

7709804



3 1378 00770 9804

NON-CIRC.

中-284



詩

詞

精

選

蘇淵雷編

▼中國三千年來詩詞之精品。盡萃於斯。

首首是大家手筆——關關是代表作品

一唱
三嘆

自近代詩起
直至詩經止

精裝一冊價洋一元八角

特價祇售九角

百讀
不厭

(寄費掛號一角五分半)

目

要

- | | | | | | | | | |
|-------|--------|-----------|-------|-----------|------------|--------|----------|----------|
| 9. 楚辭 | 8. 樂府詩 | 7. 魏晉南北朝詩 | 6. 唐詩 | 5. 唐五代兩宋詞 | 4. 元明清詩詞散曲 | 3. 近代詩 | 2. 新詩與譯詩 | 1. 新詩與譯詩 |
|-------|--------|-----------|-------|-----------|------------|--------|----------|----------|

世界書局發行

廣註加圈 活版大字

四部精華

會澤國藩先生選本 陸翔先生增註

經史子集 浩如煙海 讀者從何入手！

本書留四部之精華 集各家之名著

已替讀者——

打開門路 闢成大道

由此推進，不特國學得其捷徑，即整理國故，亦能抓住中心。數千年道術，學藝，文章之精華盡萃於斯。

國學之大觀 國故之匯海

編者將四部書約繁爲簡，汰

麤留精，而篇篇仍爲國學之

重心，歷代之名著，使讀者

節時……省錢

三大厚冊

價洋四元

特價二元

寄費二角三分

世界書局發行

中 醫 專 著				中 醫 醫 案			
醫 學 南 針	廣 註 素 問 靈 樞 類 纂	增 評 溫 病 條 辨	葉 溫 熱 經 緯	萬 病 自 療 全 書	增 補 葉 天 士 醫 案	葉 天 士 女 科 醫 案	葉 天 士 幼 科 醫 案
續初集	三冊	二冊	二冊	一冊	二冊	一冊	一冊
各 八 角	一 元	六 角	六 角	五 角	一 元 二 角	四 角	四 角

世 界 書 局

中 醫 驗 方					中 醫 醫 案		
全圖 華陀驗方新編	葉天士手集祕方	增註 徐洄溪古方新解	本祕 丹方大全	本祕 單方大全	薛生白醫案	吳鞠通醫案	分類 王孟英醫案
一冊	一冊	二冊	一冊	一冊	一冊	一冊	二冊
一	五	八	四	六	三	四	六
角	角	角	角	角	角	角	角

世 界 書 局

萬病內科外感病 自療

陸清潔編 一冊 定價 七 角

本書述每病之〔病源〕〔病狀〕〔變症〕〔療法〕〔調養〕五項，羅列清楚，使毫不知醫者，一翻是書，即知病源及其治療法，證驗靈効，如求良醫。

萬病內科內傷病 自療

陸清潔編 一冊 定價 一元二角

本書將內科內傷各症之〔病源〕〔病狀〕〔變症〕〔療法〕〔調養〕根據古方，明確指示，使對於醫藥毫無知識者，亦能自行療治。

世界書局

中華民國二十四年四月初版

中國藥學大辭典
中國藥物標本圖影
(全三冊)

定價大洋二十元

(外埠酌加運費匯費)

編輯者 中國醫藥研究社

主編者 陳存仁


發行者 陸高誼
世界書局有限公司代表人

出版者 世界書局
上海大連灣路

發行所

上海及各省

世界書局



版權所有 不准翻印

之必用防風。相得則益彰也。參有太子珠兒之別。附有烏頭天雄之稱。此氣味雖同。力量較異。卽母子兄弟。難同面目也。麻黃身發汗而根止汗。防風身疎風而根熄風。白頭翁一莖直上。有風不動。無風獨搖。則用其莖。當歸身養血而尾通血。此用根用莖之宜別也。玫瑰代代花。取其芳香。鮮薑子紅棗肉。用以補中。此花取輕宣。實主滋補之例也。用草務取新鮮。而葡萄桑葉。又貴經霜。用石藥務取沉降。而味薄難出。又必多煎。豬脊髓。鹿角膠。用骨以補骨。豬膚湯。霞天糲。用肉以補肉。此草石骨肉之用。各有不同也。故醫者苟理路既明。用藥自能執簡御繁。設方自能措施週到。而味者每謂中醫之藥。陳舊腐敗。不及西藥之簡單而取效速。殊不知西醫善治單濁之對症。不能治複式之雜症。提其精者。只能責成一味。安能復分根莖須使之妙用。而得配合畏惡之相助哉。陳君存仁。年少英俊。奮發有爲。知中藥之亟宜提倡也。亟宜整理也。爰搜集古今中外。關於醫藥之書數百部。條分縷晰。綱舉目張。廢四五年之光陰。經多數人之勘校。始克成中國藥學大辭典一書。偉哉是舉也。茲書一出。可以爲中藥之砥柱。可以並日月而爭輝。嗣後人手一編。立方選藥。瞭如指掌。其有功社會。造福後世。直空前絕後之創著也。利恆樂觀厥成。故又將處方選藥之餘緒。贅於書末。諒陳君亦首肯也夫。是爲跋。

民國二十三年國歷九月中浣武進謝利恆謹跋

謝跋

藥爲醫之利器。無藥不能成方。或以中醫之處方嫌其緩。殊不知中藥特性。苟能配合切用。未有不立竿見影。矧藥有根莖花實草石骨肉之分。更有單行並行。相須相使。相畏相惡。相得之妙。醫生立方。有如遣將。方中選藥。有如用兵。將與兵相合。則一戰而勝。兵與將相離。則一蹶不振。有如先主連營。破于陸遜。兵固在精。而不在多。關公困守於孤城。見欺呂蒙。將因需兵而不可少。故善將將者。莫如漢高。善將兵者。首推韓信。此中性質不同。所以取效各殊。論方用藥。亦猶是耳。一方之立。須認定君臣佐使。蓋君明則臣良。而佐使乃得指揮之益。君暗則臣暴。而佐使亦縱專橫之形。未見此病之向安。又見彼病之繼起也。故有熱因寒用者。如用附子而監以鼈甲。用肉桂而監以白芍是也。有寒因熱用者。如用黃連而制以吳萸。用石膏而制以薄荷是也。此皆相須相使之妙用也。獨聖散之一味甘草。獨參湯之一味人參。此皆有單刀出入。如汾陽直入回紇之力量。此單行法之神妙也。黃龍湯之人參大黃並用。六味丸之加附桂。此宣慰攻勦並行之法也。三拗湯之不去節尖。甘遂甘草湯之相反相承。皆能取效如響應。猶廉藺之刎頸。始怨而終好。適其病之所宜也。故相畏相惡之利用。亦不可不知。麻黃湯之必用杏仁。敗毒散

渾跋

民元以降。吾國醫學。日處於風雨飄搖之中。所以千鈞一髮維繫不做者。斷賴治療有實驗。藥物有功效。然則謂吾國醫學。建築於藥物也可。故藥書於醫籍中。實占重要位置。

自神農嘗百草以迄於今。藥書汗牛充棟。其間搜羅最廣博者。唯李瀕湖之本草綱目。積古人之經驗以成書。其所記述。自是實錄。然繁重而不切實用。蕪雜而不便檢查。狀述事物。畫影圖形。悉皆模糊影響。此爲時代所限。誠不足爲古人病。以今視之。自然不合時代化。殆已成過去之陳列品矣。

今者世界書局所印中國藥學大辭典。其繁重精詳。倍蓰綱目。而編述復分門別類。檢查良便。博采新知。發皇古義。影印圖本。爲往古所罕見。遂可免模糊影響之弊。解剖成分前人所未知。遂可爲科學化之張本。至於訂正別名。詳考產地。嚴定製法。發明功用。應有盡有。博大精純。可謂空前巨著矣。

嘗聞一國文化之進步。常與辭書相比例。辭書聚各種學說而理解之。用科學方法編輯之。誠爲學者重要之工具。吾國醫學。在此風雨飄搖之時。其有否極泰來之望乎。吾將於此書之出而占之。

中華民國二十三年十月渾鐵樵跋

目張。蒐集四千餘年藥物學之大成。清代趙吳二公之後。陳君能繼趙吳未竟之志。成此巨帙。不愧爲現代藥學大家。際此國粹醫學。主用科學整理期間。國藥建設。尤爲整理藥學之發軔。陳君此編。不僅爲國醫藥界謀福利。更且爲國產挽利權。農村謀生計。一舉而數善備矣。今是書出版在即。囑跋於余。爰述國藥之沿革。及陳君編輯是書之意旨。是爲跋。

中華民國二十四年二月四明曹炳章謹跋

二卷。較之弘治原本。更爲詳備。惜未刊行。乾隆三十年。錢塘趙恕軒。撰本草綱目拾遺十卷。本草話三十卷。花藥小名錄四卷。藥性元解四卷。奇藥備考六卷。足補諸家本草所未備。正李氏之訛誤及遺漏。乾隆時奉敕撰圖書集成。內有草木典三百二十卷。禽虫典一百九十二卷。關於藥用動植物。搜採豐富。且一物一圖。效用主治。收採時日。以及經史詩文之考正。能補正本草缺略者甚多。道光朝之吳其濬。撰植物名實圖考三十八卷。又長編二十二卷。其搜集經史百家。各地志書。有關藥用植物。有說無圖者曰長編。發明效用。辨識形態。有圖有說者曰圖考。共列藥一千七百十四種。彙集衆說。闡幽發微。有裨益於後學。趙吳二公。爲有清以來之藥學發明家。其他明清本草。不下三百餘種。雖各有獨到處。亦各有訛誤處。非可以與趙吳二公相並列。現代上海陳君存仁。爲余神交友也。學問淵博。經驗豐富。其著作已風行海內。有口皆碑。毋容余贅述也。近年著有中國藥學大辭典一書。以科學體例。博採經驗學說。考察藥物標本。繪以彩色精圖。爲便利檢查計。仿曾通辭典體例。以藥名首字筆劃多少。以分部次。注重實際理論。不尙玄學空談。每列一藥。分別命名。基本。產地。形態。種植。性質。效能。成分。主治。歷代記述考證。辨僞。近人學說。（如歐美日本新學說）配合。應用。用量。等項。條分縷析。綱舉

宗弘治十六年。奉敕命施欽等撰本草品彙精要四十二卷。各藥別爲十類。每藥分「名」「地」「苗」「時」「收」「用」「質」「色」「味」「性」「氣」「臭」「主」「行」「助」「反」「製」「治」「合」「禁」「戒」「忌」「解」「膺」爲二十四項。附以彩圖。其書中生產方土。皆漢地名。今復加以考正。附載卷末。爲本草之別開生面者也。嘉靖時陳嘉謨撰本草蒙筌十二卷。首附熊宗立歷代名醫圖考一卷。及製藥總論。藥性歌二百四十首。搜採藥七百四十二種。依王綸集要部次。每種別氣味。產地。收採。治療方法。撰成對語。以便記誦。同時許希周撰藥性粗評四卷。取常用藥品。撰成俚句。附以發明單方。其藥物形態。辨悉尤詳。最合初學之用。同時李時珍撰本草綱目五十二卷。列爲一十六部。類凡六十。蒐羅百家。訪採四方。始于嘉靖壬子。終于萬曆戊寅。稿凡三易。增新藥三百七十四種。新舊列藥一千八百九十二種。附方八千一百六十。廣收博採。集其大成。厥後盧子繇著本草乘雅半偈十一卷。以神農本經所錄。凡三百六十五種。古有今無者。刪去一百四十五種。採掇別錄以下適用之藥。如其數補足之。考辨詳明。繆氏希雍。亦著本草經疏三十卷。分本草爲十部。每藥皆有發明。故謂之疏。冠以序例二卷。論三十餘篇。亦多深義。清康熙十一年。何鎮撰本草綱目類纂必讀十二卷。集李氏之要。有裨於檢考。康熙三十九年。命王道純。奉敕重修本草品彙精要四十二卷。附續集十卷。四言舉要

諸醫官重修開寶本草。新補入十二種。新定一十七種。統計一千〇八十二種。謂之嘉佑補注本草。共二十卷。雖有增補。無大發明。後又詔天下郡縣所產藥物。命太常博士蘇頌撰述圖經本草二十一卷。考證詳切。頗有發明。但圖與說異。是其缺點耳。宋哲宗元祐中。醫士陳子丞合本草及圖經爲一。謂之重廣補注神農本草。并圖經二十三卷。間綴數語。無所發明。徽宗大觀二年。蜀醫唐慎微取嘉祐補注本草。合爲一書。復述諸家本草所遺者。五百餘種。增新藥八種。附入各部。又採古今單方。並經史百家之書。有關藥物者。亦附之。名經史證類本草。計三十一卷。上之朝廷。改名大觀本草。諸家說藥之書。能垂千古。不致湮沒。皆其功也。政和二年。醫官寇中奭編撰圖經集註衍義本草五卷。又圖經衍義本草四十二卷。以補註圖經之書。參考事實。覈其物理。援引辨正。發明良多。其書刊入正統道藏中。惜是書校刊不精。訛誤脫落甚多。政和六年。復命醫官曹孝忠將大觀本草。增附寇氏衍義。校正刊行。名曰政和新修本草三十一卷。（一名政和新修經史證類備用本草。）後高宗紹興二十九年。復命醫官王繼先校正。別刊紹興校定經史證類備用本草十二卷。皆淺俚。無高論。其他如靳霖六之本草會編。詹瑞芳之本草類要十卷。龐安時之本草補遺一卷。沈括之藥儀一卷。各有實驗發明。金元朝諸家藥性本草。得炳章所見者。計一十四種。無大改革發明。故從略之。明孝

品五味寒熱之性。採蓄時月之法。以定主療疾病。補別錄之未備。至唐高宗命英國公李勣等。修陶隱居所著本草經。增加七卷。名英公唐本草。頗有增益。至顯慶中。右監蘇恭。重加評註。表請修定。復命太尉趙國公長孫無忌等。與公詳定。增藥一百一十四種。分爲十一部。凡二十卷。別爲藥圖二十五卷。圖經七卷。世謂之新唐本草。後如甄權著本草音義七卷。藥性論四卷。增新藥四種。分藥品之性味。君臣佐使。主治各病之效能。又孟詵著食療本草三卷。祇採食養療病藥二百四十種。至開元中。陳藏器以神農本經。雖有陶蘇補集之說。遺漏尙多。博極羣書。精竅物理。訂正訛誤。搜羅幽隱。撰有序例一卷。拾遺六卷。解分三卷。總曰日本草拾遺。增藥三百六十九種。他如李珣著海藥本草七卷。搜集海藥。頗多發明。又鄭虔著胡本草七卷。皆詳胡中所產藥物。今已失傳。後蜀主孟昶。命韓保昇與諸醫士。取唐本草參校增補注釋。別爲圖經。昶自爲序。其圖說藥物之形狀。較詳於陶蘇也。宋太祖開寶六年。命尙藥奉御劉韓道士馬志等九人。取唐蜀本草。及諸家相參校正。并取陳藏器拾遺參校。訂正別名。增藥一百三十三種。馬志爲注。名曰開寶本草。計二十一卷。新舊合藥九百八十三種。廣頒天下。是時日華子姓大名明。著日華諸家本草二十卷。集諸家本草所用藥。各分以性味寒溫。花實蟲獸分類。其言功用甚悉。宋仁宗嘉佑二年。詔光祿卿掌禹錫。尙書祠部郎中林億等。同

曹跋

淮南子曰。神農嘗百草滋味。一日而七十毒。由是醫方興焉。蓋上古之世。未著文字。師學相傳。謂之本草。張華輩始因古學。附以新說。通爲編述。本草由是見於經錄。掌禹錫曰。舊說本草經三卷。神農所作。而不經見。漢書藝文志亦無錄焉。唐李世勣等以梁七錄。始載神農本草三卷。又疑其所載後漢郡縣。有後漢地名。似張機元化輩所爲。其實亦不然也。寇宗奭云。漢書雖言本草。不能斷其何代所作。淮南子言神農嘗百草以知藥。亦無本草之名。惟王世紀云。黃帝使歧伯嘗味草木。定本草經。造醫方以療衆疾。乃知本草之名自黃帝始。陶弘景曰。軒轅以前。文字未傳。藥性所主。嘗以組織相因。至於桐雷。乃著在編簡。而此書因與素問同類。考本草經三卷。分上中下三品。搜採藥三百六十五種。是本草之始也。桐君著有藥錄二卷。說其花葉形色。採藥時日。又採藥別錄二卷。乃後訪採藥物續編。雷公亦著藥對二卷。論佐使相須。蓋上古聖賢具生知之智。故能辨天下品物性味。合世人疾病所宜。後世賢智之士。從而知之。代有發明。如梁之陶弘景。增漢魏以下。名醫所用之藥。三百六十五種。合本草經爲七百三十種。首敘藥性之源。次分玉石草木菓菜米食。有名未用。以朱書爲本經。墨書爲別錄。又著藥像口訣一卷。論藥

外人將借箸而代謀矣。然則陳君此舉。又無殊中流之砥柱也哉。至於陳君年少多才。早已名馳於海內。書成付槧。定看紙貴乎洛陽。可預卜云。是爲跋。中華民國二十三年孟春之月夏紹庭應堂敘於九芝山館

夏跋

嘗稽歷來本草圖籍。得百六十種。益以近賢所著。近二十種。發明增補。糾訛訓詁。衡之他國。可謂富矣。然各本所學。言成一家。鮮有邏輯蔚爲大觀。有之。吾於古得李東璧氏之本草綱目。於今得陳存仁君主纂之中國藥學大辭典二書而已。李氏以草木分部。從其類也。陳君以筆劃爲次。便於檢也。李氏以本經爲正。旁采宏景張李諸家。而古義完矣。陳君以綱目爲主。增續東西國內時人。而新說備矣。就人參言。李氏先釋名。次集解。次修治。次氣味。次主治。次發明。次正誤。次附方。陳君於釋名中。更分別名。西名。學名。處方用名等。主治中。分功用效能。仲景發明。歷代考證。國外研究學說等。復增基本。成。分。形態。栽培。採取等。或詳其略。或補其闕。兩相比觀。其精密宏博。實多突過前人之處。夫學問之道。隨時隨地。俱在進化。故不厭其詳。不賤其新。惟其詳。斯能深切瞭解。惟其新。斯能逐步推進。陳君蓋知其要矣。方今國外人士。竭力注意於吾國藥物。英人伊博思氏之繙譯本草綱目。駭爲珍寶。德人湯姆斯氏之蒐集中藥標本。陳列化驗。美人威爾遜氏之赴四川峨嵋。採取大黃黃連。日人宮島幹之助氏之組織漢藥特委會。其彰明較著者也。據此推測。國人而再不能加以整理。外人將越俎而代庖矣。國人而再不能從事改進。



呂跋

吾國醫藥。發明最古。藥學專著。代不乏人。逮近世以來。俗尚歐西。中藥已漸有式微之慨。祇以國人不加整理。僅圖墨守。難與維新。匪獨吾國藥物。勢將退化。卽古代先哲發明之藥理。歷千百禩而不朽者。亦將隨世界之潮流以俱去。有心人所爲悵悵然悲也。今觀陳存仁先生主撰中國藥學大辭典一書。其殆先得我心者矣。不佞研究醫藥。垂二十年。每以不能振興中藥爲憾。嘗有志於改良或整理。而力未之逮。今得先生搜集成書。對於中藥之產地。形狀。種類。與夫性質。功用。栽植。炮製。種種方法。言之綦詳。使吾國人無老無幼。無賢愚不肖。皆能明瞭吾國藥物功能之大。卽吾人類之生於天地間。凡有一病。自有一藥物以愈之。不假外求。自知其要。其有裨於吾人生活之康健。豈曰小補之哉。況今國外人士研求吾國文化。咸竭力注重於藥物之一途。年中搜羅吾國藥材。再加化驗。而又轉售於吾國者。數亦不尠。禮失而求諸野。則奚若保持其勿失。而惟自己是求。然則中國藥學大辭典一書。亦保持中藥之干城也矣。是爲跋。

中華民國廿四年春三月新會呂哲公撰於僑港國醫聯合會

後。取精而用宏。則庶幾進道也夫。

民國二十二年二月皖歙王仲奇撰於海上之畸廬

王跋

醫道至繁。病形而藥用。其爲用也。古簡而今繁。要歸於適當而已。余家世業醫。閱本草諸書。知藥類至夥。未易殫述。今觀陳氏中國藥學大辭典。旁徵博引。可謂詳且盡矣。雖然。藥無盡。學亦無盡也。出吾國門。西探美洲之大陸。東攬海邦之富士。轉歷五印度之叢山疊嶂。其間熾熾鬱鬱。含英蘊奇。莫可名狀者。無限也。是猶以國外者言之也。卽吾國中而言。若能西上峨岷。東登泰岱。北涉恆鎮。南入羅浮。其間所採之飛潛動植。或有出乎古今中外書目所錄之外者。亦無限也。綜而觀之。則彌六合者皆藥也。皆吾學之所存者也。今陳氏之用心。則主以中國之本草。輔以他邦之載籍。慇懃羅輯。取資對鏡。蓋知所先也。若非然者。則將犇走舟車。皇皇然如徐霞客之徧游名山。某氏之經卅餘國。行六十萬里。恐不勝其煩。猶無當於藥學耳。爲藥學者。或創獲一物。遠符千金之古方。或專精一科。近摘十步之芳草。或遵呂氏之萬變。通都僻壤。市之咸宜。或宗司命之二書。呶咀酌量。投之亦效。是亦吾學之所存。吾儕所當勉者也。余更有說焉。皇甫坦之禁諸欲。是藥之於未病之先。扁鵲之調陰陽。乃藥之於既病之後。皆非學而通乎道者。不爲功也。讀是編者。請勿銜國外之藥。而試考國中之藥。能療他人之病。必自治一己之病。知所先

丁跋

國醫釋藥之書。炎帝本經爲最古。繼之者爲陶隱居之別錄。宋金元明。代有作者。雖皆指實課虛。推闡盡致。而博大詳明。要以李時珍之本草綱目爲最備。海通以來。舟車便利。縮萬里於咫尺。萃萬國於一堂。奇卉異草。不期而咸集。藥類愈繁。用舍愈宏。居今日而視李氏之綱目。猶李氏當日之視隱居別錄矣。其爲隘狹。何能深諱。陳君存仁。好學深思士也。深慨藥典之未備。應用之未宏。乃集合醫藥研究社同人。廣羅舊籍。博采新說。成爲中國藥學大辭典一書。每一藥。先正名。分處方之名。古籍之名。外國之名。產地之名。及市中隱名。正名而外。則標其產地。詳其形態。分其種類。弁種植栽培之要。採取之法。炮製之方。無不詳哉言之。至於性質。功用。主治。亦較他書爲備。而歷代名醫之藥論。外邦醫家之論述。尤采輯無遺。誠中國藥籍中空前之巨著也。兼附精圖千四百幅。內則攝影以顯其真。彩繪以著其色。工筆以狀其形。全書凡三百二十萬言。迭易寒暑。數經易稿。成書豈易言哉。陳君年甚少。吾不意其力學之精。竟若是也。此書出而嘉惠醫林。功豈在時珍下。余對於藥籍。愧未有所發明。因中國藥學大辭典之成。樂而爲之跋。

中華民國二十二年一月二十三日武進丁仲英跋

參考書目

有毒植物撮要

類似植物博異

植物目錄

藥學概言

生草藥之掘發

斷腸草之研究

蠶豆壳的功用

胡滿即斷腸草辨

金錢草治驗膀胱石三則

三七有殊異之功能

三七有殊異之功能

龜是痔瘡的靈藥

蟲虫辨

崇旋覆

巴豆

續隨子治水腫之宜忌

萊菔之功用

經驗生草藥性

垂絲柳解

論中國藥學

葎之研究

地黃之研究

朴硝

張祿有 武昌博物學會雜誌一卷二期

錢城 武昌博物學會雜誌三卷二期

張亨 武昌博物學會雜誌四卷二期

區若平 廣東醫藥雜誌一卷一期

李仲守 廣東醫藥學報一卷七期

李仲守 廣東醫藥學報一卷七期

沈壽鵬 廣東醫藥學報一卷六期

李仲守 廣東醫藥學報一卷六期

繆永祺 廣東醫藥學報一卷六期

李仲守 廣東醫藥學報一卷六期

張錫純 廣東杏林醫報一卷二期

張錫純 廣東杏林醫報一卷二期

沈玉書 廣東杏林醫報一卷三期

張錫純 廣東杏林醫報一卷九期

張體元 廣東杏林醫報一卷九期

沈仲圭 廣東杏林醫報一卷十期

沈仲圭 廣東杏林醫報一卷十期

張體元 廣東杏林醫報一卷十五期

劉琴仙 廣東杏林醫報一卷十五期

盧朋著 廣東杏林醫報一卷十八期

楊百城 廣東杏林醫報一卷廿四期

趙盡臣 山西醫學雜誌第一期

趙盡臣 山西醫學雜誌第三期

趙盡臣 山西醫學雜誌第四期

答人參問

辨東人參緒于氏論人參

石膏論

塘牛黃之研究

車前草

紅升白降丹之煅煉法

人參之成分與功效

元寶草治血病

三春柳之研究

藥物學之研究

麻黃

高嶺土與礬石之研究

麻黃去沫之研究

防己之成分及效驗

藥炭與木炭之研究

國產藥物專號

化州橘記

馬錢子毒質不去之研究

化橘記書後

論大黃功用

點草考古

記蘿藦之功用

貝母半夏之研究

陳公澤 山西醫學雜誌第四期

張錫純 山西醫學雜誌第五期

張錫純 山西醫學雜誌第六期

董鑑組 山西醫學雜誌第十期

薄桂堂 山西醫學雜誌第十一期

相里柱 山西醫學雜誌第十二期

高恩潛 山西醫學雜誌第十三期

張龍芝 山西醫學雜誌第十四期

喬尙謙 山西醫學雜誌第十四期

高恩潛 山西醫學雜誌第二十期

章飛仙譯 山西醫學雜誌第十八期十

九期二十期

王熾 山西醫學雜誌第二十一期

徐世長 山西醫學雜誌第二十一期

黃國材 山西醫學雜誌第二十一期

王熾 山西醫學雜誌第二十二期

社會醫報第一八四期

劉筱雲 山西醫學雜誌第二十四期

王熾 山西醫學雜誌第二十五期

張錫純 山西醫學雜誌第二十七期

劉前英 山西醫學雜誌第二十八期

許小士 山西醫學雜誌第三十三期

趙意空 山西醫學雜誌第三十三期

米煥章 山西醫學雜誌第三十五期

草果之功用

孫秉公 上海中醫雜誌第十九期

荊芥之研究

陳亦毅 廣東醫林一講雜誌第一期

番瀉葉之研究

程登瀛 廣東醫林一講雜誌第二期

龍涎香之討論

程登瀛 廣東醫林一講雜誌第六期

石膏之研究

張澤霖 廣東醫林一講雜誌第六期

長圓形石蓮子不可用

程登瀛 廣東醫林一講雜誌第六期

防己之研究

葉橘皋 廣東醫林一講雜誌第六期

麻黃底討論

趙倚江 中醫雜誌廿九三十期

藥學研究方法

孫家驥 中醫雜誌廿九三十期

中國藥之研究

袁淑範 奉天民醫雜誌

犀角(一卷一期)

黃芪(二卷二期) 桔梗(二卷七期)

防風(五卷一期)

獨活(五卷二期) 土當歸(五卷三期)

都管草(五卷四期)

升麻(五卷五期) 苦參(五卷六期)

白蘇(五卷七期)

延胡索(五卷八期) 貝母(五卷九期)

山慈菇(五卷十期)

石蒜(五卷十一期) 水仙(五卷十二期)

白茅(六卷一期)

龍胆(二) 細辛(三)

杜衡(四)

及己(五) 鬼督郵(六)

徐長卿(七)

白薇(八) 白前(九)

草犀 釵子君 吉利草(十)

百兩金(十一) 硃砂(十二)

辟瘟雷 錦地羅 紫金牛(第七卷第一期)

拳 參 鐵線草 金絲草(第七卷第二期)

大黃之研究

郭紹庭 江都醫學月刊第一期

中國醫藥衛生常識

葉橘皋 醫界春秋五十四期五十六期五十七期

蝦蟇草考證

楊華亭 醫界春秋五十七期

仲景用附子之研究

謝安之 醫界春秋五十七期

麝香之研究

張澤霖 醫界春秋五十七期

藥物學研究之方法

楊野鶴 醫界春秋五十七期

黃連之研究

時逸人 醫界春秋三十九期

革藥不可治淋

張錫純 醫界春秋三十九期

牡蠣攷

趙式訓 醫界春秋三十九期

白頭翁之研究

許小士 醫界春秋三十七期

阿膠之研究

李健頤 醫界春秋三十七期

麻黃攷證

楊華亭 醫界春秋五十六期

石膏治病無分南北論

張錫純 醫界春秋五十六期

烏頭攷證

楊華亭 醫界春秋五十六期

山茱萸攷證

楊華亭 醫界春秋五十六期

黃連攷證

葉橘皋 醫界春秋五十六期

附子柴胡

章次公 中國醫學月刊一卷五期

燕窩談

顧紹衣 上海東方雜誌十五卷八號

當歸確有調經種子之功

荊武蒙 中西醫學報十卷十期

犀牛全身多入藥

吳秉璋 現代名醫驗案第五期

冬虫夏草考

楊百城 山西醫學雜誌三十一期

元明粉之神效治驗談

呂子厚 山西醫學雜誌五十九期

峨眉山游記

克士 自然界雜誌五卷八期

藥用植物

洛文 自然界雜誌五卷九期

參考書目

八

全蠟及蛤蚧

談犀

金鷄納霜截癰應當注意的

胃痛特效藥

辨茸

藤鹽土鹽之製法

龍草之藥效問題

芭蕉葉水萍糖新用法

石膏攷驗

討論冬虫夏草之種類及效用

藏紅花栽培法

藥物與產地之關係

蓖麻油中西異性說

地頭

青黛宜用土錠說

肉桂之栽培及製造法

燕窩

人參真偽和類別淺說

麥門冬之研究

論淡豆豉

論慈苡仁之滋養力

丁香 黃連 巴戟天 薺尼

程登瀛 新嘉坡醫藥月刊第十三期

程登瀛 新嘉坡醫藥月刊第五期

程登瀛 新嘉坡醫藥月刊第四期

程登瀛 新嘉坡醫藥月刊第四期

何心餘 新嘉坡醫藥月刊第三期

程登瀛 新嘉坡醫藥月刊第三期

程登瀛 新嘉坡醫藥月刊第三期

凌鎔清 新嘉坡醫藥月刊第二期

黎百概 新嘉坡醫藥月刊第十一期

曹炳章 紹興醫藥報

張若霞 紹興醫藥報

裘吉生 紹興醫藥報

裘吉生 紹興醫藥報

裘吉生 紹興醫藥報

張汝偉 紹興醫藥報

曹炳章 紹興醫藥報

長青 自然界雜誌六卷七期

丁智伯 杭州三三醫報二卷二期

謝安之 上海中醫世界雜誌第一年

策訂

陸成一 上海中醫世界雜誌第一年

策訂

鐘廉 新刊紹興醫藥月報三卷四期

朱守眞 舊刊紹興醫藥月報十卷十期

牛膝紫貝天葵草河東等

石膏論

貝母

辨中藥之真偽

藥品道地錄

藥性類編

論柴胡

石膏不可煨煉用

藥物之真偽辨

柴胡治瘧之我見

薤白解

本草選旨

藥物案隱

鬱金之研究

赭石解

羚羊角解

芍藥之研究

本草分類詩

本草分類詩

甘草說

石膏煨用即同漬水論

牡蠣記實

馬叔眉 紹興醫藥學刊十卷十一期

張錫純 上海中醫雜誌第二期

崔眞吾 上海中醫雜誌第二期

王葦生 上海中醫雜誌第四期

葉勁秋 上海中醫雜誌第七八期

徐子石 上海中醫雜誌第七期

高思潛 上海中醫雜誌第八期

張錫純 上海中醫雜誌第九期

祝天一 上海中醫雜誌第九期

祝天一 上海中醫雜誌第九期

朱不華 上海中醫雜誌第九期

閻立陞 上海中醫雜誌第十一期廿三期

祝天一 上海中醫雜誌第十一期至十九期

王慎軒 上海中醫雜誌第十一期

張錫純 上海中醫雜誌第十二期

張錫純 上海中醫雜誌第十二期

王慎軒 上海中醫雜誌第十四期

胡仿西 上海中醫雜誌第十四期

胡仿西 上海中醫雜誌第十五期

沈仲圭 上海中醫雜誌第十六期

張錫純 上海中醫雜誌第十八期

王陽春 上海中醫雜誌第十九期

藥用植物及其用途 和漢藥研究所
有毒植物及其注意 全 上

本草圖譜 本岩崎常正氏

藥用植物五彩圖(計單片二十四幅繪圖者無攷)

近代各雜誌藥學稿件

瘧子頸草之採訪與識別

肺形草之採訪與識別

麻黃之研究

大蒜之研究

藥籠小品

瓜蒂攷

漢藥寫真集成專號第一輯

漢藥寫真集成專號第二輯

食療本草之攷察

藥物研究

羚羊與犀角

逸狼把草

龍齒治效之徵驗

和漢生藥之藥理研究

鹿茸治神經衰弱之特效

一冊

一冊

一冊

俞鳳賓 中西醫學報九卷一號

俞鳳賓 中西醫學報九卷三號

丁名全 中西醫學報九卷三號

晉陵下工 中西醫學報十卷十號

黃退庵 現代國醫雜誌一期至四期

王錫光 現代國醫雜誌第二期

中尾萬三 木村康一 自然科學研究

所彙報第一卷第二號

中尾萬三 木村康一 自然科學研究

所彙報第一卷第五期

中尾萬三 自然科學研究所彙報第

一卷第三期

王治華 浙省中醫月刊第三期

王治華 浙省中醫月刊第三期

張若霞 浙省中醫月刊第三期

王治華 浙省中醫月刊第四期

蘇錦全 浙省中醫月刊第四期

許勤助 浙省中醫月刊第七期

垂絲柳

食鹽

藥學論文十九篇

發展中國藥的入手辦法

麝香

川芎之成分

漢藥麻黃之醫治效用

中國藥科分劑表

本草綱目今釋

科學的國產藥物研究之第一步 余雲岫

(又學藝雜誌二卷四期)

漢藥目錄

茯苓

漢藥治病之成績

大蒜治療之成績報告

藥物學之研究法

蛤蚧與 LIZARD

石膏功用卓著與煨煉

石蓮子有長圓二種

黨參

羚羊山羊毛白角片之來源

蛙之種類及入藥部分

燕窩之種類

盧朋著 廣東光漢醫藥月刊第一期

余照溥 廣東光漢醫藥月刊第一期

張梅庵 上海中國藥報第一期

黃勝白 同德醫藥學五卷五期

鄭訓 同德醫藥學五卷五期

張天放 同德醫藥學六卷五期

袁淑範 同德醫藥學六卷五期

俞鳳賓 同德醫藥學五卷一期

趙燭黃 同德醫藥學五卷五期起六

卷一期止

同德醫藥學六卷三、四期

趙燭黃 同德醫藥學七卷一期

邵公佑 同德醫藥學七卷一期

孫祖烈 同德醫藥學七卷三期

丁濟華 同德醫藥學七卷三期

秦伯未 中醫指導錄第二卷十三期

程登瀛 新嘉坡醫藥月刊第十一期

羅美東 新嘉坡醫藥月刊第十三期

羅美東 新嘉坡醫藥月刊第八期

章存之 新嘉坡醫藥月刊第六期

程登瀛 新嘉坡醫藥月刊第十二期

程登瀛 新嘉坡醫藥月刊第十期

程登瀛 新嘉坡醫藥月刊第六期

程登瀛 新嘉坡醫藥月刊第六期

參考書目

各地中醫學校講義

藥物學講義	廣東中醫藥學校	李嘉範仲恒原編	四冊
藥物學綱要	蘭谿中醫學校	盧朋著補編	一冊
實驗藥物學講義	杭州中醫專門學校	張山雷著	一冊
藥物學講義	山西中醫專門學校	時逸人編	一小冊
藥物學講義	上海國醫學院	章成之編	四冊
藥物學講義	上海中醫專門學校	丁甘仁編	二冊
藥物學講義	上海中醫專門學校	徐訪儒編註	八冊
藥物學講義	上海中國醫學院	盛心如編	二冊

日本之部

和漢藥考	小泉榮次郎	有中譯本	二冊
和漢藥物學	日野五七郎	一色直太郎	二冊
民間藥及其利用法	九山房雄		一冊
漢方醫藥全書	聚原廣山		一冊
藥草與特效藥研究	藥草研究所		一冊
藥草與毒草	篠田平三郎	張落霞譯	二冊
重修本草綱目			四十冊
藥徵	吉益東瀾	有中文本二種	一冊
續藥徵	村井大年氏	有中文本二種	一冊
氣血水藥徵	吉益南涯氏		一冊
黑燒之研究	小泉榮次郎		一冊
日本草木圖說二十卷			一冊

本草啓蒙四卷	本草名疏三卷	本草和名深根輔仁十卷	扶桑採藥輯要	安南藥品攷	本草圖補	古方藥品圖攷	高麗人參圖說	毒草圖說	獐麝圖說	藥經太素二卷	康賴本草二卷	東華本草	藥治通義十二卷	一本堂藥選附錄續編三卷	藥治通義	和漢藥寶典	和漢藥之常識	和漢藥良否鑑別	和漢藥治療要解	皇漢醫學	漢藥寫真集 二輯	食療本草之攷察	藥用植物寫真集
丹波元堅	岡本幸一郎	古木仁	一色直太郎	鶴飼禮堂	湯本求真	中尾萬三	木村康一	中尾萬三	刺米達夫	和氣廣世著	丹波康賴	香川修德太冲和											
一冊	一冊	一冊	一冊	一冊	一冊	一冊	一冊	一冊	一冊	一冊	一冊	一冊	一冊	一冊	一冊	一冊	一冊	一冊	一冊	一冊	一冊	一冊	一冊

民國

規定藥品之商標二冊

偽藥條辨四卷

中華藥學源流考(紹興醫藥學報)

中國藥物學史綱一冊

藥物學講義二冊

中國醫學史一冊

本草正義七冊

新中藥一冊

英譯本草綱目藥學植物第一卷

藥物出產辨一冊

中國醫學大辭典二冊

中國藥物新辭典一冊

中華藥典一冊

中藥大辭典一冊

中國藥物學一冊

中外藥名對照表一冊

方藥攷論類編一冊

中國醫藥問題一冊

藥飲啓秘一冊

中國實用藥物學一冊

製藥指南(又名國醫製藥學)一冊

曹炳章

鄭肖岩 曹炳章

曹炳章

何梅霜

秦伯未

陳賢邦

張山雷

黃勞逸

英人伊博思

華人劉汝強

陳任枚

謝利恒

江忍庵

衛生署

趙公尙

季愛人

萬鈞

張贊巨

王一仁

許牛龍

趙賢齊

張仲岩

藥物游記錄一冊

衷中參西錄(第四期藥學)一冊

草藥圖考四卷

中國藥物形態學一冊

藥物名彙一冊

中國植物圖譜二冊

藥性提要一冊

家庭新本草一冊

化學實驗新本草一冊

本草思辨錄四冊

新本草教本一冊

辨藥指南一冊

藥用作物學一冊

藥物辨異一冊

本草辨錄一冊

要藥選一冊

新本草圖誌二冊

用藥禁忌書一冊

藥物學集說二卷

藥性輯要一冊

參苗大觀一冊

藥物大成一冊

當參新研究一冊

李春芝

張錫純

裘吉生

沈嘉徵

華鴻

中英對照

秦伯未

丁福保

丁福保

周伯度

顧子靜

賈九如

方曉章

陸晉笙

趙橘黃

陸晉笙

紹興醫報社

趙橘黃

陸晉笙

紹興醫報社

趙橘黃

陸晉笙

趙橘黃

參考書目

本經疏證十二卷

本草綱目拾遺十八卷

藥性元解(利濟十二種之一)四卷

奇藥備攷(利濟十二種之一)六卷

本草話(利濟十二種之一)三十卷

本草類方十卷

本草萬方鍼線八卷

本經逢原(在張氏醫通中)四卷

本草備要四卷

本草從新十八卷

神農本草經百種錄一卷

本草原始十二卷

本草便讀一卷

本草通元二卷

本草主治二卷

本草求真十卷

得宜本草一卷

本草經實一卷

藥性賦音釋一卷

藥品辨義三卷

藥證忌宜一卷

本草問答二卷

要藥分劑十卷

花藥小名錄

鄒澍

趙學敏

趙學敏

趙學敏

趙學敏

年希堯

蔡烈先

張璐(石頑)

汪昂

吳儀洛

徐大椿

李正宇

黃鉉

李中梓

黃宮繡

黃宮繡

王子接

葉志詵

余濟高

尤乘

陳澈

唐容川

沈芊綠

百草鏡

本草崇原集說三卷

本草會通

本草必用

長沙藥解四卷

玉楸藥解八卷

本草匯十八卷

本草綱目求真十二卷

本草經解

食物本草備考二卷

本草詩鑑四冊

本草述鈎元十二冊

本草分經審治一冊

隨息居飲食譜二冊

李東垣註雷公藥性賦二冊

重刻人參攷一冊

光論人參攷(靈鸞閣叢書中)二冊

本草圖解三冊

本草衍語(三三醫書中)一冊

植物名實圖攷一巨冊

本草纂要

本草新編

本草時義一冊

仲即庭

袁桂生

顧金壽

黃元御

黃元御

郭章宜

黃宮繡

葉天士

何克諒

楊時泰

王士雄

李東垣

唐秉鈞

李中梓

編者失名

吳其濬

龍方穀

陳士鐸

陳葆善

本草衍義補遺

湯液本草

本草證類

療癰疽耳眼本草要鈔

本草歌括

日用本草八卷

明

本草經疏三十卷

本草品彙精要

本草綱目五十二卷

本草乘雅半偈十卷

本草述三十二卷

本草發揮三卷

丹溪藥要一卷

本草集要八卷

庚辛玉冊

本草蒙筌二十卷

本草會編二十卷

救荒本草四卷

食物本草二卷

食鑑本草

本草證治辨明一卷

本草單方八卷

朱丹溪

王好古(海藏)

沈好問

王好古

胡仕可

吳瑞

繆希雍

內府孤本朱啓鈴藏

李時珍

盧之頤

劉若全

徐彥純

趙良仁

王綸

羅仙著

陳嘉謨

汪機

周憲王

王穎

寧原

徐彪

王履

本草單方八卷

本草單方八卷

本草古方講意

藥性準繩一卷

藥性對答一卷

藥性標本十卷

藥性賦補遺一卷

藥性辨疑一卷

藥品徵要

藥鏡四卷

本草發明彙要

本草彙言

本草輯要

本草類方

本草性能

方藥宜忌攷十卷

本草鈔一卷

清

校正神農本草三卷

本草崇原三卷

神農本草經讀三卷

本草三家註四冊

本草經疏輯要十卷

繆希雍

李時珍

瞿良

賀岳

翟良

吳文獻

熊宗立

姚能

姚濬

蔣儀

劉默

倪朱謨

邢增捷

黃良佑

王宏翰

繆希雍

方有執

孫星衍

張隱庵志聰等

陳念祖

葉天士等

吳世鑑

唐

唐本草(即唐新修本草又名英公本草)五十三卷李勣大尉趙國公長

孫無忌及蘇恭等二十三入

新修本草圖經四十卷

新本草四十卷

蜀本草二十卷

本草拾遺十卷

藥性本草(又名藥性論)四卷

本草性事類一卷

南海藥譜(即南海本草)六卷

湖本草七卷

藥錄纂要(載千金翼)

千金食治

食療本草三卷

食性本草十卷

本草音義廿卷(一作二卷)

本草音義七卷

四聲本草五卷

刪繁本草五卷

海藥本草

本草經方

蘇恭

王方慶

韓保昇等

陳藏器

甄權

杜善方

鄭虔

孫思邈

孫思邈

孟詵

陳士良

李含光等

甄立言

蕭炳

楊損之

李珣

劉禹錫

開寶新詳定本草廿卷

嘉祐補註本草廿卷

開寶重定新本草……(簡稱開寶本草廿一卷)

經史證補備急本草(簡稱證類本草)三十二卷

嘉祐圖經本草廿卷

大觀本草二十卷

政和新修經史證類本草(簡稱政和本草)

重廣補註神農本草及圖經廿三卷

本草衍義二十卷

日華諸家本草二十卷

本草括要詩三卷

證類本草單方三十五卷

本草外類五卷

本草辨誤一卷

本草會編

本草補遺

金元

珍珠囊一卷

潔古本草二卷

重修大觀本草三十二卷

用藥法象一卷

珍珠囊指掌補遺藥性賦四卷

東垣藥性賦

馬志

掌禹錫等

劉翰馬志等

唐愷微

蘇頌

孫集賢

曹孝忠

陳承

寇宗奭

日華子大明序

張文懿

王誤

鄭辨

崔源

靳超蛟

龐安時

張元素

張元素

張存惠

李杲

李杲

李杲

宋

本書參攷書目

周 秦 兩 漢

神農本草經三卷

蔡邕本草七卷

南 北 朝

神農本草五卷

神農本草屬物二卷

神農明堂圖一卷

名醫別錄七卷

陶隱居本草十卷

隋賈本草九卷

本草六卷

本草經三卷

本草病源合藥要鈔五卷

四家體療雜病本草要鈔十卷

小兒用藥本草

癰疽耳眼本草要鈔

本草集註七卷

本草經

本草經細行本草經利用各一卷

新集藥錄四卷

陶弘景

秦承祖

王季瑛

徐叔響

仝上

王未鈔

陶弘景

趙贊

趙贊

徐涇

藥草錄六卷

藥法四十二卷

藥性藥對各一卷

神農採藥經二卷

藥忌一卷

雷公藥對二卷

雷公泡炙論三卷

隋

本草二卷

本草經類用三卷

本草集錄二卷

本草雜要訣無攷

本草錄藥性三卷

芝草圖一卷

入林採藥法二卷

太常採藥時月一卷

四時採及合月錄四卷

藥錄二卷

諸藥異名八卷

諸藥要性二卷

種植藥法一卷

徐之才
雷敏

徐大山

姚曷

甘澹之

甘澹之

原平仲

李寧
行矩

薺苳	五三	藕節	一七六	蘇方木	一九五・二〇〇	二十四畫	
薺菜花	一五五・一五九	菱蘆	一〇八・一一三	鱉蟾	二二四	蠶豆	一四五
薺本	六三・七二	蟾蜍	二二一・二二四	二十一畫		蠶豆花	一四九
蟬蛻	二二一	二十畫		櫻桃	一六七	鸞鷟	二三五
覆盆子	一二五・一三三	籬豆	一四五・一四八	續斷	八九	龜甲	二三一・二三二
雞內金	二三四	罌粟	一四六・一四九	蠟梅花	二〇八・二二三	二十六畫	
雞血藤	一二五	藿香	六五・七二	鶴	二三五	驢皮	二四五
雞冠花	八九	蕪蛇	二二七	鶴虱	八九・一〇〇	二十九畫	
銷陽	三六・五三	蘆根	一〇〇	麝香	二三九	鬱金	六五
鵝	二三五	蘆薈	一八二	二十二畫			
十九畫		蘇	六四・六五	蜜蠟	二二一・二二四		

樟腦	一八〇・一八五	獨活	三五・五二	龍齒	二二七	翻白草	一五九
廣膠	二四四	壁錢幕	二二三	龍涎香	二二七	瞿麥	一〇〇
廣木香	五五・六六	十六畫		龍骨	二二七	檳榔	一七一
劉寄奴	八八	醉魚草	一一三	豬苓	二一五・二二七	十八畫	
十五畫		葶藶	六一・七一	蕤仁	二〇七	麋茸	二四五
鳳尾金星草	一四一	蓮鬚	一七五	藝薑	一五四	蟋蟀	二二四
鳳仙花	一〇七・一一三	蓮房	一七五	蕎麥	一四二・一四八	螻蛄	二二三
銅綠	一・三	蓮蕊	一七三・一七五	燕窩	二三四・二三六	螺螄	二二二
銀杏	一六八	蓮子	一七五	燈芯草	九九・一〇〇	薤白頭	一五九
酸棗仁	二〇七	蓬莪朮	六三・七一	澤蘭	五八	薔薇	二〇八・二二三
遠志	三六・五二	蓬砂	九・一三	澤瀉	一三五	薑黃	六三・七二
輕粉	一三	翦草	一三二	澤漆	二〇六	薑皮	一五五
豨薟草	八七	穀精草	八八・九九	橘核	一六九	薄荷	六四・七一
蛻螂	二二三	穀芽	一四四	橘紅	一六七	薇	一五三
蜘蛛	二二三	稻根鬚	一四四	橘白	一六六	十七畫	
蒼耳子	八六・九九	磁石	一二	橘子	一六六	龜板	二三〇・二二二
蒼朮	二二・四二	熟地	七五	樺木皮	二〇〇	龍鬚草	一〇〇
蓖麻子	一〇八・一一二	潼蒺藜	八六	樸槲	二〇〇	龍膽草	三六・五三

蛤蚧	二二六	椿樗皮	一九三・一九九	雷丸	二一七・二一八	葶萍草	一三六
萊菔子	一五三・一五八	樓欄	一九四・一九九	雌黃	七	蒲黃	一三四・一三六
葶藶	一二三	十三臺		補骨脂	六一	蒲公英	一五四・一五九
菴蘭草	九七	黑芝麻	一四二	蜂房	二二四	綠豆衣	一四五・一四八
菟絲子	一二三・一二二	黑大豆	一四五	蜀葵	九九	綠豆	一四五
菰蘖	一三二	黃蘖	一九四	葶藶子	九八	綠毛橘紅	一六九
菊	八四・八五・九七	黃藥子	一三三	葱白	一五〇	瑪瑙	二
絲瓜絡	一五三	黃精	三四・五一	葡萄	一七三	熊膽	二四五
絲瓜子	一五八	黃魚膠	二二七	葛根	一二四・一三三	漏蘆	八七・九九
番瀉葉	一一二	黃耆	三一・三三・五〇	蕭蓄	八六	槐角炭	一九五
番木鱉	一二三・一三二	黃連	三四・五一	萱草	九八	槐	二〇〇
琥珀	二一七	黃芩	三三・五一	萬年青	八五	梔子	一七一
猴棗	一二	雲實子	一一二	當歸	六二・七一	榕樹根	一九九
無花果	一九八	雲母石	二・三	煙膠	二四五	墓頭回	一四一
無名異	一二	雄黃	七・一二	煙草	一一〇	十四臺	
款冬	八四	雁來紅	九八	滑石	七・一二	鼠婦	二二三
斑蝥	二一九・二二三	象皮	二四四	椿實子	二〇八・二二三	鼠屎	二四四
寒水石	八・一三	訶子	一九三・一九九	楓實	一八七	預知子	一三三

馬兜鈴	一二一・一三一	常山	一〇五	犀角	二四四	蛇含石	一二
馬鞭草	九四	排草香	七〇	甜瓜	一七四	蛇蛻殼	二二六
馬蘭花	九五	掛金燈	七八・九三一	甜瓜子	一七三・一七四	貫衆	三五
馬寶	二三八・二四一	敗醬	八三・九六	畢澄茄	一七二・一七三	透骨草	一四一
馬蘭	七〇	旋覆花	八四	硃砂	九	通天梗	一七四
骨碎補	一四〇	望月砂	二三九	紫石英	二・三	連翹	八三
高良薑	六一・七〇	望江南	九五	紫花地丁	九六	野料豆	一四五
鬼臼	一一一	梅	一六一・一六二	紫荊	二二三	陳皮	一六六
鬼箭羽	二二二	梗通草	一二二	紫金牛	五〇	魚腥草	一一二
十一臺		梧桐	一九二・一九三 一九八	紫苑	九六	烏不宿	二一三
		淡竹葉	八二・九六	紫草茸	三二・五〇	鹿角	二四二・二四三
乾漆	一九一	淡豆豉	一四三	紫蘇	七二	鹿角霜	二三八
乾薑	一五八	淡秋石	七	細辛	三二・五〇	鹿茸	二四三・二四四
側柏子	一八七	淫羊藿	四九	羚羊角	二三八・二四二	鹿啣草	九七
側柏炭	一八二	清水豆卷	一三四	荷花	一七三・一七五	麥芽	一四八
側柏葉	一八一	清風藤	一二二・一三一	荷葉	一七六	麻黃	八二・九五
商陸	一〇五・一一一	牽牛	一二四	蚯蚓	二二〇	十二臺	
密陀僧	一・三	犀牛角	二三九	蛇牀子	六一・七〇		
密蒙花	二三三					壺蘆	一五八

胖大海	一七〇	香附	五九・六九・七〇	浮海石	六・一一	稗米	一四三・一四七
梧桐淚	一八六	香樟木	一八〇・一八五	海金沙	八一・九四	粉草薺	一三一
胡葵子	一五七	香薷	六〇	海狗腎	二四一	臭梧桐	一九二・一九八
胡椒	一六九・一七二	香櫟	一六五	海桐	一九七	臭蕪夷	一九八
胡黃連	三四・五一	香櫟皮	一六五・一六八	海馬	二二六	荔枝草	一七〇
苡仁	一四三	十薑		海龍	二二六	茜草	一二一・一三一
苦參	三〇・四八	夏枯草	九三	海藻	一三五	茺白子	一三六
苧麻	八〇	射干	一〇三・一一一	烏柏	一九二	茯苓	二一六・二一四
茄子	一五二・一五七	栗	一六〇	烏梢蛇	二二六	茯神	二二五
茅朮	二一・四一	栝蒌	一二〇・一三〇	烏頭	一〇四・一一〇	茴香	一五〇
茅針花	二三・四三	桂枝	一八一・一八六	烏藥	一八二	茵陳	八一・九四
茉莉花	六九	桃仁	一六〇	狼毒	一〇四・一〇九	菟蔚子	八〇
虻蟲	二二二	桃樹	一六二	珠兒參	一六	荊芥	六〇
郁李仁	二〇五・二二二	桑枝	二〇六・二二二	益母草	八〇	草決明	九四
降香	一八六	桑寄生	二一四・二一六	益智仁	六一・七〇	草河車	一〇五・一一〇
韭菜子	一五七	桑葉	二〇六	神麴	一四四	草果	五九
風茄葉	一〇六	桑螵蛸	二一四・二二二	秦皮	一九七	草烏	一一〇
風茄花	一〇六・一二三	桔梗	三一・四八	秦艽	三一・四九	馬勃	一三八・一四〇

刺猬皮	二三七・二四〇	芥	一五二	附子	一〇三	紅花子	九三
卷柏	一三八・一四〇	芫花	一〇六	青木香	五五・六六	紅娘子	二二二
夜交藤	一一七・一二八	芭蕉	九二	青皮	一六四	枳椇子	一六九
夜明砂	二三三	花蕊石	四	青果	一七〇	枳殼	二〇七
昆布	一三四	虎	二四〇・二四一	青娘子	二二二	柿	一六六
明黨參	一七・四一	金牛草	四七	青葙子	七八・九三	枸杞	二〇五
松針	一七九・一八五	金柑	一六五	青蒿	七八	枸骨	二二二
板藍根	七八	金鈎子	一九七	青礞石	五	枸橘	二二二
枇杷	一六八	金雀花	二〇六	九 薑		柴胡	二九・三〇・四七
枇杷葉	一六五	金絲草	四七			炮薑	一五五・一五九
河白草	一三〇	金鈴子	一九二		三〇・四七	玳瑁	二三一・二三二
狗牙半支蓮	一四一	金銀花	一一九・一二八		二一	珊瑚	二・三
狗脊	二八・四六	金精石	六・一一	南瓜蒂	一五二	珍珠母	二三二
玫瑰花	二〇四	金鎖匙	二九・四七	南沙參	二七	砂仁	五九・六九
知母	二八	金錢白花蛇	二二六	厚樸	一九〇・一九一 一九七	砒石	五・一一
羌活	三五・五二	金櫻子	二〇五・二一一	威靈仙	一一九・一三〇	禹餘糧	六
芙蓉	二一一	阿膠	二三七	孩兒茶	二四六	秋葵子	七九・九三
芙蓉花	二〇四	阿魏	一八〇	紅花	七九	穿山甲	二二五

石葦	一三九	地鼈	一五三	血餘	二四五	沙參	二六・二七・四六
石蒜	四四	安息香	一八三	西瓜	一七四	牡丹皮	五七・六八
石榴	一六二	戊腹米	二四〇	西河柳	一八九・一九六	牡蠣	二二九・二三二
石榴皮	一六四	戎鹽	九	西洋參	一七・四〇	豆蔻	五六
石榴花	一六八	百部	一一七	七靈		豆蔻花	五六・六七
石燕	四	百藥煎	二一九	何首烏	一一七・一二八	貝母	二八
石蟹	四・一〇	羊	二四〇	佛手	一六四	貝齒	二二九
石碱	二四七	羊躑躅	一〇七・一〇九	佛耳草	九二	赤小豆	一四三
石鐘乳	八・一三	老鶴草	一四一	吳茱萸	一七二	赤芍藥	五七・五八・六八
六靈		肉豆蔻	五六	呂宋果	一八八	車前草	七七・九二
伏龍肝	二四六	肉果	六七	延胡索	四六	辛夷	一七七・一八四
全蝎	二一九・二三二	肉桂	一七八・一八四	忍冬藤	一一九・一二八	防己	一一八・一二八
合歡皮	一八九・一九六	肉蓯蓉	二六・四六	早蓮草	七七	防風	二七・四六
地栗	一七四	自然銅	一・三	杏仁	一六〇	八靈	
地骨皮	二〇五・二二一	艾	九一	杜仲	一九〇・一九六	乳香	一七七
地榆	二五・四五	艾葉	七六	沉香	一四四・一七九 一八三・一八四	佩蘭	五八・六九
地膚	七六	血見愁	一三九	沒石子	一八八	使君子	一一八
地錢	五七	血竭	一八三	沒藥	一七七	兔	二三九・二四〇

木香	五五・六六	代代花	二〇三	甘松香	六七	白疾藜	八六
木通	一一六	代赭石	五・一〇	甘枸杞	二一〇	白槿花	二一〇
木犀	一七七	冬瓜子	一五一・一五七	甘草	二五・四四	白頭翁	二四・四三
木賊草	七三・九〇	冬瓜皮	一五一	甘遂	一〇三	白薇	二二・四三
木綿子	二〇九	冬青	二〇九	生地	七五	白鮮	二三・四四
木蝴蝶	二一七・二一八	冬蟲夏草	二四	生苡仁	一四八	白殭 _{附子}	二二〇
木蘭	一八三	北鈔參	二六	白丁香	二三三・二三五	白藥子	一二八
木鼈子	一二七	半夏	一〇二	白及	二二・四三	白蘇	六四・七二
水蛭	二一九・二二二	半夏麴	一四四	白木耳	一五六	白欬	一一六・一二七
水銀	一〇	功勞子	二〇二・二一〇	白朮	二〇・二一・四二	白蠟	二二二
水獺肝	二四〇	功勞葉	二〇二・二一〇	白石英	一・三	石木耳	一五六
牛蒡子	七四・九〇	巨勝子	一四七	白芍藥	五八	石灰	四
牛膝	七四・九〇	平地木	二一〇	白芷	五六・六七	石決明	二二八・二三二
王不留行子	九〇	玄參	二六・四五	白芥子	一五七	石柱參	四五
五靈		玄精石	一三	白果	一六三	石南葉	二一一
		玉竹	二五・四四	白花蛇	二二五	石斛	一三七
仙茅	二四	瓦松	一三九	白前	二三	石硫黃	八
仙鶴草	七五・九一	瓦楞子	二二八	白茅根	二三・四三	石菖蒲	一三四・一三六

檢圖索引

本圖影有彩色版與照相版兩種。故所列頁碼。前後參差。惟均注明於每一藥名之下。俾檢查者得以前後對照。

二薑	大青葉	山柰	六月霜	九〇
丁香	大胡麻	山查	升麻	一九・四二
人中白	大麻	山茶花	天仙籐	二二六
人中黃	大麻仁	山梔子	天竹黃	二一八
人參	大麥	山慈菇	天門冬	一一四・一五
刀豆	大戟	山藥	天花粉	一二〇・一三〇
十姊妹	大黃	山躑躅	天南星	一〇二・一〇九
三薑	大腹皮	川芎	天麻	一八・四一
三七	大蒜	川椒	天雄	一〇二
三稜	大薊	川樅皮	天漿殼	一六二
千年紅	女貞子	四薑	太子參	一六
千年健	小茴香	丹參	孔雀	二三五
千里光	小蘇	五加皮	巴豆	一八八
土茯苓	小麥	五味子	巴戟天	一九・四一
土茜草	小薊	五倍子	文蛤	二二八
	山豆根	五靈脂	木瓜	一六三・二〇九

- A.T.P. American Journal of Pharmacy.
Ann. Annalen der Chemie (Liebig's)
Arch. Pharm. Archiv der Pharmacie.
Ber. Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft.
Berlin. Klin. Woch. Berliner Klinische Wochenschrift.
B.P.C. British Pharmaceutical Codex, London.
Chem. Ztg. Chemiker zeitung.
Chinese Gour. Phy. Chinese Journal of Physiology (Peking)
F.S.A.I. Flora Sinensis. Series A. volume I.
I.M.P. Indian Medicinal Plants.
J. DePhar Journal le Pharmacie et de Chimie (Paris)
J. Chem. Soc. Journal of Chemical Society of London.
J. Exp. Pharm. Journal of Experimental Pharmacology and Therapeutics.
Med. Woche. Medicinische Wochenschrift
Pharm. Central. Pharmaceutische Centralhalle.
Rec. Recueil des Travaux Chimique des Pays-bas.
U.S.D. United States Dispensatory.
出版年號：(爲便於購買及查閱，用日本原來年號，不改西曆)
明卽明治——四十年止
大卽大正——元年(民國元年)
昭卽昭和——二年(民國十六年)

慶醫——慶應醫學

臨床——臨床醫學

東醫——東京醫學會雜誌

京醫——京都醫學雜誌

邦醫——邦產藥用植物

化誌——日本化學會誌

臺醫——臺灣醫學會雜誌

日新——日新醫學

千醫——千葉醫學會雜誌

工化——工業化學會誌

醫海——醫海時報

滿醫——滿洲醫學雜誌

植研——植物研究雜誌

岡醫——岡山醫學會雜誌

國本——國譯本草綱目

藥考——和漢藥考

長醫——長崎醫學會誌

農化——農藝化學雜誌

朝鮮——朝鮮醫學會雜誌(鮮醫同)

藥誌——藥學雜誌(學彙雜誌皆本誌附錄)

朝試——朝鮮總督府中央試驗所報告

臺研——臺灣總督府中央研究所報告

富藥誌——富山藥專校友會雜誌

衛試彙——衛生試驗所彙報

京藥誌——京都藥學校藥窗誌

東北醫——東北醫學會報

中外醫新——中外醫事新報

微生物誌——日本微生物學會雜誌

日本藥物——日本藥物學雜誌

Acta. Phy.

Acta Phytotechnica(Tokyo)

(二)新舊制容量比較表

二錢五分	二錢九分八釐	二錢零九釐
三錢	三錢五分八釐	二錢五分一釐
三錢五分	四錢一分八釐	二錢九分三釐
四錢	四錢七分七釐	三錢三分五釐
五錢	五錢九分七釐	四錢一分九釐
一兩	一兩一錢九分	八錢三分八釐
二兩	二兩三錢九分	一兩六錢八分
三兩	三兩五錢八分	二兩五錢一分
四兩	四兩七錢七分	三兩三錢五分
五兩	五兩九錢七分	四兩一錢九分
一斤	一九兩零九分	一三兩四錢
容 量	舊制合市用制	市用制合舊制
一 勺	一勺〇・三六撮	九・六六撮
一 合	一合零三・六撮	九勺六・六撮
一 升	一升零三勺六撮	九合六勺六撮

例如方書某藥用一錢五分即知合市秤一錢七分九釐。又如依市秤某藥用二錢五分。即知僅合舊制庫平二錢另九釐。

是故鉛丹丹砂積與五銖錢等。其重亦等。若三倍錢積而成一七。則得二錢四分也。

五 近世權度之折合

向來國醫開方藥鋪配藥所用權度。悉依營造尺庫平制。近自民國十八年公布中華民國度量衡法。另定一種市用制以來。嚴厲推行。全國幾完成劃一。藥鋪已廢除營造尺庫平制。而改用市用制。惟市用制之斤兩較庫平爲輕。不及庫平八四折。而市用制之升亦較營造尺制之升爲小。不及舊升九七折。此後如國醫仍照舊制開方。而藥鋪乃依新制配藥。在輕病已覺見效稍緩。在重病必致貽誤不淺。與病家極有關係。茲將新舊制之分量比較如下。

(一) 新舊制重量比較表

重 量	庫平合市秤	市秤合庫平
一 釐	一釐一毫九絲	八毫三絲八忽
五 釐	五釐九毫七絲	四釐一毫九絲
一 分	一分一釐九毫	八釐三毫八絲
二 分	二分三釐九毫	一分六釐八毫
三 分	三分五釐八毫	二分五釐一毫
四 分	四分七釐七毫	三分三釐五毫
五 分	五分九釐七毫	四分一毫九毫
一 錢	一錢一分九釐	八分三釐八毫
一 錢五分	一錢七分九釐	一錢二分六釐
二 錢	二錢三分九釐	一錢六分八釐

重。今平四兩七錢八分八釐。卽漢時十六兩。是漢一兩當今二錢九分九釐二毫半也。以貨布寸法自乘再乘。得今三百五十七分九百一十一釐。所積黃金當重今平六兩另一分二釐九毫強。卽漢時十六兩。是漢一兩當今三錢五釐八毫有奇。以大泉寸法計一銖之重。略與貨泉相當。以貨布寸法計一銖之重。略與漢五銖相當。則漢代權衡本有出入。然爲孔氏同度記謂漢一兩祇當今二錢五分有奇。則歷驗未有其徵也。（徐氏謂漢一兩當今二錢更謬。）

漢量在者。清宮有王莽銅斛。然宋時范鎮已不見是器。蓋依著隋志仿造者爾。若依大泉寸法。漢時立方一寸。當今二百八十二分一斗。積一百六十二立方寸。當今四十六寸一百七十分。以清康熙斗法三百二十立方寸除之。得一升四合四勺強。以清雍正斗法三百十六立方寸以除。得一升四合六勺強。若依貨布寸法。漢時立方一寸。當今三百五十七分九百一十一釐。一斗積一百六十二立方寸。當今五十七寸九百八十一分四百九十二釐。以清康熙斗法三百二十立方寸除之。得一升八合一勺強。以清雍正斗法三百十六方寸除之。得一升八合三勺強。二者相差。如徐氏所稱古一斗當今二升者。則於貨布寸法爲近。（周禮中年人食三鬴。謂一月之食也。依古一寸。今一升八合一勺。得粟一升一合五勺。粟率五十。粳米二十七。則爲米六合二勺也。若依一升四合六勺計。則太少矣。）藥物重輕。礦植既異。植物之根莖葉實復有不同。漢時散藥一錢七者。謂以五銖錢鈔之不落爲度。然則積藥既厚。無過三倍於錢爾。而植物與銅重量殊絕。木中重者。無爲烏木紫檀。視銅祇六分之一。其餘或十五分之一矣。以之作散重者亦輕。大抵草木散藥。積與五銖錢等。其重無過十分之一。積五銖銅三倍其重。無過十分之三。今據五銖銅重八分之三。則二錢四分以十除之。得二分四釐。是草木散藥一錢七之重也。石質重於草木。然以玉較銅。若一與二六比。麤碎作散。化堅爲壤。其重當減三方之一。以較銅若一與三九比。然則石藥作散體積三倍五銖錢者。得重六分一釐五毫也。金質又重於石。以黑鉛較銅。若三與三比。以水銀較銅。若九與五比。丹砂輕於水銀。亦與鉛相等。麤碎作散。其重當減三分之一。

關於古方引用權量。均係古制。與今時全不相同。大抵古之一兩。約當今三錢。古之一七。約當今二錢四分。今爲檢閱者參考起見。特將章太炎先生所作古方權量考附錄於次。（以下均太炎先生稿。）

古權衡之難定者。在其自有盈肭。宋世如歐陽永叔沈存中諸公。各以古器與今之權量比勘。亦種種不同。夫謂一兩當今之三錢者。此惟王莽貨泉爲然。據志貨泉重五銖。今平得貨泉十枚重六錢三分五釐。則一銖當今一分二釐七毫。二十四銖爲成兩。當今三錢另四釐八毫也。若漢五銖錢以今稱平之。一枚適重八分十三枚則重一兩另四分。以唐開通元寶十枚互平略相當。（沈冠雲云。開通元寶十枚。重一兩另三分。比今之所平得者正同。然則今之一錢。不逮開通元寶一枚也。）是一銖當今一分六釐。二十四銖當今三錢八分四釐也。五銖錢存者最多。除梁女錢隋鐵錢易辦外。以五字交服漢錢。而其重悉如此。殆可以爲定法矣。昔人謂十六五銖錢。當十開通元寶錢。實不然也。又上考武帝三銖。以三枚平之。重一錢八分八釐。是一銖當今二分另八八不盡。又考王莽貨布。貨布重二十五銖。今以二枚平之。重九錢二分。是一銖當今一分八釐四毫。且三國晉宋權衡未改於漢也。今以宋四銖四枚平之。重二錢七分。是一銖當今一分六釐八毫七秒五忽。雖非能對如畫一。然一銖之重。未有在一分六釐以下者。更以黃金驗之。漢志稱太公作九府圓法。黃金方寸重一斤。劉徽九章注亦有是說。而清康熙雍正兩朝所核黃金重量。積營造尺一立方寸重十六兩八錢。則欲求權衡之差。又當先知尺度之差矣。漢尺在者。有建初銅尺。孔尚謂當今量地官尺六寸六分。所謂量地官尺者。未知卽營造尺否也。今以莽大泉比營造尺一枚得七分九釐。積十枚得七寸九分。據漢志稱大泉徑一寸二分。是漢一寸當今六分五釐八毫三秒三忽不盡也。然劉歆尺卽晉前尺所本。據宋王厚之所舉者。晉前尺實得營造尺六寸九分。現積十大泉者爲長。莽泉在者。貨布最爲完好。漢志稱貨布廣一寸。今以營造尺度之得七分一釐。然則王厚之所圖者。與貨布尺相近矣。與大泉尺相遠以大泉寸法自乘再乘。得今二百八十五分所積黃金

【咬咀】嚼也。古人於藥物無刀剉法。但以口嚼細。近世用咬咀二字。可作爲以藥切成飲片解。

【君】方劑中之主要藥。如治寒病則熱藥爲君。治熱病則寒藥爲君。

【臣】方劑中之輔助藥。因主要藥之力量尙有不足。故加他藥以輔助之。

【佐】方劑中之監制藥。如寒病治以熱藥。而恐熱藥過甚之爲害也。則少用寒涼藥以監制之。

【使】方劑中之引導藥。臟腑經絡各有引導專品。能使藥與病相遇而奏效易著。

【方寸匕】古方中量名。其匕正方抄散藥末以不落一寸爲度。其容量猶今之一茶匙也。

【字】古方中權名。古以銅錢抄藥末。依世相沿稱一銅錢所抄藥末之量。曰一錢。錢面共有四字。故又稱一錢之四分之一曰一字。二字則五分也。

【陰陽水】生水與熱水相和也。又井水與河水相和亦稱陰陽水。

【文武火】文火卽火力之緩而慢者。武火卽火力之猛而烈者。

【製】裁製藥性之偏者。猛者使之就於範圍也。

【等分】謂諸藥分量相同也。

【刀圭】卽十分方寸匕之一。

【泡】水製法之一。暫置藥品於水中。以解其烈性也。

【炒】置藥物於火下使之黃而不焦。以祛其寒性也。

【炮】置藥物於火上。以烟起爲度。

四 古方權量之考證

【紅花】 產蓬溪。分片紅花大市紅花兩級。以色氣鮮紅花鬚長而淨者爲最佳。

【麝香】 產西康及四川邊境。以有原皮內色黃氣味香而長具有「黑豆瓣」者爲最佳。（未散之香形如黑豆瓣故名。）

乙、浙江方面 此項材料係由國民政府實業部所編中國實業誌稿所錄出。據云。浙省所產藥材極多。最著者如貝母，麥冬，白朮。貝母種植面積達六千畝。產量達八千數百擔。值價達五十萬元。麥冬面積達萬畝。產量達二萬擔。價值達一百二十萬元。白朮面積凡三萬五千五百餘畝。產量達七萬一千餘擔。價值達一百三十三萬餘元。他如玄胡，茯苓，芍藥，冬桑葉，桑槲，桃仁，枇杷葉，萊菔子，冬瓜子，白芥子，荊芥，夏枯草，蘇根，苦參子，牛蒡子，百葚子，黃麻子，澤蘭，玄參，地黃，薄荷，決明，千金子，白芷等。多所在皆有。

浙江貝母。卽統稱象貝。較川省之貝母爲大。產於象山縣。笕橋，鄞縣亦有。以漳村，大雷二處爲最多。

貝母爲草本植物。秋種夏收。幹高尺餘。分作二枝。葉對生。花白色。普通每株結實二枚。多則三枚。以元寶貝爲佳。白朮產於新昌爲最多。他如溫嶺，仙居，東陽，永康，遂昌，於潛，各有出產。以於潛爲最佳。

麥冬產於杭州之笕橋及餘姚二處爲最多。

元參以笕橋爲最有名。喬司及艮山門外亦佳。

地黃，決明，白芷，荊芥均以笕橋爲名產。

三 本書內專門名詞之解釋

中國藥物學中。有常用之專門名辭甚多。每非通常學者所習知。茲分釋其意義如後。以備檢閱此書者之參考。

【羌活】產中壩，灌縣。分特羌，羌王，附羌三級。以羌心如菊花，色黃有香味者爲佳。

【白芷】產遂寧，崇慶，渠河。以根條不壯，皮紅內黃爲最劣。根條粗壯，內外色白者爲最優。

【附子】產中壩，河東與河西。分鹽附子，泥附子兩種。銅皮黃色者爲優。

【半夏】產渠縣，營山，令川，遂寧，敘府。分蛋夏，貢夏，棟夏，揀夏四等。以身乾色白，子大圓熟者爲佳。

【澤瀉】產灌縣，石羊場。以個頭大，身乾色白，無枯坑者爲佳。

【牛膝】產雅安，天全。以根粗如指者爲優。

【黃連】產雅安，石柱，雲南。分雅連，毛連，刁支連，味連四級。以根條粗短者爲佳。

【貝母】產松潘，雅安。分真松貝，沖松貝，熟貝，黃貝，提貝，干貝，等數級。以羅漢肚狀，平頂閉口者爲佳。

【鬱金】產崇慶，灌縣，敘府。分出號，頭號，二號，魁貢，頂貢五級。以子粒圓熟，內色黃形如麻雀卵者爲最佳。

【吳萸】產綏定，敘府，貴州。以子粒大，開口無枝幹者爲最佳。

【巴豆】產納溪，合川。分巴豆，巴米兩種。以納溪產子粒大，滿倉者爲佳。

【枳實】產江津，綦江。分鵝眼枳實，片枳實，鎗枳實三級。以身乾色黃，子粒與片子均細者爲最佳。

【川棟子】產合川，寧渡河。以身乾色黃，個頭大者爲最佳。

【杜仲】產貴州，秦州，中壩，巴中。分厚仲，行仲二級。以身乾皮張寬大者爲最佳。

【黃柏】產嘉定。以身乾色黃，塊大身厚者爲最佳。

【厚樸】產宣漢。分靴兜子，萬卷書，羊耳三級。以皮張厚有油氣，味帶辛辣者爲最佳。

【通草】各地皆產。以色白，身乾者爲最佳。

中藥產地。以四川、廣東、浙江爲大宗。廣東方面之藥品產地。本書記載特詳。四川、浙江二處之產地。今據得之實地調查報告。錄記如下。

甲、四川方面 此項材料，係四川之中國銀行重慶分行所集。記述鑿確。頗不易致。

川藥產量以川芎、當歸、白芍、薑四種爲最多。年達百萬觔以上。

其次爲大黃、半夏、枳殼、天雄、陳皮、黨參、白薑、巴豆、羌活、白芷、杜仲、澤瀉、麥冬、黃芪、紅梅、使君子、谷齒、木香、鬱金、枳實、丹參等二十一種。年產十萬觔以上。

其次爲貝母、牛膝、甘松、鹿角、天麻、鮮石斛、天門冬、川棟子、秦艽、故紙、赤芍、黃柏、橘絡、吳茱、黃連、常山、薄荷、五加皮等十八種。年產萬觔以上。

再次爲冬蟲夏草、豬苓、雷丸、牙皂、通草、南星、佛手片、川烏、菊花、厚樸、龍骨、豹骨、九香蟲、紅花、參葉等十五種。年產在千觔以上。

再次爲茅慈姑、蟬花二種。年產百觔以上。

再次僅麝香一種。爲十觔以上。

每年出口總值。共達三四百萬之鉅。

重慶中國銀行之調查。精切逾恆。其有利於治藥學者殊鉅。各藥花名等級產地並錄於此。

【大黃】 產階州、文縣、南坪、岷州、泰州、葉塘等。有刁支、混莊、伏頭、通底、頂底、刁王、統獨、枯枝、服子、歸尾等花名。以泰州所產皮微紅、紋細、苗小、味麻而甜者爲最佳。

【川芎】 產灌縣、石羊場。分貢芎、芎王、統芎、撫芎四種等級。

【菖蒲】 學名 *Acorus Gramineus*, Soland.

成分 精油(主成分 $\text{Asaron } \text{C}_{12}\text{H}_{18}\text{O}_2$)

發表者 木村(雄)藥誌513(大15)

【白菖】 學名 *Acorus Calamus*, L. Var. *Angustatus*, Bess.

成分 精油

發表者 朝比奈藥誌295(明30) 朝比奈, 今井藥誌333(大3)

【香薷蒲黃】 學名 *Lypha Latifolia*, L.

成分 脂肪油及 $\text{Iso-Rhamnetin } \text{C}_{16}\text{H}_{12}\text{O}_7$ (配糖體)

發表者 Masao Fukuda: Bull Chem. Soc. Jap. 3 (1928)

【金星草】 學名 *Polypodium Normale*, Don. (?)

成分 *Cumarin*

發表者 鈴木(衡)藥誌557(昭3)

【石松】 學名 *Lycopodium Clavatum*, D.

成分 脂肪油(鍾子中)⁽¹⁾ $\text{Lycopodin } \text{C}_{22}\text{H}_{52}\text{N}_2\text{O}_3$ ⁽²⁾

發表者 (1) A. Langer: Arch. Pharm. 227, 208 (1880) (2) K. Bodeker: Ann. 203 (1881)

二 藥物產地之實地調查報告

發表者 近藤，落合，中島，藥誌497(大42) 近藤，落合，藥誌503(大13)石割：中外醫事新報955等
【通草】 學名 Sauntonia Chineusis, DC (?)

成分 (子)脂肪油⁽¹⁾(木部)結晶性配糖體 Akibin ($C_{25}H_{56}O_{10}$ ⁽²⁾)。

發表者 (1)内田，工化19(大5) (2)有馬，高橋，化誌48(昭2)49(昭3) [其他]石戸谷，鮮藥3(大14)
河野，藥誌561(昭3)

【鉤藤】 學名 Uncaria Sinensis, Oliv.

成分 Rhynchophyllin $C_{22}H_{28}N_2O_4$ 或 $C_{21}H_{26}N_2O_4$ 。

發表者 近藤，福田，富田，藥誌554(昭3)赤松，國香，長醫6(昭3)

【忍冬】 學名 Lonicera Japonica, Thunb.

成分 單寧質

發表者 邦藥34

【藤黃】 學名 Garcinia Morella, Desv.

成分 Gambogiasaure, Gummiguttigelb.

發表者 下山，生藥學397

【羊蹄】 學名 Rumex Japonicus, Melsn

成分 Chrysophansaure 及 Frangulaemodin

發表者 村山，藥誌375(大2)村山，板垣，藥誌470(大10)

發表者 佐佐木(林)農化3(昭2)

【百部】 學名 *Stemone Japonica*, Miq.

成分 全草中含 *Stemonin* 及融點 116°C 1 種 *Alkaloid*.⁽¹⁾ 根中有 *Hodorin* $\text{C}_{19}\text{H}_{31}\text{O}_5\text{N}$.⁽²⁾

發表者 (1) 鈴木(衡)化誌82(明4)鈴木藥誌352(明4)長井古屋藥誌162(明23) (2) 古屋藥誌368(大1) [其他] 猪子東醫2(明22)

【何首烏】 學名 *Polygonum Multiflorum*, Thunb.

成分 四川品之一般成分爲總窒素1.1%澱粉45.2%脂肪3.1%礦物4.5% *Lecitein*. 3.7% *Oxymethy Lanthrachinon* 化合物1.78%水可溶性物總量26.4%

發表者 衣笠辰濃藥誌480(大11) [其他] 高木(重)藥誌472(大10)

【白藥子】 學名 *Trichosanthes Kirilowii*, Maxim(?)

成分 *Trichosanthin* Pigments

發表者 F.S.A.I.G

【茜草】 學名 *Rubia Cardifolia*, L.

成分 *Purpurin*

發表者 近藤藥誌208(明22)

【防己】 學名 *Sinomeninum Acutum*, Rehd. Et Wil.

成分 *Sinomenin*, $\text{C}_{19}\text{H}_{28}\text{NO}_4$ *Disinomenin*, $\text{C}_{38}\text{H}_{54}\text{N}_2\text{O}_8$ 及無晶形之 *Diversin*, $\text{C}_{20}\text{H}_{27}\text{NO}_5$

成分 全草中含水溶性物質30.7% 葡萄糖17.5% 灰分4.3% 及 Sapium
發表者 桑田播磨藥誌548(昭2) 鶴田實驗消化器病學1(大15)

【營實】 學名 *Rosa Multiflora*, Thumb.

成分 Auercein, Multiflorin

發表者 安藤京醫9(大1) 近藤岩本口羽藥誌565(昭4)

【月季】 學名 *Rosa Chinesis*, Jacq.

成分 精油

發表者 F.S.A.I.34

【栝樓】 學名 *Trichosanthes Kirilowii*, Maxim.

成分 (根)澱粉(子)脂肪油

發表者 津田九藥1(昭2)

【王瓜】 學名 *Thladiantha Dubia*, Runge.

成分 根中含澱粉

發表者 邦藥30

【葛】 學名 *Pueraria Triloba*, Makino

成分 (根)澱粉(葉) Adenin, Asparagin Glutamin Saure, Butter Saure 及融點185°C之黃色結晶
性物質

【使君子】 學名 *Quisqualis Indica*, L. Var *Villosa*, Clarke

成分 脂肪油⁽¹⁾及少量性狀不明之結晶性物⁽²⁾

發表者 (1)於藥誌420(大6) (2)猪子：藥誌331(明42) [其他]鶴田長醫2(大13)

【木鼈子】 學名 *Momordica Cochinchinensis*, Spreng.

成分 脂肪油二種 Saponine 及一種複糖體

發表者 攝陽主人：藥誌13(明16)中尾：藥誌453(大8)

【番木鼈子】 學名 *Strychnos Nux-Vomica*, L.

成分 *Strychnin*, *Brucein*

發表者 下山生藥學363

【槿藤子】 學名 *Entada Scandens*, Benth.

成分 *Entadasaponin*

發表者 F.S.A.I-31

【牽牛子】 學名 *Pharbitis Nil*, Choisy.

成分 *Pharbitin*(樹脂配糖體)⁽¹⁾脂肪油⁽²⁾

發表者 (1)朝比奈：寺田藥誌452(大8) (2)朝比奈：清水：藥誌479(大11) (3)朝比奈：中西藥誌520

(大14)

【旋花】 學名 *Calystegia Sepium*, R. Br.

成分 揮發油，樹脂，脂肪油，單寧，糖分。
發表者 藥考

【茵芋】 學名 *Skimmia Japonica*. Th. (?)

成分 *Skimmiarine* *Skimmin*

發表者 F.S.A.I.27

【石龍芮】 學名 *Ranunculus Sceleratus*, L.

成分 *Anemonin*

發表者 朝比奈, Acta. Phytoch. 1922 (Not) 朝比奈, 藤田藥誌407(大10)

【蕁麻】 學名 *Urtica Thunbergiana*, Sieb. et. Zucc.

成分 *Urticin*

發表者 藥邦285

【鉤吻】 學名 *Rhus Toxicodendron*, L. Var. *Radicans*, M.

成分 樹皮滲出物中含Laccol $C_{28}H_{46}O_2$ 及酸化酵素 Laccase.

發表者 邦藥155

【菟絲子】 學名 *Cuscuta Chinensis*, Lam.

成分 樹脂配糖體等

發表者 佐野, 京藥誌28(大6)

【半夏】 學名 *Pinellia Ternata*, Breit.

成分 精油⁽¹⁾揮發性 Alkaloid.⁽²⁾

發表者 (1)中山(亡)藥誌509(大13) (2)八木第四回藥理學會(昭5) [其他]江馬:中外醫新
238號

【蚤休】 學名 *Paris Polypphylla*, Sm.

成分 Paridin

發表者 F.S.A.L.51

【鳶尾】 學名 *Iris Tectorum*, Maxim.

成分 脂肪油及配糖體 Tectoridin $C_{22}H_{22}O_{11}$

發表者 柴田(文)藥誌543(昭2) 朝比奈, 柴田(文), 小川:藥誌561(昭3)

【曼陀羅花】 學名 *Datura Alba*, Nees.

成分 (子) Scopolanin, Hyoscyamin Atropin 及脂肪油

發表者 長田:藥誌504(大13)

【羊躑躅】 學名 *Rhododendron Molle* G. Don.

成分 Andromedutoxin

發表者 F.S.A.L.14

【莽草】 學名 *Illicium Anisatum*, L.(?)

發表者 猪口 工化29(大14)〔其他〕喜多 大角 工化26(大12)田中 工化15(明15)

【藜蘆】 學名 *Veratrum Nigrum*, L.

成分 *Jervin* (Alkaloid) $C_{28}H_{47}NO_8$

發表者 邦藥337

【木藜蘆】 學名 *Leucothae Grayana*, Mxlm.

成分 *Grayanotoxin* $C_{27}H_{44}O_8$

發表者 久保 東醫21(明40)22(明41)土居 日新醫9年11號(大9)〔其他〕佐佐木(秀)日本公衆保健協會雜誌2(大15)

【烏頭】 學名 *Aconitum Fischeri*, Reichb.

成分 *Japaconitin* $C_{25}H_{41}NO_4$ (A.B.C.)

發表者 邦藥253

【虎掌天南星】 學名 *Arisaema Heterophyllum*, Bl.

成分 *Saponin* (尙未精査)多量澱粉

發表者 邦藥332

【蒟蒻】 學名 *Amorphophallus Konjac*, K. Koch.

成分 *Konjak-Manvan*

發表者 辻暢 Bull. Coll. Agr. Imp. Univ. Tokyo 2 (1894)前田 東醫31(大6)

發表者 (1)猪子, 本田東醫5(明24) (2)小倉工化31(昭3) [其他]長井藥誌88(明23)岩川東醫26(大1)

【狼毒】

學名 *Aconitum Lycocotonum*, L.

成分 *Lycacotin*, *Myocotonin* *Euphorbon*, 樹脂, 薹

發表者 F.S.A.I. 40

【大戟】

學名 *Euphorbia* Spp.

成分 酸石灰及一種 Alkaloid

發表者 有馬化誌252(昭3)

【續隨子】

學名 *Euphorbia Lathyris*, L.

成分 *Aesculetine* $C_9H_6O_4$

發表者 田原化誌10(明22)藥誌93(明22)

【莨菪】

學名 *Hyoscyamus Niger*, L. Var. *Chinensis*, Makino.

成分 *Hyoscyamin* $C_{17}H_{23}NO_2$ *Atropin*, *Nor-Hyoscyamin* $C_{16}H_{21}O_2N$ *Nor-Atropin*. *Scopolamin*

$C_{17}H_{21}NO_4$

發表者 邦藥38

【蓖麻】

學名 *Ricinus Communis*, L.

成分 子中含脂肪油, *Ricin* (毒性) *Lipase* (脂肪分解酵素) 等蛋白質類, 及 *Ricin* (Alkaloid)

成分 Polygonum Acid Tannin

發表者 F.S.A.I.43

【虎杖】學名 Polygonum Reynoutria, Makine

成分 Polygonin

發表者 藥誌314(明41)學彙

【蕭薺】學名 Polygonum Aviculare, L.

成分 糖, 單寧, 蠟

發表者 Lebbin-Med Woche, 4(1908)

【蒺藜】學名 Tribulus Terrestris, L.

成分 單寧

發表者 U.S.D. 1291 I.M.P.229

【大黃】學名 Rheum Tanguticum (Maxim.)

成分 Chrysophan Saure, Emodin, Isoemodin. Rhein. Rheochrysin. 其他 Aporetin, Erythrethin
及 Phaeoretia 大黃鞣酸 (Rheumgerbsaure) 鞣酸酐, 澱粉等

發表者 下山, 生藥學114

【商陸】學名 Phytolacca Esculenta, Houtt.

成分 硝石^(?) 脂肪油

成分 全草中含配糖體 Aucubin $C_{15}H_{24}O_{10}$ (?) 及 Plantagin (?) 種子中除多量黏液外尚有 Planten-
olsaure $C_{15}H_{24}O_8$ (?) 琥珀酸 (?) 等

發表者 (1) 宿谷富藥誌(大13)藥誌390(大11) (2) 高橋(統)岡醫389(大11) (2) 緒方(草)西大藥
誌514(大13)

【馬鞭草】 學名 *Verbena Officinalis*, L.

成分 *Verbenalin* $C_{17}H_{26}O_{10}$ (結晶性配糖體)

發表者 L. Blumradier: Chem. Ztg. 1908, Apr 藥誌316(明41)學彙

【連翹】 學名 *Hypericum Ascyron*, L.

成分 葉中含 Phyllirin.

發表者 Eijkman: Rec. 5(1886)

【藍】 學名 *Polygonum Tinctorium*, Lour.

成分 Indican (配糖體)

發表者 W. P. 176

【藍澱】 學名 *Indigo* (英名)

成分 *Indigo*

發表者 藥誌39(明18)雜錄

【蓼】 學名 *Polygonum Hydrophiper*, L.

(3)W aage: Pharm.Central.(1892)

【酸漿】 學名 *Physalis Alkekengi*, L.

成分 (全草) *Physalin* (無晶形苦味質)(果實)枸橼酸及微量 *Alkaloid*。(1)(根中)*Hystonia*。(2)

發表者 (1)Dessaigue: et Chantard J. Pharm.21(1862) (2)溝口衛次彙24(大13)X.F.S.A.I.8

【迎春花】 學名 *Jasminum Mediflorum*, Lindl.

成分 葉中含 *Syringin* (一種 *Glycoside*)

發表者 F.S.A.I.13

【款冬花】 學名 *Tussilago Farfara*, L.

成分 (葉中)配糖體2.63%(花中)一種 *Phytosterin*.

發表者 W. P. 785; B. P. C. 1128 A.J.P. 1887(59) U.S.D. 1331

【決明】 學名 *Cassia Tora*, L.

成分 *Emodin* 及配糖體

發表者 Eelborue: Phar. Jocer. Traus. 3(1829)

【金盞草】 學名 *Calendula Arvensis*, L.

成分 全草中含水楊酸根中含 *Inulin*.

發表者 W.P. 786 B.P.C.251

【車前】 學名 *Plantago Major*, L. Var *Asiatica*, Deene.

成分 Mannit及糖

發表者 大谷日藥總會(48)演講(昭3)

【牛膝】 學名 *Achyranthes Bidentata*, Blume

成分 灰分中富加里^(?)監黏液質

發表者 (1)河野藥誌561(昭3) [其他]藤田藥誌504(大13)

【紫苑】 學名 *Aster Tartaricus*, L.(?)

成分 Quercetin及融點150°之結晶性物質

發表者 中沖日藥45回總對(昭3)

【鴨跖草】 學名 *Commelina Communis*, L.

成分 Starch, Mucilage,

發表者 F.S.A.I.52

【黃蜀葵】 學名 *Abelmoschus Manihot*, Medic.

成分 黏質物

發表者 小澤工化25(大11)石津藥誌209(明32)

【龍葵】 學名 *Solanum Nigrum*, L.

成分 全草中含少量有散腫作用之 Alkaloid^(?)果實中含 Solanin^(?)及 Saponin^(?)

發表者 (1) Q. Schmidt, Schutte, Arch. Pharm 229 (1891) (2) Desfosses: J. De Phar. 6 (1820)

成分 苦味質 Darutin

發表者 F.S.A.I.3

【甘蕉】 學名 *Musa Paradisiaca*, L. Var. *Sapientum*, Kuntze.

成分 糖質,有機酸,單寧,沒食子酸,脂肪,纖維素等

發表者 F.S.A.I.49

【麻黃】 學名 *Ephedra Sivea*, Stampf.

成分 Ephedrin $C_{10}H_{15}NO^{(1)}$ Pseudoephedrin. ⁽²⁾ Non-Pseudoephedrin $C_9H_{13}NO^{(3)}$ Methylephedrin $C_{11}H_{17}NO^{(4)}$ Imethylepseudoephedrin $C_{11}H_{17}NO^{(5)}$

發表者 (1)長井藥誌 120, 121, 127 (明25)130139(26) (2)E. Read & O. T. Feng: Chinese Jour. Phy. 1(1927) (3)Smith: J. Chem.Soc. (1928) 學藥雜誌556(昭3) (4) (5)

【木賊】 學名 *Equisetum Hyemale*, L.

成分 無水珪酸

發表者 邦藥360

【燈心草】 學名 *Juncus Effusus*, L. Var. *Decipiens*, Buch.

成分 水分 7.15% 脂肪 6.55% 粗纖維 33.16% Protein 1.73% 無氮素抽出物 42% 灰分 4.32%
發表者 大島 J. of Sapporo Agric. College 2(1906)

【地黃】 學名 *Rehmannia Lutea*, Maxim.

【番紅花】學名 *Crocus Sativus*, L.

成分 含有 a-Crocin, b-Crocin. 及 a-Crocin (色素) 其他 Picrocrocin $C_{28}H_{48}O_{17}$ (苦味質) 脂肢油, 精油等

發表者 雜錄草誌557(昭3)

【續斷】學名 *Dipradus Asper*, Wall.

成分 Lamine 及 Glycoside.

發表者 F.S.A.I.9

【惡實】學名 *Arcium Lappa*, L.

成分 Inulin. 脂肪油

發表者 F.S.A.I.1

【菜耳】學名 *Xanthium Strumarium*, L.

成分 Xanthostrumarin

發表者 學彙66(明20)

【天名精】學名 *Carpesium Abrotanoides*, L.

成分 Inulin(?)

發表者 F.S.A.I.2

【豨薟】學名 *Siegesbeckia Pubescens*, Makino

【黃花蒿】 學名 *Artemisia Annua*, L.

成分 精油

發表者 F.S.A.I. I 今田藥誌420(大6) 朝比奈, 吉富藥誌424(大6)等

【益母草】 學名 *Leonurus Sibiricus* L.

成分 *Leonurin*

發表者 久保田, 中島醫海1771(昭3)

【夏枯草】 學名 *Brunella Vulgaris*, L.

成分 全草含有水溶性無機鹽約3.5% 其中約68%爲KCl所成又成有水難溶性之植物質鹼樣物

質子中含脂肪油

發表者 久保田, 中島滿醫9(昭3)

【雞冠花】 學名 *Celosia Cristata*, L.

成分 子中含脂肪油

發表者 F.S.A.I.42

【紅藍花】 學名 *Carthamus Tinctorius*, L.

成分 花中含Saflargelb $C_{24}H_{36}O_6$ 及 Carthamin $C_{21}H_{32}O_{10}$ ⁽¹⁾ (紅色素) ⁽²⁾ 種子中有脂肪油

發表者 (1) Malin: Aun. 136(1863) (2) 龜高化誌29(明39) 化誌31(明42) 黑田日藥例會(昭41月)

〔其他〕羽根植研4(昭2)

發表者 木村(惠) 工化7(明37)

【薺薺】

學名 *Salvia Plebeia*, R. Br.

成分 精油 (主成分 Thymol)

發表者 村山藥誌459(大9) [其他] 吉川, 富澤, 工化22(大8)

【菊】

學名 *Chrysanthemum Sineusis*, Sab.

成分 精油

發表者 F.S.A.I.2

【野菊】

學名 *Chrysanthemum Indicum*, L.

成分 精油

發表者 F.S.A.I.2

【艾】

學名 *Artemisia Vulgaris*, L, Var. *Indica*, Maxim

成分 精油 (主成分爲 Cineol, α -Thujon $C_{10}H_{16}O$)

發表者 中尾, 澁江, 藥誌510(大13) [其他] 大橋, 東北醫10(1927) 時, 日本藥物2(大15) 微生物誌

20(大15)

【青蒿】

學名 *Artemisia Apiacea*, Hance.

成分 苦味質精油 Abrotanine.

發表者 F.S.A.I.1

發表者 朝比奈, 村山: 藥誌390(大2)398(大4)朝比奈, 柴田(文): 藥誌415(大5)朝比奈, 剝米431(大7)
朝比奈, 桑田: 藥誌485(大11)朝比奈, Acta, Phytocchim, vol. II, 1921

【荊芥假蘇】 學名 *Ocimum Basilicum*, L.

成分 精油 (主成分 D-Menthon 及非旋光性 Methon D-Limonen)

發表者 村山, 板垣: 藥誌476(大10)村山: 化誌32(明44)

【薄荷】 學名 *Mentha Arvensis*, L.

成分 精油 (主成分爲 Menthol $C_{10}H_{26}O$)

發表者 學彙: 藥誌346(明44)學彙: 藥誌441(大7)學彙: 藥誌384(大1)篠崎(英): 工化22(大8)18(大

4) 木村(惠): 工化7(明37)

【積雪草】 學名 *Hydrocotyle* Spp.

成分 精油

發表者 F.S.A.I.9

【蘇】 學名 *Perilla Ocimoides*, L, Var *Crispa*, Benth.

成分 精油 (主成分爲 *Perilla Aldehyd* $C_{10}H_{14}O$)

發表者 吉木: 藥誌347(明44) [其他] 吉川, 富澤: 工化23(大9)農業會報(大6)11月號)

【荏】 學名 *Perilla Ocimoides*, L.

成分 精油

成分 精油(主成分爲 Cineol)

發表者 邦藥³⁰⁴

【莎草】 學名 *Cyperus Rotundus*, L.

成分 精油(主成分爲 *Cyperen* $C_{15}H_{24}$ 及 *Cyperol* $C_{19}H_{34}O$) 脂肪酸及 Phenol 性物質

發表者 木杖(雄)大谷藥誌⁵⁶⁰(昭3)學彙藥誌⁵²⁷(大15)

【茉莉】 學名 *Jasminum Sambac*, Ait.

成分 香脂(主成分爲精油及蠟)

發表者 士橋臺研¹¹(大11)

【茅香】 學名 *Cymbopogon Nardus*, Rendl.

成分 精油

發表者 惠澤工化¹⁶(大2)篠崎(英)工化¹⁶(大2)賀田工化¹⁶(大2)加福工化¹⁹(大5)20(大6)

加福臺研⁵(大5)

【迷迭香】 學名 *Rosmarinus Officinalis*, L.

成分 揮發油、

發表者 下山生藥學

【香薷】 學名 *Mosla*, Sp.

成分 精油(主成分爲 *Esholtziaketone* $C_{10}H_{14}O_2$)

【甘松香】 學名 *Nardostachys Jatamansi*, Royle.

成分 精油

發表者 朝比奈藥誌302(明40)化誌28(明40)

【山奈】 學名 *Kaempferia Rotunda*, L.

成分 精油(主成分爲 Methyl-p-cumar Saure Athyl Ester 及 Zimt-Saure Athyl Ester 其他含 Pentadecan 及少量之 Zimtaldehyd)

發表者 中尾澁江藥誌513(大13)

【蒟醬】 學名 *Piper Metle*, L.

成分 精油

發表者 F.S.A.I.47

【肉豆蔻】 學名 *Myristica Fragrans*, Houtt.

成分 脂肪油, 揮發油, 澱粉,

發表者 下山生藥學399

【薑黃】 學名 *Curcuma Aromatica*, Salisb

成分 Curcumin (黃色素) 油澱粉

發表者 藥誌542(昭2)藥彙

【蓬莪草】 學名 *Kaempferia Pandulata*, Roxb.

發表者 中尾; 藥誌462(大9)

【葉本】 學名 *Ligusticum Sinesis*, Oliv.

成分 精油

發表者 高橋; 化誌49(昭3)

【白芷】 學名 *Angelica Anomala*, Lallen.

成分 精油 *Angelicaure* 之類似酸⁽¹⁾ 及 *Angelicatoin*⁽²⁾

發表者 (1) 村山 (長) 藥誌152(明27) (2) 酒井; 東醫31(大6) 藥誌415(大8)

【芍藥】 學名 *Paeonia Albiflora*, Pall

成分 安息香酸⁽²⁾ 精油⁽²⁾

發表者 (1) 朝比奈; 奧野; 藥誌309(明40) (2) F.S.A.I.15

【牡丹】 學名 *Paeonia Moutan*, Sims.

成分 *Paeonol* $C_9H_{10}O_2$ 安息香酸 *Phytosterin*

發表者 長井; 藥誌77.81(明17) 田原; 藥誌117(明24) 同(明25) [其他] 藤田; 藥誌209(大13)

【木香】 學名 *Inulu Racemosa*, Hook, Fil.

成分 精油 (主成分爲 *Aplotaxen* $C_{17}H_{28}$ a-b- *Coste* $C_{15}H_{24}$ *Costus Lacton* $C_{15}H_{20}O_2$ *Dihydrocostus*

Lacton $C_{15}H_{22}O_2$ *Costussavre* $C_{15}H_{22}O_2$ *Costol* $C_{14}H_{24}O$ 等

發表者 (Ber. 471914)

【杜衡】 學名 *Asarum Maximum*, Hemsl.

成分 精油(主成分爲 *Safrol* 及 *Eugenol* 少量)

發表者 朝比奈藥誌 302 (明40) 朝比奈化誌 28 (明40)

【拳參】 學名 *Polygonum Bistorta*, L.

成分 (一般成分) 灰分 4.35% 單寧酸 18.25% 還元糖 2.13% 護膜黏液質 2.23% 澱粉, 樹脂, 纖維素 66.74%

發表者 藥誌 471 (大10) 學彙

【當歸】 學名 *Angelica Sinensis*, Diels

成分 精油

發表者 酒井東醫 30 (大5) [其他] 藤田藥誌 493 (大12)

【芎藭】 學名 *Cnidium Officinale*, Makino

成分 精油(成分爲 *Cnidium lacton* $C_{12}H_{18}O_2$ *Cnidiumsäure* $C_{12}H_{20}O_3$ *Cnidium Säure Ester* C_{12}

$H_{19}O_2$ $O-C_{10}H_{17}$ *Sedanon Säure* $C_{12}H_{14}O_{38}$ 等

發表者 酒井東醫 30 (大5) 藥誌 935 (大8) 村山藥誌 477 (大10) 493 (大12) [其他] 藤田藥誌 514 (大13)

【蛇床】 學名 *Selinum Monnieri*, L.

成分 精油

(昭2) ④F. S. A. 1.37

【貝母】

學名 *Fritillaria Verticillata*, Willd var *Thunbergii*, Baker.

成分 $\text{Fritillin } \text{C}_{26}\text{H}_{44}\text{NO}_4^{(1)}$ $\text{Fritillarin } \text{C}_{19}\text{H}_{33}\text{NO}_2$ ve $\text{Ricin } \text{C}_{19}\text{H}_{33}\text{NO}_2$ $\text{Verticillin } \text{C}_{19}\text{H}_{33}\text{NO}_2^{(2)}$

發表者 ①八木京醫10(大2) ②福昌化誌50(昭4)

【石蒜】

學名 *Lycoris Radiata*, Herb.

成分 $\text{Lycorin } \text{C}_{16}\text{H}_{17}\text{NO}_4^{(1)}$ $\text{Sekisamin } \text{C}_{16}\text{H}_{19}\text{NO}_4^{(2)}$

發表者 ①森島藥誌168(明29)東醫9(明28)朝比奈、杉井藥誌377(大2) ②近藤、富村藥誌545(昭

2) 〔其他〕外山藥誌335(明43)江日新10年8號(大10)森島東醫專2402(大14)江千醫134(大10)

【水仙】

學名 *Narcissus Tazetta*, L. Var. *Chinensis*, M. Roem.

成分 $\text{Lycorin } \text{C}_{16}\text{H}_{17}\text{O}_4\text{N}^{(1)}$ $\text{Narcotine } \text{C}_{16}\text{H}_{19}\text{NO}_4^{(2)}$

發表者 ①山内藥誌243(明35) ②F. S. A. I. 50 〔其他〕朝比奈、杉井藥誌377(大2)

【龍膽】

學名 *Gentiana Scabra*, Bunge.

成分 $\text{Gentiopicroin } \text{C}_{16}\text{H}_{25}\text{O}_6$ (苦味配糖體) $\text{Gentianose } \text{C}_{18}\text{H}_{32}\text{O}_{16}$ (三糖體)

發表者 朝比奈、照山藥誌382(大2)朝比奈、依田藥誌390(大3)

【細辛】

學名 *Asarum Sieboldi*, Miq.

成分 精油

發表者 近藤(東)鮮醫88(昭3)

發表者 有馬¹ 化誌48(昭2)49(昭3)

【升麻】

學名 *Cimicifuga Foetida*, L.

成分 *Cimicifugin*. 蔗糖, 油, 樹脂, 鞣酸

發表者 F.S.A.140國本4

【苦參】

學名 *Sophora Angustifolia*, L. Ets.

成分 (根) *Martin* $C_{15}H_{24}N_2O^{(1)}$ (子) 脂肪油 *Cytisin* $C_{11}H_{14}N^{(2)}$

發表者 (1) 長井¹ 近藤² 藥誌260(明36) 近藤³ 佐藤⁴ 藥誌474(大10) 近藤⁵ 貴志⁶ 荒木⁷ 藥誌478(大10) 近藤⁸ 眞田⁹ 藥誌498(大12) 近藤¹⁰ 落合¹¹ 藥誌522(大15) 332(大15) 近藤¹² 落合¹³ 相原¹⁴ 近藤¹⁵ 落合¹⁶ 中村¹⁷ 藥誌561 近藤¹⁸ 落合¹⁹ 西村²⁰ 藥誌561(昭3) (2) 猪子²¹ 藥誌330(明42) (其他) 藤田²² 藥誌505(大12) 石板²³ 東醫²⁴ 17(明36) 杜²⁵ 臺醫²⁶ 237(大13)

【白鮮】

學名 *Dictamnus Albus*, L.

成分 苦味質精油

發表者 F.S.A.137

【延胡索】 學名 *Corydalis Bulbosa*, DC. (?)

成分 *Protopin* $C_{20}H_{18}NO_5^{(1)}$ *Bulbocapnin* $C_{19}H_{18}NO_4^{(2)}$ *Dtetrahydropalmatin* $C_{21}H_{28}O_4N$ 及融點228—230³ 一種 *Alkaloid*⁽³⁾ *Dehydrocorydalin* *Ber Berin*⁽⁴⁾

發表者 (1) K. Makoshi: *Arch. Pharm.* 274(1908) (2) 朝比奈⁵ 用潮⁶ 藥誌463(大9) (3) 長田⁷ 藥誌547

【黃連】 學名 *Coptis Chinensis*, Franch.

成分 $\text{Berberin } \text{C}_{20}\text{H}_{17}\text{NO}_6$ $\text{Palmitin } \text{C}_{21}\text{H}_{21}\text{NO}_4^{(1)}$ $\text{Coptisin } \text{C}_{16}\text{H}_{15}\text{NO}_6^{(2)}$ $\text{Worenin } \text{C}_{20}\text{H}_{15}\text{NO}_4^{(2)}$

發表者 (1) 村山篠崎藥誌 530 (大15) (2) 北里Proc. Imp. Acad. Japan 2(1926) (3) 北里藥誌 542

(昭2)

【胡黃連】 學名 *Pterorhize Kuroa* Royle.

發表者 朝比奈前田藥誌433(大7)

【黃芩】 學名 *Scutellaria Baicalensis*, Georgi.

成分 $\text{Woogonin } \text{C}_{16}\text{H}_{12}\text{O}_4$ 及 $\text{Baicalin } \text{C}_{21}\text{H}_{18}\text{O}_{11}$

發表者 柴田Acta. Phy. 1(1923) [其他]高橋藥誌109(明24)

【秦艽】 學名 *Gentiana Tiliacea*, King.

成分 Alkaloid.

發表者 F.S.A.I. 6

【柴胡】 學名 *Bupleurum Falcatum*, L.

成分 Saponin.⁽²⁾ 揮發油樹脂澱粉粒

發表者 (1) 惠澤臺研5(大5) [其他]藤田木村藥誌553(昭3)近藤(東)日本藥物7(昭3)等

【前胡】 學名 *Angelica Miqueliana*, Maxim. (?)

成分 Nodakenin $\text{C}_{20}\text{H}_{24}\text{O}_9$ (配糖體)

成分 Senegin, Resin. 脂肪油

發表者 F.S.A.I. 26

【地榆】 學名 *Sanguisorba Officinalis* L.

成分 ⁽¹⁾單寧質, ⁽²⁾Sugar⁽²⁾

發表者 (1) 邦藥 213 (2) F.S.A. I. 35 (其他) 藤田醫誌(大12)附錄

【王孫】 學名 *Paris Tetraphylla* A. Gr. (?)

成分 Paridin, Paristypnin

發表者 F.S.A.I. 51

【紫草】 學名 *Lithospermum Officinale*, L. Var. *Erythrorhizon*, Maxim (?)

成分 Acetylshikonin $C_{18}H_{18}O_6$ (結晶性紫色素)

發表者 (1) 黑田化誌 30(大7) (2) 上田朝試(大6) (3) 澤田東北醫 29(明36)

【白頭翁】 學名 *Auemonia Chinen* Sis, Runge.

成分 Auemonin

發表者 F.S.A.I. 41

【白及】 學名 *Bleilla Striata*, Reichb.

成分 黏液質

發表者 邦藥 238

成分 Panagiolon $C_{32}H_{50}O_{14}$ ⁽¹⁾ Panax Sapogenol $C_{27}H_{48}O_8$ Phytosterin $C_{28}H_{44}O^{(2)}$ 等
發表者 (1) 藤谷京醫2.(明38年) (2) 近藤天野藥誌466(大9年) 近藤田中藥誌401(大4年)
近藤山口藥誌440(大7年)

【沙參】

學名 Adenophora Varticillata, Fisch. Var Typica, Regel.

成分 Saponin

發表者 F.S.A.I.4(1927)

【桔梗】

學名 Platycodon Grandiflorum, DC.

成分 Kikyoaponin $C_{29}H_{48}O_{11}$

發表者 (1) 松南磯義日藥總會(48)(昭3) (2) 梅辻京藥誌26(大6) (3) 大鹿京醫15(大7)等

【朮】

學名 Atractylis Ovata, Thunb.

成分 精油(主成分爲 Atractylol $C_{15}H_{24}O$ 其他 Atractylon $C_{14}H_{18}O$ 等)

發表者 (1) 上野藥誌129(明25) 高木藥誌473(大10) (2) 高木本郷藥誌509(大13) [其他] 藤田藥誌511(大13) 金鮮醫83(昭2)

【貫衆】

學名 Polystichum Falcatum, Diels Var Fortunei, Baker.

成分 Oleoresin

發表者 F.S.A.I.60(1927)

【遠志】

學名 Polygala Tenuifolia Willd.

編輯後記

中國藥學大辭典成於民國二年六月。其間排印校對。歷時一年十月而始行出版。在此排校期間。續得珍貴之材料甚多。不忍割棄。因作編輯後記以容之。

一 日本化驗中藥之新報告

日本近年復興皇漢醫藥。已爲世人所共知。研求之精。成績之富。皆出國內人士之料想。近由日本醫學博士中尾方三集得中藥一百四十二種之成分報告。均係正式發表於醫藥雜誌者。誠皆中國藥學上之重大收穫。國人對此能不憬然驚惕。吾願國醫同志。勿再泥於舊說學派之空論。作無謂之自訟。當知國醫之唯一寶物。即在效驗卓特之中國藥物。今後當盡力於研求國藥文獻。辨別道地真偽。改進泡製種植。化驗成分性質。判定藥效度量。此數端卽爲國醫造成萬世不滅之根基。亦爲國醫科學化之正確途徑。又願國內科學專家。西醫藥家。轉易研究標的。勿使國傳環寶。坐讓於人。是本書之所由作也。茲將中國藥品一百四十二種之成分化驗報告。記錄如下。

★發表者均用縮名見後面縮名索引

【甘草】 學名 Glycyrrhiza Glabra, L. var Glandulifera, Reg. Et

成分 Glycyrrhizin $C_{42}H_{64}O_{16}$ 及蔗糖、葡萄糖、Mannit 林檎酸、Asparagin.

發表者 F.S.A.I.30(1927)

【人參】 學名 Panax Ginseng, C.A. Mey.

【鵪鶉】 主治 預解毒。水黃一枚。與小兒啖之。令不出痘。或出亦稀。(李時珍)

【鵪鶉】 主治 小兒天釣驚風。

發歇不定。炒研半錢。入牛黃。麝香。各半錢。炒。五枚爲末。每服半錢。新汲水服。

【鵪鶉骨及嘴】 主治 喉痺。飛尸蛇虺咬。

及小兒閃癖。大腹痞滿。並煮汁服之。亦燒灰飲服。

【鵪鶉】 命名 本品性好浴水。其睛瞿瞿然。故名。

古鵪別名 鵪鶉(周禮) 鵪鶉鳥(廣雅) 八哥(綱目俗名) 寒皋(萬畢術)

外國名 鵪 Aoridoherescristatellus Gm. (拉丁) ハンツ チヤウ或ナシレン(日本)

基本 係脊椎動物鳥類鳴禽類白頭翁科之鵪鶉。

形態 鵪鶉爲林禽類之一種。全體羽色純黑。兩翼下各有白點。背面稍帶紫光。頭後及腰稍帶綠。頭羽稍長。爲冠額。羽稍向嘴基而卷曲。嘴色淡黃。嘴根紅色。脚橙黃。

眼簾亦黃。拙難者養之。修剔其舌尖。教以言語。能效人語。亦能巧擬禽獸之啼聲。其肉可供藥用。

採取 須於臘月採之。

性質 甘平無毒。主治 五痔止血。炙食。或爲散飲服。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論鵪鶉肉曰。治老嗽。臘月臘日取得。五味醃炙。食作羹食。或搗散蜜丸服之。【宋】日華諸家本草論鵪鶉肉曰。炙食一枚。治呃噫。下氣通靈。

【鵪鶉目睛】 主治 和乳汁。研滴目中。令人目明。能見霄外之物。

【鵪鶉】 即鵪鶉之古籍別名。典見綱目。詳『鵪鶉』條。

三十畫

【鵪鶉】 即豪緒之古籍別名。典見綱目。詳『豪緒』條。

三十三畫

【羅桂枝】 即桂枝之處方用名。詳『桂枝』條。

加四物湯服之。(朱震亨) ①鬱金香

生蜀地及西戎苗似薑黃花白質紅末秋出莖心而無實其根黃赤

取四呎子根去皮火乾馬藥用之破血而補胡人謂之馬逐嶺南者

有實似小豆不堪噉(蘇恭) ②今廣南江西州郡亦有之然不及蜀

中者佳四月初生苗似薑如蘇恭所說(蘇頌) ③鬱金不香今人將

染婦人衣最鮮明然不奈日炙染成衣則微有鬱金之氣(寇宗奭)

【鬱金香】古籍別名 鬱香(御覽) 草麝香 茶炬摩(佛書) 紅藍花 紫述香(綱目)

外國名詞 Tulipa Gesneri-ana, L. (拉丁) ウツテンユウ

チウリツプ(日本) 基本 係百合科山慈姑屬。爲鬱金香之花。

產地 廣西羅城縣及諸山野間恒多有出。

形態 鬱金香爲芳草類之多年生草本。高尺餘。葉廣披針形。帶白色。四五月間花大而美麗。單生於花莖之頂端。花蓋六片。有黃紅白等色。或爲重瓣花。花瓣可供香

藥用。

性質 苦溫無毒。主治 蟲野諸毒心腹間惡氣鬼注。鴛鴦等一切臭入諸藥香用。

參攷資料 ①許慎說文解字云。鬱芳草也。十葉爲貫。百二十貫

築以黃之。鬱者乃百草之英。合而釀酒以降神。乃遠方鬱人所真。故謂之鬱。鬱今鬱林郡也。(蘇頌)

漢鬱林郡。即今廣西貴州潯州賓諸州之地。一統志惟載柳州羅城縣出鬱金香。即此也。金光明經

謂之茶炬摩者。此乃鬱金花。香與今時所用鬱金根名同物異。按趙

古則六書本義。鬱字象米在器中。以匕扱之之意。鬱字從臼奉缶置

於几上。鬱有多飾五體之意。俗作鬱。則鬱乃取花藥酒之意。非指地

言地乃因此草得名耳。(李時珍) ②鬱金香生大秦國。二月三月有花。狀如紅藍。四月五月採花即香

也。(陳藏器) ③按鄧玄云。鬱草似蘭。楊孚南州異物志云。鬱金出蜀

賓國人種之。先以供佛。數日萎然後取之。色正黃。與芙蓉花裏嫩蓮者相似。可以香酒。又唐書云。太宗

時伽毗國獻鬱金香。葉似麥門冬。九月花開。狀似芙蓉。其色紫碧。香

聞數十步。花而不實。欲種者取根。二說皆同。但花色不同。種或不一

也。古樂府云。中有鬱金蘇合香者。是此鬱金也。晉左貴嬪有鬱金頌

云。伊有奇草。名曰鬱金。越自殊域。厥珍來尋。芳香酷烈。悅目怡心。明

德惟馨。淑人是欽。【鬱香】即鬱金香之古籍別名。典見御覽。詳【鬱金香】條。

【鬱臭苗】即益母草之古籍別名。典見和漢藥考。詳【益母草】條。

【鬱臭草】即益母草之古籍別名。典見圖經本草。詳【益母草】條。

【鬱鬱】即鬱金之古籍別名。典見和漢藥考。詳【鬱金】條。

【鬱雞】形態 鬱雞爲雞類之一種。棲在山野。多食鬱金苗葉。其肉鬆脆。可供藥用。

主治 解鬱散結氣。命名 鸛字篆文象其形。形似鸛無丹頂。似鸛無冠毛。嘴長

色暗黑。眼裸出色赤。脚長亦赤。色肩覆及翼白色。略帶黑。體之上部

黑色。下部白色。脰以下無羽毛。被多角形鱗紋。爪短小而褐色。巢於高樹。以枝葉羽毛等構成。捕食魚

蟲。性馴溫。和。其骨可供藥用。【鸛】古籍別名 皇君負釜(詩疏) 黑尻(綱目)

外國名詞 Ciconia boyciana (拉丁) S Fork (英) Storch

(德) ユウノトリ 或 ユフツル (日本) 基本 係脊椎動物鳥類涉禽類鸛科

產地 江湖池沼間有之。形態 鸛爲水禽類之一種。其

形似鸛無丹頂。似鸛無冠毛。嘴長色暗黑。眼裸出色赤。脚長亦赤。色

肩覆及翼白色。略帶黑。體之上部黑色。下部白色。脰以下無羽毛。被

多角形鱗紋。爪短小而褐色。巢於高樹。以枝葉羽毛等構成。捕食魚

蟲。性馴溫。和。其骨可供藥用。



鸛

採取 以白色者佳。性質 甘大寒。無毒。主治 鬼蠱諸注。五月。心腹

痛。參攷資料 鸛骨有小毒。入沐湯浴頭。令髮盡脫。更不生也。(陳藏器)

氣行血。解開結止痛。是其專長。古稱解鬱。義亦如是。唐本草謂治血積下氣破惡血血淋尿血。甄權謂治宿血氣心痛。冷氣結。癰湖謂治血氣心腹痛。產後敗血衝心欲死。丹溪謂治吐血衄血唾血及經事逆行並以鬱金末加韭汁薑汁童尿同服其血自清痰中帶血者加竹瀝同無一非開泄洗降之功用也。又曰。丹溪謂鬱金之性輕揚上行。古人以治鬱遏不能升者。命名因此。案此藥是根。質堅沈重。潔古謂其氣味俱厚。故純以下行為用。惟入血行氣亦能破堅散結。所謂開鬱者。本以宣通解散為義。鬱不能升一層大是誤會。况丹溪亦自謂其治吐血衄血及逆經諸症則專以下行為長。當亦可於言外得之。反謂上行寧不自矛盾。范石湖且謂一味為末治蠱毒服之即瀉出惡物尤為明白。了解丹溪此說恐出依託而石頑和之亦謂先升後降。不思之甚矣。王治華曰。市肆所售廣鬱金。即川鬱金。體圓尾銳。外皮糙白粗皺。折開質堅黃色光明脆嫩。其味苦中帶甘者真。

二十九畫

鬱

川鬱金即溫州所產之鬱金。質堅色黑。香氣甚微。較遜。按鬱金入心與包絡肝胃四經。為降氣解鬱。涼血散瘀之品。日醫石原保秀氏用以治唾血吐血衄血尿血婦人經脈逆行心腹痛諸症。但考其功用與蓬朮薑黃相似。惟蓬朮入肝。能治氣中之血。薑黃入脾。可治血中之氣。而鬱金則入心。專治心包之血。有破宿生新之功。為稍異耳。

配合應用 ①鬱金同非萊。降香。當歸。生地黃。童便。能治惡氣傷肝吐血。又治鼻衄唾血。喉中血腥氣。及經脈逆行有痰方加竹瀝。②鬱金七兩。同明礬三兩。為細末。薄米糊為丸。梧子大。每服五十丸。白湯下。昔人曾治婦人癰狂十年不愈。初服此藥。心胸間有物脫去。即神氣洒然。再服而蘇。此驚憂痰血。總聚心竅所致。此藥入心去惡血。明礬化頑痰。故也。

③痘疹始有白泡。忽插入腹。漸作紫黑色。無膿。日夜叫亂者。鬱金一枚。甘草二錢半。水半碗。煮乾。去甘草切片。微火烘燥為末。入真片腦半錢。每用一錢。以生豬尾血五

七滴。新汲水調下。不過二服。甚者毒氣從手足心出。如癰狀乃瘥。此乃五死一生之候也。（龐安常傷寒論方）

④又范石湖文集云。嶺南有采生之害。其術於飲食中行厭勝法。致魚肉能反生於人腹中。而人已死。則陰役其家。初得覺胸腹痛。次日刺人十日。則生在腹中也。凡胸膈痛。即用升麻或膽礬吐之。若膈下痛。急以米湯調鬱金末二錢服。即瀉出惡物。或合升麻鬱金服之。不吐則下。李巽嚴侍郎為雷州推官。鞠獄得此方。活人甚多。

⑤治厥心氣痛不可忍。鬱金。附子。乾薑等分。為末。醋糊丸。梧子大。珠砂為衣。每服三十丸。男酒女醋下。（奇效方）

⑥治產後心痛。血氣上衝欲死。鬱金燒存性。為末二錢。米醋一呷。調灌即甦。（袖珍方）

⑦治自汗不止。鬱金末臥時調塗於乳上。（集簡方）

⑧治衄血吐血。川鬱金為末。井水服二錢。甚者再服。（黎居士易簡方）

用量 錢半至二錢。
施用宜忌 凡陰虛而無癰瘡者禁用。

參攷資料 ①鬱金其性輕揚上行。治吐血衄血唾血血尿及經脈逆行。並宜鬱金末加韭汁薑汁童尿同服。其血自清。痰中帶血者加竹瀝。又鼻血上行者。鬱金。韭汁。

涼。同於他味。兼爲調治之。如敗血衝心。加以薑汁童便。去瘋心癲明。攀爲丸。硃砂爲衣。與受蟲毒。加以升麻之類。若使惡血。惡痰。惡癰。惡癩。惡痔。在於下部而難消者。俟其辛氣既散。苦氣下行。卽爲疎泄。而無鬱滯難留之弊矣。此藥本屬入心散瘀。因瘀去而金得泄。故命其名曰鬱金。書云。此藥純陰而寒者。因性主下而言也。有云是藥性溫而言者。因氣味辛香。主上而言也。各有論說不同。以致理難畫一耳。因爲辨論正之。出川廣園如蟬肚。外黃內赤。色鮮微香。帶甘者眞。市人多以薑黃僞充。【清】陳修園本草經讀論鬱金曰。時醫徇名有二。誤。一曰生脈散。因其有生脈二字。每用之以救脈脫。入咽少頃。脈未生而人已死矣。一曰鬱金。因其命名爲鬱。往往取治於氣鬱之症。數服之後。氣鬱未解。而血脫立至矣。醫道不明。到處皆然。而江浙閩粵。尤其甚者。又曰鬱金氣味苦寒者。謂氣寒而善降。味苦而善泄也。其云血積者。血不行則爲積。積不去。則爲惡血。血逆於上。從口鼻而出。

則爲衄血吐血。血走於下。從便溺而出。有痛爲血淋。無痛爲尿血。卽金瘡之瘀血不去。則血水不斷。不能生肌。此物所以統主之者。以其病原皆由於積血。特取其大有破惡血之功也。蓋血以氣爲主。又標之曰下氣者。以苦寒大泄其氣。卽所以大破其血。視他藥更進一步。解鬱二字。不見經傳。切不可惑此邪說。若經水不調。因實而閉者。不妨以此決之。若因虛而閉者。是其寇警。且病起於鬱者。卽內經所謂二陽之病。發心脾。大有深旨。若錯認此藥爲解鬱而頻用之。十不救一。至於懷孕。最忌攻破。此藥更不可以沾唇。卽在產後。非熱結停瘀者。亦不可輕用。若外邪未淨者。以此擅攻其內。則邪氣乘虛而內陷。若氣血兩虛者。以此重虛其虛。則氣血無根而暴脫。此女科習用鬱金之害人也。聖經灼然可據。雜書雜說。居然魚目混珠。甚爲不解。昔人謂不讀人間非聖書。吾深有味乎斯言。

辨僞 ●鄭肯藤曰。鬱金辛苦微甘。氣寒。其性輕揚。上行入心。及包絡。兼入肺經。涼心熱。散肝鬱。破血下氣。出川廣體銳圓如蟬肚。皮黃肉赤。色鮮微香。折之光明脆嫩。苦中帶甘者乃眞。今市中所售者多是薑黃。并有以薑莖充僞之者。俱峻削性烈。挾虛者大忌。用者慎之。况鬱金苦寒。色赤入心。姜黃辛溫。色黃入脾。莖莖味苦。色青入肝。胡得混售而貽害耶。●曹炳章曰。按鬱金山草之根。野生也。兩廣江西咸有之。而以蜀產者爲勝。上古不甚重用。以治馬病。故又名馬蹏。因其形像我蹏也。自唐以後。始入藥料。治血症有功。本非貴重之品。清初吳亂未靖時。蜀道不通。貨少居奇。致價數倍。甚則以薑黃輩僞之者。然其形銳圓如蟬腹狀。根杪有細鬚一縷如莖。臍之苗長一二寸。市人因呼金線甲蝦蟆。蟬肚爵金是也。其皮黃白有皺紋。而心內黃赤。剝開微然兩層如井欄。產四川重慶。惟本年生者嫩小而黃。若遺地未採。逾年而收。則老而深黯。色如三七狀。爲老廣鬱金。然老鬱金治血症化瘀削積之力。勝於嫩者。若開鬱散痛。卽嫩黃者亦效。乃

近年傳黑者爲野鬱金。黃者爲假。并誤其爲薑黃。殊不知此物本是野生。若薑黃皮有節紋。肉色深黃無暈。莖尤色黑。無心。最易辨也。然老鬱金雖產四川。近今名稱廣鬱金。所謂川鬱金。乃溫州產也。色黯黑。形扁亦有心。惟不香耳。

近人學說 ●張山雷曰。鬱金始見於唐本草。稱其辛苦而寒。石頑逢原已改作辛平。謂安有辛香而寒之理。又謂蜀產體圓尾銳如蟬腹狀。發苗處有小孔。皮黃而帶黑。通身粗皺如梧桐子紋。每枚約重半錢。折開質堅。色黃中帶紫黑。嗅之微香。不烈者眞。如大小不等折之中空質柔。內外皆黃。其氣烈者。卽片子薑黃也。案今市肆鬱金有二種。川產廣產。形頗相近。但川產者形扁。切片亦深黃褐色。中心則紫。廣產形圓。切片則作淡黃色。中心略深。亦黃而不紫。今俗尚多用廣產。實則質堅而光潔。其性沈重。其氣極微。嗅之亦無甚香味。二者皆然。若色深香烈而形較大。則薑黃也。惟其實堅性重。色黃赤如血。故導入血分。能行血中之氣。下

語。羽色豔美。有白赤黃綠等色。脚具四趾。二前二後。能攀木握物。性伶俐。可馴養。巢於岩洞樹穴。覓食果實等物。其肉可供藥用。

性質 甘。鹹。溫。無毒。
主治 食之已虛嗽。

【鷄蠅螺】即海螺之一種。性質功效與海螺同。詳「海螺」條。

【羴羊角】即羴羊角之古籍別名。典見綱目。詳「羴羊角」條。

【羴】即羴之古籍別名。典見綱目。詳「羴」條。

【羴鼠】即羴鼠之古籍別名。典見本經。詳「羴鼠」條。

二十九畫

【糞】即丹黍米之古籍別名。典見綱目。詳「丹黍米」條。即黍之色赤者別名。典見爾雅。詳「黍」條。

【糞冬】即麥門冬之古籍別名。典見別錄。詳「麥門冬」條。即天門冬之原名。詳「天門冬」條。

【龍珠】即龍眼之古籍別名。典見和漢藥考。詳「龍眼」條。

【鬱李仁】即郁李仁之古籍別名。典見別錄。詳「郁李仁」條。

【鬱金】原名 馬蹄。本品根形似莖。而醫馬病。故名。又能解肺金之鬱。遂名鬱金。

處方用名 廣鬱金。川鬱金。古籍別名 乙金。玉金。深黃。鬱金。鬱金母。蛇。(和漢藥考)

外國名詞 Curcuma, (拉丁) Turmeric, (英) Kunkuma, (德)

基本 屬蕁荷科。為鬱金之地。下莖。

產地 陳仁山藥物生產辨云。鬱金產四川為正地道。好氣味。色金黃。有產兩廣者。名土金。色淡白。無味。不適用。和漢藥考曰。產東印度。中國臺灣。琉球。日本九州地方。

(一) 金鬱

形體 鬱金為多年生宿根草。高二三尺。葉類疊華。花稍似若荷而大。多小苞作鱗狀。其間有三四黃蕊。鬱金入香料。能使其香及遠。

其根為芋狀主根。長五分之一寸五分許。葉痕作輪狀。環繞周圍。外面灰褐色。內部暗褐色或黃色。作角質狀。有一種芳香。稍有苦味。

製法 去鬚。切薄片。或原粒杆而用之。

性質 辛苦寒。無毒。

成分 為黃色素(Curcumin, $C_{15}H_{10}O_5$)。揮發油。澱粉等。

效能 解鬱行氣。涼血。破瘀。用作血瘕金瘡藥。

作用 在胃時僅分解。至腸始被吸收。然半數仍由大便排出。由腸壁吸入血中。即能增進血液氣化之功。同時又能令子宮黏膜之充血。

主治 血積下氣。生肌止血。破惡血。血淋。尿血。金瘡。



亦治馬脹。【金】張元素珍珠囊論鬱金曰。涼心。【元】李東垣用藥法象論鬱金曰。治陽毒。入胃下血。類痛。【明】李時珍本草綱目論鬱金曰。治血氣。心腹痛。產後敗血衝心。欲死。失心。顛狂。蠱毒。【明】繆希雍本草經疏論鬱金曰。鬱金味辛。苦。其氣寒。而無毒。辛能散。苦能洩。故善降逆氣。入心肝胃三經。故治血積氣降。而和則血凝者散。故主生肌止血。其破惡血。治血淋。尿血。主金瘡者。調氣行血之功也。單用亦治女人宿血氣。心痛。冷氣結聚。溫醋磨服之。入心涼血。故潔古用以涼心。入足陽明。故治陽毒。入胃下血。類痛。其性輕揚。能開鬱滯。故為調逆氣行瘀血之要藥。【清】黃宮繡本草求真論鬱金曰。鬱金辛苦而平。諸書論斷不一。有言此屬純陰。其論所治。皆屬破氣下血之說。有言性溫不寒。其論所治。則有療寒除冷之謂。究之體輕氣竄。其氣先上行而微下達。凡有宿血凝積。及有惡血不堪之物。先於上處而行其氣。若使其氣其邪。其痰其血。在於腸上而難消者。須審宜溫宜

形體 鸛為水禽類之一種。

其狀似鵞。又似鴨形。上嘴鉤曲而尖。下嘴直扁。色暗黑。頤喉眼緣黃色。眼有光輝。後頭部疏生短黑毛。狀如冠毛。頸與體之下面概黑色。有綠光。腹部稍白。翼尾脚亦黑色。脚有爪蹠。四趾皆前向。性善潛水。捕魚。漁人恒多養之。其肉可供藥用。



鸛

性質 酸。鹹。冷。微毒。

主治 大腹鼓脹利水道。

參攷資料 鸛別錄不見功用。惟雷氏炮炙論序云。體寒腹大。

全類鸛。註云。治腹大如鼓。體寒者。以鸛燒存性。為末。米飲服之。立愈。竊謂諸腹鼓大。皆屬於熱。衛氣並循於血脈。則體寒。此乃水鳥其氣寒。冷而利水。寒能勝熱。利水能去溼。故也。又外臺云。凡魚骨哽者。但密念鸛。不巳即下。此乃厭伏之意耳。(李時珍)

【鸛鵒羽】 採取 宜以翅羽燒灰用。

主治 魚骨哽噎。

【鸛鵒卵】 主治 墜胎。有不欲留孕者。取一個白水煮服。胎即化為血水。從小便出。多則二服。無有不驗。

【鸛鵒涎】 主治 腎咳。趙學敏曰。俗呼頓喘。從小腹下逆上而咳。連嗽數十聲。少住又作。甚或咳發必嘔。牽掣兩脇。涕淚皆出。連月不愈者。是痰水冲服下咽即止。

【鸛鵒骨】 主治 下魚骨哽。燒灰水服。去雀斑。斑燒研入白芷末。豬脂和。夜塗且洗。

【鸛鵒素】 命名 本品即鸛鵒喉中受食之處。故名。主治 魚骨哽喉。吞之。

【鸛鵒嘴】 主治 噎病發。啣之便安。

【鸛鵒頭】 主治 哽及噎。燒研酒服。

【鸛鵒糞】 原名 蜀水花。性質 冷微毒。主治 去面上黑黚。磨瘡。

歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草論鸛鵒糞曰。療面癰疵及湯火瘡痕。和脂油傅疔瘡。【宋】蘇頌圖經本草論鸛鵒糞曰。南人治小兒疳疔。乾研為末。炙豬肉蘸食。云有奇效。【明】李時珍本草綱目論鸛鵒糞曰。殺蟲。

配合應用 ①治鼻面酒皰。鸛鵒屎一合。研末。以臘月豬脂和之。每夜塗且洗。(千金方) ②治魚骨哽咽。鸛鵒屎研。水服方寸匕。并以水和塗喉外。(范汪方)

③斷酒。鸛鵒屎灰研水服方寸匕。日一服。(外臺祕要方)

二十八畫

【薏米】即苡仁之古籍別名。典見別錄。詳「苡仁」條。

【薏菜】即香薷之古籍別名。典見和漢藥考。詳「香薷」條。

【薏友】即白芍之古籍別名。典見和漢藥考。詳「白芍」條。

【鰾魚】即鰾魚之古籍別名。典見綱目。詳「鰾魚」條。

【鰾哥】即鰾鵒之古籍別名。典見

綱目。詳「鰾鵒」條。

【鰾哥菊】即浙烏頭之俗名。詳「浙烏頭」條。

【鰾鵒】即鰾鵒之原名。詳「鰾鵒」條。

【鰾鵒】 原名 鰾鵒。命名 本品能學人語。猶嬰兒之學母語。故名。

古籍別名 鰾哥。乾草。隴客。(綱目) 隴陀。(梵書)

外國名詞 Psittacus 或 Psittaci (拉丁) Parrot (英) Papagai (德) オーム或アウム (日本)

基本 係屬脊椎動物鳥類。食類鵒鵒科。

產地 出美、澳兩洲。及南方熱帶諸地。



鰾鵒

形體 鰾鵒為林禽類之一種。種類甚多。其頭圓。嘴強大。下嘴短。小上嘴鉤曲。舌肥大而軟。能效人

【驢骨】 主治 養湯。浴。歷節風。歷代記述效驗【明】李時珍本草綱目論驢骨曰。牝驢骨黃汁服。治多年消渴極效。

【驢陰莖】 性質 甘溫無毒。主治 強陰壯筋。性質 辛寒有小毒。主治 浸蜘蛛咬瘡良。

【驢溺】 歷代記述效驗【明】李時珍本草綱目論驢溺曰。治反胃噎病。狂犬咬傷。癰癤惡瘡。並多飲取瘡風蟲牙痛。類含漱之良。

配合應用 治狐尿刺瘡。烏驢尿頓熱漬之。千金方。治白玷風。驢尿薑汁等分和勻類洗。聖濟總錄方。

治耳聾。人中白一分。乾地龍一條爲末。以烏驢駒尿一合和勻。盡器盛之。每滴少許入耳。聖惠方。

參攷資料 婦病禮。用四物加驢尿與服。以防其生蟲。數十帖而愈。朱丹溪。張文仲備急方。言幼年患反胃。每食羹粥諸物。須臾吐出。貞觀中許奉御兄弟及柴蔣諸名醫奉勅調治。竟不能療。

漸疲困。候經旦夕。忽一衛士云。服驢小便極驗。遂服二合。後食止吐。一牛。哺時再服二合。食粥便定。次日奏知。則宮中五六人患反胃者。同服一時俱瘥。此物稍有有毒。服時不可過多。須熱飲之。病深者七日當效。後用屢驗。李時珍。

【驢頭肉】 主治 麥汁服二三升。治多年消渴無不瘥者。又以漬麴醞酒服。去大風動搖不伏者。

歷代記述效驗【宋】日華諸家本草論驢頭肉曰。洗頭風風屑。【明】李時珍本草綱目論驢頭肉曰。同薑蒸麥汁日服。治黃疸百藥不治者。【明】常效先心鏡篇論驢頭肉曰。治中風頭眩。心肺浮熱。肢體骨痠。語蹇身顫。鼓汁煮食。

【驢頭骨】 主治 燒灰和油塗小兒顫解。主治 燒灰和油塗小兒顫解。

【驢懸蹄】 主治 燒灰。傅癰疽。散膿水。和油傅小兒解顫。以瘥爲度。

配合應用 治腎風下注生

瘡。驢蹄二十斤。燒灰。蜜陀僧。輕粉各一錢。麝香半錢。爲末。傅之。奇效方。

【治天柱瘡毒】 生脊大椎上。大如錢。赤色。出水。驢蹄二片。胡粉熬一分。麝香少許爲末。醋和塗之。乾則摻之。聖惠方。

【治飲酒穿腸】 飲酒過度。欲至穿腸者。用驢蹄硬處。削下水。煮濃汁。冷飲之。襄州散將樂小蠻得此方有效。經驗方。

【治鬼瘧不止】 用白驢蹄剉炒。砒霜各二分。大黃四兩。菴豆三分。雄黃一分。硃砂半份。研丸。梧子大。未發。平旦冷水服二丸。即止。七日忌油。肘後方。

【驢髓】 性質 甘溫無毒。主治 耳聾。參攷資料 多年耳聾。重者用三兩度。初起者一上便效。用驢前脚脛骨打破。向日中曬出髓。以瓷盒盛收。每用綿點少許入耳內。側臥候藥行。其髓不可多用。以白色者爲上。黃色者不堪。普濟方。

【鐵刀】 卽鐵刀之訛。詳【鱈魚】條。

【鱈魚】 命名 本品確有一鱈。故名。古籍別名 姜公魚。針魚。俗名。銅虎魚。臨海志。

外國名詞 Hyporhamphus japonicus (拉丁) サヨリ或ハリラ或サイヨリ或ナガイワシ(日本)

基本 係脊推動物魚類。類鱈魚科之鱈魚。產地 出江海中。

形態 鱈魚爲鱈魚類之一種。其體狹長而略側扁。鱗細小。腹裸出。眼大。下顎延長而尖。如針。占體長七分之一。兩顎有細尖齒。牙。脊鰭近尾。臀鰭與脊鰭對生。青色。淡黑。旁有深黃色之直線紋。腹白。全體長尺餘。常隱居於海灣靜水中。



魚 鱈

一九七三

一種。全體羽色銅赤。混雜黑斑而光澤。雌雄異色。雌者羽色不及雄者之美。背羽黑色。有褐色斑紋。尾較短。雄者面部裸出色赤。背部金黃。肩腰腹各有白斑。尾羽長於體之三倍餘。有黑白及栗茶諸色之橫條紋。體長一尺。覓食穀類昆蟲等物。其肉可供食與藥用。

鵪鶉 山鵪有四種。名同物異。似雉而尾長三四尺者。鵪雉也。似鵪而尾長五六尺。能走且鳴者。鵪雉也。俗通呼為鵪矣。其二即鵪雉錦鵪是也。

性質 甘。平。有小毒。

主治 五臟氣喘不得息。作羹

鵪食之。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論鵪雉肉曰。炙食。補中益氣。

【鵪鶉】即鵪雉之古籍別名。典見食經。詳「鵪雉」條。

【鶩】即鶩之古籍別名。典見綱目。詳「鶩」條。

座地 出安南諸地。

形體 鵪鶉為水禽類之一種。大如孔雀。喙長尺餘。黃白黑色。光瑩如漆。腳長口勾。末如冠。質極堅緻。可作飲器。其糞香如薰陸。可供藥用。

主治 水和塗雜瘡。

【鵪】即鵪之古籍別名。典見綱目。詳「鵪」條。

【鵪】即鵪之古籍別名。典見綱目。詳「鵪」條。

原名 鵪龍。

命名 鵪字象其頭腹足尾之形。

古鑄別名 鵪魚。本經。土龍。網目。諸婆龍。動物學大辭典。

基本 係脊椎動物爬蟲類鵪科之鵪。座地 生江海湖澤中。形體 鵪為鱗類之一種。體長一二丈。有四足。背尾俱有鱗甲。形似鰻魚。惟其後足祇生半蹠。性能橫飛。不能上騰。夜則應更鳴吼。其聲如鼓。故有鵪更鵪鼓之稱。舟人聞之而畏懼。俚人聽之以占雨。其力猛。其穴深。枕骨瑩淨。勝於魚枕。皮可冒鼓。涎沫最毒。其甲可供藥用。

採取 以篋繫繫餌。探入其穴中。候其吞鉤。徐徐引出。取出之。製法 凡使鵪甲。須酥炙或酒炙用。

性質 酸。微溫。有毒。

主治 心腹癰瘕。伏堅積聚。寒熱。女子小腹陰中相引痛。崩中下血五色。及瘡疥死肌。本經。五邪。涕泣。時驚。腰中重痛。小兒氣經。皆潰。別錄。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論鵪甲曰。小腹氣痛及驚恐。唐。甄權藥性本草論鵪甲曰。除血積。婦人帶下。百邪癰腫。唐。陳藏器本草拾遺論鵪甲曰。殺蟲。治癰瘕。瘡。風頑。瘡疥。惡瘡。火燒酒浸服之功。同鵪甲。宋。日華諸家本草論鵪甲曰。療牙齒疳。鵪宜露。明。李時珍本草綱目論鵪甲曰。治陰瘡。

施用宜忌 畏芫花。甘遂。狗膽。蜀漆。為之使。

參攷資料 鵪甲所主諸證。多屬厥陰。其功只在平肝木。治血殺蟲也。千金方治風癩有鵪甲湯。今藥肆多懸之。云能辟蠱。亦殺蟲之意。李時珍。

【鵪肉】性質 甘。有小毒。

主治 少氣。吸吸足不立地。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論鵪肉曰。溼氣邪氣。諸蟲。腹內癰瘕。惡瘡。

參攷資料 鵪肉色似鵪而發冷氣痛疾。蘇頌。梁周興嗣嗜此肉後為鵪所啖。便生惡瘡。此物不食更佳。其涎最毒。陳藏器。鵪肉雖至補益。亦不必食。陶弘景。

【鵪肝】主治 五尸病。用一具。炙熟。同蒜鹽食。

主治 諸風及惡瘡。

【鵪脂】即鵪之古籍別名。典見本經。詳「鵪」條。

【鵪龍】即鵪之原名。詳「鵪」條。

【鵪】即鵪之古籍別名。典見說文。詳「鵪」條。

【鵪】即白芷之古籍別名。典見綱目。詳「白芷」條。

本草拾遺論鼈肉曰熱氣溼痺腹中激熱五味煮食當微泄【唐】孟詵食療本草論鼈肉曰婦人漏下五色羸瘦宜常食之【宋】日華諸家本草論鼈肉曰婦人帶下血瘕腰痛【宋】蘇頌圖經本草論鼈肉曰去血熱補虛久食性冷【元】朱丹溪本草衍義補遺論鼈肉曰補陰【明】李時珍本草綱目論鼈肉曰作臘食治久痢長髭鬚作丸服治虛勞瘵癰脚氣【清】王士雄隨息居飲食譜論鼈肉曰滋肝腎之陰清虛勞之熱主脫肛崩帶瘰癧藏癭以湖池所產背黑而光澤重約斤許者良宜煮羹食之或但飲其汁則益人多食滯脾且鼈之陽聚於上甲久嗜令人患發背孕婦及中虛寒溼內盛時邪未淨者切忌之又忌與蔥同食回回不食鰥鼈謂之無鱗魚凡鼈之三足者赤腹者赤足者獨目者頭足不縮者其目凹陷者腹下有王字卜字文者過大者在山上者有蛇文者並有毒殺人或云薄荷煮鼈亦害人其殼入藥亦不可作丸散服【清】黃宮繡本草求真論鼈肉曰鼈肉

止有雌無雄與蛇與龜爲匹形多變幻故書有言鼈有三足一足者不宜食獨目者不宜食頭足不縮者不宜食目凹陷者不宜食腹下有王字卜字文蛇文者不宜食生於山上者名旱鼈不宜食腹赤如血者名硃鼈不宜食此有毒殺人不宜食鼈之說也又言鼈合鷄子萵菜食則令人生鼈同猪兔鴨食則能損人同芥子食則生惡瘡與妊婦食則生子項短同薄荷食則能殺人此合他味同食之有見害於人也至於冷瘡食之則能發冷水病須合葱與椒薑同煮並到鼈甲少許以入可知鼈性冷故須假以椒薑以爲之制鼈肉聚故須假以鼈甲之散以爲之佐耳惟婦人素挾血熱症見血痕血漏並瘡痢諸症服之得宜若使中氣有虧謂可補中益氣縱出別錄亦屬膚語不足信也

參攷資料 禮記食鼈去醢

謂頸下有頸骨如龜形者也食之令人患水病凡鼈之三足者赤足者獨目者頭足不縮者其目凹陷者腹下有王字卜字文者腹有蛇

文者是蛇化也在山上者名旱鼈並有毒殺人不可食【陳藏器】

鼈肉不可合鷄子食萵菜食昔有人到鼈以赤蔥同包置溼地經旬皆成生鼈又有裹鼈甲屑經五月皆成鼈者【陶弘景】

鼈肉不可合猪兔鴨肉食損人不可合芥子食生惡瘡【孫思邈】

案三元參贊書言鼈性冷發水病有冷勞氣瘵癭人不宜食之生生編言鼈性熱戴原禮言鼈之陽聚於上甲久食令人生發背似與冷性之說相反蓋鼈性本不熱食之者和以椒薑熱物太多失其本性耳鼈性畏葱及桑灰凡食鼈者宜取沙河小鼈斬頭去血以桑灰湯煮熟去骨

甲換水再煮入葱醬作羹膳食乃良其膳味辣破入湯中可代椒而辟腥氣李九華云鼈肉主聚鼈甲主散食鼈到甲少許入之庶幾稍平又言薄荷煮鼈能害人此皆人之所不知者也【李時珍】

【鼈血柴胡】即柴胡用鼈血拌成者之處方用名詳柴胡條
主治 鹽藏煨食止小兒下痢

【鼈津甲】即鼈甲之古籍別名典見和漢藥考詳鼈甲條

【鼈珠】即真珠之古籍別名典見和漢藥考詳真珠條

【鼈兒提】即獲莖之古籍別名典見和漢藥考詳莖條

【鼈脂】 主治 白髮拔去之塗孔中

【鼈頭】 主治 陰乾燒灰療小下墜戶疰心腹痛

歷代記述攷證 【宋】日華諸家本草論鼈頭曰傳歷年脫肛不愈

【鼈頭血】 主治 脫肛年久不愈

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論鼈頭血曰鼈頭血治風中血脈口眼喎僻及小兒疳勞潮熱
參攷資料 按千金方云目瞶唇動口喎皆風入血脈急以小續命湯服之外用鼈血或雞冠血調伏龍肝散塗之乾則再上甚妙蓋鼈血之性急縮走血故治口喎脫肛之病【李時珍】

① 治血癰癰癰。用鼈甲、琥珀、大黃等分作散。酒服二錢。少時惡血即下。若婦人小腸中血下盡即休服也。(甄權方)

② 治疔瘡癰癰。用鼈甲醋炙黃研末。牛乳一合。每調一匙。朝朝服之。(甄權方)

③ 治婦人漏下。鼈甲醋炙研末。清酒服方寸匕。日二。又用乾薑、鼈甲、訶梨勒皮等分爲末。糊丸。空心下三十丸。日再。(甄權方)

④ 治婦人難產。鼈甲燒存性。研末。酒服方寸匕。立出。(梅師方)

⑤ 治勞復食復。驚病初起。受勞傷食致復欲死者。鼈甲燒研。水服方寸匕。肘後方)

⑥ 治小兒痼疾。用鼈甲炙研乳服一錢。日二。亦可蜜丸服。(子母祕錄方)

⑦ 治卒得腰痛。不可俛仰。用鼈甲炙研末。酒服方寸匕。日二。(肘後方)

⑧ 治沙石淋痛。用九肋鼈甲醋炙研末。酒服方寸匕。日三。服石出瘥。(肘後方)

● 治陰虛夢泄。九肋鼈甲燒研。

每用一字。以酒半盞。童尿半盞。煮白七寸。同煎去殼。日晡時服之。出臭汗爲度。(醫聖元戎方)

⑨ 治吐血不阻。鼈甲、蛤粉各一兩。同炒色黃。熱地黃一兩半。曬乾爲末。每服二錢。食後茶下。(聖濟總錄方)

⑩ 治瘰癧煩喘。小便不利。用鼈甲二兩。燈心一把。水一升半。煎六合。分二服。凡患大小便有血者。中壞也。黑脈無膜者。十死不治。(龍安時傷寒論方)

⑪ 治癰疽不斂。不拘發散一切瘡。用鼈甲燒存性。研搽甚妙。(李樓怪症奇方)

⑫ 治腸癰肉痛。鼈甲燒存性。研水服一錢。日三。(傳信方)

⑬ 治陰頭生瘡。人不能治者。鼈甲一枚。燒研。鷄子白和傅。(千金方)

⑭ 治瘡唇緊裂。用鼈甲及頭燒研傅之。(類要方)

⑮ 治人咬指爛。久欲脫者。鼈甲燒灰傅之。(葉氏摘玄方)

⑯ 用鼈甲三錢至四錢。施用宜忌。凡陰虛而無熱。以

及脾弱而泄瀉。禁用。能墮胎。孕婦亦忌。惡藥石。並不可與鷄子鴨肉。莧菜。猪兔。同食。食之損人。

著名方劑 鼈甲煎丸。治瘰癧。邪結爲癰。名曰瘰癧母。(金匱方) 鼈甲十二分。柴胡六分。黃芩三分。人參一分。半夏一分。桂枝三分。芍藥五分。阿膠三分。乾薑三分。大黃三分。厚樸三分。牽牛一分。石葶三分。瞿麥二分。赤硝十二分。桃仁二分。丹皮三分。烏扇五分。紫葢三分。蜚蠊六分。鼠婦三分。蜂窠四分。蟬蟲五分。爲末。煨鼈下灰一斗。清酒一斛五斗。浸灰。候酒盡。一半入鼈甲煎化。取汁入諸藥中。煎爲丸。梧桐子大。空心服七丸。日進三服。

參攷資料 ① 鼈。水居陸生。脊連脇。其甲四圍有肉裙。故曰鼈肉。裏甲無耳。以目爲聽。純雌無雄。與蛇及鼈爲匹。夏日生卵於涯。渡河隔水望之。卵自孚化而出。性畏隙光。暴之日中無恙。置隙光之下。輒死。又畏蚊。嚼之經夕則死。(李時珍) ② 鼈。蠕動之物。入肝經至陰之分。既能養陰。又能入絡搜邪。(吳鞠通) ③ 金匱鼈甲煎丸。治病

瘰癧一月不差。結爲癰癰者。以鼈甲行厥陰而消癰癰也。升麻鼈甲湯。治陽毒陰毒者。以鼈甲排膿。膿而行血癰也。(黃元御) ④ 經中不言治勞。惟藥性論言治勞瘵骨熱。故虛勞多用之。然甚有據。但不可過劑耳。(寇宗奭) ⑤ 鼈甲蟲也。與龜同類。四緣有肉裙。故曰龜甲。裏肉鼈肉。裏甲無耳。以目爲聽。純雌無雄。與蛇及鼈爲匹。故萬華術云。燒鼈脂。可以致鼈也。夏日孚乳。其抱以影。俾雅云。卵生思抱。其狀隨日影而轉。在水中上必有浮沫。名曰鼈津。人以此取之。今有呼鼈者。作聲撫掌。望津而取。百十不失。管子云。涸水之精。名曰蟬。以名呼之。可取魚鼈。正此類也。類從云。鼈一鳴而鼈伏。性相制也。又畏蚊。生龜遇蚊叮則死。死鼈得蚊煮而爛。所以熏蚊者。復用鼈甲物。相報復如此。異哉。淮南子云。膏之殺鼈。類之不可推也。(李時珍)

【鼈肉】 性質 甘平。無毒。主治 傷中益氣。補不足。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器

梁中邪入陰分。故出併於陽而熱甚。入併於陰而寒甚。元氣虛羸。則邪陷而中焦不治。甚則結爲瘕母。甲能益陰除熱而消散。故爲治瘕之要藥。亦是退勞熱在骨及陰虛往來寒熱之上品。血癢腰痛。小兒脇下墜。皆陰分血病。宜其悉主之矣。勞復女勞復。爲必須之藥。勞瘵骨蒸。非此不除。產後陰脫。資之尤急。清黃宮繡本草求真論龍甲曰。龍甲味鹹氣平色青。青雖載屬補肝。與龜載屬補腎。各別。然究皆屬除熱削肝之品。非真滋肝藥也。凡厥陰血分積熱。而見勞嗽骨蒸。寒熱往來。溫瘧瘕母。及腰腹脇堅。血癢痔核。經阻產難。瘍癰瘡腫。癰疽疔等症。服無鹹平。能以消除。若肝虛無熱。切忌龍甲。以七肋九肋者佳。以其得陽之數耳。其用必取乎肋。以助屬肝故耳。但食品中惟龍叵洩。如三足兩頭。並項強腹。赤皆有大毒。能以殺入。不可不慎也。【清】楊時泰本草述鉤元論龍甲曰。龍甲益陰。丹溪更云補氣。夫氣有陽氣陰氣之殊。其說本於內經。經曰陰虛則無氣。無氣則死。蓋惟

是眞陰之氣。有化乃有生。有生即有化。故本經首主癰瘕堅積。而別錄甄權曰。華子並以溫瘧血癢宿食冷塊。瘕瘕結爲言也。丹溪揭出補陰補氣而言。可謂探其要矣。本經不言治勞。然虛勞多用之。蓋勞雖五臟皆有。而心腎爲多。心主血。腎主精。精竭血燥。則勞生焉。所以清骨扶羸之除蒸熱必用。而麥煎散又以治少男室女骨蒸黃瘦。口臭盜汗。七情爲病也。又虛勞發熱。未有不由瘀血者。瘀血未有不內傷者。凡心下引脇俱痛。皆滯血不消。新血無以養。故麥煎散中用龍甲。并同於乾漆以化積者。由茲味能以通滯爲滋補也。龍甲之治瘕。尤專於瘕母。瘕母即邪之結爲瘕瘕者。可見諸本草無不以血之專。即化以爲生矣。其次更治脚氣。脚氣之起。惟是陰不升而陽不降耳。足爲三陰所起之地。即三陰所歸之地。陰爲陽之原。如三陰不足。不能上而召陽之歸。則三陽失守。不能下而和陰之滯。故陰壅於下。陽逆於上。脚氣所由病也。陰

不足而不能升。致陽失守而不能降。故大龍甲湯。以龍甲之補陰者爲君。又龍甲散。木香散。皆治脚氣。心腹脹滿。一則并治小便不利。一則云治堅硬不消。夫心腹脹滿。非陰不升。以致陽不降乎。小便不利。非陽不得陰以歸而達於下乎。堅硬不消。非陰不得陽以化而暢於上乎。二證皆用龍甲。以和陰陽之升降。則其專精於陰氣可知矣。至於積聚之治。靈樞言喜怒不節。則傷臟。臟傷則陰虛。虛則風雨襲之。病起於上而生積。清溼襲之。病起於下而生積。此積所由生之要領也。方書治肝積肥氣。龍甲丸。心積伏梁。乾漆丸。及半夏散。脾積痞氣。又龍甲丸。統以龍甲爲之。君則積之本於陰虛而生者。固不能舍專於陰氣之味。以奏效也。又次而治嗽血。黃芪龍甲散。人參黃芪散。盜汗。麥煎散。青蒿散。凡虛勞之有客熱者。再如男子遺精。女子漏下。皆用龍甲療之。卻又以行瘀血。總由此味專補陰氣。如漏則陰氣虛。而不能固也。瘀亦陰氣虛。而不能流貫於經絡也。但就

女子經血一證。以推所治。即可知其要以盡其變矣。

配合應用 ①治久瘕。用龍甲、牛膝、當歸佐以橘皮。何首烏。知母、麥門冬。

②治溫瘧。熱甚渴甚。用龍甲、知母、石膏、麥門冬、貝母、竹葉。無肺熱病者。加人參。若瘕發熱甚渴甚。又寒甚汗多。發時指甲黯。狀若欲死。并加桂枝。有神去桂枝。治瘕瘕良。

③治骨蒸勞熱。用龍甲、青蒿、麥門冬、五味子、地黃、枸杞、牛膝。甚則加銀柴胡、地骨皮、胡黃連。

④內主傷中益氣。補不足。腹中結熱。婦人漏下。陰虛羸瘦。性冷補一切陰虛人宜常食之。

⑤治老瘕勞瘕。用龍甲、醋炙研末。酒服方寸匕。隔夜一服。清早一服。臨時一服。不顯者。入雄黃少許更佳。〔肘後方〕

⑥治奔豚氣痛。上沖心腹。龍甲醋炙三兩。京三稜煨二兩。桃仁去皮尖。四兩。湯浸研汁三升。煎二升。入末煎良久。下醋一升。煎如餲。以餅收之。每空心酒服半匙。〔聖濟方〕

鱗屬之一種。長尺餘。飼以海鹽。則每鱗中流出鹽質。可供藥用。

主治 輿陽事。每以鱗中鹽質溫酒服。

【鹽膽水】 基本 本品即煮鹽初熟時槽中瀝下之黑水也。

古籍別名 鹽鹵。(俗名)

性質 鹹苦。大毒。

主治 痰厥不省。

用法 灌之即吐。

【鹽藕節】 命名 本品即取新鮮藕節烘乾。用鹽醃過者。故名。

主治 喉痛。嚼汁嚥之。陰虛喉痛更佳。

【鹽藥】 產地 生山谷間。

形態 鹽藥爲鹵石類之一種。形似芒硝未入口極冷。可供藥用。

性質 鹹冷。無毒。

主治 眼赤。皆爛風赤。細研。水和點之。又水研服。去熱煩痰滿頭痛。明目。鎮心。又主蛇蝎惡蟲毒。藥箭鐵毒。疥癬癰腫。瘰癧。並摩傳之。甚者水化服之。又解獨自草箭毒。

【鹽蟹汁】 基本 本品即以鹽醃蟹之鹵汁。

主治 喉風重痛。滿含細嚥即消。

【鹽龜草】 即馬先蒿之日本名。詳『馬先蒿』條。

【鹽蘿蔔】 即馬先蒿之日本名。詳『馬先蒿』條。

【龍爪】 命名 龍行蹇蹇。故名。

【龍甲】 處方用名 淡龍甲。生龍甲。炙龍甲。

古籍別名 團魚。(俗名)神守。河伯從事。(古今注)上甲。孚乳甲。黑龍衣。龍津甲。(和漢藥考)守神。(淮南子)

基本 係屬龜鱉類爲龍之甲。

產地 陳仁山藥物生產辨云。以產暹羅。大隻厚甲爲正。近日各熱藥店所用小隻薄甲。乃水魚殼也。中國各省均有。以長江揚子江一帶爲多出。功力不及厚甲之佳。此乃利其質薄易炒。慳柴火耳。龍屬一種水魚另屬一種。不可不知。

形態 龍體類龜。水居陸生。大者六七寸。小者四五寸。但頭尾四肢。俱不能縮藏甲中。尾短而頭頸長。鼻類象鼻。性喜堅嚼他物。頗不易脫。其脊甲帶褐黑色。多小鱗。祇中央部分硬。邊緣軟。作肉裙。俗稱龍裙。

製法 蘇頌曰。今處處有之。以岳州沅江所出甲有九肋者爲勝。入藥以醋炙黃。用陶弘景曰。採得生取甲。剔去肉者爲好。凡有連厥及乾癯者便真。若肋骨出者是。炙熱不可用。雷斅曰。凡使要綠色。九肋多裙。重七兩者爲上。用六一泥固瓶子底。待乾。安甲於中。以物撐起。若治癰塊。定心藥。用頭醋入瓶內。大火煎盡三升。乃去裙肋骨。炙乾入用。若治勞去熱藥。不用醋。用童子小便煎盡一斗二升。乃去裙留骨。石臼搗粉。以雞腥皮裹之。取東流水三升。盆盛。開於盆上一宿。取用力有萬倍也。李時珍曰。按衛生寶鑑云。凡龍甲以煨燼灰一斗。酒五升。浸一夜。黃令爛。如膠漆用。更佳。桑葉灰尤妙。

性質 鹹平。無毒。

效能 補陰氣。潛肝陽。消癰癥。

除寒熱。用於女子血病及勞瘵等。

主治 心腹癰瘕。堅積寒熱。去瘡疾。息肉。陰蝕。痔核惡肉。(本經)療溫瘧。血瘕。腰痛。小兒腦下堅。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論龍甲曰。宿食癰塊。痼癖冷癰。勞瘵。除骨熱。骨節間勞熱。結實壅塞。下氣。婦人漏下五色。下瘀血。【宋】日華諸家本草論龍甲曰。去血氣。破癥結。惡血。墮胎。消瘡腫。腸癰。并撲損瘀血。【元】朱丹溪本草衍義補遺論龍甲曰。補陰。補氣。

【元】寇宗奭本草衍義論龍甲曰。治勞瘵。除骨熱。極佳。【明】李時珍本草綱目論龍甲曰。除老瘡。癰母。陰毒。腹痛。勞復食復。斑痘。煩喘。小兒驚風。婦人經脈不通。難產。產後陰脫。丈夫陰瘡。石淋。欬潰。【明】繆希雍本草經疏論龍甲曰。龍甲味鹹平。無毒。潤下。作鹹。甲主消散者。以其味兼乎平。平亦辛也。鹹能癭堅。辛能走散。故本經主癭瘕。堅積。寒熱。去瘡疾。息肉。陰蝕。痔核。惡肉。別錄錄溫瘧者。以瘧必暑邪爲病。類多陰虛。水衰之人。乃爲暑所

【鹽豆豉】即鹽豉之原名。詳「鹽豉」條。

【鹽枕】即寒水石之古籍別名。典見綱目。詳「寒水石」條。

【鹽根】即寒水石之古籍別名。典見綱目。詳「寒水石」條。

【鹽笋乾】基本 本品即春笋和鹽湯煮曬而成者。古籍別名 泥黃烏尖。直脚（綱目拾遺）。

性質 鹹。甘平。無毒。主治 行氣消痰。

【鹽消】即鹽硝。詳「朴硝」條。

【鹽梅子】即鹽麩子之古籍別名。典見綱目。詳「鹽麩子」條。

【鹽棗子】即鹽麩子之古籍別名。典見綱目。詳「鹽麩子」條。

【鹽萎子】即胡萎之古籍別名。典見和漢藥考。詳「胡萎」條。

原名 鹽豆豉。

【鹽豉】製法 用大豆水浸三日。淘蒸攤曬。候生黃。取出。鍍淨。水淘。瀝乾。加鹽。薑絲。椒。橘。蘇。茴。杏仁。拌勻。入甕。上面水浸。以箬蓋封口。曬一月乃成。

主治 功同蒲州豆豉。詳見該

目拾遺）五構。鹽膚子。鹽梅子。鹽

條。

【鹽鹵】即鹽膽水之俗名。詳「鹽膽水」條。

【鹽湯】即食鹽溶於沸水中者之處方用名。詳「食鹽」條。

【鹽硝】即朴硝之古籍別名。典見綱目。詳「朴硝」條。

【鹽梅】即鹽鹵。詳「鹽膽水」條。

【鹽精石】即寒水石之古籍別名。典見綱目。詳「寒水石」條。

【鹽絲】即絲鹽之古籍別名。典見綱目。詳「絲鹽」條。

【鹽膚子】即鹽麩子之古籍別名。典見綱目。詳「鹽麩子」條。

【鹽蓬】產地 出河北海濱鹽地有之。

形態 鹽蓬為雜草類之一種。其葉似蒿而圓長。至秋時葉俱紅色。採之燒灰淋湯煎鹽勝於海水煮者。可供藥用。

性質 鹹。涼。無毒。

主治 清熱消積。

【鹽麩子】命名 本品味酸鹹。故名。

古籍別名 叛奴鹽。酸桶。（綱目拾遺）五構。鹽膚子。鹽梅子。鹽

棗子（綱目）木鹽。（通志）天鹽。

（靈草篇）酢桶。（本草拾遺）外國名詞 Rhus semi-alata, Muir, var. osbeckii, DC. (拉丁) ヌルデ（日本）

基本 係漆樹科漆樹屬。為鹽

木之子實。

產地 生山野間。

形態 鹽麩為喬木類之落葉木。本高二丈餘。葉為奇數羽狀複葉。長尺餘。有鋸齒。面青背白。小葉長卵形。繖葉柄在小葉間有翼。其葉之面背有瘤狀之蟲巢。色赤褐。即五倍子。夏月梢頭開花。作圓錐花序。花小。綠白。七月結小核果。密生紫色或白色之短毛。熟則外附白色粉質。中有子。可供藥用。

參攷資料 按本草集譜云。鹽

麩子根。能輭難骨。岑公云。有人被雞骨哽。項腫可畏。用此根煎醋吸至三碗。便吐出也。又彭醫官治骨哽。以此根搗爛入鹽少許。綿裹。以線繫定。吞之。牽引上下。亦釣出骨也。（李時珍）

參攷資料 按本草集譜云。鹽

麩子根。能輭難骨。岑公云。有人被雞骨哽。項腫可畏。用此根煎醋吸至三碗。便吐出也。又彭醫官治骨哽。以此根搗爛入鹽少許。綿裹。以線繫定。吞之。牽引上下。亦釣出骨也。（李時珍）

參攷資料 按本草集譜云。鹽

麩子根。能輭難骨。岑公云。有人被雞骨哽。項腫可畏。用此根煎醋吸至三碗。便吐出也。又彭醫官治骨哽。以此根搗爛入鹽少許。綿裹。以線繫定。吞之。牽引上下。亦釣出骨也。（李時珍）

參攷資料 按本草集譜云。鹽

麩子根。能輭難骨。岑公云。有人被雞骨哽。項腫可畏。用此根煎醋吸至三碗。便吐出也。又彭醫官治骨哽。以此根搗爛入鹽少許。綿裹。以線繫定。吞之。牽引上下。亦釣出骨也。（李時珍）



子 鉄 鹽

上白屑。搗末服之。

歷代記述攷證 【明】李時珍 本草綱目論鹽麩子曰。生津降火。化痰潤肺。滋腎消滯。止痢收汗。治風溼眼病。

參攷資料 鹽麩子之核外薄皮上有薄鹽。謂之鹽霜。可制汞硫。

（綱目）

【鹽麩樹白皮】主治 破血 止血。療毒血。

痢。殺蟲。並煎服之。

【鹽麩樹根白皮】主治 酒 瘡。搗碎米 泔浸一宿。平日空腹溫服一二升。

歷代記述攷證 【明】李時珍 本草綱目論鹽麩樹根皮曰。諸骨 鯁。以醋煎濃汁時啣之。

參攷資料 按本草集譜云。鹽

麩子根。能輭難骨。岑公云。有人被雞骨哽。項腫可畏。用此根煎醋吸至三碗。便吐出也。又彭醫官治骨哽。以此根搗爛入鹽少許。綿裹。以線繫定。吞之。牽引上下。亦釣出骨也。（李時珍）

參攷資料 按本草集譜云。鹽

麩子根。能輭難骨。岑公云。有人被雞骨哽。項腫可畏。用此根煎醋吸至三碗。便吐出也。又彭醫官治骨哽。以此根搗爛入鹽少許。綿裹。以線繫定。吞之。牽引上下。亦釣出骨也。（李時珍）

參攷資料 按本草集譜云。鹽

麩子根。能輭難骨。岑公云。有人被雞骨哽。項腫可畏。用此根煎醋吸至三碗。便吐出也。又彭醫官治骨哽。以此根搗爛入鹽少許。綿裹。以線繫定。吞之。牽引上下。亦釣出骨也。（李時珍）

一葉貼上。外以消毒膏護之。二三日疔脫。(聖濟總錄方)

③治風牙疼痛。獼猴頭草。入鹽少許於掌心揉擦即止。(集玄方)

用鹽 錢半至三錢
施用宜忌 凡陰虛無熱。胃寒便瀉者禁用。

參攷資料 ④鵞腸生下溼地。所在坑渠間多有苗似旋覆。二月八月採陰乾。(蘇恭) ⑤處處有之。南方尤多。此有二種。一種葉似柳而光澤。莖似馬齒莧。高一二尺。開花細而白。其實若小蓮房。蘇恭謂似旋覆者是也。一種苗梗枯瘦。頗似蓮花而黃色。實亦作房而圓。南人謂之連翹者。二種折其苗。皆有汁出。須臾而黑。俗謂之早蓮子。亦謂之金陵草。(蘇頌) ⑥早蓮有二種。一種苗似旋覆而花白細者是鵞腸。一種花黃紫而結房如蓮房者。仍是小連翹也。爐火家亦用之。(李時珍) ⑦鵞腸性冷陰寒之質。雖善涼血。不益脾胃。病人雖有血熱。一見脾胃虛敗。飲食難消。及易滯。薄作泄者。勿輕與服。孫真人方用薑汁和爛。蓋防其冷而不利於

腸胃故也。不用薑汁。椒紅相兼修事服之者。必腹痛作泄。宜詳審之。(經希雍)

【鵞腸草】即鵞腸之處方用名。詳【鵞腸】條

【鷹】 原名 蒼鷹。
以鷹擊故名。本品簡稱爲鷹。鷹以鷹擊故名。鷹以鷹擊故名。鷹以鷹擊故名。

古籍別名 角鷹。鷲鳩。(綱目)
外國名詞 Astur palumbarius Linnaeus Commongos-hawk (拉丁) Eagle (英) タ力或オホク力(日本)

基本 係屬脊椎動物鳥類猛禽類鷹科。
產地 深山林野間多有之。

形態 鷹爲林禽類之一種。頭扁。上嘴鉤曲。下嘴小。尖端呈截斷狀。眼周視力頗強。頭頂黑色。頭後具白色與褐色之雜斑。全體上暗褐色。下面白色。羽軸暗褐。有淡褐條紋。腰被毛。跗蹠黃色。趾皆具鉤爪。羽翅有黑褐與灰色橫紋。互相排列。盤翔天空。捕食小類生物。其肉可供藥用。

主治 食之療野狐邪魅。

【鷹毛】 主治 斷酒。以水煮汁飲。

【鷹吐毛】 基本 鷹食鳥雀。連毛食之。肉消而毛不消。聚成一團。次早吐出。如大茱實。

主治 反胃噎膈。腹末服。
【鷹目】即石硫黃之日籍別名。典見和漢藥考。詳【石硫黃】條。

【鷹屎白】 性質 微寒。有小毒。
主治 傷挫減痕。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論鷹屎白曰。燒灰酒服治中惡。【唐】蘇恭新修本草論鷹屎白曰。燒灰酒服方寸匕。主邪惡。勿令本人知。【明】李時珍本草綱目論鷹屎白曰。消虛積殺勞蟲。去面皰。野雞。

參攷資料 單用不能滅癰。須合殭蠶衣魚之屬爲膏效。(陶弘景)

【鷹骨】 主治 傷損接骨。燒灰。每服二錢。酒服。隨病上下。食前食後。

【鷹睛】 主治 和乳汁研之。日三注眼中。三日見碧霄中物。忌烟薰。

【鷹嘴及爪】 主治 五痔。狐魅。燒灰水服。

【鷹嘴香】即特迦香之古籍別名。典見綱目拾遺。詳【特迦香】條。

【鷹頭】 主治 五痔。燒灰飲服。
歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論鷹頭曰。治痔瘻。燒灰入麝香少許。酥酒服之。治頭風眩暈。一枚。燒灰酒服。

【鷲】即鷲鷹之原名。詳【鷲鷹】條。
【鷲鷲】即鷲鷲之別名。典見動物學大辭典。詳【鷲鷲】條。

【鷲鷲草】即忍冬藤之古籍別名。典見和漢藥考。詳【忍冬藤】條。

【鷲鷲】 原名 鷲。
命名 禽經云。鷲飛則霜。鷲飛則露。故名。

古籍別名 絲禽。雪客。春鷲。白鳥。(綱目) 白鷲。鷲鷲。一曰鷲。(動物學大辭典)

基本 係屬脊椎動物鳥類涉禽類鷲科。
形態 鷲鷲爲水禽類之一種。嘴長色黑。有直溝紋而端尖。頸細長。全體白色。夏月頭後垂有數枚細長之白冠毛。純純如絲。背有白

細長之白冠毛。純純如絲。背有白

以此等陰藥專治其標。須與補中健脾之劑相輔成功。乃爲萬全無弊之策。若止知爲熱。徒事寒涼。則虛火未必安潛。而脾胃之陽先敗。必有過中泄瀉不食之虞。且虛火縱以逆折得息。而反爲純陰無陽之候。又將何以善其後耶。唐本草謂氣味甘酸而平。主血利。又鍼灸瘡發血不可止者。傳之立止。汁塗眉髮生速而繁。日華謂通小腸。治瘡毒。瀕湖謂烏髭髮益腎陰。天一日李時珍云。旱蓮有兩種。一是鱧腸。一名小連翹。今市上亦有兩種。一名黑旱蓮。一名紅旱蓮。黑旱蓮者。莖葉皆有毛。枝柔委地。葉對生如柳葉。斷之有黑汁。花白如小菊。實似覆盆。是鱧腸也。紅旱蓮莖葉皆紅。無毛。幹硬挺立。葉似蓼葉。實房如石蓮子。破之中亦分。似芝麻房。然而無裂紋。亦符李時珍所謂小連翹也。本草旱蓮止一切血。烏髭髮益腎陰。兼治瘡瘍腫毒。鱧腸色黑。氣腐。質弱味鹹。止一切血而滋腎陰者。當取鱧腸也。瘡瘍爲淫熱釀成。小翹色赤。氣芳。實似心房。入營分而清瘀熱。治瘡

瘍者。當取小翹也。古方二至丸註云。夏至採旱蓮。冬至採女貞。按夏至時。小翹始成熟。鱧腸尙嫩。當時也。嫩莖氣味不全。所云夏至採旱蓮者。似指小翹言也。愚以二至丸爲滋補肝腎之藥。理當取鱧腸。其謂二至者。至到也。女貞至肝陰。旱蓮至腎陰。言兩物能益肝腎也。非夏至冬至採藥時之謂也。傷寒論瘧熱發黃有麻黃連翹赤小豆湯方。方解云。連翹卽連翹根。非也。而李時珍宗之。連翹條云。根名連翹。下註仲景二字。不知方解者。後人解仲景之方。非仲景自解其方也。不得云仲景謂連翹卽連翹根也。爾雅連翹。一名連君。君與輶通。詩云。君之華。芸其黃矣。註云。陵君生下溼地。疑卽翹也。蓋君輶翹音同而義通。本草多出異名。異出同名。致後人之滋惑者亦多矣。如大翹小翹。同出而異名。鱧腸小翹異出而同名是也。本經又有翹根。陶弘景云。方藥不用。人無識者是矣。好古云。卽連翹根。臆斷也。而又以爲連翹者益非矣。

配合應用 ①金陵煎益髭髮。

變白爲黑。金陵草一秤。六月以後收採。揀青嫩無泥土者。不用洗。摘去黃葉。爛搗。新布絞取汁。以紗絹濾過。入通油器鉢盛之。日中煎五日。又取生薑一斤。絞汁。白蜜一斤。合和。日中煎。以柳木筥攪。勿停手。待如稀餡。藥乃成矣。每日及午後各服一匙。以溫酒一盞化下。如欲作丸。日中再煎。令可丸。大如梧子。每服三十九丸。及時多合爲佳。其效甚速。千金方。

②烏鬚固齒。七月取旱蓮草連根一斤。用無灰酒洗淨。青鹽四兩。淹三宿。同汁入油鍋中炒存性。研末。日用擦牙。連津嚥之。又法。旱蓮取汁。同鹽煉乾。研末擦牙。攝生妙用方。旱蓮散。烏鬚固牙。溫尉云。納合相公用此方。年七十鬚髮不白。懇求始得。後遇張經。始傳分兩也。旱蓮草一兩半。麻姑餅三兩。升麻。青鹽各三兩半。訶子連核二十個。皂角三挺。晚蠶沙二兩。爲末。薄醋熬糊丸。彈子大。曬乾。入泥瓶。中火烘令烟出。存性。取出。研末。日用揩牙。奉親養老書方。

③治偏正頭痛。鱧腸草汁滴鼻。

中。聖濟總錄方。④治一切眼疾。腎臟虛障。涼腦。治頭痛。能生髮。五月五日平旦。合之蓮子草一握。藍葉一握。油一斤。同浸。密封四十九日。每臥時以鐵匙點藥。壓頂上四十九遍。久久甚佳。聖濟總錄方。

⑤腎腎截瘰。旱蓮草搗爛。男左女右。置寸口上。以古文錢壓定。帛繫住良久。起小泡。謂之天灸。其瘰卽止。甚效。王執中資生經方。

⑥治小便血溺。金陵草一名墨頭草。車前草各等分。杵取自然汁。每空心服三盃。愈乃止。醫學真傳方。

⑦治腸風膿毒。下血不止。旱蓮子草瓦上焙研末。每服二錢。米飲下。家藏經驗方。

⑧治痔漏瘡。旱蓮草一把。連根鬚洗淨。用石臼搗如泥。以極熱酒一盞衝入。取汁飲之。痔傳患處重者。不過三服卽安。太僕少卿王鳴鳳患此。杖方能移步。服之得瘰。累治有驗。劉松石保壽堂方。

⑨治疔瘡惡腫。五月五日收旱蓮草。陰乾。仍露一夜。收。遇疾時嚼

鱧蛇。有舌。有齒。有肚。背腹有幾連尾。無歧。形狀可憎。氣腥惡。食品所卑。南人有珍之者。北人尤絕之。道家指為水厭。齋籙所忌。(李時珍)

【鱧魚肉】即鱧魚之處方用名。詳

【鱧魚】條。

【鱧魚腸及肝】

主治 以五味炙香。貼痔瘻及蛙肝瘡。引蟲盡為度。

【鱧魚膽】

採取 臘月收取陰乾。用。

性質 甘平。

主治 喉痺將死者。點入少許。即差。病深者水調灌之。

參攷資料 諸魚膽味苦。惟鱧魚膽味甘。可食為異也。(日華)

【鱧魚膽】即鱧魚之處方用名。詳

【鱧魚】條。

【鱧腸】

命名 鱧魚頭也。其腸亦為本品。柔莖。斷之有黑汁。如鱧之腸。然故名。

處方用名 鱧腸草。旱蓮草。墨

旱蓮。

古籍別名 蓮子草。(唐本)金

陵草。(圖經)獼猴頭。(必用)墨煙

草。黑頭草。墨菜。豬牙草。綱目)

外國名詞 Eclipta alba,

Isabel. (拉丁) マカサブラウ

(日本)

基本 係菊科鱧腸屬之鱧腸

草。

產地 凡道旁田畦及水隈溼

地間恒有出。

形態 鱧腸為澤草類之一年

生草本。莖高一二尺。枝自葉腋對

生。更分小枝。葉對生。質稍厚。披針

狀。有鋸齒。葉面粗糙。生毛。茸。八九

月間自小枝開小頭狀花。花小。色

白。外圍之花。作舌狀花冠。中部之

花。作筒狀花冠。其果實成熟。即呈

黑色。實形如蓮房。斷之有汁。須臾

亦呈黑色。其莖葉等可供藥用。



鱧 腸

採取 二月八月間採之。

製法 凡採得陰乾用。

性質 甘酸平。無毒。

效能 補腎陰。烏鬚髮。用作緩

和滋養藥。又為止血藥。

主治 血痢。鍼灸瘡。發洪血。不

可止者。傳之立已。汗塗眉髮。生速

而繁。

歷代記述疏證 【唐】蕭炳四

聲本草論鱧腸曰。膏點鼻中。添腦

【宋】大明諸家本草論鱧腸曰。止

血排膿。通小腸。傳一切瘡。并蠱癘

【明】李時珍本草綱目論鱧腸曰。

烏鬚髮。益腎陰。【明】繆希雍本草

經疏論鱧腸曰。鱧腸其汁玄黑。其

味甘酸。平而無毒。純陰之草也。入

腎入肝。亦入胃與大小腸。善涼血。

鬚髮白者。血熱也。齒不固者。腎虛

有熱也。涼血益血。則鬚髮變黑。而

齒亦因之而固矣。故古今變白之

草。當以茲為勝。本經主血痢及鍼

灸瘡。發洪血。不可止者。傳之立已。

塗眉髮。生速而繁。蕭炳又謂能止

血排膿。通小腸。傳一切瘡。膏點鼻

中。添腦者。蓋以血痢由於血分。為

溼熱所傷。鍼灸瘡。發洪血。不止。亦

緣病人素有血熱。及加艾火。則益

熾矣。血涼則不出。營。血熱壅則生

膿。涼血則自散。小腸屬丙火。有熱

腦為髓之海。熱則消。火能消物。故

也。鼻竅通氣於腦。故以膏點鼻中。

使腦中熱散。無邪剋他。則腦自益

矣。之數者。何非涼血益血之功也。

【清】黃宮繡本草求真論鱧腸曰。

旱蓮草。即書所云鱧腸草。金陵草

者是也。味甘而酸性平。色黑。功尚

入肝入腎。為止血涼血要劑。是以

血痢煎膏用之。其血即止。鬚白汁

塗。變白為黑。火瘡發紅。其紅即退。

齒牙動搖。擦之即固。合冬青子。名

二至丸。以補肝腎。但性陰寒。雖善

涼血。不益脾胃。若不同以薑汁。椒

紅相兼。修服者。必腹痛作瀉。苗如

旋。習。實。似蓮房。斷之有汁。須臾而

黑。熬膏良。

近人學說 ●張山雷曰。鱧腸

草折其莖汁出。須臾而黑。故以鱧

腸為名。言如鱧魚之腸也。產於下

溼地。結實如小蓮房。因有旱蓮之

名。古謂之金陵草。亦稱墨菜。汁黑

而黏。故入腎補陰而生長毛髮。又

能入血。為涼血止血之品。又消熱

病癰腫。但黑色之藥。純陰用事。非

陽盛之體。不應多用。脾虛泄瀉尤

忌。凡勞怯諸症。虛火旺者。不可

adoi Higd 或 A. Seturio Gaur-
geon (拉丁) チヨウザメ或テ
ウザメ(日本)

基本 係脊椎動物魚類硬鱗
類鱧魚科之鱧魚。

產地 江淮黃河遼海深水處
有之。

形態 鱧魚爲魚鱗類之一種。

其體長形呈紡錘狀似鱧長至一
二丈口小在頭下位於鰓孔與吻
端之中間唇突出爲肉質稍能伸
縮下唇狹上唇厚而膨起中央有
裂痕觸鬚橫列於口與吻端眼小

鼻長四孔在口之前排水孔在鰓
端之上頭部密被骨板軀有斜方
形硬鱗鱗與脊鱗相對胸鱗狹
長腹鱗小背色茶褐腹灰黃脂色

黃與白色之肉層層相間脊骨及
鰓蓋並鼻皆脆軟可食其肉亦可
供食與藥用。

性質 甘平有小毒。

主治 利五臟。

參攷資料 ①鱧魚肉多食難
消化服荊芥藥者不可食(李時
珍) ②鱧魚肉發氣動風發瘡疥

和蕎麥食令人失音(孟詵) ③鱧

魚肉味極肥美。楚人尤重之多食
生熱痰(寧原)

【鱧魚肝】 性質 無毒。

主治 惡血疥癬。

參攷資料 鱧魚肝切勿以鹽
炙食之(陳藏器)

【鱧魚】 即鯢魚之原名。詳「鯢魚」
條。

命名 本品首有七星。

故名。 夜朝北斗有自然之禮。

處方用名 鱧魚肉。鱧魚膽。

古藥別名 鱧魚。銅魚(本經)

黑鱧(圖經)玄鱧(埤雅)烏鱧文
魚(七厘魚。綱目)黑魚(俗名)黑

火柴頭魚。醫林集要)烏魚。

基本 係水族動物。爲無鱗類
之鱧魚。

產地 凡江湖池澤之淡水中
恒有出。

形態 鱧魚形長。體圓。頭尾相
等。細鱗。黑色有斑紋。腹背兩鱗均

連續至尾。

性質 甘寒。無毒。

效能 瀉熱。行水。用作利尿消
腫。澤藥。

主治 療五痔。治溼痺。面目浮
腫。下大水(本經)有瘡者不可食。
令人瘠白(別錄)

歷代記述攷證 【唐】孟詵食
療本草論鱧魚曰下大小便壅塞

氣作鱧與脚氣風氣人食良【宋】
蘇頌嘉祐圖經本草論鱧魚曰主

妊娠有水氣【明】李士材本草圖
解論鱧魚曰鱧魚甘寒無毒其功

專於去溼下水他無所長多食能
痼疾【清】黃宮繡本草求真論鱧

魚曰鱧魚膽即鴈鳥鱧又名七星
魚者是也其物伏土勝水味甘性

寒無毒凡人身患十種水氣垂死
可用肉與冬瓜葱白以治且煮湯

浴兒可以稀豆。膳味書雖載甘然
嘗之終苦凡喉痺將死者點入即

愈病深者水調灌之亦可。

配合應用 ①治十種水氣垂
死。鱧魚一斤重者煮汁和冬瓜葱

白作羹食(食醫心鏡方)

②下一切氣用大鱧一條開肚。
入胡椒末半兩大蒜片二顆縫合

同小豆一升煮熱下蘿蔔三五顆
葱一握俱切碎煮熱空腹食之至

飽并飲汁至夜洩惡氣無限也五

日更一作(孟詵方)

③治腸痔下血鱧魚作鱠以蒜
鹽食之忌冷毒物(外臺祕要方)

④治一切瘡風頑癬疥癩年久
不愈者不過二三服必愈用黑火

柴頭魚一個即烏鱧也去腸肚以
蒼耳葉填滿外以蒼耳安鍋底置

魚於上少少着水慢火煨熟去皮
骨淡食勿入鹽醬功效甚大(醫

林集要方)

⑤浴兒免痘除夕黃昏時用大
烏魚一尾小者二三尾煮湯浴兒

遍身七竅俱到不可嫌鱧以清水
洗去也者不信但留一手或一足

不洗過出痘時則未洗處偏多也
此乃異人所傳不可輕易(楊拱

醫方摘要方)

參攷資料 ①鱧魚合小豆白
羹療腫滿最效(陶弘景) ②鱧首

有七星夜朝北斗有自然之禮故
謂之鱧又與蛇通氣色黑北方之

魚也故有玄鱧諸名俗呼火柴頭
魚即此也其小者名銅魚蘇頌圖

經引毛詩諸注謂鱧即鮠魚未免
誤矣(李時珍) ③形長體圓頭尾

相等細鱗灰色有斑點花文鱗類

可食。蠶溺皆香。如麝氣。楊慎丹鉛錄云。予在大理府見香貓如狸。其

條。

文如金錢豹。此即楚辭所謂乘赤

【鱖魚】即海鰻魚之古籍別名。典

豹。今載文狸。王逸註爲神狸者也。

見綱目。詳「海鰻魚」條。

南山經所謂宜爰之山有獸焉。狀

【鱖】即魚子之古籍別名。典見綱

如狸而有髦。其名曰類。自爲牝牡

目。詳「魚子」條。

食者不妬。列子亦云。宜爰之獸。自

【鱖魚】即鱖魚之古籍別名。典見

孕而生曰類。疑即此物也。又星禽

綱目。詳「鱖魚」條。

真形圖。心月狐有牝牡兩體。其神

【鱖魚】命。鱖者候也。鱖善

狸乎。珍按劉楊二說。與異物志所

古籍別名。鱖帆鱖障。小者名

說相合。則類即鱖狸無疑矣。類狸

外國名詞。Limulus longis-

字音亦相近也。李時珍。靈龜

候風故名。

肉氣味甘溫無毒。綱目。

蟹。綱目。

【靈龜】即鱗龜之古籍別名。典見

蟹。綱目。

郭璞賦。詳「鱗龜」條。

蟹。綱目。

【靈龜子】即枸杞子之古籍別名。

蟹。綱目。

典見和漢藥考。詳「枸杞子」條。

蟹。綱目。

【靈磁石】即慈石之處方用名。詳

蟹。綱目。

【慈石】條。

蟹。綱目。

【靈龜】即鱗龜之古籍別名。典見

蟹。綱目。

漢書。詳「鱗龜」條。

蟹。綱目。

【鱗牛兒】即牻牛兒之古籍別名。

蟹。綱目。

典見和漢藥考。詳「牻牛兒」條。

蟹。綱目。

【鱗雪紅】即月季花之古籍別名。

蟹。綱目。

典見綱目。詳「月季花」條。

蟹。綱目。

【鱗雞】即蟋蟀之俗名。詳「蟋蟀」

蟹。綱目。

條。

蟹。綱目。

條。

蟹。綱目。

條。

蟹。綱目。

動之關節。甲殼堅硬。尾成劍狀。雄

小雌大。雌常負雄以行。浮游水中。

腹中有子如黍米。可爲醃醬。皮殼

甚堅。可爲冠帽。其血碧色。肉白。可

供藥用。

蟹。綱目。

蟹。綱目。

蟹。綱目。

蟹。綱目。

蟹。綱目。

蟹。綱目。

蟹。綱目。

蟹。綱目。

蟹。綱目。

蟹。綱目。

蟹。綱目。

蟹。綱目。

蟹。綱目。

蟹。綱目。

蟹。綱目。

蟹。綱目。

蟹。綱目。

蟹。綱目。

蟹。綱目。

蟹。綱目。

蟹。綱目。

蟹。綱目。

蟹。綱目。



魚 鱖

【鱖魚膽】主治 大風癩疾。殺

蟲。

【鱖障】即鱖魚之古籍別名。典見

綱目。詳「鱖魚」條。

鱖。綱目。

鱖。綱目。

鱖。綱目。

鱖。綱目。

鱖。綱目。

鱖。綱目。

鱖。綱目。

鱖。綱目。

鱖。綱目。

鱖。綱目。

鱖。綱目。

鱖。綱目。

鱖。綱目。

鱖。綱目。

鱖。綱目。

鱖。綱目。

鱖。綱目。

鱖。綱目。

鱖。綱目。

鱖。綱目。

鱖。綱目。

鱖。綱目。

鱖。綱目。

產地 出蘇松浙江諸地。

形體 鱖殘魚爲無鱗類魚屬

之一種。大者長四五寸。身圓如筋

潔白如銀。體無鱗。若已鱮之魚。日

有兩黑點。其肉可供食與藥用。

性質 甘平。無毒。

主治 作藥食。寬中健胃。

參攷資料 鱖殘魚在清明節

前有子。食之甚美。清明節後子散

而瘦。可作鮮腊。曝乾亦佳。(李時

珍)

【鱖魚】命名 本品肥而不善

游。有適如之象。故名。

古籍別名 黃魚(食療)鱖魚。

(御覽)玉版魚。含光片鱗。綱目)

鱖魚。俗名)

外國名詞 Acipterus miki-

形圖) 麝香貓 (別名)

外國名詞 Zibethum, (拉

丁) Olvee, (英) Zibeth, (德)

基本 屬貓類之靈貓屬, 肛門與生殖器間開口腺所分泌之液汁。

產地 靈貓香產非洲諸國、美洲之巴西、祕魯、中國及其他亞洲諸國、穴居山野多產子。以小獸諸鳥為食, 缺則食果類菜草。

形態 靈貓香為類黃色輕膏狀物質, 經久者變褐色。不溶於水。逢酒精祇能溶一部分。近嗅帶尿臭。遠嗅則類麝香。味苦。點火則發明焰燃燒。靈貓形似貓而大。自鼻端至尾端長二尺餘。頭短, 鼻長, 眼稍長而小。耳小似貓耳。惟不尖。牙尖利如狗。脚短小。前脚尤短。約五姆指橫徑。有五趾。爪黑而尖。直全身之毛有二種。一種長而粗硬。雜黑白、茶褐三色。成黑斑及條紋。一種短而柔軟。灰色帶褐色。縮縮而劇於長毛中。頭之兩側有大黑斑。將眼圍住。在體軀、頸及尾之毛皆長而粗硬。頭毛則短。灰色而間黑色。鼻灰白。其端黑色。耳外黑而內

白。頸有黑白斑。吭與腹皆黑。尾之上面黑色。兩側及下面則雜白毛。或作黑白輪紋。脚毛短如頭毛。

採取 採無時。採香應由檻前將棍插入。逐至後邊。從檻後格子間。把住其尾。即插二板入檻中。夾其兩脇。使不能動。乃將其後足縛於格子。用小匙徐徐刮取溝內之液。惟液隨氣候之寒暖而有多寡。故或每日。或二日。或三日取一次。(大抵二日出一錢許。此獸在山野時。係自觸木石。剔出其液云。

性質 辛溫無毒。

成分 靈貓香含有脂肪、揮發油、樹脂質等。

效能 宣竅。辟惡。行氣。止痛。與麝香海狸香相同。能使情火熾盛。用作興奮精神藥。又為鎮痛等藥。並治陰痿偏頭痛。

作用 在胃中不起作用。至小腸及十二指腸始行分解而被吸入。即刺激中樞神經。使精神奮興。性慾神經亦同時被激感而亢進。如用大量。則神經反被麻醉而昏睡。甚至由血尿盜汗而死。

主治 中惡氣飛尸蠱疰。心腹

卒痛。狂邪鬼神。鬼瘧疫氣。夢寐邪驚。鎮心安神。

國外學說 和漢藥考曰。靈貓

性兇悍難馴。人觸之輒被抓咬。自幼畜檻中者。性稍馴。但稍怒亦動輒咬人。其外貌雖若柔弱懶惰。但其捕蟲鼠鳥類。則奔跳飛越。輕敏如貓。其食料以牛乳及雞卵為最佳。若用肉類及穀果蔬菜等畜之。則靈貓香之性能香氣皆變劣弱。此獸雖輪出他國。若以良食畜之。亦善能生育。可取香與產地無異。惟此獸本屬暖國產。苟運至寒地。或寒暖中和地。則精力稍減。不產子。其香質如蜜。為似牛酪之稠厚。液新鮮上品。為白色或黃白色。其氣烈如麝香。且帶有如琥珀油之氣味。味苦。上品為白色。但經久則漸變黃色。終成為褐色。亦有帶黃灰色。或帶赤色者。凡褐色愈多。則品愈下。將此勻攤平紙上。無粒塊。無如脂之腐敗臭。氣者為上品。有於液內雜酪及脂類。假充出售者。用乳汁及雞卵者。其香白色。為上品。用肉類果菜者。其液褐色。香氣及功效俱劣。其主治以多油

氣揮發鹽。有鎮痛、解凝、緩和之功效。能使神經強壯。疝痛小兒腹痛。子宮硬腫及衝逆等。用此擦臍。頗有奇效。惟婦女多不喜此香氣。多用於香料。取少許加於他香料中。則發佳香如麝香。此物逢燒酒不溶化。溶於油脂類。牝牡皆於陰具與肛門之間。有一披溝。內被短毛。其左右有膜囊。即香囊。隆起皮上。成為溝唇。其囊約長三姆指橫徑。闊約二姆指橫徑。其中約可容鵝卵。(或云此囊牡倍於牝。囊之內外有腺。多溝內左右有二腺。俱分泌香液。藏於囊中。溝內之兩側各有一孔。通於兩囊。將香流泄於溝。

用量 一分至三分。

參攷資料 靈貓生南海山谷。狀如狸。自為牝牡。其陰如麝。功亦相似。按異物志云。靈貓一體自為陰陽。剖其水道。逆囊以酒洒。陰乾。其氣如麝。若雜入麝香中。罕能分別。用之亦如麝焉。(陳藏器) 按段成式言。香狸有四肢。則自能牝牡者。或由此也。劉侗西域記云。黑契丹出香狸。文獻士約。其肉

生薑湯調下。(錢氏小兒方)

五臟補助元氣。研末糯糊爲丸。棗湯服最能鎮壓神丹也。【清】黃宮繡本草求真論靈砂曰靈砂又名神砂係水銀硫黃二物。同水火煨煉而成。蓋水銀性秉最陰。硫黃性稟純陽。同此煎熬。合爲一氣。則水與火交。火與水合。而無元陽飛越之弊矣。故凡陽邪上浮下不交。而至虛煩狂燥。寤寐不安。精神恍惚者。用此墜陽交陰。則精神鎮攝。而諸病悉去。謂之曰靈。即見扶危拯急。若有神使之意。後人不明辰砂。即屬丹砂混以靈砂。入於益元散內。詎知一神一靈音同字別。一水一火。天淵各判。烏可以此煮煉燥烈之品。以代辰州甘寒之味耶。市肆與醫。妄用如斯。附記以俟高明並參。

配合應用

●陰陽丸 治伏熱吐瀉。用硫黃半兩。水銀一錢。研末。薑汁糊丸。小豆大三歲三丸。冷水下。大人三四十丸。亦治諸般吐逆。(鄭氏小兒方)

●治霍亂吐逆。不問虛實。冷熱。二氣散。一名青金丹。用水銀硫黃等分。研不見星。每服一字至半錢。

二十九。鹽湯下。四味皆等分。此藥升降陰陽。既濟心腎。神效不可具述。(局方)

●治脾疼反胃。靈砂一兩。蚌粉一兩。同炒。赤丁香。胡椒各四十九粒。爲末。自然薑汁煮。半夏粉糊丸。梧子大。薑湯下二十九。普濟方。

●治冷氣心痛。用靈砂三分。五靈脂一分。爲末。稀糊丸。麻子大。每服二十九。食前石薑蒲。生薑湯下。(直指方)

●治九竅出血。因暴驚而得。其脈虛者。靈砂三十粒。人參湯下。二服愈。此證不可錯認。血得熱則流。妄用涼藥誤事。(楊仁齋直指方)

●養正丹。又名交泰丹。乃寶林真人谷伯陽方也。卻邪輔正。助陽接真。治元氣虧虛。陰邪交蕩。上盛下虛。氣不升降。呼吸不足。頭旋氣短。心怯膽悸。虛煩狂言。盜汗腹痛。腰痛。反胃吐食。霍亂轉筋。欬逆。又治中風涎潮。不省人事。陽氣欲脫。四肢厥冷。傷寒陰盛。自汗唇青。脈沉。婦人產後月候不勻。帶下腹痛。用黑靈一隻。入黑鉛溶汁。次下水銀。次下朱砂末。炒不見星。少頃。乃下硫黃末。急攪。有焰酒醋解之。取出研末。糯粉煮糊。丸綠豆大。每服

用量 三分至五分。施用宜忌 凡非實邪暴病者。禁用忌火。

參攷資料 ●靈砂即化學上之赤色硫化汞。(和漢藥考) ●茅亭客話載以靈砂餌胡孫鸚鵡。鼠犬等。變其心。輒會人言。丹之通爲靈者。(唐慎微) ●靈砂雖稱水火既濟。陰陽配合。然而硫汞有毒。性亦下墜。止可藉其墜陽交陰。卻病於一時。安能資其養神益氣。通靈於平日哉。凡胃虛嘔吐。傷暑霍亂。肺熱生痰。病屬於虛。非關驟發者。咸在所忌。(穆希雍)

【靈狸香】即靈貓香之古籍別名。典見和漢藥考。詳『靈貓香』條。

【靈脂】即五靈脂之簡稱。詳『五靈脂』條。

【靈草】即甘草之古籍別名。典見別錄。詳『甘草』條。

【靈液】●即水銀之古籍別名。典見綱目。詳『水銀』條。●即口津之古籍別名。典見綱目。詳『口津』條。

【靈通】即甘草之古籍別名。典見記事珠。詳『甘草』條。

【靈通草】 參攷資料 楚庭碑珠僧建公之徒參悟。患驢。建公謂得羅浮靈通草。始獲參悟。來博館入山。於玉女峯得此草。莖長三尺。如簪。而莖虛中。兩頭皆實。頂開七葉。取葉煎水服。截其虛者。貫兩耳中。夜一聲若雷。響遂開。(趙恕軒)

【靈黃】即石硫黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳『石硫黃』條。

【靈壽木】 古籍別名 扶老杖。(孟康) 樹(綱目)

形體 靈壽木爲灌木類之一種。高八九尺。圍三四寸。莖幹似竹。有節。可爲杖及馬鞭之用。其根皮可供藥用。

性質 苦平。主治 止水。

【靈貓】即靈貓香之簡稱。詳『靈貓香』條。

【靈貓香】 古籍別名 香狸香。(雜俎) 神狸香。(離騷註) 類香。(綱目) 文狸香。靈狸香。(和漢藥考) 心月狐。(星禽異)

參攷資料

蠶繭方書多用。而諸家本草並不言及。誠缺文也。近世用治癰疽代鍼。用一枚即出一頭。二枚即出二頭。神效無比。麥湯治消渴。古方甚稱之。丹溪朱氏言此物屬火。有陰之用。能瀉膀胱中相火。引清氣上朝於口。故能止渴也。纔絲湯及絲綿麥汁。功並相同。(李時珍)

【蠶繭草】

外國名詞

Poly-

onum japonicum, Meisn. (拉丁) サクラタデ (日本)

基本 係蓼科蓼屬。爲蠶繭草

之莖葉

產地 原野溼地均有出



蠶繭草

形體 蠶繭草爲溼草類之多

年生草本。莖高二三尺。葉披針形。長而稍厚。互生。有托葉如鞘狀。上緣生長剛毛。秋月莖梢抽出花軸。綴以稀疎之長穗狀花。花蓋白色。或帶紅色。五裂甚深。雄蕊八枚。突

出於花蓋之外。雌蕊一枚。此爲藥類中之最大者。其莖葉供藥用。

性質 辛平。無毒。

主治 諸蟲如蠶類咬人。恐毒入腹。煮服之。亦搗傳諸瘡。

參攷資料 蠶繭草生溼地。如麥大莖赤花白。束土有之。(陳藏器)

【蠶繭鹵汁】

命名 本品即蠶繭中蛹汁也。

故名。

效能 解毒。殺蟲。

主治 蠱蝨瘰癧。疥癩。山陰山蛭入肉。蚊子及諸蟲咬毒。小兒疥瘡等。(煮湯浴)

【蠶魚】

即衣魚之古籍別名。典見綱目。詳「衣魚」條。

【衢筭乾】

基本 本品即以竹筍用鹽湯煮熟。熏乾而成者。

性質 鹹。甘平。無毒。

主治 利膈化痰。

【讓實】

基本 讓實爲雜草類之一種。可供藥用。

採取 十月採之。陰乾。性質 酸。

主治 喉痺。止洩痢。

【釀】即米酒之古籍別名。典見和漢藥考。詳「米酒」條。

【蠶羊】即大尾羊之古籍別名。典見唐書。詳「大尾羊」條。

【蠶山柴】即天靈蓋之古籍別名。典見和漢藥考。詳「天靈蓋」條。

【蠶芝】即石耳之古籍別名。典見綱目。詳「石耳」條。

【靈砂】

命名 本品以至陽勾至陰脫陰反陽故名靈砂。

砂。

古靈別名 二氣砂。青金丹。金鼎靈砂。九轉靈砂。老火靈砂。(綱目) 神砂。(求真) 氣砂。釘辰砂。(和漢藥考)

形體 靈砂爲鮮紅色針狀結晶。不溶於水及通常溶解劑。熱之則發藍色焰而燃燒。

製法 唐慎微曰。靈砂用水銀一兩。硫黃六銖。細研。炒作青砂。頭後入水。火既濟。抽之。如束鍼紋者成就也。李時珍曰。按胡宣丹藥祕訣云。升靈砂法。用新鍋。安道遠爐。上蜜摺鍋底。文火下燒。入硫黃二兩。銕投。投水銀半斤。以鐵匙急

攪作青砂。頭如有焰起。暗醋解之。待赤不見星。取出細研。盛入水火鼎內。鹽泥固濟。下以自然火升之。乾水十二盞爲度。取出如束鍼紋之物也。硫黃製而成形。謂之丹基。奪天地造化之功。竊陰陽不測之妙。可以變化五行。鍊成九還。其未升鼎者。謂之青金丹。頭已升鼎者。乃曰靈砂。靈砂有三。以一伏時。周天火而成者。謂之金丹。靈砂以九度抽添。用周天火而成者。謂之九轉靈砂。以地數三十日炒煉而成者。謂之醫家老火靈砂。並宜桑灰淋醋。煮伏過。用乃良。

性質 甘溫。無毒。

效能 調陰陽。交水火。安精神。定魂魄。專作鎮壓藥。

主治 五臟百病。養神。安魂魄。益氣明目。通血脈。止煩滿。益精神。殺精魅。惡鬼氣。久服通神明。不老。

輕身神仙。令人心靈。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論靈砂曰。主上盛下虛。痰涎壅盛。頭眩吐逆。霍亂反胃。心腹冷痛。升降陰陽。既濟水火。調和

配合應用 ①治吐血不止。蠶

蛻紙燒存性。蜜和丸。芡實大。含化嚥津。(集驗方)

②治牙宣牙癰及口瘡。並用蠶蛻紙燒灰乾傅之。(集驗方)

③治風蟲牙痛。蠶蛻紙燒灰擦之。良久。鹽湯漱口。(直指方)

④治走馬牙疳。蠶蛻紙灰。入麝香少許貼之。直指加白僵蠶等分。(集驗方)

⑤治小兒頭瘡。蠶蛻紙燒存性。入輕粉少許。麻油調傅。(聖惠方)

⑥治經喉風疾。用蠶蛻紙燒存性。煉蜜和丸。如芡實大。含化嚥津。(集驗方)

⑦熏耳治聾。蠶蛻紙作捻。入麝香二錢。入筆筒燒烟熏之。三次即開。

⑧治癩狂邪祟。凡狂發欲走。或自高貴稱神。或悲泣呻吟。此爲邪祟。以蠶蛻紙燒灰。酒水任下方寸匕。亦治風癩。(肘後方)

⑨治沙證壯熱。江南有沙證。狀如傷寒。頭痛壯熱。嘔惡。手足指末微厥。或腹痛悶亂。須臾殺人。先用蠶蛻紙剪碎。安於竈中。以礞蓋之。

滾湯沃之。封固良久。乘熱服。暖臥取汗。(活人書方)

⑩中蠱藥毒。雖面青脈絕。腹脹吐血者。服之即活。用蠶蛻紙燒存性。爲末。新汲水服一錢。(衛生方)

⑪治中諸藥毒。用蠶蛻紙數張燒灰。冷水服。(易簡方)

⑫治小便澀痛不通。用蠶蛻紙燒存性。入麝香少許。米飲每服二錢。(博濟方)

⑬治熱淋如血。蠶蛻紙燒灰。入麝香少許。水服二錢。極效方也。(衛生家寶方)

⑭治崩中不止。蠶故紙一張。剪碎炒焦。槐子炒黃各等分。爲末。酒服立愈。(易簡方)

⑮治婦人斷產。蠶子故紙一尺。燒爲末。酒服。終身不產。(千金方)

⑯治痔漏下血。蠶紙半張。盤內燒灰。酒服自除。(備急方)

參攷資料 ⑰蠶蛻今醫家多用初出蠶子殼在紙上者。東方諸醫用老蠶眠起所蛻之皮。功用相近。當以蛻皮爲正。入藥微炒爲用。(掌禹錫)

⑱蠶蛻當用眠起時所蛻皮。蠶連燒灰亦可用。(趙宗璣)

①馬明退。蠶連紙。功用相同。亦如蠶蛻。蛇蛻之義。但古方多用蠶紙者。因其易得耳。(李時珍)

【蠶絲吐頭】功用性質。詳【蠶繭】條。

【蠶蛹】 古鑿別名 小蜂兒。(日用)

主治 炒食治風及勞瘦。研傅瘡癰惡瘡。

歷代記載攷證 【唐】陳士良食性本草論蠶蛹曰。治消渴煩亂。

【明】李時珍本草綱目論蠶蛹曰。爲末。飲服。治小兒疳瘦。長肌退熱。

除蛇蟲。煎汁飲。止消渴。參攷資料 劉大瞻者。終身忘食。發則難免。(孫思邈)

【蠶蛻】 基本 本品即蠶眠起所蛻之皮。

古鑿別名 馬明退。(嘉祐)佛退。(綱目)

性質 甘。平。無毒。

主治 血病。益婦人。

歷代記載攷證 【宋】寇宗奭本草衍義論蠶蛻曰。治婦人血風。

【明】李時珍本草綱目論蠶蛻曰。治目中翳障及疳瘡。

【蠶蛻紙】即蠶連之原名。詳【蠶連】條。

【蠶頭歸】即蠶頭歸。詳【蠶頭歸】條。

【蠶繭】 採取 以已出蛾者用。性質 甘。溫。無毒。

主治 燒灰酒服。治癰腫無頭。次日即破。又療諸疳瘡及下血血淋血崩。煮汁飲。止消渴反胃。除蛇蟲。

配合應用 ①治痘瘡疳蝕。膿水不絕。用出了蠶蛾繭。以生白礬末。填滿。煨枯。爲末。擦之。甚效。(陳文中小兒方)

②治口舌生瘡。蠶繭五個。包蓬砂瓦上焙焦。爲末。抹之。

③蟹黃散。治腸風大小便血。淋瀝疼痛。用蟹黃。蠶蛻紙並燒存性。晚蠶沙。白僵蠶並炒。等分。爲末。入麝香少許。每服二錢。用米飲送下。日三服。甚效。亦治婦人血崩。(聖惠方)

④治反胃吐食。蠶繭十個。煮汁。烹雞子三枚。食之。以無灰酒下。日二服。神效。或以繭絲湯煮粟米粥食之。(惠濟方)

效能 益脾和中。用作健胃藥。
主治 快胃和臟腑。

歷代記述攷證 【明】經希雍
本草經疏論蠶豆曰。蠶豆味甘微辛。無毒。能厚腸胃和臟腑。萬表積善堂方言。一女子誤吞針入腹。諸醫不能治。一人敬令煮蠶豆同葦菜食之。針自大便同出。今人有誤吞金銀物者。用之皆效。實救急之良方也。【清】黃宮繡本草求真論蠶豆曰。蠶豆味甘性溫。據書載此服多滯氣。又曰誤吞鐵針。用此卽下。蓋緣人受穀食。必伏中氣以爲運行。若使中氣稍振。雖服有形之物。礙於腸胃。用此合以溫藥同投。卽能以解。如其中氣既餒。稍服滯滯。卽能作脹。况多食乎。此蠶豆之所以有通有不通之說也。但此既能通針。其性疎利。已見一斑。與於陰潤之物。過人則滯。絕不相同。惟在臨症。相人體氣及多食少食。以別耳。【清】王士雄隨息居飲食譜論蠶豆曰。蠶豆甘平。煨時剝爲蔬饌。味甚鮮美。老則煮食可以代糧。炒食可以爲肴。性主健脾快胃。浸以發芽。更不壅滯。亦可煮糜作饌。

餌。肆中磨細攪入小粉。亦可燙皮搓索。以混綠豆粉。

近人學說 丁福保曰。蠶豆爲多人之嗜食品。需用頗廣。其味稍甘。性平和。微寒。爲無毒性之食品。其功有治胃之效能。但皮厚而硬。難以消化。故胃弱之人及小兒不宜食用。

參攷資料

蠶豆莢狀如老蠶故名。王楙農書謂其蠶時始熟故名。亦通。吳鼎本以此爲豌豆誤矣。此豆種亦自西胡來。雖與豌豆同名。同時種。而形性迥別。太平御覽云。張騫使外國得胡豆種歸。指此也。今蜀人呼此爲胡豆。而豌豆不復名胡豆矣。【李時珍】蠶豆南土種之。蜀中尤多。八月下種。冬生嫩苗。可茹。方莖中空。葉狀如匙頭。本圓末尖。面綠背白。柔厚一枝三葉。二月開花。如蛾狀。紫白色。又如紅豆花。結角連綴如大豆。頗似蠶形。蜀人收其子。以備荒歟也。【李時珍】

【蠶豆苗】

性質 苦。微甘。溫。
主治 酒醉不醒。油鹽炒熟。煮湯灌之效。

【蠶豆苗】卽蠶豆之處方用名。詳「蠶豆」條。

【蠶豆莢】卽蠶豆之處方用名。詳「蠶豆」條。

【蠶豆殼】 主治 清水解毒。

【蠶豆殼】 配合應用 治瘰癧。用油鹽蠶豆殼二錢。麻油浸一週時。取起。將豆殼瓦上焙研爲末。麻油調搽患處。立愈。【行篋秘方】

治腸食。用蠶豆磨粉。紅糖調食。數次卽愈。【指南方】

治小便日久不通。難忍欲死。豆殼三兩。煎湯服之。如無鮮殼。取乾殼代之。【活人書方】

治黃水瘡。凡大人小兒頭面黃水瘡。洗到卽生。蔓延無休者。用蠶豆殼炒成炭。研細。加東丹少許和勻。以真菜油調塗。頻以油潤之。三日卽愈。【毛世洪經驗集方】

治漏。用炒熟蠶豆殼磨末。每服三四錢。加沙糖少許調服。【種福堂方】

治瘰癧。用鮮蠶豆湯如泥。塗瘡上。乾卽換之。三五次卽愈。如無鮮者。用乾豆以水泡胖。搗敷亦效。

（張卿子外科方）

治吐血以新蠶豆殼四五。年陳者。炒煎湯飲之。卽愈。【外科方】

治天泡瘡。蠶豆黑殼燒灰存性。研末。加枯礬少許。菜油調敷。一次卽愈。

【蠶屎】卽原蠶沙之俗名。詳「原蠶沙」條。

【蠶毒】卽蛇莓之古籍別名。典見綱目。詳「蛇莓」條。

【蠶退】卽蠶蛻。詳「蠶蛻」條。

【蠶退紙】卽蠶蛻紙。詳「蠶連」條。

紙蠶蛾生卵於紙。常以線綴之。通作一連。故名。

原名 蠶蛻紙

古籍別名 蠶子故紙。【千金方】

主治 吐血鼻衄。腸風瀉血。崩中帶下。赤白痢。痔瘡腫痛。

歷代記述攷證 【宋】寇宗奭

本草衍義論蠶連曰。治婦人血露。【明】李時珍本草綱目論蠶連曰。牙宣牙痛。牙癰牙疳。頭瘡喉痺。風癩狂癡。蟲毒藥毒。沙證腹痛。小便淋瀝。婦人難產及吹乳疼痛。

九五

類塗之又塗赤遊風。

【鰻魚頭】 採取 五月五日採收之。

性質 甘平。無毒。

主治 燒服止痢。主消渴。去冷氣。除痞瘕。食不消。

歷代配述攷證 【明】李時珍

本草綱目論鰻魚頭曰。同蛇頭。地龍頭。燒灰酒服。治小腸癰。有效。百蟲入耳。燒研。綿裹塞之。立出。

【鱮魚】 即鰻魚之古籍別名。典見綱目。詳「鰻魚」條。

【鱮魚血】 即鰻魚之處方用名。詳「鰻魚」條。

【鰻豚】 即鰻魚之古籍別名。典見日華諸家本草。詳「鰻魚」條。

【鰻魚】 命名 鰻者鰻也。本品體不能屈曲如殭。鰻也。故名。

古籍別名 鰻魚。石桂魚。（開寶）水豚。（綱目）鰻魚。（動物學大辭典）鰻豚。（日華）

外國名詞 Helicolenus Sp.

基本 係脊椎動物魚類喉鰻類之鰻魚。

產地 生江湖中。

形態 鰻為魚鱗類之一種。體扁腹闊。口大。鱗細。體色淡黃兼褐。腹白有黑斑。斑紋色明顯者為雄。稍晦者為雌。脊鰭十二棘。鰭蓋骨亦有細棘。體長七八寸。小者三四寸。棲江湖。冬日潛伏岸穴中。其肉無細刺。可供食與藥用。

性質 甘平。無毒。

主治 腹內惡血。去腹內小蟲。益氣力。令人肥健。

歷代配述攷證 【唐】孟詵食療本草論鰻魚肉曰。補虛勞。益脾胃。【唐】日華諸家本草論鰻魚肉曰。治腸風瀉血。

參攷資料 按張景岳說云。越州邵氏女年十八。病勞瘵累年。偶食鰻魚羹。遂愈。觀此正與補勞益胃殺蟲之說相符。則仙人劉翥隱士張志和之嗜此魚。非無謂也。（李時珍）

【鰻魚尾】 主治 小兒輕癰。貼之良。

採取 臘月採收。懸北簷下。陰乾用。

性質 苦寒。無毒。

主治 骨鯁竹木刺入咽喉。酒煎溫服。取吐之。

【鱗蛇】 產地 出雲南、安南諸地。

形態 鱗蛇為蟒蛇之大者。即所謂巨蟒也。長丈餘。有四足。鱗有黃黑二色。能食麋鹿。亦能傷人。春冬居山。夏秋居水。土人殺而食之。其膽可供藥用。

採取 以黃鱗者良。

性質 苦寒。有小毒。

主治 解藥毒。治惡疾及牙疼。

【鱗鯉甲】 即石斛之古籍別名。典見和漢藥考。詳「石斛」條。

命名 本品軀體延長。故字從尋而名曰鱗。

古籍別名 鱗魚。鮪魚。王鮪。（爾雅）碧魚。（綱目）小者名叔鮪。更小者名鮪子。（郭璞）尉魚。（毛詩疏義）鮪鱗。（漢書）乞里麻魚。（飲膳正要）

外國名詞 Psophurus Sp.

基本 係脊椎動物魚類硬鱗類鱧魚科之鱧。

產地 生江河深水間。

形態 鱧魚為無鱗魚類之一種。體長似鱧。長達一二丈。背無硬鱗。鼻亦長。口在頭下。尾分叉。青色。腹白色。頗有青斑紋。狀如梅花。肉色潔白。味亞於鱸。可供食與藥用。

性質 甘平。無毒。

主治 補虛益氣。令人肥健。

歷代配述攷證 【唐】孟詵食療本草論鱧魚肉曰。煮汁飲。治血淋。

參攷資料 鱧魚肉有毒。味雖美而發諸藥毒。動風發一切瘡疥。久食令人心痛腰痛。服丹石人忌之。勿與乾筍同食。發癰瘰癧。小兒食之成咳嗽及癰瘰。作鮮雖珍。亦不益人。（孟詵）

【鱧魚子】 主治 食之肥美。殺腹內小蟲。

補虛下氣。

參攷資料 鱧魚鼻肉作脯。名鹿頭。亦名鹿肉。蓋言其美也。（綱目）

【鱧魚鼻肉】 即鱧魚之俗名。詳「鱧魚」條。

【鰻雞】 形態 本品為原禽類秧雞科之一種。大如雞。

一五二

供食與藥用。

性質 甘溫無毒。

主治 暖胃和中。

參攷資料 鯉魚多食動風熱。

發疥癬(李時珍)

【鯉魚】 命名 本品腹黃。故世有黃鯉之稱。

處方用名 鯉魚肉。鯉魚血。

古籍別名 黃鯉。黃鯉。鯉魚。(綱目)

基本 係水族動物無鱗類。爲

鯉魚之肉。

產地 凡水岸泥窟中恒有出。

形態 鯉魚形似鰱而細長。

亦似蛇而無鱗。體赤褐或青黃。多

涎沫。長二三尺。頭部下有鰓孔二。

腹中有肺。或謂之氣囊。其肉血等

可供藥用。

性質 甘。大溫。無毒。

效能 祛風溼。補虛羸。用作緩

和強壯藥。又爲中風溼痺藥。

主治 補中益血。療瘡瘡。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器

本草拾遺論鯉魚曰。補虛損。療婦

人產後惡露淋瀝。血氣不調。羸瘦

止血。除腹中冷氣。腸鳴及溼痺氣。

【唐】孟詵食療本草論鯉魚曰。補

五臟。逐十二風邪。患溼風惡氣人

作腫。空腹飽食。暖臥取汗。出如膠

從腠脚中出。候汗乾。暖五枝湯浴

之。避風三五日一作甚妙。【元】朱

丹溪本草衍義補遺論鯉魚曰。善

補氣。婦人產後宜食。【明】李時珍

本草綱目論鯉魚曰。專貼一切冷

漏痔瘻。腫瘡引蟲。【明】繆希雍本

草經疏論鯉魚曰。鯉魚味甘氣大

溫。甘溫具足。所以能補中益血。甘

溫能通經脈。療風邪。故又主療瘡

唇及今人用之以治口眼喎斜也。

【清】黃宮繡本草求真論鯉魚曰。

鯉魚稟土陽氣以生。性善穿穴。力

堅而銳。無足能竄。與蛇同性。故書

皆載通經達絡。能治十二經風邪。

並耳目諸竅之病。如風中血脈。口

眼喎斜。用尾血同磨少許。右喎塗

左。左喎塗右。止即洗去。耳痛鼻衄。

痘後目翳。用血滴點即愈。瘡瘡。疔

爛。用鐮打死。香油抹腹。繫於瘡上。

候痛取下。看鐮有蟲。上入即去。產

後惡露。淋瀝。滴腸鳴。溼痺。用此煮食。

即除。老人虛痢不止。用此曝乾。煨

灰存性。調服即絕。且能通力壯筋。

故大力丸取此同能筋。虎骨。當歸。

人參等分。以進。陽道不長。不能續

嗣。用此血同蛤蚧等藥。以入。皆以

借其性力相助。但此味甘性熱。其

力能補。若病屬虛熱。及時行病後

陰虛火熾。食則必有氣弱動風。與

氣之變。不可不慎。【清】王士雄隨

息居飲食譜論鯉魚曰。鯉甘熱。補

虛助力。善去風寒溼痺。通血脈。利

筋骨。治產後虛羸。愈瘡瘡。痔瘻。肥

大腹黃者。勝宜與豬脂同煨。多食

動風發疥。患霍亂損人時病前後

瘡。痘脹滿諸病。均大忌。黑者有毒。

更有蛇變者。項下有白點。夜以火

照之。則通身浮水上。或過大者皆

有毒。不可不慎也。其血塗口。眼喎

斜。赤避風。滴鼻止衄。滴目治疹後

生翳。

配合應用 ①與黃耆同食。能

益氣力。

②治火丹赤腫。生鯉血塗之效。

③瘡瘡。疔爛。用黃鯉魚數條。打

死。香油抹腹。蟠瘡上。繫定。頃刻痛

不可忍。然後取下。看腹有針眼。皆

蟲也。未盡更作。後以人脛骨灰油

調搽之(奇效方)

參攷資料 ①鯉魚。黑者有毒。

(孫思邈) ②鯉魚。性熱能補。時行

病後食之多復(陶弘景) ③鯉魚。

動風氣。多食令人霍亂。曾見一耶

官。食此吐利幾死也。(寇宗奭) ④

鯉魚。黃質黑章。體多涎沫。大者長

二三尺。夏出冬熱。二種蛇變者名

蛇鯉。有毒害人。南人驚鯉肆中。以

缸貯水。畜數百頭。夜以燈照之。其

蛇化者。項下必有白點。通身浮水

上。即棄之。或以蒜瓣投缸中。則羣

鯉跳擲不已。亦物性相制也。(李

時珍) ⑤鯉魚作臘。當重煮之。不

可用桑柴。亦蛇類也。(陳藏器)

【鯉魚皮】 主治 婦人乳核硬

痛。燒灰。空心溫酒服。

【鯉魚肉】 即鯉魚之處方用名。詳

『鯉魚』條。

採取 在尾上取之。

主治 塗瀉及瘻。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論鯉魚血曰。瘡口眼喎

斜。同磨香少許。左喎塗右。右喎塗

左。正即洗去。治耳痛。滴數點入耳。

治鼻衄。滴數點入鼻。治疹後生翳

點少許入目。治赤眦。同蒜汁墨汁

蕪。上林賦云。被以江藤。抹以靡蕪。似非一物何耶。蓋嫩苗未結根時。則爲靡蕪。既結根後乃爲芎藭。大葉似芹者爲江藤。細葉似蛇牀者爲靡蕪。如此分別自明白矣。淮南子云。亂人者若芎藭之與蕪。本蛇牀之與靡蕪。亦指細葉者言也。廣志云。靡蕪香草。可藏衣中。管子云。五沃之土生靡蕪。郭璞贊云。靡蕪香草。亂之蛇牀。不損其真。自製以芳。又海中苦蕪亦名江藤。與此同名耳。李時珍。

【藤蕪花】

主治 入面脂用。

【蕪蕪】即千歲蕪之古籍別名。典見錄詳千歲蕪條。

【羅白子】即萊菔子之古籍別名。典見和漢藥考詳萊菔子條。

【羅爬子】即萊菔子之古籍別名。典見和漢藥考詳萊菔子條。

【羅蒿】即羅蒿之古籍別名。典見爾雅詳羅蒿條。

【羅蒿】即萊菔之古籍別名。典見爾雅詳萊菔條。

【羅蒿三七】即早三七之別名。典見百草鏡詳早三七條。

【羅摩】原名 研合子。命名 漢高祖用于傳

軍士金瘡。故名研合子。又其實嫩時有漿。製時如瓢。故有雀瓢羊婆奶之稱。每一子有一條白絨。長二寸許。故俗呼婆藥。鋪線包。及婆藥錢袋兒等名。

古籍別名 龜。芎藭。詩疏。白環藤。拾遺。實名雀瓢。詩疏。研合子。拾遺。羊婆奶。綱目。婆藥。鋪線包。俗名。苦丸。雞腸。和漢藥考。蕪蕪。陳藏器。

外國名詞 牧野富太郎氏定

羅摩學名爲 Metaplexis japonica, Makino

基本 係屬羅摩科羅摩之種子及白絨。

產地 山野間多產之。

形態 羅摩爲山野自生之多

年生蔓草。春日從舊根生苗。纏繞他物而生。長葉爲長心臟形。輾而厚。有光澤。大者四寸許。傷葉莖。則流出白汁。夏月於葉腋生穗。一二寸。叢生五瓣小花。花冠外面白色。內面淡紫色。中有白茸。花後結長圓形長三四寸之蒴果。殼青紫色。

鬆軟。抗起。成熟則作舟狀。縱裂。中有似絹絲光澤之白絨。作針狀。長寸許。其針之根附有一子。遇風立即飛散。



羅摩

種類 研合子。即羅摩子也。有一種莖葉及花。皆似羅摩。但氣臭根紫。結子圓大如豆。生青熟赤爲異。此則蘇恭所謂女青似羅摩。陳藏器所謂二物相似者也。蘇恭謂女青葉似羅摩。兩葉相對。子似瓢形。大如葶。許故名雀瓢。根似白微莖。葉並生。平澤列錄云。葉嫩時似羅摩。間端大葉實黑。

種植 亦有植於園圃爲籬者。

採取 有採其葉有收其子。

性質 甘辛溫無毒。

效能 種子用作強壯藥。絨用

作止血藥。

主治 虛勞。補益精氣。強陰道。

藥食。功同子。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器

本草拾遺論羅摩曰。搗子傳金瘡。生膚止血。搗葉傳腫毒。明李時珍本草綱目論羅摩曰。取汁傳丹毒赤腫。及蛇蟲毒。即消蜘蛛傷。頑治不愈者。搗封二三度。能爛絲毒。即化作膿也。

配合應用 治一切創傷。採實內綿貼之。則止血。

治蜘蛛咬傷。搗汁塗之。

治蛇咬。搗汁塗之。

用量 一錢至三錢。

著名方劑 羅摩散。補益虛損。極益房勞。千金方。枸杞根皮。五味子。柏子仁。酸棗仁。乾地黃。各三兩。上共研末。每服方寸。酒化下。日三服。

參攷資料 羅摩作藤。生搗之。有白乳汁。人家多種之。葉厚而大。可生啖。亦可煮羹食之。諺云。去家千里。勿食羅摩。枸杞言其補益精氣。強盛陰道。與枸杞葉同也。陶弘景云。羅摩一名芎藭。關州謂之雀瓢。然雀瓢是女青別名也。羅摩葉似女青。故亦名雀瓢。蘇恭云。羅摩東人呼爲白環藤。生籬落間。折之有白汁。一名雀瓢。其

水碱火煨醋淬。研末。同白果肉水浸搗汁。和服七分。可治白濁。亦入眼科用。

辨偽 以色白如蜜灰。置手中冷入骨者真。

【巖耳】即石耳之日本名。詳『石耳』條。

【巖蜜】即蜂蜜之古籍別名。典見綱目。詳『蜂蜜』條。

【欖枝】即荔枝之古籍別名。典見和漢藥考。詳『荔枝』條。

【欖茶】參攷資料 范石湖集 脩江出欖茶。蓋石楠樹葉也。毛文錫茶譜云。湘人四月採楊桐汁作飯。則必採石楠芽作茶。乃能去風。

（趙恕軒）

【藥荊】 古籍別名 頑荊。（圖經）

形態 藥荊爲灌木類荊之一種。枝莖白色。葉圓青色。似榆葉而長。冬夏不凋。夏開紫白色之花。結實如大麻。其子可供藥用。

採取 八月採之。
性質 辛苦。溫。有小毒。
主治 大風。頭面手足諸風。癰

痛。狂癲。瘰癧。寒冷疼痛。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論藥荊子曰。四肢不遂。通血脈。明目益精。光。【宋】蘇頌圖經本草論藥荊子曰。合柏油同熬。塗人畜瘡疥。

施用宜忌 惡石膏。決明爲之使。

【藥華】 外國名詞 Koehnertia paniculata, Laxm. (拉丁) ヨクゲンジ(日本)

基本 係無患子科藥樹屬。爲藥樹之花。

產地 生山野間園圃亦或有之。

形態 藥樹爲喬木類之一種。高丈餘。葉爲奇數羽狀複葉。小葉卵形。有不整齊之缺刻。及重複之齒牙。而互生。狀如木槿葉而薄。上面平滑。下面有毛。夏開圓錐狀花序。花小黃色。似槐花而稍長。大中心雜以紅色。結實實之子殼似酸漿子。實如熟豌豆。圓黑堅硬。可爲數珠。其花可供藥用。

採取 五月六月間採收之。

性質 苦寒。無毒。

主治 目痛淚出。傷督。消目腫。歷代記述攷證 【唐】蘇恭新修本草論藥荊曰。合黃連作煎。療目赤爛。

【藥芽】 ①即粟芽之原名。詳『粟芽』條。②即穀芽之原名。詳『穀芽』條。

【織霞草】 基本 本品爲雜草類之一種。

主治 腎臟虛冷。氣攻臍腹痛。同礪砂。生烏頭。共研成末。將沙礪燒赤。傾入內煨之。不蓋罐口。至爐冷取出。再同烏頭末蒸餅爲丸。如梧子大。醋湯送服。

【藨香】 ①即大茴香之原名。詳『大茴香』條。②即杜衡之古籍別名。典見和漢藥考。詳『杜衡』條。

【藨子】 ①即鼠李子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『鼠李子』條。②即白芷之古籍別名。典見和漢藥考。詳『白芷』條。

【蘼蕪】 (別錄) 蘼蕪(爾雅) 古籍別名 薇蕪。江蘇。外國名詞 (Onoselinum univittatum, Turcz. (拉丁))

ンキウ(日本)

基本 係繖形科芍藥屬。爲蘼蕪之葉莖。

性質 辛。溫。無毒。

主治 咳逆定驚氣。辟邪惡。除蟲毒。鬼疰。去三蟲。久服通神。(本經) 主身中老風。頭中久風。風眩。

歷代記述攷證 【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論蘼蕪曰。作飲。止瀉瀉。

參攷資料 ①蘼蕪一作蘼蕪。其莖葉靡弱而繁蕪。故以名之。當歸名蕪。白芷名蘼。其葉似當歸。其香似白芷。故有蘼蕪江蘼之名。王逸云。蘼草生江中。故曰江蘼是也。(李時珍) ②芍藥葉名蘼蕪。又曰蘼蕪一名江蘼。芍藥苗也。生雍州川澤及宛旬四月五月採葉。曝乾。(別錄) ③今出歷陽處。人家多種之。葉似蛇牀而香。賸人借以爲葷。方藥稀用。(陶弘景) ④此有二種。一種似芹葉。一種似蛇牀。香氣相似。用亦不殊。(蘇恭) ⑤別錄言蘼蕪一名江蘼。芍藥苗也。而司馬相如子虛賦。稱芍藥爲蘼蕪。江蘼。蘼

之性。其黏液素之性質。尙不十分明瞭。似與纖維素及『阿拉敏』（阿拉伯樹膠之成分）有關。名之爲『巴魯阿拉敏』（Paralamin），其含量約爲三〇%。黏液素究有驅蟲功效與否。殊不敢必。假若有此功效。則如加拉健與寒天藻（涼菜）或亦有同一價值云。中外醫事新報載有田中醫士言。海人草含有名『格拉紐姆』植物鹽基。但慶松藥學士則云。不能因此即認爲有機化合物云。和漢三才圖會曰。海人草生琉球海邊。多出於薩州。販於四方。黃色微黯。長一二寸有歧。無根。而有微毛茸。輕虛味甘微鹹。能瀉胎毒。（浸水一夜去土砂）小兒初生。三日中先用海人草甘草二味（或加落根）包臍浸湯令飲之。呼曰甜物。此方不知始於何時。本朝通俗必要之藥也。小兒吞之。即吐涎沫。謂之吐穢汁。可以去臍上胎毒。

用量 五分至錢半。

著名方劑 ① 鷓鴣菜丸。治一切胎毒。蟲癖。或寒熱如瘧者。下就蟲尤妙也。和漢藥考方。鷓鴣菜

二錢。蒲黃。大黃各三分。苦楝皮二份。上爲末。糊丸。煎服亦可。② 鷓鴣菜湯。治腸胃中蟲。方同上。③ 鷓鴣菜二錢半。蒲黃五分。甘草二分。上水煎服。④ 鷓鴣湯。俗呼『麻久里』（按鷓鴣菜日俗稱麻久里）云。可下初生兒胎毒。方同上。⑤ 甘草十六錢。檳榔四錢。黃連二錢。海人草四錢。將軍四錢。上方若女子則加紅花四錢。

參攷資料

① 鷓鴣菜生海石上。色微黑。連江志。② 鷓鴣菜散碎花。微黑。出漳浦（漳州府志）

【鷓鴣】即鷹之古籍別名。典見綱目。詳『鷹』條。

【鷹】命名 鷹喜文章。故字從章。而性鷹悍。故名。

古籍別名 鷹。牡者名鷹。牙聲。白毛者名銀鷹。牝者名鷹子。名鷹。大者名鷹。綱目。

外國名詞 Moschus chin.

100

基本 係脊椎動物哺乳類有胎盤類有蹄類反芻偶蹄類騰科之聲。

產地 山野陂澤及淺草叢中

有之。

形體 鷹爲獸類鷹屬之一種。形似鹿。體較小。頭無角。雄者有牙出口外。即名牙鷹。色黃黑。大者重二三十斤。秋冬居山。春夏居澤。四肢善馳。其皮細軟。勝於鹿皮。夏月毛毳而皮厚。冬月毛多而皮薄。其肉可供食與藥用。

性質 甘溫無毒。

主治 補益五臟。

歷代記述攷證 【唐】孫思邈千金翼論鷹肉曰。益氣力。悅澤人面。【明】寧原食鑑本草論鷹肉曰。釀酒。又有祛風之功。

參攷資料 ① 八月至十一月食之。勝羊。十二月至七月食之。勳氣多。食令人消渴。苦瘦惡者食之。發痼疾。不可合鷓鴣肉食。成癰疾。又不可合梅李蝦食。病人（至孟詵）俗云。白肉是鷹。其膽白。易驚怖也。（陶弘景）

性質 甘。微溫。無毒。

主治 虛損洩精。

歷代記述攷證 【宋】日華諸家本草論鷹骨曰。益精髓。悅顏色。參攷資料 千金治產後虛損。

參攷資料 千金治產後虛損。

有鷹骨湯。煮汁煎藥。李時珍。

【鷹髓及腦】主治 益氣力。悅澤人面。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論鷹髓及腦曰。治虛風。

參攷資料 ① 千金治暗風之薯蕷煎。及治虛損之天門冬煎。並用之。（李時珍）唐方有鷹髓與鷹骨酒並補下（蘇頌）

【鼈】即蟾蜍之古籍別名。典見詩經。詳『蟾蜍』條。

【鼈】即黃鼠之古籍別名。典見綱目。詳『黃鼠』條。

【鼈鼠】即鼯鼠。詳『鼯鼠』條。

【鼈鼠】即鼯鼠之古籍別名。典見綱目。詳『鼯鼠』條。

【鼈鼠】即鼯鼠之日本名。詳『石耳』條。

一二十三畫

【巖香】俗名 水硫。

基本 巖洞壁上有泉滴下年久。其流水處有水結。即是巖香。

性質 寒。無毒。

主治 敷湯火傷。金瘡出血。

一九四七

珍本草綱目論鰻鱺曰。治小兒疳
勢及蟲心痛。明。繆希雍本草經
疏論鰻鱺曰。鰻鱺魚味甘。其氣寒。
其形類蛇。常與水蛇同穴。故其性
有小毒。甘寒而善能殺蟲。故骨蒸
勞瘵。及五痔瘡。瘰癧。人常食之。有大
益也。燒烟辟蚊。熏屋舍。竹木斷蛀
蟲。置骨於衣箱中。斷蠹。其殺諸蟲
之驗可證矣。腹下有黑斑。背上有
白點者。毒甚。不可食。重三四斤及
水行昂頭者。不可食。妊娠食之。令
胎有疾。脾胃薄弱。易泄者。勿食。
配合應用 ①治諸蟲心痛。多
吐清水。鰻鱺淡煮飽食。三五度即
差。(外臺祕要方)

②治骨蒸勞瘵。用鰻鱺二斤。治
淨酒二盞。煮熱入鹽醋食之。亦治
腸風下蟲。(聖惠方)

③治一切惡瘡。用蛇魚骨炙為
末。入諸色膏藥中貼之。外以紙護
之。(經驗方)

施用宜忌 凡有溼熱時病者
禁用。

參攷資料 ①婦人帶下。療一
切風癢。如蟲行。又壓諸草石藥毒。
不能為害。(張鼎) ②鰻鱺所主諸

二十二畫 鰻 鰻 鰻 鰻

病。其功專在殺蟲去風耳。與蛇同
類。故主治近之。稽神錄云。有人病
瘰癧。相傳死者數人。取病者置棺中。
棄於江。以絕害。流至金山。漁人引
起開視。乃一女子。猶活。取置漁舍。
每以鰻鱺食之。遂愈。因為漁人之
妻。張鼎云。燒烟熏蚊。令化為水。熏
衾及屋舍。竹木斷蛀蟲。置骨於衣
箱。斷諸蠹。觀此則別錄所謂能殺
諸蟲之說。益可證矣。(李時珍) ③

欽州溪潭中出一種。其背有五色
文者。頭似鰻蛇。入藥最勝。江河中
難得。五色者。(孟詵) ④鰻鱺其狀
如蛇。背有肉鬣連尾。無鱗。有舌。腹
白。大者長數尺。脂膏最多。背有黃
脈者。名金絲鰻鱺。此魚善穿深穴。
非若蛟蟹之攻岸也。或云。鮎亦產
鰻。或云。鰻與蛇通。(李時珍) ⑤腹
下有黑斑者。毒甚。與銀杏同食。患
輒風。(吳瑞) ⑥小者可食。重四五
斤及水行昂頭者。不可食。嘗見舟
人食之。七日皆死。(汪機)

【鰻鱺血】 主治 瘡疹入眼生
眵。以少許點之。

【鰻鱺骨及頭】 主治 瘡疹
入藥。治疔瘡。

腸風。弱帶。燒灰敷惡瘡。燒薰痔瘻。
殺諸蟲。

【鰻鱺魚】 即鰻鱺之處方用名。詳
「鰻鱺」條。

【鰻鱺膏】 主治 諸瘡。
歷代記述攷證
【唐】蘇恭新修本草論鰻鱺膏曰。
耳中蟲痛。【宋】寇宗奭本草衍義
論鰻鱺膏曰。曝乾。微炙。取油塗白
眼。風即時色轉。五七度便差。

參攷資料 白駁生頭面上。浸
淫。漸長似癬者。刮令燥痛。炙熱。脂
擦之。不過三度。即差。(集驗方)

【鰻魚】 即泥鰍之古籍別名。與見
爾雅。詳「泥鰍」條。
【鰻魚】 即鰻魚之古籍別名。典見
綱目。詳「鰻魚」條。

歷代記述攷證 【唐】李珣海
藥本草論鰻曰。燒灰。傳陰瘡。瘰癧。
月蝕瘡。【明】李時珍本草綱目論
鰻曰。止折傷。血出不止。

參攷資料 沈括筆談云。鰻鱺
烏賊魚腸也。孫愐唐韻云。鰻藏魚
腸也。南史云。齊明帝嗜鰻鱺。以蜜
漬之一食數升。觀此則鰻與腸皆
得稱鰻鱺矣。(李時珍)

【鰻膠】 基本 本品即以諸魚
之鰻所作之膠。
古籍別名 魚膠。鮫膠。(綱目)

性質 甘。鹹。平。無毒。
主治 燒存性。治婦人產難。產
後風。搖破傷風。瘕。止嘔。血散瘀。血
消腫。毒伏。砲砂。

參攷資料 ①魚鰻膠同沙苑
葵。服之種子。蓋取其精血黏聚。
不致洩泄也。其能治難產及散瘀
消腫。或者魚得天一之氣。為先。而
膠為水化之勝。用以調陰中之氣。
化有殊功歟。(本草述鈎元) ②諸
鰻皆可以為膠。而海魚多以石首
鰻作之。名江鰻。謂江魚之鰻也。黏
物甚固。此乃工匠日用之物。而記
籍多略之。今人以鰻煮凍作膏切

古今注詳醃漿條

【蕒】卽吳茱萸之古籍別名。典見和漢藥考。詳吳茱萸條。

【蟪蛄】卽壁虎之古籍別名。典見揚子方言。詳壁虎條。

【蟪蛄】產地 廣東陽春縣爲出產地。

形態 蟪蛄爲卵生蟲類之一種。常附橄欖樹而生。雖有首足。與木葉無異。須待木葉凋落時乃得之。置篋筍中。每遇蟲毒必鳴。鳴則自呼。而以其聲之清濁。可卜凶吉。故可供藥用。

主治 佩之辟蟲。

【蟪蛄】卽蝦蟇之古籍別名。典見綱目。詳蝦蟇條。

【蠶】卽馬刀之古籍別名。典見周禮。詳馬刀條。

【蠶】卽羊蠶闌花之簡稱。詳羊蠶闌花條。

【蠶】卽山茶花之古籍別名。典見綱目。詳山茶花條。

【鑑】卽古銅鏡之古籍別名。典見綱目。詳古銅鏡條。

【響豆】命名 本品卽槐實之於夜間爆響者故名。

品多食其廉而用之。惟此品由種種物質消失或變化其香氣。醫藥用實難代天然麝香也。

配合應用 ①治心氣虛怯。驚邪癲癩。或夢寐粉紆。鬼交鬼注。及小兒急驚。大人中惡等證。用麝香犀角牛黃。琥珀。龍齒。遠志。丹砂。鉛丹。金箔。菖蒲。真珠。茯神。天竺黃。

②傳一切癰疽疔腫有神。用麝香。白及。白斂。紅白藥子。雄黃。烏雞骨。煨乳香。沒藥。冰片。爲末。

③治中風不省。麝香二錢。研末入清油二兩和勻灌之。其人自甦也。(濟生方)

④治中惡客忤。項強欲死。麝香少許。乳汁塗兒口中取效。醋調亦可。(廣利方)

⑤治小兒驚啼。發歇不定。真麝香一字。清水調服。日三。(廣利方)

⑥治小兒中水。單以麝香如大豆三枚。奶汁調分三四服。

⑦治破傷風水。腫痛不可忍。麝香末一字。納瘡中。出盡膿水便效。(普濟方)

⑧治中惡霍亂。麝香一錢。醋半盞調服。(聖惠方)

⑨治諸果成種。傷脾作脹氣急。用麝香一錢。生桂末一兩。飯和丸。菉豆。大人十五丸。小兒七丸。白湯下。蓋水得麝則落水得桂即枯故也。(濟生方)

⑩治消渴飲水。因飲酒或食果實過度。雖能食而口渴。飲水數尿。以麝香當門子。酒和作十餘丸。枳椇子煎湯送下。蓋麝香敗酒壞果枳椇亦敗酒也。(濟生方)

⑪治偏正頭痛久不除者。晴明時將髮分開。用麝香五分。皂角末一錢。薄紙裹。置患處。以布包炒鹽於上熨之。冷則易。如此數次。永不復發。(簡便單方)

⑫治五種蟲毒。麝香。雄黃等分。爲末。以生羊肝如指大。以刀割開。裹藥吞之。(衛生方)

⑬治口內肉毯。有根如線。五寸餘。如釵股。吐出乃能食物。捻之則痛。微心者。麝香一錢。研水服之。日三自消。(夏子益奇疾方)

⑭催生易產。麝香一錢。水研服立下。(續千金方) 濟生勝金散。治人弱難產。麝香一錢。豆豉一兩。以舊青布裹之。燒紅爲末。以秤錘淬

酒服二錢。卽下。郭稽中云。婦人產難及橫逆生者。乃兒枕破而敗血裹子。服勝金散。逐其敗血自生也。

⑮治死胎不下。麝香當門子一枚。桂心末二錢。溫酒服卽下。(本事方)

⑯治痔瘡腫毒。麝香當門子。印城鹽等分。塗之。不過三次。(外臺祕要方)

⑰治鼠咬成瘡。用麝香封之妙。(經驗方)

⑱治蠶咬成瘡。蜜調麝香傅之。(廣利方)

⑲治山嵐瘴氣。水服麝香三分解之。(集簡方)

⑳治蟲牙作痛。香油抹筋頭。麝香末。綿裹炙熱咬之。換二三次。其蟲卽死。斷根甚妙。(醫方摘要方)

用量 三分至一錢。

施用宜忌 凡非氣壯邪實者。及勞怯與孕婦等。禁用。忌大蒜。

參攷資料 ①麝香入脾。治內病。凡風病在骨髓者。宜用之。使風邪得出。若在肌肉。用之。反引風入骨。如油入麵之不能出也。(李杲)

②五臟之風。不可入麝香。以瀉衛氣。口鼻出血。乃陰盛陽虛。有升無降。當補陽抑陰。不可用腦。腦輕揚飛。戴之物。婦人以血爲主。凡血海虛而寒熱盜汗者。宜補養之。不可用麝香之散。琥珀之燥。(朱震亨)

③中風不省者。以麝香清油灌之。先通其關。則後免語塞癱瘓之證。而他藥亦有效也。(嚴用和) ④嚴氏言風。風必先入麝香。而丹溪謂風病血病。必不可用。皆非通論。蓋麝香走竅。能通諸竅。之不利。開經絡之壅遏。若諸風諸氣。諸血諸痛。驚癇。癱瘓。諸病。經絡壅閉。孔竅不利者。安得不爲引導以開之。通之耶。非不可用也。但不可過耳。濟生方治食瓜果成積作脹者。用之。治飲酒成消渴者。用之。云果得麝則壞酒得麝則敗。此得用麝之理者也。(李時珍) ⑤麝香不可近鼻。有白蟲入腦。患癩。久帶其香。透關令人成異疾。(李廷飛) ⑥麝生中臺山谷。及益州雍州山中。春分取香生者。益良。(別錄) ⑦麝形似鼯而小。黑色。常食柏葉。又蛇蝥其香。正在陰莖前皮內。別有膜袋裹之。

酒服二錢。卽下。郭稽中云。婦人產難及橫逆生者。乃兒枕破而敗血裹子。服勝金散。逐其敗血自生也。

⑮治死胎不下。麝香當門子一枚。桂心末二錢。溫酒服卽下。(本事方)

⑯治痔瘡腫毒。麝香當門子。印城鹽等分。塗之。不過三次。(外臺祕要方)

⑰治鼠咬成瘡。用麝香封之妙。(經驗方)

⑱治蠶咬成瘡。蜜調麝香傅之。(廣利方)

⑲治山嵐瘴氣。水服麝香三分解之。(集簡方)

⑳治蟲牙作痛。香油抹筋頭。麝香末。綿裹炙熱咬之。換二三次。其蟲卽死。斷根甚妙。(醫方摘要方)

用量 三分至一錢。

施用宜忌 凡非氣壯邪實者。及勞怯與孕婦等。禁用。忌大蒜。

參攷資料 ①麝香入脾。治內病。凡風病在骨髓者。宜用之。使風邪得出。若在肌肉。用之。反引風入骨。如油入麵之不能出也。(李杲)

②五臟之風。不可入麝香。以瀉衛氣。口鼻出血。乃陰盛陽虛。有升無降。當補陽抑陰。不可用腦。腦輕揚飛。戴之物。婦人以血爲主。凡血海虛而寒熱盜汗者。宜補養之。不可用麝香之散。琥珀之燥。(朱震亨)

③中風不省者。以麝香清油灌之。先通其關。則後免語塞癱瘓之證。而他藥亦有效也。(嚴用和) ④嚴氏言風。風必先入麝香。而丹溪謂風病血病。必不可用。皆非通論。蓋麝香走竅。能通諸竅。之不利。開經絡之壅遏。若諸風諸氣。諸血諸痛。驚癇。癱瘓。諸病。經絡壅閉。孔竅不利者。安得不爲引導以開之。通之耶。非不可用也。但不可過耳。濟生方治食瓜果成積作脹者。用之。治飲酒成消渴者。用之。云果得麝則壞酒得麝則敗。此得用麝之理者也。(李時珍) ⑤麝香不可近鼻。有白蟲入腦。患癩。久帶其香。透關令人成異疾。(李廷飛) ⑥麝生中臺山谷。及益州雍州山中。春分取香生者。益良。(別錄) ⑦麝形似鼯而小。黑色。常食柏葉。又蛇蝥其香。正在陰莖前皮內。別有膜袋裹之。

酒服二錢。卽下。郭稽中云。婦人產難及橫逆生者。乃兒枕破而敗血裹子。服勝金散。逐其敗血自生也。

⑮治死胎不下。麝香當門子一枚。桂心末二錢。溫酒服卽下。(本事方)

⑯治痔瘡腫毒。麝香當門子。印城鹽等分。塗之。不過三次。(外臺祕要方)

⑰治鼠咬成瘡。用麝香封之妙。(經驗方)

⑱治蠶咬成瘡。蜜調麝香傅之。(廣利方)

⑲治山嵐瘴氣。水服麝香三分解之。(集簡方)

⑳治蟲牙作痛。香油抹筋頭。麝香末。綿裹炙熱咬之。換二三次。其蟲卽死。斷根甚妙。(醫方摘要方)

用量 三分至一錢。

施用宜忌 凡非氣壯邪實者。及勞怯與孕婦等。禁用。忌大蒜。

參攷資料 ①麝香入脾。治內病。凡風病在骨髓者。宜用之。使風邪得出。若在肌肉。用之。反引風入骨。如油入麵之不能出也。(李杲)

②五臟之風。不可入麝香。以瀉衛氣。口鼻出血。乃陰盛陽虛。有升無降。當補陽抑陰。不可用腦。腦輕揚飛。戴之物。婦人以血爲主。凡血海虛而寒熱盜汗者。宜補養之。不可用麝香之散。琥珀之燥。(朱震亨)

③中風不省者。以麝香清油灌之。先通其關。則後免語塞癱瘓之證。而他藥亦有效也。(嚴用和) ④嚴氏言風。風必先入麝香。而丹溪謂風病血病。必不可用。皆非通論。蓋麝香走竅。能通諸竅。之不利。開經絡之壅遏。若諸風諸氣。諸血諸痛。驚癇。癱瘓。諸病。經絡壅閉。孔竅不利者。安得不爲引導以開之。通之耶。非不可用也。但不可過耳。濟生方治食瓜果成積作脹者。用之。治飲酒成消渴者。用之。云果得麝則壞酒得麝則敗。此得用麝之理者也。(李時珍) ⑤麝香不可近鼻。有白蟲入腦。患癩。久帶其香。透關令人成異疾。(李廷飛) ⑥麝生中臺山谷。及益州雍州山中。春分取香生者。益良。(別錄) ⑦麝形似鼯而小。黑色。常食柏葉。又蛇蝥其香。正在陰莖前皮內。別有膜袋裹之。

少者。品質必惡。或有偽造之疑。因如雜有澱粉類或草根木皮之粉末等物。在顯微鏡下一覽即可分明也。試藥溶解量。用伊打、石油、伊打、偏醇、酒精、稀酸類溶解。百分之中祇溶解八分九至十八分。水溶解量。最良之品。可溶解百分之五十至六十。憑此鑑別精粗。最爲便利。灰分量。最良之麝香。亦多雜鉛、鐵、水銀、砒及其他金屬。若粗劣之品。金屬極微。至多不過在百分之三以上。此即可斷爲人工偽造。物質品攪和之狀況。有尿臭或臭。臭者。或祇攪皮粉。或加最良之麝香。使之適度。此等偽造物品。欲其色澤逼真。則以砂研和。或細碎紫檀木屑拌入。蓋紫檀木理緻密。既可加重。且現紅色。乃有益無害之品也。亦有攪和動物性細粉者。最多即用麝香皮細剉。炒爲粉末。或即用白毛皮。或鹿鞭皮製之。誠匪夷所思矣。○張澤霖曰。麝之性味辛溫。寒症用以配合。固無妨礙。熱症而純用一味。或配辛燥之品。則非但無益。而且有害。必也以其他涼性參合。如紫雪、牛黃之屬。

庶乎無虞。考麝。古書言其形狀甚多。特錄數則於下。說文云。『如小麋。膺有香。一名射父。』爾雅釋獸。則『麝父。麝足。』字林曰。『小鹿有香。其足似麋。故云麝足。』字彙註。『獸如小麋。身有虎豹之文。膺有香。爲人所迫。即自投高巖。舉爪剔出其香。就繁且死。猶拱四足保其膺。故象退齒。鹿退角。麝退香。皆輒掩覆。如其珍也。』今人以其價貴。每用贗品混充。以香貓腎囊一個。攪和辛夷、荔枝核等末。辨別之法。一嗅其香氣。真者氣味襲人。日久不散。僞者不但不能襲人。且嗅之稍久。而香氣已散。二以火試之。真者彈於火上。如燃人髮。奇香四溢。其質爆裂。僞者非惟無香。更且如同灰燼。亦不燥烈。

近人學說 鄭訓曰。中國麝香。爲各種麝香冠。以雲南產者爲尤佳。香氣佳良。其氣極烈。毫無尿臭。及阿姆尼亞臭。氣。而有永留不散之特性。囊成圓形。接連腹筋之面。平坦無毛。外成凸面。有粗硬之毛。中央開口處。有微褐色旋縮之毛。囊之本身。乃由二種筋皮及三層

薄膜組成。中含褐色麝香。大如櫻桃。或豌豆樣。質極易破碎。白毛麝香。產於蒙古及西伯利亞。經中國輸入日本。經俄國輸入歐洲。西人曰。西伯利亞麝香。或加排兒地麝香 (Moschus Sibiricus S. Cabardinus)。此品非採於麝。乃採自壁。白毛非圓形。乃略橢圓形。二面之毛帶白色。周邊之毛類褐色。其內部麝香。柔軟帶有尿臭。及阿姆尼亞性臭。氣。不及中國麝香遠矣。東京麝香。乃在日本販賣。日本人曰。日本麝香。西人曰。東京麝香。恐即西藏麝香。經中國輸入日本者。此麝囊圓形。或略橢圓形。其上面向中央。假伏成穹隆狀。下面平坦。帶類黃色之毛。邊周着白色剛強之毛。大抵帶溼氣。有黏着性。其內部麝香。常呈膜呈軟膏樣。間有顆粒狀者。香氣佳良。略帶阿姆尼亞性臭。氣。偏加兒麝香。外觀類中國產者。麝囊較大。毛棕紅色。香氣薄弱。類西伯利亞產者。波拉哈產麝香。乃採自麝香鼠之腺。名爲美國產麝香。亦有人販賣之。但用途不廣。模造麝香。貼附獸毛。巧儼

者。其殼如豬脬亦佳。四川松盤山出名。蠟蝠香皮厚有毛亦佳。雲南有一種無殼散香。色黑有顯氣者。次大抵聚於蜀之打箭爐者。名川香。聚於雲南者名雲香。陝西之蘭州者名芥州香。皆良。其形圓香氣濃厚。歷久不散。產於張家口以外歸化城。以及內外蒙古者。名西口蠟蝠香。產於東三省。聚於營口者。名東口蠟蝠香。其形皆扁。氣味微薄而帶顯氣。略次。蓋麝香真色。乃紫紅與墨色。近世作偽者。將少許蠟蝠香。雜以多數之香料屑末。攪入。且加以相當之顏料。形似真者。彷彿辨別真偽者。大抵鼻嗅香氣。芬烈與微薄。以香料之香。與麝香之香。顯能分別。况真者氣味不但襲人。且日久不散。偽者香不能襲人。稍久嗅之。已乏香氣。尙有試法。亦可主判真偽。以熾炭火上將香少許彈於炭火上。真者如燃人髮。其實爆烈。奇香四溢。偽者不但無香。且質如灰燼而爆烈。以此試之。立分真偽。麝香內結有圓粒。或長扁形。外紋光滑堅碎之香氣。逾常。即名當門子。其功力較散香勝

數倍。亦有人工造作者。亦可試之。將當門子泡滾水內。真者依然堅結。偽者即化開矣。⑤和漢藥考曰。麝香偽製之品。自昔爲多。業此者百計千方。苦心鑑別。正恐自誤而誤人也。已故藥劑師蘇島松兵衛者。與其祖俱精斯業。審察真贋。造詣最深。嘗出其多年之經驗。著爲論說。演之講壇。俾藥業中人。驟獲參考之資料。茲錄其筆記如左。麝香之爲用。入藥材充香料。大抵粗劣之品。概作香品之原料。若入藥材。則物品之良醜。關係匪細。有人於此。奄奄欲斃。此時醫者處方。用麝香。龍腦。俾恃其興奮之效力。得以回蘇。則藥舖之責任重大。果何如哉。此余所以不憚喋喋也。自實際上考察之一。爲本口麝香。日本東京轉銷。一爲薄皮麝香。亦在東京轉銷。與本口爲相同之物質。惟薄皮者發育極盛。去其表皮。便無他異。一爲雲南麝香。上海出口。爲厚皮之物。乃一種同質異形者。一爲括圓麝香。上海出口。以豬膀胱或油紙包裝。驟視之。與除去表皮之本口相仿。實則概係人工製造

品。歐美人呼此爲東京產。白毛麝香。產於亞洲北部之西伯利亞。及俄國各地。出此香之獸。非麝。乃鼯也。如上海、高麗、烏拉港等。各口岸俱運銷之。計兩種。其一爲白毛。表皮緣之一側。有硬白毛極多。其似腿之處。內皮薄而軟。皮中充滿麝香。其一亦爲白毛。又名鼯香。香味與上一種相似。然有光澤。又有或當門子。品出前種之上。貴物也。其白毛。又稱鼯香者。囊中充滿白毛。品質粗惡。殆人造物也。要之雲南本口。薄皮。括圓。四種。品物大有高下。雲南麝香。表皮與內皮之間。有線縫之。內外俱不能觸知。必割開方能見之。蓋縫於皮與皮之中心也。又有將皮之中心。仿其形狀。穿有薄而深之溝。流入泥土或鉛者。從前囊中僅打進鉛子。或鉛條。今則已不多見。此外尙有攪和酸化鉛。鐵粉並其他物質者。凡此作偽多端。均可以指探捫而知之。如皮之厚薄。重量。容積等。猶其顯然易知者。也。更有一物不雜。而但使其溼潤者。按溼潤之弊有二。其一可使皮輾而薄。一若囊中麝香極多。

其二。可使重量增加。本口麝香。殆無上述諸弊。且本口與白毛。驟視之。雖易誤認。實則白毛。概有硬白毛。鼯爲長形。本口無白毛。外皮較圓。而且扁平。老練家一經寓目。便可斷定。其孰爲劣品。孰爲佳品。大抵皮多而麝香少者。約如雲南之半價。薄皮麝香。如雲南麝香之縫法。所異者。內尙有同質之皮。將麝香糊封其中。麝香之品位。在中上部。與下部之間。至括圓。則不問優劣。要皆係人造之麝香。外以豬膀胱或油紙包裝。粗劣愈甚。以刀割開其囊。往往有小蟲走出。狀似蠅而極細。以上諸種。有發異臭者。有作屎臭者。有於夏秋間易流動者。有皮質非常肥厚如海綿者。有皮薄而麝香實少。即老練家亦爲所蒙者。要須視麝香之品位。與其多少而定。貴賤耳。十年前學術膚淺。曾以麝香試驗。費至半兩之多。當時所得成績。頗爲可觀。今已散失。無存。姑舉能記憶者如下。顯微鏡檢查所得最良之品。於黑褐色。不整齊。如岩之處。每見有黃色或帶黃褐易流動。如樹脂之斑點。斑點

鷺之禽獸。其所遺矢多有麝香氣。後此果捕獲異鼠。定當割其香囊風乾試驗。究否與麝香有同一之效云。(錄明治十二年工業新報第六十六號)又和漢藥考曰。麝香考云。竹內保德言。唐太島山中有一種香鷺。長二三寸。色黃黑。香氣如麝。驗之。囊中有毛骨。詢之士人曰。貂蟬也。或謂是麝。蓋者誤。按貂一名松狗。(爾雅)一名松鼠。(留青日札)此獸常食松實。(本草綱目)故其糞香又好食華金鼠。(松浦弘說)故糞中多毛骨。詳保德所云。其香如麝。因考本草纂疏。及日光志等所載之麝。又稱靈貓。蓋者其爲貂蟬無疑。按麝香質品如是之多。若多得貂蟬製造。則賢於其他質品遠矣。又曰。日本及歐美各國。俱不產之。專產於東亞及中亞。如阿爾泰山脈之山中。及北緯三十度至四十度之中國雲南、西藏等處。又曰。以化學法試驗。麝香投入沸湯。過半溶解。僅餘四分之一渣滓而已。此水溶液。遇硝酸及醋酸鉛。則生沈澱。遇昇汞。則否。亦不瀝濁。燻之餘灰。分百分

之五六。灰作鼠白色。若雜有他物。多現褐色或黃色。灰分中主爲加里、石灰、苦土。並鐵少許。又曰。相傳中國人偽造麝香。每以香鼠爲混合物。此獸之應用。局部今尙不明。茲錄宮崎柳條之說如左。長崎有物名麝香鼠者。常宿於廚竈之砧板下。一日爲庖人捕。三頭試畜之。形同家鼠。惟目鼻與豚似。鼠目無瞳。日中不明。目且極小。僅如罌粟子。大後有一穴。莫辨牝牡。食蚯蚓、魚肉。或餌以米穀。長崎之東有嶺曰日觀。欲攜去。踰此嶺即死。乃命工寫真爲圖。此鼠臭氣竄鼻。啼時尤甚。惟遠嗅之。略似麝香氣。臭入食器。立被傳染。雖屢滌。如故。啼聲似蝙蝠而大。如曰吉吉。故時陽俗謠。謂此鼠啼時必吉。不可殺之。

辨偽 鄭有麝曰。麝形似獾而小。色黑。常食柏葉及蛇蟲。其香在臍。故名臍香。又名當門子。生陰莖前皮內。別有膜袋裹之。至冬香滿。入春臍內急痛。自以爪剔出。覆藏土內。此香最佳。但不得今。惟得活者看取。必當全真。出荒夷

者最好。出隋郡義陽晉溪諸蠻中者。亞之。出益州者。形扁多偽。凡真香一子分作三四子。刮取血膜。雜以餘物。裹以四足膝皮而貨之。今貨者又多偽。聞土人多以香貓腎爲充。考劉侗西域記有云。黑契丹出香貓。糞溺皆香。如麝氣。故有取其糞。用雜獸血膜。偽造爲麝香。近又有以荔枝根爲灰。裝入真麝香皮袋中。混售。貽害不淺。凡入藥須辨真者。用之。曹炳章曰。按麝爲壯鹿類。而無角。其尾甚短。如山羊。嘴之上。稜牙如野猪。其種大小不一。皮毛之色。生而數變。初鱗色與褐黑色。繼變紅褐。至白灰色而老矣。全身生毛。惟嘴無毛。鬚其旁面有縱長之斑點。背多橫紋。然形狀雖笨。而腿力甚速。故獵捕甚難。腹下之臍。即名臍囊。割破其囊。即得麝香矣。其肉因香氣芬烈。土人視爲美味。其囊之大小。關乎麝之年歲。與強弱。產地首推西藏高山中。或喜馬拉亞山。以及雲貴等省之山內。東三省與蒙古亦產之。黃河以南。雖產似麝。其實本草所謂香狸。非麝也。羌海雜誌云。青海江拉

希拉之間。重巖巖。產麝尤多。大抵山有香麝。必有香氣。遠聞之香烈。而略帶腥。忽隱忽現。若即若離。麝穴愈近。而其腥愈不可聞。循其氣味而尋之。百不失一。麝臍最穢。常流血液。天日晴時。必仰臥於草地。而曝其臍。臍眼突出。大如鉢。腥臭異常。蚊蠅蟻蚋飛集。蝕之。臍眼突然縮入。微蟲穢如糞粉。一日數次。脂漸凝厚。此謂草頭。藥肆常用之。品也。曾吸入蜂蝎蜈蚣毒蟲類者。臍有砂點。謂之紅頭。麝其品已高。最貴者曰蛇頭。麝毒蛇吮其臍。臍痛而力吸。跳躍狂奔。蛇身伸屈盤結。堅不可脫。須臾蛇身截然而斷。首即腐爛於內矣。臍有雙紅珠。是爲蛇眼。得此配藥。其香經久不散。醫治毒症。功效無比。經仲淳云。香有三品。一曰道香。是臍臍閉滿。自於石傍用蹄尖揮落者。爲最佳。其地草木枯焦。二曰膝香。亦佳。三曰心急香。被諸獸驚恐。遺落取得。見心流脾結。作一血塊。隔山間亦有香氣。此三者皆爲佳品。今時以陝西哈密出者。其色黃香。味濃厚者。佳。山西五台山羊來出

種名中國麝香。出自西藏者。皮囊及毛。俱作赭褐色。出自雲南者。品最佳。一種名俄國麝香。出於西伯利亞及俄國各地。皮囊及毛。俱作鼠白色。至日本所有之麝香。專仰給於中國。從前藥舖處理此物。所分品類極多。詳見遠西醫方名物考。摘錄如下。麝香之香囊與皮毛之形色大小。種種不一。即係上品。香中尚有毛雜入。其氣味色質等。亦大有出入。由此觀之。香囊不免有以麝皮或他獸皮擬造者。一囊之香。雜以他物。亦竟可分作數十囊。嘗見藥舖所賣之麝香。一斤須香囊三十個。每年運銷日本者。斤數已屬不少。其餘運銷印度及歐美各國者。歲更不知幾千萬斤。香囊亦不知幾萬億。此匿居深山幽谷之異獸。既非輕易可獲。縱令得之一囊。亦僅有一囊可採。其數烏得有若此之多。謂非夾雜贗造。其誰信之。姑懸此說。用質疑於來者。或謂中國禁令甚嚴。真品決不准輸入他邦。且其價貴。與銀對換。故真者絕少。按今日日本藥舖所售之中國產麝香。核諸西說所述。大略

相符。因西說大可以鑑別真贗也。而樂只享之說。亦足以備考證焉。樂只享之言曰。麝香在有毛之皮囊中。完全無損。藥舖呼為麝香。其囊皮即為麝香皮。麝香在囊中時。形如碎粉。出囊則呼為麝香。藥舖出售者有三等。上等曰本口中。等曰間山下。等曰白毛。本品囊圓。煤色。徑一寸二分。至一寸四分。許。小者約七八分。重四五錢至七八錢。側面有茶褐色之細毛。少許。於其無毛處。作十字式切開。內有麝香。如碎粉。色紫黑。如饅頭之細沙。餡一種作黑色。一種香氣極烈。以上碎粉中有大如黑豆之粒。切之覺饅頭是為當門子。此粒多者為最上品。非本口無此物也。一種帶微赤色者。香氣較和。亦屬上等。然僅有碎粉。無當門子。一種黑色。饅頭甚黏。如泥。香氣甚。雖可視為上品。然此必非當門子。是殆間山也。或謂此種多溼潤。其中有如無患子大之圓塊。指按之則柔饅而扁。即非當門子。然以其香氣烈。可作上品。若囊乾毫不溼潤。其中之麝香亦乾而香氣甚者。亦屬上

等。有貯藏數十年之麝香。其囊圓而小。徑祇六分。許。重不過一錢四五分。囊乾而硬。其中麝香如沙。又如白鹽。嚼之亦如沙。香氣峻烈者。上品也。若嚼之如沙而覺枯燥者。必係下品。又嘗見有極大者。囊徑有一寸七八分。重一兩一錢。許。其麝香當是上品。近來此種已不多見。又囊中如有薄膜二三層。形如竹膜者。色如翠羽。有光澤。則膜內之麝香。亦必純良。近見囊中之麝香。往往雜有細毛或鉛子。雜鉛子者。如黑豆大。一囊有三五粒。一說辨別之法。視其囊割下處。有無線縫。為斷有線縫者。屬本口。無則屬白毛。但此說亦不能拘定。白毛。囊扁而橢圓。大如中等之白柿。皮厚而硬。一側有白毛。較本口毛粗而多。且如將長毛剪短者。然一側無毛。皮作茶褐色。其中麝香。色紫黑。或純黑。如碎粉。無當門子。香氣甚弱。與諸藥調和。香氣立即消失。是白毛之極上品也。囊曾見其尤佳者。一枚囊之外面。無毛。皮之包含處。有麻線縫合。形扁圓而大。去線視之。其中空虛。一側遍生白毛。長

三寸許。此乃翻轉有毛之皮而包者也。繼割其皮之底。則見皮裏膜間。有最上之麝香。皆小粒如當門子。色紫黑。香氣峻烈。又見一種。呼為高麗麝香。囊形如白毛。而毛長。所存麝香極少。間山。其囊與麝香之形色。一如本口。惟香氣弱而近。貓亦惡臭。不欲捕之。其香雖不似麝。而有麝香鼠之名。又瓊浦偶筆曰。長崎有異鼠。多穴薰穢之旁。嚙有香似麝。以故上府署之廁。往往香襲人衣。相傳此鼠東踰日觀嶺。便死。有中國人汪姓者。告余曰。此鼠一名臭鼠。唐山亦有之。生於陰溼薰污之地。其目不甚明。往往為人所攫。或云。見之則有喜事。柳條曰。貓亦惡其臭。而不欲捕之。是殆造物故與。以臭使為防身之具歟。一說。獵者割取麝香囊。如經兩三日。猶尚未風乾。則其氣之烈。尤勝於臭。近之不可當。即已乾者。設或過多。嗅之。且然。惟香氣漸減。倘加入他物。或放置遠處。則芬芳襲郁。誠令人愛不忍釋。或謂麝香脫氣者。掛廁中承塵上。數日。香如故。是麝香者。與薰同性之物也。故凡食

作與奮及回蘇業。

作用 至腸被吸收而入血中。使血液流動增進至腦而激大腦神經。令精神異常興奮。然時間甚短。萬不及番木鱉之能延長數日之久也。

主治 辟惡氣。殺鬼精物。去三蟲。蠱毒。溫瘧驚癇。久服除邪。不夢宿寢。瘰癧。本經療諸凶邪鬼氣。中惡心腹暴痛。脹急痞滿。風毒去面。顯目中膚。婦人產難。墮胎。通神仙。(別錄)

歷代記述攷證 【南北朝】陶弘景本草集註論麝香曰。佩服及置枕間。辟惡夢。及尸疰鬼氣。又療蛇毒。【唐】甄權藥性本草論麝香曰。熱水研服一粒。治小兒驚癇客忤。鎮心安神。止小便利。又能蝕一切癰瘡膿水。【唐】孟詵食療本草論麝香曰。除百病。治一切惡氣。及驚怖恍惚。【宋】日華諸家本草論麝香曰。治蛇蠍咬。沙蟲溪瘴毒。辟蠱氣。殺臟腑蟲。治瘧疾。吐風痰。療一切虛損。惡病。納子宮。暖水臍。止冷帶下。【元】王好古湯液本草論麝香曰。療鼻塞。不聞香臭。【明】李

時珍本草綱目論麝香曰。通諸竅。開經絡。透肌骨。解酒毒。消瓜果食積。治中風中氣。中惡痰厥。積聚癰瘕。【明】繆希雍本草經疏論麝香曰。陶弘景云。麝常食柏葉。又嗽蛇子。以爲其香必非因嗽蛇而結。蘇頌乃云。夏月食蛇多。至寒則香滿入春。臍內急痛。自以爪剔出。陶云。五月得香。往往有蛇皮骨。豈有食蛇逾一年。而皮骨尚不化者乎。不知麝乃山獸。好食香木芳草。如柏葉之類。故其氣聚於臍而結成。是香。或遇蛇亦嗽。但不結香耳。如必嗽蛇多而後有香。則此藥必大毒難近之物。安得味辛氣溫無毒耶。甄權言苦辛。其香芳烈。爲通關利竅之上藥。凡邪氣着人。淹伏不起。則關竅閉塞。辛香走竅。自內達外。則毫毛骨節俱開。邪從此而出。故主辟惡氣。殺鬼精物。凶邪蠱毒。溫瘧中惡。心腹暴痛。脹急痞滿。風毒諸證也。其主癰瘕者。借其氣以達於病所也。苦辛能殺蟲。故主去三蟲。辛溫主散。故能去面蠱及目中膚翳。性能開竅。故主難產墮胎也。走竅之性。而云久服除邪。不夢寐。

覺寐通神仙者。凡香皆能辟除惡氣而通神明。故有是功能也。日華子云。納子宮。暖水臍。止冷帶疾。藥性論主小兒驚癇客忤。蝕一切癰疽膿水。今人又用以治中風中氣。中惡痰厥。并什藥入膏藥傳藥。皆取其通竅開經絡透肌骨之功耳。

【清】黃宮繡本草求真論麝香曰。麝香辛溫芳烈。開關利竅。無處不到。如邪氣着人。淹伏不起。則關竅閉塞。登時眼翻手提。僵仆昏地。故必用此辛香。自內達外。則毫毛骨節俱開。而邪始從外出。是以邪鬼精魅。三蟲諸毒。皆能治也。諸風諸氣。閉之關竅。而不用此驅除。則病安祛。但不可過爲用耳。至於婦人難產。墮胎尤善。小兒驚癇客忤。鎮心安神。鼻塞不聞香臭。服此即開。目疾內翳。點此即除。痔漏惡瘡。面黑斑疹。豎鼠咬蟲傷。成瘡用麝封固。即愈。瘡疔開之。亦貼服之。即發藥之辛香。雖同冰片。然冰片入口貼肉即冷。稍煩熱性。即發。不似麝香。香氣慄烈。入耳與肉而不冷耳。欲辨真偽。須於火炭上有油滾出。而成焦黑者。此即肉類屬真。若假則化白灰。而爲木類也。研用。凡使麝香。用膏門子尤妙。忌蒜。不可近鼻。防蟲入腦。

國外學說 日本學說謂內服少量。不呈作用。服大量則心悸亢進。精機能過敏。胃部起溫熱之感。且被壓迫。又能增多諸腺之分泌。及發汗利尿。甚或頭痛眩暈。據日本藥局方。爲興奮藥。用於衰弱症。如熱性病之虛脫。宜用之一回。自〇・〇五至〇・五和於白糖。或爲乳劑。此外爲芳香藥。又第四版改正日本藥局方載麝香爲瘰癧中之分泌物。新鮮者稍柔軟。乾則爲顆粒狀之塊。色黑褐或深赤褐。香氣異常強烈。以松節油浸之。用顯微鏡檢視。則見其碎片及塊片。大略均勻。質半透映。色褐。毫無他物夾雜其間。此物有安母尼亞臭。氣但甚微。試燃燒成灰。其遺留之硬固性。百分中不至八分以上。又和漢藥考曰。麝香之品類。隨麝香鹿棲息地方之氣候食物而異。兼因麝香乾燥法。調製法等。而不同。雖未能一一辨別。總之品類頗多。在貿易上。則大概分爲兩種。一

一九三七

賦。煮炙食之。頓盡一枚。至驗。

【鸛鵒】即鸛鵒之古籍別名。典見

爾雅。詳「鸛鵒」條。

【鵒鵒】即鵒鵒之古籍別名。典見

綱目。詳「鵒鵒」條。

【鵒】即鵒之古籍別名。典見綱目。

詳「鵒」條。

【鸛】古鸛別名。鵒。鵒。鵒。鵒。

【鸛】(綱目)

形。鸛爲原禽。類鸛雞屬之一種。與鸛同種而異類。亦爲候鳥

之。一羽黑如鸛而無斑點。頭脚皆

長。常棲茅葦間。捕食魚蟲諸物。其

肉可供藥用。

性質 甘平。無毒。

主治 諸瘡陰腫。煮食去熱。

【鸛雀】即鸛。詳「鸛」條。

【鸛鵒】即百舌之古籍別名。典見

綱目。詳「百舌」條。

【鵒】即食鹽之古籍別名。典見綱

目。詳「食鹽」條。

【鵒蓬】出河北鹽地。爲雜草類之

一種。割取燒灰淋湯可煎鹽。與鹽

蓬同。詳「鹽蓬」條。

【麝干】即射干之古籍別名。典見

和漢藥考。詳「射干」條。

【麝肉】

性質 甘溫。無毒。

主治 腹中瘕病。

參攷資料 麝肉。蠻人常食之。

似蟹肉而腥氣。云食之不畏蛇毒

也。(孟詵)

【麝男】即甘松之古籍別名。典見

和漢藥考。詳「甘松」條。

【麝香】

命名 本品之香氣能

遠射故名。麝形似獐。俗

有香獐之稱也。

處方用名 原麝香。原寸香。當

門子。

古籍別名 射父香。(爾雅)香

麝香。(綱目)最佳者名元寸香。麝

香。麝堂。麝臍。麝香。四味臭

拔萃園。莫詞婆伽。(和漢藥考)

外國名詞 Moschus (拉

丁) Musk (英) Moschus, Ba-

am. (德)

基本 屬哺乳獸雙蹄類之麝

鹿。爲牡獸。臍中與陰部間二腺囊

分泌之香油。

產地 陳仁山藥物生產辨云。

麝香產四川打箭爐爲正地道。雲

南亦可。西藏次之。乃麝狗之臍。出

無定時。味清香。又有一種名北麝。

又名西麝。又名蘇麝。產張家口爲

上。牛莊次之。身扁。氣味類馬尿。

比四川雲南西藏者大不如也。

形態 麝體如尋常之鹿。但矮

小似野羊。身長三尺。高二尺許。全身

灰褐色。生長毛。自頸至脚。有白斑

二條。無角。無淚竅。耳長如兔。面頗

長。上顎之犬齒突出吻外而向下

長及三寸。晝間隱伏不出。入夜始

出而覓食。芳草性懦怯。然善跳躍

雖六丈闊之溪崖。亦能一躍而過

逐之過急。則窘而隱竄。牡者有一

腺囊。在臍與陰部之中間。充滿分

泌物。即名麝香。其囊謂之香臍。獵

者捕獲此獸。立即割下腺囊。惟因

香氣峻烈。須先以布帛遮蔽口鼻。

然後採取。否則往往頭痛。甚者致

死。故獵者割取腺囊之時。最須留

意。萬不可誤損其囊云。其香臍爲

似囊之包皮。腺形卵圓或輪圓。小

者如金橘。大者若雞卵。下扁平。上

陷。凹有毛被之中央有一小孔。毛

密而迴旋爲放線狀。外皮似革。囊

膜殊薄。剝之有兩層。膜中藏有香

液。新鮮之際。稠厚如蠟膏。乾則爲

大小不等之顆粒。於水可溶解。四

分之三。於酒精稀溶解二分之一。

近嗅之。發一種異常峻烈之臭氣。

遠聞之。轉覺芳香可愛。味苦。遇硫

黃木炭。動物炭等。其臭即消矣。

種類 ①生香即遺香。乃麝自

剔出者。蓋其香滿於臍。入春臍內

急痛。以自爪剔出。著屎尿中覆之。

常在在一處不移也。②臍香。乃獵人

捕殺牡麝取得者。③心結香。乃其

被大獸捕逐。驚畏失心狂者。墜死

被人覓得。破心見血。流出脾上。乾

作血塊者。此品不堪入藥。④水麝

香。乃臍中皆水。以針刺臍。滲一滴

於斗水中。用酒衣物。其香不歇。針

臍後。捻以真雄。則臍復合。此品近

不復有。或有之人。亦不識矣。

採取 每年春季。覓採生者。良

餘時。獵捕麝香者次之。

製法 雷斅曰。凡使麝香。用當

門子尤妙。以子日開之。微研用。不

必苦細也。

性質 辛溫。無毒。

成分 成自揮發性未詳之有

效成分。及脂肪。膠質。蛋白質。纖維

質。無機鹽類。安母尼亞。水分等。

效能 通竅。辟穢。搜風。逐邪。用

〔日本〕

基本 係脊椎動物鳥類涉禽類鵝科。

產地 出東三省。及西伯利亞諸地。

形態 鵝爲水禽類候鳥之一種。生活最適宜於溫帶地方。冬則南來。春則北返。其形如鸞。嘴長而堅硬。色綠而頭頂赤色。軀幹亦極全體純白。尾端黑色。額頰咽喉及頸與翼尖亦黑色。高約三四尺。足及趾與頸皆長。趾無蹼。翼大飛翔甚捷。又好涉游。棲水濱。覓食魚介蟲物。其血可供藥用。



鵝

採取 以白鵝者良。

性質 鹹平。無毒。

主治 益氣力。補虛乏。去風益肺。

〔鵝卵〕

性質 甘。鹹平。無毒。

主治 預解毒。多者令少。少者令不出。每用一枚。煮與

小兒食之。

〔鵝肫中砂石〕

主治 磨水服。解毒。解蟲毒邪。

〔鵝骨〕

主治 煎炙入滋補藥。

〔鵝翎草〕 卽翠羽草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「翠羽草」條。

〔鵝頂〕 卽鵝肫之古籍別名。典見綱目。詳「鵝肫」條。

〔鵝頂紅〕 卽楊梅之古籍別名。典見和漢藥考。詳「楊梅」條。

〔鵝頂草〕 卽藜之古籍別名。典見土宿本草。詳「藜」條。

〔鵝腦〕 主治 和天雄葱實服之。令人目明。夜能書字。

〔鵝蝨〕 命名 本品係天名精。卽杜牛膝之所結子實。形小而長。有刺。善螫人衣。勢似於蟲故名。

基本 屬菊科鵝蝨之子實。

產地 凡山谷川澤及原野間。恒多生焉。

形態 鵝蝨爲山野自生之宿根草。莖高二尺餘。根生葉叢。生地上。形狀似煙草葉。邊緣稍有鋸齒。有皺毛。有一種強烈氣味。夏月於

葉腋開黃花。如野菊花。後結實。呈褐黑色。

採取 八月採之。

製法 凡使須微炒。香入藥用。

性質 苦。辛。有小毒。

效能 殺蟲。治疳。專作殺滅諸蟲之要藥。

主治 蚊蠅爲散。以肥肉臚汁服。方寸匕。亦入丸散用。

歷代記述攷證 〔宋〕開寶重定新本草論鵝蝨曰。蟲心痛。以淡醋和牛匕服。立瘥。〔宋〕大明諸家本草論鵝蝨曰。殺五臟蟲。止癰。傳惡瘡。〔清〕黃宮繡本草求真論鵝蝨曰。鵝蝨氣味苦平。功專入肝除逆。故凡一身痰凝氣滯。得此苦以疎泄。則痰氣頓解。而蟲自無安身之地矣。況蟲得苦則伏。如小兒蚊蠅腹痛。用以鵝蝨研末。納於肥肉汁中調服。其蟲自下。非其蟲因苦逐。曷克有是。但藥肆每以藜蘆童子代充。不可不辨。

配合應用 ①治大腸蟲出不斷。斷之復生。行坐不得。鵝蝨末水調半兩服。自愈。〔怪疾奇方〕

②療蚊咬心痛。取鵝蝨十兩。搗

篩蜜丸。梧子大。以蜜湯空腹吞四五十丸。忌酒肉。草雲。患心痛十年。不瘥。於雜方內合服之。便愈。〔初虞世古今錄驗方〕

③治小兒蚊蠅心腹痛。亦單用鵝蝨研末。以肥猪肉汁下之。五歲一服二分。蟲出卽止也。〔李絳兵部手集方〕

用量 八分至錢半。

〔鵝頭紅〕 卽楊梅之古籍別名。典見和漢藥考。詳「楊梅」條。

〔鵝鳩〕 卽鵝嘲之古籍別名。典見左傳。詳「鵝嘲」條。

〔鵝嘲〕 命名 凡鳥朝鳴曰嘲。夜鳴曰鵝。鵝喜朝鳴。故名。

古籍別名 鵝鳩。風鳩。〔爾雅〕鵝鳩。〔左傳〕鵝鳩。阿鵝。鵝鷄。〔綱目〕

產地 出深林間。

形態 鵝嘲爲林禽類之一種。形似山鵝。而小。尾短。有青毛冠。羽色青黑。飛翔不遠。春來秋去。好食桑椹。其肉可供藥用。

性質 鹹平。無毒。

主治 助氣。益脾胃。主頭風目

一九三五

二一畫 鵝

邊略略揭起些須，用力急揭去，痔
根便帶出也。但揭出痔根時，極痛
無比。非醉飽即暈倒也。（陳氏傳
方）水疔用鱗魚鰓下近腹處有
種，體如鰓而腹平，頭如錠而口大
，頰如鮎而色黃，鱗如鯽而稍細，大
者三四十斤，性喜獨行而啖同類
，其肉可供藥用。

③治下疳。鱗魚鱗焙乾煨研。白色名白龍丹。敷之即愈。得此可包醫。(救生苦海方)

●治血瘰蔡雲白言人生血瘰挑破。血出不止者。用鱗魚鱗貼之。卽癒而愈。

魚。〔鰓魚〕
原名 鰓魚。
古語別名 鰓魚。黃頰。

產地 生江湖間。
形態 鯪魚爲鱗類魚屬之一。

種。體如鰐而腹平。頭如鮐而口大。頰如鮎而色黃。鱗如鱗而稍細。大者三四十斤。性喜獨行而啖同類。其肉可供藥用。

性質 甘平無毒。
主治 止嘔暖中益胃。

【鰯魚】即鮓魚之古籍別名。典見綱目詳『鮓魚』條。

【鰓魚】即鰓魚之古籍別名。典見本草拾遺。詳『鰓魚』條。

【鰐𩺰】即烏藥之古籍別名。典見綱目。詳『烏藥』條。

【鱈】即海鰻之古籍別名。典見爾雅。詳『海鰻』條。

【鷓鴣】即鷓鴣之古籍別名。典見爾雅。詳『鷓鴣』條。

【鶇雞】

古籍別名 鶇鷄。鸚鵡。
鶇鹿（爾雅）麥雞。（綱

目)
形態 鵠雞爲水禽類之一種。

狀如鶴而無丹頂。兩頰紅。羽色青蒼。亦有灰色者。頸長而脚高。常覓

食於田澤洲渚之間。其肉可供藥用。

性質 甘溫無毒
主治 殺蟲解蠱毒

一九三四

【鶯】

原名	鶯。
原名	鴝。故稱。

古籍別名 黃鳥（詩經）黃鸝（說文）鵲黃商庚（爾雅）倉庚

（月令）青鳥（左傳）黃伯勞（綱目）告春鳥（動物學大辭典）

搏黍。楚雀。黃鸝。金衣公子。黃袍。

外國名圖 Cettia Cantans
T. & S. 40 Horeites Cantans

Eastern nightingale (大夜鷹) Large
japanese bush-warbler (大夜鷹)

ウグイス或ハルツゲトリ（日本）

基本
類。鴛科。
係脊椎動物鳥類鳴禽

產地 山林原野間處處有之。
形態 鶯爲林禽類之一種。眼

主治 補益陽氣助脾。

本草綱目論鷺肉曰。食之不妬。

食之不妬。楊夔止妬論云。梁武帝
郢后性妬。或言會夷爲善。廢石。遂

令茹之。妬果減半。(李時珍)

鶯爪鶯爪知魚之腥
乾而大者可供食與藥

性質 甘平無毒。

【鷺食蜜】卽夏枯草之古籍別名。

【驚栗殼】卽罌粟殼之古籍別名。

【鶯歌綠】卽伽楠香之色如鶯毛

命名 鶴字篆文象其翽
竹短尾之形。

古籍別名 仙禽。胎禽。(綱目)

色玄蒼者名灰鶴。(俗名)

Crane 鶴 Sacred crane Kran-
ich (拉丁) ツル 或タンチヤウ

【霹靂礎】 古籍別名 雷楔。(綱目) 霹靂楔。霹靂

斧。(博物志)

產地 廣東海康縣及河東山澤間皆產之。

形態 霹靂礎係屬石類。爲經雷電交震之礪石。形似斧刀。色青黑。有斑紋。堅硬如玉。上有二孔。取之可供藥用。

性質 辛溫。無毒。效能 安神定志。殺勞蟲。解蠱毒。

主治 驚邪。恍惚。瘵疾。洩瀉。石淋。驚夢。

【鱧】 卽百合之古籍別名。典見別錄。詳「百合」條。

【鴈】 卽石芸之古籍別名。典見別錄。詳「石芸」條。

【鴈】 卽寒具之古籍別名。典見綱目。詳「寒具」條。

【鰓】 卽燕之古籍別名。典見古今注。詳「燕」條。

【騾】 命名 騾。古文作騾。從馬從羸。諧聲也。故名。

古籍別名 騾。駝駝。駝駝。駝駝。

騾。駝駝。駝駝。駝駝。

騾。駝駝。駝駝。駝駝。

外國名詞 Equus asinus mulus Mule (拉丁) ラバ (日本)

基本 係脊椎動物哺乳類有胎盤類。有蹄類。奇蹄類。馬科之騾。

產地 北省多養之。

形態 騾爲獸類家畜。類屬馬屬之一種。爲驢父馬母所生之雜種。其頭耳皆長。毛短。鳴聲如驢。而體較大。力健於馬。尾根裸出。力強於驢。毛色黑褐或灰或赤褐。背上有黑褐。食粗糲。能重負。遠行。以其力在腰。舊說尾後有鎖骨。故不羣。乳質係其精子不成熟。不能傳種。其肉有毒。不堪食。蹄可供藥用。

主治 難產。燒灰入麝香少許。酒服一錢。

參攷資料 ① 騾性頑劣。肉不益人。孕婦食之難產。(寧原) ② 騾古方未見用者。按呂氏春秋云。趙簡子有白騾甚愛之。其臣陽城渠胥有疾。醫云得白騾肝則生。不得則死。簡子聞之曰。殺畜活人。不亦仁乎。乃殺騾取肝與之。渠胥病愈。此亦剪髮以救功臣之意。書之於此。以備醫案。(李時珍)

【騾尿】 主治 打損。諸瘡破傷。中風腫痛。炒焦裹髮之冷即易。

【騾尿】 卽騾之古籍別名。典見綱目。詳「騾」條。

【薔華】 卽茉莉花之古籍別名。典見和漢藥考。詳「茉莉花」條。

【鱖】 卽比目魚之古籍別名。典見段氏北戶錄。詳「比目魚」條。

卽比目魚之古籍別名。典見綱目。詳「比目魚」條。

【鱖魚】 命名 本品初夏時有之。餘月則無。故名。

古籍別名 鱖魚。(綱目)

外國名詞 Taiisha elongata Bennett (拉丁) ハラダハランノシロ (日本)

基本 係脊椎動物魚類。喉類鱗科之鱖魚。

產地 江河中多有之。

形態 鱖魚爲鱗類魚屬之一種。其體側扁而長。下顎突出。齒生兩顎骨及口蓋骨及舌上。微小如鱗。脊鱗十六刺。腹鱗小而脊鱗長。尾鰭爲叉狀。腹下有三角鱗。背青色而腹白色。體長約三尺。肉多。

性質 甘平。無毒。

主治 補虛勞。

歷代記述攷證 【明】寧原食鑑本草論鱖魚肉曰。蒸下油。以瓶盛埋土中。取塗湯火傷甚效。

主治 疥癬。腳趾瘡。並貼之。

【鱖魚鱗】 採取 須乘活時拔。划水邊二鱖。尖長者佳。若死者便減藥力。

主治 湯火傷。疔瘡。腿瘡。並下疳。

配合應用 ① 治湯火傷。用鱖魚鱗香油熬塗。立效。茅集之云。鱖魚鱗貼腿瘡疼痛。立效。(逢原方)

② 治疔瘡。用鱖魚鱗貼上。則咬緊。先須與酒飯吃飽。然後將魚鱗

細刺而富脂肪。可供食與藥用。

鱖魚



魚 鱖

精斑駁。其根可供藥用。

效能 同酒煎服。能止痛活血。

【鐵霜】即鐵華粉之處方用名。詳

【鐵華粉】條。

【鐵菱】油。處方用名 鐵菱油。刀

古籍別名 刀煙（綱目）

基本 以竹木燒火於刀斧刃上。燒之津出如津者是。江東人多用之。

用法 恒以外塗用。

效能 殺蟲。治瘡。用作腐蝕瘡

瘍藥。

主治 惡瘡蝕爛。金瘡毒物。傷

皮肉。止風水。不入水不爛。手足

皺折。瘡根結。癰癰毒腫。染髭髮

令永黑。及熱未凝時塗之。少頃當

乾硬用之。須防水。又殺蟲立效。

配合應用 治瘰癧項邊癰子

似桃核。於刀上燒煙熏之。（陳氏

本草方）

【鐵繳】產地 出南安。

形態 綠莖如蒿。有直

紋。旁多細枝。厚葉翠綠。背微紫。似

平地木葉。而齒圓長。可供藥用。

效能 活氣。行血通絡。



鐵 繳

【鐵菱油】即鐵菱之處方用名。詳

【鐵菱】條。

【鐵邊箕】即金鎖銀開之古籍別

名。典見百草鏡。詳「金鎖銀開」條。

【鐵櫛】即櫛子之古籍別名。典見

綱目。詳「櫛子」條。

【鐵鑿】即鑿石之狀如赤石脂而

有金星者。詳「明鑿」條。

命名 本品係鐵之鐵

衣故名。

處方用名 鐵鐵衣。鐵赤衣。

古籍別名 鐵衣（綱目）

基本 係金屬原質。為鐵之赤

衣。用法 恒以水浸汁。或刮研末

用。性質 辛寒。無毒。

效能 解毒。治瘡。用作外科瘡

毒藥。

主治 惡瘡疥癬。和油調塗。蜘蛛

蛛咬。蒜磨塗之。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論鐵鐵曰。平肝。墜熱。消

瘡腫。口舌瘡。醋磨塗。蜈蚣咬。【明】

經希雅本草經疏論鐵鐵曰。鐵鐵

味應辛苦。氣應寒。惡瘡疥癬。濕熱

所生。蜘蛛蟲咬。毒氣傷血。辛苦能

除濕熱。寒能解熱。毒氣故主之也。

又秘法取露天入土者。研極細。同

蟾酥。腦脂。以金鐵刺入。疔瘡中。令

至根。然後以藥塞入。能拔疔根。輒

效。蓋疔腫未有。不因肝經風熱所

致。此藥屬金。善能平木。故有如是

之功。普濟方。疔腫初起。多年土內

鐵釘。火燬醋淬。刮下鐵末。研細。每

用少許。人乳和。挑破傳之。

配合應用 治風癢癰瘡。鐵

鐵磨水塗之。（集簡方）

治湯火傷瘡。背竹燒油。同鐵

鐵擦之。（積德堂方）

治疔腫初起。用多年土內鐵

釘。火燬醋淬。刮下鐵末。不論遍次。

燬取收之。每用少許。人乳和。挑傳

之。仍炒研二錢。以蠶水煎。待冷

調服。（普濟方）

方）

治重舌腫脹。鐵鐵燒紅。打

下鐵研末。水調二錢。噙咽。（生生

編方）

治小兒口瘡。鐵鐵末水調服

之。（集簡方）

治內熱遺精。鐵鐵末冷水調

服一錢。三服止。（活人心鏡方）

治婦人難產。雜草燒鐵鐵白

芷等分。為末。每服一錢。童尿米醋

各半。和服見效。（救急方）

鐵鐵篋。即蕪蠶之別名。典見植

物學大辭典。詳「蕪蠶」條。

鐵鐵粉。即鐵華粉之古籍別名。

典見綱目。詳「鐵華粉」條。

鐵鐵墨。即金漆墨之古籍別名。典

見開寶本草。詳「金漆墨」條。

鐵鐵。即柚之古籍別名。典見綱

目。詳「柚」條。

鐵鐵木。即雷公藤之古籍別名。

典見綱目拾遺。詳「雷公藤」條。

【霹靂酒】基本 本品係以鐵

器用火燒赤。所浸淫

之酒。

一九三二

主治 疝氣偏墜。婦人崩中下

血。胎產不下。

性質 鹹寒。無毒。

成分 爲第一醋鐵酸 ($\text{Fe}(\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2)_3$) 之酸性溶液。

效能 鎮驚癇。能解諸毒。用作收斂藥。

主治 鎮心明目。主癩癰。發熱急黃。狂走。六畜。狂人爲蛇犬虎狼毒刺惡蟲等。嚼服之。毒不入肉也。兼解諸毒入腹。

配合應用 治時氣生瘡。胸中熱。鐵漿飲之。

治一切疔腫。鐵漿日飲一升。(千金方)

治發背初起。鐵漿飲二升取利。(外臺祕要方)

治蛇皮惡瘡。用鐵漿類塗之。(談藝翁方)

治漆瘡作痒。用鐵漿類洗愈。(外臺祕要方)

參攷資料 鐵漿是以生鐵漬水。服餌者旋入新水。日久鐵上生黃膏。則力愈勝。唐太妃所服者乃此也。(陳承) 鐵漿造法。取舊鐵入器中。和米屑少許漬水。夏三日冬七日。置暖處則生鏽。汁作紅黃色。味微甘者佳。(和漢三才圖會)

會)

【鐵漿水】即鐵漿之處方用名。詳『鐵漿』條。

【鐵線粉】基本 鐵絲起鏽。用刀刮其鏽。明亮如新。

所刮下之鏽。未名鐵線粉。其色黃。另有銻鐵鍋中。浮起白沫如枯礬者。其色白。均真。

主治 兩腿陰面溼癬。

【鐵線草】外國名詞 Adian-
tum, L. (拉丁) カナクジャク
シダ(日本)

基本 係水龍骨科石長生屬。爲鐵線草之根。



鐵線草

性質 微苦。平。無毒。

主治 療風。消腫毒。有效。

配合應用 治男女諸風。產後風尤妙。鐵線草根五錢。五加皮一兩。防風二錢。爲末。以烏骨雞一斤重者。水內淹死。去毛腸。砍作肉生。

入藥。剉勻。下麻油些少。炒黃色。隨人量入酒煮熟。先以排風藤煎濃湯。沐浴頭身。乃飲酒食雞。發出黏汗。即愈。如不沐浴。必發出風丹乃愈。(滑伯仁櫻寧心要方)

參攷資料 生饒州。三月採根陰乾。(蘇頌)

【鐵線草】即龍鬚草之古籍別名。與見綱目拾遺。詳『龍鬚草』條。

【鐵線筒】即龍鬚草之古籍別名。與見綱目拾遺。詳『龍鬚草』條。

【鐵線透骨草】即透骨草之古籍別名。與見綱目拾遺。詳『透骨草』條。

【鐵樹】古籍別名 鐵連草。(綱目拾遺)

外國名詞 Pleasura sp.

產地 出閩粵諸地。

形態 鐵樹爲灌木類之一種。有數種。出廣西。馴象衛境者。樹黑色。高數尺。枝細。刀斫不斷。斧之乃折。葉類石楠。葉逢丁卯年開花。四瓣。紫白色。形似瑞香。花圓小。累月不凋。色亦不褪。其花可供藥用。

種類 產瓊州島等處者。高一二尺。葉密生。花紅色。狀如鐵絲。

燈籠。廣張千葉。瓣各一花。枝皆鐵色。枝極穿絡而生。植之盆中。可供玩賞。產廣東者。葉似弱而紫。幹如密節。莖蒲。

主治 止血。下痰。清痰火。療一切心胃氣痛。煎湯服。

【鐵樹】即鳳尾蕨之古籍別名。與見綱目拾遺。詳『鳳尾蕨』條。

【鐵樹開花】形態 一莖一葉。以馬蹄而尖。有微齒。與犁頭尖相類。而葉背白。細根。可供藥用。

主治 同豬蹄。煮治腸食症。

【鐵燈樹】有之 產地 江西湖南皆



鐵燈樹

形態 鋪地而生。一莖一葉。葉似紫苑。而寬本圓。末尖。夏間中抽一莖。長五六寸。頗似枯莖。秋深始從四面發小葉。隨作苞。開細瓣小白花。緒蒂長二三分。葉蒂攢密。青

云生鐵落下氣疾也。又狂怒屬肝氣暴升。故取金氣以制之也。其主氣在皮膚中。及除胸膈中熱氣。食不下止煩者。皆制木散熱之功也。本經又主風熱。惡瘡瘍。疽瘡癰疥者。皆肝心火熱所致。辛平能除二經之火熱。故主之也。蘇恭以之炒熱投酒中飲。療賊風瘧。大明治驚邪癰癩。小兒客忤。並煎服之。悉此意耳。

配合應用 小兒丹毒。煨鐵屎研末。豬脂和傳之。

參攷資料 ①生鐵打鑄。皆有花出如蘭如蛾。故俗謂之鐵蛾。今煙火家用之。鐵末浸醋書字於紙背後塗墨如碑字也。(李時珍) ②按素問病態論云。帝曰。有病怒狂者。此病安生。岐伯曰。生於陽也。陽氣者。暴折而不泄。故善怒。病名陽厥。曰何以知之。曰陽明者。常動。巨陽少陽不動而動大疾。此其候也。治之當奪其食則已。夫食入於陰。長氣於陽。故奪其食。即已。以生鐵落為飲。夫生鐵落者。下氣疾也。此素問本文也。愚嘗釋之云。陽氣拂鬱而不得疏越。少陽膽木挾三焦

綱目詳「鐵落」條。
【鐵鈴草】即鐵烏鈴之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「鐵烏鈴」條。

【鐵精】 命名 本品係鐵經鍛如塵。乃其精華。故名。

處方用名 鐵精粉。

古籍別名 鐵花(綱目)。

基本 係金屬原質。為鐵鍊成之塵末。

性質 平。微溫。

效能 解毒。療瘡。用作鎮逆藥。又作解毒藥。

主治 明目化銅。(本經)療驚悸。定心氣。小兒風癰。陰潰脫肛。(別錄)。

配合應用 ①下痢脫肛。鐵精粉敷之。(至寶方)。

②女人陰脫。鐵精、羊脂、布裏炙熱炭之。(聖惠方)。

③男子陰腫。鐵精粉敷之。(子母秘錄方)。

④疔腫拔根。鐵渣一兩。輕粉一錢。麝香少許。為末。鐵畫十字口。點藥入內。醋調麵糊傅之。神效。(普濟方)。

⑤食中有蟲。腹內堅痛。面目青

黃。淋露骨立。病變無常。用爐中鐵精研末。雞肝和丸。梧子大。食前酒下五丸。不過十日愈。(肘後方)。

⑥蛇骨刺人。毒痛。鐵精粉豆許。吹入瘡內。(肘後方)。

參攷資料 鐵精。鐵之精華也。出鐵爐中如塵。紫色。輕者為佳。亦以磨瑩銅器用之。(陶弘景)。

【鐵精粉】 即鐵精之處方用名。詳「鐵精」條。

【鐵綿草】 即蕭蕭之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蕭蕭」條。

【鐵漿】 命名 本品乃鐵浸水。中經久色青。沫出如漿者。故名。

處方用名 鐵漿水。

形態 鐵漿為紅黃色。稍稠濁之液。略有酸敗之臭。氣味甘。而有收斂性。遇單寧質。則生黑色之沈澱。可供藥用。

製法 以酸敗酒或甘酒之稀薄液。或米屑和水入壺中。投以鐵器之破片。或被燒養化之鐵屑。暫置暖處。不久鐵自生鐵漿。而溶解於醋酸中。凡用取其上層澄清之液水。

外國名醫

Lepedeza jun-
cea, pers, var. sericea, Hem-
sl.

形態 山間多有之。綠莖而方。上有紫線紋。葉似紫頂龍芽。微有白毛。七月開小黃花。結實似筍。形能刺人手。

主治 風痺血崩。黃痘吐血。跌撲。鬼箭風如神。搗敷肩癰。鶴膝風。鮮者連根煮。如秋冬根老。取葉汁加飛麵調勻包紮。煎湯浴瘡疥立愈。

配合應用 ①治黃痘。用此草乾者一兩。白酒煎服四五劑即愈。(種福堂方)

②治鶴膝風。石見穿草用根梗俱紅色者佳。連枝俱用。如秋冬根梗俱老。止用葉半分。俱要當日取新鮮者。隔宿勿用。連同鐵筍草一分。加飛麵少許。同打紫藤眼內。(種福堂方)

③治面上斑駁。取鐵筍草地上自落下葉并子。煎湯澄清洗面。三四次其斑自消。(朱子和方)

④治腸症。石打穿草按月取草頭一個。如三三個月四個月。以

月分爲多寡之數。搗汁。同人乳羊乳汁攪勻服。立效。(蔣雲山傳方)

⑤治跌打傷。用鐵筍草三兩酒煎服。并治跌打瘋腫。鐵筍草八角金盤根。白毛藤。蘇木。絡石藤。各一兩。酒浸十日用。(金居士選要方)

【鐵結】即伽楠香之色黑而質堅者。性質效能較伽楠香劣。遂爲伽楠香之最下品。詳「伽楠香」條。

【鐵華粉】 鹽塗鐵生衣。刮取如粉狀者。故名。

處方用名 鐵粉。鐵霜。
古籍別名 鐵胤粉。(日華)鐵鹽粉。(綱目)

外國名詞 Eisenocher
基本 係金屬原質。爲鐵製成之衣末。

製法 馬志曰。作鐵華粉法。取鋼鍛作葉如笏或圓。平面磨錯。令光淨。以鹽水洒之。於醋罌中。陰處埋之一百日。鐵上生。即成粉矣。刮取細搗。篩入乳鉢。研如麵。和合諸藥爲丸散。此鐵之精華。功用強於鐵粉也。又大明曰。懸於醬版上。生霜者。名鐵胤粉。淘去粗滓。鹹味。

烘乾用。

性質 鹹。平。無毒。

效能 治驚癇。療瘡瘍。用作鎮逆藥。又爲解毒藥。

主治 安心神。堅骨髓。強志力。除風邪。養血氣。延年變白。去百病。隨所冷熱和諸藥用。棗膏爲丸。

歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草論鐵華粉曰。止驚悸虛癰。鎮五臟。去邪氣。治健忘。冷氣心痛。疰瘕瘕結。脫肛痔漏。宿食等。及傳竹木刺入肉。

【鐵菱角】即菱莢之古籍別名。典見綱目。詳「菱莢」條。

【鐵塔草】即茜草之古籍別名。典見土宿本草。詳「茜草根」條。

【鐵脚威靈仙】即威靈仙之處方用名。詳「威靈仙」條。

【鐵脚婆羅門草】即瓦松之赤者古籍別名。典見綱目。詳「瓦松」條。

【鐵脚梨】即木瓜之古籍別名。典見和漢藥考。詳「木瓜」條。

【鐵落】 命名 本品乃鍛家燒鐵赤沸。砧上鍛落之皮甲。故名。
處方用名 生鐵落。鐵屑。

古籍別名 鐵液。(別錄)鐵鐵。

(綱目)

基本 係金屬原質。爲鐵之細屑。

產地 凡爐冶砧旁恒有之。
用法 水煎或研末用。

性質 辛。平。無毒。

效能 降火。潛陽。用作鎮逆藥。至治風熱惡瘡。瘡疽瘡疥。氣在皮膚中。(本經)除胸膈中熱。氣食不下。止煩去黑子。可以染皂。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論鐵落曰。主鬼打鬼。注邪氣。水漬沫出。澄清。暖飲一二盃。

【唐】蘇恭新修本草論鐵落曰。炒熱投酒中。飲療賊風。瘧。又裹以熨腋下。療胡臭。有驗。【宋】大明諸家本草論鐵落曰。治驚邪癰。小兒客忤。消食及冷氣。並煎服之。【明】李時珍本草綱目論鐵落曰。平肝去怯。治善怒發狂。【明】經希雅本草經疏論鐵落曰。鐵落是鍛家燒鐵赤沸。砧上煨之。如皮甲落下者。本出於鐵。不離金象。體重而降。故素間有生鐵落飲。以療病狂。恐者。

【鐵秤錘】

基本 本品即秤上之鐵錘。

性質 辛溫無毒。

主治 賊風。止產後血癥腹痛。

及喉痺熱寒燒赤淫酒熱飲。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論鐵秤錘曰。治男子疝

氣。女子心腹妊娠脹滿。漏胎卒下血。

【鐵粉】

命名 本品係用鋼鐵入火飛鍊而成粉狀。故

名。

外國名詞 Ferrum Pulver-

atum. (拉丁) Iron Pow de

(英) Isenpulver. (德)

基本 係金屬為鋼鐵鍊成之

粉末。

產地 凡有爐冶之處咸有出

形態 鐵粉質重而色灰黑。遇

磁石即為攝引。遇稀硫酸或稀鹽

酸即發水素瓦斯而溶解。於此鹽

酸性溶液中。加水多量而稀釋

之。再加以赤色血滴鹽溶液。則生

深藍色之沈澱。百分中含有九十

八分以上之純鐵。

製法 凡使以搗篩成粉用。

性質 鹹。平。無毒。效能 安神。鎮心。平肝。定驚。用

作鎮痙強壯藥。

主治 安心神。堅骨髓。除百病。

變黑潤肌膚。令人不老。體健能食。

久服令人身重肥黑。合和諸藥。各

有所主。

歷代記述攷證 【清】黃宮繡

本草求真論鐵華粉曰。鐵粉氣辛

性平。諸書所著治功。止載定驚療

狂。治癰解毒數效。其所云定驚療

狂。亦止就鐵重壓之意起見。故云

可以定療。豈真救本求源之治哉。

配合應用 ①治驚瀉發熱。鐵

粉水調少許服之。(聖惠方)

②治急驚瀉潮壯熱悶亂。鐵粉

二錢。硃砂一錢為末。每服一字。薄

荷湯調下。(楊氏家藏方)

③治傷寒陽毒。狂言妄語亂走。

毒氣在臟也。鐵粉二兩。龍膽草一

兩。為末。磨刀水調服一錢。小兒五

分。(全幼心鑑方)

④治頭痛鼻塞。鐵粉二兩。龍腦

半分。研勻。每新汲水服一錢。(聖

惠方)

根三兩搗如泥。封之日二換。(集

元方)

⑤治風熱脫肛。鐵粉研。同白敘

末。傅上按入。(直指方)

用量 五分至八分。

施用宜忌 凡腎虛及氣陷者

禁用。畏磁石皂莢。

參攷料查 ①化痰鎮心。抑肝

邪特異。(許叔微) ②乃鋼鐵飛鍊

而成者。人多取雜鐵作屑飛之。其

體重真鋼者不爾也。(蘇恭)

【鐵粉】即鐵華粉之處方用名。詳

『鐵華粉』條。

【鐵拳頭】

產地 生南安。

形態 叢生柔莖。細

綠。每枝三葉。葉如薄荷。中有赤紋

結實黃如小球。硬尖如蠟。略似石

龍芮。惟葉無歧。可供藥用。



鐵拳頭

主治 和豬蹄煮服。治失血。

產地 生建昌。

形態 叢生粗根似

莖葉綠色有節。對排似接骨草。而微端亦寬。而緣背微黃。其根可供藥用。



鐵骨散

主治 同甘草煎洗脚腫。

【鐵掃帚】即馬鞭草之古籍別名。

典見和漢藥考。詳『馬鞭草』條。

【鐵掃帚子】即馬齒莧子之古籍

別名。典見救荒本草。詳『馬齒莧』

條。②即地膚子之古籍別名。典見

和漢藥考。詳『地膚子』條。

【鐵梗半支】即馬牙半支之古籍

別名。典見綱目拾遺。詳『馬牙半

支』條。

【鐵液】即鐵落之古籍別名。典見

別錄。詳『鐵落』條。

【鐵連草】即鐵樹之古籍別名。典

見綱目拾遺。詳『鐵樹』條。

【鐵筴草】即馬鞭草之古籍別名。

典見和漢藥考。詳『馬鞭草』條。

【鐵筴帚】古籍別名。石打穿。

千條針。綱目拾遺。

相入。謂之團鋼。又曰灌鋼。此蓋草創之鋼。亦不免偽也。蓋生鐵之堅及三四鍊。則生鐵亦自熟。却是柔鐵。而天下莫以爲非磁州鍊坊方識真鋼。凡鐵之有鋼。如麵之有筋。灌洗揉麵既盡。筋乃見。鍊鋼亦然。恒取精鐵一百餘斤。每鍛一火。稱之。遂輕。累鍛稱之。至於不減耗。此則純鋼也。實鐵之精純者。雖百鍊不耗矣。其色清明。磨瑩之則黯黯而清。且黑。亦有鍊之盡。無鋼者。繫地之所產。精粗兩前。所謂鐵精者。其說有二。陶隱居言出鍛竈中。如壓紫色輕者爲佳。亦以磨瑩銅器用之。日華子又云。犁鏡尖浸水。名爲鐵精。本條既言化銅。則隱居所說是。蓋鍛竈中壓紫磨銅。則明漫犁鏡尖水非是。(慈示爽)

【鐵刀】

主治 蛇咬毒入腹。取兩刃於水中相摩。飲其汁。百蟲入耳。以兩刃於耳門上摩。敲作聲自出。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論鐵刀曰。磨刀水服。利小便。塗脫肛。痔核。產腸不上。耳中卒痛。

【鐵刀環】

主治 產難。數日不出。燒赤洋酒一盃。頓服。

【鐵木子】

即枕椰子之古籍別名。典見綱目。詳「枕椰子」條。

【鐵甲將軍】

即蜈蚣之古籍別名。典見綱目。詳「蜈蚣」條。

【鐵皮石斛】

即石斛之處方用名。詳「石斛」條。

【鐵朱】

即代赭石之古籍別名。典見和漢藥考。詳「代赭石」條。

【鐵色草】

即夏枯草之古籍別名。典見綱目。詳「夏枯草」條。

【鐵色箭】

即石蒜之古籍別名。典見綱目。詳「石蒜」條。

【鐵衣】

即鐵鑄之古籍別名。典見綱目。詳「鐵鑄」條。

【鐵角孫兒】

即楓上寄生之古籍別名。典見綱目。拾遺。詳「楓上寄生」條。

【鐵赤衣】

即鐵鑄之處方用名。詳「鐵鑄」條。

【鐵花】

即鐵精之古籍別名。典見綱目。詳「鐵精」條。

【鐵胤粉】

即鐵華粉之古籍別名。典見日華諸家本家。詳「鐵華粉」條。

【鐵屑】

即鐵落之處方用名。詳「鐵落」條。

【鐵指甲】

命名。本品形如指甲。故名。佛指甲。佛甲草。寄生。綱目拾遺。

【鐵地】

常生牆脚石隙間。主治 諸瘡毒火丹。頭面腫脹。少入皮硝搗爛之牙痛。蝦未擦之。

【鐵炭】

即石炭之古籍別名。典見綱目。詳「石炭」條。即石灰之古籍別名。典見和漢藥考。詳「石灰」條。

【鐵胡蜂】

即金頂龍芽草之古籍別名。典見百草鏡。詳「仙鶴草」條。

【鐵扇子】

命名。本品即桑葉。之採過頭次後。其二葉至冬猶青。或乾枯在枝上。而又經霜雪壓過者。風吹作鐵器聲。故名。

【鐵烏鈴】

鐵烏鈴爲雜草類之一種。其本色黑。葉梗堅實。如鐵。其汁亦黑。可供藥用。汁詳見該條。

【鐵烏鈴草汁】

主治 楊梅惡瘡。風氣癱瘓。損折筋骨。俱煎酒服。

【鐵烏鈴草汁】

主治 烏鬚。

【鐵烏鈴草汁】

主治 烏鬚。

【鐵烏鈴草汁】

主治 烏鬚。

【鐵烏鈴草汁】

主治 烏鬚。

一致。且磁力甚弱。易於傳電。置溼空氣中。遇三養化炭。輒生鏽。遂成紅褐色之養化鐵。其性狀恒因製煉之法而異。

種類 ①生鐵乃初煉去礦用以鑄器具者。②熟鐵乃生鐵再三鎔拍可以作錄。亦謂之鑄鐵者。③鋼鐵乃生熟相雜和用以作刀劍鋒刃者。④鐵落乃鍛家燒鐵赤沸粘上打下細皮屑。⑤鐵精乃鍛爐中飛出如塵色紫而輕虛。可以鑿磨銅器者。⑥鐵砂乃作鐵家磨爐細末者。⑦鐵漿乃諸鐵浸水中經久色青。沫出可以染皂者。⑧鐵華粉乃鐵塗醋鹽使生衣。刮取成粉者。⑨鐵粉乃鐵經火飛鍊而成粉者。⑩鐵線粉乃溶鐵鍋中浮起之白沫。形如枯礬色白。搗細而成粉者。⑪鐵鏽乃鐵上自生之赤衣。⑫鐵燕乃以竹木煮火於刀斧刃上燒之。津出如漆者。

用法 水煎或水浸取汁入藥用。

性質 辛。平。有毒。

效能 墜痰。鎮驚。專作鎮逆藥。

主治 堅肌耐痛（本經）下部

及脫肛。別錄。

歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草論鐵曰。鐵心。安五臟。治痢疾。黑髮。髮治癰。及惡瘡。疥。蜘蛛咬。蒜。磨生油調傳。【明】李時珍本草綱目論鐵曰。散瘀血。消丹毒。

配合應用 ①治脫肛。歷年不入者。生鐵二斤。水一斗。煮汁五升。洗之日再（集驗方）

②熱甚耳聾。鐵鐵投酒中飲之。仍以慈石塞耳。日易夜去之。（千金方）

③小兒丹毒。燒鐵滓水。飲一合。（陳氏本草方）

④治小兒爛瘡。一名爛瘡。燒鐵滓水中。二七遍。浴之。二三起作漿（子母祕錄方）

⑤打撲瘀血在骨節及脇外不去。以生鐵一斤。酒三升。煮一升服（肘後方）

⑥熊虎傷毒。生鐵煮令有味洗之（肘後方）

施用宜忌 畏慈石。皂莢。

參攷資料 ①諸藥療病並不入散。皆煮取汁用之（蘇恭）②鐵砂鐵精。並入丸散（陳藏器）③鐵

遇神砂。如泥似粉（雷斅）④鐵畏皂莢。豬犬脂。乳香。朴硝。礬砂。鹽鹵。荔枝。藥食鐵。而蛟龍畏鐵。凡諸草木藥。皆忌鐵器。而補腎藥尤忌之。否則反消肝腎。蓋肝傷而母氣愈虛矣（李時珍）⑤經用辛平之鐵。此柔鐵。即熟鐵也（蘇恭）⑥鐵皆取礦土炒成。秦晉。淮楚。湖南。閩。廣。諸山中。皆產鐵。以廣鐵為良。甘肅土銍鐵。色黑性堅。宜作刀劍。西番出寶鐵。尤勝。寶鐵論云。鐵有五種。荊鐵。出當陽。色紫而堅。利。上饒鐵。次之。寶鐵。出波斯。堅利。可切金玉。太原。蜀山。之鐵。頑滯。副鐵。生西南。瘴海中。山上。狀如紫石英。水火不能壞。穿珠切玉如土也。土宿本草云。鐵受太陽之氣。始生之初。鹵石產焉。一百五十年而成慈石。二百年孕而成鐵。又二百年不經採鍊而成銅。銅復化為白金。白金化為黃金。是鐵與金銀同一根源也。今取慈石碎之。內有鐵片可驗矣。鐵稟太陽之氣。而陰氣不交。故燥而不潔。性與錫相得。管子云。上有緒。下有鐵（李時珍）⑦凡鐵劑。雖然濃淡不同。收斂與感動腸胃之

性亦不同。但其功用則無異。血之紅色。特鐵而得之。若血內之紅色。鐵料太少。則有血虛之病。身弱而瘦。無病之時。每血重百分內含血輪十二分。患血虛者。則少於此。比例血輪內有鐵。能顯紅色。故凡服鐵劑。其意令血中多生血輪。人身更能堅壯。凡有血虛之病。以鐵為要藥。然鐵劑雖為補藥。若面色不白。而血內之血輪未減。服鐵劑無益。凡服鐵劑者。雖耐心日久。多食養身之物。又令大便常通。否則不能得鐵之益。按此論鐵之作用。要自確當。不可不參考也（儒門醫學）⑧鐵礦於礦中鍊出者。謂之生鐵。鐵落斷而落者也。鑄鐵。鐵炒熟鐵也。剛鐵。鍊鐵去滓者也。鐵精。針沙。鐵漿。已上三等取汁。各依經用。鐵華粉。鐵粉。已上二等。燒蝦取馬。卿。秤。鐵。車。轄。秤。已上四等。特以其意使之耳。其生鐵既自火中鍊石而出。世謂之生鐵。亦如炒脂。麻。取油。謂之生油。其義亦同。白油。麻。條中。已著鐵粉。以生。濯。汁。調。擦。眉。上。生。眉。毛。鋼。鐵。今。用。柔。鐵。風。盤。乃以生鐵。陷其間。泥封煉之。煨令

【羣芳譜】詳「白茱」條。

【蘭花結】即伽南香之色微綠而黑者。詳「伽南香」條。

【蘭花露】基本 本品係蘭花蒸取之露。

性質 氣薄味淡。

主治 明目舒鬱。

【蘭香】①即羅勒之古籍別名。典見補註本草。詳「羅勒」條。②即佩蘭之別名。詳「佩蘭」條。

【蘭根】即白茅根之古籍別名。典見本經。詳「白茅根」條。

【蘭草】即草蘭之原名。詳「草蘭」條。

【蘭華】即連翹之古籍別名。典見吳普本草。詳「連翹」條。

【蘭桃】即白芷之古籍別名。典見和漢藥考。詳「白芷」條。

【蘭蓀】即白蒿之古籍別名。典見本草集註。詳「白蒿」條。

【蘭蓀芷】即菖蒲之古籍別名。典見和漢藥考。詳「菖蒲」條。

【蘭澤草】即草蘭之古籍別名。典見本草集註。詳「草蘭」條。

【蘭薰】即火腿之古籍別名。典見王士雄飲食譜。詳「火腿」條。

【蔞藤】即天門冬之古籍別名。典見爾雅。詳「天門冬」條。

【蔞藤實】即營實之原名。詳「營實」條。

【蠟子】即寶石之色紫者。性質功效與寶石同。詳「寶石」條。

【蠟片】即鹿茸之花名。詳「鹿茸」條。

【蠟珀】即琥珀之古籍別名。典見綱目。詳「琥珀」條。

【蠟茶】即茶之別名。性質功效與茶同。詳「茶」條。

【蠟梅花】命名 本品形似梅相近。色似蜜蠟。故名。

古鑑別名 黃梅花。不經接者名狗蠟梅。已接者名碧口梅。色如紫檀者名檀香梅。〔綱目〕

外國名詞 Calycanthus

precox, L. (拉丁) ラフバイ

カラウメ ナンキンウメ ナンキンムメ (日本)

基本 係蠟梅科蠟梅屬。爲蠟梅之花。

形態 蠟梅爲灌木類之落葉木。本高七八尺。大者丈餘。葉對生。

作卵圓。有尖端。冬月開花。花有香氣。花色外黃蠟色。內帶紫色。結實如垂鈴。尖長寸許。樹皮浸水磨墨。有光彩。其花可供藥用。



花 梅 蠟

性質 辛溫。無毒。

主治 解暑生津。

【蠟魚】即鱧魚之古籍別名。典見御覽。詳「鱧魚」條。

【蠟黃雀】即桑扈之古籍別名。典見綱目。詳「桑扈」條。

【蠟蜂】即蜜蜂之古籍別名。典見綱目。詳「蜜蜂」條。

【蠟蔗】即甘蔗之古籍別名。典見綱目。詳「甘蔗」條。

【蠟樹】即女貞之古籍別名。典見綱目。詳「女貞」條。

【蠟櫻】即櫻桃之古籍別名。典見綱目。詳「櫻桃」條。

【蠟牛】①即蝸牛之古籍別名。典見藥性。詳「蝸牛」條。②即蝸牛之

古籍別名。典見和漢藥考。詳「蝸牛」條。

【蠟魚】即鱧魚之古籍別名。典見本經。詳「鱧魚」條。

【蠟實】即馬蘭子之原名。詳「馬蘭子」條。

【蠟蛤】即牡蠣之古籍別名。典見本經。詳「牡蠣」條。

【護火】即景天之古籍別名。典見綱目。詳「景天」條。

【護生草】即薺菜之古籍別名。典見綱目。詳「薺菜」條。

【護羌使者】①即羌活之古籍別名。典見本經。詳「羌活」條。②即獨活之古籍別名。典見本經。詳「獨活」條。

【蠟龜】即蠟龜之古籍別名。典見綱目。詳「蠟龜」條。

命名 鐵者。鐵也。剛可截物。故名。

古鑑別名 黑金。烏金。〔綱目〕

土錠鐵。〔圖經本草〕

基本 係金屬原質之一種。

產地 凡各省之山礦。咸有出。

形態 鐵質重色黑。狀類平石。入爐經煉者。或成條。或成塊。頗不

【龍草】即烏蘇莓之古籍別名。典見本草集註。詳「烏蘇莓」條。

【龍鼓】即葑草之古籍別名。典見詩經。詳「葑草」條。

【龍蕒】即馬蔘之古籍別名。典見綱目。詳「馬蔘」條。

【龍鬚】即瞿麥之古籍別名。典見和漢藥考。詳「瞿麥」條。

【蘼麥】即瞿麥之古籍別名。典見爾雅。詳「瞿麥」條。

【蘼蕒】即芡粳之古籍別名。典見綱目。詳「芡粳」條。

【蘼】即白蒿之古籍別名。典見爾雅。詳「白蒿」條。

【蘼縷】 命名 本品莖莖甚繁。而中有一纖故名。

古籍別名 蘼縷（爾雅）蘼縷（郭璞）滋草（千金）鵝腸菜（綱目）鵝腸草（千金食治）

基本 屬石竹科蘼縷之葉莖。產地 凡山野川澤及溼地間恒有生長。

形態 蘼縷為山野自生之一年生草或越年生草。莖細長。蔓延地上。接地處有節。葉對生。作卵圓形。四五月間。開白色二深裂

五瓣花。後結蒴果。種子破蒴之前端而散布。



縷 蘼

種類 ①鵝腸味甘莖空。有縷花白色。②雞腸味微苦。咀之涎滑。莖中無縷。色微紫。花亦紫色。

採取 五月間採之。

製法 凡使以葉青花白者。採苗曬乾入藥用。

用法 水煎飲。或生搗或剉末用。

性質 酸。平。無毒。

效能 破血。治瘡。用治諸瘡。藥主治 積年惡瘡。痔不愈。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論蘼縷曰。破血。下乳汁。產婦宜食之。產後腹有塊痛。以酒炒絞汁溫服。又曝乾為末。醋糊和丸。空腹服五十丸。取下惡血。

國外學說 和漢三才圖會曰。凡瘡癰之藥。多用鵝腸菜汁傳之。和漢藥考曰。蘼縷鹽。昔時用作牙

粉。云有保護齒牙功效。製法於端午日。採取葉莖絞汁。與鹽同煉。和後燒製。

配合應用 ①食治烏髭。蘼縷為鹽。久久食之。能烏髭髮。（聖惠方）

②治小便卒淋。蘼縷草滿兩手。水煮。常飲之。亦治產婦有塊作痛。（范汪東陽方）

③治丈夫陰瘡。莖及頭潰爛。痛不可忍。久不瘳者。以五月五日蘼縷燒焦五分。入新出蚯蚓屎二分。入少水和研。作餅貼之。乾即易。禁酒麵五辛及熱食等物甚效。（扁鵲方）

用量 錢半至二錢。

參攷資料 ①此菜五月五日採曝乾。燒作屑。療雜瘡有效。亦雜百草服之。不止此一種也。（陶弘景）

②治惡瘡有神效之功。搗汁塗之。作菜食。益人。須五月五日者乃驗。又曰。能去惡血。不可久食。恐血盡。（孟詵）

③此草莖莖甚繁。中有一縷。故名。俗呼鵝兒腸菜。象形也。易於滋長。故曰滋草。古樂府云。為樂當及時。何能待來滋。滋乃草

名。即此也。（李時珍）④蘼縷五月五日。日中採乾用。（別錄）⑤蘼縷即藤也。又恐白軟草是之。（孟詵）

⑥即雞腸也。南中多有之。生於田野間。近林下溼地。亦或有之。葉似荇菜。而小。夏秋間生。小白黃花。其莖梗作蔓。斷之有絲縷。又細而中空。似雞腸。因得此名。本草蘼縷。雞腸作兩條。蘇恭以為一物。謹按郭璞註爾雅云。蘼縷一名雞腸草。實一物也。今南北所生。或肥瘠不同。故人疑為二物。而葛洪肘後方治卒淋云。用雞腸及蘼縷。如此又似是二物。其用大概主血。故人宜食之。（蘇頌）

⑦蘼縷即鵝腸。非雞腸也。下溼地極多。正月生苗。葉大如指頭。細莖引蔓。斷之中空。有一縷如絲。作蔬甘脆。三月以後漸老。開細瓣白花。結小實。大如稗粒。中有細子。如葶麻子。吳瑞本草謂黃花者為蘼縷。白花者為雞腸。亦不然。二物蓋相似也。（茲分明於種類耳）（李時珍）

【蘭江】即澤瀉之古籍別名。典見和漢藥考。詳「澤瀉」條。

【蘭花】即白芨之古籍別名。典見

被淡黃色。不整齊。嫩莖及花序。有一種香氣。其根與葉可供藥用。



藜

採取 八九月採根。

製法 雷敷曰。凡使勿用草牛草。真相似。其草牛草腥澀。凡使白藜。以銅刀刮去粗皮一重。細切入砂盆中。研如膏。取自然汁。鍊作煎新器。攤冷如乾膠狀。刮取用之。

性質 辛溫。有小毒。

主治 中蠱及瘡搗汁服。

歷代記述攷證 【南北朝】陶弘景本草集註論藜荷根曰。溪毒沙蟲蛇毒。【唐】蘇恭新修本草論藜荷根曰。諸惡瘡根心。主稻麥芒入目中。不出。以汁注目。即出。【明】李時珍本草綱目論藜荷根曰。赤眼澀痛。搗汁點之。

參攷資料 ①按干寶搜神記云。外姊夫蔣士先得疾。下血。盲中蠱。其家密以藜荷置於席下。忽大笑曰。蠱我者。張小小也。乃收小小。

小小亡走。自此解蠱。藥多用之。往往驗也。周禮庶氏以嘉草除蠱毒。宗懷謂嘉草即藜荷是也。陳藏器云。藜荷。西根爲主。蠱之最謂此。【蘇頌】①本草白藜。荷。而今人呼赤者爲藜。荷。白者爲覆。蓋。食以赤者爲勝。入藥以白者爲良。葉同一種。爾。陶弘景。②藜荷。荆襄湖江間多種之。北地亦有。春初生。葉似甘蔗。根薑牙而肥。其葉冬枯。根堪爲茹。其性好陰。在水下生者尤美。潘岳閑居賦云。藜荷依陰。時藜向陽是也。宗懷荆楚歲時記云。仲冬以鹽藏藜荷。用備冬儲。又以防蠱。史游急就篇云。藜荷冬日藏。其來遠矣。然有赤白二種。白者入藥。赤者堪茹。及作梅果多用之。【蘇頌】③藜荷。八九月間淹貯。以備冬月作蔬。果治病止用白者。【寇宗奭】④蘇頌圖經言。荆襄江湖多種。今訪之。無復識者。惟楊慎丹鉛錄云。急就草註。藜荷即甘露。考之本草。形性相同。甘露即芭蕉也。崔豹古今注云。藜荷似芭蕉而白。色。其子花生根中。花未敗時可食。久則消爛矣。根似薑。宜陰翳地。依

蔭而生。又按王旻山居錄云。藜荷宜樹陰下。二月種之。一種永生。不須鋤耘。但加糞耳。八月初踏其苗令死。則根滋茂。九月初取其傍生根以爲茹。亦可齊藏。十月初中以糠覆其根下。則過冬不至於凍死也。【李時珍】

【藜荷草】 性質 苦。甘寒。無毒。主治 溫瘧寒熱。酸嘶。邪氣。辟不祥。

【藜草】 即藜荷之古籍別名。典見別錄。詳「藜荷」條。

【藜木】 即黃柏之原名。詳「黃柏」條。

【藜皮】 即黃柏之原名。詳「黃柏」條。

【藜藟】 古籍別名 燕藟。【毛詩】嬰舌。【廣雅】山葡萄。【唐詩】野葡萄。【俗名】藤名木龍。【綱目】

外國名 Vitis Thunbergii, See Z. (拉) H. ヤムン

エビカヅラ イヌエビ (日本) 基本 係葡萄科葡萄屬。爲藜藟之子實。其藤根詳各該條。

產地 生山野間。

形態 藜藟爲果類之蔓生草本。狀如灌木。莖有卷鬚。攀緣樹木。葉掌狀。淺裂。有鋸齒。基部呈心臟形。表面平滑。背面密生淡褐色毛茸。如綿狀。夏間出花軸於莖。開總狀花序。花小。黃綠色。有五瓣。結實爲漿果。球形。色紫黑。似葡萄而小。可供食與藥用。



藜

性質 甘。酸。無毒。主治 止渴。悅氣。益氣。

【藜藟】 即千歲藥之古籍別名。典見蘇恭新修本草。詳「千歲藥」條。

【藜藟根】 性質 甘。平。無毒。主治 下焦熱痛。淋瀝。消腫毒。

【藜藟藤】 性質 甘。平。無毒。主治 喉逆。傷寒後嘔。噦。搗汁飲之。良。歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論藜藟藤曰。止渴。利小便。

①止血補不足療崩中用續斷白膠阿膠地黃麥門冬杜仲五味子山茱萸人參枸杞子黃耆

②安胎續斷涼血補血與順氣藥同用

③療金瘡續斷與金瘡藥同用

④治小便淋瀝生續斷搗絞汁服即馬薊根也(初虞氏古今錄驗方)

⑤治妊娠胎動兩三月墮預宜服此川續斷酒浸杜仲薑汁炒去絲各用二兩爲末桑肉煮爛杵和丸梧子大每服三十丸米飲下

⑥治產後諸疾血暈心悶煩熱厥厥氣欲絕心頭硬乍寒乍熱續斷皮一握水三升煎二升分三服如人行一里再服無所忌此藥救產後垂死(子母祕錄方)

⑦治打撲傷損因筋骨接用節骨草葉搗爛燭之立效(衛生易簡方)

用量 錢半至三錢

施用宜忌 凡無瘀阻及風寒

滯滯者禁用惡雷丸地黃爲之使參攷資料 ①宋張叔潛祕書知劍州時其閣下病血痢一醫用

平胃散一兩入川續斷末二錢半

每二錢水煎服即愈紹興王子會

稽時行痢疾叔潛之子以方傳人

往往有驗小兒痢服之效(李時珍)

⑧按桐君藥錄云續斷生蔓延葉細莖如荏大根本黃白有汁

七月八月採根今皆用莖葉節節

繼皮黃皺狀如雞脚者又呼爲桑

上寄生時人又有接骨樹高丈餘

許葉似葫蘆皮主金瘡廣州又有

續斷藤一名諸藤斷其莖以器承

取汁飲療虛損絕傷用沐頭長髮

折枝插地即生恐皆非真李當之

云是虎薊與此大乖但虎薊亦療

血(陶弘景)⑨所在山谷皆有今

醫草茅根綠真相似若誤服令人

筋軟(蘇頌)⑩續斷之說不一桐

君言是蔓生葉似荏李當人但以

節節斷皮黃皺者爲真(李時珍)

⑪凡使忽用之范汪並言是虎薊

日華子言是大薊一名山牛蒡蘇

恭蘇頌皆言葉似荏薊根似大薊

而名醫別錄復出大小薊條頗難

依據但自漢以來皆以大薊爲續

斷相承久矣究其實則二蘇所云

似與桐君相符當以爲正今人所

用以州中來色赤而瘦折之有烟

塵起者爲良焉鄭樵通志謂范汪

所說者乃南續斷不知何據蓋以

此一味則氣煦血濡不滯不漏而

胎自安矣止爲下虛上實者設故

胎墜而尺強寸弱者動作少氣者

表虛惡風汗時出者心下懸飢得

食則止者一身之氣盡欲下墜者

皆在禁例(黃宮繡)

【續斷藤】即續斷之古籍別名典

見和漢藥考詳續斷條

【經木香】即乳香之古籍別名典

見和漢藥考詳乳香條

【經枝牡丹】即旋花之古籍別名

典見綱目詳旋花條

【薑荷】古鑑別名覆菹薑草

(別錄)搏菹菹菹(說文)嘉草(綱目)茗荷(日本)陽

發(植物圖考)陽荷(壽志)

外國名詞 Zingiber Mioga

Rosca (拉丁)メウガニールガ

(日本)

基本 係薑荷科爲薑荷之根

產地 凡山野原澤有出

形體 薑荷爲澤草類之多年

生草本高二三尺葉呈長橢圓形

端尖類似庭葉長達尺餘夏秋之

間花軸自地下莖抽出着以多數

之花如穗狀由鱗狀葉被包之花

續隨葉

主治 搗傳蠟盤

續斷

命名 本品功能續折接骨故名

處方用名 川斷。川斷肉。

古籍別名 屬折(本經)接骨。

龍豆(別錄)南草(綱目)槐生龍

立槐槐生諸藤斷續斷藤(和漢

藥考)馬薊根(初虞氏古今錄

驗方)

外國名詞 Sonchus asper,

Vill(拉丁)

基本 屬唇形科續斷之根。

產地 陳仁山藥物生產辨云。

續斷產湖北省沙市內興山宜都

資邱市等名曰川斷實出自湖北

味微苦而帶甘甜又有一種產廣

東樂昌星子連州東陂等處名曰

西斷實出自廣東

形態 續斷為原野自生之多

年生草春季自宿根抽出方莖高

達一二尺葉對生具有長葉柄作

卵圓形或心臟形前端尖邊緣有

鋸齒花為白色或帶紫色唇形花

冠開於葉腋其根為赤黃色長細

根叢生於一莖其乾燥者皮部呈

黃色有皺裂破折則發粉塵。

種類 中國產之續斷根粗

類斷根謂之南續斷日本產之

續斷根細而長謂之川續斷

採取 七八月間採根陰乾

製法 雷敷曰凡採得根橫切

到之又去其硬筋以酒浸一伏

時焙乾入藥用

性質 苦微溫無毒

效能 補肝腎續筋骨通血脈

利關節為續筋骨跌折藥又為金

瘡癰瘍藥

主治 傷寒補不足金瘡癰瘍

折跌續筋骨婦人乳難久服益氣

力(本經)婦人崩中漏血金瘡血

內漏止痛生肌肉及跌傷惡血腹

痛關節緩急(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥

性本草論續斷曰去諸濕毒通宜

血脈【宋】大明諸家本草論續斷

曰助氣補五勞七傷破凝結瘀血

消腫毒腸風痔瘻乳癰癰癰婦人

產前後一切病胎漏子宮冷面黃

虛腫縮小便止泄精尿血【明】繆

希雍本草經疏論續斷曰續斷本

經味苦微溫別錄益之以辛曾得

蜀中者嘗之其味帶甘應云味苦

甘辛微溫無毒使非味甘焉能主

傷中補不足非辛焉能主金瘡癰

傷折跌續筋骨婦人乳難辛能潤

苦溫能散甘能益血故別錄又主

崩中漏血金瘡血內漏止痛生肌

肉及腕傷惡血腰痛關節緩急本

經久服益氣力傷去血生之效也

入足厥陰少陰為治胎產續絕傷

補不足療金瘡理腰腎之要藥也

【清】黃宮繡本草求真論續斷曰

續斷因何以續為名蓋緣其味苦

其性溫能入腎經以補骨又緣其

味辛能入肝經以補筋味兼甘又

入中州以補虛凡跌撲折傷癰腫

癰筋骨曲節血氣滯之處服此即

能消散止痛生肌且其味溫故

能止血治血並縮小便固精安胎

久服能氣力培增筋斷復續故曰

續斷實疏通氣血筋骨第一藥也

第因氣薄而見精脫胎動溺血失

血等症則又深忌以性下流者故

耳功與地黃牛膝杜仲巴戟相等

但有溫補細微之別不可不知川

產者良狀如雞脚皮黃皺節節斷

者真去裏硬筋酒浸用

近人學說

●賈九如曰續斷

苦養血脈辛養皮毛善理血脈傷

損接續筋骨斷折故名續斷外消

乳癰癰癰內消痔漏腸紅以其氣

和味清胎產調經最為穩當且苦

能堅腎辛能潤腎可療小便頻數

精滑夢遺腰背酸疼足膝無力此

皆腎經症也若同桑苑用之調血

潤燥治血枯便閉大能宣通血氣

而不走泄●張山雷曰續斷莖延

甚遠味苦辛而微甘其氣溫而氣

味俱厚故兼入氣血能宣行百脈

通利關節凡經絡筋骨血脈諸病

無不主之而通痺起癰尤有特長

又其味苦而濡能行能止則療崩

漏帶下血痢淋濁而女科之胎產

經帶奇經八脈諸病及傷科腕閃

跌仆諸證外癰癰癰潰腐支節痠

疼屈伸不利等病類皆賴以成功

其效甚宏其用頗廣加以呈功頗

捷而性又柔和無燥烈剛暴之弊

是眞名將風流雅容掄揚以奏膚

功而藏大敵洵非猛將之偏鋒陷

陣者所可同日語矣

配合應用 ●行血理傷用續

斷當歸牛膝肉桂延胡索

皆滯。治肺氣水氣。日服十粒。瀉多。以酸漿水或薄醋粥喫即止。又塗疥癬瘡。【明】繆希雍本草經疏論續隨子曰。續隨子味辛氣溫。而其性有毒。實攻擊剋伐之藥也。長於解蟲毒鬼疰。以致腹痛脹滿。攻積聚。下惡滯物。及散痰飲。至於婦人月閉癥瘕。瘰癧瘰癧。大小腸不利諸病。則各有成病之由。當求其本而治。不宜概施。蓋此藥之爲用。乃以毒攻毒之功也。

國外學說 日本諸子氏曰。續隨子與甘遂大戟。共有峻下之效。其有效成分未詳。田原良純氏於續隨子中雖檢出エスクレン。而於治療上亦爲無效。〔藥學雜誌第九十三號〕然漢醫用之爲下劑之外。治疥癬。或除疣黑子。稱爲有效。其用量自二、八至八、〇。又和漢藥考曰。續隨子者。俗云爲毒蟲所螫時。壓壞此實。而摩擦之。或於金瘡等用之。甚妙。又日本九州土人中。食毒時。食此實。可以吐瀉毒物。見農業雜誌。愛斯克列丁。Asasulfine, $C_6H_5O_4$ 爲無色無臭之光耀針狀結晶。無味。稍

溶於冷水及冷酒精。逢熱湯與熱酒精。頗易溶化。但逢伊打哥羅仿姆。及硫化炭等。概不溶解。熱之。約於攝氏二百八十度。漸次分解而溶化。本品溶液。由醋酸鉛而生黃色沈澱。〔自東京化學會誌第十帙第八冊摘錄〕結晶性成分之愛斯克列丁。據已故醫學博士諸子吉人氏言。在治療上並無功效云。

配合應用 ①治小便不通。臍腹脹痛不可忍。用續隨子一兩。鉛丹半兩。同少蜜搗作團。瓶盛。埋陰處。臘月至春末取出。研蜜丸。梧子大。每服二三十九丸。木通湯下。〔聖濟總錄方〕

②治涎積癥塊。用續隨子三十枚。膩粉二錢。青黛炒一錢。研勻。糯米飯丸。炙子大。每服一丸。打碎。以大棗一枚。燒熟。去皮核。同嚼冷茶。送下。半夜後取下積聚惡物爲效。〔聖濟總錄方〕

③治蛇咬腫闊欲死。用重臺六分。續隨仁七粒。搗篩爲散。酒服方寸匕。兼睡和少許。用塗咬處立效。〔崔元亮海上方〕

④治黑子疣贅。續隨子於熱時塗之自落。〔普濟方〕

⑤治水氣腫脹。聯步一兩。去殼研壓去油。重研。分作七服。每治一人。用一服。丈夫生餅子酒下。婦人荊芥湯。五更服之。當下利。至曉自止。後以厚朴湯補之。類啖益善。忌鹽酸一百日。乃不復作。聯步即續隨子也。〔斗門方〕

⑥治陽水腫脹。續隨子炒去油二兩。大黃一兩。爲末。酒水丸。綠豆大。每服以白湯送下五十丸。以去陳莖。〔摘玄方〕

用量 八分至錢半。
施用宜忌 凡非氣壯邪實及脾虛便滑者禁服。

著名方劑 解毒萬病丹。治一切藥毒。疫死牛馬河豚等毒。及瘟疫熱毒。癰疽發背等症。山茨菰〔去皮洗淨焙〕二兩。川文蛤〔超破洗刮〕千金子〔去壳研盡油〕二兩。麝香〔細研〕三錢。大戟〔洗焙〕一兩。上各研末。以糯米粥爲劑。每料分作四十粒。於端午七夕重陽合如欲急用。辰日亦得。於木白中杵數百下。

參攷資料 ①續隨下水最速。然有毒損人。不可過多。〔蘇頌〕

②續隨與大戟。澤漆。甘遂。葶藶相似。主療亦相似。其功皆長於利水。惟在用之得法。亦皆要藥也。〔李時珍〕

③續隨子生蜀郡。處處亦有之。苗如大戟。〔馬志〕

④今南中多有北土產少。苗如大戟。初生一莖。莖端生葉。葉中復出葉。花亦類大戟。自葉中抽幹而生。實青有殼。人家園庭中多種以爲飾。秋種冬長。

春秀秋實。〔蘇頌〕

⑤莖中亦有白汁。可結水銀。〔李時珍〕

⑥續隨子仁最下痰飲。用白者十數粒。研碎去油服之。痰水即下。又曰。續隨子仁驅逐痰飲。亦良物也。〔黃元御〕

⑦續隨斷其莖極。則滲出乳液。觸於皮膚。則局部發疹。若誤食子實。則起刺衝而下痢。〔和漢藥考〕

⑧日本於天文年間。開始由葡萄牙傳入續隨子。故俗有呼爲葡萄牙者。〔和漢藥考〕

【續隨莖】 主治 剝人面皮。去

歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草論續隨莖曰。傳白癰癧瘍。

【獾】●即狼之牡者。典見爾雅。詳『狼』條。②即狗獾之原名。詳『狗獾』條。

【獾狹】即豬獾之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『豬獾』條。

【獾漢指頭】即枳椇子之古籍別名。典見綱目。詳『枳椇子』條。

【獾葡萄】即苦瓜之古籍別名。典見救荒本草。詳『苦瓜』條。

【獾蝦蟇】即蟾蜍之古籍別名。典見綱目。詳『蟾蜍』條。

【龜中黃土】即伏龍肝之古籍別名。典見和漢藥考。詳『伏龍肝』條。

【龜心土】即伏龍肝之原名。詳『伏龍肝』條。

【龜心黃土】即伏龍肝之處方用名。詳『伏龍肝』條。

【龜突墨】即百草霜之古籍別名。典見綱目。詳『百草霜』條。

【龜馬】
古籍別名 龜雞 龜壁 雞 (俗名)

外國名詞 Diestramena japonica, Brum. (拉丁) カウドウ (日本)
基本 係節肢動物昆蟲類直翅類螽斯科之龜馬。

產地 生陰溼地及龜屋間。

形態 龜馬爲化生蟲類之一種。其體裸出無翅。故無鳴器。亦無聽器。其背駝起。色赤褐。頭小有絲狀之觸角。後肢強大。尾有長刺。善跳躍。可供藥用。

主治 療竹刺入肉。取一枚搗傳。

【龜煙煤】即百草霜之處方用名。詳『百草霜』條。

【龜煤】即百草霜之處方用名。詳『百草霜』條。

【龜壁雞】即龜馬之俗名。詳『龜馬』條。

【龜雞】即龜馬之俗名。詳『龜馬』條。

【龜額墨】即百草霜之古籍別名。典見綱目。詳『百草霜』條。

【龜】即竹筍之古籍別名。典見僧贊寧。詳『竹筍』條。

【龜草根】即甘松之古籍別名。典見植物學大辭典。詳『甘松』條。

【續命筒】即乾漆之古籍別名。典見和漢藥考。詳『乾漆』條。

【續毒】即狼毒之古籍別名。典見和漢藥考。詳『狼毒』條。

【續根草】即香附子之古籍別名。典見圖經本草。詳『香附子』條。

【續骨木】即接骨木之古籍別名。典見綱目。詳『接骨木』條。

【續絃膠】即防風之古籍別名。典見和漢藥考。詳『防風』條。

【續筋根】即旋花之古籍別名。典見圖經本草。詳『旋花』條。

【續隨子】
命名 本品葉中出葉數數相續而生。故名。冬月始長。故又名拒冬也。

處方用名 千金子。

古籍別名 拒冬 (開寶) 千兩金。菩薩豆。日華 (聯步) 斗門方。

百兩金白隨子。反時生。牛枝連。蜀隨子。 (和漢藥考)

外國名詞 Semen Euphorbiae latyrta

基本 係屬大戟科續隨子之種子。

產地 馬志曰。續隨子蜀郡處處有之。

形態 續隨子爲一年生草。秋季抽圓莖。高達三四尺。葉初狹長。後變闊大。每節對生。作十字形。葉背及莖呈白色。夏季於葉腋開四

瓣黃紫色花。後結黑褐色扁圓形種子。大四五分。有三溝。成熟則三裂。中有種子三個。爲類似薊麻子之種子。大約一分五釐。表面呈淡褐色。有紋理。味辛有毒。

採取 八九月採實曬乾。

製法 李時珍曰。凡用去殼取色白者。以紙包。壓去油。取霜用之。

性質 辛溫。有毒。

成分 東京化學會誌第十帙第八冊。載有藥學博士田原良純氏之漢藥續隨子所含結晶成分實驗一文。言該藥中含有二種結晶性物質。其一爲愛斯克列丁。約含有〇・九%云。

效能 下水。破血。與大戟。甘遂功效相同。用作瀉劑。又治疥癬。或除疣黑子。

主治 婦人血結月閉。瘀血癥瘕。疥癬。除毒。鬼疰。心腹痛。冷氣脹滿。利大小腸。下惡滯物。

歷代記述攷證 【唐】韓保昇蜀本草論續隨子曰。積聚痰飲。不下。食嘔逆。及腹內諸疾。碎研酒服。不過三顆。當下惡物。【宋】大明日華諸家本草論續隨子曰。宜一切

齒密生毛茸。春夏間開小花。色白如梅花。後結小實如棗。熟則紅。經雨則蟲自內生。目不能見。用水浸之。良久。蟲皆出。乃可食。亦供藥用。



櫻 桃

性質 甘。熱。瀉。無毒。

主治 調中。益脾。氣。令人好顏色。美志。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論櫻桃曰。止洩精。水穀痢。

參攷資料 ①櫻桃食多無損。但發虛熱。耳有暗風。人不可食。食之立發。【孟詵】②櫻桃傷筋骨。敗血氣。有寒熱病人不可食。【李廷飛】③按張子和儒門事親云。舞水一富家有二子。好食紫櫻。每日

啖一二升。半月後。長者發肺癆。幼者發肺癰。相繼而死。嗚呼。百果之生。所以養人。非欲害人。富貴之家。縱其嗜欲。取死是何。天耶。命耶。邵堯夫詩云。爽口物多終作疾。真格言哉。王維詩云。飽食不須愁內熱。

大宜還有蔗漿寒。蓋謂寒物同食。猶可解其熱也。【李時珍】

【櫻桃水】 基本 本品係櫻桃中之流質。

性質 甘。辛。熱。

主治 凍瘡瘡及疹發不出。

參攷資料 春日鮮櫻桃。收貯磁瓶內。封口。放在涼處。爛過成水。濾渣聽用。【趙恕軒】

【櫻桃枝】 主治 去雀斑斑點。同紫萍。牙白。白梅肉。研和。日用洗面。

【櫻桃花】 主治 去面黑粉滓。

【櫻桃核】 卽山櫻桃之核。可供藥用。非尋常之櫻桃核。詳『山櫻桃核』條。

【櫻桃根】 採取 以東行者良。主治 煮汁服。立下寸白蟲。

【櫻桃葉】 性質 甘。平。無毒。主治 蛇咬搗汁飲。并傳之。

參攷資料 櫻桃葉煮老鵝。則易軟熟。【綱目】

【櫻珠】 卽櫻桃之日本名。詳『櫻桃』條。

桃 條。

【櫻類】 古籍別名 稠梨。【綱目拾遺】

產地 出關東鳥喇口外。

形態 櫻類爲夷果類之一種。其樹叢生。結實形如野葡萄。色黑而小。鮮時甚美。其果可供藥用。

性質 甘。澀。溫。無毒。

主治 補脾。止洩瀉。

參攷資料 櫻類實曬乾爲末。可以致遠。暑月調水服之。更佳。【綱目拾遺】

【櫟】 卽櫟之古籍別名。典見爾雅。詳『櫟』條。

【櫟木】 卽紗木甦之古籍別名。典見綱目。詳『紗木甦』條。

【櫟檀】 卽檀香之古籍別名。典見和漢藥考。詳『檀香』條。

【灌棗】 卽大棗之古籍別名。典見和漢藥考。詳『大棗』條。

【灌草】 古籍別名 鼠肝。【別錄】

形態 灌草爲雜草類之一種。其葉滑而色清白。可供藥用。

主治 療癰腫。

【爛瓜】 卽枳椇子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『枳椇子』條。

見和漢藥考。詳『枳椇子』條。

【爛石草】 卽馬先蒿之古籍別名。典見別錄。詳『馬先蒿』條。

【爛茶葉】 基本 本品乃泡過殘茶。積存磁罐內者。如乾則以茶汁浸入。愈久愈妙。效能 清火。解毒。

配合應用 ①治無名腫毒。犬咬及火燒成瘡。俱效如神。搗爛似泥敷之。乾則以茶汁潤澤。抹去再換。敷五六次全愈。【救生方】

②治瘡癤。用泡過茶葉。曬乾爲末。同五倍子各等分。雞子清調敷。【家寶方】

③治諸毒。肌肉不退。硫黃研細末。數上卽退。再用後收口藥。爛茶葉五錢。烏梅三個。燒灰。共爲末。敷上卽收。【保和堂秘方】

【爛砂星】 卽夜明砂之古籍別名。典見和漢藥考。詳『夜明砂』條。

【爛紫精】 卽夜明砂之古籍別名。典見和漢藥考。詳『夜明砂』條。

【爛腸草】 卽鈎吻之俗名。詳『鈎吻』條。

【爛構】 卽枳椇子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『枳椇子』條。

【爛構】 卽枳椇子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『枳椇子』條。

【爛構】 卽枳椇子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『枳椇子』條。

【爛構】 卽枳椇子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『枳椇子』條。

【爛構】 卽枳椇子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『枳椇子』條。

一九一七

科參、五加科參同一植物也。何時何地不可生長。在古代中國山西太行山一帶、潞安、遼縣等處。焉知不產五加科參。焉知其時真有豈科參。彼時就已豈科參而偶成人形者。亦不能謂爲五加科參而混沌稱呼也。以五加科參及豈科參比較鑑別。迥然不同。五加科參苗葉生數柄。每葉分五歧。根長數寸。豈科參苗生繁盛。簇生如豌豆根長數尺。觀察植物形態。顯然兩種不能認兩種爲一物者。一也。五加科參爲興奮劑。豈科參爲強壯健胃劑。實驗藥效成分。功用各異。不能認兩種爲一物者。二也。再以中國藥效言之。人參爲溫補峻烈之劑。用以峻補五臟陽氣之君藥。黨參爲平補和緩之劑。用以滋養脾胃之要藥。此又不能認兩種爲一物者。三也。若不以爲然。可親採其藥苗而實驗之。自知言之不謬也。考本草所載。隋文帝時。上黨有人宅後。夜夜聞人呼捕之不得。距宅里許。掘得人參。酷似人形。四肢畢具。呼聲遂絕。在彼時是五加科參根而成人形者。抑是豈科參根

而成人形者。或云不敢決定。何以現在上黨所產之參。均爲豈科參。未聞產一二株五加科參也。卽是豈科參能成人形者。亦不稀奇。例如何首烏之根長成童形。枸杞之根長成大形。橘中二鬼。草下一蟲。凡植物之根能成異形者。爲極尋常之事實也。居今日之文明時代。又爲科學進步時代。竟有醫界中人研究五加科參與豈科參而混爲一物。良可嘆也。要知五加科參東西各國已研究分析。培養種植。每年得利若干。確有把握。中國不但不知種植而抵禦之人參。黨參界限。尙且多未分別。歐美諸國。對於豈科參不知研究否。固無論矣。考中國本草。自古迄今。上下數千年。除張騫、吳遷程、黃宮繡、屠道和在應用上大略分別言之。再無醫界中人認黨參爲另一種而詳細研究者。余有感於此。謹就豈科參各項研究。以補先進之缺點。而供醫藥界證明爲二物及博物家之參考也。又曰。以中國研究黨參氣平味甘。爲足太陰脾足陽明胃三經之要藥。而屠道和謂其甘平清

肺之藥。用作人參之代用品者。誤也。余在實驗上對於脾胃之虛弱等症。令其多服久服。雖則有效。病減甚緩。惟用於老年人或氣虛之體。下肢瀉腫及四肢面部水腫。配五皮飲加焦冬朮。奏效甚速。總而言之。因其氣平與淡品藥物同用。最爲相宜。尤宜虛寒虛症。不宜於實熱之病。而用量宜輕不宜重。寧可一日內多服數劑。不可一劑內用其大量。恐用大量致有變證也。用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡非虛寒而有實邪者禁用。忌鐵劑膩品。

製法 黨參膏。藥市所製黨參膏。現在只稠厚流膏一種。其內多配伍其他藥品。在商家應用。意此藥比別家較好。在病家應用。不免有誤投之弊。而今以純品製成分爲流膏硬膏兩種。流動者便於病家服用。乾固者便於旅行攜帶。其功用與黨參同。

流動黨參膏之製法。取鮮黨參壓搾其汁液。熬膏最佳。但非在原產地不可。如取乾黨參製膏。切碎用熱水浸數日。煎數次。盛布袋壓搾其汁液。須用粗

紙過濾。取其汁液。熬至稠厚爲度。貯瓶中供藥用。

硬固黨參膏之製法。取前項熬成之稠厚流膏。盛模型中。入乾燥器內烘乾爲度。貯藏供藥用。

參攷資料 按古本草云。參須上黨者佳。今真黨參久已難得。肆中所賣之黨參。種類甚多。皆不堪用。唯防風黨參。性味和平。足貴。根有獅子盤頭者。眞。硬紋者。僞也。白黨味微甘而甚淡。功用遠不及爾。

（吳遷程）黨參一名黃參。黃潤者良。出山西潞安太原等處。有白色者。總以淨軟壯實味甘者佳。嫩而枝小者。名上黨參。老而大者。名防風黨。味甘性平。治肺虛能益肺氣。

（百草鏡）白參卽將黨參曬而成。原汁已出不堪用。

（吳遷程）黨參功用可代人參。皮黃色而橫紋有類乎防風。故名防風黨。江南徽州等處。呼爲獅頭參。因薦頭大而圓凸也。古名上黨人參。產於山西太行山潞安州等處。爲勝陝西者次之。味甚甜美。勝如棗肉。近今有川黨。蓋西陲毗連移種。栽植皮白味淡。類乎桔梗。無獅頭

振動中氣，而無剛燥之弊。是裏坤土中正之氣，柔順之德，而無偏無害者。且較諸遼參之力量厚重，而少偏於陰柔。高麗參之氣味雄壯，而微嫌於剛烈者。尤爲得中和之正。宜乎五臟交受其養，而無往不宜也。特力量較爲薄弱，不能持久。凡病後元虛，每服二三錢，止足振動其一日之神氣，則信乎和平中正之規模。亦有不耐悠久者。然補助中州而潤澤四隅，與坤土合德，亦可謂至德也已。故凡古今成方之所用人參，無不可以潞黨參當之。即凡百證治之應用人參者，亦無不可以潞黨參投之。不僅取其惠而不費，可以節用，而隱爲斯民造福，卽論其功德及人，亦較彼遼參之價值連城者，又何嘗多讓。不謂張氏逢原、吳氏從新，既取之而所用不足以盡其所長，殆猶未免皮相之見耶。○今世以黨參號名者，就余目前所見，有六種：一防黨、二潞黨、三川黨、四湘黨、五文黨、六利黨。考參以黨得名，原由產自上黨郡，自參種移植於各地，而仍以黨名之。其實地已全非，參亦異樣。

今品其優劣，則防黨爲勝。其餘五種，除潞黨外，每混充防黨，而實屬遠遜。潞黨形體細長，與防黨顯然易別，不致誤認。惟川黨、湘黨、文黨、利黨與防黨，形似往往混充。余核驗防黨，色較黃赤，其獨有之特徵，則皮有橫紋，整然不紊。其餘四種，則無橫紋，祇有凸凹不平之直皺紋。而湘黨、文黨、色皆晦，川黨、利黨，色皆白。但製藥者，可以未糖水熬成黃色。防黨之味甜，而純厚。川黨之味甜，而淺薄。利黨、湘黨，文黨，味亦淺薄。然皆可以糖水助之。須試其生藥，方有分別。余又切視各參橫斷面，中俱有一白心，旁俱爲腺管。惟防黨之腺管極鬆，管孔分明，可見。餘四種，不及其腺管皆模糊不辨。因此之故，防黨之外皮，良好端正。由於腺孔鬆，則外皮有。其他四種，腺孔不鬆，則外皮不有。且防黨全體柔軟，其他四種，雖大體亦軟，然比較之，則不及。而川黨且硬脆，亦折。余惟腺管爲液道，氣道，黨參之補，在液與氣。其液道氣道，分明端正者，其所行之液與氣，倍有力，味甜，走胃腸與脾，調和其

胃、脾、腸、脾、脾，自然有效。古方以此物入四君子湯，不爲無功。其他四種，未必有此氣力。然每用以混充防黨，則以其價賤，較之防黨，不啻五與一。而以利爲問題。則藥效不可問矣。○趙蕞臣曰：黨參，是地名。卽古上黨也。又黨所也在於山上，其所最高。故曰上黨。上黨，禹貢屬冀州，殷爲魏國。春秋時爲臯落氏地。後爲晉有。七國時屬趙。亦屬魏。秦治上黨郡。屬并州。古上黨，關楚漢之時，爲西魏地。漢上黨郡，十四城。後漢上黨郡，十三城。三國魏因之。晉及後周，北齊，仍爲上黨郡。隋開皇年，別置上黨縣。大業初，年復爲上黨郡。唐武德初，改上黨郡爲潞州。上黨縣如故。後復潞州爲上黨郡。乾元又改爲潞州。五代梁、唐、晉、漢、周，爲潞州。宋金、元、互改爲潞州。及上黨縣。明初，省上黨縣入潞州。嘉靖八年，并州爲潞安府。又置冀南道於此。清康熙六年，併潞安府於冀寧道。民國元年，廢府道，存縣治。今長治、長子、屯留、潞城、黎城、襄垣、平順、八縣，卽古上黨也。按地理及山脈言，在山西省

東南部。太行山之南端也。隋文帝由上黨發見，潞名曰黨，黨卽草名也。故從艸。浸，堅，藥草名也。從浸，浸，同。浸，浸，漸之意。卽年久浸漸長成之意也。潞之名考。古本本草載有人潞、玄潞、沙潞、丹潞、苦潞、紫潞、六種。獨未載黨潞。黨潞爲隋文帝時發明，絕對無疑。考唐書地理志：太原府土貢人潞。非黨參，而何所貢之參。既爲人參，何以唐以前未聞。太原有貢者，何以隋文帝發明時，不命名曰人參，而曰黨參。又曰：自民國以來，研究潞者夥矣。以西醫研究者，獨重人參，而不重黨參。以中國研究者，人參黨參多有混合爲一物，而不分別之。夫人參爲五加科植物，黨參爲荳科植物，分明兩種，而不可混淆。俗醫竟以一物而應用哉。考神農本草經：人參味甘微寒，主補五臟，安精神，定魂魄，止驚悸，除邪氣，明目，開心，益智。久服輕身延年。決不是指今日之荳科黨參而言。按人參之名詞，對五加科人參之根而稱呼也。偶而長成人形者，可謂之人參。不成人形者，只可謂之參。不可謂之人參。草

健身體之效力。又治慢性腸加吞
兒胃弱吞酸及糖尿病之初期。

作用 能補助胃腸之消化。促

進乳糜之吸收。又對淋巴系及血
行系。能增進新陳代謝之功用。

主治 補中益氣生津。和脾胃。
除煩渴。中氣微虛。用以調補。甚為
平安。

歷代記述攷證 【清】張石頑

張氏醫通論黨參曰。黨參產山西
太行山者。却有甘平清肺之力。不
比人參甘溫有峻補之功。亦不似
沙參性寒。專泄肺氣也。【清】黃宮
繡本草求真論黨參曰。人參而有
上黨之號。蓋緣隋文帝時。上黨有
人宅後。每夜聞人呼求之不得。去
宅一里許。見參異常。掘得人參一
如人體。四肢畢備。呼聲遂絕。又上
黨人參。根頗纖長。根下垂有芟一
尺餘者。或十歧者。其價與銀相等。
遼東高麗伯濟諸參。均莫及焉。李
時珍云。上黨潞州也。民以人參為
地防害。不復採取。今所用者。皆是
遷參。觀此則知諸參惟上黨為最
美。而上黨既不可採。豈復別有黨
參之謂哉。近因遷參價貴。而世好

奇居異。乃以山西太行山出之苗。

及以防風。桔梗。薤白。偽造相繼混
行。詎知參有不同。性有各異。防風

桔梗。乃屬表散風寒傷氣之味。人
參甘溫。乃屬補肺益氣之味。即山

西太行山新出之黨。考之張璐。亦
謂甘平清肺。並非等於真正黨參。

確有補益。今人但見參貴。而即以

此代參。不亦大相逕庭乎。且余嘗
見虛弱之症。亟當人參峻補。以致

垂絕。而醫輒用黨參替代。以致病
卒不起。并令豪貴之家。朝夕代茶。

以致肺受剝削。病潛滋長。此皆誤
用之害人。但習而不察耳。附記以

為世之粗工妄用黨參者戒。

辨偽 ●鄭肯巖曰。黨參種類

不一。綱目拾遺引翁有良辨誤云。
黨參功用可代人參。皮色黃而橫
紋。有類乎防風。故名防黨。江南徽
州等處。呼為獅頭參。因頭大而
圓凸也。古名上黨人參。產於山西
太行山路。安州等處。為勝。百草鏡
有云。亦有白色者。總以淨軟壯實。
味甜者佳。嫩而小。枝名上黨參。老
而大者。名防黨。味甘平。補中益
氣。和脾胃。除煩懣。解渴。中氣微虛。

用以調補。甚為平安。今有川黨。蓋

陝西毗連。移種栽植。皮白味淡。有
類桔梗。無獅頭。較山西者過別。入

藥亦殊劣。不可用。近肆中一種黃
色黨參。有用梔子熬汁染造者。服

之。涌吐。更有一種小潞黨參。皮色
紅者。乃鑿紅所染。味澀不甘。皆贗

物也。用者宜明辨之。●曹炳章曰。

按前賢所謂人參。產上黨者。即今
黨參是也。考上黨。即今山西長子

縣境。舊屬潞安府。故又稱潞黨參。
其所產參之形狀。頭如獅子頭。皮

細起皺紋。近頭部皮當有方紋。體
糯。糙黃色。肉白。潤。味甜鮮潔。為

黨參中之最佳品。其他產陝西者

曰介黨。亦皮紋細。糯。肉色白。
潤。味鮮甜。亦為佳品。如鳳黨。皮紋
雖略糙。性亦糯。軟。味亦甜。產四川
文縣者。曰文元黨。皮直紋。性糯。味
甜。頭小於身。條皆佳。又一種川
黨。俗稱副文元。產川陝毗連處。性
硬。皮粗。寬紋。粗。肉色白。味淡。
為次。產禹州者。曰禹黨。產紋富者。
曰紋富黨。皆粗皮直紋。性硬。肉燥。
呆白色。味淡。皆次。產關東吉林者。
曰吉林黨。皮寬粗而糙。頭甚大。如

獅子頭。肉白燥而心硬。味淡有青

草氣。價甚賤。為黨參中之最次者。
其餘種類甚多。未及細辨。總之以

皮紋細。肉白柔潤。頭小於身。氣
帶清香。味甜鮮潔者佳。若皮粗肉

堅。或齏。味淡氣腥。如青草氣者。皆
為側路。以此分別。最為明晰。如鄭

君云。有用梔子熬汁染造者。及皮

紅以鑿紅所染者。云云。此等贗物。
我江浙未之見也。

近人學說

●張山雷曰。黨參
之名。初不見於古書。僅於張氏之
逢原。吳氏之從新。及趙氏之拾遺
見之。今則南北通行。凡醫藥中。應
用人參者。幾於無不用此。則以價
值尚廉。而功用堪信耳。惟市肆中
亦有數種。以西潞黨為最佳。枝不
必其巨。但以近蘆處橫紋細密。為
真。皮肉不必其白。但取其柔潤。不
枯。生嚼之。甘味極濃。而多脂。骨無
渣滓者。為上。其他稱潞黨者。尚有
數種。皆遠不逮也。力能補肺養胃。
潤肺生津。健運中氣。本與人參不
甚相遠。其尤可貴者。則健脾運而
不燥。滋胃陰而不滯。潤肺而不犯
寒涼。養血而不偏滋膩。鼓舞清陽。

堅韌而微有空罅。或無之。爲周圍有圓凹沿不規則之圓面。自小白心至表皮處。有直線形輻射紋。貼表裏圍周圍有不足寬一分之褐色一環也。而順斷之面。可想像而類推之。

種類

●潞黨參。係產山西潞安府等處者。●遼黨參。係產山西遼縣者。●臺黨參。係產山西五臺縣者。●交黨參。係產山西交城縣者。●大山參。係產中國北部歸綏區大青山野者。●川黨參。係產四川山野者。●南黨參。係由各商自河南彰德藥會販來者。●南山參。係產陝西終南山者。●野黨參。係山野自生。有生長數年而採得者。有生長數十年而採得者。●種黨參。係由人工栽種。有一二年而採收者。有三四年而採收者。●白黨參。爲原來之皮色。而有牙白色者。有骨白色。又有土白色者。●紅黨參。係產山西黎城縣各處者。採收後。用紅色之土搓染紅色。非天然之色者。●獅子盤頭參。乃野生黨參之莖頭。生長數年枝枯之蒂痕。多至十餘個。其蒂上之皮紋。螺旋纏繞。

全蘆形狀。如見畫壁獅頭之毛蓬蓬盤繞者。●防風黨參。係黨參全形之小者。如防風形狀也。●黨參各處所產。以山西上黨八縣野產者佳。五臺縣野產者尤佳。大青山野產者更佳。惜產數極微。而人工種植者次之。

種植

●土地之選擇。以依傍石山之土地。或砂土地爲最善。●種植之方法。第一年爲秧苗培養期。按各地氣候之寒暖。於植樹節前後。先灌漑土地。耕掘虛鬆。而使平坦。遂播種其種子。待參苗發生齊全。勿令土氣乾燥。寒地冬時。宜以草掘覆之。可免凍傷之害。●翌年之分秧。第二年爲栽秧期。挖取第一年之蘖秧。於另一土地。依土地之優劣。相距四五寸或七八寸。各種一苗。隨時灌漑。所用肥料。宜以植物肥料。如豆餅類爲最佳。不宜以動物肥料。如骨粉類爲最忌。●另地之移植。第三年可以另地移栽。使生長茂盛。如洗澆。灌根壅則堅實矣。生長經過數年後。方可採掘。●採掘之方法。採取之年。勿使開花結實。否則實液即不能充。

於根莖也。用人工剪去花實。則可更宜注意詳記苗之發生。葉柄。花實生長之節氣。以供藥用之研究。蓋因各地氣候不同。故生長亦不同。則不能預定故耳。

採取

●人工栽培者。於八九月間。翌年之芽胞發時。或二三月間。苗未發生而津液未充。苗葉時。採掘其地下根莖。陰乾供藥用。●山野自生者。於春秋兩季。須入山採收。移運多年野生者最佳。欲知其歷年多少。須數地下莖之上端。近蘆處。橫列凹凸之皺紋。每皺紋有兩層者。必經一年。數得幾雙皺紋。便知經過幾個春秋。此皺紋之生也。每年經氣候之寒暖兩次。因榮枯福澤之理。必生兩層皺紋。爲自然之理也。採時用錐。其掘取周圍之土。輕輕去其根莖。謹防鏟傷其莖。若傷其莖。失去莖間之白色乳汁。藥效必失大半。如誤斷其莖。宜用線繩繫其斷處。或可保留其乳汁之津液。採收回送陰而乾之。

製法

●採得陰乾時。當用手隨時揉握之。使皮肉緊貼而堅實。

若不用手揉握。參身皮肉分裂爲兩層。則虛鬆而不堅實。不能耐久。必須揉握至乾。紮分圓錐形之把。而收藏於乾燥之處。時值生蟲之際。宜時時晒晒。以防蟲蝕。而重保存。●黨參本年採收者。質柔而潤。藥效充足。出處則可。遠方多不易得。舊存咀片或整把。放置於三年以上者。收藏安當。雖不如新者力強。尚可入藥。若在五六年以上者。不問蟲蝕腐朽與否。均不堪入藥。而橘皮。地黃之宜用陳者。豈可與黨參同日而語哉。例如藥市所售之黨參。皆其內攪雜其他藥品。質不純粹。用無效驗。猶其小者也。往往有蟲蝕腐壞。不能作湯劑用者。製成膏劑出售。妨礙治療。其害之大。不可不知也。

●製法。凡使有用土炒者。有用米炒者。概因土氣入脾之義。並可去黨參內之油質也。

●性質。甘平無毒。

●成分。含有澱粉糖質。及少量脂肪。

●效能。補脾胃。生津液。用作強壯健胃藥。用於一切衰弱症。有強

藥用。

性質 甘平。無毒。

主治 炙食令人勇健。

歷代記述攷證 【明】汪穎食

物本草論鴉肉曰炙食令人肥潤

【驚】即鴉之原名。詳『鴉』條。

【驚肉】即鴉之處方用名。詳『鴉』

條。

【驚肪】即雁肪之古籍別名。典

見綱目。詳『雁肪』條。即鴨肪之

原名。詳『鴨肪』條。

【鴉鴉】即杜鵑之古籍別名。典見

綱目。詳『杜鵑』條。

【鹹豆豉】性質 鹹寒。無毒。

效能 調中發汗。通

關節。解腥氣。

主治 寒熱。虛勞。傷寒。鼻塞。煩

熱。熱毒。

製法 用大豆水浸三日。淘蒸

攤置俟上黃取出。簸淨。水淘。曬乾。

加鹽。薑絲。椒。橘。蘇。茴。杏仁。拌勻。入

鹽上面水浸。以箬蓋封口。曬一月。

即成。

【鹹昆布】即昆布之處方用名。詳

『昆布』條。

【鹹秋石】即秋石之處方用名。詳

『秋石』條。

【鹹豉】即鹹豆豉之簡稱。詳該條。

【鹹魚】即鮑魚之別名。典見綱目。

詳『鮑魚』條。

【鹹菹菹】即肉菹菹之處方用名。

詳『肉菹菹』條。

【鹽角】即羚羊角之古籍別名。典

見綱目。詳『羚羊角』條。

【黨參】命名 本品出上黨地

方。而形如參。故名。

處方用名 潞黨參。西潞黨。文

元參。上黨參。

古籍別名 遼黨。臺黨。交黨。大

山黨。川黨。南黨。南山黨。野黨。澤

種黨。白黨。紅黨。獅子盤頭

黨。防風黨。趙壽臣。防黨參。

外國名詞 Campanumaea

pliosia

基本 屬荳科。為雙子葉植物

部。離瓣花。植物類為黨參之根。

產地 凡山野間恒多。生焉。趙

靈臣黨。新研究云。黨參產中國

山西。長治。長子。屯留。壺關。潞城。黎

城。襄垣。平順。和順。遼縣。交城。五臺

等縣。陝西。終南山。四川。各山。歸綏

大清山等處。

形態 黨參為山野自生及

栽種田園之多年宿根草。根長數

寸至數尺不等。鬚根多少不一。苗

由地下莖上端蘆頭處發生。多數

簇生。長柄。葉枝長三四尺不等。枝

葉繁盛。生長稠密。如豌豆之簇生

狀。葉枝細長。如莢。葉生時形如杏

葉。而薄。小葉之主脈明顯。支脈不

甚分明。葉柄細長。全苗之葉皆係

對生。均呈綠色。微帶碧黃色。季夏

枝間開梅花色豆花形之小花。秋

季結莢。角長約寸餘。剖之內藏數

粒。豆形種子。名曰黨參豆。初結莢

角呈青色。成熟時呈黃褐色。深秋

苗則乾枯。如白絲。來年春風一吹

又從宿根而生。○大山黨參之鮮

者。肥白細膩。身長乳足而粗。大皮

顯橫紋。而無順皺紋。內部少植物

纖維。味甘而淡。有土香之氣。其嫩

如白蘿蔔。用其鮮者入藥。其效最

著。陰乾用之。亦無不稱贊。適產量

極少。又不易得耳。其路安等處之

鮮黨參。無論野生與種植。質粗味

微澀。均不甚好。○野黨參之乾者

其根自蘆至梢長五六寸至三四

尺不等。莖根至梢根圓徑八九分。

漸至梢漸細。至一二分大小不等。

近蘆處周圍有多數橫皺紋。其至

下梢有稀疏之深凹順皺紋。蘆頭

上有多數葉梢脫落之螺旋突起

蒂痕。全身周圍有寬一二分至四

五分之橫列隆起枝。此枝乃乾野

黨之極要點。全身色澤蒼老而瘦

有含而不露之油潤氣象。外皮灰

白色。而又罩黑色之薄薄一層土

鏽味。甘。而土香之氣稍濁。○種黨

參之乾者。根長三四寸至三四尺

不等。上粗下細之圓徑六七分至

一二分。近蘆處有少數橫皺紋。遠

蘆處有多數順皺紋。及多數毛根

質潤而肥。不甚密緻。外皮牙白色

而又罩灰土色之土鏽。味甘。而微

有土香之氣。○野生鮮黨之橫斷

面。質嫩軟。而無空隙。為非真圓之

圓面。中心之白色小點。不甚顯明

自中心之輻射紋。略顯白色之最

細縱紋。貼表皮之褐色環。其色極

淡。圓面全部之色澤。如燈光之黃

色。見燈光之色。如見其物之色也

而順斷面之形色組織。及莖角之

剖面種子。種子之破面胚胎。可參

看圖釋。○野生乾黨之橫斷面。質

種。頭小尾尖。頭縮鱗細。身扁。腹大。其色青白。腹中有肪。味頗腴美。其肉可供食與藥用。

性質 甘溫無毒。

主治 調胃氣。利五臟。和芥食之。能助肺氣。去胃風。消穀。作鱸食之。助脾氣。令人能食。作羹臠。食宜人。功與鰕同。疳痢人勿食。

【鰈】即比目魚之古籍別名。典見綱目。詳「比目魚」條。

【鰈】即比目魚之古籍別名。典見綱目。詳「比目魚」條。

【鰈】即泥鰍之原名。詳「泥鰍」條。

【鰈】即鰈魚之古籍別名。典見綱目。詳「鰈魚」條。

【鰈魚】即鰈魚之古籍別名。典見綱目。詳「鰈魚」條。

【鰈魚】即鰈魚之古籍別名。典見綱目。詳「鰈魚」條。

【鰈魚】即鰈魚之古籍別名。典見綱目。詳「鰈魚」條。

【鰈魚】即鰈魚之古籍別名。典見綱目。詳「鰈魚」條。

【鰈魚】即鰈魚之古籍別名。典見綱目。詳「鰈魚」條。

種。頭小尾尖。頭縮鱗細。身扁。腹大。其色青白。腹中有肪。味頗腴美。其肉可供食與藥用。

性質 甘溫無毒。

主治 調胃氣。利五臟。和芥食之。能助肺氣。去胃風。消穀。作鱸食之。助脾氣。令人能食。作羹臠。食宜人。功與鰕同。疳痢人勿食。

【鰈】即比目魚之古籍別名。典見綱目。詳「比目魚」條。

【鰈】即比目魚之古籍別名。典見綱目。詳「比目魚」條。

【鰈】即泥鰍之原名。詳「泥鰍」條。

【鰈魚】即鰈魚之古籍別名。典見綱目。詳「鰈魚」條。

【鰈魚】即鰈魚之古籍別名。典見綱目。詳「鰈魚」條。

【鰈魚】即鰈魚之古籍別名。典見綱目。詳「鰈魚」條。

【鰈魚】即鰈魚之古籍別名。典見綱目。詳「鰈魚」條。

【鰈魚】即鰈魚之古籍別名。典見綱目。詳「鰈魚」條。

【鰈魚】即鰈魚之古籍別名。典見綱目。詳「鰈魚」條。

瘡。下乳汁。法制壯陽道。黃汁吐風痰。搗膏傳蟲疽。【清】黃宮繡本草求真論鰈曰。鰈味最甘。席品所尚。然性善跳躍。風火易動。是以書載小兒切勿妄食。恐其發瘡動氣也。陰虛火動者尤忌。以其性易洩除也。惟乳汁不下。及風痰不吐。與制藥壯陽為差宜耳。海馬種亦鰈屬。雌雄勿離。鰈類馬身似鰈。浮於水面。亦主下胎催產。及佐房術之用也。【清】王士雄隨息居飲食譜論鰈曰。鰈性甘溫微毒。通督壯陽。吐風痰。下乳汁。補胃氣。拓痘瘡。消鰈瘕。傳丹毒。多食發風動疾。生食尤甚。病人忌之。海鰈性味相同。大小不一。產東洋者尤佳。鹽漬曝乾。乃不發病。名式甚夥。厥味皆鮮。開胃化痰。病人可食。其子可醃。可曝。味亦鮮美。

配合應用

治鰈瘕疼痛。類編云。陳拱病鰈瘕。隱隱見皮內痛。不可忍。外醫洪氏曰。可以鮮鰈作羹食之。久久痛止。明年又作。再如前治而愈。遂絕根本。

補腎與陽用鰈米一斤。蛤蚧一枚。茴香。蜀椒。各四兩。並以青鹽

化酒。炙炒。以木香粗末一兩。和勻。乘熱收根。餅中密封。每服一匙。空心鹽酒嚼下甚妙。

治鰈瘕生蟲。用小鰈三十尾。去頭足。微同糯米飯研爛。隔紗貼瘡上。別以紗單之一夜解下。挂看皆小赤蟲。即以蔥椒湯洗淨。用舊茶箱內自竹葉隨大小剪貼。一日二換。待汁出盡。逐日煎苦楝根湯洗之。以好膏貼之。將生肉。勿換膏藥。忌發物。【直指方】

治血風腫瘡。生鰈。黃丹。搗和貼之。日一換。【集簡方】

施用宜忌 凡有瘡癰宿疾者禁用

參攷資料

江湖出者大而白。溪池出者小而青。背脊嶮嶮。鰈鼻背有斷節。尾有硬鱗。多足而好躍。其腸屬鰈。其子在腹外。凡有數種。米鰈。糠鰈。以精粗名也。青鰈。白鰈。以色名也。梅鰈。以梅雨時有也。泥鰈。海鰈。以出產名也。嶺南有天鰈。其蟲大如蟻。秋社後羣墮水中。化為鰈。人以作鮓。食凡鰈之大者。蒸曝去殼。謂之鰈米。食以蠶繭。饌品所珍。【李時珍】

以熱飯盛密器

所珍。【李時珍】

也。(集簡方)

●治小兒舌腫。鮮鯽魚切片貼之。頻換。(總微論方)

●治小兒丹毒。從髀起流下。陰頭赤腫出血。用鯽魚肉切五合。以赤小豆末二合。搗勻。入水和傅之。(千金方)

●治小兒禿瘡。鯽魚燒灰。醬汁和塗。一用鯽魚去腸。入皂礬燒研。搽。(千金方)用大鯽去腸。入亂髮。燒滿。燒研。入雄黃末二錢。先以藥水洗拭。生油調勻。搽之。(危氏方)

●治小兒頭瘡。畫開出膿。夜即復合。可用鯽魚長四寸。一枚。去腸。大附子一枚。去皮。研末。填入。炙焦。研傅。搗蒜封之效。(聖惠方)

●治走馬牙疳。用鯽魚一個。去腸。入砒一分。生地黃一兩。紙包。燒存性。入枯白礬。麝香少許。爲末。搽之。

●治牙疳出血。大鯽魚一尾。去腸。留鱗。入當歸末。泥固。燒存性。入煨過鹽。和勻。日用。亦治搯牙烏髮。(聖惠方)

●刮骨取牙。用鯽魚一個。去腸。入砒在內。露於陰地。待有霜刮下。

瓶收。以針搜開牙根。點少許。咳嗽自落。又方。用磁砂入鯽魚內。煨過。瓶收。待有霜。刮取如上法用。

●治諸瘡腫毒。鯽魚一斤者。去腸。柏葉填滿。紙裹。泥包。煨存性。入輕粉二錢。爲末。麻油調搽。(普濟方)

●治浸淫毒瘡。凡卒得毒氣攻身。或腫痛。或赤痒。上下周匝。煩毒欲死。此浸淫毒瘡也。生鯽魚切片。和鹽搗貼。頻易。(聖惠方)

●治臂上便毒。鯽魚一枚。山藥五錢。同搗敷之。卽消。(醫林集要方)

●治骨疽膿出。黑色。鯽魚一個。去腸。入白鹽。令滿。封定。以水一盞。石器內。煮至乾。魚爲末。猪油調搽。少痛勿怪。(危氏方)

●治手足癰疽。累累如赤豆。剝之。汁出。大鯽魚長三四寸者。亂髮一雞子大。豬脂一升。同煎膏塗之。(千金方)

●治腫生瘡。用中鯽魚三尾。洗淨。穿山甲二錢。以長皂莢一挺。劈開。兩片夾住。扎之。煨存性。研末。先以井水洗淨。膿水。用白竹葉刺。

孔貼之。候水出盡。以麻油輕粉調藥。傳之日一次。(直指方)

●治小兒撮口。出白沫。以艾灸口之上下四壯。鯽魚燒研。酒調少許。灌之。仍掐手足。兒一歲半。則以魚網洗水灌之。(小兒方)

參攷資料 ●夏熱痢有益。冬月不宜。(本草綱目) ●和蒜食少熱。同沙糖食生疳。同芥菜食成腫疾。同豬肝雞肉。牛肉。鹿肉。猴肉。食生癰疽。同麥門冬。食害人。(張鼎) ●鯽喜偎泥。不食雜物。故能補胃。冬月肉厚子多。其味尤美。鄒道元水經注云。荊州廣濟。青林湖。鯽魚大二尺。而食之肥美。辟寒暑。東方朔神異經云。南方湖中多鯽魚。長數尺。食之宜暑。而辟風寒。呂氏春秋云。魚之美者。有洞庭之鮪。觀此則鯽爲佳品。自古尙矣。(李時珍)

●鯽魚子 主治 調中。益肝氣。施用宜忌 忌豬肝。

●鯽魚骨 主治 驅瘡。燒灰傅。敷次卽愈。

●鯽魚腦 主治 耳聾。以竹筒蒸過。滴之。

●鯽魚頭 主治 小兒頭瘡。口瘡。重舌。目瞤。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論鯽魚曰。燒研。飲服。療咳嗽。【明】李時珍本草綱目論鯽魚曰。燒研。飲服。治下痢。酒服。治脫肛。及女人陰脫。仍以油調搽之。醬汁和塗。小兒面上黃水瘡。

●鯽魚鮮 主治 瘡瘡。批片貼之。或同桃葉搗傳殺其蟲。

●鯽魚膽 主治 取汁塗疳瘡。陰蝕瘡。殺蟲止痛。點喉中。治骨鯁。竹刺不出。

●鯽魚鱗 主治 久痢赤白。腸痔疾。大小兒丹毒。風眩。

歷代記述攷證 【唐】孫思邈千金翼論鯽魚鱗曰。治脚風及上氣。【明】李時珍本草綱目論鯽魚鱗曰。溫脾胃。去寒結氣。

●鰻魚 原名 魴魚。命名 魴者。方也。鰻者。扁也。其狀方。其身扁。故名。產地 生湖澤淡水水中。形態 魴魚爲魚類鱗屬之一。

主治 合掌作羹。主胃弱不下食。調中益五臟。合焚首作羹。主丹石發熱。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器

本草拾遺論鯽魚曰。合五味煮食主虛羸。【唐】韓保昇蜀本草論鯽魚曰。止下痢。腸痔。【唐】蘇恭新修本草論鯽魚曰。生搗塗惡核腫毒不散及瘡。同小豆搗塗丹毒。燒灰和醬汁塗諸瘡。十年不瘥者。以豬脂煎灰服。治腸癰。【宋】大明諸家本草論鯽魚曰。溫中下氣。【明】李時珍本草綱目論鯽魚曰。合小豆煮汁服。消水腫。灸油塗婦人陰疳。諸瘡殺蟲止痛。釀白礬燒研飲服。治腸風血痢。釀硫黃煨研。釀五倍子煨研。酒服。並治下血。釀茗葉煨服。治消渴。釀胡蒜煨研。飲服。治隔氣。釀綠礬煨研。飲服。治反胃。釀鹽花燒研。搗齒疼。釀當歸燒研。搗牙烏髭止血。釀砒燒研。治急疳瘡。釀白礬煨研。搗骨疽。釀附子炙焦。同油塗頭瘡。白朮。【明】繆希雍本草經疏論鯽魚曰。鯽魚莫土氣以生。故其味甘。其氣溫無毒。是以能入胃。治胃弱不下食。入大腸。治赤

白久痢。腸癰。脾胃主肌肉。甘溫能益脾生肌。故主諸瘡久不瘥也。藏器主虛羸。大明主溫中下氣。孟詵云。調中益五臟。表其益脾和胃之功也。【清】黃宮繡本草求真論鯽魚曰。鯽魚氣味甘溫。諸魚性多屬火。惟鯽魚則性屬土。土能制水。故書載有和胃胃腸行水之功。凡腸

風下血。腸氣吐食。俱可用此投治。且性與厚朴反。可塗痰核乳癰。堅腫。以豬油煎灰服。可治腸癰。合赤小豆煮汁食。則消水腫。灸油則治婦人陰瘡。同白礬燒煨。則治腸痢血痢。入綠礬泥固煨。則治反胃吐血。與胡蒜煨。則治腸氣痞滿。皆以借其制水之意。但煨不可去礬。以鱗有止血之功。烏背者味美。忌麥冬。芥菜。沙糖。豬肝。【清】王士雄隨息居飲食譜論鯽魚曰。甘平開胃。調氣生津。運食和營。息風清熱。殺蟲解毒。散腫愈瘡。止痢止疼。消疳消痔。大而雄者勝。宜蒸煮食之。外感邪盛時勿食。嫌其補也。餘無所忌。煎食則動火。

配合應用 ① 鵠突羹。治脾胃

虛冷不下食。以鯽魚半斤。切碎。用沸豉汁投之。入胡椒。薑。薑。橘末。空心食之。【食醫心鏡方】

② 治卒病水腫。鯽魚三尾。去腸

留鱗。以商陸赤小豆等分。填滿扎定。水三升。煮糜。去魚食。豆飲汁。二日一作。不過三次。小便利愈。【肘後方】

③ 治消渴飲水。用鯽魚一枚。去腸留鱗。以茶葉填滿。紙包煨熟。食之不數枚即愈。【吳氏心統方】

④ 治腸風下血。用活鯽一大尾。去腸留鱗。入五倍子末。填滿。泥固。煉存性。爲末。酒服一錢。或飯丸。日二服。又用硫黃一兩。如上法煨服。亦效。【百一選方】

⑤ 治酒積下血。酒煮鯽魚。常食最效。【便民食療方】

⑥ 治腸痔滴血。常以鯽魚作羹食。【外臺祕要方】

⑦ 治腸風血痔。用活鯽魚。剝側穿孔。去腸留鱗。入白礬末二錢。以糠包紙。煨存性。研末。每服二錢。米飲下。每日二服。亦治血痢。禁口。【直指方】

⑧ 治反胃吐食。用大鯽魚一尾。

去腸留鱗。入綠礬末。令滿。泥固。煨存性。研末。每米飲服一錢。日二服。【本事方】

⑨ 治腸氣吐食。用大鯽魚。去腸留鱗。以大蒜片填滿。紙包。十重。泥封。曬半乾。炭火煨熟。取肉。和平胃散末。一兩。杵丸。梧子大。密收。每服三十丸。米飲服。【經驗方】

⑩ 治小腸疝氣。每頓用鯽魚十個。同茴香煮食。久食自愈。【生生編方】

⑪ 治妊娠感寒。時行者。用大鯽之頭。燒灰。酒服方寸匕。無汗。腹中緩痛者。以醋服取汁。【產乳方】

⑫ 治熱病日暗。因瘵後食五辛而致。用鯽魚作醢食之。【集驗方】

⑬ 治目生贅肉。鮮鯽魚取一斤。者中央開竅。貼於睛上。日三五度。【聖濟總錄方】

⑭ 治婦人血崩。鯽魚一個。長五寸者。去腸。入血竭。乳香。在內。綿包。燒存性。研末。每服三錢。熱酒調服。【葉氏摘玄方】

⑮ 治小兒胸喘。活鯽魚七個。以器盛。令兒自便尿。養之。待紅。煨熟。食甚效。一。女。年十歲。用此。水。不。發。

并水服二錢。可御十女。(蚰蟥神書方)

⑤治陰寒癰弱。蜂房灰夜傳陰。陰即熱起。(千金方)

⑥治陰毒腹痛。露蜂房三錢燒存性。葱白五寸同研爲丸。男左女右著手中。握陰臥之。汗出愈。

⑦治寸白。白蠱。蜂窠燒存性。酒服一匙。蟲即死出。(生生編方)

⑧治乳石熱毒。壅悶頭痛。口乾。便澀赤少者。用蜂房煮汁五合。服乳石末從小便下。大效。用十二分。炙以水二升。煮八合分服。(圖經方)

⑨如聖散。治藥毒上攻。用蜂房甘草等分。熬炒黃色。去麩爲末。水二盞。煎八分。臨臥頓服。明日取下惡物。

⑩治鼻外瘡痛。膿血水出。蜂房炙研。酒服方寸匕。日三服。(肘後方)

⑪治頭上瘡癬。蜂房研末。臘豬脂和塗之效。(聖惠方)

⑫治癩癧煩作。露蜂房二枚燒存性。以巴豆二十一粒煎清油二三沸。去豆用油調傳。(唐氏得效

方)

⑬治女人妬乳。乳癰汁不出。內結成腫。名妬乳。用蜂房燒灰研。每服二錢。水一小盞。煎六分。去渣溫服。(濟衆方)

⑭治風癰不合。用露蜂房一枚。炙黃研末。每以一錢。臘豬脂和塗。(肘後方)

⑮治下部漏痔。大露蜂房燒存性。研搽之。乾以真菜油調。(唐氏經驗方)

⑯治蜂螫腫疼。蜂房爲末。磁羔和傳。或煎水洗。(千金方)

⑰用。量八分至錢半。

⑱施用宜忌。凡癰疽已潰。及無蟲積而屬虛寒。諸瘰者。禁用。臨乾。薑。丹。參。黃。芩。芍。藥。牡。蠣。

⑲【饅頭柑】即柑之古籍別名。典見綱目。詳「柑」條。

⑳【番毛】即馬騾毛之原名。詳「馬騾毛」條。

㉑【鯀魚】原名 鮐魚。古籍別名 草魚。鰻魚。

(綱目)

產地 江湖池澤間多有之。形態 鯀魚爲魚鱗類之一種。

形似鯉而身長圓。肉厚而鬆。又類青魚。有青白兩色。而白者味勝。其肉可供食與藥用。詳見該條。

性質 甘溫。無毒。

主治 暖胃和中。

參攷資料 鯀魚肉多食。能發諸瘡。(李廷飛)

【鯀魚膽】採取 臘月收取。陰乾用。

性質 苦寒。無毒。

主治 喉痺。飛尸。水和攪服。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論鯀魚膽曰。一切骨鯁。竹木刺在喉中。以酒化二枚。溫呷取吐。

【鯀魚】即鯀魚之古籍別名。典見綱目。詳「鯀魚」條。

【鯀魚】即河豚之古籍別名。典見日華諸家本草。詳「河豚」條。

【鯀魚】即河豚之古籍別名。典見日華諸家本草。詳「河豚」條。

【鯀魚】即鯀魚之古籍別名。典見漢書。詳「鯀魚」條。

命名 本品性喜暖魚。

其目暖視故名。古籍別名 鯀魚(食療)

產地 生江湖中。

形態 鯀魚爲魚類之一種。其體圓厚而長。似鯀魚而腹稍起。扁類長。喉口在領上。鱗細。腹白。背色微黃。亦能噉魚。大者重有二十三十斤。其肉可供食與藥用。

性質 甘平。無毒。

主治 補五臟。益筋骨。和脾胃。多食宜人。作鮓尤宜。曝乾香美。亦不發病。

【鯀魚】命名 鯀魚相即相附而游故名。

古籍別名 鮓魚(綱目)黃色者名金鯀魚。

基本 係水族動物。爲鱗屬之鯀魚。

產地 凡池澤淡水中有恒有出。形態 鯀魚形似小鯀。色黑而體促。肚大而背隆。大者至三四斤。長數尺。其肉既可食。又可入藥用。

用法 恒以調入五味。煮食供食。其入藥則焙剉用。

性質 甘溫。無毒。

效能 益脾和中。行水。實腸。用作健胃藥。

蜂窠。只在人家屋上。大小如拳。色蒼黑。內有青色蜂二十一箇。或只十四箇。其蓋是石垢。其黏處是七姑木汁。其隔是竹蛀也。名獨蜂窠。俗名七里蜂。其毒最猛。其窠大小如鵝卵。大皮厚蒼黃色。是小蜂并蜂翅盛向裏。只有一箇蜂。大如小石燕子許。人馬被螫着立亡也。名是草蜂窠也。草蜂石蜂。尋常所見之蜂也。又有一種小而色淡黃。窠長六七寸至一尺。闊二三寸。如蜜脾。下垂一邊。多在叢木深林之中。謂之牛舌蜂。更有一種。多在高木之上。或屋之下。外面圍如三四斗許。或一二斗。中有窠如瓢狀。由此得名玄狐蜂。其色赤黃。大於諸蜂。今人皆兼用之。

採取 七月間或十二月間。採窠陰乾。

製法 雷斅曰。凡使革蜂窠。先以鴉豆枕等同拌蒸。從已至未時。出鴉豆枕了。曬乾用。大明曰。入藥並炙用。

用法 水煎內服。或剉末外治。亦有和作丸散者。性質 甘平有毒。

效驗 祛風。殺蟲。解毒。療瘡。用作殺蟲解毒藥。

主治 驚癇癰瘰。寒熱邪氣。癰疾。鬼精蠱毒。腸痔。火熱之良。(本經)療蜂毒。毒腫。合亂髮蛇皮。燒灰。以酒日服二方寸匕。治惡疽附骨癰。根在臟腑。歷節腫。出丁腫。惡脈諸毒皆瘥。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新

修本草論露蜂房曰。療上氣。赤白痢。遺尿失禁。燒灰酒服。主治陰痿。水瘻。洗狐尿刺瘡。服汁下乳石毒。【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論露蜂房曰。煎水洗熱病後毒氣衝目。炙研和豬脂塗癰癰成瘻。【宋】大明諸家本草論露蜂房曰。煎水漱口。止風蟲疼痛。又洗乳癰蜂疔惡瘡。【明】繆希雍本草經疏論露蜂房曰。蜂性有毒。螫人則痛極。蜂房味苦氣平。性亦有毒。別錄言鹹。當作辛鹹。辛散苦泄。鹹可軟堅。故主驚癇癰瘰。寒熱邪氣。癰疾鬼精。蠱毒腸痔等證也。療蜂毒毒腫者。取其氣類相從。以毒攻毒之義也。蘇恭以亂髮蛇皮三物合燒灰酒服。方寸匕。治惡疽附骨癰。根在臟腑。

歷節腫。出丁腫。惡脈諸毒。大明煎水漱口。止風蟲疼痛。洗乳癰蜂疔惡瘡。皆取其攻毒散邪殺蟲之功耳。

配合應用 治小兒卒癰。大

蜂房一枚。水三升。煮濃汁。浴之日三四次。佳。(千金方)

治臍風溼腫。久不瘥者。蜂房燒末。傅之。效。(子母祕錄方)

治手足風癱。黃蜂窠大者一箇。小者三四箇。燒灰。獨頭蒜一盞。百草霜一錢。半同搗傅。上一時取下。埋在陰處。忌生冷葷腥。(乾坤祕輿方)

治風氣搔痒及癰瘡。蜂房炙。蟬蛻等分。爲末。酒服一錢。日三服。用露蜂房煎汁。入芒硝。傅之。日五次。(梅師方)

治風熱牙腫。連及頭面。用露蜂房燒存性。研末。以酒少許。調噴漱之。(十便良方)

治風蟲牙痛。露蜂房煎醋熱。漱之。用草蜂房一枚。鹽實孔內。燒過。研末。擦之。鹽湯漱之。或取一塊。咬之。祕方也。(袖珍方)用露蜂房一箇。乳香三塊。煎水漱之。又同細

辛煎水漱之。又露蜂房。全蠍同研。擦之。(普濟方)用蜂房蒂綿包咬之。效。(聖惠方)

治喉痺腫痛。露蜂房灰。白蠟。等分。爲末。每乳香湯服半錢。又用蜂房燒灰。每以一錢。吹入喉內。不拘大人小兒。(食醫心鏡方)

治重舌腫痛。蜂房炙研。蒸酒塗。日三四次。(聖惠方)

治舌上出血。數如鍼孔。用紫金沙。即露蜂房。頂上實處一兩。貝母四錢。蘆薈三錢。爲末。蜜和丸。雷丸大。每一丸。水一盞。煎至五分溫服。吐血溫酒調服。亦治吐血衄血。(雲臺方)

治崩中漏下五色。使人無子。蜂房末三指。溫酒服神效。(張文仲方)

治小兒下痢赤白者。蜂房燒末。飲服五分。(子母祕錄方)

治小兒咳嗽。蜂房二兩。洗淨。燒研。每服一字。米飲下。(勝金方)

治二便不通。以蜂房燒末。酒服二三錢。日二服。不拘大人小兒。(子母祕錄方)

治陰痿不興。蜂窠燒研。新汲

殊。故乳稱石。語云。上土服石。服其精。下土服石。服其滓。滓之與精。其力遠也。此說雖明。快然須真。病命門火衰者。宜之。否則當審。(李時珍) ④柳宗元與崔連州書云。草木之生也。依於土。有居山之陰。陽或近木。或附石。其性移焉。况石鐘乳。直產於石。石之精粗疎密。尋尺特異。而穴之上下。土之厚薄。石之高下。不可知其依而產者。固不一性。然由其精密而出者。則油然而滑。油然而蠟。其紋滑以夷。其肌廉以微。食之。使人榮華溫柔。其氣宣流。生胃通腸。壽考康寧。其粗疎而下者。則奔突結澀。乍大乍小。色如枯骨。或類死灰。奄頓不發。叢齒積類。重濁頑璞。食之。使人便瘳壅鬱。泄火生風。戟喉痺肺。幽關不聽。心煩喜怒。肝舉氣剛。不能平和。故君子慎取其色之美。而不必惟土之信。以求其至精。凡爲此也。(唐懷微) ⑤石鐘乳光潤而薄。如羅紋鳥鵲。蟬翼。一切皆成白色者。可服。非若此者。慎勿服之。殺人甚於鴆毒。(孫真人) ⑥石鐘乳第一

出始興。而江陵及東境名山石洞

亦皆有。惟通中輕薄如鵝翎管。碎之如爪甲。中無鵝齒。光明者爲善。長挺乃有一二尺者。色黃以苦酒洗刷。則白。仙經少用。而俗方所重。(陶弘景) ⑦石鐘乳第一始興。其次廣連。潯州等州者。雖厚而光潤可愛。餌之並佳。今陝州青溪房州三洞出者。亞於始興。其餘非其土地。不可輕服。每發淋渴。止可搗篩白練裹之。合諸藥草。浸酒服。合陶云。有一二尺者。謬說也。(蘇恭) ⑧按范成大桂海志所說甚詳。明云。桂林接宜融山洞穴中。鐘乳甚多。仰視石脈涌出處。即有乳狀。白如玉雪。石液融結成者。乳狀下垂。如倒數峯。小山峯端。漸尖且長。如冰柱。柱端輕薄。中空如鵝翎。乳水滴漉不已。且滴且凝。此乳之最精者。以竹管仰承取之。鍊治家又以鵝管之端。尤輕明如雲母。爪甲者爲勝。(李時珍)

【鐘乳粉】即鐘乳石之處方用名。詳「鐘乳石」條。
【斷木鳥】即啄木鳥之古籍別名。典見爾雅。詳「啄木鳥」條。
【露甲】即瑞香之古籍別名。典見

和漢藥考。詳「瑞香」條。

【露花】 古籍別名 路頭花。寒花。(綱目拾遺)

產地 廣東番禺縣境。

形態 露花爲雜草類之一種。狀如菖蒲。其葉節邊有刺。葉落。根以火燭之。而成枝幹。開花。花生叢葉中。瓣有大小。亦如葉而色。瑩白柔滑。無芒刺。花抱蕊。心如穗。朝夕有露露在苞中。夏時成熟。以花覆盆。盪之。香落菜子油中。其氣馥烈。謂之露花油。其粉可供藥用。其露詳見該條。

主治 止汗。潤肌膚。

主治 解渴。

【露花露】

【露草】即鴨跖草之日本別名。詳「鴨跖草」條。

【鴨跖草】條。

【露筋草】 形態 露筋草爲雜草類之一種。莖高三尺。春生苗葉。隨即開花。結子。碧綠色。四時不凋。其根可供藥用。

性質 辛。瀉涼。無毒。

主治 蜘蛛。蜈蚣咬傷。焙研。白礬水調貼之。

【露葵】 ①即冬葵子之古籍別名。

典見綱目。詳「冬葵子」條。②即蓴之古籍別名。典見綱目。詳「蓴」條。

【露蜂】即露蜂房之原名。詳「露蜂房」條。

蜂房」條。

【露蜂房】 命名 本品係懸樹者之蜂巢。故名。

處方用名 蜂房。蜂巢。

古籍別名 蜂房。本經。蜂。蜂。百穿。(別錄)。獨蜂窠。石蜂窠。草蜂窠。紫金沙。草蜂窠。(綱目)。蜂家。蜜房。牛蜂家。金房。一寸樓臺。黃蘗蜂窠。(和漢藥考)。

基本 即虎頭蜂之蜂房。

產地 凡山野木石間及寺院屋簷端恒有之。

形態 露蜂房爲茶褐色。球圓形。或瓢形之蜂巢。有褐色斑點。其狀如卷雲。大者周圍達一二丈。破其外皮。則見中有無數巢房重疊。

釋名 ①名草蜂窠。即山中大黃蜂也。其房重如樓臺狀。大者一二丈。圍在樹上。內窠小。隔六百二十六箇。大者至一千二百四十箇。其窠黏木。帶是七姑木汁。其蓋是牛糞。其隔是葉蘆也。②名石

一八九五

白魚。便以水洗之。不隨水落者即熟。落者更研。乃澄取曬乾。每用一錢半。溫酒空腹調下。兼和丸散用。其煮乳黃濁水。切勿服。服之損人咽喉。傷肺。令人頭痛。或下痢不止。其有犯者。但食豬肉解之。(千金方)

①鐘乳酒。安五臟。通百節。利九竅。主風虛。補下焦。益精明目。鐘乳煉成粉五兩。以夾練袋盛之。清酒六升。瓶封湯內煮減三之二。取出添滿。封七日。日飲三合。忌房事。葱豉生食硬食。(外臺祕要方)

②鐘乳丸。治丈夫衰老陽絕。肢冷少氣。減食。腰疼脚痺。下氣消食。和中長肌。鐘乳粉二兩。菟絲子酒浸焙。石斛各一兩。吳茱萸湯泡七次。炒。半兩為末。煉蜜和丸。梧子大。每服七丸。空心溫酒或米湯下。日二服。服訖行數百步。覺胸中熱。稍停。即食乾飯豆醬。忌食粗臭惡物。及聞尸穢等氣。初服七日。勿為陽事。過七日乃可行。不宜傷多。服過半劑。覺有功。乃續服。此曹公卓方也。(和劑局方)

③治吐血損肺。鍊成乳粉。每服

二錢。糯米湯下立止。(十便良方)

④治大腸冷滑不止。鐘乳粉一兩。肉豆蔻煨半兩。為末。煮棗肉丸。梧子大。每服七十九丸。空心米飲下。用量 三錢至五錢。

施用宜忌 凡陰虛有熱者禁用。反參朮惡牡丹玄石牡蒙忌羊血葱蒜胡荽畏石英蒼草蛇床為之使。

著名方劑 鐘乳丸。治丈夫衰老。陽絕肢冷。少氣減食。腰疼脚痺。下氣消食。和中長肌。(局方) 鐘乳粉二兩。菟絲子(酒浸焙)石斛各一兩。吳茱萸(泡七次炒)半兩。上研末。煉蜜丸。梧子大。每服七丸。空心溫酒或米湯下。忌食粗臭惡物。及勿聞尸穢等氣。初服七日。勿為陽事。

參攷資料 ①蕭炳云。石鐘乳如蟬翼。爪甲者為上。如鷄管者下。經既言乳。今復不用乳。此何義也。蓋乳取其性下。不用如腐齒者。謂如鳥頭附子。不用尖丫角義同。但明白光潤。輕鬆色如鍊消石者佳。服鍊別有法。(寇宗奭) ②石鐘乳為悍悍之劑。內經云。石藥之氣悍。

仁哉言也。凡藥氣之偏者。可用於暫而不可久。夫石藥又偏之甚者也。自唐時太平日久。膏粱之家。惑於方士服食致長生之說。以石藥體厚氣厚。習以成俗。迨宋至今。猶未已也。斯民何辜。受此氣悍之禍。而莫之能救。哀哉。本草讀其久服延年之功。柳子厚又從而述美之。予不得不深言也。(朱震亨) ③石

鐘乳乃陽明經氣分藥也。其氣慄疾。令陽氣暴充。飲食倍進。而形體壯盛。昧者得此自慶。益肆淫泆。精氣暗損。石氣獨存。孤陽愈熾。久之營衛不從。發為淋渴。變為癰疽。是果乳石之過耶。抑人之自取耶。凡人陽明氣衰。用此合諸藥以救其衰疾。平則止。夫何不可。五穀五肉久嗜不已。猶有偏絕之弊。况石藥乎。種樹書云。凡果樹作穴。納鐘乳末少許。固密。則子多而味美。納少許於老樹根皮間。則樹復茂。信然。則鐘乳益氣。令人有子之說。亦可類推。但恐嗜欲者。未獲其福。而先受其禍也。然有秉賦異常之人。又不可執一而論。張杲醫說。載武帥雷世賢多待妾。常餌砂母鐘乳。日

夜煎鍊。以濟其欲。其妾交苦寒泄。不嗜食。求丹十粒服之。即覺脾腹如火。少焉熱狂。投井中。救出。遍身發紫泡。數日而死。而世賢服餌千計。了無病憊。異哉。沈括筆談。載夏英公性豪侈。而稟賦異於人。纏睡。即身冷而僵。如死者。常服仙茅。鐘乳。硫黃。莫知紀極。每晨以鐘乳粉入粥食之。有小吏竊食。遂發疽死。此與終身服附子無恙者同一例也。沈括又云。醫之為術。苟非得之於心。未見能臻其妙也。如服鐘乳。當終身忌尤。尤能動鐘乳也。然有藥勢不能蒸。須要其動而激發者。正如火少。必借風藥鼓之。而後發火盛。則鼓之反為害。此自然之理也。凡服諸藥。皆宜做此。又十便良方云。凡服乳人。服乳三日。即三日補之。服乳十日。即十日補之。欲飽食。以牛羊羶鹿等骨煎汁。在意作羹食之。勿食倉米。臭肉。及犯房事。一月後。精氣滿盛。百脈流通。遍身體覺熱。達臍肉起。此為得力。可稍近房事。不可頻數。令藥氣頓竭。禍更害人。成之慎之名。為乳。以其狀人之乳也。與神丹相配。與凡石迫

虔謨 CaCO_3

效能 助陽。溫肺。化痰。用爲補

陽藥。又用作眼科藥。

主治 咳逆上氣。明目益精。安

五臟。通百節。利九竅。下乳汁。(本

經)益氣補虛。損癆。脚弱。疼冷。下

焦傷。竭強。陰久。服延年益壽。好顏

色。不老。令人有子。不鍊服之。令人

淋。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥

性本草論鐘乳曰。主泄精。寒嗽。壯

元氣。益陽事。通聲。(宋)日華諸家

本草論鐘乳曰。補五勞七傷。(明)

繆希雍本草經疏論鐘乳曰。石鐘

乳。稟石之氣。而生。本經謂其味甘

氣溫。無毒。吳普曰。神農。辛。斯言近

之。甄權以爲有大毒。或是經火之

故。應云。甘。辛。氣大溫。其性得火

則有大毒。乃爲得之。其主咳逆上

氣者。以氣虛。則不得歸元。發爲斯

證。乳性溫。而鎮墜。使氣得歸元。則

病自愈。故能主之也。通百節。利九

竅。下乳汁者。辛溫之力也。療脚弱

疼冷者。亦是陽氣下行之驗也。甄

權主寒嗽。通聲者。辛以散邪。結溫

以祛寒氣故也。其他種種補益之

說。當是前人事者。溢美之辭。夷

考其性。恐無是理。未足信也。【清】

黃宮繡本草求真論鐘乳曰。石鐘

乳。卽鴉管石者是也。味辛而甘。氣

溫。質重。故凡咳氣上逆。脚弱。冷痛

虛滑。遺精。陽事不舉者。服此立能

有效。以其氣不歸元。墜堅。鎮虛。得

此。火不上浮。氣不下脫。而病俱可

以愈耳。且以辛溫之力。又兼色白。

故能通竅。利乳。昔人取名鐘乳。卽

是此意。但金石性悍。服之。陽氣暴

充。形體壯盛。飲食倍進。得此。肆淫

則精竭。火燄。發爲癰疽。淋濁。害不

勝言。古有焚香透腦散。以治胸膈

勞嗽。瘧滿之病。然暫用則可。久用

恐損人氣。出洞穴中。石液凝成。下

垂如冰柱。通中輕薄。如鴉管。碎

之。如爪甲。光明者。眞煉合各如本

方。【清】黃元御玉楸藥解論鐘乳

曰。石鐘乳。燥濕悍疾。治脾胃滯寒。

遺精。吐血。腸滑。乳閉。虛喘。勞嗽。陽

痿。聲嘶。其功甚速。寒消溼去。食進

氣充。特此縱欲傷精。陽根升泄。往

往發爲消淋。癰疽之證。固緣金石

慄悍。亦因服者。恃藥力而離斷也。

【清】張隱菴本草原論鐘乳曰。

石鐘乳乃石之津液。融結而成。氣

味甘。溫。主滋中焦之汁。上輪於肺

故治咳逆上氣。中焦取汁。奉心化

赤。而爲血。故明目。流溢於中。而爲

精。故益精。精氣盛。則五臟和。故安

五臟。血氣盛。則百節和。故通百節

津液。濡於空竅。則九竅自利。滋於

經脈。則乳汁自下。

配合應用 ●治廣瘡結毒。爛

壞鼻梁。及陰蝕陽物。有神。石鐘乳

得牛黃。白蠟。象牙末。眞珠。乳香。沒

藥。樺皮。灰。龜板。灰。俱存性。細研。枯

白礬。蛙。竹屑。紅鉛。

●鐘乳煎治風虛勞損。腰脚無

力。補益強壯。用鐘乳粉煉成者。三

兩。以夾絹袋盛之。牛乳一大升。煎

減三之一。去袋飲乳。分二服。日一

作。不吐不利。虛冷人微瀉。無所苦。

一袋可煮三十度。力盡別作袋。每

服。訖須濯淨。令通氣。其滓和麴。煨

雞子食之。此崔尙書方也。(孫真

人千金翼方)

●焚香透膈散。治一切勞嗽。胸

膈痞滿。用鷄管石。雄黃。佛耳草。款

冬花。等分爲末。每用一錢。安香爐

上焚之。以筒吸煙入喉中。日二次。

(宣明方)

●治肺虛喘急。連綿不息。生鐘

乳粉。光明者。五錢。蠟三兩。化利。飯

飯內蒸熟。研丸。如梧子大。每水下

一丸。(聖濟總錄方)

●治乳汁不通。氣少血衰。脈澀

不行。故少乳。煉成鐘乳粉二錢。濃

煎。漏蘆湯調下。或通草等分爲末。

米飲服。方寸匕。日三服。(外臺祕

要方)

●李補嗣服乳法。主治五勞七

傷。咳逆上氣。治寒嗽。通聲音。明目

益精。安五臟。通百節。利九竅。下乳

汁。益氣補虛。損癆。脚弱。疼冷。下焦

傷。竭強。陰久。服延年益壽。不老。令

人有子。取韶州鐘乳。無問厚薄。但

顏色明淨。光澤者。卽堪入煉。惟黃

赤二色。不任用。置於金銀器中。大

鑊著水。沉器煮之。令如魚眼沸。水

減卽添。乳少三日。三夜。乳多七日

七夜。候乾。色變黃白卽熟。如凝生

更煮滿十日。最佳。取出。去水。更以

清水煮半日。其水色清。不變卽止。

乳無毒矣。入意鉢中。玉槌著水研

之。覺乾。漚卽添水。常令如稀米泔

狀。研至四五日。搗之光膩。如書中

性質 甘平。無毒。

效能 除熱。止瀉。

主治 心腹痛。反胃。霍亂。

【醴泉】即口津之古籍別名。典見綱目。詳「口津」條。

【鑄鐵衣】即鐵鑄之處方用名。詳「鐵鑄」條。

【鐘乳】即鐘乳石之簡稱。詳「鐘乳石」條。

【鐘乳石】命名 石之津氣鐘聚成乳。滴溜成石故名。鐘乳蘆。形象鵝管而空中。又稱鵝管石。

處方用名 鐘乳粉。鵝管石。

古籍別名 石鐘乳（本經）留公乳。蘆石。夏石（別錄）虛中（吳普）黃沙石。藥性）小靈石。乳公乳。竹乳（和漢藥考）滴乳石。

外國名詞 Sclachite（英）Stalactite（德）

基本 屬礦石類。為乳狀之石塊。

產地 和漢藥考曰。石鐘乳生洞穴中。仰視石脈滴出處。則有乳狀。白如玉。雪。石液融結成者。其乳狀下垂。如倒數峯小山。峯端漸銳。

且長如冰柱。柱端輕薄。中空如鵝翎。乳水滴瀝不已。且滴且凝。此乳最精者。以竹管仰承取之。尤經明如雲母。有爪甲者為勝。中日各國多產之。下垂於石灰石洞穴中。乃一種極為可觀之鐘乳也。世界產此最聞名者。一為美國之孟母斯洞。二為澳洲之亞台培克窟。三為日本之武藏洞。陳仁山藥物生產辨云。中國產廣東新安。平海。汕尾等處。

形態 為白色或灰白之冰柱狀。鐘乳石長短不一。其橫斷破碎面。有自中心向外作放射狀之條理。透明質重。有時中空。凡含有炭酸之水。透過石灰質之地層。溶解為炭酸石灰。此水自洞穴之上。滴瀝下降之際。接觸空氣。放散溶存之炭酸瓦斯。而析出結晶性之中性炭酸石灰。漸次下垂。凝結而為冰柱狀。是為鐘乳石。又其水滴瀝而下。再由下盤旋凝結而上。則為石筍。亦稱石牀。鐘乳石可作盆玩。以供觀賞。

種類 ①孔公藥。一名孔公石。次於鐘乳。狀如牛羊角。中有孔。附

垂於石。如木之有萌蘖。②殷藥。一名薑石。生於石上。如木之蘖。亦盤結如薑。此即孔公藥之根也。但似附石生而粗者為殷藥。接殷藥而生。由漸空通者為孔公藥。接孔公藥而生者為鐘乳。蓋殷藥如人之乳根。孔公藥如乳房。鐘乳如乳頭也。③石牀。一名乳牀。或稱逆石。亦作石筍。生石鐘乳中。鐘乳水滴下凝結而生。儼如竹筍。久則漸與上乳相接為柱。④石花。一名乳花。亦生鐘乳中。乳水滴石上。散如霜雪。日久積成如花者是也。⑤土殷藥。一名土乳。即鐘乳石之生於山崖土中者。南方名山多有之。人亦掘為石山。以供玩賞。不知其為土鐘乳也。⑥鐘乳。中國日本多產之。其形如指。色白或褐。又如翅管。中空透明。輕虛者名鵝管石。俱為上品。形長大。質粗中充實者為下品。⑦鐘乳石生深山洞穴中。乳水滴凝如冰柱。其大者如柱。小者如筆管。⑧石乳者。其山洞純石。以石津相滋。陰陽交備。蟬翼紋成。其性溫。竹乳者。其山洞遍生小竹。以竹津相滋。乳如竹狀。其性平。⑨茅

山之乳者。其山洞生茅草。以茅津相滋。為乳。乳色稍黑而滑潤。其性微寒。

採取 二三月間採取陰乾。

製法 雷斅曰。凡使石鐘乳。勿用頭粗厚併尾大者。為孔公石。不用色黑及經大火驚過。并久在地。上收者。曾經藥物製者。並不得用。須要鮮明。薄而有光潤者。以鵝翎個子為上。有長五六寸者。凡修事法。鐘乳八兩。用沉香。零陵香。麝香。甘松。白茅各一兩。水煮過。再煮汁。方用煮乳。一伏時。漉出。以甘草。紫背天葵各二兩同煮。漉出。拭乾。緩火焙之。入口。作粉篩過。入鉢中。令有力少壯者。二三人。不住研。研三日。三夜勿歇。然後以水飛澄。過絹。籠於日中曬乾。入鉢。再研。二萬遍。乃以蠶盒收之。唐慎微曰。太清經錄鐘乳法。取好細末。置金銀器中。瓦一片。密蓋。勿令洩氣。蒸之。自然化作水也。

用法 研為細末。成為鐘乳粉。水煎或糊丸散。

性質 甘溫。無毒。

成分 化學上謂之炭酸加爾

以蠶蠶。故謂之蕪。抱根叢生。故曰抱娘。(李時珍) ⑤蕪蒿生高崗。似小蘗宿根。先於百草。爾雅云。我羅是也。詩小雅云。菁菁者莪。陸璣注云。即我蒿也。生澤國。漸加處。葉似斜蒿。而細科。二月生莖葉可食。又可蒸香。美頗似蕪蒿。但味帶麻。不似蕪蒿香甘。(李時珍)

【蕪】即知母之古籍別名。典見別錄。詳「知母」條。⑥海藻之古籍別名。典見爾雅。詳「海藻」條。【蕪穴】即知母之古籍別名。典見和漢藥考。詳「知母」條。

【蟪蛄】古籍別名。蟪蛄。(本經)肥蟪(別錄)乳齊(陶弘景)地蠶(郭璞)應條。(吳普)

形態 蟪蛄爲化生蟲類。金龜子之幼蟲。其狀如蠶而大。身短節促。足長有毛。其背滾行。甚速如脚。生於樹根及糞土中者。外黃內黑。生舊茅屋土者。外白內黠。皆係淫熱之氣薰蒸而生。可供藥用。

採取 以出糞土中者入藥良。製法 雷斅曰。凡收得後。陰乾。與糯米同炒。至米焦黑。取出去米。

及身上口畔肉毛并黑。壓了。作三四截。研粉用之。李時珍曰。諸方有乾研及生取汁者。又不拘此例也。

性質 鹹。微溫。有毒。

主治 惡血。血癰。瘰癧。破折血。在脇下。堅滿痛。月閉。口中淫腐。青翳白膜。(本經)療吐血。在胸腹不去。破骨。腰折。血結。金瘡。內塞。產後中寒。下乳汁。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論蟪蛄曰。取汁滴目去翳障。主血止痛。(唐)陳藏器本草拾遺論蟪蛄曰。汁主赤白遊癰。擦破塗之。(宋)日華諸家本草論蟪蛄曰。搗傳惡瘡。(宋)蘇頌圖經本草論蟪蛄曰。取汁點喉。得下。即開。

【明】李時珍本草綱目論蟪蛄曰。主唇緊口瘡。丹癰。破傷風瘡。竹木入肉。芒物眯目。

近人學說 尤學周曰。蟪蛄治目翳。一見於本經。再見於藥性本草。而陳氏經驗方又引晉書盛沖母失明。其婢素有積恨。私以蟪蛄蒸熟食之。目自復開。事爲證。一若蟪蛄之力。真若暗室炬燈。可以大放光明者。及經施用。毫無實效。考

其說之由來。實誤會孟子陳仲子章。遂以訛傳訛。後人復踵事增華。所致陳仲子三日不食。耳無聞目無見。乃饑餓太過。營養不敷。機能衰退之故。非且有疾。患食井上蟪李三咽耳。聞目見。乃得李充饑之效。與蟪無關。後人附會此說。(本經託名神農所作。實出於孟子之後)謂爲有去目翳之能。其說不足信也。

施用宜忌 惡附子。蠶蠶爲之使。

參攷資料 ①同緒齋作藥食。蓋下乳汁。(陶弘景) ②張仲景治雜病。大慶蟲丸方中用之。取其去脇下堅滿也。(蘇頌) ③許學士本事方。治筋急。養血。地黃丸中用之。取其治血癰瘰也。按陳氏經驗方云。晉書吳中書郎盛沖母王氏失明。婢取蟪蛄蒸熟與食。王以爲美。沖還知之。抱母慟哭。母目即開。與本草治目中青翳白膜。藥性論汁滴目中。去翳障之說相合。予嘗以此治人得驗。因錄以傳人。又按晉伯嗣嬰童百問云。張太尹傳治破傷風神效。方用蟪蛄將駝脊背捏

住。待口中吐水。就取抹瘡上。覺身麻汗出。無有不活者。子弟額上跌破。七日成風。依此治之。時間就愈。此又符療腰折。傳惡瘡。金瘡內塞。主血止痛之說也。蓋此藥能行血。分散結滯。故能治已上諸病。(李時珍)

【蟪珠】即真珠之古籍別名。典見禹貢。詳「真珠」條。

【蠶】即牡蠣之古籍別名。典見和漢藥考。詳「牡蠣」條。

【蠶山】即牡蠣之古籍別名。典見和漢藥考。詳「牡蠣」條。

【蠶甫】即牡蠣之古籍別名。典見和漢藥考。詳「牡蠣」條。

【蠶】即蠶蟻。詳該條。

【蠶鍛】即鍛之一種。產鹹水中。大者長五六寸。出水即死。其性質功用與對鍛同。詳「對鍛」條。

【蠶生丹水】即鼠姑之古籍別名。典見別錄。詳「鼠姑」條。

【蠶舍】即雀藥之古籍別名。典見本經。詳「雀藥」條。

【醴泉】命名 本品即地脈中泉水之精華也。味甘如醴。故名。

蘇梗多屬野蘇之梗。蓋鷄冠蘇梗在五月間。連葉帶梗嫩時割取。以作蘇葉。其梗未老已收。祇可作嫩蘇梗之用。惟野蘇其葉不採藥用。任其留存。至九月間收子。以作蘇子。拔根以作蘇梗。其實乃野蘇之梗。皆不道地。

【蘇梗】即紫蘇之處方用名。詳『紫蘇』條。

【蘇葉】即紫蘇之處方用名。詳『紫蘇』條。

【蘇鐵】即無漏子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『無漏子』條。

【蘇荳】即蘇荳之古籍別名。詳『蘇荳』條。

【蘇荳】即蘇荳之古籍別名。詳『蘇荳』條。

【蘇荳】即蘇荳之古籍別名。詳『蘇荳』條。

【蘇荳】即蘇荳之古籍別名。詳『蘇荳』條。

【蘇荳】即蘇荳之古籍別名。詳『蘇荳』條。

【蘇荳】即蘇荳之古籍別名。詳『蘇荳』條。

【蘇荳】即蘇荳之古籍別名。詳『蘇荳』條。

【蘇荳】即蘇荳之古籍別名。詳『蘇荳』條。

【蘇荳】即蘇荳之古籍別名。詳『蘇荳』條。

【蘇荳】即蘇荳之古籍別名。詳『蘇荳』條。

【蘇荳】即蘇荳之古籍別名。詳『蘇荳』條。

白而平。磨荳則色白而寒也。香荳能益胃氣不飢。及治小便不禁。磨荳則能理氣化痰。而於腸胃亦有功也。然皆體潤性滯。多食均於內氣有阻。而病多發。不獨磨荳然也。【清】王士雄隨息居飲食譜論磨荳。曰。磨荳甘涼。味極鮮美。葷素皆宜。開胃化痰。煥而無砂者。勝多食。發風動氣。諸病人皆忌之。

參攷資料 ①磨荳有毒。動氣發病。不可多食。②正要 ③磨荳出山東淮北諸處。埋桑楮諸木於土中。澆以米泔。待荳生。採之。長二三寸。本小末大。白色柔輭。其中空虛。狀如未開玉簪花。俗名雞腿磨荳。謂其味如雞也。一種狀如羊肚。有峰窠眼者。名羊肚菜。④李時珍

【磨荳】即磨荳之古籍別名。典見綱目。詳『磨荳』條。

古籍別名 芥菜。拾遺

【芥菜】四葉菜。唐言。田字草。白

蕨。破銅錢。綱目。水庫。吳普

外國名詞 Marsilia quadrifolia, L. (拉丁) デンシサウ

ヨツバウキクサ(日本)

基本 係蕨科蕨屬。爲蕨類葉。

產地 生地澤淺水間。形態 蕨爲水草類。隱花植物。類之多年生草本。莖柔細長。深入水底。抽出長柄之葉。上浮水面。葉爲四片合成。狀如田字形。夏開小白花。葉柄下部。特生小枝。着以囊狀體之孢子。大如豆而質堅。其莖葉可供藥用。



蕨

採取 三月間採之。日乾用。

性質 甘寒。滑。無毒。

主治 暴熱。下水氣。利小便。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器

本草拾遺論蕨曰。搗塗熱瘡。搗汁

飲。治蛇傷。毒入腹內。曝乾。枯。樓等

分爲末。入乳和丸服。止消渴。

原名 奈。

命名 奈字篆文。象子

綴於木之形。故名。

古籍別名 平婆。梵言。頻婆

色。白者名素奈。色赤者名丹奈。朱

奈。色青者名綠奈。冬熟者名冬奈。

【綱目】 外國名詞 Pirusmalus, L. (拉丁) リンゴ(日本)

基本 係薔薇科梨屬。爲蘋果

之果實。

形態 蘋果爲果類之落葉喬

木。一似林檎。樹身幹直。而葉色青

其果實如梨。而圓滑。生青熟則紅

色。或半紅。或半白。光潔可愛。香

數步。其味甘。熟者。食之。軟如

棉絮。過熟則沙爛不堪。可供食與

藥用。

性質 苦寒。有小毒。

主治 補中焦。諸不足。氣和脾

卒食飽。氣壅不通者。搗汁服。

歷代記述攷證 【唐】孫思邈

千金翼論蘋果曰。益心氣。耐飢。

參攷資料 ①蘋果甘。無毒。生

津止渴。②正要 ③蘋果多食。令肺

壅。腫。服。有病人。尤忌。④別錄

古籍別名 栽蒿。蘿蒿。

性質 辛溫。無毒。

主治 破血下氣。養食之。

參攷資料 ①陸農師云。隨之

爲言也。高。我亦哉也。我科蒿也。可

以簪挑起。徑尺不斷如絲。漸屈起如鉤者爲上。以少許擦手心。香透手背者真。按蘇合香爲開透關。麝與香機能辟惡達鬱之宣品也。

配合應用 治水氣浮腫。蘇合香、白粉、水銀等分搗勻。煉蜜爲丸。小豆大。每服二丸。白湯下。當下水出(肘後方)。

用量 五滴至八滴。或一分至五分。

施用宜忌 凡陰虛火旺。及氣虛多痰者禁用。忌火。

著名方劑 蘇合香丸。療傳屍骨蒸。殘癰。肺癰。疰忤。鬼氣。卒心痛。霍亂吐利。時氣瘴癘。赤白暴利。瘀血月閉。瘧癰。丁腫。驚癇。小兒吐乳。大人狐狸等疾。(局方) 蘇合香油。五錢。(入安息香內) 安息香一兩。(另爲末用無灰酒半斤熬膏) 丁香、青木香、白檀香、沉香、藿香、附子、訶子(煨去肉)烏犀角、硃砂(水藏)各一兩。薰陸香、片腦(研)各五錢。麝香七錢。半上爲細末。入安息香膏、煉蜜和劑。圓如芡實大。每四九空心用沸湯化下。溫酒下亦得。

二十畫 蘇

參攷資料 蘇合香氣能通諸竅。臟腑故其功能辟一切不正之氣。按沈括筆談云。太尉王正文公。氣羸多病。宋真宗面賜藥酒一餅。令空腹飲之。可以氣血。辟外邪。公飲之大覺安健。次日稱謝上曰。此蘇合香酒也。每酒一斗入蘇合香丸一兩。同煮。極能調和五臟。却腹中諸疾。每冒寒風。與則宜飲一盃。自此臣庶之家皆倣爲之。比方盛行於時。其方本出唐玄宗開元廣濟方。謂之白米丸。後人亦編入千金外臺。治疾有殊效。(李時珍) 今從西域及昆崙來。赤紫色與紫真檀相似。堅實極芳。香性重如石。燒之灰白者好。(蘇恭) 今廣州雖有蘇合香。但類蘇木。無香氣。藥中只用如膏油者。極勞烈。陶隱居以爲獅子矢者。亦是指此膏油者言之。爾雅書云。中天竺國出蘇合香。是諸香汁煎成。非自然一物也。又云。大泰國人採得蘇合香。先煎其汁。以爲香膏。乃實其滓與諸國。買人是以展轉來達中國者。不大香也。然則廣南貨者。其經煎煮之餘乎。今用如膏油者。乃

合治成者爾。(蘇頌) 按寶宇志云。蘇合油出安南三佛齊諸番國。樹生膏。可爲藥。以濃而無滓者爲上。葉廷珪香譜云。蘇合香油出大食國。氣味皆類篤耨者。沈括筆談云。今之蘇合香。赤色如堅木。又有蘇合油。如蠟膠。人多用之。而劉夢得傳信方言。蘇合香多譌。藥子如金色。按之即少。放之即起。良久不定。如蟲動。氣烈者佳。如此則全非今所用者。宜精考之。竊按沈氏所說。亦是油也。不必致疑。(李時珍) 蘇合香聚諸香之氣而成。能透諸竅。辟一切不正之氣。凡痰積氣厥。必先以此開導。治痰以理氣爲本也。凡山嵐瘴濕之氣。鬱於經絡。拘急弛緩不均者。非此不能除。(張石頑) 蘇迤米羅細。即草豆蔻之古籍別名。典見金光明經。詳「草豆蔻」條。

【蘇枋】即蘇木之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蘇木」各條。

【蘇枋木中沙】即蘇木中沙之原名。詳「蘇木中沙」條。

【蘇芳花】即紫荊花之日本名。詳「紫荊」條。

【蘇香】即蘇合香之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蘇合香」條。

【蘇家三七】即昭參之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「昭參」條。

【蘇密那子】即覆盆子之古籍別名。典見綱目。詳「覆盆子」條。

【蘇梗】主治 下氣。較蘇子稍緩。虛者宜之。

歷代記述攷證 【清】吳儀洛本草從新論蘇梗曰。順氣安胎。

辨偽 鄭有巖曰。蘇梗即紫蘇旁枝小梗。崇原云。氣味辛平。無毒。主寬中行氣。消飲食。化痰涎。治噎膈反胃。止心腹痛。通十二經。關竅脈絡。近市肆有一種白蘇梗。即白蘇之梗。既去白葉。無從辨識。葉色既殊。梗性自別。不堪入藥。用者慎之。曹炳章曰。按蘇江浙皆出。紫梗空心。葉雙面皆紫。有皺摺。紋如鷄冠者。故名鷄冠紫。蘇味辛。氣甚香爲最佳。又一種綠方梗。葉上面綠下面紫。香味較淡薄。俗名單面紅紫蘇。略次。又有一種野生田野方梗。綠葉。惟葉筋紫。氣微香而潤。俗爲野紫蘇。最次。不入藥。乃

二十八日爲適宜。所以用白欒朴
稍者。因不用白欒則半夏卸。全用
白欒則製起半夏太實。是以用朴
稍佐之。使半夏不太實。但朴硝入
瀉類不適於用。故將朴硝刪去。轉
用生鹽三錢。佐白欒煎水浸之。生
鹽亦有除痰之功。寧使其實。亦不
如朴硝之瀉也。

主治 除溼化痰。止嘔。

【蘇伐羅】即金之古籍別名。典見
綱目。詳【金】條。

【蘇合油】即蘇合香製成之油之
處方用名。詳【蘇合香】條。

【蘇合香】 命名 本品出自蘇
合國故名。

處方用名 蘇合油。

古籍別名 合香（藿香亦一
名合香）帝香。蘇香。楓脂香。（和
漢藥考）

外國名詞 Storax（拉丁）
（英）（德）

基本 係金縷梅科。爲楓屬蘇
合香樹幹內皮所煎出之香膏。

產地 概產於小亞細亞及波
斯諸地。

形態 蘇合香樹爲落葉喬木。

高達四丈餘。枝柯繁茂。葉作掌狀。
邊緣有鋸齒。花爲長圓形頭狀花。
開於葉腋。果實爲球形。中藏有扁
平種子。蘇合油爲柔軟膠質之濃
稠液體。透明而褐色。但含有水氣
時則濁濁而作灰色。較水爲重。溶
於伊打哥羅仿姆。硫化炭等。清香
如香膏。味苛辣。



蘇合香

製法 由蘇合香樹中膠汁製
成。勿經火。

性質 甘溫。無毒。

成分 爲司吉諾兒（Stryol）、
司吉拉辛（Stryacin）、桂皮酸、
樹脂等。

效能 通竅。解鬱。辟穢。祛痰。用
作衝動性祛痰藥。又爲疥癬塗擦
藥。

作用 在胃中僅自行分解。然
不起何等作用。至腸次第被吸入
血中。能使血行增進。并能激氣管
神經。使分泌液透出。

主治 辟惡。殺鬼精物。溫瘧蟲
毒。癰疽。去三蟲。除邪。令人無夢覺。
久服通神明。輕身。延年。

歷代記述攷證 【明】李士材
本草圖解論蘇合香曰。蘇合香甘
溫。芳香氣實。通達諸竅。流行百骸。
故其主治能辟邪。殺鬼。止癰。截瘧。
【清】黃宮繡本草求真論蘇合香
曰。蘇合香味甘氣溫。出於天竺。崑
崙諸國。安南三佛齊亦皆有之。治
能辟惡。殺鬼。凡溫瘧蟲毒。癰疽。並
痰積氣厥。山嵐瘴濕。襲於經絡。塞
於諸竅者。非此不除。按香皆能辟
惡。除邪。此合諸香之氣。煎就而成
一物。其通竅逐邪。殺鬼通神。除癰
絕癰。祛蟲。宜其然矣。以筋挑起。懸
絲不斷者。真。但血燥氣弱者。勿用。

國外學說 日本學說謂流動
蘇合香供藥用時。爲褐色混濁之
黏稠液。溶解於酒精中。於防腐殺
下等動物之性。因刺激性少。且價
廉。故與等分或倍量之阿列布油
混和。或與百露拔爾撒母相混。治
疥癬等甚效。或爲防腐性殺菌藥。
於火傷凍傷潰瘍。外用之。又日本
藥局方曰。流動蘇合香。係煎蘇合

香樹（Liquidambar orientalis, L., mill.）內皮壓榨而得。爲灰色
黏稠液。有佳香。入水下沉。水面僅
有無色油滴浮動（中略）精製之
法。用流動蘇合香於重湯煎上溫
熱。除去水氣大半。乃溶於等量酒
精。濾過蒸發。使成稠厚。越斯。本
品爲褐色黏稠物質。薄層證明。溶
於等量酒精。證明溶化。多量則變
稠濁。逢伊打。硫化炭。臨蘇爾等。祇
略留絮狀物質而溶化。又和漢藥
考曰。蘇合香有數種。一爲外面黃
赤色。作顆粒狀者。有脂氣。二爲雜
有前者之小塊。呈淡褐色。易磨碎。
投入水中。其香彌佳。三爲輕質。巨
塊。混有污物。品最下。四爲蘇合香
即今之流動蘇合香。又曰。司吉諾
兒（Stryol C₂₁H₃₂）爲無色揮發
性液體。比重八〇・九二四。約於
攝氏一百三十五度沸騰。蘇合香
之香氣。即從此物發出。司吉拉辛
（Stryacin C₂₁H₃₀O₂）通
常爲羽狀結晶體。時或爲油狀。伊打
善能溶解。酒精則稍能溶解。
辨偽 蘇合香色微綠。如雜斑
者。良。微黃者次之。紫赤者又次之。

方交愛。

國學說 英美學說謂蘇木又名赤木產東印度海島等處而暹羅國等處亦產之其木心可爲藥品內含一精卽巴字林其醫治作用與洋蘇木同能收斂而其力則較遜爲收斂藥補藥如日久痢症服之能治惟患紅痢及當身熱則未可連服又如患白帶可以內服及用藥水節射入陰戶此藥爲收斂藥中不可少之藥惟服後則顏色多屬黑其功用又能治積滯胃弱久瀉內部出血處方用蘇木一兩劈碎肉桂九分六釐二毫半研末汽水二十兩先將蘇木入銅鍋內或用磁鍋亦可惟鐵器則忌用熬十分鐘將畢加肉桂末調勻濾渣再用汽水淋洗足二十兩爲度每服一兩至二兩（蘇木煮水方）又用蘇木一分碎屑沸汽水十分浸一天入鍋熬至一半濾渣再入燙鍋散氣成膏爲度治久瀉久痢每服一分七釐半至五分二釐半（蘇木膏方）又用蘇木煮水足一兩石灰水三錢一分半共和勻爲度作一服治癆病之泄瀉吐

血（蘇木勻水方）

配合應用 ①治產後血暈有神用蘇木澤蘭川芎麥門冬生地黃蒲黃人參童便益母草牛膝黑豆荊芥穗

②治產後兒枕作痛用蘇木山查延胡索牡丹皮澤蘭當歸五靈脂赤芍藥紅花加入乳香沒藥治產後血凝不消因寒而得者加炒黑乾薑桂各少許

③治婦人月候不調用蘇木延胡索牡丹皮牛膝當歸地黃芍藥續斷煎濃汁加入乳香沒藥血竭自然銅麝蟲麻皮灰黃荊子等末量病輕重調服四五錢治跌撲損傷如神

④治產後血暈蘇方木三兩水五升煎取二升分服

⑤治產後氣喘面黑欲死乃血入肺也用蘇木二兩水二碗煮一碗入人參艾一兩服隨時加減神效不可言（胡氏方）

⑥治破傷風病蘇方木爲散三錢酒服立效名獨聖散（普濟方）

⑦治脚氣腫痛蘇方木爲齋藤等分細剉入定粉少許水二斗煎

一斗五升先煎後洗（普濟方）

⑧治偏墜腫痛用蘇方木二兩好酒一壺煮熱頓飲立愈（集簡方）

⑨金瘡接指凡指斷及刀斧傷用真蘇木末敷之外以蠶繭包縛完固數天如故（攝生方）

用量 錢半至三錢
施用宜忌 凡無瘀滯者禁用忌鐵石灰火

參攷資料 ①蘇木性涼味微辛發散表裏風氣宜與防風同用又能破死血產後血腫脹滿欲死者宜之（張元素）②蘇方木乃三陰經血分藥少用則和血多用則破血李時珍③蘇方木自南海崑崙來而交州愛州亦有之樹似菴羅葉若榆葉而無澀抽條長丈許花黃子青熟黑其木入用染絳色（蘇恭）④按徐表南州記云生海畔葉似絳木若女貞（李珣）

⑤按檢含南方草木狀云蘇方樹類槐黃花黑子出九真煎汁忌鐵器則色黯其木蠹之蠹名曰紫納亦可用暹羅國人賤用如薪（李時珍）

【蘇木中沙】 原名 蘇枋木中沙

古籍別名 天成沙（綱目拾遺）

採取 劈蘇木中取之但難得須囑染坊家收存入藥用
主治 卒心痛溫酒服

【蘇木紅】 卽山牛膝之古籍別名典見綱目拾遺詳山牛膝條
【蘇冬】 卽麥門冬之俗名詳麥門冬條

【蘇半夏】 製法 取頂上半夏十斤泡清水兩日每日換水三次第三日用白礬二兩生鹽三錢用滾水溶化待水涼凍時卽用此水浸半夏每四日照法換水一次以七次爲度共二十八日取起曬至五成乾再用橘紅二兩陳皮一兩蘇子二兩礬石二兩北味一兩花粉二兩杷葉二兩白前一兩煎水多少以漬勻此半夏爲度曬乾刮去皮用之此方原用白礬二兩朴硝二兩煎水泡七次每次七日共泡四十九日仍取起曬乾惟浸至四十九日每嚼之無味性之不存痰何能去故改轉浸

味。本品加哥羅仿姆 (Chloroform)。

orm) 煮沸或加伊打 (Fether) 祇稍呈類黃色。將其伊打液蒸發則遺下少許黃色著黏性殘渣。又用熱湯溶化。加硼酸鈉濃液則呈綠色之螢石光彩。(和漢藥考)

【蘆薈】
命名 卽蘆薈外之皮
性質 苦寒無毒

效。能。生。肉。滅。癰。
 主。治。金。瘡。
 蘆。蟲。蟲。蟲。
 命。名。本。品。卽。生。於。蘆。桿。節。中。之。蟲。蟲。故。

形態 蘆蠹蟲爲化生蟲類之一種狀如小蠶可供藥用。

性質 甘寒無毒。

主治 小兒飲乳後吐逆不入腹取蟲二枚煮汁飲之嘔逆與覓乳不同乳飽後覓出者爲覓乳也。

蘇 卽紫蘇之原名。**詳**紫蘇條。

蘇子霜 卽紫蘇子之處方用名。

詳『紫蘇子』條
蘇方木 卽蘇木之古籍別名。典
見唐本草。詳『蘇木』條。

蘇木
原名 蘇方木
命名 本品產於海島

之蘇方國。故名。後世簡稱爲蘇木。

古籀別名 木中尊(綱目)蘇方木(唐本草)多邦。蘇枋。巴勝虎。(和漢藥考)

外國名詞 Sapan-wood. (拉
丁) (Sappan wood.) (英)

基本產地 屬荳科爲蘇枋之樹幹。陳仁山藥物生產辨云。

蘇木產中亞美利加與西印度羣島等處。東印度、暹羅等處亦有出。



木 蘇

用法 水煎。或酒浸。或剉末用。

性質	甘。鹹平。無毒。
成分	含有 Tannic acid
	$C_{12}H_{10}O_9 \cdot 2H_{20}$, Fixed Oil, 樹

脂、纖維、糖素。
效能。祛瘀。止痛。和血。散風。用
作清血藥。

作用 在胃時微有制酵之功。入腸能促進腸之斂性。同時又能減少腸之分泌。入血後能收縮發炎之微血管。

主治 破血產後血脹悶欲死者。水煮五兩取濃汁服。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器
本草拾遺論蘇木曰。霍亂逆送。及
人常嘔吐。用水煎服。 【唐】李珣海
藥本草論蘇木曰。虛勞血癖。氣壅
滯。產後惡露不安。心腹攪痛。及經
絡不通。男。女。中風。口噤不語。並宜
細研乳頭香末。方寸匕。以酒煎蘇
方木調服。立吐惡物。瘥。 【宋】大明
諸家本草論蘇木曰。婦人血氣心
腹痛。月候不調。及蓐勞。排膿止痛。
消癰。腫。撲損瘀血。女人失音。血噤。
赤白痢。并後分急痛。 【元】李東垣
用藥法象論蘇木曰。破瘡。瘍。死血。

產後敗血。【明】繆希雍本草經疏論蘇木曰。蘇木味甘鹹氣平無毒。好古加辛。降多於升。陽中陰也。入足厥陰。兼入手少陰。足陽明經。凡積血與大產後血脹悶欲死。無非心肝二經爲病。此藥鹹主入血。辛能走散。敗濁瘀積之血行。則二經清寧。而諸證自愈。日華子主婦人血氣。心腹痛。月候不調及。產勞排膿止痛。消癰腫。撲損瘀血。女人失音。血噤。海藥主。虛勞血。癖氣。煩滯。產後惡露不盡。心腹攪痛。及經絡不通。悉取其入血行血。辛鹹消散。亦兼有輭堅潤下之功。故能祛一切凝滯留結之血。婦人產後尤爲所須耳。【清】黃宮繡本草求真論蘇木曰。蘇木甘鹹平涼。功用有類。紅花。少用則能和血。多用則能破血。但紅花性微溫。而此則性微寒涼也。故凡病因表裏風起。而致血滯不行。暨產後血暈脹滿。以死。及血痛血癢。經閉氣壅。癰腫跌撲損傷等症。皆宜相症合。以他藥調治。如疎風。則與防風同用。行血。則與乳香同用。但性本疎泄。產後惡露已盡。大便不實者。均應禁用。出蘇

產後敗血。【明】繆希雍本草經疏論蘇木曰。蘇木味甘鹹氣平無毒。好古加辛。降多於升。陽中陰也。入足厥陰。兼入手少陰。足陽明經。凡積血與大產後血脹悶欲死。無非心肝二經爲病。此藥鹹主入血。辛能走散。敗濁瘀積之血行。則二經清寧。而諸證自愈。日華子主婦人血氣。心腹痛。月候不調及。產勞排膿止痛。消癰腫。撲損瘀血。女人失音。血噤。海藥主。虛勞血。癖氣。煩滯。產後惡露不盡。心腹攪痛。及經絡不通。悉取其入血行血。辛鹹消散。亦兼有輭堅潤下之功。故能祛一切凝滯留結之血。婦人產後尤爲所須耳。【清】黃宮繡本草求真論蘇木曰。蘇木甘鹹平涼。功用有類。紅花。少用則能和血。多用則能破血。但紅花性微溫。而此則性微寒涼也。故凡病因表裏風起。而致血滯不行。暨產後血暈脹滿。以死。及血痛血癢。經閉氣壅。癰腫跌撲損傷等症。皆宜相症合。以他藥調治。如疎風。則與防風同用。行血。則與乳香同用。但性本疎泄。產後惡露已盡。大便不實者。均應禁用。出蘇

不凝。因膽汁太少之故。則可代膽汁之用。其力似能感動大腸而最易感動肛門。因此令大便秘通。設或已有便秘或有痔瘡。則此爲有弊。依此法亦能感動其相近之各處。因此可爲調經藥。又如讀書辛勞。頭痛便秘。婦人腰脊骨痛。月經不行。並宜服此藥。第不宜過服。過服則令肛門痛熱。至孕婦及生痔與大小腸有炎症。則不宜服。其功用又能驅蟲。開胃。治經脈不調。腸膜核疳。經閉便燥。飯不消化。外用能作射水。助瀉驅蟲。

近人學說 顧子靜曰。蘆薈有

兩種。(一)爲喜望峯地方所產百合科植物蘆薈屬諸種肥厚肉狀之葉。榨取其津汁。煎至濃稠。成暗褐色之塊。易於破碎。其碎面呈貝殼狀。有玻璃狀光澤。邊緣透映視之呈類赤色或淡褐色。粉碎之。成黃色無晶形粉末。有特異之臭氣。與極苦味。難溶解於冷水。入二倍之沸湯中。殆成透明之溶液。是所謂透明蘆薈也。主成分爲阿路愛。帶有強瀉下作用。并含多量弱瀉下性之蘆薈脂。此外更其沒食子

二十畫 蘆

酸。蛋白質狀物質。脂肪等。(二)爲

東西印度地方所培植之蘆薈屬植物。製成不透明之塊。是稱肝狀蘆薈。含少量之阿路因。無光澤。色黃褐。乃至黑褐。粉末爲橙黃色。乃至褐色。此外之性質及成分。與透明蘆薈無異。蘆薈之作用。其少量自三毫至一釐五毫。能興奮食慾。促進消化。但不甚確實。稍大量自三釐至一分三釐。發生噁氣。胃部壓重。服用後經十時至十五時。排瀉狀暗色便數次。時或腹痛。其三倍量即四分。通利較速。排泄液便腹痛極強。併發裏急後重。但瀉下量因人而異。瀉後毫無便秘之患。久用大量。則下腹臟器易至充血。以腎臟與在小骨盤腔內之直腸并生殖器之血管爲甚。因此誘起子宮出血。尿意頻數。痔疾。痔出血等症。少量久用。亦直腸血管擴張。難於回復。成爲痔疾。是由蘆薈之直接刺激直腸也。蘆薈之醫療應用。最常用者爲瀉下藥。尤適於常習便秘。可以久服。以無須增大用量也。但有出血之傾向者。(如痔疾。月經期慢性子宮病。妊娠等)皆當禁用。

皆當禁用。

配合應用 ①治小兒諸疳。用蘆薈。厚朴。橘紅。甘草。青黛。無灰。百草霜。旋復花爲末。以砂仁湯吞。一歲一分。甚效。

②治脾疳。蘆薈。使君子。等分爲末。每服一二錢。米飲調下。(衛生易簡方)

用量 八分至錢半。

施用宜忌 凡脾胃虛弱者禁用。

著名方劑 ①更衣丸。治津液不足。大便不通。(古方)蘆薈七錢。(研細)礞砂五錢。(研如飛麵)滴好酒少許。和丸。每服一錢。重至三錢。酒下。②當歸龍薈丸。治肝經實火。大便祕結。小便澀滯。或胸膈作痛。陰囊腫脹等症。(古方)當歸龍薈草。黃連。黃芩。梔子。仁各一兩。大黃。蘆薈。青黛。各五錢。水香二錢。牛麝香五分。(另研)上爲末。炒神麝糊丸。每服二十丸。薑湯下。

參攷資料 ①唐劉禹錫傳信方云。予少年曾患難。初在頸項間。後延上左耳。遂成瘻。瘻深澤。用斑蝥。狗膽。桃根。諸藥。徒令贅。其瘻

轉盛。偶于楚州賣藥。人欲用蘆薈一兩。炙甘草半兩。研末。先以溫漿水洗。攤拭淨。傳之。立乾。便瘻。真神奇也。(蘇頌)②蘆薈生波斯國。狀似黑錫。乃樹脂也。(李珣)③今惟廣州有來者。其木生山野中。滴脂淚而成。採之不拘時月。(蘇頌)④蘆薈原在草部藥譜及圖經所狀。皆言是木脂。而一統志云。爪哇三佛齊諸國所出者。乃草屬。狀如蟹尾。採之以玉器搗成膏。與前說不同。何哉。豈亦木質草形乎。(李時珍)⑤蘆薈爲蘆薈族植物。種類頗多。其形狀亦因之而有差異。亞拉伯蘇哥篤拉島(A. arabico-

lib. Is.)所產之蘆薈。莖作單圓柱狀。時亦有分岐者。高可四五尺。葉扁平。似肉質。叢生於莖之枝端。作藍綠色。披針形。上有白斑。邊緣有短刺。棘。以鑽刺葉。則滲出苦味液汁。謂之蘆薈汁。第四版改正日本藥局方曰。蘆薈係從其葉採取液汁煎成。爲暗褐色之固塊。質脆易碎。碎片透明。作貝殼狀。現銳稜有類似玻璃之光澤。置顯微鏡下觀之。見並非結晶。氣味特異。有苦

一八九五

或黑或暗綠。質堅硬脆弱。研碎之。則成爲黃色或褐色之粉末。沸湯及溫酒精。均能溶解。熱灼之初。膨脹。繼放明焰而燃燒。氣味頗惡。有苦味。



蘆 薈

性質 苦。寒。無毒。

成分 爲蘆薈素 (Aloin) 幾斯樹脂等。蘆薈素 ($C_{25}H_{39}O_{14}$) 爲蘆薈之有效成分。係淡黃色結晶體。有蘆薈特有之臭氣。味初甘而後苦。冷水難溶。熱湯及酒精易溶。

效能 清疳熱。殺蟲積。能興起大腸蠕動。故有瀉下功效。並能助胃之消化。故用作瀉劑及健胃苦味劑。此外又用作通經藥。並治習慣性便秘經閉。

作用 入胃後能促進胃液分泌。增加使消化增強。至腸能激腸之蠕動。加速黏膜之分泌。加令積糞泄出。由腸壁而達血中。則血

亦受激而循環迅速。而使子宮之充血尤爲有效。故可治一切經閉及衰弱之症。

主治 熱風煩悶。胸膈間熱氣。目目。鎮心。小兒癩癩驚風。療五疳殺三蟲。及痔瘡瘡癢。解巴豆毒。

歷代記述攷證 【唐】李珣海藥本草論蘆薈曰。主小兒諸疳熱。【唐】甄權藥性本草論蘆薈曰。單用殺疳。吹鼻殺腦疳。及除鼻癢。【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論蘆薈曰。研末傳露齒甚妙。治溼癬出黃汁。【明】繆希雍本草經疏論蘆薈曰。蘆薈味苦。其氣寒。其性無毒。寒能除熱。苦能泄熱。燥瀉。苦能殺蟲。至苦至寒。故爲除熱殺蟲之要藥。其主熱風煩悶。胸膈間熱氣。明目鎮心。小兒癩癩驚風。療五疳殺三蟲者。熱則生風。熱能使人煩悶。熱除則風熱煩悶。及胸膈間熱氣自解。涼肝故明目。除煩故鎮心。小兒癩癩驚風。熱所化也。五疳同爲內熱。脾胃停滯之證。三蟲生於腸胃。溼熱痔病瘡癢。亦皆溼熱下客腸臟。致血凝滯之所生。故悉主之。能解巴豆毒。亦除熱之力也。詳其功用。是足厥陰足太陰二經藥。亦可兼入手少陰經。【清】黃宮繡本草求真論蘆薈曰。蘆薈大苦大寒。功專殺蟲除疳。安心明目。最爲小兒驚癩疳積上品。且能吹鼻殺腦疳。及除鼻癢。然苦雖能殺蟲。寒能療熱。而氣甚穢惡。僅可施之藜蘆及體質強健者。若胃虛少食。人得之入口。便大吐逆。遂致奪食瀉泄。因而羸瘦。怯弱者多多矣。如黑錫苦色綠者真。

國外學說 日本學說謂蘆薈者。產於喜望峯地方。Aloe 屬之諸種也。日本藥局方亦記載之本品之主成分。爲「アロイン」下泄通經。健胃之藥也。服少量。能增加食物。促進消化。用爲下劑。則於六時至十二時後奏效。有嘔氣胃部壓重腹痛等。此際雖達於小骨盤內之臟器。然不害消化。不留便秘。常食亦無習慣之性。因是於慢性便秘適用之。又爲通經藥。於月經閉止。痔血閉止。以下劑量與之。爲誘導下劑。於腦充血。肺充血。用之。又或用少量。爲健胃藥。若用大量。則起嘔氣。嘔吐。腹痛。下利。直腸子

宮。腎之充血。因是患子宮出血。痔出血。尿意頻數。流產。春情亢進等症。亦有之。且能使膽汁。腸液。乳汁之分泌增加。腸之蠕動亢進。甚有發炎性者。本品若爲散布藥。則於弛緩性潰瘍用之。又有於眼病用之者。用量。健胃則用〇、〇一至〇、〇五。爲下劑則用〇、二至一、〇。アロイン 用量。內服〇、一至〇、二四。可爲蘆薈之代用品。爲皮下注射。亦有下劑之效。即以一分與個里設林(甘油)八分之比。例溶解者。注入一箇至二箇。日本藥局方藥物學綱要。又和漢藥考曰。蘆薈種類甚多。其中供藥用者。有巴倍屯。昔斯蘆薈 (Aloe barbadensis) 蘇哥。篤里那蘆薈 (Aloe socotrina) 歐巴吉加蘆薈 (Aloe hepatica) 加邊昔斯蘆薈 (Aloe capensis) 等。但普通則分爲透映蘆薈 (Aloe lucida) 及肝蘆薈 (Aloe hepatica) 二種。英美學說謂蘆薈爲瀉藥 (專瀉大腸) 如食小服。則爲補藥。食大服。則爲瀉藥。醫士或以爲能感動肝。又如腸內功用。

今作簾者是也。所謂莖者。今以當薪者是也。而人罕能別葦莖與蘆葦也。又北人以葦與蘆爲二物。水旁下澤所生者皆名葦。其細不及指大。人家池園所植者皆名蘆。其幹差大深碧色者。亦難得。然則蘆葦皆可通用矣。(蘇頌) 蘆有數種。其長丈許。中空皮薄。色白者。葭也。蘆也。葦也。短小於葦而中空皮厚。色蒼者。莖也。蘆也。荻也。葦也。其最短小而中實者。葉也。簾也。皆以初生已成得其名。身皆如竹。其葉皆長如箬葉。其入藥性味皆同。其未解莖者。古謂之紫箬。(李時珍)

④入陽明。清熱下降。筍性更佳。能解河豚毒。按根亦能解魚蝦蟹河豚毒。葦莖形如肺管。甘涼清肺。葦莖即蘆之莖也。(顧松園) ⑤別錄記載蘆根。而不及葦莖。大率生水中者。多與水爲事。其根能啓水竅上滋。治消渴客熱。則其莖必係導熱痰下流。而治肺癰矣。凡有節之物。能不爲津液隔閡者。於津液之隔閡而生患害。尤能使之通行。此千金所以有葦莖湯歟。(鄒潤安)

二十畫 蘆

【蘆莖葉】

性質 甘寒。無毒。主治 霍亂嘔逆。肺癰。煩熱。癰疽。燒灰淋汁。煎膏。蝕惡肉。去黑子。

歷代記述攷證 【南北朝】徐之才雷公藥對論蘆葦曰。舜治金瘡。生肉。凍瘡。

配合應用 ①治霍亂煩渴。腹脹。蘆葉一握。水煎服。又方。蘆葉五錢。糯米二錢。牛蒡一錢。水煎。入薑汁。蜜各半合。煎兩沸。時時啣之。(聖惠方)

②治吐血不止。蘆荻外皮。燒灰。勿令白。爲末。入蚌粉少許。研勻。麥門冬湯服一二錢。三服可救一人。(聖惠方)

③治肺癰。咳嗽煩滿微熱。心胸甲錯。葦莖湯用葦莖切二升。水二斗。煮汁五升。入桃仁五十枚。煮薏仁。瓜瓣各半升。煮取二升。服當吐出膿血而愈。(金匱方)

④治發背潰爛。陳蘆葉爲末。以葱椒湯洗淨。傅之。神效。(乾坤祕鑑方)

⑤治癰疽惡肉。白炭灰。白荻灰等分。煎膏塗之。蝕盡惡肉。以生肉膏貼之。亦去黑子。此藥只可留十日。久則不效。(時後方)

⑥治小兒疥瘡。以鹽湯洗淨。蒲灰傅之。(聖濟總錄方)

參攷資料 古方煎藥。多用勞水及陳蘆灰。取其水不強火不盛也。蘆中空虛。故能入心肺。治上焦虛熱。李時珍

【蘆粟】 ①即稷米之別名。詳『稷米』條。 ②即蜀黍之俗名。詳『蜀黍』條。

【蘆葷子】 即萊葷子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『萊葷子』條。

【蘆筍】 性質 微苦。冷。無毒。主治 脇間客熱。止瀉。利小便。解河豚及諸蟹毒。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論蘆筍曰。解諸肉毒。施用宜忌 忌巴豆。

【蘆肥】 即萊葷之古籍別名。典見爾雅。詳『萊葷』條。

【蘆胎子】 即萊葷子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『萊葷子』條。

【蘆藥】 ①即蜀黍之古籍別名。詳『蜀黍』條。 ②即蜀黍之俗名。詳『蜀黍』條。

【蘆葷子】 即萊葷子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『萊葷子』條。

【蘆筍】 性質 微苦。冷。無毒。主治 脇間客熱。止瀉。利小便。解河豚及諸蟹毒。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論蘆筍曰。解諸肉毒。施用宜忌 忌巴豆。

【蘆肥】 即萊葷之古籍別名。典見爾雅。詳『萊葷』條。

【蘆胎子】 即萊葷子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『萊葷子』條。

【蘆粟】 ①即稷米之別名。詳『稷米』條。 ②即蜀黍之俗名。詳『蜀黍』條。

【蘆葷子】 即萊葷子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『萊葷子』條。

【蘆筍】 性質 微苦。冷。無毒。主治 脇間客熱。止瀉。利小便。解河豚及諸蟹毒。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論蘆筍曰。解諸肉毒。施用宜忌 忌巴豆。

【蘆肥】 即萊葷之古籍別名。典見爾雅。詳『萊葷』條。

【蘆胎子】 即萊葷子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『萊葷子』條。

【蘆藥】 ①即蜀黍之古籍別名。詳『蜀黍』條。 ②即蜀黍之俗名。詳『蜀黍』條。

米之俗名。詳『稷米』條。

【蘆薈】 命名 蘆薈。黑色也。薈。聚也。本品木之脂液凝集。色黑如飴。故名。俗呼爲象臙。以其味苦如臙也。

處方用名 眞蘆薈。詳蘆薈。古籍別名 蘆薈。奴會。(開寶) 訥會。拾遺。象臙。(俗名) 鬼丹。(和漢藥考)

外國名詞 Aloe (拉上) (德) Aloes (英)

基本 鑽刺百合科蘆薈族植物之葉。煎熬其所滲出之液汁。製成越幾斯質之蘆薈。

產地 蘆薈產索哥德。拉。及巴。巴。豆。好望角等處。近日恒用者。以索哥德。拉。所產爲上品。功用。潤腸。殺蟲。調經。開胃。助膽汁。又名。象臙。由。喇。吉。打。運。來。和。漢。藥。考。曰。亞。拉。伯。之。蘇。哥。德。拉。島。西。印。度。之。巴。魯。篤。巴。多。斯。島。非。洲。之。喜。望。峯。等。熱。帶。地。方。均。產。之。

形態 蘆薈爲香木類。係常綠。灌木。木。葉。大。而。尖。肉。質。有。銳。鋸。齒。花。成。穗。狀。其。葉。分。泌。之。脂。色。黑。有。光。爲。透。明。或。半。透。明。之。同。塊。其。色。

一八九三

續本草求真論蘆根曰。蘆根治無他奇。惟清肺降火。是其所能。凡人胸中有熱。則火上升。嘔逆氣不下。脾肺熱起。則消渴便數。甚至不能少忍。故必得此苦寒以治。則諸症悉除。且解蝦魚中毒酒毒。然此止宜實熱。不宜虛寒。若誤用之。必致見害。取逆水土內甘美者效。若露出水面者損人。去蘆節。

國外學說 荷蘭藥鏡卷五載有蘆根 (Trichum repens) 之藥效摘錄於下。蘆根有清涼淨血。開達利水之效。和解酷厲液稀釋黏稠液。疏解凝結。為解凝良藥。疏解內臟壅塞塊腫。開通肝脾腎膀胱等壅塞。治肝之壅塞結腫黃疸脾病。依劉昆垚兒最有效。又能溶解膽液凝石。故用於間歇黃疸。有殊效。用於羸瘦病之氣內臟壅塞者。能津潤滋養。緩和酷厲液。但不適於下痢症。黏液壅塞頑固諸病。用此製根成越幾斯劑。日服五六盎斯佳。能抑制熱病毒之刺激衝動。用於減損脈管纖維擴張力。諸症及熱病之稍傾厥衝症者。甚有效。用於間歇熱稀釋黏液。疏開壅

塞。利小便。驅散病毒。用於間歇熱

等之兼有內臟壅塞險重症最佳。用於胸肺咽喉諸症。有緩和疏解清涼功效。遷延病之有酷厲毒。而

成刺戟症者。例如風痛。流走痛。傷冷痛及頑滯瘡腫。疥癬類。或由黏稠液壅塞而發之黃疸等。用此根加於煎劑長服。有殊效。例如下方。

排毒蘆根煎。用蘆根山牛蒡根各六盎斯。加水適宜。煎成煎汁六十盎斯。再加後藥。接骨木傑列乙三盎斯。孕藥酒石 (或霸王鹽) 四錢。攪和隨意飲服。大便閉者。加瀉藥配合應用。

●止因熱嘔吐。用逆水蘆根竹茹。枇杷葉麥門冬。烏梅。木瓜。

●除傷寒熱病。煩悶嘔吐。用蘆根。竹茹。麥門冬。大青。青黛。藥性論云。蘆根能解大熱。開胃。治噎噤不止。皆由甘寒除熱之力也。

●治骨蒸肺癆不能食者。蘇遊蘆根飲主之。蘆根。麥門冬。地骨皮。生薑各十兩。橘皮茯苓各五兩。水二斗。煮八升。去滓分五服。取汁乃瘥 (外臺祕要方)。

●治勞復食復欲死。並以蘆根

煮濃汁頻飲之 (肘後方)。

●治嘔噤不止厥逆者。用蘆根三斤。切。水煮濃汁。頻飲二升。必效。若以童子小便煮服。不過三升。愈 (肘後方)。

●治五噎吐逆。心膈氣滯。煩悶不下食。蘆根五兩。剉。以水三大盞。煮取二盞。去滓溫服下 (金匱玉函方)。

●治反胃上氣。蘆根。茅根各二兩。水四升。煮二升。分服 (千金方)。

●治霍亂煩悶。蘆根三錢。麥門冬一錢。水煎服 (千金方)。

●治霍亂腹脹。蘆根一升。生薑一升。橘皮五兩。水八升。煎三升。分服 (太平聖惠方)。

●治食狗肉毒。心下堅積。或腹脹口乾。忽發熱。妄語。蘆根煮汁服 (梅師方)。

●治中馬肉毒 (聖惠方)。

●治食蟹中毒。亦

亦治鱖鱖魚毒。亦治食蟹中毒。亦治中藥毒 (千金方)。

●用量 五錢至一兩。

●施用宜忌 凡中寒而無火者

禁用。

著名方劑 葦莖湯。治咳。有微

熱煩滿。胸中甲錯。是為肺癰 (千

主治 取汁塗蛇毒。點風疹。洗瘋疾。亦可肥豕以飼之。

【蕤麻】卽蕤草之古籍別名典見綱目拾遺。詳「蕤草」條。

【蕪艾炭】卽艾葉焙炒成者之處
方用名詳『艾葉』條。

【蘼艾葉】卽艾葉之處方用名詳『艾葉』條。

【蘼蕪】卽蘼蕪之古籍別名典見爾雅。詳『蘼蕪』條。

【蕪蛇】即白花蛇之古籍別名典見綱目。詳『白花蛇』條。

【蕪蛇肉】卽白花蛇之處方用名。詳『白花蛇』條。

【蘄棍】
別名 豆艾
產地 生建昌。

形態。高不及尺。圓莖長。葉白
毛如粉。葉厚而柔。兩兩下垂。惟直



棍 蕐

效能 去風熱。
主治 腫毒。

二十畫 藥

斬
蘄
蘆

【薔薇香】卽杜若之古籍別名。典見植物學大辭典。詳『杜若』條。

【蘆巴】卽胡蘆巴之古籍別名。典見和漢藥考詳『胡蘆巴』條。

【蘆甘石】卽爐甘石詳『爐甘石』條。

【蘆石】卽鐘乳石之古籍別名。見別錄。詳『鐘乳石』條。

【蘆肥子】即胡盧巴之古籍別名。典見和漢藥考。詳『胡盧巴』條。

【蘆花】
原名蘆薈。
性質甘寒無毒。

主治 霍亂水瀉濃汁服大驗
歷代記述攷證 【宋】蘇頌圖

經本草論蘆花曰煮汁服解中魚
蟹毒【明】李時珍本草綱目論蘆
花曰燒灰吹鼻止衄血亦入崩中
藥。

【蘆根】 命名 葦之夜生曰蘆。未秀曰蘆。長成曰葦。本

品乃蘆之根莖故名。
處方用名 活蘆根。鮮蘆根。活
水蘆根。

藥考)

外國名醫	Feed root(英)
-------------	---------------------

基本 屬禾本科蘆(葦)之根。
產地 各省各屬有產。
形態 蘆爲草本。多生於水邊。



根 蘖

採取 二月八月採根日乾。餘者採掘無時。

製法 雷斅曰蘆根須要逆水生。并黃泡肥厚者去鬚節并赤黃皮用。

性質 甘寒無毒

成分 蘆根中含有糖質、蛋白質及中性鹽類等。

效能 清胃火止嘔噦除煩熱

發疹瘡。用爲芳香性健胃藥。又爲解熱祛痰藥。

歷代記述攷證【唐】蘇恭新

下食。胃中熱。傷寒內熱。彌良。【唐】

香而不嫌其猛烈。溫煦而不偏於燥熱。能祛陰陰。驅濕邪。而助脾胃。正氣爲滯。困脾陽。怠倦無力。飲食不甘。舌苔濁垢者。最捷之藥。亦辟穢惡。解時行疫氣。蓋瘟疫以氣染入。無非溼濁穢腐之薰蒸。感之者。由口鼻吸入。胃先受之。芳香得清氣之心。而馨香氣味和平。不嫌辛燥。故助脾胃而無流弊。但必以廣產爲佳。雖以氣勝。而沖和可愛。今江浙間遍地產之。則味苦澀而氣亦惡劣。石頑謂伐胃消食。且能耗氣。而世俗以爲能解暑氣。淪茶多飲。未盡善也。

配合應用 ①治霍亂。用藜香、縮砂蜜炒鹽。②治吐瀉轉筋。霍亂。用藜香、人參、橘皮、木瓜、茯苓、縮砂蜜。

③辟惡氣。治中惡。心腹疼痛。用藜香、木香、沈水香、乳香、縮砂蜜。④補肺。藜香入順氣烏藥散。補脾外入黃耆四君子湯。治中暑吐瀉。入桂枝甘露飲。

⑤治暴中寒邪。吐逆不止。用藜香、木香、丁香、紫蘇葉、人參、生薑。⑥治升降諸氣。藜香一兩。香附

炒五兩爲末。每以白湯點服一錢。(經效濟世方)

⑦治霍亂吐瀉。垂死者服之。回生。用藜香、萊菔皮各半兩。水二盞煎一盞溫服。(百一選方)

⑧治暑月吐瀉。滑石炒二兩。藜香二錢。牛丁香五分爲末。每服一二錢。漸米泔調服。(禹誨師經驗方)

⑨治胎氣不安。氣不升降。嘔吐酸水。用香附、藜香、甘草二錢爲末。每服二錢。入鹽少許。沸湯調服之。(聖惠方)

⑩香口去臭。藜香洗淨。煎湯。時時噴漱。(摘玄方)

⑪治冷露瘡爛。藜香、細茶等分。燒灰。油調塗瘡上貼之。(應驗方)

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡陰虛無溼。及胃有鬱熱者。禁用。忌火。

著名方劑 藜香正氣散。治外感四時不正之氣。內停飲食。頭痛寒熱。或霍亂吐瀉。或發瘧疾。(局方) 厚朴、陳皮、桔梗、半夏各二兩。炙草一兩。大腹皮(換板榔亦可)

白芷、茯苓、蘇葉、藜香各三兩。上十味共研末。加薑棗水煎熱服。

參攷資料 ①芳香之氣助脾胃。故藜香能止嘔逆。進飲食。(李杲) ②按廣志云。藜香出海邊國。莖如都梁。葉似水蘇。可著衣服中。穢含南方草木狀云。出交趾。九真、武平、興古諸國。吏民自種之。叢生五六月採日乾。乃芬香。(掌禹錫)

③藜香嶺南多有之。人家亦多種。二月生苗。莖梗甚密。作叢。葉似桑而小。薄。六月七月採之。須黃色。乃可收。金樓子及俞益期牋皆云。扶南國人言五香共是一木。其根是旃檀。節是沉香。花是雞舌。葉是藜香。膠是薰陸。故本草以五香共條。義亦出此。今嶺南中藜香。乃是草類。與稽含所說正相符合。范曄合香方云。零藜虛燥。古人乃以合香。即此扶南之說。似涉欺罔也。(蘇頌)

④藜香方莖有節。中虛。葉微似蒟蒻。潔古東垣惟用其葉。不用枝梗。今人併枝梗用之。因葉多僞。故耳。唐史云。頓遜國出藜香。插枝便生。葉如都良者是也。劉欣期交州記言。藜香似蘇合香者。謂其氣

相似。非謂形狀也。(李時珍) ⑤藜香入肺經。故古方治鼻淵。以之爲君。以其能引清陽之氣。上通顛頂也。(沈金鰲) ⑥藜香廣產者良。但葉甚少。土人每以排草葉僞充。最難辨別。(失名) ⑦按藜香雖不燥烈。然究是以氣用事。惟舌有濁垢而淡。欲泛者最佳。若舌燥光滑。津液不布者。咸非所宜。凡芳香行氣。醒脾勝滯。諸芳草。皆有同情。不僅藜香。木香一類爲然也。(張山雷)

【藜香露】 基本 本品爲藜香蒸取之露。

性質 涼。散。微辛。

主治 清暑。正氣。

古籍別名 藜麻。蠟子。

【藜草】 草(綱目拾遺。惡草羅)

產地 生田野間。

形態 藜草爲毒草類之一種。蘆高四五尺。葉如麻。嫩時可供馬秣。經霜則辛。觸之整人。腫痛不可忍。甚於蜂蠍。蝥蟻。入肌肉即成瘡。浸淫潰爛。久不能愈。有花無實。雪下猶青。其子可供藥用。

下猶青。其子可供藥用。

種類無甚分別。惟有早晚之別。故曰早種晚種。④整地下種栽培者。宜先作溫熱之苗牀。其內之土。必須細碎膨鬆。分切栽培者。作幅四五尺之畦。整地既畢。可以栽種也。⑤栽種下種栽培。於三月間下種於苗牀上。蓋蘖灰。待其生長。可以移植於他處。移植之期。以五月下旬至六月上旬爲常。分切栽培。切其莖爲數段。而後斜插於畦上。待其生長。可毋庸移植也。⑥灌溉。薺香好溼潤。故當灌溉。栽植或播種之後。稍過三四日。即當灌溉一次。待其生長或苗出時。尤宜灌溉。以冷水。又過二十餘日。見其芽生長至一尺餘時。亦當灌水。以助其蒸發。蓋薺香生長之時。正在天氣溫燠之時。其葉甚多。則蒸發甚烈。若此時不行灌溉。則所需水分不足。葉之蒸發益烈。遂不能免其枯萎之患。故栽培薺香。以灌溉爲必要。然行灌溉時。不可不定時間。以灌之。蓋灌水不定時間。則必有害。例如灌水宜行於早晚時。若不依時間。而於日中灌溉之。不惟無益。反致枯死。故亦當注意也。⑦施肥肥料。以人糞尿充之。當其施與時。將人糞尿與水混和至稀薄。人糞尿不可過多。當以適度爲要。(水十擔和人糞尿二擔至三擔半爲度)見其芽出。而後於早朝時施行之可也。但不可行於日間。恐害及其全體。自種迄收。當施二次已足。不必多施也。⑧除薺草叢生。即當除去。爲要。勿使蔓延。致害薺香生長。惟除時亦當注意於薺香。勿使創斷。

採取 五六月間。隨時可以採取。或者見其花開葉大時。爲止長期。乃採取之。正適其當。採取之法。用銳利之刀。割其莖葉。割取之後。曝日中乾之。而後或賣或貯可也。收穫之量。每畝可得四百斤。二三百斤者。次之一百餘斤者。爲最下。總隨栽培之巧拙而分之。

用法 與他藥水煎。或剉末和作丸散。

性質 辛。微溫。無毒。

效能 醒脾和胃。辟惡。止嘔。用治霍亂吐逆要藥。

主治 風水腫。去惡氣。止霍亂心腹痛。

歷代記述攷證

【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論薺香曰。脾胃吐逆爲要藥。【金】張元素珍珠囊論薺香曰。助胃氣。開胃口。進飲食。【元】王好古湯液本草論薺香曰。溫中快氣。肺虛有寒。上焦壅熱。飲酒口臭。煎湯漱。【明】經希雍本草經疏論薺香曰。薺香稟清和芳烈之氣。其味辛。其氣微溫無毒。潔古辛甘又曰。甘苦入手足太陰。亦入足陽明經。風水腫。腫病在於脾。惡氣內侵。亦由脾虛。邪入胃。亂心腹痛。皆中焦不治之證。脾主中焦。香氣先入脾。理脾開胃。正氣通暢。則前證自除矣。蘇氏以爲脾胃吐逆爲要藥。潔古謂其助胃氣開胃口。進飲食。海藏謂其溫中快氣。肺虛有寒。及寒熱熱壅於上焦。飲酒口臭。煎湯飲之。皆辛溫入脾入胃。清上治中之功也。【清】黃宮繡本草求真論薺香曰。薺香辛香微溫。香甜不峻。但馨香氣正。能助脾醒胃。以辟諸惡。故凡外來惡氣內侵。而見霍亂嘔吐不止者。須用此投服。俾其胸開氣寬。飲食克進。故同烏藥。順氣散。則可以利肺。同四君子湯。則

可健脾。以除口臭。但因熱作嘔。勿服。

辨偽 ①鄭肯巖曰。偽名次薺香。氣味不香。不知何處所產。更有一種洋薺香。性味更別。薺梗皆然。用之無益。而有害。按薺香產於嶺南。交趾爲正地道。故近日由廣東辦來者。爲良。氣味芳香。功能醒脾和胃。宜氣開鬱。最得天地之正氣。且方莖有節。中虛。葉似柔而小。薄用者。當明辨之。②曹炳章曰。按薺香本草名兜婁婆香。產嶺南爲最道地。在羊城西百里內之河南寶岡村。及肅慶者。五六月出。新方梗白。毫綠葉。揉之清香。氣繞鼻而濃厚。味辛淡者。名廣薺香。廣東省垣各山貨行。收買揀淨發行。首推巨昌與泰昌爲最道地。如雷州瓊州等處產者。名海南薺香。即今所謂洋薺香也。其氣薄而濁。味辛辣燥烈。葉細而小。梗帶圓形。莖長根重爲最次。其他如江浙所產之土薺香。能乘鮮切片。烈日曬乾。貯於缸甕。使香氣收貯不走。入藥效能亦甚強。不亞於廣薺香也。

近人學說 張山雷曰。薺香芳

爲用。仍與紅花同意。惟自海舶交通。西人所造各種顏料。盛行於時。豔麗絕勝土產。而皆含毒質。今之燕脂。綿燕脂粉。又皆以洋色製成。萬不可爲入藥之品。不如仍用紅花。較爲穩妥。

配合應用 治乳頭裂破。燕脂粉爲末傅之。(危氏得效方)

治嬰孩鵝口。白厚如紙。用蠶子燕脂。以乳汁調塗之一宿效。男用女乳。女用男乳。(集簡方)

治漏瘡腫痛。用礞脂七箇。綿燕脂十箇。洗水和勻。塗七次即可。(救急方)

防痘入目。用燕脂嚼汁點之。(集簡方)

治痘瘡倒陷。乾燕脂三錢。胡桃燒存性一箇。研末。用胡荽煎酒服一錢。再服取效。(救急方)

參攷資料 按伏候中華古今注云。燕脂起自紂。以紅藍花汁凝作之。調飾飾女面。產於燕地。故名燕脂。或作煙妝。何奴人名妻爲闕氏。音同燕脂。謂其顏色可愛。如燕脂也。俗作臟肢。腦支者。並謬也。(李時珍)

燕脂有四種。一種以

紅藍花汁染胡粉而成。乃蘇鶚演義所謂燕脂。葉似薔花。似滌出西方。中國謂之紅藍。以染粉爲婦人面色者也。一種以山燕脂花汁染粉而成。乃段公路北戶錄所謂端州山間有花叢生。葉類薔。正月開花似薔。土人採含苞者爲燕脂粉。亦可染帛如紅藍者也。一種以山

縮花汁作成者。鄧處胡本草中載之一種。以紫鈿染綿而成者。謂之胡燕脂。李珣南海業譜載之。今南人多用紫鈿燕脂。俗呼紫梗是也。大抵皆可入血病藥用。又落葵子亦可取汁。和粉助面。亦謂之胡燕脂。(李時珍)

胭脂須貯於不受日光不觸空氣之處。故以密藏黑漆小箱。或黑漆壺中爲宜。(和漢藥考)

胭脂花 卽紫茉莉之古籍別名。典見草花譜。詳紫茉莉條。

胭脂菜 卽紫之古籍別名。典見綱目。詳紫條。

甘蔗 卽甘蔗之古籍別名。典見綱目。詳甘蔗條。

山藥 卽山藥之古籍別名。典見和漢藥考。詳山藥條。

山藥之古籍別名。典見和漢藥考。詳山藥條。

薔香 卽山藥之古籍別名。典見吳普本草。詳山藥條。

薔香 卽山藥之古籍別名。典見綱目。詳山藥條。

薔香 卽赤豆葉之原名。詳赤豆葉條。

薔香 卽薔香之古籍別名。典見和漢藥考。詳薔香條。

薔香 卽薔香之古籍別名。典見和漢藥考。詳薔香條。

薔香 卽薔香之古籍別名。典見和漢藥考。詳薔香條。

薔香 卽薔香之古籍別名。典見和漢藥考。詳薔香條。

薔香 卽薔香之古籍別名。典見和漢藥考。詳薔香條。

薔香 卽薔香之古籍別名。典見和漢藥考。詳薔香條。

薔香 卽薔香之古籍別名。典見和漢藥考。詳薔香條。

薔香 卽薔香之古籍別名。典見和漢藥考。詳薔香條。

薔香 卽薔香之古籍別名。典見和漢藥考。詳薔香條。

薔香 卽薔香之古籍別名。典見和漢藥考。詳薔香條。

形態 薔香爲多年生草。莖方高三四尺。香氣強烈。葉對生。作長心臟形。前端尖。邊緣有鋸齒。夏月於莖頂叢生青紫色唇形花冠。花作穗狀。



香 薔

種類 運來有葉微青者。稱青葉薔香。其芽香甚烈。用合香料。殆係採葉未黃者陰乾製之。今有得真薔香種栽之者。稱倭薔香。春生苗高二三尺。節節生葉。似木芙蓉葉而小長。開紫花。似夏枯草。花其香有桂氣而烈。摘葉用膠泥一宿乾。武州多種之。與唐薔香無異。

種植 氣候及土質。寒冷而稍帶溫和之氣候。正適其生育。熱則不宜。土地以肥沃及排水適宜之砂質土爲最佳。次之則石灰土亦能生長也。其餘一切土地皆不相宜。產地及種類。薔香爲吾國最多之藥用作物。其產地地有之。

產地 凡山谷田野恒多生焉。陳仁山藥物生產辨云。產廣東以番禺河南。寶蘭。喃嘸。庄石牌爲好。肇慶六步爲最香。次之瓊州屬產者爲南香。更次。

經赤。經粉。(和漢藥考)

外國名國 Carthaminum.

(拉丁) Gerthamin. (英)(德)

基本 屬於菊科之紅花。其花

瓣中含有之紅色素。即以之製成
臙脂也。

產地 陳仁山藥物生產辨云。

棉脂。廣東廣州市製造而成。

形態 臙脂爲血紅色之糊狀。

或有光輝之塊。無臭味。水不溶解。

但以水少許。十分混和。則現紅色。

受空氣及日光溫熱。則次第分解。

製法 摘取紅花之花瓣。陰乾。

浸以適宜之水。使之發酵。造成餅

紅。再浸水中。除去可溶性之黃色

素。以絞搾者入木灰水中。使紅色

素得以溶出。乃於此溶出之液中

注入稀薄之有機酸液。則紅色素

自然沈澱。遂採集而製成臙脂。茲

更詳述如下。○餅紅花之製法。欲

以紅花製成餅塊。須將乾紅花入

桶。灌水。兩足踏出黃汁。傾去。約四

五次。此黃汁爲花蕊與花瓣中所

含之液。煎之可爲黃色染料。黃汁

去後。即以竹筴入流水中振動。且

置日中曬之。候紅花半乾時。捏成

徑一寸許。厚二分餘之堅塊。置於

闊三寸長六尺之框中。框底須先

墊溼水之蓆。然後累疊餅紅。約四

五寸厚。蓋溼蓆一層。兩足在面上

均勻踏緊。蓆上再疊餅紅。蓋蓆足

踏如前。至重疊蓆五層而止。每

層灌水少許。約三四日。聽其放置。

候餅紅之花瓣變軟。手指摺之。覺

現黑色。乃將上面覆蓋之溼蓆。與

下墊之溼蓆替換。下墊之溼蓆。撒

去不用。上蓋則易以乾蓆。既而併

乾蓆亦撤之。餅紅曬乾收藏。如在

陰雨之天。則載以闊三尺長六尺

之竹篾或篋。置火上烘乾。亦有不

用框而用木架。一面堆置。一面可

流去黃汁。其木架亦可疊至五六

層。其法大略相同。○臙脂製造法。

以餅紅花置水中。浸一宿。翌日。搾

以輓轆。以後再浸再搾。凡五六次。

至黃汁去盡。再浸以木灰汁。則臙

脂悉因木灰而游離。然後入米醋。

使與灰汁親和。更以芋蘆入水中。

將臙脂盡行吸收。是爲第一期。此

吸收臙脂之芋蘆。復浸以木灰汁。

(製下等之物。則用稻藁灰汁)而

搾以輓轆。則芋蘆之臙脂亦盡分

離。芋蘆仍復其原有之白色。是爲

第二期。既而將此臙脂水傾入壺

內。加入乾梅之醋。大約臙脂水一

升。入乾梅醋一茶碗。隨工人之巧

拙。而自爲加減。約二時後。臙脂悉

數沈澱。乃徐徐撇淨上面之水。包

以絹紗兩層。再徐徐搾去其水。是

爲第三期。至此臙脂始完成矣。其

搾淨可爲熏蚊之香。至臙脂所得

之分量。須視紅花之好否。與土地

之若何而異。大抵餅紅花百分。可

得臙脂七分至十分。最佳者得十

五分子。

性質 甘。平。無毒。

效能 活血。解毒。用作活血止

血藥。

主治 小兒聾耳。浸汁滴。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論臙脂曰。活血。解痘毒。

【清】黃元御玉楸藥解論臙脂曰。

臙脂味甘。氣平。入足厥陰肝經。治

血行瘀。消腫止痛。此紅蘭花所作

活血與花同。

國外學說 日本和漢藥考曰。

臙脂以臘月製者爲佳。稱爲寒紅。

今日販賣之品類。約如下述。沈降

餅紅而得之臙脂。(已除去水分

者)謂之豔紅。乾燥之臙脂。謂之

乾紅。磁酒杯中投一定之量。周圍

抹刷。發綠色之光輝。專供婦人裝

飾用者。謂之刷紅。臙脂加葛粉。調

成糊狀。自來作糕餅類及錦繪等

著色用者。謂之細工紅。又名食料

紅。又日本明治四十年間。宮城人

山啓內者。提倡一種治病之法。謂

之紅療法。以臙脂與拉納林調和。

製成軟膏。據云。以之塗擦全身皮

膚。能治百病。當時認爲效驗極著。

其明年且著紅療法講演錄一卷。

歷述臙脂之效。謂以臙脂塗擦皮

膚。則血液或組織所吸收之酸素。

悉被分解而放出。且從而調整全

身之營養機能。或奮起其能力。臙

脂既有如此之功效。故祇須診查

等病起因所在。並關聯之神經系

等。即塗擦之。該病即可治愈。乃此

紅療法不久。即闢爲無聞。殆其效

仍歸於泡影歟。

近人學說 張山雷曰。臙脂即

紅藍花汁製成。閩中。以爲面脂潤

色之用。製法不止一種。澎湖綱目

載之甚詳。皆以紅汁染成。以活血

皮良。罌中有米極細。書言氣味甘寒。黃粥能治反胃。亦須分臟偏純。及病症陰陽虛實以治。

國外學說 英美學說謂罌粟

原產印度。波斯等國。高約二尺至四尺。後漸流傳至中國之雲南山西四川等處。今則各處多栽植之。入藥用其已熟之殼。去盡其子。(子無功力)更有於其殼未熟時割裂而取其汁液曬乾以成鴉片。爲藥中要質。罌粟有二種。一爲黑色。一爲白色。而阿剌伯國與波斯國之醫書中亦言有二種。近時印度大平原中多種白色罌粟。而雪山則有一種黑色罌粟。即深紅色鴉片大半爲白罌粟所出。間有紅色與紫色者。惟軟白色之罌粟則更少。西國園內所種之罌粟。疑爲波斯國初產。然在各國種植罌粟已有多年。其子且易散至遠處。故所見野生之罌粟甚多。歐羅巴南方恒見有野生之罌粟。罌粟在埃及國早已種之。而法國土耳其國並歐羅巴他處亦種植罌粟。有法人言地中海東邊所產之罌粟較法國所產者爲更佳。而其功力亦

最大。其醫治作用。能配膏糖煮水等。而其方則較鴉片大遜處方。罌粟殼二兩搗碎。汽水三十兩共入鍋。蓋嚴熬十分鐘。濾渣。加汽水淋之。足二十分爲度。用手巾蘸數患處。治疼痛。跌打外傷。亦治皮膚病。熱用方效。有潤皮膚寧睡之性。如身體有腫大處。或痛處。或生炎處。即如眼睛。肚腹交節等處。俱可用之。(罌粟殼煮水方)

配合應用 ①治熱痢便血。罌粟醋炙。一兩。陳皮半兩爲末。每服三錢。烏梅湯下。

②治久痢不止。罌粟殼醋炙。爲末。蜜丸彈子大。每服一丸。水一盞。薑三片。煎八分。溫服。又方。罌殼十兩。去膜。分作三分。一分醋炒。一分蜜炒。一分生用。並爲末。蜜丸。芡子大。每服三十丸。米湯下。又集要百中散。用罌殼蜜炙。厚朴薑製各四兩。爲細末。每服一錢。米飲下。忌生冷。

③神仙救苦散。治小兒赤白痢。日夜百行不止。用罌粟殼半兩。醋炒爲末。再以銅器炒過。柝榔半兩。炒赤研末。各收。每用等分。赤痢蜜

湯服。白痢沙糖湯下。忌口味。(全効心鑑方)

④治水泄不止。罌粟殼一枚。去蒂。臍。烏梅肉。大棗肉。各十枚。水一杯。煎七分溫服。(經驗方)

⑤治久嗽不止。殼數數壯人用之。卽效。罌粟去筋。蜜炙爲末。每服五分。靈湯送下。(危氏方)

⑥治久咳虛嗽。買同知百勞散。治咳嗽多年。自汗。用罌粟殼二兩。半去蒂。膜。醋炒。取一兩。烏梅半兩。焙爲末。每服二錢。臥時以白湯下。(宣明方)

用量 八分至錢半。
施用宜忌 凡非真氣虧損而有實邪者禁用。

參攷資料 ①收斂固氣能入腎。故治骨病尤宜。(李梴) ②今人虛勞咳嗽。多用罌殼止劫。及溼熱泄痢者用之。止瀉。其治病之功雖急。然殺人如劍。宜深戒之。又曰。治嗽多用罌殼不必疑。但要先去病根。此乃收後藥也。治痢亦同。凡痢須先散邪行滯。豈可遽投罌殼。龍骨之藥。以閉塞腸胃。邪氣得補而愈。其所以變症作而淹延不已也。

(朱震亨) ③酸主收澀。故初病不可用之。泄瀉下痢既久。則氣散不固。而腸滑肛脫。咳嗽諸病既久。則氣散不收。而肺脹痛劇。故俱宜此澀之固之。收之斂之。按楊氏直指方云。罌殼治痢人皆薄之。固矣。然下痢日久。腹中無積痛。常止澀者。豈容不澀。不有此劑以治之。何以對治乎。但要有輔佐耳。又王碩易簡方云。罌殼治痢如神。但性緊澀。多令人嘔逆。故人畏而不敢服。若用醋製。加以烏梅。則用得法矣。或同四君子藥。尤不致閉胃妨食。而獲奇功也。李時珍 ④得醋烏梅。橘皮良。(李時珍)

【罌粟嫩苗】 性質 甘平。無毒。

主治 作蔬食。除熱潤燥。開胃厚腸。

【罌殼殼】 卽罌粟殼之古籍別名。典見和漢藥考。詳「罌粟殼」條。

【臍脂】 卽臍脂之訛。詳「臍脂」條。

命名 本品初產燕地。而以紅藍花汁凝作之。故名。
古醫別名 輕枚。(綱目) 臍脂。

反胃。去胸中痰滯也。

國外學說 和漢藥考曰。罌粟油 (Oleum Papaveris.) 乃壓搾

罌粟子而得之脂肪油也。色黃性燥。酒精能溶解之。比重〇・九二四。可爲油畫家所用油料及製造肥皂原料等。

聖藥良方 治反胃吐食。罌粟粥。用白罌粟米三合。人參末三

大錢。生山芋五寸。細切研。三物以水二升三合。煮取六合。入生薑汁及鹽花少許。和勻分服。不計早晚。亦不妨別服湯丸。圖經方。

治泄痢赤白。罌粟子炒。罌粟殼炙等分爲末。煉蜜丸。梧子大。每服三十丸。米飲下。有人經驗。一百一選方。

用量 八分至錢半。

參攷資料 服石人研此水

煮。加蜜作湯飲。甚宜。唐宗爽。高陽子云。罌粟花有四葉。紅白色。上有淺紅暈子。其葉形如鸛頭。節中有細米。陳藏器。處處有之。人多時以爲飾。花有紅白二種。微腥氣。其實形如餅子。有米粒極細。圃人隔年糞地。九月布子。涉冬至

春。始生苗。極繁茂。不爾不生。生亦不茂。俟鮮焦黃乃採之。蘇頌。罌粟秋種。冬生。嫩苗作蔬食。甚佳。葉如白苣。三四月抽臺。結青苞。花開則苞脫。花凡四瓣。大如仰盂。罌

在花中。繫蕊囊之花。開三日即謝。而罌在莖頭。長一二寸。大如馬兜鈴。上有蓋。下有蒂。宛然如酒杯。中有白米。極細。可煮粥和飯。水研濾

漿。用綠豆粉作腐食尤佳。亦可取油。其殼入藥甚多。而本草不載。乃知古人之不用也。江東人呼千葉者爲鹽春花。或謂是罌粟別種。蓋亦不然。其花形態。本自不當有白者。紅者紫者。粉紅者。杏黃者。半紅者。半紫者。半白者。鹽醋可愛。故曰麗春。又曰賽牡丹。曰錦破花。詳見游默齋花譜。李時珍。性寒。多食利二便。動勝脫氣。寇宗爽。

罌粟米。卽罌粟子之處方用名。詳罌粟子條。

罌粟泡。卽鴉片之古籍別名。典見和漢藥考。詳鴉片條。

罌粟花。性質功用與鴉片同。參見鴉片條。

罌粟津液。卽鴉片之古籍別名。

典見和漢藥考。詳鴉片條。

【罌粟脂】卽鴉片之古籍別名。典見和漢藥考。詳鴉片條。

【罌粟殼】原名 罌子殼。處方用名 御米殼。古醫別名 米殼。粟殼。米囊。芥子殼。罌殼。爲粟殼。和漢藥考。外國學說 Papaveris Capsulae. (Capsulae).

基本 屬罌粟科。爲罌粟之果殼。產地 陳仁山藥物生產辨云。罌粟殼原產印度。後流入雲南。至今各省無不有之。其汁卽鴉片烟也。

形態 罌粟殼爲壺狀。謂果之皮殼。生者其色綠。乾則變灰綠。或茶褐。外面有突出之縱紋十條至十五條。內亦相同。入藥多用果皮。已傷阿片已盡之餘。微間取成熟之萌果。除去種子。用之新鮮者有麻痺性之臭氣。其味苦。

採取 入藥須採其未熟者。曬乾。已熟者亦或取之。

製法 李時珍曰。凡用以水洗。潤。去蒂及筋膜。取外薄皮。陰乾。細

切。以米醋拌炒。入藥。亦有蜜炒。蜜炙者。

性質 酸。澆。微寒。無毒。成分 與阿片含相同之成分。但不多耳。

效能 斂肺。瀉腸。固精。止痛。用作祛痰鎮痙。故有鎮痛鎮咳止瀉之作用。但此爲劇藥。病初者忌服。

主治 主止瀉痢。回脫肛。治遺精。久咳。斂肺。瀉腸。止心腹筋骨諸痛。

歷代記述攷證 【明】李士材本草圖解論罌粟殼曰。粟殼酸澆。收斂。其性緊急。非久瀉久嗽者。不可輕投也。世當聞而畏之。概不肯用。不知久痢滑脫者。非此不效。因噤而廢食。良覺弗爲也。水洗潤。去蒂及筋膜。取薄皮。醋炒。黃黃富

補本草求真論罌粟殼曰。御米殼酸澆微寒。功偏斂肺瀉腸固腎。凡久瀉久痢。脫肛。久嗽氣乏。並心腹筋骨諸痛者。最宜。若嗽痢初起。寒熱未淨。用此以爲收瀉。致令邪留不解。則他人如劍。可不慎歟。洗去帶膜。或醋炒。蜜炒。取用。得烏梅陳

一八八五

用稻稈灰煎汁灌入。即死而出也。

(李時珍)

【糯稻類】即穀類。參詳「糯穀芒」條。

【糯稻露】基本 本品爲鮮糯稻葉上之露水。

性質 甘平。

主治 養胃和脾。

參攷資料 俞佳士妙應方治

瘡塊。八月白露後。收糯稻頭上露水。晚作二服。飲下立消。按諸草木

皆需天露始潤。惟稻至酉時。其根

上津潤之氣漸升。入夜乃達葉尖。

至曉復自上而降於根。故無露之

夜。稻葉獨潤。陳翠虛詞。一些珠露

阿誰運上稻花頭是也。(趙恕軒)

【糯稻稈】即稻稈。參詳「糯稻稈」條。

【糯穀芒】原名 穀類。性質 辛甘。熱。無毒。

主治 黃病。爲末酒服。又解蟲

毒。煎汁飲。

【罌子桐】命名 本品實狀似罌子。故名。

古籍別名 虎子桐。(拾遺) 荏

桐。(衍義) 油桐。(綱目)

外國名詞 Aleurites cord-

ata, Muell. Arg. (拉丁) ア

ラギリ(日本)

基本 係大戟科罌子桐屬。爲

罌子桐之子油。

產地 出暖地之山野間。園林

中亦有之。

形態 罌子桐爲落葉喬木類。

桐屬之一種。幹高二丈。雌雄異株。

雌樹之葉似橄欖。雄樹之葉有二尖

及四五尖。五月開淡紅色花。而聚

梢頭。結實如球。內有種子三四粒。

取子榨油。可作漆飾之用。並可供



罌子桐

採取 以篋貯。曬起。如鼓面者

良。性質 甘。微辛。寒。有大毒。

主治 摩疥癬蟲瘡毒腫。毒鼠

至死。歷代記述攷證 【宋】大明諸

家本草論罌子桐油曰。傳惡瘡及

宜水腫。發鼠咬處。能辟鼠。【明】李

時珍本草綱目論罌子桐油曰。塗

瘡。瘡。湯火傷。瘡。吐風痰喉痺。及一

切諸疾。以水和油。搗入喉中。探吐

或以子研末。吹入喉中。取吐。又點

燈燒銅箸頭。烙風熱爛眼。亦妙。

參攷資料 罌子桐油。誤食吐

人得酒即解。(李時珍)

【罌子粟】即罌粟子之原名。詳「

罌粟子」條。

【罌子殼】即罌粟殼之原名。詳「

罌粟殼」條。

【罌粟子】原名 罌子粟。命名 本品實狀如

罌子。其米如粟。乃象乎穀。而可以

供仰。故有諸名。

處方用名 御米。罌粟米。

古籍別名 米囊子。御米。(開

寶) 象穀。(綱目) 白米。羊古米。陽

古米。(和漢藥考)

外國名詞 Scaevola Papav-

eria (拉丁)

基本 屬罌粟科。爲罌粟之種

子。形態 罌粟子爲黃白色或藍

黑色之小種子。其形似腎臟。外皮

有薄網之皺紋。其一面廣闊。胎芽

彎曲作馬蹄形。味甘似油。



罌粟子

製法 生搗或炒。

性質 甘平。無毒。

成分 含脂肪油四十八至五

十。嗎啡〇・〇六。

效能 治反胃。療瀉痢。用治下

痢及瘰癧藥。

主治 丹石發動。不下飲食。和

竹瀝養粥食極美。

歷代記述攷證 【宋】蘇頌嘉

祐園經本草論罌粟子曰。行風氣

逐邪熱。治反胃。胸中痰滯。【明】李

時珍本草綱目論罌粟子曰。治瀉

痢潤燥。【明】經希雍本草經疏論

罌粟子曰。罌粟其花至有千葉者。

紅白紫黑色。有數種。一罌內子凡

數千萬粒。細如葶藶子而色白。本

經味甘平。無毒。蘇頌性寒甘寒。除

熱解毒。下氣和中之故。主丹石發動

不下食。及圖經行風氣逐邪熱止

良方)

①治女人白淫。糯米、花椒等分炒為末。醋糊丸。梧子大。每服三四十丸。食前醋湯下。(楊超簡便方)

⑤治胎動不安。下黃水。用糯米一合。黃芪、芍藥各五錢。水一升煎八合分服。(產寶方)

⑥治小兒頭瘡。糯米飯燒灰。入輕粉清油調傅。(普濟方)

⑦治癰蛇丹毒。糯米粉和鹽嚼塗之。(濟急方)

⑧治打撲傷損諸瘡。寒食日浸糯米。逐日易水。至小滿取出。日乾為末。用水調塗之。(便民圖纂方)

⑨治金瘡癰腫及竹木簪刺等毒。用糯米三升。於端午前四十九日。以冷水浸之一日兩換。水輕淘。轉勿令攪碎。至端午日取出。陰乾。絹袋盛。掛通風處。每月旋取炒黑為末。冷水調如膏藥。隨瘡大小。裹定瘡口。外以布包定。勿動。直候瘡

瘡若金瘡。犯生水作膿腫。甚者急裹一二食久。即不作膿腫也。若瘡疽初發。纔解癰腫。急貼之一夜便消。(靈苑方)

②治喉痺吐膿。用前膏貼項下及腫處。一夜便消。乾即換之。當令溼為妙。

③治竹木簪刺。用煎膏貼之一夜刺出在藥內也。

④治顏犬咬傷。用糯米一合。斑蝥七枚。同炒。蝥黃去之。再入七枚。再炒黃去之。又入七枚。待米出烟。去蝥為末。油調傅之。小便利下佳。(醫方大成方)

⑤荒年代糧。糯米一斗。淘汰。百蒸百曝。搗末。日食一發。以水調之。服至三十日止。可一年不食。(肘後方)

⑥治虛勞不足。糯米入豬肚內。煮乾。搗作丸。子日服之。

⑦治腰痛虛寒。糯米二升。炒熟。袋盛。拴鼻痛處。內以八角茴香研酒服。(談藝叢試驗方)

施用宜忌 凡有溼熱痰火者禁用。

參攷資料 ①糯米性溫。釀酒則熱。熬餿尤甚。故脾肺虛寒者宜之。若素有痰熱風病及脾病不能輸轉食之最能發病成積。孟詵蘇頌或言其性涼性寒者。謬說也。別

錄已謂其溫中。堅大便。令人多熱。是性豈寒涼者乎。今人冷洩者。炒食即止。老人小便數者。作藥糕或

丸。子夜食亦止。其溫肺暖脾可驗矣。痘證用之。亦取此義。(李時珍)

②糯米性寒。作酒則熱。糟乃溫平。亦如大豆與鼓醬之性不同也。(蘇頌)

③涼發風動氣。使人多睡。不可多食。(孟詵)

④久食令人身軟。緩人筋也。小豬犬食之。亦脚屈不能行。馬食之足重。妊婦雜肉食之。令子不利。(陳藏器)

⑤久食發心悸及癰疽瘡癤中痛。合酒食之。醉難醒。(陳士良)

⑥糯米性黏滯。難化。小兒病人最宜忌之。(李時珍)

【糯米泔水】

性實 甘涼。無毒。主治 益氣。止煩渴。霍亂。解毒。食鴨肉不消者。頓飲一盞。即消。

【糯米粥】

性實 甘溫。無毒。主治 益氣。治脾胃虛寒。洩痢。吐逆。小兒痘瘡。白色。性實 辛甘。熱。無毒。主治 齒黃。燒取白灰。擦之。

【糯米】即秬之古籍別名。典見唐

本草。詳「秬」條。

【糯麥】即大麥之有黏性者。典見綱目。詳「大麥」條。

【糯粟】即秬之古籍別名。典見唐本草。詳「秬」條。

【糯稻花】

性實 甘涼。無毒。主治 揩牙固齒。烏鬚。陰乾用。

【糯稻稈】

原名 稻稈。性實 辛甘。熱。無毒。主治 黃病如金色。煮汁浸之。仍以穀芒炒黃為末。酒服。

歷代記述攷證 【唐】蘇頌新修本草論糯稻稈曰。燒灰治墜撲傷損。【明】李時珍本草綱目論糯

稻稈曰。燒灰浸水飲。止消渴。淋汁浸腸痔。按糯稻難饑。饑足去寒溼氣。

參攷資料 ①稻稈灰方。出劉禹錫傳信方。云湖南李從事。馬損傷。用稻稈燒灰。以新熟酒連糟入鹽拌和。淋取汁。淋痛處。立瘳也。

(蘇頌) ②稻稈煮汁。作紙。嫩心取以為韃。皆大為民利。其紙不可貼瘡。能令爛肉。按江湖紀聞云。有人壁虱入耳。頭痛不可忍。百藥不效。

基本 係禾本科稻屬。為糯稻之子實。

產地 各省皆有出。

形態 糯稻為栽於水田中之一年生草本。莖高三四尺。中空有節。葉細長而尖。有平行脈。互生。秋月莖梢開花。呈穗狀。花小。有內殼外殼。六雄蕊。一雌蕊。果實為穎果。其殼顯較黑。性亦較黏。米粒等供食用。亦可充藥物。

採取 十月間刈收之。

製法 收得曬乾。磨去殼。杵去糠用。

性質 苦。溫。無毒。

效能 補肺。健脾。專作滋養強壯藥。

主治 作飯。溫中。令人多熱。大便堅。

歷代記述攷證 【唐】陳士良

食性本草論糯米曰。能行營衛中

血積。解亮青斑。蠶毒。【唐】孫思邈

千金翼論糯米曰。益氣止泄。【唐】

蕭炳四聲本草論糯米曰。以駱駝

脂作煎餅食。主痔疾。【唐】陳藏器

本草拾遺論糯米曰。作糜一斗食

主消渴。【宋】大明諸家本草論糯

米曰。補中益氣。止霍亂後吐逆。不

止。以一合研水服。【明】李時珍本

草綱目論糯米曰。暖脾胃。止虛寒

洩痢。縮小便。收自汗。發痘瘡。【明】

繆希雍本草經疏論糯米曰。稻米

即今之糯米也。其味應甘。氣應溫

無毒。造酒必用之者。以其性近於

熱也。為補脾胃。益肺氣之穀。脾胃

得補。則中自溫。大便亦堅實。溫能

養氣。氣充則身自多熱。大抵脾肺

虛寒者宜之。為其能益氣溫中也。

故又有止泄利。縮小便。收自汗。發

痘瘡等用。【清】黃宮繡本草求真

論糯米曰。稻米味甘性平。據按諸

書。有言性溫。性寒。性涼之不同。然

究此屬陰物。陰即寒聚。故性黏滯

而不爽也。是以服之。使人多睡。身

軟無力。四肢不收。發風昏昏。且使

小貓食之。亦脚屈不能行。馬食之

足重難移。妊婦雜肉食之。令子不

利。使果性溫而熱。則食自有溫和

通活之妙。何至陰凝膩滯如此哉。

如謂釀酒則熱。熬糖尤甚。且發癰

疽瘡。何謂不溫。詎知性如大豆。

生亦性溫。何以作鼓。則涼可知。稻

非性溫。因於造釀而溫始有。至書

有云。食之補中益氣。及止虛寒泄

瀉。並縮小便。收自汗。發痘瘡。皆是

性黏不利。留滯在中。土壅不下之

故。非如生者性主溫補。仍兼通活

而無如此陰滯之甚也。謂之緩中

則可。謂之溫中而熱。豈其可乎。謂

之中虛宜服則可。謂之虛寒宜服

亦鳥見其可乎。凡老人小兒久病

均忌。【清】王士雄隨息居飲食譜

論糯米曰。糯米甘溫。補肺氣。充胃

津。助痘漿。煖水臟。釀酒熬餡。造作

餅餌。若煮粥飯。不可頻餐。以性大

黏滯難化也。小兒病人尤當忌之。

凍米（冬月所製）性不黏滯。止瀉

補脾。炒米香燥助火。多食傷津。

配合應用 ①治霍亂煩渴不

止。用糯米三合。水五升。蜜一合。研

汁分服。或煮汁服。亦治消渴飲水

（楊氏產乳方）

②治三消渴病。梅花湯。用糯穀

炒出白花。桑根白皮等分。每用一

兩。水二碗。煎汁飲之。（三因方）

③治下痢禁口。糯穀一升。炒出

白花去殼。用薑汁拌溼。再炒為末。

每服一匙。湯下。三服即止。（經驗

良方）

④治久洩食減。糯米一升。水浸

一宿。漚乾。慢炒熟。磨細。入懷慶山

藥一兩。每日清晨用牛膽入砂糖

二匙。胡椒末少許。以極滾湯調食。

其味極佳。大有滋補。久服令人精

暖。有子秘方也。（松靈經驗方）

⑤治鼻癢不止。服藥不應。獨聖

散。用糯米微炒黃為末。每服二錢。

以新汲水調下。仍吹少許入鼻中。

（簡要濟眾方）

⑥治勞心吐血。糯米半兩。蓮子

心七枚。為末。酒服。孫仲愷云。曾用

多效。或以墨汁作丸服之。（潛察

方）

⑦治自汗不止。糯米小麥麩同

炒為末。每服三錢。米飲下。或煮粥

肉點食。

⑧治小便白濁。白糯米。治入夜

小便頻停。白濁。老人虛人多此證。

令人卒死。大能耗人精液。主頭昏

重。用糯米五升。炒赤。黑白芷一兩

為末。糯粉糊丸。梧子大。每服五十

丸。水浸頭煎湯下。無此用局方補

腎湯下。若後生稟賦怯弱。房室太

過。小便太多。水管寒澀。小便如膏

脂。入石菖蒲牡蠣粉其效。（經驗

肉。歌云。黑大豆甘。腰子樣式。所以補腎藥餌宜入。卽是馬料。煮寒炒。

熱。調中下氣。止痢。攣急。利水除脹。
追風活血。生研敷腫。吞止煩渴。解。

一切毒。甘草煎汁。傷中淋露。產後

諸疾明目悅顏。製服有益。又云。穆豆卽小黑豆。因其粒細。稱驢豆。別馬料也。治產後血風冷痛。其粒細。

不及馬料。歌云。穠豆黑。小甘逐。邪風冷痺血滯。浸酒和融。（藥性考）

⑤ 稽豆補五臟益中助十二經脈。
調中煖腸胃殺鬼氣舒筋。(儒門
事親)

命名。本品即稽豆。

主治 解肌熱。止盜汗。

【薺豆葉】 辟麝香草搗傳之。
原名 稻米。

糯米。糯者糯也。本品

古籍別名 稌。(綱目)元米。占

米 (飲食譜)

var. glutinosa, Mats (荳卜)
毛ネコノ(日本)

一八八

科。 獼 猴

〔李時珍〕●爐甘石種類頗多。日本以名泡樣者爲上。質軟。呈白色。其形如浮石。謂之羊腦爐甘。名茶碗樣者爲次。品質軟堅。白色微紅。作扁平狀。謂之片子爐甘。名石樣者亦次。品質尤堅。呈青白色。形狀不定。藥用大抵選質軟白色者。帶他色者不佳。〔和漢藥考〕

〔爐先生〕即爐甘石之古籍別名。典見土宿本草。詳「爐甘石」條。

〔爐底〕即蜜陀僧之古籍別名。典見綱目。詳「蜜陀僧」條。

〔爐眼石〕即爐甘石之古籍別名。典見和漢藥考。詳「爐甘石」條。

〔鑪牛〕即鑪牛之古籍別名。典見綱目。詳「鑪牛」條。

〔筆雞〕即檮雞之訛。詳「檮雞」條。

〔獼猴〕古醫別名。沐猴。〔史記〕爲猿。〔說文〕胡孫。〔格古論〕王孫。〔柳文〕馬留。〔倦游錄〕狙。綱目。摩斯訛。〔梵書〕外國名詞。Macaus Monkey 或 Macaque (拉丁)サル或ヤ

エル(日本) 基本 係脊椎動物哺乳類有胎盤類。猿長類。猿類。狢鼻類。獼猴。

〔獼猴皮〕 主治 疥馬疫。

產地 出川廣之深山林野間。形態 獼猴爲獸類。猴屬之一種。頭稍圓。吻略突。眼並列向前。耳殼邊殆圓。面部裸出色赤。頸有頰腺。齒列門白大三種。毛色背灰黑或黃。腹部漸淡。臂有臂疣。前肢比後肢爲長。肢形如人手。尾短。體長二三尺。性馴良。可畜其肉可供藥用。



猴 獼

性質 酸。平。無毒。

主治 諸風勞。瘰癧爛佳。作脯食。治久瘧。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論獼猴肉曰。食之辟瘴疫。

〔獼猴手〕 主治 小兒驚癇口禁。

【獼猴屎】

主治 小兒疳風。最口急驚風。〔燒末和生蜜少許灌之。〕

命名 本品形如梨。色如桃。而獼猴喜食。故名。

【獼猴桃】

古籍別名 獼猴梨。藤梨。〔開寶〕陽桃。〔日用〕木子。〔綱目〕外國名詞 Actinidia arguta, PI (拉丁)サルナシ シラクチヅル ヤバナシ ユクワ (日本)

基本 係獼猴桃科獼猴桃屬。爲獼猴桃之果實。其藤及葉。藤中汁詳見各該條。

產地 生山野間。



桃 猴 獼

形態 獼猴桃爲灌木類之落葉蔓生木。木幹大。大者圍尺餘。葉橢圓形。或心臟形。葉端尖。緣邊有刺狀鋸齒。質硬。有光澤。而互生。五六月間。葉腋出花。花五瓣。爲聚

〔獼猴頭骨〕 主治 瘰癧作湯浴。小兒驚癇。

繖花序。色綠白。葯帶黑色。其樹皮可製紙及繩。與繫筏之用。結實圓形如球。爲漿果。可供食與藥用。

性質 酸。甘。寒。無毒。

主治 止瀉。解煩熱。墮丹石下淋石熱瘰。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論獼猴桃曰。調中下氣。主骨節風。癰緩不遂。長年白髮。野雞內痔病。

參攷資料 ●獼猴桃。鹹。酸。無毒。多食冷脾胃。動洩瀉。〔陳藏器〕

●獼猴桃有實熟者。宜食之。太過則令人臍寒作泄。〔張景岳〕

〔獼猴桃藤及葉〕 主治 殺狗療癰疥。

性質 甘。滑。寒。無毒。

主治 反胃。和生薑汁服之。又下石淋。

【獼猴桃藤汁】

〔獼猴梨〕即獼猴桃之古籍別名。典見開寶本草。詳「獼猴桃」條。

〔獼猴頭骨〕 主治 瘰癧作湯浴。小兒驚癇。

鬼魅。寒熱。

并能限止其繁殖。

主治 止血消腫毒。生肌。明目。去翳。退赤。收溼除爛。同龍腦點治目中一切諸病。

歷代記述攷證 【明】繆希雍

本草經疏論爐甘石曰。爐甘石味應甘辛。氣溫無毒。其性帶澀。經曰營氣不從逆於肉裏。乃生癰腫。甘溫能通暢血脈。則腫痛散。血自止。肌肉生也。又目得血而能視。風熱上壅。則目爲赤爛。腎虧甘入脾而益血。辛溫能散風熱。性澀則能黏物。故點目翳及治目中一切病也。

【清】黃宮繡本草求真論爐甘石

曰。爐甘石係金銀之苗。產於金銀坑中。狀如羊腦。凝似石脂。能點赤銅爲黃。甘辛而澀。氣溫無毒。其性專入陽明胃。蓋五味惟甘爲補。惟溫爲暢。是能通和血脈。故脾毒得此則消。而血自能充。止肌亦自能克生也。辛溫能散風熱。性澀能黏睛膜。故凡目翳得此。即能撥雲也。有用此治下疳陰瘡。並齒疎陷物者。亦此義耳。李時珍常用甘石煨飛海螵蛸。礪砂等分爲細末。硃砂依分減半。同入點諸目病皆妙。煨

用童便良。

配合應用 ①治目暴赤腫。爐甘石火煨尿淬。風化消等分爲末。新水化一粟點之。〔御藥院方〕

②治諸般翳膜。爐甘石。青礬。朴硝等分爲末。每用一牛。沸湯化開。溫洗日三次。〔宣明方〕

③治一切目疾。真爐甘石。牛斤。用黃連四兩。剉豆大銀石器內水。二盞。煮二伏時。去黃連爲末。入片臘二錢。半。研勻。罐收。每點少許。頻用取效。又方。爐甘石煨一錢。盆消一錢。爲末。用熱湯泡洗。

④治目中諸病。石連光明散。治眼中五輪入廊。諸證神效。爐甘石半斤。取如羊腦鴨頭色者。以桑柴灰一斗。火煨赤。研末。用雅州黃連各四兩。切片。煎水浸石。澄取粉。曬乾。用盆粉二定。以二連水浸過炒之。雄黃研末。每用甘石盆粉各三分。雄黃一分。片臘半。研勻點眼。甚妙。〔張氏方〕

⑤治目暗昏花。爐甘石火煨童尿淬七次。代赭石火煨醋淬七次。黃丹水飛各四兩。爲末。白沙蜜半斤。以銅鐺鍊去白沫。更添清水五

六盞。熬沸下藥。文武火熬至一盞。滴水不散。以夾紙濾入瓷器收之。類點目用。〔衛生易簡方〕

⑥治爛弦風眼。風眼流淚。爛弦白爐甘石四兩。火煨童尿淬七次。放地上出毒三日。細研。每用椒湯洗目。後隨臥點三四次。次早以茶湯洗去甚妙。又方。爐甘石一斤。火煨黃連四兩。煎水淬七次。爲末。入片臘。每用點目。〔劉長春方〕

用爐甘石。石膏各一錢。海螵蛸三分。爲末。入片臘。磨香各少許。收點。〔宣明眼科方〕

⑦用爐甘石二兩。以黃連一兩。煎水。入童尿半盞。再熬下。朴消一兩。又熬成。以火煨石淬七次。洗淨。爲末。入蜜陀附木一兩。研勻收點之。〔衛生易簡方〕

⑧治聾耳出汗。爐甘石。礬石各二錢。胭脂半錢。磨香少許。爲末。繳淨吹之。〔普濟方〕

⑨治齒疎陷物。爐甘石。煨寒水石等分。爲末。每用少許擦牙。忌用刷牙。久久自密。〔便玄方〕

⑩治漏瘡不合。童尿製爐甘石。牡蠣粉外塞之。內服滋補藥。〔雜病治例方〕

⑪治下疳陰瘡。爐甘石火煨醋淬五次。一兩。孩兒茶三錢。爲末。麻油調傳立愈。〔通妙邵真人方〕

⑫治陰汗淫痒。爐甘石一分。真蚌粉半。分。研粉撲之。〔直指方〕

用量 八分至錢半。

卷攷資料 ①爐甘石陽明經藥也。受金銀之氣。故治目病爲要。藥李時珍常用爐甘石煨淬。海漂蛤礪砂各一兩。爲細末。以點諸目。病甚妙。入朱砂五錢。則性不黏也。〔李時珍〕

②爐甘石所在坑治處。皆有川蜀湘東最多。而太原澤州陽城。高平。靈丘。融縣。及雲南者。爲勝。金銀之苗也。其塊大小不一。狀似羊腦。凝如石脂。亦黏舌。產於金坑者。其色微黃。爲上。產於銀坑者。其色白。或帶青。或帶綠。或粉紅。赤銅得之。即變爲黃。今之黃銅。皆此物點化也。造化指南云。爐甘石受黃金白銀之氣。薰陶三十年。方能結成。以大穰浸。及桃煮過。皆可點化。不減三黃。崔昉外丹本草云。用銅一斤。爐甘石一斤。鍊之。即成。鎔石一斤。半。非石中物取出乎。眞鎔石生波斯。如黃金。燒水赤而不黑。

根四兩。酒一盞。煎七分。空心溫服。
(麗仙乾坤生意方)

①治婦人崩中及下痢。日夜數十起欲死者。以此入腹即活。懸鉤根。薺薇根。柿根。菰各一斛。剉入釜中。水淹上四五寸。煮減三之一。去滓取汁。煎至可丸。梧子大。每溫酒服十丸。日三服。(千金翼方)

【懸鉤葉】 喉中塞。 主治 燒研水服。療

【懸菱】 即瓜菱之別名。詳『瓜菱仁』條。

【懸鉤】 即蜈蚣之古籍別名。典見古今注。詳『蜈蚣』條。

【櫛子】 古籍別名。櫛櫛。血櫛。鐵櫛。(綱目) 櫛櫛。(日本)

外國名詞 *Quercus glauca*, *Thunb.* (拉丁) カシ (日本)

基本 係殼斗科櫛屬。為櫛之子仁。其葉。木皮詳見各該條。

產地 生暖地山野間。
形態 櫛為常綠喬木類之一種。種類不一。高三四丈。葉廣披針

形。或長橢圓形。端尖。邊緣或有鋸齒。春夏開花。花為穗狀花序。雌雄同株。結實為堅果。有櫛狀殼斗。大如菩提子。霜後殼裂實出。實中仁如杏仁。木材堅實難腐。可製器具。其子仁可供藥用。



(一) 子 櫛



(二) 子 櫛

性質 苦。澀。平。無毒。

主治 食之不飢。令人健行。止

洩痢。破惡血。止渴。

參攷資料 櫛子酸甘微寒。不可多食。(正要)

【櫛木皮】 主治 煮汁飲。止產

【櫛木葉】 主治 煮汁飲。止產

歷代記述攷證

【明】吳瑞日

用本草論櫛木葉曰。嫩葉貼臍。瘡一日三換良。

【經皮】 即土骨皮之古籍別名。典見和漢藥考。詳『土骨皮』條。

【櫛】 ①即梧桐之古籍別名。典見綱目。詳『梧桐』條。②即木槿之古籍別名。典見爾雅。詳『木槿』條。

【櫛子】 即櫛實之古籍別名。典見羣芳譜。詳『櫛實』條。

古籍別名 兜婁婆香。

產地 生山野間。

形態 櫛香為香木類之一種。幹高丈許。葉長。色青。有鉅齒之缺刻。似小蘗葉而氣香。對生。其根狀如枸杞根而大。煨燒之亦有香氣。可供藥用。

性質 苦。澀。平。無毒。

主治 頭痛腫毒。碾末麻脂調塗。七日腐落。

【爐山石】 即爐甘石之古籍別名。典見和漢藥考。詳『爐甘石』條。

【爐甘石】 命名 本品為爐火所重。其味甘。故名。

處方用名 製甘石。

古籍別名 爐先生。(土宿本

草) 爐眼石。爐山生。(和漢藥考)

外國名詞 *Calamina* (拉丁) *Smithsonite* or *Calamine* (英) *Galmei* (德)

基本 係金屬鋅礦類。為白色或藍色之半透明。或不透明之固體礦石。

產地 陳仁山藥物生產辨云。爐甘石產廣西柳州容縣長安壩等和漢藥考曰。日本產於岐阜縣吉城郡等處之硫化鋅礦及銅礦脈中。

形態 爐甘石為白色長方形。或六面形。或成雞冠形。或如葡萄狀。恒團結成球。多作玻璃狀。或真珠狀。有光之殼子形。鐘乳形。塊形。物。又有作褐色。青色而稍透明者。

製法 李時珍曰。凡使爐甘石。以炭火煨紅。童子小便淬七次。洗淨研粉。水飛過曬用。

性質 甘。溫。無毒。

成分 為炭酸鋅。中含有鐵。鈣。鎂及銅少許。

效能 散風熱。燥溼。治一切目疾。專作眼科藥。

作用 能驅局部之葡萄球菌。

採取 二三月採。陰乾用之。若俱是大穢干藥者。名洋茶。不入藥。單瓣者。亦不入藥。

性質 甘。澆。微辛。瀉寒。無毒。

主治 消癰腫。跌撲。斷久痢。腸風下血。崩帶。血淋。鼻衄。吐血。外敷灸瘡。均焙研七染。空心酒服。

配合應用 ①治赤痢。用大紅寶珠山茶花。陰乾。爲末。加白糖。拌勻。飯鍋上蒸三四次服。(救生苦海方)

②治鼻中出血。千葉大紅山茶花。二三月採。陰乾。用時取五六朵煎服。卽止。(何明遠方)又鼻衄。用寶珠山茶大紅者。焙研三五錢。砂糖滾水和服。(張氏必效方)

③治吐血咳嗽。寶珠山茶。瓦焙。黑色。調紅砂糖。日服。不拘多少。又方。寶珠山茶十染。紅花五錢。白芨。兩。紅棗四兩。水煎。一盤服之。渣再服。紅棗不拘時。亦取食之。(不藥良方)又山茶花。吐血。衄血。腸風下血之良將。(藥儀藥鏡拾遺賦)又曾見有人患乳頭開花。欲墜。疼痛異常。有教以用寶珠山茶。焙研爲末。用麻油調搽。立愈。痔瘡。

出血。(朱春暉方)又用寶珠山茶研末。沖服。(汪子明方)

參攷資料 ①寶珠山茶。涼血。破血。止血。瀉痢也。(百草鏡)②寶珠山茶。可代鬱金。研末。麻油調塗。湯火灼傷。(羣芳譜)

③寶珠山茶。即山茶花之處方用名。詳「山茶花」條。

④寶鼎香。即薑黃之古籍別名。典見綱目。詳「薑黃」條。

⑤寶劍草。即鳳尾金星之別名。詳「鳳尾金星」條。

⑥寶蔻。即草豆蔻之古籍別名。典見和漢藥考。詳「草豆蔻」條。

⑦懸刀。即皂莢之古籍別名。典見綱目。詳「皂莢」條。

⑧懸石。即絡石之古籍別名。典見別錄。詳「絡石」條。

⑨懸針。即蛸蚪之古籍別名。典見古今注。詳「蛸蚪」條。

⑩懸鉤。即蠶廬之別名。詳「蠶廬」條。

古籍別名 沿鉤子。(日用)箭子。山莓子。(爾雅)木莓子。(郭璞)樹莓子。(日華)

外國名詞 Rabus palmetu of Thunb. (拉丁)キイチナサガリイチノ(日本)

基本 係薔薇科。爲懸鉤屬之子實。

產地 凡山野林澤間。恒有出形。懸鉤爲落葉灌木。恒野生於山野。高四五尺。莖及葉皆有刺。葉作掌狀分裂。裂片自三至五。如有缺刻狀之鋸齒。葉柄長而互生。初夏葉腋開花。花冠五瓣。色白。其大與棠棣花之花冠相近。似子實爲肉果。呈紅色。由多數之小核果合成。可供藥用。



子 鉤 懸

又爲解毒藥。
主治 醒酒止渴。除痰。去酒毒。歷代記述攷證【明】李時珍本草綱目論懸鉤子曰。搗汁服。解射工沙蟲毒。

用量 三錢至四錢。

參攷資料 ①生江淮林澤間。莖上有刺。其子如梅子。酸美。人多食之。(陳藏器)②樹莓枝梗柔軟。有刺。頗類金櫻。四五月結實。如覆盆子。採之。擊蒂而中。實味酸。覆盆則蒂脫而中虛。味甘爲異。(汪機)

③懸鉤樹生。高四五尺。其莖白色。有倒刺。其葉有細齒。青色。無毛。背後淡青。頗似櫻桃葉。而狹長。又似地棠花葉。四月開小白花。結實。色紅。今人亦通呼爲藤子。爾雅云。箭山莓也。郭璞注云。今之木莓也。實似蘆葍而大可食。孟詵大明並以此爲覆盆。誤矣。(李時珍)

【懸鉤根皮】 性平。無毒。

主治 子死腹中不下。破血。婦人赤帶。久患赤白痢。膿血腹痛。經蟲毒。卒下血。並濃煮汁飲之。

配合應用 ①血崩不止。木莓。

採取 四五月採實。
製法 凡採得陰乾。或日乾。
性質 酸。平。無毒。
效能 醒酒解毒。用作祛痰藥。

主治 折傷。斷骨。燒灰。每服二錢。酒下。在上食後。在下食前。骨即接如初。

參攷資料 鷹鷂鷂骨。皆能接骨。蓋鷂鳥之力在骨。故以骨治骨。從其類也。(李時珍)

【鵝屎】 主治 諸鳥獸骨哽。燒灰酒服。

【鷄雞】 即鷄之古籍別名。典見陸機詩疏。見『鷄』條。

【鵲】 命名 鵲字古文作鳥。而其鳴聲暗暗。故名。

古籍別名 飛駁馬(陶弘景) 喜鵲(食療) 乾鵲(新語)


外國名詞 Pica Pica Sericea Goud Magpie Elister (拉丁)

カササギ或テウセンガラ(日本)

基本 係脊椎動物鳥類鳴禽類鳥科之鵲。

形態 鵲爲林食類之一種。其形如烏嘴尖。尾長。羽色黑褐。而有青紫色之光澤。肩頸腹及胸與冠毛之後皆白色。尾闊則黑白相間。尾長六七寸。與身相等。嘴根有剛毛。蔽於鼻孔。至秋則毛毯頭禿。飛

鳴聲如鴉而低。其肉可供藥用。



鵲

採取 以雄鵲者入藥用。

性質 甘。寒。無毒。

主治 石淋。消結熱。可燒作灰。以石投中。解散者是雄。

歷代記述攷證 【宋】蘇頌圖經本草論鵲肉曰。治消渴疾。去風。

及大小腸澀。并四肢煩熱。胸膈痰結。婦人不可食。【明】李時珍本草綱目論鵲肉曰。冬至埋鵲於園前。辟時疾溫氣。

參攷資料 凡鳥之雌雄雌別者。其翼左覆右者乃雄。右覆左者乃雌。又燒毛作屑。納水中。沉者是雌。浮者是雄。今云投石。恐止是鵲。

餘鳥未必爾。(李時珍)

【鵲不踏】即樛木之古籍別名。典見綱目詳『樛木』條。

【鵲巢】 採取 以多年者良。

主治 燒之。水服。療癩。狂。鬼魅。及蟲毒。仍呼崇物名。號亦傳瘴瘡良。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論鵲巢曰。燒研服。治積年漏下。不斷。困篤者。一月取效。並小便不禁。

【鵲腦】 採取 五月五日採之。

主治 入媚藥。

【鷄白】 即鳥柏之古籍別名。典見綱目詳『鳥柏木』條。

【鷄麻】 即亞麻之古籍別名。典見圖經本草詳『亞麻』條。

【鷄男】 即鳥柏之古籍別名。典見和漢藥考。詳『鳥柏木』條。

外國名詞 Colubrex

【鶉】 Communis Bonn. Common quail or Quail Weachtal

(拉丁) ウツラ或ウズフ(日本)

基本 係脊椎動物鳥類鶉雞類雷鳥科之鶉。

產地 多養殖於黑龍江等地之原野間。

形態 鶉爲原食類之一種。形似雞而頭嘴皆小。軀幹肥滿。尾短。

全體茶褐色。背濃褐色。翼黃褐色。黑斑。腹色赤白。秋從北來。春向北去。夜則羣飛。羣伏草叢。至秋鳴聲。悽愴。性馴。可以養養。其肉可供食與藥用。

性質 甘。平。無毒。

主治 補五臟。益中。續氣。實筋骨。耐寒暑。消結熱。和小豆生薑。食止洩痢。酥煎食。令人下焦肥。

歷代記述攷證 【宋】寇宗奭本草衍義論鶉肉曰。小兒患疳。及下痢五色。且旦食之有效。

參攷資料 四月以前未堪食。不可合諸肝食。令人生黑子。合菌子食。令人發痔。(掌禹錫) 按

董柄集驗方云。魏秀才妻。病腹大如鼓。四肢骨立。不能貼席。惟衣被懸臥。穀食不下者數日矣。忽思鶉食。如法進之。遂運劇。少頃兩汗莫能言。但有更衣狀。扶而圓。小便突

出。白液凝如鷄脂。如此數次。下盡。遂起。此蓋中焦濕熱積久所致也。詳本草。鶉解熱結。療小兒疳。亦理固然也。董氏所說如此。時珍謹按

鶉乃蛙化。氣性相同。蛙與蝦蟆皆解熱治疳。利水消腫。則鶉之消鼓

蟻蟻乾。紙封縫瘻肝之。男左女右。繫臂上勿令知之。(楊氏家藏方)

●折傷接骨大蝦蟇生研如泥。劈竹裹縛其骨自痊。(奚囊備急方)

●治大腸痔疾。蟾蜍一箇。以磚砌四方。安於內。泥住火煨存性。爲末。以豬廣腸一截。扎定兩頭。煮熟切碎。蘸蟾末食之。如此三四次。其痔自落。

●用量 錢半至二錢。
●施用宜忌 凡無蟲積熱毒者禁用。

●參攷資料 ●別錄云。治獼犬傷。肘後亦有方法。按洗約宋書云。張收爲獼犬所傷。人云。噉蝦蟇。食之遂愈。此亦治癰疽疔腫之意。大抵是物能攻毒拔毒。古今諸方所用蝦蟇不甚分別。多是蟾蜍。讀者當審用之。不可因名迷實也。(李時珍) ●此是腹大皮上多疣。磊者。其皮汁甚有毒。大嚙之。口皆腫。五五。日。取東行者五枚。反縛着密室中。閉之。明旦視自解者。取爲術用。能使人縛亦自解。齋病曰。腹下有丹書八字。以足畫地者。眞

蟾蜍也。(陶弘景) ●今處處有之。別錄謂蝦蟇一名蟾蜍。以爲一物。非也。按爾雅。鼃。蟾蜍也。郭璞云。似蝦蟇居陸地。則非一物。明矣。蟾蜍多在人家下。溼處。形大。背上多

疣。磊行極遲緩。不能跳躍。亦不解鳴。蝦蟇多在陂澤間。形小。皮上多黑斑點。能跳接百蟲。舉動極急。二物雖一類。而功用小別。亦當分而

用之。蟾蜍屎謂之上板。樹下溼處。往往有之。亦能主疾。寇宗奭曰。世傳三足者爲蟾。人遂爲三足枯蟾。以罔衆。但以水沃半日。其僞自見。

蓋無三足者也。(蘇頌) ●蟾蜍銳頭。蟾腹。促眉。濁聲。上形有大如盤。自然論云。蟾蜍吐生鄭。蟾自其口出也。抱朴子云。蟾蜍千歲。頭上有

角。腹下丹書。名曰肉芝。能食山精。人得食之。可仙。術家取用。以起霧。祈雨。辟兵。解縛。今有技者。聚蟾爲戲。能聽指使。物性有靈。於此可推。許氏說文謂三足者爲蟾。而寇氏非之。似是。但龜鼈皆有三足。則蟾之三足。非怪也。若謂入藥必用三足。則謬矣。响。蟾神書載蟾寶之法。用大蟾一枚。以長尺鐵釘四箇。釘

脚四下。以炭火自早炙至午。去火。放水一盞於前。當吐物如皂莢子。大有金光。人吞之。可越江湖也。愚謂縱有此術。誰敢吞之。方技誣說。未足深信。漫記於此。以備祛疑耳。(李時珍)

【蟾蜍皮】 至治 貼大毒。能拔毒收毒。

配合應用 ●治腸頭推出。用蟾皮一片。燒焦并傳(千金方) ●指頭紅腫生毒。用活蟾一隻。生剝皮。將皮外面向患處包好。明日其毒一齊拔出。或發背對口等症。毒忽收內。如又起。再貼。切記不可將其皮裏面着肉。即咬牢。雖揭。凡痘疹後回毒。亦可用此治。(黃汝良行藥驗秘方)

●瘰癧欬口膏藥。治療瘰。膿已盡。腫已平。瘡口未斂。以此貼之。用蝦蟇皮二個。要活剝者。鼠皮二張。蛇退二條。蜂房大者一個。上四味俱煨灰。將水膠一兩。用井花水一

酒。鍾化開後。加蜜一兩。蜈蚣煎麻油一小鍾。攪勻。前四味灰。臨起入麝香一分。將稍攪來。不溼爲度。 ●凡患癰疽瘡毒者。用土中大

蝦蟇一個。剝全身爛皮。蓋貼瘡口。於蟻皮上用針將皮刺數孔。以出毒氣。自覺安靜。且能爬住瘡口。不令長大。又可免蜈蚣聞氣來侵。神妙。靈祕丹云)

【蟾蜍皮】 即蟾蜍之處方用名。詳『蟾蜍』條。

【蟾蜍舌】 至治 拔疔瘡。研爛。傅瘡上。以蟾肚皮蓋貼。根自出。

【蟾蜍屎】 古籍別名 土檳榔。(嘉祐圖經本草)

產地 卑溼處多有之。
主治 療惡瘡。
【蟾蜍蘭】 即天名精之古籍別名。典見別錄。詳『天名精』條。
【蟾蜍葇】 即稀莪草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『稀莪草』條。
【蟾蜍寶】 即蟾蜍之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蟾蜍』條。
【蟾蜍】 即蟲蠶之細而長者。性質功用參詳『蟲蠶』條。
【蠶蟲】 即乳蟲之古籍別名。典見廣雅。詳『乳蟲』條。
【蠅狐】 即蠅虎之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『蠅虎』條。

也。袖珍云。治瘋犬傷。即用蝦蟆後足搗爛。水調服之。昌克按。李中梓亦於蝦蟆條說。獾犬之效。又沈約宋書載。張收（或作牧）爲獾犬所傷。人云宜噉蝦蟆膽。食之遂愈。實一奇方也。野呂玄亦有蝦蟆膽之說。又有療毒蛇咬。急取蝦蟆蟾搗爛。敷上以帛繫之之法。如諸書所載。蝦蟆蓋卽類蝦蟆也。鄒樵通志云。蝦蟆類多。以蟾蜍爲上。昌克頃游久慈郡。訪慈雲寺。語次道及犬毒之事。上人語我曰。郡中遇其患者。乃作蛙膽食之。遂無至危篤者。因知此物善治毒。不必有蝦蟆蟾蜍之分也。上人又曰。噉蝦蟆後。其頭上有發物如癩。蚬蚬狀者。亦一奇也。經月餘便脫去。

配合應用 治腹中冷癖。水穀陰結。心下停痰。兩脇痞滿。按之鳴轉。逆害飲食。大蟾蜍一枚。去皮腸支解之。芒硝強入一升。中人七合。弱人五合。水七升。煮四升。頓服得下爲度（肘後方）

治小兒疳積。腹大黃瘦。骨立頭生瘡。結如麥穗。用立秋後大蝦蟆。去首足腸。以清油塗之。陰陽瓦

炙熱食之。積穢自下。連服五六枚。一月之後。形容改變。妙不可言。

治五疳八痢。面黃肌瘦。好食泥土。不思乳食。用大乾蟾蜍一枚。燒存性。皂角去皮弦一錢。燒存性。蛤粉水飛三錢。麝香一錢。爲末。糊丸。粟米大。每空心米飲下三四十九日。二服。名五疳保童丸（全嬰方）

治小兒疳泄下痢。用蝦蟆燒存性。研飲服方寸匕（子母祕錄方）

治走馬牙疳。侵蝕口鼻。乾蚬。蝦黃泥裹固。煨過。黃連各二錢。牛青黛一錢。爲末。入麝香少許。和研傳之（鄭氏小兒方）

金鞭散。治疳瘡。膿穿牙落。以抱還雞子軟白皮。包活土狗一箇。放入大蝦蟆口內。草縛。泥固。煨過。取出。研末。貼之。以愈爲度（普濟方）

治小兒口瘡。五月五日。蝦蟆炙研末。傳之。卽瘥（子母祕錄方）

治一切疳瘡。無問去處。皆能治之。蝦蟆燒灰。醋和傳。一日三五度（梅師方）

治陰蝕欲盡。蝦蟆灰。兔屎等分。爲末。傳之（肘後方）

治月蝕耳瘡。五月五日。蝦蟆燒末。豬膏和傳（外臺祕要方）

治小兒瘡。五月五日。取蟾蜍炙研末。傳之。卽瘥（子母祕錄方）

治小兒臍瘡。出汁。久不瘥。蝦蟆燒末。傳之。日三甚驗。一加牡蠣等分（外臺祕要方）

治一切溼瘡。蟾蜍燒灰。豬脂和傳（千金方）

治小兒癰瘡。蟾蜍燒灰。豬脂和傳（外臺祕要方）

治癩風蟲瘡。乾蝦蟆一兩。炙爲末。以竹管引入羊腸內。繫定。以鉄鋪額內。置藥鉄上。蒸熟。入麝香半錢。去鉄。同搗爲丸。如梧子大。每溫酒服二十一丸（直指方）

治附骨壞瘡。久不瘥。膿汁不已。或骨從瘡孔中出。用大蝦蟆一箇。亂頭髮一雞子大。豬油四兩。煎枯去滓。待凝。如膏。先以桑根皮烏頭煎湯洗拭。乾。蝦龍骨末。搽四邊。以前膏貼之（錦囊祕覽方）

治發背腫毒未成者。用活蟬一箇。繫放瘡上。半日。蟬必昏。置水中。以救其命。再易一箇。如前法。其蟬必跟。再易一箇。其蟬如舊。則毒散矣。累驗極效。若勢重者。以活蟬一箇。或二三箇。破開。連肚乘熱合瘡上。不久必臭。不可開。再易二三次。卽愈。慎勿以物微見輕也（醫林集要方）

治腫毒初起。用大蝦蟆一箇。剝碎。同炒石灰。研如泥。傳之。類易（余居士方）

治破傷風病。用蟬二兩。半切。剝如泥。入花椒一兩。同酒炒熟。再入酒二盞。半。溫熱服之。少頃通身汗出。神效。

治獾犬咬傷。每七日一發。生食蝦蟆膽。絕良。亦可燒炙食之。勿令本人知之。自後再不發也（肘後方）

治瘋犬傷。卽用蝦蟆後足搗爛。水調服之。先於頂心拔去血髮三兩根。則小便內見沫也（袖珍方）

治發背腫毒未成者。用活蟬一箇。繫放瘡上。半日。蟬必昏。置水中。以救其命。再易一箇。如前法。其蟬必跟。再易一箇。其蟬如舊。則毒散矣。累驗極效。若勢重者。以活蟬一箇。或二三箇。破開。連肚乘熱合瘡上。不久必臭。不可開。再易二三次。卽愈。慎勿以物微見輕也（醫林集要方）

治腫毒初起。用大蝦蟆一箇。剝碎。同炒石灰。研如泥。傳之。類易（余居士方）

治破傷風病。用蟬二兩。半切。剝如泥。入花椒一兩。同酒炒熟。再入酒二盞。半。溫熱服之。少頃通身汗出。神效。

治獾犬咬傷。每七日一發。生食蝦蟆膽。絕良。亦可燒炙食之。勿令本人知之。自後再不發也（肘後方）

治瘋犬傷。卽用蝦蟆後足搗爛。水調服之。先於頂心拔去血髮三兩根。則小便內見沫也（袖珍方）

治腸頭挺出。蟾蜍皮一片。瓶內燒烟燻之。并傳之（孫真人方）

佩襪瘡疾。五月五日。收大蝦

無使血球溶崩之作用。又動物對此毒質。不能享受免疫性。其毒力遠不若黃芩託扣希與地瑪林。此毒質三分之一約當黃芩託扣希與地瑪林四分之一。而其有效量與中毒量之相差。又較他種強心藥爲甚。即如黃芩託扣希之製劑。雖奏強心之效。然常有蓄積作用。而此則無之。試投加瑪因。其心臟作用。尤爲迅速。以其易於吸收故也。若夫局部之腫痛作用。必多用始然。設僅用治療之量。則決無誘起腫痛之弊害。說見衛生試驗彙報第十五號。

辨偽 鄧省巖曰。蟾蜍生江湖池澤間。其肩間白汁謂之蟾酥。以油單紙裏眉裂之。酥出紙上陰乾。或以蒜及胡椒等辣物納口中。則蟾身白汁出。以竹筴刮下。麵和成塊乾之。聞有一種假酥。係麵粉及別藥偽造。萬不可用。曹炳章曰。按鮑叔真醫方約說云。蟾酥乃治諸毒之要藥也。製合得宜。傳服皆可用。蛤蚧皮即蟾皮也。大能收毒外貼。不可缺也。嘉興縣志云。宮中用蟾蜍銚。於每年端午日修

合。各坊車蝦蟆至醫院者。億萬計。往時取用後。率斃。蓋兩目俱廢。不能跳躍也。東山朱公典院事。命止刺其一偏。得麝者甚多。此事似微。然發念甚真。爲德不淺。王文謨碎金方。取蟾酥法。先將牙皂角三兩。煎水三沸。旋候冷。用大口甕或缸盛水。將蝦蟆不拘多少。入中以稀物覆之。勿令跳出。過一宿。其酥即浮水面。若未浮。其酥即在身上。可用竹刀刮下。用之本草明辨云。端午日以大蛤壳未離帶者。合於蝦蟆眉上腫處。用力一捻。則酥出壳內。貯於油紙候乾。江南出者爲杜酥。要無麵塊神色。起亮光者。佳。無錫出者。中有竹節痕。浙江杭州出者。爲片子酥。粉質少者亦佳。山東出者。爲東酥。色黃黑。味麻辣。不上二層之貨。蓋酥本無定色。但驗其粉之輕重。以爲衡。如看成色。以水一碗。將酥化開。放入水。如烏見水即變色。水面有泡沫者。真。僞者見水不動。而粉質漸露矣。

配合應用 爛疔根。用蟾酥同鐵鑊桑礪磨香。牛黃。冰片。以金鐵入疔根。抹入前藥。其疔根即

爛出。

② 治疔丸。用蟾酥、硃砂、冰片、牛黃、明礬、白礬、礪磨香、黃蠟溶化。作丸。麻子大。用葱頭白酒吞下。取汗。不過二三小丸。

③ 拔取疔黃。用蟾酥以麵丸。梧子大。每用一丸。安舌下。即黃出也。(青囊雜纂方)

④ 拔取疔毒。蟾酥以白麵黃丹搜作劑。每丸粟粒大。挑破納入。仍以水澄膏貼之。(危氏方)

⑤ 治一切瘡毒。蟾酥一錢。白麵二錢。硃砂少許。井水調成小錠子。如麥大。每用一錠。葱湯服。汗出即愈。如瘡勢緊急。用三四錠。(保命集方)

⑥ 凡癰疽發背。無名腫毒。初起者。急取蟾酥三五分。廣膠一塊。米醋一二碗。入鍋內火化開。用筆蘸乘熱。令人不住手。周圍潤之。以散爲度。(萬氏家抄方)

⑦ 治疔瘡惡腫。蟾酥一錢。巴豆四箇。搗爛。飯丸錠子。如綠豆大。每服一丸。薑湯下。良久。以薑薤根、黃荊子。研酒半碗。服。取行四五次。以粥補之。(乾坤祕蘊方)

⑧ 治諸瘡腫硬。針頭散。用蟾酥、麝香各一錢。研勻。以乳汁調和。入罐中待乾。每用少許。津調傳之外。以膏護住。毒氣自出。不能爲害也。(保命集方)

⑨ 治喉痺乳蛾等證。用蠟蝦蟆眉酥。和草烏尖末。猪牙皂角末等分。丸小豆大。每研一丸。點患處。神效。(活人心統方)

⑩ 治一切齒痛。疳蝕齲齒。癰腫用蚊蚋一枚。鞭其頭背。以竹筴刮眉間。即有汗出。取少許點之。即止也。(類編方)

⑪ 治風濕牙痛。不可忍。用蟾酥一片。水浸軟。入麝香少許。研勻。以粟米大。綿裹咬定。吐涎愈。一方用胡椒代麝香。一方用蟾酥染絲綿上。剪一分。紙入齒縫根裏。忌熱物。半日效。乾者以熱湯化開。(聖惠方)

⑫ 治破傷風病。蟾酥二錢。湯化爲糊。乾蝦酒炒。天麻各半兩。爲末。合搗丸。綠豆大。每服一丸。至二丸。豆淋酒下。(聖惠方)

用蠟二釐至五釐。

施用宜忌 凡非實症者。禁用。

外國名詞 Tordax (英)

基本 爲蟾蜍分泌之白色乳

狀毒液。

產地 陳仁山藥物生產辨云。

蟾蜍以產河北省北平東便之豐
閩玉田兩縣者爲最好。亦多出山
東產者次之。六七月收成。和漢藥
考曰中國之江蘇四川皆其主產
地。

形態 蟾酥爲蟾蜍分泌之毒
汁。與麵粉泥和之煉合物。其形狀
不。惟外面稍覺滑澤。現黑褐色。
其破碎片之尖端。透映而作褐色。
味辛烈。其粉末如入眼內及鼻中。
卽發腫痛。水能次第溶解。市上出
售者多作扁圓形。大九分許。中心
凹陷。有一小孔。此蓋串以麻線。令
得風乾也。亦有爲半圓形。徑一寸。
高六七分。中亦穿孔。又或扁平。展
延若板片者。製造處及品質俱各
不同。故其形狀亦異。就中以番木
甯子形者爲最佳。

採取 六月七月採治之。其法
有三焉。●刺蟾蜍之肩間。使分
泌白汁。●以蟾蜍入水缸中。覆以
有孔之蓋。孔中插細竹枝。以刺戟

蟾蜍。使其痛苦。蟾蜍遂憤怒不勝。
自皮膚分泌多量之毒液。乃從而
收集之。●以蟾蜍置中央四面架
鏡。使起受困之惑。因分泌多數毒
液。以保護己之身體。吾人卽利其
所有。與麵粉混合煉製。前人不知
爲外皮分泌之液汁。每誤以爲油。
故有蝦蟆油之稱。

製法 寇宗奭曰。凡使蟾酥。須
眉間白汁。謂之蟾酥。以油單紙裹
眉裂之。酥出紙上。陰乾。用李時珍
曰。取蟾酥不一。或以手捏肩稜。取
白汁。於油紙上。及桑葉上。插背陰
處一宿。卽自乾白。安置竹筒內。盛
之。眞者輕浮。入口味甜也。或以蒜
及胡椒等辣物。納口中。則蟾身白
汁出。以竹篦刮下。麵和成塊。乾之。
其汁不可入人目。令人赤腫盲。或
以紫草汁洗點卽消。

性質 甘辛溫。有毒。
成分 爲開梅因。但有毒。

效能 散風火癰毒。治發背疔
腫。有強心之效。爲清涼性興奮藥。
又外用消散疔癰腫毒藥。
主治 小兒疳疾。腦疳。
歷代記述攷證 【宋】蘇頌嘉

祐國經本草論蟾酥曰。主聾牙。及
小兒疳瘕。【宋】日華諸家本草論
蟾酥曰。酥同半酥。或吳茱萸苗汁。
調摩眼。陰囊。治腰腎冷。并助陽
氣。又療蟲牙。【宋】寇宗奭本草衍
義論蟾酥曰。治齒縫出血。及牙疼。
以紙紙少許。按之立止。【明】李時
珍本草綱目論蟾酥曰。發背疔瘡。
一切惡腫。【清】黃宮繡本草求真

論蟾酥曰。蟾酥味辛。氣溫。有毒。能
拔一切風火熱毒之邪。使之外出。
蓋邪氣着人肌肉。鬱而不解。則或
見爲疔腫發背。陰瘡。陰蝕。疽癰。惡
瘡。故必用此辛溫以治。蓋辛主散。
溫主行。使邪盡從汗出。不留內入。
而熱自可以除矣。性有毒。止可外
治取效。卽或用丸劑。亦止二三四
厘而已。多則能使毒入。其用作丸
投服。亦宜雜他藥內入。如牛黃明
礬。乳香沒藥之類。毋單服也。故書

載拔諸毒。只宜用酥一錢。白麵二
錢。硃砂少許。作錠。諒病輕重。酌與
不可盡服。又治背發無名等毒。取
酥三五分。廣膠水化。米醋入。鋪火
化。乘熱手刷不已。以散爲度。刻玉
塗之。等於刺蝟。房術用之。更善。總

皆外科革命之功。輕用爛人肌肉。
至若蟾蜍。氣味辛寒。凡癰瘡。積塊。
風犬咬傷。小兒疳積。痘疫發斑。瘡
疽發背。用之與酥略同。以其辛有
發散之能。寒有逐熱之功。外服固
見神功。內服除去頭足腸腹痞。亦
能去積除熱。如風狗咬傷。用蟾蜍
後足。搗汁生食。先於患人頂心。拔
去血髮三四莖。於小便內見沫。其
毒卽解。發背初腫。用活蟾數個。更
易繫於腫上。則其毒亦散矣。總皆
具有外拔內攻之力。勿輕用也。蟾
酥以油單紙裹。眉裂之。酥出紙上。
陰乾。用蟾蜍焙乾。去皮爪。酒浸去
肉用。

國外學說 日本藥學博士石
津利作及上遠野與作兩氏。同將
蟾蜍皮膚之分泌物。以化學研究
之。遂名其毒分曰加瑪茵。並舉其
生理作用如下。加瑪茵者爲日本
內地產蟾蜍皮膚分泌物中之一
種成分。其作用極似賀美答利斯。
有使心臟作用強盛之效。用此藥
後。脈搏減少。脈之容積加大。血液
上昇。尿量增加。若其作用再稍加
劇。卽誘起心臟收縮性之休止。然

一對變形爲蟹。橫行甚速。

採取

八九月採捕之。

製法 李時珍曰。凡蟹生烹鹽藏。糟收酒浸。醬汁浸。皆爲佳品。但久留易沙。見燈亦沙。得椒易腫。得皂莢或蒜及韶粉可免沙腫。得白芷則黃不散。得葱及五味子同煮則色不變。

性質

鹹寒。有小毒。

效能 散血。結瀉。諸熱。其殼用作疥癬漆瘡藥。

主治

胸中邪氣熱結痛。喝僻面腫。能敗漆。燒之致鼠(本經)解結散血。愈漆瘡。養筋益氣(別錄)

歷代記述攷證

【唐】孟詵食療本草論蟹曰。散諸熱。治胃氣。理經脈。消食。以醋食之。利肢節。去五

臟中煩悶氣。益人。【唐】陳藏器本草拾遺論蟹曰。能續斷絕筋骨。去殼同黃搗爛。微炒。納入瘡中。筋即連也。【宋】日華諸家本草論蟹曰。產前肚痛。血不下者。以酒食之。筋骨折傷者。生搗炒。置之。【宋】寇宗奭本草衍義論蟹曰。小兒解顛不合。以整同白及末搗塗。以合爲度。

【明】李時珍本草綱目論蟹曰。殺

黃蒼毒。解鱈魚毒。漆毒。治癰。及黃疸。搗膏塗疥瘡。癰。搗汁滴耳。聾。

【明】繆希雍本草經疏論蟹曰。蟹味鹹氣寒。本經雖云有毒。然今人多食之。卒無害。其有毒者。大抵形質怪異。入足陽明足厥陰經。經曰熱淫於內。治以鹹寒。故主胸中邪氣熱結痛也。喝僻者。厥陰風熱也。面腫者。陽明熱壅也。解二經之熱。則筋得養而氣自益。喝僻面腫俱除矣。鹹走血而軟堅。故能解結散血。漆得蟹則化爲水。燒之可集鼠於庭。此物性之相感相制。莫能究其義也。愈漆瘡者。以其能解漆毒故也。爪性迅利。故能破胞墮胎也。

【清】黃宮繡本草求真論蟹曰。螃蟹最屬陰寒。故書所述利弊。大令人駭。如蟹與柿同食。則令人泄瀉。及發癰瘰。與孕婦食。則能使胎即下。而爪尤甚。以蟹燒烟。則能集鼠於庭。同銀絲燒烟。則能使臭蟲即斃。蟹近於漆。則化漆而爲水。筋骨損斷。用蟹搗爛。微炒。納入瘡中。則能使筋即連。他如胸中熱積。喝僻面腫。及蓄血發黃。婦人乳癰硬腫。小兒顛解。凡因熱結熱滯而成者。

無不用之立效。其化血爲水。逐熱消瘀。未有若是其神者矣。總原性屬鹹寒。外骨內肉。生青熟赤。陽包陰寒。陰氣純佈。故克其迅利耳。若血因寒滯。及腹中疼痛。喜熱而惡寒者。其切忌焉。蟹宜入蒜頭。則不沙。敵中蟹毒者。宜搗藕節熱酒調服。【清】張隱菴本草崇原論蟹曰。今外科多用蟹殼。搗細篩末。爲鐵鎚收毒散。大抵蟹殼爲攻毒散風。消積。行瘀之用。學者以意會之可也。【清】王士雄隱居飲食譜論蟹曰。蟹甘鹹寒。補骨。利肢節。續絕復。滋肝陰。充胃液。養筋活血。治疽愈癰。瘰癧。打骨折。筋斷。諸傷。解鱈魚。黃蒼。漆毒。殺主。辟邪。破血。爪可催產墮胎。種類甚繁。名號不一。以吳江烏程。秀水。嘉興。海昌等處河中。所產。霜後大。而脂滿者。勝和以薑醋。風味絕倫。多食發風。積冷。孕婦及中氣虛寒。時感未清。痰嗽便濁者。均忌。別種更寒。尤不益人。中其毒者。紫蘇。冬瓜。蘆根。蒜汁皆可解之。反荊芥。又忌同柿食。誤犯則腹痛吐利。急以丁香。木香解之。海產者。黃堅滿。而無膏。不鮮。並

可鹽漬酒浸。糟醬久藏。得皂莢則不沙。

配合應用

●治濕熱黃疸。以蟹燒存性研末。酒糊丸。如梧桐子大。每服五十丸。白湯下。日服二次。(集簡方)

●治骨節離脫。生蟹搗爛。以熱酒傾入。連飲數碗。其渣塗之。半日內。骨內谷谷有聲。即好。乾蟹燒灰。酒服亦好。【唐】唐經驗方

●治中鰕魚毒。食蟹即解。(董炳驗方)

●千金神造湯。治子死腹中。并雙胎一死一生。服之令死者出生者安。神驗方也。用蟹爪一升。甘草二尺。東流水一斗。以葦薪煮至二升。濾去滓。入真阿膠三兩。令烊。頓服。或分二服。若人困不能服者。灌入即活。

●下胎蟹爪散。治妊婦有病欲去胎。用蟹爪二合。桂心。瞿麥各一兩。牛膝二兩。爲末。空心溫酒服一錢。千金方

●治崩中腹痛。毛蟹殼燒存性。米飲服一錢。(證治要訣方)

●治蜂螫螫傷。蟹殼燒存性研

須用此藥。只塗半圈。即移過一邊。用白芨、白蘇、三七、五倍子、大皂角、山茨菰、藤黃各等分。俱剉薄片。除藤黃餘皆入砂鍋內水浸一日。煎汁傾出。入水再煎。如此數次。濾淨。熬膏。以藤黃將水蒸干。加入攪勻。再熬。入碗曬乾。用時以雞蛋清磨出濃汁。新筆蘸塗。又方。藤黃、銀硃等分。醋和敷。敷毒至他處出膿。如用殺樹汁調。可搽。一二次。即消。

（移毒方）

①大提藥方。圍毒初起。凡對口發背惡疽。四五日即消。雄黃、藤黃、麝香各一錢。硃砂三分。草麻肉三錢。紅昇丹一錢五分。先將草麻研如泥。後和各藥研爛。用象牙匣封藏。外以虎皮包之。方不泄氣。（良方彙選方）治諸毒不起。敷之立起。藤黃、雄黃各三錢。蟾酥、紅藥各二錢。冰片、麝香各一錢。草麻肉一兩。先將草麻肉去皮。打如魚凍水。入諸藥。打成膏。磁罐收貯。勿令洩氣。或云宜紅藥三錢。冰片、蟾酥勿用。止加麝三分。辰砂一錢。（種福堂提藥方）又方。鬱金、雄黃、藤黃各二錢。牛黃、蟾酥、硃砂、冰片各五

分。巴豆肉八錢。草麻肉一兩。共搗爛。磁瓶貯。遇症放膏藥上。少許貼之。治一切惡毒。未成可消。已成用之化腐。疔毒更妙。（黃提藥方）

②諸毒圍藥。用南星炒四兩。五倍子炒黑。白芨炒各二兩。藤黃、黃炒各一兩。共為細末。醋調塗。重者加牛黃一錢。鹿茸五錢。（祝氏效方）又無膿即消。有膿即潰。五倍子一兩。白芷六錢。藤黃、百草霜各三錢。生半夏、生南星、白芨、陳小粉、飛麝各四錢。共為末。紅醋調敷。（種福堂方）

③摘毒。五倍子略焙一兩。藤黃四兩。銅青少許。小粉炒八兩。作錠。用時醋磨塗。（活人書方）

④治一切無名腫毒。藤黃五錢。五倍子二兩。白蜜、蔥頭各一兩。用米醋調團患處。留頂勿敷。

⑤五色蟾酥墨。能立消腫毒。雄黃、銀硃、膽礬、韶粉、藤黃、銅綠、硃砂各一兩。麝香一錢。共為末。蟾酥為條。如筆管大。水磨塗。

⑥治疔瘡。銀硃、蛇蛻、白甘菊、人中白、芋根內、白心、雄黃、藤黃、大黃。共搗敷上。即退。（楊氏便易方）

⑦治坐板瘡。藤黃搗碎。用雄豬網油。青布一長條。將藤黃膠在網油之上。青布捲成條子。用線紮緊。浸菜油內。一夜。火燃取滴下油。杯積埋土中。一夜。出火毒。瘡即效。（仙遺拾珠方）

⑧五黃散。治一切頑癬。雞脚大黃、硫黃、雄黃、薑黃、藤黃各等分。為細末。菜油調塗患處。七日勿洗浴。全愈。

⑨金氏離濁膏。治膿瘡如神。萬應油五兩。藤黃一兩。五錢淨黃蠟二兩。共熬黑。棧色。攤貼。熬萬應油法。香油六十兩。以十六兩官秤作

準。浸桃枝一兩。柳枝一兩。槐枝一兩。桑枝一兩。葱一兩。男髮四兩。花椒五錢。草麻二兩。馬前四兩。蕁麻五錢。桂枝一兩。白芷二兩。夏浸三日。冬七日。春秋五日。然後熬至渣枯。去渣。每筋生油熬熟。汁得八折。此油凡一切膏藥。可作地子。

參攷資料 ①按郭義恭廣志云。出岳鄂等州諸山。崖樹名海藤。花有蕊。散落石上。彼人收之。謂之沙黃。就樹採者。輕妙。謂之蠟黃。今人訛為銅黃。銅藤音譯也。此與石

漠採之無異。畫家及丹竈家時用之。（李珣）②今畫家所用藤黃。皆經煎煉成者。砥之麻人。按周達觀真臘記云。國有畫黃。乃樹脂。番人以刀斫樹枝。滴下。次年收之。似與郭氏說微不同。不知即一物否也。（李時珍）③藤黃性毒。而能攻毒。故治牙疳。吐蟲。齒點之。即落。毒能損骨。傷腎。可知。葉氏得宜本草云。服藤黃藥。忌吃烟。按三黃寶鑑丸。黎

峒丸。俱用藤黃。以其善解毒也。有中藤黃毒者。食海蜆即解。（張石頑）

④藤葵。即落葵之古籍別名。典見食鑑本草。詳「落葵」條。

⑤藤韶子。即韶子之古籍別名。典見綱目。詳「韶子」條。

⑥藥子。即海藥子之簡稱。詳「海藥子」條。

⑦藥王草。形態藥王草類。雜色。摘之有汁。可供藥用。性質甘平。無毒。

主治 解一切毒。止鼻衄。吐血。祛煩躁。【藥本】即五靈脂之古籍別名。典

售。以此歐羅巴人不能多見。而加西尼亞等所產之藤黃可代暹羅與錫蘭所產者。咸豐五年時。法國博物院中存有印度買索爾所產之藤黃。亦屬甚佳。其質脆而易碎。長約六寸。徑約一寸。色橙黃。和水色亦黃。無臭。味頗辣。服後若干時。猶覺喉內痒而不適。又搗碎時。所成細粉。能惹鼻流涕。藤黃為重性。水瀉藥。驅蟲藥。如大便秘久不通。經閉。水腫等病。用此藥均能有益。然獨用則不及合於汞（二）綠等藥用之。且不宜過服。過服則使人嘔吐。肚疼。有大毒而危險。故在此項用途上最好避之。而代以他品。此其醫治外用之大概也。至用量則每服一釐七毫半至八釐七毫半。驅蟲。每服五釐二毫半至一分七釐半。過服使人嘔吐肚疼。故單服者少。又日本和漢藥考曰。藤黃係藤黃樹（Garcinia Hanburyi, Hoole, et）之膠質樹脂。大七仙米為圓柱形或彎曲狀之熔合塊。帶綠黃色。易破碎為暗枸橼黃色。扁平貝殼狀之不透明片。用本品一分加水二分研磨之。則成鮮黃

色之乳劑。其味如灼。再和以安母尼亞水一分。則變澄清液。初呈鮮赤色。最後變褐色。將此混和液中之安母尼亞中和時。則液失色。而析出黃色絮狀物。藥舖所售藤黃有二種。甲種日本呼辨天印。係將脂液入竹筒硬固者。其狀如蛇之蟠屈。謂之竹管黃。為上品。乙種日本呼為盤樣。作不正塊狀。外面有竹縷紋。破碎面之色不一。恐係煎熬數種脂液所成之混和物。謂之沙黃為下品。

近人學說 張山雷曰。瀕湖綱目謂藤黃點蛀牙自落。石頑謂性毒而能攻毒。點牙即落。毒能傷骨。傷骨可知。趙氏綱目拾遺謂三黃寶蠟丸。黎啊丸俱用藤黃。以其善解毒也。中藤黃毒者。食海蜇即解。趙氏又引本草鏡。謂藤黃出外洋及粵中。乃藤指也。形似筆管者良。大塊者不佳。又引粵志。廣中產黃藤。熬汁即藤黃。性最寒。以背魚膽和之。治眼疾。治癰疽。止血。化毒。欽金瘡。亦能殺蟲。治刀斧木石傷。及湯火傷。有治一切諸傷神效。方金不換。治跌打刀傷。方治外科一筆

消之毒散等方。皆佳。詳見趙氏本草。茲不具錄。壽頭案。藤黃雖曰有毒。然除寶蠟丸。黎啊丸外。本不入口。其能退消外癰癰腫。及止血定痛。欽金瘡。則粵志謂其性最寒者是矣。且本是藤之脂膏。養成性極黏膩。故能生肌止血。且藤本蔓延善入經絡。此又治跌打傷消癰腫之原理。究屬有毒。故又殺蟲能療癰疥。

配合應用 風氣膏。治一切無名腫毒。藤黃四兩。白蠟八兩。小磨麻油十二兩。先將油煎熟。將成珠入水不散。再加黃白攪勻。磁瓶收。面上仍以麻油養之。臨用攤貼。（不藥良方）

一筆消。用大黃二兩。藤黃一兩。明礬。蟾酥各五錢。麝香。乳香。沒藥各二錢。用蠟牛搗爛。作錠。遇小瘡。毒未出。搗頭。以此醋磨。新筆蘸藥。圈外愈。圈內愈。小瘡毒盡消而止。（祝氏效方）

治一切癰腫。雄黃。膽礬。礞砂。藤黃。銅綠。皮硝。草烏各一兩。麝香二錢。為細末。和蟾酥為條。如筆管大。金箔為衣。用時以醋磨濃。新筆蘸藥塗毒四圍。數次即愈。（祝氏一筆消方）

則用五元散。乃藜蘆赤小豆皂角白礬腦攀吐之。然則藜蘆乃救急之藥。不可不知而又不可不備者也。〔盧鵬飛〕藜蘆擦外皮立見紅熱其氣噴之令人噴嚏不休。內服則嘔吐大作。間有服後作瀉者其平脈甚速。服少許俟兩點鐘再服。可使脈數者轉爲遲緩。腦部肺肝各臟。積血多尙未發炎之先服此藥能免其成炎。亦可佐別法以散其積血。〔西藥略釋〕

〔藜蘆〕即藜蘆之古籍別名。典見和漢藥考。詳〔藜蘆〕條。

〔藤弘〕即胡麻之古籍別名。典見張揖廣雅。見〔胡麻〕條。

〔藤紙〕命名。本品係用藤製成之紙。故名。

採取 陳舊者良。

主治 內熱衄血。破傷出血。餘與楮紙同。

〔藤梨〕即獼猴桃之古籍別名。典見開寶本草。詳〔獼猴桃〕條。

〔藤菜〕即落葵之古籍別名。典見綱目。詳〔落葵〕條。

〔藤菜子〕即冬葵子之古籍別名。典見和漢藥考。詳〔冬葵子〕條。

【藤黃】命名 本品乃海藤樹之膠質脂液結成其色黃澤。故名藤黃。

古鑿別名 海藤。〔郭義恭廣志〕

外國名詞 Guttu (拉丁) Gamboge (英) Gaurimgute (德)

基本 係將屬金絲桃科藤黃樹 (Garcinia Morella, deav.) 之幹皮。於開花前鑽取其滲出之濃稠乳狀液曬乾之。結爲膠質華爾斯。用以入藥。

產地 陳仁山藥物生產辨云。藤黃西藥名千薄折。產暹羅、安南、暹羅等處。乃洋海藤樹脂結成色黃味辛。無臭。以暹羅出者爲上。八九月新。

形態 藤黃樹爲生於熱帶地方之喬木。高五六丈。枝分枝繁茂。作傘形。葉厚硬而對生。作尖卵圓形。花爲黃赤色。單性。四瓣。花後結橙狀漿果。其脂液所結成之藤黃作圓筒形或管狀。直徑六分至一寸五分許。時或作不正固塊。外面綠黃色。有縱紋。並被有黃色之粉

霜。質堅而脆。破碎而作貝殼狀。呈黃褐色。發類蠟之光澤。能溶於鹼液。伊打酒精則不能完全溶解。用水研和則成黃色乳劑。投火中則燃燒。本品無臭。氣。咀嚼之初粘稠無味。後漸辛。口中似乾燥。

採取 以形似筆管而色嫩純明者良。

製法 以水蒸化。濾去渣。盛磁器內。隔水煮之。水少時再添。煮乾。以三炷香爲度。以帛絮磁器口。埋土中七日。取出。如此七次曬乾。用。

性質 酸澀有毒。

成分 上品藤黃含有樹脂七十五%及可溶性膠質三十至二十五%。

效能 用作峻下劑。用於瘰癧及水腫等。

作用 在胃時能刺胃壁神經。使胃液分泌增加。至腸中則腸黏膜被而腸分泌增多。膽汁亦因



藤黃

激增加。腸之蠕動亦驟然迅速。可使積糞急下。若服量稍多。則起腸胃炎。甚至腸出血。嘔吐腹痛頭昏而死。

主治 蛇牙疳。點之便落。

歷代記述攷證 【清】趙學敏本草綱目拾遺論藤黃曰。治癰疽。止血化毒。欬金瘡。亦能殺蟲。治刀斧木石傷及湯火傷。竹木刺入肉。一切諸傷。

國外學說 英美學說謂藤黃西名千薄折。爲膠香類之質。原產安南、真臘、暹羅等國。係將洋海藤樹。斫其樹身。皮裂液流。接以竹筒。即凝結成條。原西國之得此物。曾有西人由中國帶至西國。至西國之用藤黃代真大黃膏。則不知始於何時。蓋自英國醫士遊歷西藏得此物。土人謂之大黃膏。尋常出售之藤黃有二種。一產暹羅。一產錫蘭。暹羅所產之藤黃。似錫蘭所產。原質與性情。亦復大略相同。其條成柱形。心或實或空不定。其所以成爲圓柱形者。殆因其液收於竹內。比凝結時取出。故成此形。至錫蘭所產之藤黃。在印度街市出

①治中風不省。牙關緊急者。藜一兩去苗頭濃煎。防風湯浴過。

焙乾切。炒微褐色為末。每服半錢。

小兒減半。溫水調灌。以吐風涎為效。未吐再服。(簡要濟衆方)

②治中風不語。喉中如曳鋸。口中涎沫。取藜蘆一分。天南星一個。去浮皮於臍上剗一坑。納入陳醋二椀。斗四面火逼黃色。研為末。生麵丸。小豆大。每服三丸。溫酒下之。甚效。(經驗方)

③治諸風頭痛。和州藜蘆一莖。日乾研末。入麝香少許。吹鼻。又方通頂散。藜蘆半兩。黃連三分。嗜鼻。(聖惡方)

④治久瘧痰多。不食。欲吐不吐。藜蘆研末半錢。溫薑水調下。探吐。(保命集方)

⑤治痰癰積痛。藜蘆。皂莢炙各一兩。巴豆二十五枚。熬黃研末。蜜丸。小豆大。每空心服一丸。未發時一丸。臨發時又服一丸。勿用飲食。(肘後方)

⑥治黃疸腫疾。藜蘆灰中炮為末。水服半錢。匕。小吐。不過數服效。

⑦治胸中結聚。如駭駭不去者。

巴豆半兩。去皮心。炒搗如泥。藜蘆炙研一兩。蜜和搗丸。麻子大。每服一二丸。取效。(肘後方)

⑧治身面黑瘡。用藜蘆灰五兩。水一大碗。淋汁。銅器重湯煮成黑膏。以針微刺破點之。不過三次效。(聖惠方)

⑨治鼻中息肉。藜蘆三分。雄黃一分。為末。蜜和點之。每日三上自消。勿點兩畔。(聖惠方)

⑩治牙齦蟲痛。藜蘆末內入乳中。勿吞汁。神效。(千金翼方)

⑪治白禿蟲瘡。藜蘆末豬脂調塗之。(肘後方)

⑫治頭生蟻虱。以藜蘆末搽之。(直指方)

⑬治頭風白屑痒甚。藜蘆末沐頭搽之。緊包二日夜。避風效。(本事方)

⑭治反花惡瘡。惡肉反出。如米。藜蘆末豬脂傅。每日三五上。(聖濟總錄方)

⑮治疥癬蟲瘡。藜蘆末生油和塗。

⑯治羊疽瘡痒。藜蘆二分。附子八分。為末。傅之。蟲自出也。(陶隱居方)

⑰治誤吞水蛭。藜蘆炒為末。水服一錢。必吐出。(德生堂方)

⑱用量 八分至錢半。

⑲施用宜忌 凡非氣壯邪實者。禁用。畏葱白。反細辛。芍藥。人參。沙參。紫參。丹參。苦參。惡大黃。黃連。為之使。

參攷資料 ①藜蘆服錢匕一字。則惡吐。人又用通頂。令人嘔。別本云。治噎逆甚效。(蘇頌) ②噎逆用吐藥。亦反胃用吐法。去痰積之義。吐藥不一。常山吐瘧痰。瓜蒂吐熱痰。烏附尖吐溼痰。萊菔子吐氣痰。藜蘆則吐風痰也。按張子和儒門事親云。一婦病風癰。自六七年得驚風後。每一二年一作。至五七年五七作。三十歲至四十歲則日作。或甚至一日十餘作。遂昏癡健忘。求死而已。值歲大飢。採百草食於野中。見草若葱狀。採歸熟熟飽食。至更忽覺心中不安。吐涎如膠。連日不止。約一二斗。汗出如洗。甚昏困。三日後遂輕健。病去食進。百脈皆和。以所食葱訪人。乃葱。葱苗也。即本草藜蘆是矣。圖經言能吐

風病。此亦偶得吐法耳。我朝荊和王妃劉氏。年七十。病中風。不省人事。牙關緊閉。羣醫束手。先考太醫吏目月池翁診視。藥不能入。自午至子。不獲已。打去一齒。濃煎藜蘆湯灌之。少頃噫氣一聲。遂吐痰而甦。調理而安。藥弗瞑眩。厥疾弗瘳。誠然。(李時珍) ③藜蘆生太山山谷。三月採根陰乾。(別錄) ④所在山谷皆有。葉似鬱金。秦艽。黃芩等根若龍膽。莖下多毛。夏生冬凋。八月採根。韓保昇 ⑤今陝西。山南。東西州郡皆有之。遼州。均州。解州者尤佳。三月生苗。葉似初出。機心。又似車前。莖似葱白。青紫色。高五六寸。上有黑皮。莖似櫻皮。有花。肉紅色。根似馬腸。根長四五寸許。黃白色。二月三月採根陰乾。此有二種。一種水藜蘆。莖葉大同。只是生在近水溪澗石上。根鬚百餘莖。不中藥用。今用者名葱白藜蘆。根鬚甚少。只是二三十莖。生高山者為佳。均州土俗亦呼為葱白藜蘆。范子計然云。出河東黃白者善。(蘇頌)

⑥真中風。痰涎壅盛。無汗表實。用三聖散。即防風藜蘆瓜蒂吐之。甚

熱痰。烏附尖則吐瀉痰。此則專吐風痰者也。況此氣善通頂。治喉痺及鼻中瘻肉。爲末吹效。然亦並非得已。即有中蠱等毒。及或老痰積塊。止可借其宣泄。切勿沾口。以自損其津液耳。取根去頭。

國外學說

日本學說謂漢藥用爲解熱清涼藥。其用量自〇・一至〇・二。猪子氏曰。藜蘆雖爲吐藥。然含「ウエラトリン」或類似之鹽基。其性極劇烈。故不適於吐瀉。亦非治療上必用之品。(中外醫事新報) 藜蘆根中之亞爾加魯乙度。依アークレーメル氏之定量云。用善良之根末五瓦。於浸出裝置之定量。可得成白色鱗屑。或細小柱之亞爾加魯乙度「エルザイン」及「ゲエラトロイゲン」一・三瓦至一・五瓦。(藥學雜誌第九十號) 和漢藥考曰。藜蘆產日本高山。近江之伊吹山下。野之光山尤多。故一名日光蘭。藜蘆有二種。一種爲黑藜蘆。即今所述者。一種爲白藜蘆(Albun, L.) 產歐洲及亞洲北部。亦供藥用。又有一種日本藜蘆。

十九畫 藜

者。係屬石南科。葉互生。作卵圓形。爲有毒植物。將此乾葉末少許吹入鼻孔。立發噴嚏。如用多量。雖至鼻孔出血。噴嚏仍不止。但飲冷水則立已。煎湯。則得淡褐色液。服之腹部突然膨脹。但經片時即愈。藜蘆或呼萬年青草。有以萬年青根充藜蘆根者。非英美學說謂白藜蘆產中國。歐羅巴南方等處。高約三尺至四尺。其根可爲藥品。根內含有霜。西醫所謂匪懈地丫者。即此物。用法取出。其霜甚毒。故醫士鮮用之。英國藥肆中常出售之白藜蘆。多從日耳曼國運來。藜蘆根如指大。色白。嗅之令人掩鼻。惟乾者無臭。味初嘗覺少甜。後最苦而辛。則掩其甜味。至其醫治作用。則爲平腦藥。平腦藥。又爲惹胃毒藥。研末服之。則吐瀉。前時用爲引水瀉藥。又用以治痛風。今用此以殺皮膚毛髮內之蟲。間用之爲取嚏藥。其用法。將此藥一二釐。合於小粉。或白芷粉。嗅之。其功用能去火除煩。與青藜蘆同。或代以配酒。亦可。其處方如白藜蘆酒方。用白藜蘆根八兩切碎。白葡萄酒二斤。浸七

天。濾渣爲度。每服十滴。每日服三次。合於鴉片酒少許服之。此爲吐藥。瀉藥。寧睡藥。間有痛風與風溼病用之。用量每一釐。須分四十服。又青藜蘆英美學說。謂亦產中國。及北亞美利加。加拿大等處。其言曰。此草所產之處。爲卑溼地。或溼草地。或河邊。高約三尺至六尺。形狀與白藜蘆同。惟白藜蘆則產於岡陵。此爲青藜蘆與白藜蘆之不同處。其根厚而軟。上半似有切斷形。下半厚而多白色小根。味苦而辛。嗅之令人噴嚏。可爲藥品。醫治作用。則食大服必嘔吐大作。間有服後作瀉。其平腦甚速。服少許。俟兩點鐘再服。可使脈弦數轉爲遲緩。如痛風。風溼。或腦氣筋疼。可用最小之服。又如心肌肉生厚。跳動。適當有力。服之可減緩略安。倘心房間有壞。則不宜服。又如心跳症。之或因飲濃咖啡。或因吸生熟煙。而致者。服之可止。又如腦部肺肝各臟。脂積血多。其未發炎之先。服之可以免其發炎。亦可佐別法以散其積血。既發炎則不宜服。又如跳血。宜用此藥以減少心力跳。

動。兼以外治法療治之。(其外治法。須按定患在何處。或用線細繫。或用拇指摘緊。或夾束以壓止之。若此則可以令血囊內之血易於凝結。而漸就見效。) 又如以此藥搽皮膚。則立見紅熱。嗅其霜能令人噴嚏不休。其功用能去火除煩。生津液。平脈。緩氣。治風脚。倘誤服此藥過多。可服鴉片。火酒等解之。處方如下。青藜蘆四分。細末。濃酒二十分。先用酒十五分。浸二天。間時搖動。裝淋筒。淋乾。加餘酒漂淋。用絞盤絞渣。過淋紙。再加酒仍足二十分爲度。如服至作瀉。或服至寸脈已緩。宜停止。勿服。至放血。或瀉劑。欲減輕其血脈急迫之患。此藥皆足以佐之。每服八釐。七毫半至三分半。青藜蘆酒方。用量則每服七釐至一分半。釐多服則昏暈無力。不可妄用。研末或配酒用。再者青藜蘆不可用爲吐藥。以其藥性過於猛烈。吐後必嘔。服不堪也。

配合應用 治諸風痰飲。藜蘆十分。鬱金一分爲末。每以一字溫藥水一盞。和服。探吐(經驗方)

十九畫 藜

產地 生田野間。

形態 藜爲菜類之一年生草。本高五六尺。葉質柔而形闊。緣邊有少數之缺刻與鋸齒。葉面有粉狀之小體。葉柄長。夏初梢頭攢簇細花無瓣。具黃綠色之小形萼。其葉可供藥用。



藜

採取 八九月間。和子採收之。

性質 甘平微毒。

主治 殺蟲。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論藜葉曰。煎湯洗蟲瘡。漱齒齲。搗爛塗諸蟲傷。去癰風。

參攷資料 鶴頂陰草也。搗汁

煮粉霜。燒灰淋汁。煎粉霜。伏礬石。結草砂。制硫。伏汞。及雌黃砒石。(李時珍)

【藜藟荻】即秦藜藟之古籍別名。典見山海經。詳「秦藜藟」條。

主治 燒灰和荻灰。蒿

【藜莖】 灰等分。水和蒸取汁煎。

膏。點洗贅黑子。蝕惡肉。

【藜蘆】 命名 黑色曰藜。其蘆有黑皮裹之故名。

古籍別名 山葱。葱母。(別錄) 葱炙。葱葉。豐蘆。吳普本草。葱蘆。鹿葱。(綱目) 山機。風草。烏藜。爰芑。朴草。藜蘿。棕欄草。朴烏伊。(和漢藥考)

外國別名 Veratrum nigrum, L. (拉丁)

基本 屬百合科藜蘆之地下莖。

產地 陳仁山藥物生產辨云。藜蘆出北亞美利加。我國江蘇省鎮江縣亦有出。

形態 藜蘆爲山地自生之多。年生毒草。春季自宿根叢生數葉。夏月抽生二三莖。高達二三尺。葉長。作細披針形。有平行脈。小葉互生。花爲大三四分之紫黑色。六瓣。花。作圓錐花序排列。根莖被有類似機毛之細毛。故一名棕欄草。其根爲肥短直行之地下莖。有許多鬚根。外部黃褐色。內部白色。無臭。有強烈辛辣味。若吸入此粉末。則發噴嚏甚烈。誤服少許。則立發嘔吐。

毒。混於飯中。蠅食之即死。故一名蠅毒。

製法 雷斅曰。凡採得去頭用。糯米泔汁煮之。從已至未。曬乾用。



藜蘆

採取 二三月間。採掘陰乾。

成分 含有攝魯文 (Jelvin), 梵拉篤洛伊仁 (Veratroidin), 梵拉篤拉魯濱 (Veratralbin), 塞凡仁 (Cevadin), 澱粉等。

效能 吐風痰。療中風癱瘓。殺諸蟲。治疥癬惡瘡。用作催吐藥。又作殺蟲藥。

主治 蟲毒咳逆。洩痢腸澀。頭痛。疥癬惡瘡。殺諸蟲。去死肌。(本經) 療噦逆喉痺不通。鼻中息肉。馬刀爛瘡。不入湯用。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論藜蘆曰。主上氣。去積年膿血。泄痢。(宋)蘇頌嘉祐圖經本草論藜蘆曰。吐上膈風涎。暗風癰

病。小兒緞胸痰疾。(宋)寇宗奭本草衍義論藜蘆曰。研末治馬痔瘡。

【明】繆希雍本草經疏論藜蘆曰。藜蘆味辛氣寒。別錄苦微寒。有毒。入手太陰足陽明經。本經主蠱毒。咳逆。及別錄療喉逆。喉痺不通。皆取其宣壅導滯之力。苦爲消劑。故能使邪氣痰熱。胸膈部分之病。悉皆吐出也。辛能散結。故主鼻中息肉。苦能泄熱殺蟲。故主洩痢腸澀。頭瘍疥癬。殺諸蟲毒也。瘡瘍皆滯熱所生。滯熱不去。則肌肉潰爛。苦寒能瀉滯熱。則馬刀惡瘡爛瘡。死肌皆愈也。味至苦。入口即吐。故不入湯。(清)黃宮繡本草求真論藜蘆曰。藜蘆能反五參細辛芍藥。及一服即吐。其意何居。蓋緣苦雖屬降。而亦善涌。藜蘆辛少苦多。故能入口即吐。是以風痰腦結。而見咳逆上氣者。常用是藥。以投使其膈部之邪悉從上出也。但此宜作散劑。以投。切勿湯藥。以服。至於腸癰泄痢。如何書載。免治。亦是因吐除其實積。積去而利與瀉亦可止矣。吐雖等於常山。瓜蒂烏附尖。萊菔子。但常山則吐癰痰。瓜蒂則吐

名詳「藕絲菜」條。

【藕節炭】即藕節焙成炭者之處方用名。詳「藕節」條。

【藕節粉】基本 本品係以藕節搗澄之粉。

性質 甘。微苦。平。無毒。

主治 開腸補腰腎和血脈。散一切瘀血。生一切新血。產後及吐血者。食之尤佳。

【蘆茹】即茹蕒。

【蕒蕒】即蘭茹之古籍別名。典見綱目。詳「蘭茹」條。

【蕒】即食萊蕒之古籍別名。典見圖經本草。詳「食萊蕒」條。

【蘭茹】處方用名 蘭茹根。蘭茹草。

古籍別名 離婁。別錄。掘掘。蘆蕒。白者名草蘭茹。綱目。漆頭。〔本草集注〕

產地 凡山野川谷及原澤恒有出。

形態 蘭茹爲毒草類之一。生草本莖高二三尺。葉爲長卵形。莖葉中有汁。折時甚白。旋即凝黑。如漆。春開淡紅或紫色小花。夏日結實如豆。一顆三粒。生青熟黑。中

有仁。其根可供藥用。

採取 四五月採之。製法 採得陰乾用。

性質 辛寒。有小毒。效能 破血殺蟲。蝕惡肉。治瘡

疥。用作腐蝕藥。又爲疥癬頑瘡藥。

主治 蝕惡肉。敗瘡。死肌。殺疥蟲。排膿惡血。除大風熱氣。善忘不寐。〔本經〕去熱痺。破癥瘕。除息肉。〔別錄〕

配合應用 ①緩疽腫痛。蘭茹一兩爲散。溫水服二錢匕。〔聖惠方〕

②治傷寒咽痛。毒攻作腫。真蘭茹爪甲大。納口嚼汁嚥之。當微覺爲佳。〔備急方〕

③治中焦熱痞。善忘不禁。蘭茹二分。甘草二兩。消石爲末。每服一錢。雞鳴時溫酒下。以知爲度。〔聖惠方〕

④治疥瘡癢癢。蘭茹末入輕粉香油調塗之。〔多能鄙事方〕

用量 八分至錢半。

施用宜忌 凡無實邪者禁用。惡門冬。甘草爲之使。

參攷資料 ①治馬疥。尤善服

食。方用至少。〔寇宗奭〕②孟詵必效方。治甲疽生於脚趾邊腫爛用

蘭茹三兩。黃芪二兩。苦酒浸一宿。以豬脂五合合煎。取膏三合。日三

塗之。即消。又聖惠方。治頭風旋眩。鷓鴣頭丸中亦用之。〔李時珍〕③草

高四五尺。葉圓黃。四四相當。四月花五月實。黑根黃。有汁亦黃色。三

月採葉。四月五月採根。〔吳普〕④今第一出高麗。色黃。初斷時汁出。凝黑如漆。故云漆頭。次出近道。名

草蘭茹。色白。皆燒鐵鑊頭令黑。以當漆。非真也。〔陶弘景〕⑤今河陽

滑齊州亦有之。二月生苗。葉似大戟。而花黃色。根如蘿蔔。皮赤黃。肉

白。初斷時汁出。凝黑如漆。三月開淺紅花。亦淡黃色。不着子。陶隱居

謂出高麗者此近之。又有一種草蘭茹。色白。古方兩用之。故姚僧垣

治癰疽生惡肉。有白蘭茹散。傳之看肉盡便停止。但傳諸膏藥。若不

生肉。又傳黃芪散。惡肉仍不盡者。可以漆頭赤皮蘭茹爲散半錢。和白蘭茹散三錢。和傳之。觀此則赤

白皆可。用也。〔蘇頌〕⑥范子計然云。蘭茹出武都。黃色者善。草蘭茹

出建康。色白。今處處有之。生山原中。春初生苗。高二三尺。根長大如

蘿蔔。莖青。壯或有歧出者。皮黃赤。肉白色。破之有黃漿汁。莖葉如大

戟。而葉長微闊不甚尖。折之有白汁。抱莖有短葉相對。圓而出尖。葉

中出莖。莖中分二三小枝。二三月開細紫花。結實如豆大。一顆三粒。相合生青熟黑。中有白仁。如續隨子之狀。今人往往呼其根爲狼毒。誤矣。狼毒似商陸。大黃。根無漿汁也。〔李時珍〕

【蘭茹根】即蘭茹之處方用名。詳

【蘭茹草】即蘭茹之處方用名。詳

【蘭茹】條。

【蘭蕒子】即蕒蘭子之處方用名。詳「蕒蘭子」條。

【藜】古籍別名 萊。〔詩疏〕紅心灰藜。〔玉冊〕鶴頂草。〔土宿〕臘脂菜。〔綱目〕

外國名詞 Chenopodium album, L. (拉丁)アカザ (日本)

基本 係藜科藜屬。爲藜之葉。其莖詳見該條。

十九畫 藕

大熱地五錢。養燭竹膏。真藕粉一兩五錢。研。真川連六分。酒拌炒。研末。右將紅棗肉熟地膏和諸藥末搗勻。爲丸如桐子大。每早以白滾湯送下七粒。逐日加增二粒。至二十一粒止。以後不必再加。服一料全愈。予多試皆效。切勿泛視。濟世養生集方。

參攷資料 藕粉味甘。氣又芬芳。作食輕身延年。而其功用更專益血止血也。凡一切症皆不忌可服。趙學敏。淮以南皆澤國。居人嗜藕。暇則濾爲粉。淘汰既淨。去其渣滓。存其甘液。風吹日曝。漸成碎珠。以湯沃而食之。純任天然。別有風味。亦野物之可尙者矣。尤著者曰片粉。擇藕之極佳者。淘曬人工十倍尋常。及其既成。則如白雲片片。纖塵不染。味亦絕勝。非大有力者。不能製也。宦遊筆記。

【藕梢菜】即夾實之古籍別名。典見和漢藥考。詳「夾實」條。
【藕荷葉】即荷葉貼水之古籍別名。典見綱目。詳「荷葉」條。

【藕絲菜】原名藕莖。採取五月六月間。

嫩時採茹之。老則爲藕。不堪爲蔬。性質甘平。無毒。

主治 生食。療霍亂後虛渴。煩悶。不能食。煎解酒食毒。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論藕絲菜曰。功與藕同。

【明】汪穎食物本草論藕絲菜曰。解煩毒。下瘀血。

【藕絲菜】即藕之古籍別名。典見綱目。詳「藕」條。

【藕實】即蓮肉之原名。詳「蓮肉」條。

【藕節】處方用名 鮮藕節。藕節炭。

基本 屬睡蓮科。爲藕莖間之節。

產地 凡池澤間恒有生焉。陳仁山藥物生產辨云。各省各屬均有出。廣東以南番順香山等處爲多。

形態 藕節狀如竹節。而外圍有無數細莖。

採取 採藕時採之。製法 採得洗淨。或曝乾。

性質 溫平。無毒。效能 止血化痰。

主治 搗汁飲。主吐血不止。及口鼻出血。

歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草論藕節曰。消瘀血。解熱毒。產後血閉。和地黃研汁入熱酒小。

便飲。【明】李時珍本草綱目論藕節曰。能止咳嗽。唾血。血淋。溺血。下血。血痢。血崩。清。唐容川本草問。

答論藕節曰。藕節中空。能行水。故用以行血分之滯熱。而清瘀血。藕在水中。節又結束極細。而其中仍能通水氣。淋是水竅通而不通。藕節在水中不通。而通且色能回紫。

變紅。又入血分。以治淋症尤宜。配合應用 治鼻衄不止。藕節搗汁飲。并滴鼻中。

治卒暴吐血。雙荷散。用藕節荷蒂各七箇。以蜜少許。搗爛。用水二鍾。煎八分。去滓溫服。或爲末丸服亦可。聖惠方。

治大便秘下血。藕節曬炙研末。人參白蜜煎湯調服二錢。日二服。全幼心鑑方。

金鎖玉關丸。治遺精白濁。心虛不寧。用藕節蓮花鬚蓮子肉夾實肉。山藥白茯苓白茯神各二兩。

一八五六

爲末。用金櫻子二斤。搗碎。以水一斗。熬八分。去滓。再熬成膏。入少麵和藥丸。梧子大。每服七十九粒。米飲下。

治鼻淵腦瀉。藕節。芎藭。焙研爲末。每服二錢。米飲下。普濟方。

用量 錢半至三錢。

參攷資料 一男子病血淋。痛脹欲死。予以藕汁調羹。灰。每服二錢。三日而血止。痛除。按趙潛養病漫筆云。宋孝宗患病。衆醫不效。高宗偶見一小藥肆。召而問之。其人問得病之由。乃食潮蟹所致。遂診脈曰。此冷病也。乃用新採藕節。搗爛。熱酒調下數服。即愈。高宗大喜。就以搗藥金杵白賜之。人遂稱爲金杵白。服防禦家。可謂不世之遇也。大抵藕能消瘀血。解熱開胃。而又解蟹毒。故也。李時珍。藕節性冷。伏硫黃。藕節。糯米。主吐血不止。及口鼻出血。王孟英。經云。血者神氣也。又云。所言節者。神氣之所遊行出入也。即此可悟。藕節大療血證之義矣。劉潛江。

【藕莖】即藕之古籍別名。典見綱目。詳「藕」條。即藕絲菜之原。

生津。行瘀止渴。除煩開胃。消食析
醒。治霍亂口乾。療產後悶亂。暑金
瘡止血定痛。殺射同魚蟹諸毒。熟
食補虛。養心生血。開胃舒鬱。止瀉
充飢。搗著凍瘡。亦可入饌。果中鹽
品。久食休癯。以肥白純甘者良。生
食宜鮮。煑羹食宜壯老。用砂鍋燉
藥。緩火煨極爛。入煉白蜜收乾。食
之最補心脾。若陰虛肝旺。內熱血
少。及諸失血證。但日熬濃藕湯飲
之。久自愈。不服他藥可也。老藕
搗浸澄粉。爲產後病後衰老虛勞
妙品。但須自製。市物恐屬雜不真
也。市中熟藕多雜穢物。故易糜爛
最不宜食。諸病皆忌。藕節入藥。功
專止血。

配合應用 ①治時氣煩渴。用
生藕汁一盞。生蜜一合。和勻細服。
(聖惠方)

②治傷寒口渴。用生藕汁。生地
黃汁。童子小便各半盞。煎溫服之。
(龐安時傷寒論方)

③治霍亂煩渴。藕汁一鍾。薑汁
半鍾。和勻飲。(聖濟總錄方)

④治霍亂吐利。生藕搗絞汁服。
(聖惠方)

十九畫 藕

⑤治上焦痰熱。藕汁。梨汁各半
盞。和服。(簡便方)

⑥治產後悶亂。血氣上衝。口乾
腹痛。用生藕汁三升。飲之。(梅師
方) 用藕汁。地黃汁。童便等分煎
服。(龐安時)

⑦治小便熱淋。生藕汁。地黃汁。
蒲萄汁各等分。每服半盞。入蜜溫
服。

⑧治墜馬。血瘀積在胸腹。唾血
無數者。乾藕根爲末。酒服方寸匕。
日二次。(千金方)

⑨治食蟹中毒。生藕搗汁飲之。
(聖惠方)

⑩治凍脚裂圻。蒸熟藕搗爛塗
之。

⑪治塵芒入目。大藕洗搗。綿裹
滴汁入目中。即出。(普濟方)

⑫用薑 三錢至一兩。

施用宜忌 凡非血熱而有瘀
滯者禁用。忌鐵器。

著名方劑 藕汁膏。滋養胃液。
(沈氏尊生書方) 藕汁。生地黃汁
二味。加牛乳。黃連末。天花粉末。生
薑汁。白蜜爲膏。用時挑取留舌上。
徐徐熟湯送之。日三四次。

參攷資料 ①根入神仙家。宋
時太官作血絡。(音勸) 庖人削

藕皮誤落血中。遂散淡不凝。故醫
家用以破血多效也。啗者血養也。
孟詵曰。產後忌生冷物。獨藕不同
生冷者。爲能破血也。(陶弘景)

②白花藕大而孔扁者。生食味甘。煮
食不美。紅花及野藕。生食味澀。煮
蒸則佳。夫藕生於卑污。而潔白自
若。質柔而穿堅。居下而有節孔。竅
玲瓏。絲綸內隱。生於嫩莖。而發爲
莖葉花實。又復生芽。以續生生之
脈。四時可食。令人心歡。可謂靈根
矣。故其所主者。皆心脾血分之疾。
與蓮之功稍不同云。(李時珍)

③藕熬濃汁服。既能補血。亦能通氣。
故無膩滯之偏。(王素衡)

④陰虛
肝旺。內熱血少。及諸失血證。但日
熬濃藕湯飲之。久自愈。不服他
藥可也。(王孟英)

⑤相感志云。藕
與鹽水共食。則不損口。同油燥麵
米果食。則無渣。(李時珍)

⑥藕子。卽蓮肉之古籍別名。典見
和漢藥考。詳「蓮肉」條。

⑦藕汁。卽藕之處方用名。詳「藕」
條。

【藕粉】 基本 本品係以老藕
搗浸澄取之粉。

採取 冬日掘取老藕。搗汁澄
粉乾之。以刀削片。潔白如鶴羽。或
取粗藕。不限多少。洗淨截斷。浸三
日夜。每日換水。看極淨。漚出搗如
泥。以布絞淨汁。又將藕渣搗細。又
絞汁盡。卻輕濾去渾脚。以清水少
和攪之。然後澄去清水。下卽爲粉。
曬乾收貯。和糯米粉白糖蒸食之。
或以白糖開水冲服。俱可。莖粉灰
粉。俱用此法。

性質 甘平。無毒。

主治 調中開胃。補髓。益血。通
氣。分清表熱。常食安神。生智慧。解
暑生津。消食止瀉。

配合應用 ①八仙藕粉。此粉
滋胃保元。治一切虛勞雜症。白花
藕粉。白茯苓。白扁豆。炒蓮肉。川貝
母。山藥。白蜜各等分。入乳另入滾
水冲。不拘時食。(經驗廣集方)

②人紅丸。專治童子勞怯。神驗
之極。用人龍二十一條。(卽蛇蟲。
童便洗淨。瓦焙。勿令黑研末) 不
破皮紅棗三十個。(飯上蒸熟去
皮核) 藕粉一錢五分。(炒研)

一八五五

十九薑 羅 屬 臘 蘭 藕

詳見該條。

性質 甘。無毒。

主治 補腎益肺。止心胃痛。

參攷資料 羅漢松實味甘氣香。能大補氣血(趙學敏)

【羅漢松皮】

主治 一切血病。殺蟲。療癬。合

薑香。香油調搽。

外國名詞 Theja-

【羅漢柏】 pais dolabata, S.

edz

基本 屬松杉科羅漢柏之葉。

形態 羅漢柏為常綠樹。生於深山陰溼之地。幹高達十丈餘。徑達二尺餘。葉類檜葉。作鱗片狀。但粗大。表面呈深綠色。裏面類白色。花為單性花。果實作毬形。

採取 採葉曬乾。

效能 用為黃疸藥。

用量 二錢至四錢。

【羅漢條】即普賢線之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「普賢線」條。

產地 廣西桂林。

主治 止咳。清熱。

【羅漢菓】

【鰾魚】即鰾魚之古籍別名。典見開寶本草。詳「鰾魚」條。

【鰾魚】即鰾魚之古籍別名。典見開寶本草。詳「鰾魚」條。

【鰾魚】即鰾魚之古籍別名。典見開寶本草。詳「鰾魚」條。

【鰾魚】即鰾魚之古籍別名。典見開寶本草。詳「鰾魚」條。

【鰾魚】即鰾魚之古籍別名。典見開寶本草。詳「鰾魚」條。

【臘茄】即蕃椒之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蕃椒」條。

【臘茶】即茶葉之陳久者。功用較尋常茶葉為良。

【臘雪水】基本 本品乃冬至降之雪水。

後第三戌日臘月所

降之雪水。

性質 甘。冷。無毒。

主治 解一切毒。治天行時氣溫疫。小兒熱癩狂啼。大人丹石發動。酒後暴熱。黃疸。仍小溫服之。

歷代記述攷證 【明】吳瑞日用本草論臘雪水曰。煎茶煮粥。解熱止渴。【明】李時珍本草綱目論臘雪水曰。宜煎傷寒火喝之藥。抹痛亦良。

參攷資料 ●臘雪水。洗目退赤。(張從正) ●雪洗也。洗除瘡癩蟲蝗也。凡花五出。雪花六出。陰之成數也。大宜榮麥。又殺蟲蝗。臘雪密封陰處。數十年亦不壞。用水浸五穀種。則耐旱不生蟲。酒凡席間則鯽自去。淹藏一切果食。不至蛀蠹。豈非除蟲蝗之驗乎。(李時珍) ●春雪有蟲水亦易敗。所以不收。(陳藏器)

【臘菜】即芥子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「芥子」條。

【臘黃】即海藤花之就樹採者之古籍別名。典見郭義恭廣志。詳「藤黃」條。

【蘭藕】即菰。詳「菰」條。

【藕】命名 本品乃蓮之根。蓮之花葉常偶生。不偶不生。故其根名曰藕。藕者耦也。

處方用名 蓮藕。藕汁。

古籍別名 藕密。藕絲菜。(綱目)

基本 屬睡蓮科。為蓮之地下莖。

產地 凡池澤間恒多生焉。

形態 藕色白。裏有孔。而有絲。大者如胳膊。長六七尺。凡五六節。每節生二莖。一為花。一為葉。盡處乃生藕。大抵野生及紅花者。運多藕劣。種植及白花者。運少藕佳也。

採取 冬春間採之。

製法 凡採得洗淨泥土用。

性質 甘平。無毒。

效能 生用涼血散瘀。熟用補心益胃。用作清涼解熱藥。

主治 熱渴。散留血。生肌。久服

令人心歡。

歷代記述攷證 【南北朝】徐之才雷公藥對論藕曰。汁解射罔毒。蟹毒。【唐】陳藏器本草拾遺論藕曰。止惡止洩。消食解酒毒。及病後乾渴。【唐】孟詵食療本草論藕曰。生食治霍亂後虛渴。煮食甚補。五臟。黃下馬。同蜜食。令人腹臍肥。不生諸蟲。亦可休糧。【宋】大明諸家本草論藕曰。搗汁服。止渴除煩。開胃。治霍亂。產後血悶。痔瘡。腎金瘡。并傷折。止暴痛。煮食之。大能開胃。【明】經希雍本草經疏論藕曰。藕稟土氣。以生。其味甘。生寒。熟溫。入心脾胃三經。生者甘寒。能涼血止血。除熱清胃。故主消散瘀血。吐血。鼻出血。產後血暈。鬱金瘡。傷折及止熱渴。霍亂。煩悶。解酒等功。熟者甘溫。能健脾開胃。益血補心。故主補五臟。實下焦。消食。止洩。生肌。及久服。令人心懽。止惡也。本生於污泥之中。而體至潔白。味甚甘脆。孔竅玲瓏。絲綸內隱。療血止渴。補益心脾。真水果中之上品也。又能解蟹毒。【清】王士雄隨息居飲食譜論藕曰。藕性甘平。生食

【羅兒】 古籍別名 九層皮果。
(綱目拾遺)

產地 出廣西山中。

形態 羅兒爲夷果類之一種。結實狀似橄欖。又似蠶豆。至夏成熟。外有黑殼。連肉有皮七層。或九層。肉味如栗。可供藥用。

性質 甘溫。無毒。

主治 養肝膽。明目。去翳。止渴。退熱。解利風邪。消煩。降火。翻胃吐食。或食下即吐。或朝食暮吐。暮食朝吐。用七枚煨存性。每日酒調下。

臟腑生蟲。及小兒食泥土。腹痛。澀滯。積硬腹中。蟄蟲上攻。心下痛。欲死。面有白斑。同牽牛子各七枚。水煎服。

【羅浮香】即米酒之古籍別名。典見和漢藥考。詳「米酒」條。

【羅浮參】 產地 產於羅浮。

形態 如山茅。葉細莖圓。有紫花。三葉一花者爲仙茅。一葉一花者爲人參。根如人字。色如珂玉。煮汁食。味與參無別。但微有膠漿耳。可供藥用。

性質 味甘。帶苦。無毒。

主治 生津。養胃。補虛羸。潤肺。

【羅勒】 古籍別名 蘭香。(嘉祐)

目) 外國名詞 Ocimum basilicum, L. (拉丁)メバウキ (日本)

基本 係唇形科羅勒屬。爲羅勒之莖葉。其子詳見該條。

產地 生田野間。

形態 羅勒爲菜類之一種。種有三。其葉有似紫蘇者。有葉大於二十步內。即聞香氣者。有堪作生菜者。其莖葉俱可供藥用。

性質 辛溫。微毒。

主治 調中消食。去惡氣。消水氣。宜生食。療齒根爛瘡。使用之甚良。患喉嚨者。取汁服半合。冬月用乾者煮汁。其根燒灰。傅小兒黃爛瘡。

歷代記述攷證 【明】吳瑞日用本草論羅勒曰。主辟飛尸。鬼疰蟲毒。

參攷資料 ①羅勒不可多食。壅關節。澀營衛。令人血脈不行。又動風發脚氣。(孟詵) ②按羅天益云。蘭香味辛。氣溫。能活血潤燥。而

掌禹錫言多食澀營衛。血脈不行。何耶。又東垣李氏治牙疼。口臭。神功丸中用蘭香云。無則以藿香代之。此但取其去惡氣而已。故飲膳正要云。與諸菜同食。味辛香。能辟腥氣。皆此意也。(李時珍) ③香菜

須三月葉生時種之。乃生。否則不生。常以魚腥水。米泔水。泥溝水澆之。則香而茂。不宜澆水。(李時珍)

【羅勒子】 形態 羅勒子大如蚤而褐色。不光澤。可供藥用。

採取 七月間採收之。

主治 目翳及塵物入目。以三五顆安目中。少頃當澀。膜與物俱出。又主風赤眇淚。

參攷資料 按普濟方云。昔廬州知錄彭大辨。在臨安暴得赤眼。後生醫一僧用蘭香子洗。曬。每納一粒入臂內。閉目少頃。連膜而出。也。一方爲末點之。李時珍常取子試之。水中亦服大。蓋此子得澤即脹。故能染惹。膨浮膜。爾然目中不可着一塵。而此子可納三五顆。亦不妨礙。蓋一異也。(李時珍)

【羅野梨】即鹿梨之古籍別名。詳「鹿梨」條。

產地 出於廣西南寧府。

形態 葉滑嫩。長二寸許。似帶。可供藥用。

主治 折傷損手足者。取葉火煨。微熱。貼之。即愈。

【羅漢松】 命名 本品結實熟之服製裝。故名。

古籍別名 金錢松。徑松。長者名長青。短者名短青。(綱目拾遺)

外國名詞 Podocarpus chinensis, Wall

產地 多生山野高地。



形態 羅漢松爲松屬之一種。常綠喬木。高數丈。葉厚而狹。長。互生。花單性。瓣闊。老則結實。長四五分。大者如雞子。小者如豆。皮平上。銳色紫黑。熟則紅色。可供藥用。皮

十九畫 礪

礪 斡 簞 簞 繩 繫 繭 羅

一八五二

一二十九。欲利大便。則服一二百丸。溫水下。(王隱君養生主論方)

●金寶神丹。治一切虛冷久積。

滑泄久痢。癰塊血刺心腹下痢及婦人崩中漏下。青礪石半斤爲末。

消石末二斤。坩鍋內鋪頭蓋底。按實炭火二十斤。煨過取出。入赤石

脂末二兩。滴水丸。灰子大。候乾。入坩鍋內。小火煨之。每服一丸至二

三丸。空心溫水下。少許壓之。久病瀉痢。加至五七丸。(楊氏家藏方)

●奪命散。治急慢驚風。痰涎壅塞咽喉。命在須臾。服此墜下風痰。

乃治驚利痰之聖藥也。真礪石一兩。煨消一兩。同煨過爲末。每服半

錢。或一錢。急驚痰熱者。薄荷自然汁。入生蜜調下。慢驚脾虛者。木香

湯入熟蜜調下。亦或雪糕丸。綠豆大。每服二三丸。(湯氏嬰孩寶鑑方)

●治小兒急驚。青礪石磨水服。

(衛生方)

用量 三錢至四錢。

施用宜忌 凡虛弱而非實症者禁用。

參攷資料 ●湯衡嬰孩寶鑑

言礪石乃治驚利痰之聖藥。吐痰在水上。以石末糝之。痰即隨水而下。則其沉墜之性可知。然止可用之救急。氣弱脾虛者不宜久服。楊士瀛謂其功能利痰。而非性胃家

所好。如慢驚之類。皆宜佐以木香。而王隱君則謂痰爲百病。不論虛實寒熱。概用滾痰丸。通治百病。豈

理也哉。朱丹溪言一老人忽病目盲。乃大虛證。一醫與礪石藥服至

夜乃死。此乃盲醫虛虛之過。礪石豈殺人者乎。况目盲之病。與礪石

並不相干。(李時珍)●礪石江北諸山往往有之。以盱山出者爲佳。

有青白二種。以青者爲佳。堅細而青黑。打開中有白星點。煨後則星

黃如鈔金。其無星點者不入藥用。通城縣一山產之。工人製爲器物。

(李時珍)●礪石必用火硝煨過。性始能發。乃能墜痰。不煨則石質

不化。藥性不發。故必用煨。(唐容川)

【礪米】即苡仁之古籍別名。典見雷氏詳。【苡仁】條。

【斡珠】即苡苡之古籍別名。典見本草集註詳。【苡仁】條。

【簞箕蟲】即廢蟲之古籍別名。典見本草衍義詳。【廢蟲】條。

【繩毒】即蛇牀子之古籍別名。典見本經詳。【蛇牀子】條。

【繫彌子】形態 狀圓而細。色赤如腰麥。

性質 味苦。甘平。無毒。

主治 益五臟。去頭面諸風。產後痢疾不止。用此藥一合。酒水各

半煎。空心服立效。

【蘭耳羊】即黃羊之古籍別名。典見綱目詳。【黃羊】條。

【蘭栗香】即沉香之一種。典見綱目詳。【沉香】條。

【繭鹵汁】基本 本品非鹹鹵也。乃繭鹵中蚶汁。

主治 百蟲入肉。醫蝕瘡疥。及牛馬蟲瘡。爲湯浴小兒瘡疥。殺蟲

以竹筒盛之。浸山蝨。山蛭。入肉。蚊子諸蟲咬毒。亦可預帶一筒。取一

蛭入中。并持乾海苔一片。亦避諸

蛭。

【羅】即鹿梨之古籍別名。典見綱目詳。【鹿梨】條。

【羅青】即青黛之古籍別名。典見和漢藥考詳。【青黛】條。

【羅蚡】性質 甘平。氣香。主治 瘰癧。消腫。除煩。消脹。除痰。止咳。清肺。

參攷資料 長風羅蚡。疑即古人願渚紫筭也。介於山中。謂之蚡。

羅氏隱焉。故名。羅西吳。枝葉湖人。於若不數願渚。而數羅蚡。願渚之

佳者。其風味已遜龍井。蚡梢清。然藥粗。而作草氣。嘉靖長興志。羅

蚡在互通山西土地廟後。產茶最佳。吳人珍重之。凡茶以初生雨前者佳。惟羅蚡立夏開園。梗粗葉厚。

微有齋筭之氣。還是夏前六七日。如雀舌者。最不易得。然廟後山西向故稱佳。總不如洞山南向獨受

陽氣。嘉稱仙品。只數十畝而已。凡茶產平地。多受土氣。故其質濁。羅

茗產高山。巖石純。是風露清虛之氣。故可尚。又長物志云。浙之長興

者佳。價亦甚高。今所最重。前溪稍下。採茶不必太細。細則芽初萌而

味欠足。不必太青。青則茶已老。而味欠嫩。惟成帶葉綠色。而圓厚者

爲上。不宜以日曬炭火焙過。扇冷。以箬葉襯。擇好高處。蓋茶最喜溫

燥。而忌冷澤也。(趙恕軒)

（陶弘景）此藥攻擊積冷之病爲良。若以餘物代之。療病無效。正爲此也。（蘇恭）治久積及久病腹冷功用。直須慎。其毒不可試也。（寇宗奭）礬石性氣與砒石相近。蓋亦其類也。古方礬石礬石常相連書。蓋二字相似故誤耳。然礬石性寒無毒。礬石性熱有毒。不可不審。陸農師云。礬石之力十倍鐘乳。按洪容齋隨筆云。王子敬靜息帖言礬石深是可疑。凡喜散者輒發癰。蓋散者寒食散也。古人多服之中有礬石。性熱有毒。故云深可疑也。劉表在荊州與王粲登鄴山。見一岡不生百草。王粲曰。此必古冢。其人在世服生礬石熱不出外。故草木焦滅。表掘之。果有礬石滿筵。又今洛水不冰。下亦有礬石。人謂之溫洛是也。取此石安甕中。水亦不冰。文鵬伏卵。取石置巢中。以助溫氣。其性如此。豈可服。予見文安公鎮金陵。秋暑減食。醫者湯三盆。教服礬石丸。已而飲啖日進。送加意服之。越十月而毒作。衄血斗餘。自是數數不止。竟至精液皆竭而死。李時珍竊謂洪文安之病。

十九畫 礬

礬

未必是礬石毒發。蓋亦因其健啖。自恃厚味。房勞縱嗜。無忌。以致精竭而死。夫因感食而服石。食既進。則病去藥當止矣。而猶服之不已。恃藥妄作。是果藥之罪與。（李時珍）礬義不解。許氏說文云。礬毒石也。西山經云。皋塗之山有白石。其名曰礬。可以毒鼠。郭璞注云。鼠食則死。蠶食而肥。則鼠鄉之意。以此（李時珍）礬石生漢中山谷及少室。採無時。（別錄）今蜀漢亦有。而好者出南康南野溪。及彭城界中汶陽縣南。暨及湖東新寧及零陵皆有。白礬石能柔金。以黃泥包炭火燒之一日。一夕則解。可用丹房及黃白術多用之。（陶弘景）此石能拒火。久燒但解散。不可脫其堅。今市人乃取潔白理石當之。燒卽爲灰也。今漢川武當西遼坂名礬石谷。卽是真出處。少室有粒細理不如漢中者。（蘇恭）今台州階州亦有之。（蘇頌）

礬石

本品之色深淺然故名。

處方用名 青礬石 煨礬石 金

礬石。銀礬石。

基本 係石類爲山石之一種。

產地 陳仁山藥物生產辨云。

金礬石各省有出。但以四川湖北兩處來者爲好。銀礬石各省有出。安南會安等亦有出。

形態 礬石質堅而細。體重擊碎。中有白星點。煨後則色星黃如

鉄金。其無星點者不入藥。入藥以青者爲佳。故有青礬石之稱。蓋有青白兩種耳。

製法 李時珍曰。用大坩鍋一箇。以石四兩。打碎。入硝石四兩。拌勻。炭火十五斤。簇定。煨至消盡。其石色如金爲度。取出研末。水飛去

消毒。曬乾用。

性質 甘。鹹。平。無毒。

效能 瀉痰熱。破癥積。用作祛痰藥。又爲鎮瀉藥。

主治 食積不消。留滯臍腹。宿食癥塊。久不瘳。小兒食積。羸瘦。婦人積年食癥。攻刺心腹。得巴豆。硝砂。大黃。荊三棗。作丸服良。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論礬石曰。治積痰驚癇。咳嗽喘急。【明】繆希雍本草經疏

論礬石曰。礬石裏石中剛猛之性。體重而降。能消一切積聚痰結。其味辛鹹。氣平無毒。辛主散結。鹹主輕堅。重主墜下。故本經所主諸證。皆出一貫也。今世又以此治小兒驚痰喘急。入滾痰丸。治諸痰怪證。【清】黃宮繡本草求真論礬石曰。礬石裏石中剛猛之性。沉墜下降。味辛而鹹。色青氣平。功歸入肝。平木下氣。爲治驚利痰要藥。蓋風水太過。脾土受制。氣不運化。積氣生痰。壅塞膈上。變生風熱。治宜用此重墜下泄。則風木氣平。而痰積自除。今人以王隱君滾痰丸內用礬石。通治諸般痰怪症。殊爲未是。不知痰因熱盛。風木挾熱。而脾不運。故爾痰積如膠。如漆。用此誠爲合劑。如其脾胃虛弱。食少便清。服此泄利不止。小兒服之多成慢症。以致束手待斃。可不慎歟。硝礬水飛研用。

配合應用 滾痰丸。通治痰爲百病。惟水瀉雙旋者不可服。礬石。紹硝各二兩。煨過。研飛。曬乾。一兩。大黃酒蒸八兩。黃芩酒洗八兩。沉香五錢。爲末。水丸。梧子大。常服。

十九畫 櫚

產地 出廣西。

【櫚苦】

形態 櫚苦爲夷果類

之一種。其果大如半升碗。數十房攢聚成穗。每房有縫。冬生色青至夏紅熟。其子實可供藥用。

性質 甘。無毒。

主治 補脾胃。固元氣。壯精神。益血脈。寬痞。消痰。解酒毒。止酒後發渴。利頭目。開心益智。婦人不孕。用櫚苦子浸入好酒內。三日。日日飲之。百日有效。又目生翳障。漸漸昏暗。視物不明。櫚苦子浸白蜜內。每日連蜜啖一枚。一月即退。

【櫚木】

古籍別名 花櫚木。(綱目)

產地 出安南。及南海諸地。

形態 櫚木爲喬木類之常綠

木。本木質堅而色紫紅如紫檀。亦有花紋者。謂之花櫚。可爲器。置桌几。亦可供藥用。

性質 辛溫。無毒。

主治 產後惡露衝心。癥瘕結氣。赤白漏下。並煎煎服。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器

本草拾遺論櫚木曰。破血塊。冷嗽。寒汁熱服。爲枕令人頭痛。性熱故也。

櫚 櫚 櫚 瀝 櫚 獸 瓊 瀉 櫚

也。

【櫚】即梳篋之古籍別名。典見綱目。詳「梳篋」條。

【櫚】即櫚之日本別名。詳「櫚」條。

【櫚】即櫚之原名。詳「櫚實」條。

【櫚皮】即土骨皮之古籍別名。典見和漢藥考。詳「土骨皮」條。

【櫚棘】即櫚實之古籍別名。典見綱目。詳「櫚實」條。

【櫚榧子】即櫚實之古籍別名。典見綱目。詳「櫚」條。

【櫚】即櫚之古籍別名。典見綱目。詳「櫚」條。

【瀝茶】基本 茶葉之產於四川瀘州者。

性質 味辛。性熱。

主治 療風氣。

【瀝油】即松油之古籍別名。典見綱目。拾遺詳「松油」條。

【瀝青】即松脂之古籍別名。典見綱目。詳「松脂」條。

【櫚牛】即牦牛之古籍別名。典見爾雅。詳「牦牛」條。

【獸目】即茶葉之一種。產雲南舊東川府境者。詳「茶葉」條。

【瓊珠】即荔枝之古籍別名。典見

和漢藥考。詳「荔枝」條。

【瘠竹】即仙人杖之別名。詳「仙人杖」條。

【礬石】處方用名 白礬石。煨

古籍別名 立制石。青介石。固

羊石。(本經)石鹽。太白石。(別錄)

澤乳。鼠鄉。吳曹本草。毒砂。肉羊

石。(和漢藥考)銀星礬石。金星礬

石。(綱目)

外國名詞 Arsenopyrites.

(英) 基本 係金屬。爲鐵礦類之神

礦鐵礦。

產地 凡四川、浙江、及英國之

山谷間。恒多生焉。和漢藥考曰。日

本石見。伊勢下野信濃越後等諸

國產此。

形態 礬石係生於巖石間之

銀白色或灰黑色粒狀或樹枝狀

礦石。斷面不滑澤。硬度五。五。比

重約六。○質脆。煨之發蒜臭。

採取 採無時。或十二月採之。

製法 採得以黃泥包炭火燒

之一日。一夕則解可用。

性質 辛。大熱。有毒。

成分 爲砒硫化鐵之礬石。即

由硫黃(二〇%)砒(三三%)鐵

(四六%)而成。

效能 燥寒濕。治冷積。專作殺

蟲殺風藥。並治癰瘡。

作用 與癰菌相遇。直接有致

死之能。

主治 寒熱。鼠瘻。蝕死肌。風痺。

腹中堅癰。邪氣。(本經)除熱明目。

下氣。除腸中熱。止消渴。益肝氣。破

積聚。癰冷。腹痛。去鼻中息肉。久服

令人筋擊。火煉百日。服一刀圭。不

煉服則殺人。及百獸。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥

性本草論礬石曰。除胸膈間積氣。

去冷溼風痺。癢痒積年者。

配合應用 治風冷脚氣。白礬

石煨二斤。酒三斗。漬三日。稍稍飲

之。

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡陰枯陽亢者禁

用。惡羊血。馬目毒。公鷲尿。虎掌。細

辛。畏水。鉛丹。棘針。爲之使得火良。

參攷資料 常取生礬石。納

水。令水不冰。如此說則生者性亦

大熱矣。張仲景云。生用破人心肝。

十八畫 鵝 鵝 鵝

【主治】風熱上壅。咽喉腫痛。及解癰藥毒。搗末酒服有效。亦消風熱結毒。酒摩塗之立愈。

【鵝屎】 主治 絞汁服療小兒鵝口瘡。並傳狗咬傷。

【鵝涎】 主治 咽喉穀賊。

【鵝涎】 歷代記述攷證 【清】趙學敏本草綱目拾遺論鵝涎曰小兒鵝口瘡甚效。

參攷資料 按洪邁夷堅志云小兒誤吞稻芒。着咽喉中不能出者名曰穀賊。惟以鵝涎灌之即愈。蓋鵝涎化穀相制耳。（李時珍）

【鵝脚草】即土荊芥之古籍別名。典見和漢藥考。詳「土荊芥」條。

【鵝喉管】 主治 婦人赤白帶下。煨末服之。咽喉痛。

煨末和冰片吹之。

【鵝掌上黃皮】 主治 燒研。搽脚趾縫溼爛。焙研油調。塗凍瘡良。

【鵝掌金星草】即金星草之古籍別名。典見植物名實圖考。詳「金星草」條。

【鵝屎】即屎之古籍別名。典見嘉祐圖經本草。詳「屎」條。

【鵝藥】即藥之古籍別名。典見嘉祐圖經本草。詳「藥」條。

【鵝藥】即藥之古籍別名。典見嘉祐圖經本草。詳「藥」條。

【鵝藥】即藥之古籍別名。典見嘉祐圖經本草。詳「藥」條。

【鵝藥】即藥之古籍別名。典見嘉祐圖經本草。詳「藥」條。

【鵝項草】 基本 鵝項草為雜草類之一種。其花可供藥用。

【主治】咽喉生瘡。同白芷、椒根皮、研末吹之。

【鵝腸菜】即繁縷之古籍別名。典見千金食治。詳「繁縷」條。

【鵝管石】即鐘乳石之處方用名。詳「鐘乳石」條。

【鵝腿骨】 主治 犬傷日久發者。煨末搽之。

【鵝膏】 原名 白鵝膏。命名 本品宜以白鵝者良。故名。

採取 臘月煉收之。性質 甘微寒。無毒。

主治 瀉耳。治卒聾。

歷代記述攷證 【宋】日華諸家本草論白鵝膏曰。潤皮膚。可令面脂【明】李時珍本草綱目論白鵝膏曰。塗面急令人悅。白唇。瘡手足皴裂。治癰腫。解瘰石毒。

【鵝膏草】 產地 生深山野間。形態 鵝膏草為菜類香薷屬之一種。狀似鵝卵。老則散開。惟與土茵長易相混。可供藥用。

【鵝膏草】 產地 生深山野間。形態 鵝膏草為菜類香薷屬之一種。狀似鵝卵。老則散開。惟與土茵長易相混。可供藥用。

【鵝膏草】 產地 生深山野間。形態 鵝膏草為菜類香薷屬之一種。狀似鵝卵。老則散開。惟與土茵長易相混。可供藥用。

【鵝膏草】 產地 生深山野間。形態 鵝膏草為菜類香薷屬之一種。狀似鵝卵。老則散開。惟與土茵長易相混。可供藥用。

【鵝膏草】 產地 生深山野間。形態 鵝膏草為菜類香薷屬之一種。狀似鵝卵。老則散開。惟與土茵長易相混。可供藥用。

用。

性質 甘滑。主治 與香薷同功。

【鵝膽】 性質 苦寒。無毒。主治 解熱毒。及痔瘡。初起。頻塗抹之自消。

【鵝膠】 基本 本品乃鵝之尾肉。古籍別名 尾膠。（綱目）

主治 塗手足皴裂。納耳中。治聾及聾耳。

【鵝】 命名 本品鳴聲暗暗。故名。古籍別名 天鵝。（綱目）黃鵠。

（本草綱目）外國名詞 Cygnus bewicki Yarell Swan 或 Bewicks Swan Schwan ハクテウ（日本）

基本 係脊椎動物鳥類游禽類鴨科鵝亞科之鵝。

產地 河湖海濱間多有之。

形態 鵝為水禽類之一種。其形似鵝而體大。頸長。嘴前橙黃色。嘴根有突起黑色之瘤狀。全體長三尺有餘。羽毛純白。脚尾俱短。而


脚黑色。鳴聲洪亮。飛翔極高。尤善行走。夏棲湖澤。冬居海濱。覓食水草昆蟲等物。其肉可供食與藥用。

【鵝絨毛】 主治 刀杖金瘡貼之。

【鵝頭】即灰質之古籍別名。典見和漢藥考。詳「灰質」條。

【鵝瀉】即澤瀉之古籍別名。典見本經。詳「澤瀉」條。

【鵝鵲】即烏鵲之古籍別名。典見



鵝

耳。若夫止渴。凡發胃氣者。皆能生津。豈獨止渴哉。便曰性涼乎。參苓

白朮散。乃治渴要藥。何嘗寒涼耶

(李時珍) ③白鵝辛涼無毒。蒼鵝

冷有毒。發瘡腫。(日華) ④鵝肉性

冷。多食令人霍亂發病疾。(孟詵)

⑤嫩鵝毒。老鵝良。(李廷飛)

【鵝不食草】即石胡荽之古籍別

名。典見食性本草。詳「石胡荽」條。

主治 解射工水毒。

【鵝毛】 歷代記述攷證 【唐】

蘇恭新修本草論鵝毛曰。治小兒

驚癇。又治噎疾。燒灰酒服。

配合應用 ①治癰毒。用鵝毛

煨灰一兩。明礬二兩。研末。麪糊爲

丸。每服二錢。好酒下。(集驗方)

②參毛丸。治大麻風神效。苦參

一斤。鵝毛八兩。煨存性。爲末。陳米

糊爲丸。桐子大。每服五十丸。酒送

下。一日二次。(赤水玄珠方)

③神功至寶丹。專治男婦溜膿

肥瘡。膿瘻瘡。膿梨頭。遍身風癩。癰

疹。疥癬。瘙癢。異常。麻木不仁。諸風

手足酸痛。皮膚破爛。陰囊癢極。并

婦女陰瘡。淫瀝酒丸散。擦藥洗貼

如神。隨病上下。茶湯送下。日進二

次。戒暴怒房勞。炎燴發毒之物。苦

參一斤。爲末。鵝毛香油炒存性。六

兩。黃米糊丸。硃砂爲衣。此方與元

珠治大麻風所用大同小異。因並

存之。秋泉方)

④用血管鵝毛。燒灰。百草霜。各

一錢。行經後。以酒調下。終身無孕。

(保和堂秘方) 又用鵝毛一把。煨

細茶煎湯。經後服。永不生。(周氏

家寶方) 又有受打不痛法。用血

管鵝毛七根。地龍七條。煨過。同乳

香白蠟。爲丸。好酒送下。(寶生論)

⑤治癰癰初起。白鵝大者二隻。

取週身毛。翎并口脚黃皮。新瓦焙

焦。爲末。分作十服。每日食後服之。

服完即愈。(唐信方)

⑥治腫毒。用血管鵝毛一握。銅

鍋炒焦。腐皮包裹。酒吞下。即內消。

初起者效。救生苦海方) 諸腫毒

痛甚。有膿即潰。無膿即消。用鵝毛

燒灰一兩。雄黃三錢。川烏。草烏。各

錢半。黃蠟鎔化。入前藥。爲丸。每服

一錢。好酒送下。(嚴氏方) 吳訥宇

用鵝毛二個。炒蜈蚣十條。醋炒。穿

山甲一兩。炒。罌蠟一兩。炒。全蝎五

錢。洗。廣膠二兩。炒。桑黃二兩。炒。半

角屑二兩。炒。共爲末。每服三錢。砂

糖調好酒下。以醉爲度。(諸毒內

消方)

⑦治發背疔瘡。對口風毒。穿山

甲。蛇蛻。蟬退。蜈蚣。俱爲末。鵝毛全

副。燒灰存性。全蝎。血管。雞毛。二翅

燒灰。人指甲。用十分之一。敗龜板

一個。殭蠶。俱爲末。每用一錢酒下。

(醫宗彙編方)

⑧治喉吞銅錢及鈎線。用鵝毛

一錢。燒灰。磁石。皂角子。火煨。象牙

一錢。燒存性。爲末。每服五分。新汲

水下。(慈惠方)

⑨治艾火帶。乃灸火所傷。爛痛

不可忍。用雄雞毛。同鵝毛。燒灰。敷

之效。(同壽錄方)

⑩治喉癰。用鵝毛灰三分。兒

茶二錢。牛黃三厘。雄黃一錢。人中

白一錢。牛煨存性。如吃深。加珍珠

煨存性。一分。爲末。先將生桐油。探

刷一番。後用藥吹入。加膽礬更妙。

(傳信方)

參攷資料 ①東川多溪毒。養

鵝以辟之。毛羽亦佳。并飲其血。鵝

未必食射工。蓋以咸相制耳。(陶

弘景) ②禽經云。鵝飛則誠沉。賊

即射工也。又嶺南異物志云。邕州

蠻人。選鵝腹裏毛。爲衣被絮。柔暖

而性冷。嬰兒尤宜之。能辟驚癇。柳

子厚詩云。鵝毛禦臘縫山罽。即此

蓋毛與肉性不同也。(李時珍)

【鵝毛艇】即鰻魚之膳者。典見綱

目。詳「鰻魚」條。

【鵝血】 性質 鹹。平。微毒。

主治 中射工毒者飲

之。并塗其身。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論鵝血曰。解藥毒。

性質 甘。溫。無毒。

主治 補中益氣。多食

發癩疾。

【鵝卵殼】 主治 癰疽無頭。煨

末。醋調傳。

【鵝兒腸菜】即繫縷之古籍別名。

典見綱目。詳「繫縷」條。

【鵝抱】 形態 鵝抱。爲蔓草類

之一種。附石而生。莖如

大豆。其根形如萊菔。小者如拳。可

供藥用。

採取 二月八月間採根。切片

陰乾用。

性質 苦。寒。無毒。

十八畫 鵝

鵝 鵝 鵝

乃水鳥之大者。其狀如鵝而大。青

蒼色。翼展廣五六尺。頭舉高六七

尺。長頸赤目。頭頸無毛。頭有三寸

許之紅皮如鵝頂。喙深黃色而扁

直。長尺餘。喙下亦有皮囊如鵝鵝

狀。足爪如雞而黑色。性極貪惡。能

與人鬥。好啖魚蛇及鳥雛等物。其

肉可供藥用。鵝喙毛詳見該條。

性質 鹹微寒。無毒。

主治 中蠱魚毒。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論鵝鵝肉曰。補中益氣。

甚益人。炙食尤美。作脯饑食強氣

力。令人走及奔馬。

鵝鵝毛 主治 解水蠱毒。

鵝鵝髓 性質 甘溫。無毒。

主治 補精髓。

鵝鵝喙 主治 魚骨哽。

鵝 即伯勞之古籍別名。典見孟

子詳「伯勞」條。

鵝 即鵝鵝之簡稱。詳「鵝鵝」條。

鵝鵝 原名 翠鵝。

鵝鵝 命名 山海經云。沙水

多翠鵝。其名自呼。後人轉爲鵝鵝

也。

古籍別名 鵝鵝。沁河。淘鵝。鵝

鵝。網目。淘河。伽藍鳥。動物學

大辭典。黎鵝。本草綱目。

外國名詞 Pelecanus Ono-

crota us Pelican 或 White

Pelican 或 Roseate Pelican

Pelican カランテウ或ベリカ

ン或コンガラテウ(日本)

基本 係脊椎動物鳥類游禽

類鵝鵝科。

產地 出溫熱兩帶諸地之淺

海中。

形態 鵝鵝爲水禽類鵝鵝屬之

一種。體大翼長。嘴亦長。約尺餘。直

而闊。嘴下有與嘴長之大皮囊。伸

縮自如。體極白色。略帶赤。翼上撥

風羽色黑。好羣居。善游泳。常以嘴

淘水。淘魚。得魚則閉口而收縮嘴

下皮囊。以出水吞魚。其肉可食。味

不美。脂肪可供藥用。

製法 李時珍曰。剝取其脂。熬

化。掠取。就以其味盛之。則不滲漏

他物即透走也。

通耳聾。

參攷資料 淘鵝油性走。能引

諸藥透入病所。拔毒。故能治腫毒

腫毒諸病(李時珍)

鵝鵝毛及皮 主治 反胃

酒服。吐食。燒存性。

鵝鵝舌 主治 疔瘡。

性質 鹹平。無毒。

鵝鵝嘴 主治 赤白久痢成

疳。燒存性。研末水服。

鵝 命名 鵝名自呼。故名。

古籍別名 家雁。舒雁。

外國名詞 Anser domestica

Geese (拉丁) ガチョー或ガテ

ウ(日本)

基本 係脊椎動物鳥類游禽

類鵝科之鵝。

形態 鵝爲家畜類水禽類之

一種。種類甚多。乃雁之變種。故形

似雄而大。頸長。尾足皆短。嘴扁闊

嘴根有肉疣。雄者則較膨大。羽色

有蒼白兩種。嘴足肉疣亦有黃及

黑褐之分。脚大有蹼。體長約二尺

有餘。翼不能飛。足行亦拙。聽覺敏

捷而性好鬥。人多豢養於河湖池

畔。覓穀類及魚蟲爲食。其肉可供

儲茹與藥用。



採取 以白鵝者良。

性質 甘平。無毒。

主治 利五臟。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食

療本草論鵝肉曰。解五臟熱。服丹

石人宜之。唐陳藏器本草拾遺

論鵝肉曰。煮汁止消渴。

參攷資料 鵝鵝食蟲。主射

工毒爲良。白鵝不食蟲。止渴爲勝

(陳藏器) 鵝氣味俱厚。發風發

瘡。莫此爲甚。火熏者尤毒。曾目擊

其害。而本草謂其性涼。利五臟。韓

愈醫通謂其疎風。豈其然哉。又葛

洪時後方云。人家養白鵝。白鴨。可

辟食射工。則謂白鵝不食蟲。不發

十八蠶 鯉

烹此者。必先抽去其筋。而他處不知也。甚以醉鯉爲病人珍味。豈不誤人。

配合應用 ①治水腫。范汪用大鯉魚一頭。醋三升。煮乾食。一日一作。范汪方。又用大鯉一尾。赤小豆一升。水二斗。煮食飲汁。一頓服盡。當下利。盡即差。(外臺祕要方) 亦治妊娠水腫。

②治水腫脹滿。赤尾鯉魚一頭。破開。不見水及鹽。以生礬五錢。研末入腹內。丸紙包裹。外以黃土泥包放竈內。煨熟取出。去紙泥。送粥食。頭者上消。食身尾者下消。一日用蠶屢試經驗。(醫方摘要方)

③治妊娠感寒。用鯉魚一頭。燒末。酒服方寸匕。令汗出。(祕錄方)

④治胎氣不長。用鯉魚肉同鹽煮汁飲之。(集驗方)

⑤治胎動不安。及婦人數傷胎。下血不止。用鯉魚一箇。治淨。阿膠炒一兩。糯米二合。水二升。入葱薑橘皮鹽各少許。煮糜食。五七日效。(聖惠方)

⑥治乳汁不通。用鯉魚一頭。燒末。每服一錢。酒調下。(產寶方)

⑦治咳嗽氣喘。用鯉魚一頭。去鱗。紙裹炮熟。去刺研末。同糯米煮粥。空心食。(食醫心鏡方)

⑧治久腫。惡風入腹。及女人新產。風入產戶內。如馬鞭。噓吸短氣。咳嗽者。用鯉魚長一尺五寸。以尿浸一宿。平旦以木篋從頭貫至尾。文火頓熟。去皮。空心頓食。勿用鹽醋。(外臺祕要方)

⑨治反胃吐食。用鯉魚一頭。童便浸一夜。炮焦研末。同米煮粥食之。(壽域方)

⑩治一切腫毒。無論已潰未潰者。用鯉魚燒灰。醋和塗之。以愈爲度。(外臺祕要方)

⑪治積年骨疔。一捏一汁出者。熬飴餹。勃瘡上。仍破生鯉魚。搗之。頃時刮視蟲出。更洗。傳藥。蟲盡則愈。(肘後方)

⑫治小兒木舌。長大滿口。鯉魚肉切片貼之。以帛繫定。(聖惠方)

施用宜忌 凡有風熱諸病者禁用。

參攷資料 ①鯉乃陰中之陽。其功長於利小便。故能消腫脹。黃疸。脚氣。喘嗽。溼熱之病。作鱸則性

溫。故能去痰結冷氣之病。燒之則從火化。故能發散風寒。平肺通乳。解腸胃及腫毒之邪。按劉河間云。鯉之治水。驚之利水。所謂因其氣相感也。(李時珍)

②鯉脊上兩筋。及黑血有毒。溪澗中者。毒在腦。俱不可食。凡鯉炙魚。不可使烟入目。損目光。則三日內必驗也。天行病後。下痢及宿穢。俱不可食。服天門冬。硃砂。人不可食。不可合犬肉及葵菜食。(孟詵)

【鯉魚汁粥】 基本 本品係用鯉魚汁和米煮成之粥。

主治 消水腫。

【鯉魚皮】 主治 癰疹。

歷代記述攷證

【鯉魚皮】 歷代記述攷證

①【明】李時珍本草綱目論鯉魚皮曰。燒灰水服。治魚鰓不出。

【鯉魚目】 主治 刺瘡傷。風傷。水作腫。燒灰傳之。汁出即愈。

【鯉魚血】 主治 小兒火瘡丹腫瘡毒。塗之立瘥。

【鯉魚脂】 主治 食之療小兒驚悸諸癰。

【鯉魚骨】 主治 女子赤白帶下。

歷代記述攷證 ①【唐】蘇恭新修本草論鯉魚骨曰。治陰瘡。魚鰓不出。

【鯉魚腦髓】 主治 諸癰。

歷代記述攷證 ①【宋】大明諸家本草論鯉魚腦髓曰。煮粥食。治暴聾。②【明】李時珍本草綱目論鯉魚腦髓曰。和膽類點目。皆治青盲。

【鯉魚腸】 主治 小兒肌瘡。

歷代記述攷證 ①【明】李時珍本草綱目論鯉魚腸曰。聾耳有蟲。同酢搗爛。帛裹塞之。痔瘻有蟲。切斷炙熟。帛裹之。坐。俱以蟲盡爲度。

【鯉魚齒】 主治 石淋爲末。陳醋調服。卒淋消服。

【鯉魚鮮】 性質 鹹。平。無毒。主治 殺蟲。

參攷資料 鯉魚鮮。不可合豆醬同食。令成消渴。(陶弘景)

【鯉魚膽】 性質 苦寒。無毒。主治 目熱赤痛。青盲。明目。久服強悍。益志氣。

色。味淡而鮮。氣香而蘊藉。夏秋多有之。其於四月間。感受梅雨溼蒸之氣而生。頗早者。爲之梅邊。味淡肉硬。不及秋生者佳。可供藥用。

性質 甘寒。無毒。

主治 開胃利腸。治痰渴。

【題眉】即鵝之古籍別名。典見爾雅。詳「鵝」條。

【鵝】即鵝之古籍別名。典見綱目。詳「鵝」條。

【葭草】即玄參之古籍別名。典見開寶本經。詳「玄參」條。

【騷騷】即血竭之原名。詳「血竭」條。

【魏去疾】即阿魏之古籍別名。典見和漢藥考。詳「阿魏」條。

【魏蠶蛾】即原蠶蛾之古籍別名。典見唐志。詳「原蠶蛾」條。

【鮮鮓】即海豚魚之古籍別名。典見綱目。詳「海豚魚」條。

【鮓魚】即石首魚之古籍別名。典見本草拾遺。詳「石首魚」條。

【鮓魚】本品形似輶輪。故名。

產地 生江湖中。

形態 鮓魚爲無鱗魚類。狀若

馬鞭。尾有兩歧。其肉可供藥用。

性質 甘平。無毒。

主治 五痔下血。瘀血在腹。

【鮓魚】本品即鮓魚之鹽漬而成者。

性質 鹹溫。無毒。

主治 小兒頭瘡。出膿水。以麻油煎熟。取油頻塗。

【鮓魚】即鮓魚之古籍別名。典見綱目。詳「鮓魚」條。

【鮓魚】即鮓魚之簡稱。詳「鮓魚」條。

【鮓魚】即海鰻魚之古籍別名。典見綱目。詳「海鰻魚」條。

【鮓魚】本品鱗有十字文理。故名。

古醫別名 赤鯉曰玄駒。白鯉曰黃鰻。黃鯉曰黃鰻。蘇頌。烏鯉魚。


外國名詞 Cypinus carpio L. (拉丁) Carp (英)。

基本 係水族動物。爲鱗屬之鯉魚。

產地 凡江湖池澤之淡水中。處處恒有出。

形態 本品大者長三四尺。體

扁而肥。鱗有黑點。其腸鱗一道。從頭至尾。爲數三十六口之前端。有觸鬚二對。青色蒼黑。腹淡黃。諸魚惟此供食最佳。其肉脂皮骨等。俱可入藥用。



魚 鯉

性質 甘平。無毒。

效能 行水消腫。理脚氣。治黃疸。用作利尿藥。

主治 煮食治咳逆上氣。黃疸。止渴。治水腫脚滿下氣。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論鯉魚曰。作鱸溫補。去冷氣。疫癘氣塊。橫關伏梁。結在心腹。宋。日華諸家本草論鯉魚曰。治懷妊身腫。及胎氣不安。明。李時珍本草綱目論鯉魚曰。煮食下水氣。利小便。燒末能發汗。定氣喘。咳嗽下乳汁。消腫米飲調服。治大

人小兒暴痢。用意便浸。燥。止反胃。及惡風入腹。清。黃宮繡本草求真論鯉魚曰。鯉魚氣味甘平。每於急流之水。跳躍而下。是鯉已有治水之功。且甘能入脾。故書載能下氣利水。凡因水氣內停。而見咳氣上逆。黃疸水腫脚氣等症。服此則能以治河間云。鯉之治水。因其氣以相應。是以外臺祕要用赤小豆一升。水二升。煮作三升。餘撇去渣。頓盡服。利。利盡即愈。又治孕婦水腫。亦效。然性寒。六陰。陽氣初生。故多食則能動風發熱也。魚鱗燒灰。可存性。可治產後血滯。鯉骨燒灰。可療魚骨哽。清。王士雄隨息居飲食譜論鯉魚曰。鯉魚甘溫下氣。功專行水。通乳利小便。滋飲止咳。嗽。治好娘子腫。傳癰腫骨疽。可鮮可脯。多食熱中。熱則生風。變生諸病。蓋諸魚在水。無一息之停。發風動疾。不獨鯉也。以鯉脊上有兩筋。故能神變而飛越江湖。爲諸魚之長品。雖拔萃。性不益人。杭俗以其爲聖子之諱。相戒勿食。最通。其兩筋及黑血皆有毒。天行病後及有宿癥者均忌。醉者尤其甚。義余遊藝。見

主治 下氣殺穀。除飲食。辟口臭。去邪毒。辟惡氣。久服通神明。輕身耐老。(本經)主吐血。衄血。血崩。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論水蘇曰。醱酒清酒及酒

煮汁常服。治頭風目眩及產後中風。惡血不止服之。彌妙。【宋】日華諸家本草論水蘇曰。治肺痿血痢。崩中帶下。【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論水蘇曰。主諸氣疾及脚腫。【明】李時珍本草綱目論水蘇曰。作生菜食。除胃間酸水。【清】黃宮繡本草求真論水蘇曰。雞蘇卽龍腦薄荷也。又名水蘇。係野生之物。味辛微溫。功有類於蘇薄。但蘇薄其性稍涼。水蘇其性稍溫。蘇薄其性主升。水蘇其性主降。蘇薄多於氣分疎散。水蘇多於血分溫利。故凡肺氣上逆。而見頭風目眩。與血瘀血熱。而見肺痿血痢。吐衄崩淋。喉腥口臭。邪熱等病者。皆當用此宣泄。俾熱除血止。而病自可以愈矣。但表疏汗出。其切忌焉。方莖中虛。似蘇葉而微長。齒面皺。氣甚辛烈。

配合應用 ①治漏血欲死。雞蘇汁一升服之。(梅師方)

②治吐血下血。雞蘇葉煎汁飲之。(梅師方)

③治吐血咳嗽。龍腦薄荷焙研末。米飲服一錢。取效。

④治衄血不止。用雞蘇五合。同搗。搗如棗核大。納鼻孔中即止。(梅師方)

⑤治腦熱鼻淵。肺癰多涕。雞蘇葉。麥門冬。川芎。薊。桑白皮。炒。黃耆。炙。甘草。炙。生地。黃芩。等分。爲末。煉蜜丸。梧子大。每服四十丸。人參湯下。(聖濟總錄方)

⑥治風熱頭痛。熱結上焦。致生風氣。痰厥頭痛。用水蘇葉五兩。皂莢炙去皮。子三兩。羌活。醋炒。焦。一兩。爲末。煉蜜丸。梧子大。每服二十丸。食後荊芥湯下。(聖惠方)

⑦治耳卒聾閉。雞蘇葉生搗。綿裹塞之。(孟詵方)

⑧沐髮冷香。雞蘇葉汁。或燒灰淋汁沐之。亦治頭生白屑。(普濟

方)

①治暑月目昏。多眵淚生。龍腦薄荷葉搗爛。生絹絞汁點之。(聖濟總錄方)

②治霍亂困篤。雞蘇三兩。水二升。煎一升。分三服。(聖惠方)

③治中諸魚毒。香蘇濃煮汁飲之。良。(肘後方)

④治蛇虺螫傷。龍腦薄荷葉研末。酒服并塗之。(易簡方)

用量 一錢至二錢

施用宜忌 凡氣虛無實邪者禁用。

參攷資料 ①水蘇處處有之。多生水岸旁。南人多以作菜。江北甚多。而人不取食。又江左人謂雞蘇。水蘇是兩種。陳藏器謂齊薊白是一物。非水蘇。水蘇葉有雁齒。氣香而辛。齊薊葉上有毛。稍長。氣臭也。又茵陳註云。江南所用茵陳。莖葉都似家茵陳。而大。高三四尺。氣極芬香。味甘辛。俗名龍腦薄荷也。

(蘇頌) ②水蘇氣味與紫蘇不同。辛而不和。然狀一如蘇。但面不紫。及周圍槎牙如雁齒耳。瑞曰。水蘇卽雞蘇。俗呼爲龍腦薄荷。(寇宗

爽) ③水蘇薊一類二種。雨水蘇氣香。薊薊氣臭。爲異。水蘇三月生苗。方莖中空。葉似蘇而微長。密齒面皺。色青。對節生。氣甚辛烈。六七月開花成穗。如蘇穗。水紅色。穗中有細子。狀如荊芥子。可種。易生宿根。亦自生沃地者。苗高四五尺。(李時珍) ④大都逆上之血。用之得宜的有殊效。似施於下行之血。不宜在方書中治下血者亦少也。(劉潛江)

【雞蘇】卽薄荷之古籍別名。典見和漢藥考。詳「薄荷」條。

【雞蘇葉】卽雞蘇之處方用名。詳「雞蘇」條。

【雞薊】性質 味甘平。

主治 消痰。益血。助脾。長力。生津。明目。爲五損虛癆神藥。

【雞鞭】命名 本品爲茅竹筍之發於竹邊者。形如鞭故名。

古籍別名 邊筍。竹邊。四月生者名梅邊。(綱目拾遺)

形態 雞鞭爲筍類之伏生於地中者。非若笋之生長出於土上。故地肥者鞭嫩。長者尺許。其籜白

【雞腿朮】即朮之產於孝豐境內。

天日山脈之仙丈峯者。肉質肥嫩。

形似雞腿。效能勝尋常朮類。用之。

入藥最佳。典見西吳里語詳『於朮』條。

【雞腿根】即翻白草之古籍別名。

典見救荒本草。詳『翻白草』條。

【雞腿莖】即莖之產於浙江省德清縣境內者。性質功效與尋常莖。

同詳『莖』條。

【雞腿蕒菰】即蕒菰之俗名。詳『蕒菰』條。

【雞腿胫】即雞腿皮之古籍別名。

典見綱目。詳『雞內金』條。

【雞齊】即葛根之古籍別名。典見本經。詳『葛根』條。

【雞齊根】即葛根之古籍別名。典見和漢藥考。詳『葛根』條。

【雞蟲草】產地 原野溼地多有之。

形態 雞蟲草爲溼草類之一種。葉似芋麻而氣臭。深秋開紫花。

結子如椒核。其草可供藥用。

主治 風毒流火疼痛。酒煮去渣服。

【雞頭菜】即芡實之古籍別名。典見和漢藥考。詳『芡實』條。

【雞頭菜】即芡實之古籍別名。典見和漢藥考。詳『芡實』條。

【雞頭菜】即芡實之古籍別名。典見和漢藥考。詳『芡實』條。

【雞頭菜】即芡實之古籍別名。典見和漢藥考。詳『芡實』條。

【雞頭菜】即芡實之古籍別名。典見和漢藥考。詳『芡實』條。

【雞頭菜】即芡實之古籍別名。典見和漢藥考。詳『芡實』條。

【雞頭菜】即芡實之古籍別名。典見和漢藥考。詳『芡實』條。

【雞頭菜】即芡實之古籍別名。典見和漢藥考。詳『芡實』條。

和漢藥考。詳『芡實』條。

【雞橋子】即枳椇子之古籍別名。典見綱目。詳『枳椇子』條。

【雞翎】主治 下血閉。左翅毛能起陰。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論雞翎曰。治婦人小便不禁。消陰癰瘰癧。便澀疽止。

小兒夜啼。安席下勿令母知。

【雞蕉子】即芭蕉實之小於牛蕉。四季結實者。性質功效與芭蕉實同。詳『芭蕉實』條。

【雞頭】即芡實之古籍別名。典見本經。詳『芡實』條。

【雞頭菜】基本 本品即芡實之莖葉。

古籍別名 荖菜（綱目）性質 鹹。甘平。無毒。

主治 止煩渴。除虛熱。生熟皆宜。

【雞頭菜】即芡實之古籍別名。典見和漢藥考。詳『芡實』條。

【雞頭菜】即芡實之古籍別名。典見和漢藥考。詳『芡實』條。

【雞頭菜】即芡實之古籍別名。典見和漢藥考。詳『芡實』條。

【雞頭菜】即芡實之古籍別名。典見和漢藥考。詳『芡實』條。

【雞頭菜】即芡實之古籍別名。典見和漢藥考。詳『芡實』條。

【雞頭菜】即芡實之古籍別名。典見和漢藥考。詳『芡實』條。

【雞頭菜】即芡實之古籍別名。典見和漢藥考。詳『芡實』條。

【雞頭菜】即芡實之古籍別名。典見和漢藥考。詳『芡實』條。

【雞頭菜】即芡實之古籍別名。典見和漢藥考。詳『芡實』條。

【雞頭菜】即芡實之古籍別名。典見和漢藥考。詳『芡實』條。

【雞頭菜】即芡實之古籍別名。典見和漢藥考。詳『芡實』條。

【雞頭菜】即芡實之古籍別名。典見和漢藥考。詳『芡實』條。

【雞頭菜】即芡實之古籍別名。典見和漢藥考。詳『芡實』條。

【雞頭菜】即芡實之古籍別名。典見和漢藥考。詳『芡實』條。

【雞頭菜】即芡實之古籍別名。典見和漢藥考。詳『芡實』條。

【雞頭盤】即芡實之古籍別名。典見和漢藥考。詳『芡實』條。

【雞鴨脚艾】命名 葉細多之。莖葉如雞鴨脚然。故名。搓之作艾香。

主治 腳氣疝氣。性質 苦微寒。無毒。

主治 目不明。肌膚瘡。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論雞鴨脚曰。月蝕瘡。透耳根。

日三塗之。【明】李時珍本草綱目論雞鴨脚曰。燈心藥。點胎赤眼甚良。

水化。搽痔瘡亦效。

【雞頭鶩】即竹雞之古籍別名。典見東坡集。詳『竹雞』條。

【雞頭鶩】即竹雞之古籍別名。典見東坡集。詳『竹雞』條。

【雞頭鶩】即竹雞之古籍別名。典見東坡集。詳『竹雞』條。

【雞頭鶩】即竹雞之古籍別名。典見東坡集。詳『竹雞』條。

【雞頭鶩】即竹雞之古籍別名。典見東坡集。詳『竹雞』條。

【雞頭鶩】即竹雞之古籍別名。典見東坡集。詳『竹雞』條。

【雞頭鶩】即竹雞之古籍別名。典見東坡集。詳『竹雞』條。

【雞頭鶩】即竹雞之古籍別名。典見東坡集。詳『竹雞』條。

【雞頭鶩】即竹雞之古籍別名。典見東坡集。詳『竹雞』條。

【雞頭鶩】即竹雞之古籍別名。典見東坡集。詳『竹雞』條。

【雞頭鶩】即竹雞之古籍別名。典見東坡集。詳『竹雞』條。

【雞頭鶩】即竹雞之古籍別名。典見東坡集。詳『竹雞』條。

【雞頭鶩】即竹雞之古籍別名。典見東坡集。詳『竹雞』條。

【雞頭鶩】即竹雞之古籍別名。典見東坡集。詳『竹雞』條。

【雞頭鶩】即竹雞之古籍別名。典見東坡集。詳『竹雞』條。

【雞頭鶩】即竹雞之古籍別名。典見東坡集。詳『竹雞』條。

【雞頭鶩】即竹雞之古籍別名。典見東坡集。詳『竹雞』條。

【雞頭鶩】即竹雞之古籍別名。典見東坡集。詳『竹雞』條。

外國名詞 Steady's asper, Michx. var. japonica. Maxim.

（拉丁）イヌゴマ チヨロギ

タマシ（日本）

基本 係唇形科水蘇屬。爲水蘇之莖葉。

產地 凡山野原澤間恒有出。

形態 水蘇爲芳草類之生草。本高三二尺。春生苗。其莖方形。中空。直立。密生粗毛。葉如蘇葉而粗。

糙。爲箭鏃形。生皺紋。有鋸齒而色青。亦有毛。葉柄短而對生。氣甚辛烈。夏日莖端開唇形之花。花色淡紅。微紫。成穗。其花叢生於莖之上部。葉腋間如輪狀。凡數層。花穗中有細子如芥。

採取 六七月間採之。

製法 採得陰乾用。

性質 辛微溫。無毒。

效能 散風溼。止吐衄。用作解熱止血藥。

蘇 雞

蘇 雞

蘇 雞

蘇 雞

蘇 雞

蘇 雞

蘇 雞

蘇 雞

蘇 雞

蘇 雞

蘇 雞

蘇 雞

蘇 雞

蘇 雞

焦。以滾水半杯沖入。油浮水面。取出冷透用。

【雞項草】即大薊之古籍別名。典見圖經本草。詳「大薊」條。

【雞痘】
古籍別名 陰落。（別錄）

基本 雞痘為雞草類之一種。可供藥用。

性質 甘。平。無毒。

主治 補中止洩痢。療女子白沃。明目消水腫。祛風寒邪氣。

【雞翅蕩】即菱實之色碧狀如雞飛者。性質功效與菱同。詳「菱」條。

【雞腎】
俗名 雞腰。

主治 翹鼻作臭用一對。與豚前肉等分。入豉七粒。新瓦剖研。以雞子清和作餅。安鼻前引蟲出。

【雞菌】即雞蹠之古籍別名。典見綱目。詳「雞蹠」條。

【雞距子】即枳椇子之處方用名。詳「枳椇子」條。

【雞桐粘】即天芥菜之古籍別名。典見綱目。詳「天芥菜」條。

【雞嗉】
主治 小便不禁。及氣噎。食不消。

【雞腦】
主治 小兒驚癇。燒灰酒服。治雞產。

【雞腰】即雞腎之俗名。詳「雞腎」條。

【雞脚草】
古籍別名 子名勝。光子（綱目拾遺）雞爪花。（汪連仕採藥書）

產地 多生澤畔間。

形態 雞脚草為雞草類之一種。赤莖對葉狀似百合。其子可供藥用。根詳見該條。



雞脚草

效能 清肝。去星翳。明目。

主治 赤白久痢成疳。

【雞脚草根】
效能 祛風。行血。

主治 療大麻瘋。鶴膝瘋。雞爪瘋。

【雞脚菜】即石花菜稍粗如雞爪者之古籍別名。典見綱目。詳「石花菜」條。

【雞脚黃連】即黃連之形如雞爪者。詳「黃連」條。

者。詳「黃連」條。

【雞脚膠】
產地 出雲南雞足山近地土中。

形態 雞脚膠為土類之一種。狀如碎甌。入火即炸如膠。

主治 風疾。

【雞腸】
主治 遺溺。小便數不禁。燒存性。每服三指酒下。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論雞腸曰。止遺精白濁消渴。

【雞腸】即羅摩之古籍別名。典見和漢藥考。詳「羅摩」條。

【雞腸草】
別名 附地菜。

產地 原野澤地多有之。

形態 雞腸草為菜類之一種。三月生苗。莖高七八尺。葉帶紫色。而為橢圓形。四月開五出小紫花。作卷繖花序。花軸之端拳曲。至秋結小實。實中有細子。其苗可供蔬茹與藥用。

性質 微辛。苦。平。無毒。

主治 毒腫。止小便利。

歷代記述攷證 【南北朝】陶弘景本草集註論雞腸草曰。療蠱變溺瘡。【唐】甄權藥性本草論雞腸草曰。主遺溺。洗手足。傷水爛。

【唐】孟詵食療本草論雞腸草曰。五月五日作灰和鹽。療一切瘡及風丹。遍身痒痛。亦可搗封。日五六易之。作菜食。益人。去脂。骨毒氣。又燒傅疳。蠱。取汁和蜜服。療小兒赤白痢。甚良。【宋】蘇頌圖經本草論雞腸草曰。研末或燒灰。搗齒。去宜露。

【雞腸草】即石胡荽之古籍別名。典見千金方。詳「石胡荽」條。

【雞雍】即灰實之古籍別名。典見莊子。詳「灰實」條。

【雞蹠】
命名 本品味似雞。故名。

古籍別名 雞菌。丁薏。（綱目）

產地 多生沙地間。

形態 雞蹠為菜類。單屬之一種。高脚繖頭。味勝香。單可供食與藥用。

性質 甘。平。無毒。

主治 益胃。清神。治痔。

【雞精】即姑活之古籍別名。典見別錄。詳「姑活」條。

so Plasma 而成。猶人卵之胚小胞。乃雞雞之母細胞也。胚小胞之外爲卵黃。名曰養卵黃(Dotter)由多數之卵黃小球而成。可以顯微鏡窺得之。取熟雞蛋切開。見養卵黃作黃色與淡黃色層層相間而成。其淡黃色者名曰白色卵黃(Weiße Dotter)。黃色者曰黃色卵黃(Gelbe Dotter)。白色卵黃不甚凝固。黃色卵黃凝固甚堅。白色卵黃之在胚小胞之下者形如電燈泡深入卵予之中央。特名之曰隱宮(Latebra)。隱宮與胚小胞之間。爲狀略狹。名曰彭氏核(Pander'sche Kern)。

胚小胞即安置於其上。隱宮之周圍有菲薄之膜。即由白色卵黃而成。其外即爲黃色卵黃。黃色卵黃之外再爲白色卵黃。如此層層相間而成養卵黃。當卵發育之時。以之爲營養物者也。眞卵與被膜之間(即蛋黃與蛋白之間)又有一皺襞膜。名曰卵黃膜。所以包圍眞卵者也。

配合應用 ①治天行不解。已汗者。用新生雞子五枚。傾盞中入

水。一雞子攪渾。以水一升。煮沸。投入納少嚕嚕之。令汗出愈。(許仁則方)

②治天行嘔逆。食入即吐。雞子一枚。水煮三五沸。冷水浸少頃。吞之。(外臺祕要方)

③治傷寒發狂。煩燥熱極。吞生雞子一枚。效。(食鑑方)

④治三十六黃急救方。用雞子一顆。連殼燒灰研。酢一合。和之。溫服。鼻中蟲出爲效。身體極黃者。不過三枚神效。(外臺祕要方)

⑤治身面腫滿。雞子黃白相和塗腫處。乾再上。(肘後方)

⑥治年深哮喘。以雞子略敲損。浸尿缸中三四日。煮食能去風痰。(集成方)

⑦治心氣作痛。雞子一枚。打破。醋二合調服。(肘後方)

⑧治小兒疳痢。肚脹。用雞子一箇。開孔入巴豆一粒。輕粉一錢。用紙五十重。裹於飯上。蒸三度。放冷去殼。研入麝香少許。糊和丸。米粒大。食後溫湯下二九至三九。(經驗方)

⑨治預解痘毒。用雞卵一枚。活

地龍一條。入卵內。飯上蒸熟。去地龍與兒食。每歲立春日食一枚。終身不出痘也。(保和方)李氏用雞卵一枚。童便浸七日。水煮食之。永不出痘。李捷用頭生雞子三五枚。浸廟坑內五七日。取出。煮熟與食。數日再食一枚。永不出痘。徐都司得於浙人之方。

⑩治痘瘡未癒。雞子一箇。酒醋浸七日。白蠟蠟二七枚和勻。搽赤塗之甚效。(聖惠方)

⑪治雀卵面皰。雞卵醋浸壞。取出傳之。(聖惠方)

⑫治妊娠時疾。冷胎不動。以雞子七枚。納井中。令冷。取出打破吞之。(子母祕錄方)

⑬病欲去胎。雞子一枚。入鹽三指撮服。(張文仲方)

⑭治胎動下血。雞子二枚。打破。以白粉和稀食之。(藏器方)

⑮治產後血多不止。烏雞子三枚。醋半升。酒二升。和攪煮取一升。分四服。拾遺方)

⑯治產後口乾舌縮。用雞子一枚。打破。水一盞攪服。(經驗方)

⑰治婦人白帶。用酒及艾葉煮

雞卵。日日食之。(袖珍方)

⑱治頭風白屑。新下烏雞子三枚。沸湯五升。攪作三度。沐之甚良。(集成方)

⑲腋下胡臭。雞子兩枚。煮熟去殼。夾待冷。裏之三叉路上。勿回顧。如此三次效。(肘後方)

⑳治癰疽發背。初作。及經十日以上。腫赤焮熱。日夜疼痛。百藥不效者。用膠雞子一枚。新狗屎如雞子大。攪勻。微火熬。令稀稠得所。捻作餅子。於腫頭上貼之。以帛包抹。時時看視。覺餅熱即易。勿令轉動。及歇氣。經一宿。定如日多者。三日貼之一日。一易。至瘡乃止。(千金方)

㉑治蛛蠅蛇傷。用雞子一箇。輕敲小孔。合之。立癒。亦治蠅蝨尿瘡。(兵部手集方)

用量 一枚至二枚。

施用宜忌 凡消化不良而有溼滯者。禁用。長醇醋。參攷資料 雞蛋白。最能殺蟲。諸瘡破爛。不可忍。或不收口者。搽之大有神效。其法用雞蛋數個。煮熟剝去殼。及蛋白。用黃乾煎枯

十八畫 雞

分二五·七六。蛋白質四·六四。脂肪四·八五。灰分〇三·二。全卵共約三六·一〇。戊種計水分一三·一五。蛋白質二·三五。脂肪三·一一。灰分〇·一六。全卵共約一九·三〇。

效能 鎮心定驚。潤肺寧嗽。用作滋養強壯藥。

主治 除熱火灼。爛瘡癰瘡。可作虎魄神物。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論雞子曰小兒發熱以白蜜一合和三顆攪服立瘥【唐】陳藏器本草拾遺論雞子曰益氣以濁水煮一枚連水服之主產後痢和蠟煎止小兒痢【宋】日華諸家本草論雞子曰鎮心安五臟止驚安胎治妊天行熱疾狂走男子陰囊溼痒及開喉聲失音醋煮食之治赤白久痢及產後虛痢光粉同炒乾止疳痢及婦人陰瘡和豆淋酒服治賊風麻痺醋浸令壞傳斑點作酒止產後血暈暖水臟縮小便止耳鳴和蠟炒治耳鳴聾及疳痢【明】繆希雍本草經疏論雞子曰雞子稟生化最初之氣如混

沌未分之形故卵白象天其氣清其性微寒卵黃象地其氣濁其性微溫卵則兼清濁而為體其味甘氣平無毒丹潤瘡皆火熱為病雞子之甘能緩火之標平即兼涼能除熱故主癰瘡及火瘡并治傷寒少陰咽痛神效【清】黃宮繡本草求真論雞子曰雞子性稟生化最初之氣兼清濁而為體味甘氣寒性專除熱療火為風熱癰瘡及傷寒少陰咽痛必用之藥卵清微寒性專治熱解毒為目痛赤痛煩滿咳逆小兒下洩婦人難產胞衣不出癰疽敷腫必用之藥卵黃微溫性專利產安胎但多食則滯【清】王士雄隨息居飲食譜論雞子曰雞卵甘平補血安胎鎮心清熱開音止渴濡燥除煩解毒息風潤下止逆新下者良並宜打散以白湯或米飲或豆腐漿攪熱服若固國養食性極難熟雖可果腹甚不易消惟帶殼略煮之後將殼擊碎再入瓷罐內多加粗茶葉同煨三日茶汁既入蛋亦熟透剝殼食之色黑而味香美不甚阻滯也多食動風阻氣諸外感及瘧疸疳痞腫滿

肝鬱痰飲脚氣痘疹皆不可食小兒產婦氣壯者幸食無恙弱者多因此成疾不可不知

近人學說

丁福保曰雞子

為健康上有裨益之食物然依母雞之種類與飼料及飼養法常生種種之變化則不免稍有差違但雞子之有益於人身而營養上效力甚多為世人所確認惟多量食之則有妨消化害胃部誘起下痢且其滋味雖豐非半生半熟者亦不能以有效又曰因自己之食用而飼養雌雞使之產卵者若待雌雞產二三卵後而取出之則不如產後即次第取出為宜如斯取集之卵雖久經日數亦無腐敗之虞蓋雌雞產卵之際常有多量之熱度者也又雞性善性而多疑產卵之際疑怖益甚往往倉皇奔走選擇產所故產卵時尤宜遠離其產所使之絕無恐怖之念慮否則致折角產卵而中止於中途徐綸曰雞蛋者雞之卵也故一名雞卵在胎生學上屬於多黃卵(Dotterichen Ei)以其富有養卵黃(Dotter)也亦屬

一八三八

於局在卵黃卵(Telioothale)因其養卵黃偏在於一側也雞卵分卵子與被膜二種被膜有三在外者色淡紅而微帶黃色質堅而脆名曰卵殼 (Schale) 其百分之九十八由石灰鹽類而成細察之見有無數之小孔為交通內外供給卵之呼吸而設若以沙塗抹之則卵之死亡可立而待也其次曰殼膜 (Schalenhaut) 為堅硬白色之膜凡二層常互相密結惟在鈍端則分離在外者曰殼膜外層在內者曰殼膜內層內外二層之間蓄有空氣為卵發育時呼吸之用名曰氣室內層最薄曰蛋白即俗所謂雞蛋清是也由蛋白質脂肪鹽類與水而成為無色透明軟滑之流動體中心之真卵受其保護者也卵子者黃色柔軟之流動體即俗所謂蛋黃是也其兩端有紐狀之核各一條名曰繫帶 (Halschale) 亦名卵索 (Chalazen) 侵入於蛋白之內以固定卵之位置使不致旋轉傾覆也卵子之上方有一核名曰胚小胞 (Klein blöschchen) 由Dear

●治瘰癧死未絕。雞矢白如棗大。酒半盞和灌口鼻。(肘後方)

●治尸腳。疥裂無冬夏者。雞屎煮湯。漬半日。取瘡乃止。(千金方)

●治射工溪毒。白雞矢白者二枚。以錫和塗瘡上。(肘後方)

●治骨疽。不合骨從孔中出。掘地作坑。口裏大深三尺許。以乾雞屎二升。同艾及荊葉搗碎。入坑內。燒令烟出。以痘口就熏。用衣擁之。勿令洩氣。半日。當有蟲出。甚效。(千金方)

●治陰毒腹痛。雞糞。烏豆。地膚子。各一把。亂髮一團。同炒烟起。傾入好酒一椀。浸之。去滓熱服。即止。(生生編方)

●治小兒心痛。白鳥骨雞屎五錢。曝研。松脂五錢。爲末。葱頭汁和丸。梧子大。黃丹爲衣。每醋湯服五丸。忌生冷硬物。三四日立效。(嬰童百問方)

●用薑 錢半至三錢。

【雞屎草】即常山之古籍別名。典見諸家本草。詳「常山」條。

【雞屎礬】即礬石之有雜色如雞屎者。性質功效與礬石同。詳「礬石」條。

石」條。

【雞栖子】即皂莢之古籍別名。典見綱目。詳「皂莢」條。

【雞格】即黃精之古籍別名。典見別錄。詳「黃精」條。

【雞桐】產地 生嶺南山野間。形態 雞桐爲桐之一種。其葉如棟。可供藥用。

主治 足膝風。溼痺痛。煮湯洗。

【雞神水】製法 擇大蘿服一頭。開勿傷其根。方可活。孔內入雞蛋一枚。仍種地上。俟其發葉。取雞蛋內水。即雞神水。

性質 甘涼。

主治 明目去瘴。

【雞桑】即桑之花葉俱薄者。性質功效與尋常桑葉同。詳「葉桑」條。

【雞翁藤】形態 雞翁藤爲蔓草類之一種。蔓延水上。有葉無花。其莖根可供藥用。

性質 辛溫無毒。

主治 功同崖椒根。

【雞翅木子】即相思子之別名。詳「相思子」條。

【雞骨升麻】即升麻之皮細色青緣者。詳「升麻」條。

【雞骨香】即降真香之古籍別名。典見綱目。詳「降真香」條。

【雞蛋】古醫別名 雞卵。(和漢藥考) 雞子。(俗名)

外國名詞 *Ovum gallinae* (拉丁)

基本 屬鷄類。爲雌鷄所產之卵。

產地 各地咸有出焉。

形態 卵之形狀人所共知。卵殼之內。被以白膜。中存卵黃與卵白。卵黃俗呼雞子黃。卵白俗呼雞子白。卵殼色白。或作淡褐黃色。有無數細孔。孵化之際。由此流通空氣。若有黴菌自此細孔侵入。即令全卵腐敗。卵殼內有一層白色強韌之膜。謂卵殼膜。卵白成自蛋白質。內部較外部易於流動。別有薄膜包之。謂之卵白膜。卵黃係白色。

卵黃與黃色卵黃二種。重疊間層而成。因卵黃膜而爲球形。胚盤在卵黃中。爲原形質與核。孵化之際。核自分裂。漸化爲雛。以卵黃與卵白爲其養料。氣室在卵之鈍端。介

於卵殼膜與卵白膜之間。爲貯藏空氣之處。產卵後經時過久。其氣室愈增大。

製法 凡採得須密藏。以防壞變。入藥殼去衣用。

性質 甘平無毒。

成分 各種雞卵之成分。頗不一定。然大致相同。卵殼約含炭酸鈣九〇%。磷酸鈣五七%。膠質少許。卵白約含蛋白質一二至一四%。水分若干。卵黃約含卵黃素一五。七%。無磷之蛋白質及脂肪。

鹽類各少許。青木清一曾取雞卵十六種。鴨卵兩種。各試驗其成分。檢定之結果。刻於藥學雜誌第二百二十號。茲摘錄如下。(各數字係指各卵之互量而言。)

甲種成分計水分三九。九二。蛋白質六。九三。脂肪五。〇五。灰分〇。四五。全卵共約五三。六五。乙種計水分三四。一七。蛋白質六。〇八。脂肪六。〇八。灰分〇。三。

五。全卵共約四七。六〇。丙種計水分三三。一七。蛋白質五。一八。脂肪四。三八。灰分〇。四四。全卵成分四四。一〇。丁種計水

十八畫 雞

一兩。丁香一錢爲末。蒸餅丸。小豆大。每米湯下十九日。三服。(活効全書方)

②治心腹蠶癥。及宿癥。并卒得癥。以飯飼白雄雞。取糞。同小便於瓦器中熬黃爲末。每服方寸匕。溫酒服之。日四五服。或雞飯飼之。以消爲度。亦佳。(集驗方)

③治食米成癥。好食生米。口中出清水。以雞矢同白米各半合。炒爲末。以水一鍾調服之。良久。吐出如米形。卽瘥。昔慎恭道病此。飢瘦如勞。蜀僧道廣處此方而愈。(醫說方)

④治反胃吐食。以烏骨雞一隻。與水飲四五日。勿與食。將五蒲蛇二條。竹刀切。與食。待雞下糞。取陰乾爲末。水丸。米粟大。每服一分。桃仁湯下。五七服卽愈。(證治發明方)

⑤治中諸毒。發狂吐下欲死。用雞矢燒末。水服方寸匕。(葛氏方)

⑥治石淋疼痛。雞矢白。日中半乾。炒香爲末。以酸漿飲服方寸匕。日二。當下石出。(古今錄驗方)

⑦治小兒血淋。雞矢尖白如粉者。炒研糊丸。菟豆大。每服三五丸。酒下四五服効。

⑧治產後遺溺不禁。雞矢燒灰。酒服方寸匕。(產寶方)

⑨治轉筋入腹。其人臂脚直。其脈上下行。微弦。用雞矢爲末。水六合。和方寸匕。溫服。(仲景方)

⑩治中風寒痺。口噤不知人。以雞矢白一升。炒黃入酒三升。攪澄清飲。(葛氏方)

⑪治白虎風痛。鋪飯於患處。以丹雄雞食之。良久。取熱糞封之。取訖。使伏於患人牀下。(玉函方)

⑫治破傷中風。腰脊反張。牙緊口噤。四肢強直。用雞矢白一升。大豆五升。炒黃。以酒沃之。微烹。令豆澄下。隨量飲。取汗。避風。(經方)

⑬治產後中風。口噤。瘈瘲。角弓反張。黑豆二升半。同雞矢白一升。炒熟入清酒一升半。浸取一升。入竹瀝服。取汗。(產寶方)

⑭治角弓反張。四肢不隨。煩亂欲死。雞矢白一升。清酒五升。搗篩合。揚千遍。乃飲。大人服一升。少小五合。日二服。(肘後方)

⑮治小兒口。噤面赤者。屬心。白者屬肺。用雞矢白如棗大。綿裹。以水一合。煮分二服。一方酒研服之。(千金方)

⑯治小兒驚風。雞矢白研末。傅之。有涎易去。(聖惠方)

⑰治小兒驚啼。雞矢白燒灰。米飲服二字。(千金方)

⑱治頭風痺木。用臘月烏雞矢一升。炒黃爲末。絹袋盛。漬三升酒中。頻頻溫服。令醉。(千金方)

⑲治喉痺腫痛。雞矢白含之。嚥汁。(聖惠方)

⑳治牙齒疼痛。雞矢白燒末。綿裹。咬痛處立瘥。(經驗方)

㉑治鼻血不止。雞矢取有白色半截者。燒灰吹之。(唐氏經驗方)

㉒治牙齒不生。不拘大人小兒。用雄雞矢雌雞矢十五顆。焙研。入麝香少許。先以針挑破出血。傅之。年高者不過二十日。年少者十日必生。(普濟方)

但用烏雞雌雞糞入舊麻鞋底。燒存性等分。入麝香少許。三日夜不住擦。令熱爲佳。

㉓治耳聾不聽。雞矢白炒半斤。烏豆炒一升。以無灰酒二升。煮熱

一八三六

投入服。取汗。耳如鼓聲。勿訝。(外臺祕要方)

㉔治面目黃疸。雞矢白。小豆。桃米各二分。爲末。分作三服。水下。當有黃汁出也。(肘後方)

㉕治子死腹中。雌雞糞二十一枚。水二升五合。煮之下米作粥食。(產寶方)

㉖治乳妬乳癰。雞矢白炒研。酒服方寸匕。三服愈。亦治乳頭破裂。(產寶方)

㉗治內癰未成。取伏雞尿。水和服。卽瘥。(千金方)

㉘治頭瘡白禿。雄雞屎末。和陳醬苦酒洗之。(千金方)

㉙消滅癰瘰。以豬脂三升。飼烏雞一隻。三日後取矢。同白芷。當歸各一兩。煎干。沸去滓。入嚙矢白半兩。調傅。外臺祕要方)

㉚治耳中惡瘡。雞矢白炒研。傅之。(聖惠方)

㉛治癰癧瘰癧。雄雞燒灰。矢。臘豬脂和傅之。(千金方)

㉜治食中毒未死。取雞矢半升。水淋取汁一升。飲之。日三。(肘後方)

口中效。(肘後方)

①治卒縱垂死。心口猶溫者。勿斷繩。刺雞冠血滴口中。以安心神。或云男用雌。女用雄。(肘後方)

②治小兒卒驚。似有痛處。不知疾狀。用雄雞冠血少許。滴口中。妙。(譚氏小兒方)

③治小兒解頰。丹雄雞冠上血滴之。以赤芍藥末粉之。甚良。(普濟方)

④治陰毒卒痛。用雄雞冠血入熱酒中飲之。暖臥取汗。(傷寒蘊要方)

⑤治女人陰血。女人交接違理。血出。用雄雞冠血塗之。(集驗方)

⑥治爛弦風眼。雞冠血點之。日三五度。(聖惠方)

⑦治對口毒瘡。熱雞血頻塗之。取散。皆效方)

⑧治發背癰疽。用雄雞冠血滴疽上。血盡再換。不過五六雞。痛止毒散。數日自愈。(保壽堂方)

⑨治浸淫瘡毒。不早治。周身殺人。以雞冠血塗之。日四五度。(肘後方)

⑩治燥癬作痒。雄雞冠血頻頻塗之。(汪范方)

塗之。(汪范方)

①治馬咬成瘡。腫痛。可用雞冠血塗之。駁馬用雌雞。牝馬用雄雞。(肘後方)

②治蜈蚣咬瘡。雞冠血塗之。亦治蜘蛛咬瘡。(錢相公藥中方)

③治中蜈蚣毒。舌脹出口是也。雄雞冠血浸舌并咽之。(青囊雜纂方)

④治諸蟲入耳。雞冠血滴入即出。(勝金方)

⑤治諸蟲入耳。雞冠血滴入即出。(勝金方)

【雞冠花】 命名。本品花狀如雞冠。故名。

外國名詞 Celosia cristata, L. (拉丁)

基本 屬莧科。為雞冠之花與種子。

產地 雞冠花各處皆有。陳仁山藥物生產辨云。雞冠花分紅黃白各色。論雞冠花兩字本成一球。

乃為雞冠。以市上所賣插瓶之雞冠花為正。現藥肆所沽之雞冠花乃單尾直上。不成球體。為得謂之雞冠花。宜確此種係門青花。各處

海灘野生。無限之多。既錯於前。勿錯於後。

形體 雞冠為一年生草本。莖高達二三尺。葉互生。作長卵圓形。或廣披針形。花朵頗小。秋。日開於梢頭。色有紅。白。黃。三種。聚生為雞冠花序。種子色黑。粒甚微細。



雞冠花

種植 園圃間恒有栽植。以供玩賞者。

採取 七八月間採花曬乾。

製法 凡使花焙炙。子微炒用。性質 甘涼。無毒。

效能 治痔。止痢。用為痔疾及下痢藥。

主治 痔漏下血赤白。下痢崩中。赤白帶下。分赤白用。

歷代記述攷證 【清】黃元御玉樞藥解論雞冠花曰。雞冠止九竅失血吐血。崩漏淋痢。諸血皆止。並治帶淋之證。花與子同功。

配合應用 ①治吐血不止。白

雞冠花。醋浸。煮七次為末。每服二錢。熱酒下。(經驗方)

②治結陰便血。雞冠花。椿根白皮。等分為末。煉蜜為丸。梧子大。每服三十九。黃芪湯下。日二服。(聖濟總錄方)

③治遺後下血。白雞冠花并子炒煎服。(聖惠方)

④治五痔紅腫。久不愈。變成瘻瘡。用雞冠花。鳳眼草。各一兩。水二盞。煎湯頻洗。(衛生寶鑑方)

⑤治下血脫肛。白雞冠花。防風。等分為末。糊丸。梧子大。空心米飲。每服七十九。一方白雞冠花炒。櫻欄灰羌活一兩為末。每服二錢。米飲下。(永類鈴方)

⑥治經水不止。紅雞冠花一味。乾曬為末。每服二錢。空心酒調下。忌魚腥豬肉。

⑦治產後血痛。白雞冠花酒煎服之。(李樓奇方)

⑧治婦人白帶。白雞冠花曬乾為末。每日空心酒服三錢。赤帶用紅者。(孫氏集效力)

⑨治白帶沙淋。用白雞冠花。苦蜜蘆。等分燒存性。空心火酒服之。

⑩治白帶沙淋。用白雞冠花。苦蜜蘆。等分燒存性。空心火酒服之。

⑪治白帶沙淋。用白雞冠花。苦蜜蘆。等分燒存性。空心火酒服之。

⑫治白帶沙淋。用白雞冠花。苦蜜蘆。等分燒存性。空心火酒服之。

⑬治白帶沙淋。用白雞冠花。苦蜜蘆。等分燒存性。空心火酒服之。

和男子乳封常出。【明】李時珍本

草綱目論鴉尾毛曰。解蜀椒毒。燒煙吸之。并水調灰服。又治小兒痘瘡後生癰。燒灰和水傳之。

【雞杓子】即枳椇子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「枳椇子」條。

【雞肝】性質 甘苦溫無毒。主治 起陰。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論雞肝曰。補腎。治心腹痛。安漏胎下血。以一具切和酒五合服之。【明】李時珍本草綱目論雞肝曰。療風虛目暗。治女人陰蝕瘡。切片納入。引蟲出盡良。

【雞肝草】即兔肝草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「兔肝草」條。

【雞肝粥】基本 本品係以雞肝和米煮成之粥。主治 補肝虛明目。

【雞豆】即茨實之古籍別名。典見和漢藥考。詳「茨實」條。

【雞足】即茨實之古籍別名。典見和漢藥考。詳「茨實」條。○即山菜莫之古籍別名。典見吳普本草。詳「山菜莫」條。

【雞足草】即井口邊草之日本別

名。詳「井口邊草」條。

【雞味兒】即茨實之古籍別名。典見和漢藥考。詳「茨實」條。

【雞抱出卵殼】命名 本品之卵殼。故名。乃雞離脫脫之卵殼。故名。古籍別名 混沌池。鳳凰蛻。（綱目）

主治 研末。磨障翳。

歷代記述攷證 【宋】蘇頌圖經本草論雞抱出卵殼曰。傷寒勞復。熱令黃黑。爲未熱湯和一合服。取汁出。即愈。【明】李時珍本草綱目論雞抱出卵殼曰。燒灰油調塗。癰及小兒頭身諸瘡。酒服二錢。治反胃。

【雞盲草】即遍地金之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「遍地金」條。

【雞肪】性質 甘寒無毒。主治 耳聾。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論雞肪曰。治頭禿髮落。命名 本品宜與雞養食之。故名。

【雞侯菜】產地 生嶺南諸地。形態 雞侯菜爲雞草類之一

種。二月生苗。其形如艾。可供藥用。

性質 辛溫無毒。主治 溫中益氣。

【雞冠】即雞冠花之原名。詳「雞冠花」條。

【雞冠石】即雄黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳「雄黃」條。

【雞冠血】處方用名 雄雞冠血。基本 屬鷄類。爲雄雞頭冠中之血液。

採取 採無時。以三年雄雞之冠血尤良。外塗或內飲用。

性質 鹹平無毒。效能 治中惡驚癇。塗諸瘡蟲毒。用作解毒藥。

主治 烏鴉者主乳雞。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論雞冠血曰。治目淚不止。每日點三次。良。【宋】日華諸家本草論雞冠血曰。丹雞者。治白癰風。

【明】李時珍本草綱目論雞冠血曰。亦點暴赤目。並療經絡間風熱。塗頰治口喎不正。塗面治中惡卒死。飲之治瘧死欲絕。及小兒卒驚客忤。塗諸瘡癰。蜈蚣蜘蛛毒。馬嚼

瘡。百蟲入耳。【明】繆希雍本草經疏論雞冠血曰。雞冠血主乳雞。用三年老雄者。取其陽氣充溢也。凡風中血脈。則口角僻。雞冠血鹹而走血透肌肉。故以之治中風口喎不正。塗頰上效。丹雞爲陽。冠血乃諸陽之所聚。故能治中惡客忤。邪氣。高武痘疹正宗云。雞冠血和酒服。發痘最佳。【清】黃宮繡本草求真論雞冠血曰。雞冠位處至高。精華所聚。凡年久雄雞色赤。尤爲陽氣充盛。故可刺血。以治中惡驚悸。及或中風口喎。嚼斜。用血塗其頰上。即正。雞血和酒調服。可以便痘即發。對口毒瘡。可用血塗。即散。中蜈蚣毒。舌脹出口。可用冠血浸舌。并咽即消。其效甚衆。

配合應用 一治鬼擊卒死。烏雞冠血澀口中。令嘔。仍破此雞揭心下。冷乃藥之道。邊妙。（肘後方）

一治卒死。寢死或寢臥奄忽而絕。皆是中惡。用雄雞冠血塗面上。乾則再上。仍吹入鼻中。并以灰營死人一周。（肘後方）

一治卒然忤死。不能言。用雞冠血和真珠丸。小豆。大納三四丸入

一八三三

十八畫 雞

雞

雞

雞

雞

雞

雞

雞

雞

【雞舌香】 命名 本品即丁香之雌者。實擊破有順理。解而為兩。形如雞舌。故名。

性質 辛微溫。無毒。

主治 風水毒腫。霍亂心痛。去惡熱。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥

性本草論雞舌香曰。吹鼻殺腦疳。入諸香中。令人身香。【唐】陳藏器本草拾遺論雞舌香曰。同薑汁塗拔去白鬚孔中。即生黑者。

【雞舌香】 即丁香之古籍別名。典見別錄。詳「丁香」條。

【雞血】 性質 鹹平。無毒。

主治 膝折骨痛及癢痺。中惡腹痛。乳雞。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器

本草拾遺論雞血曰。治刺驢馬被傷。及馬咬人。以熱血浸之。白癰風癰瘍。以雞雞翅下血塗之。【明】李時珍本草綱目論雞血曰。熱血服之主小兒下血。及驚風解丹毒。癰毒。鬼排陰毒。安神定志。

【雞血藤】 命名 本品藤汁紅如雞血。故名。

產地 出自雲南順寧境。地。蔓

生山巖間。

形態 雞血藤為藤屬之一種。其莖綿韌。長達數十里。粗如椶櫚。細如蘆葦。中空如竹。剖斷流汁。汁色赤如血。皮質細潔。而色淡黃。切開。中起六角稜。紅色如菊花狀。四圍白色。乾之紅處輒突出二三分。許。亦有中心作小紅點。乾之而不突起者。其藤可供藥用。膠詳見該條。

主治 補血。行血。通經。活絡。暖腰膝。已風癱。健筋骨。除痠痛。功遜於膠。

【雞血藤膠】 基本 本品係用雞血藤汁熬成之膠。

形態 雞血藤膠。於端午日搗芥入山。斫藤取汁一莖。可得汁數升。熬膠色如猩紅。成塊。儼如赤玉。光潤可愛。以供藥用。

採取 以少許入沸水中。有一線如鷄血走散者。為真入藥良。

主治 大補氣血。壯健筋骨。療手足麻木。癱瘓。男子遺精白濁。婦女經水不調。赤白帶下。乾血勞症。並男女不能生育。及跌打損傷。心

胃氣痛。痿痺痠痛。虛損百病。

參攷資料

雞血藤膠。大補氣血。與老人婦女。更為得益。或不能飲酒者。早晚用開水化服。亦能奏效。【雲南志】

按順寧刊售藥單云。順寧府順寧縣阿度山。山產此。又云。阿度吾里。萬名山。寺。龍潭。所產。載於郡志。有二種。其一種起鼓。丁刺者。尤佳。或盤屈於地。或附樹而生。伐之中。通細竅。汁凝如脂。黃之有香者。真。然云。兩種糯者。為雌。放者。為雄。【趙學敏】

雞血藤膠。治風痛。濕痺。性活血。舒筋。患在上部。飽食後。服在下部。空心酒服。不飲酒者。滾水調服。其色帶微綠。有清香氣。酒服亦能興陽。尤明府。【佩蓮云】

此膠治跌打如神。其太夫人。一日偶因跌傷。臂痛不可忍。用山羊血。參三七治之。多不驗。有客教服此膠。沖酒。一服。其疾如失。其性捷走。血分可知。【滇志】

順寧土人加藥料煎熬雞血膏。統治百病。能生血。和血。補血。破血。又能通七孔。走五臟。宣筋絡。治婦人經水不調。四物湯。加減八珍湯。加元胡索。為引。婦女勞傷。氣血筋骨酸

痛。轉筋。牛膝。杜仲。沉香。桂枝。佛手。乾木瓜。穿山甲。五加皮。沙仁。茴香。為引。大腸下血。椿根皮煎湯送下。男子虛弱。八味加減。為引。服此膠。忌食酸冷。【趙學敏】

【雞卵】 即雞蛋之古籍別名。典見和漢藥考。詳「雞蛋」條。

【雞卵殼皮】 命名 本品即雞卵殼中之薄白皮。故名。

古籍別名 鳳凰衣。俗名。

主治 久嗽氣結。得麻黃紫苑服。立效。

參攷資料 按仙傳外科云。有人偶含刀在口。割舌已垂。未斷。一人用鷄子白皮袋之。擦止血。藥於舌根。血止。以蠟化蜜調。沖和脊敷鷄子皮上。三日接住。乃去皮。只用蜜蠟動數七日。全安。若無速效。以金鎗藥搽治之。此用鷄子白皮。無他。但取其柔輭而薄。護舌而透藥也。【李時珍】

【雞尾毛】 主治 小兒不禁。雄雞翎燒研酒服。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論雞尾毛曰。治刺入肉中。

配合應用 ①治小便遺失。用雞臍一具并腸。燒存性。酒調服。男用雌。女用雄。(集驗方)

②治小便淋瀝。痛不可忍。雞臍內黃皮五錢。陰乾。燒存性。作一服。白湯下立愈。(醫林集要方)

③治腸消飲水。雞內金洗曬乾。格樓根炒五兩爲末。糊丸梧桐子大。每服三十丸。溫水下。日三。(聖濟總錄方)

④治反胃吐食。雞臍一具。燒存性。酒調服。男用雌。女用雄。(千金方)

⑤治消導酒積。雞臍、乾葛爲末等分。麵糊丸梧子大。每服五十丸。酒下。(袖珍方)

⑥治噤口痢疾。雞內金焙研。乳汁服之。

⑦治小兒瘰癧。用雞臍、黃皮燒存性。乳服。男用雌。女用雄。(千金方)

⑧治喉閉乳蛾。雞臍黃皮勿洗。陰乾。燒末。用竹管吹之。即破而愈。(青囊方)

⑨治一切口瘡。雞內金燒灰。傳之立效。(活幼新書方)

⑩治鵝口白瘡。雞臍黃皮爲末。乳服半錢。子母秘錄方)

⑪治走馬牙疳。經驗用雞臍黃皮。不落水者五枚。枯礬五錢。研搽立愈。心鑑用雞臍黃皮。燈上燒存性。入枯礬、黃柏末等分。磨膏少許。先以米泔洗漱後貼之。

⑫治陰頭奇蝕。雞內金不落水。拭淨。新瓦焙脆。出火毒爲細末。先以米泔水洗瘡乃搽之。亦治口疳。(經驗方)

⑬治穀道生瘡。久不愈。用雞臍燒存性爲末。乾貼之如神。(聖濟總錄方)

⑭治腳脰生瘡。雄雞臍內皮洗淨貼之一日。一易。十日愈。(小山奇方)

⑮治瘡口不合。雞臍皮日貼之。

⑯治發背初起。用雞臍黃皮。不落水者陰乾。臨時溫水潤開貼之。隨乾隨潤。不過三五個即消。(楊氏經驗方)

⑰治發背已潰。用雞臍黃皮同綿絮焙末搽之。

⑱治金瘡瘡蝕。初生如米豆。久則穿蝕。用雞內金焙礬金等分爲末。鹽漿漱了貼之。忌米食。(聖濟總錄方)

⑲治小兒疳目。雞臍黃皮擦之自落。(集要方)

⑳治雞骨哽咽。活雞一隻打死。取出雞內金洗淨。燈草裹於火上燒存性。竹筒吹入咽內即消。不可見肉。(攝生方)

㉑用。錢半至三錢。凡脾胃無積者禁用。

【雞公柴】 產地 江西山中皆有之。

形體 叢生。莖大根深。褐色。葉似鳳仙花葉而寬。葉邊有鋸齒。對生。梢結紅實。如天竹子而大。其根可供藥用。



雞公柴

主治 和酒煎服。治白濁。

【雞心】 別名 大聚。(和漢藥考)

主治 辟五邪。

【雞心橫】 即檳榔之處方用名。詳『檳榔』條。

【雞心橫櫚】 即大腹子之古籍別名。典見本草綱目。詳『大腹子』條。

【雞爪三稜】 即三稜之古籍別名。典見開寶本草。詳『三稜』條。

【雞爪子】 即枳椇子之俗名。詳『枳椇子』條。

【雞爪花】 即雞脚草之古籍別名。典見汪連仕採藥書。詳『雞脚草』條。

【雞爪蘭花】 即珠蘭之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『珠蘭』條。

【雞汁】 ①即雞之處方用名。詳『雞』條。②即雞露之原名。詳『雞露』條。

【雞汁粥】 基本 本品係以雞肉汁和米煮成之粥。

主治 勞損。

【雞矢】 即雞屎白之古籍別名。典見素問。詳『雞屎白』條。

【雞肉】 即雞之處方用名。詳『雞』條。

【雞肋骨】 主治 小兒羸瘦。食不生肌。

陰血解熱毒。治下痢其驗。【清】黃元御長沙藥解論雞子黃曰。雞子黃味甘微溫。入足太陰脾。足陽明胃經。補脾精而益胃液。止瀉利而斷嘔吐。傷寒黃連阿膠湯。用之治少陰病。心中煩。不得臥者。以其補脾而潤燥也。金匱百合雞子湯。用之治百合病吐之後者。以其滌胃而降逆也。排膿散。用之以其補中脘而生血肉也。

配合應用 ①治赤白下痢。雞卵一枚。取黃去白。入胡粉滿殼燒存性。以酒服一錢匕。【葛氏方】

②治妊娠下痢絞痛。用烏雞子一枚。開孔。去白留黃。入黃丹一錢。在內。厚紙裹定。泥固煨乾。爲末。每服三錢。米飲下一服。愈者是男。兩服愈者是女。【三因方】

③治子死腹中。雞子黃一枚。薑汁一合。和服當下。

④治小腸疝氣。雞子黃攪。溫水服之。三服效。

⑤治小兒疳疾。乳子黃和乳汁攪服。不過三兩枚。自定。【普濟方】

⑥治小兒頭瘡。麥熟雞子黃。炒令油出。以麻油膩粉搽之。【事林廣記方】

廣記方

①治風癰已潰。雞卵一枚。米下蒸半日。取黃熬令黑。先拭瘡令乾。以藥納孔中。三度即愈。【千金方】

②治脚上臭瘡。熱雞子黃一個。黃蠟一錢。煎油塗之。

③治湯火傷瘡。熱雞子一個。取黃炒取油。入膩粉十文。攪勻。掃上三五日。永除癰痕。【集驗方】

④治杖瘡已破。雞子黃熬油。搽之。甚效。亦治天泡水瘡。【唐瑤經驗方】

⑤治消滅癰痕。雞子五七枚。煮熟取黃炒黑。拭塗。日三。久久自滅。【聖惠方】

⑥治妊娠胎漏。血下不止。血盡則子死。用雞子黃十四枚。以好酒二升。煮如飴服之。未瘥再作。以瘥爲度。【普濟方】

⑦治耳疳出汁。雞子黃炒油塗之。甚妙。【談藝翁方】

用量 一枚至二枚。

施用宜忌 凡脾胃有滯滯者禁用。

參攷資料 ①雞子黃氣味俱厚。陰中之陰。故能補形。昔人謂其

與阿膠同功。正此意也。其治嘔逆諸瘡。則取其除熱引蟲而已。【李時珍】

②雞子入藥最多。而髮煎方特奇。劉禹錫傳信方云。亂髮雞子膏。治孩子熱瘡。用雞子五枚。黃熱去白。取黃。亂髮如雞子大。相和於鐵銚中。炭火熬之。初甚乾。少頃即髮焦。乃有液出。旋取置碗中。以液盡爲度。取塗瘡上。即以苦參末粉之。頃在武陵生子。疹內便有熱瘡。塗諸藥無益。而日愈劇。蔓延牛身。晝夜號啼。不乳不睡。因問本草。髮髮條云。合雞子黃煎之。消爲水。療小兒驚熱下痢。註云。俗中嫗母爲小兒作雞子煎。用髮雜熬之。良久得汁。與小兒服。去痰熱。主有病又雞子條云。療火瘡。因是用之。果如神效也。【蘇頌】

Gizzard Pepsin (英)

基本 爲雞脾中之黃皮。

產地 各地均有出。

形態 雞內金色黃質。制而有皺紋。乾則堅硬。火焙之。其體胖發。且有臭穢之氣。

性質 甘平。無毒。

效能 消水穀。治瀉痢。理脾胃。療腫脹。與胃酸相同。用作消化健胃藥。

主治 洩痢。小便頻遺。除熱止煩。

歷代記述攷證 【宋】日華諸家本草論雞內金曰。止泄精。並尿血。崩中帶下。腸風瀉血。【明】李時珍本草綱目論雞內金曰。治小兒食瘕。療大人淋瀝。反胃。消酒積。上喉閉乳蛾。一切口瘡及牙疳諸瘡。

【明】繆希雍本草經疏論雞內金曰。雞內金即雞內黃皮。一名雞內金。是也。雞是雞之脾。乃消化水穀之所。其氣通達大腸膀胱二經。有熱則洩痢遺溺。得微寒之氣。則熱除而洩痢遺溺自愈矣。煩因熱而生。熱去故煩自止也。今世又以之治諸疳瘕多效。

處方用名 雞脫皮。炙內金。

古籍別名 雞脫脰。【綱目】

外國名詞 Inguvin (拉丁)

主治 目熱赤痛。除心下伏熱。止煩滿。咳逆。小兒下泄。婦人產難。胞衣不出。並生吞之。醋浸一宿。療黃疸。破大煩熱。

歷代記述攷證

【唐】陳藏器

本草拾遺論雞子白曰。產後血閉不下。取雞子白一枚入醋一半攪服。【明】李時珍本草綱目論雞子白曰。和赤小豆末塗一切熱毒。丹腫。顯痛神效。冬月以新生者酒漬之密封七日取出。每夜塗面去黥。黥皴。令人悅色。【清】黃元御長沙藥解論雞子白曰。雞子白味甘。氣腥微寒。入手太陰肺經。療咽喉之腫痛。發聲音之暗啞。傷寒苦酒方。【方在苦酒】治少陰病咽中生瘡。聲音不出。用之以其消腫痛而發聲音也。其諸主治塗鼻瘡。治發黃。傳腫痛。洗燒灼。

國藥學說

英美學說謂雞蛋青之質。不特卵屬有之。即精血乳內與動物植物汁內皆有之。血內所含者為血精。乳內所含者為乳精。蛋內所含者為蛋精。動物內所含者總稱動物精。植物內所含者總稱植物精。雞蛋青之功用能作

潤劑。養生。解汞毒及膽礬（一名藍礬）之毒。配水藥類之混濁者。若加以蛋青少許。即可變清。

配合應用 ①治時行發黃。醋酒浸雞子一宿。吞其白數枚。（肘後方）

②治下痢赤白。生雞子一個取白。攤紙紙上日乾。摺作四重。包肥烏梅十個。安熨斗中。以白炭燒存性。取出。梳覆冷定。研末入水銀粉少許。大人分二服。小兒三服。空心井華水調下。如覺微利。不須再服。（類澄方）

③治蛇蟲攻心。口吐清水。以雞子一枚去黃。納好漆入雞子殼中。和合。仰頭吞之。蟲即出也。（古今錄驗方）

④治五種過尸。其狀腹脹。氣急冲心。或礫硯踊起。或牽腰脊。以雞卵白七枚。頓吞之。良。（千金方）

⑤治咽塞鼻瘡。及乾嘔頭痛。食不下。用雞子一枚。開一竅。去黃留白。着米酢。燂火燉沸。取下。更燉如此三次。乘熱飲之。不過一二度即愈。（普濟方）

⑥治面生皰瘡。雞子以三歲苦

酒浸之。三宿待軟。取白塗之。（肘後方）

⑦治湯火燒灼。雞子清和酒調洗。動洗。即易生肌。忌發物。或生傳之亦可。（經驗秘方）

⑧治頭髮垢膩。雞子白塗之。少頃洗去。光澤不燥。（瀨湖方）

⑨面黑令白。雞子三枚。酒浸。密封四七日。每夜以白傅面如雪白也。（普濟方）

⑩塗面駐顏。雞子一枚開孔。去黃留白。入金華胭脂及礪砂少許。紙封。與雞抱之。俟別卵抱出。以塗面。洗之不落。半年尚紅也。（普濟方）

用量 一枚至二枚。
施用宜忌 凡無風熱鬱火者禁用。

參攷資料 ①產後血暈。身暈直口。目向上牽。急不知人。取雞子一枚。去殼分清。以荊芥末二錢調服。即安。甚敏捷。烏雞子尤善。（寇宗奭）

②雞蛋清又名蛋精。西名阿布門。化名炭輕淡養。此質不但卵屬有之。精血乳內亦含之。且舉凡動物植物汁內皆有。書中所

云蛋清類者。即此。醫家所云此質血內所含為血精。乳內所含為乳精。蛋內所含為蛋精。動物所食總為動物精。植物所食總為植物精。功用詳萬國藥方卷五。一百零三篇。（陳仁山）

【雞子辛】即辛子之古籍別名。典見綱目。詳「辛子」條。

【雞子黃】原名 卵黃。雞卵黃中之黃。故名。

產地 各地咸有出。
形態 卵黃形圓如球。色黃質厚。煮熟則體尤膩重。

性質 甘溫。無毒。
成分 雞卵之黃部。自五十四分之水。七十一分之蛋白質。二十九分之含酸脂肪。及剋駕亞斯新鹽。磷酸。鹽酸。酸化等而成。

效能 清熱補陰。用作解熱解毒藥。
歷代記述攷證 【宋】日華諸家本草論雞子黃曰。炒取油和粉。傳頭痛。【明】李時珍本草綱目論雞子黃曰。卒乾。嘔者生吞數枚。良。小便不通者。亦生吞之。數次效。補

十八畫 雞

性本草論菹菌曰。除腹內冷痛。治白亮。

施用宜忌 畏雞子。得苦酒良。

【菹菌】即菹菌之古籍別名。典見本經。詳「菹菌」條。

【雞】命名 雞者。稽也。能稽時也。故名。

處方用名 雞汁。雞肉。

古籍別名 燭夜。蜀。荆。鷄。角雞。

（綱目） 基本 屬鴉雞類。藥用諸雞之肉。

產地 各處咸有產焉。

形態 雞本為產於東印度。爪哇地方之野雞（*Gallus bankiva*, Brist）捕歸而飼養之。後大加改良。始成現在之家雞。雞之形狀及大小。均不一致。頭上皆有肉冠。或頂毛冠。嘴極堅硬。尖端頗銳。便於啄食蟲類。或穀實。脚亦強健。恃以抓地而覓食物。物雄者羽毛美麗。姿勢亦甚雄壯。嘴下懸有血色之肉垂。且則啼而報時。其脚有距。用為禦敵之具。雌者矮小。羽毛不如雄之可觀。每產卵後。往往須抱卵十枚內外。約經二十一日。即

孵化為雞。

性質 甘。溫。無毒。

效能 溫中氣。補虛羸。用作滋養強壯藥。

主治 女人崩中漏下。赤白帶。通經。殺惡毒。辟不祥。（本經）補虛。溫中止血。能愈久傷。乏瘡。不瘥者（別錄）

歷代記述攷證 【清】王士雄隨心居飲食譜論雞肉曰。雞甘溫。補虛。煖胃。強筋骨。續絕傷。活血。調經。拓癰疽。止崩帶。節小便。頻數。主婉後虛羸。以屬過細皮肥大而嬾者。勝。肥大雌雞亦良。若老雌雞熬汁最佳。烏骨雞滋補功優。多食生熱動風。凡時感前後。痘疹後。瘡瘍後。癰疽疔瘡。肝氣目疾。喉證。腳氣。諸風病皆忌之。未願者愈老愈毒。諸病均不可食。惟辟邪宜用丹雄雞也。

近代學說 丁福保曰。雞有棲息山野與飼養人家者之二種。其生育之法各異。故其成分亦稍有不同。然大都甘溫無毒。且頗有美味。丹雞之肉。能補虛。黃雞有益於老人。要之皆有滋養之大益者也。

參攷資料 雞類甚多。五方所產。大小形色。往往亦異。朝鮮一種。長尾雞。尾長三四尺。遼陽一種。食雞。一種角雞。味俱肥美。大勝諸雞。南越一種。長鳴雞。晝夜啼叫。南海一種。石雞。潮至即鳴。蜀中一種。鸛雞。楚中一種。詹雞。並高三四尺。江南一種。矮雞。脚纔二寸許也。雞在卦屬巽。在星應昂。無外腎而虧小腸。凡人家無故。雞夜鳴者。謂之荒雞。主不祥。若黃昏獨啼者。主有天恩。謂之盜啼。老雞能人言者。牝雞雄鳴者。雄雞生卵者。並殺之。即已。俚人畜雞無雄。即以雞卵告竈而伏出之。南人以雞卵畫墨。煮熟。驗其黃以卜吉凶。又以雞骨占年。其鳴也。知時刻。其棲也。知陰晴。太清外術言。蓄蟲家之雞。輒飛去。萬畢術言。其羽焚之。可以致風。五行志言。雄雞毛燒着酒中。酒飲之。所求必得。古人言。雞能辟邪。則雞亦靈禽也。不獨充庖而已。（李時珍）

雞有五種。五色者。玄雞。白首者。六指者。四距者。雞死足不申者。並不可食。害人（孟詵）延壽書云。闍雞能啼者。有毒。四月勿食。抱雞

一八二八

肉。令人作癰。成漏。男女虛乏。（李時珍）

【雞子白】原名 卵白。本品係雞卵中之白質。故名。

別名 蛋青。蛋精。（新中藥）外國名詞 Ori Albumen.（拉丁）Egg Albumen.（英）

形態 色白而潔。質稠如水。煮熟則凝結而起玉色。

性質 甘。微寒。無毒。

成分 雞卵之白部。自八十三至八十九分之水分。十二至十五分之蛋白質。及砂糖。脂肪。曹達鹽。炭酸鹽。硫酸鹽等各種之成分而成。

效能 清風熱。治腫毒。用作解熱瘡瘍藥。

典見綱目。詳『天麻』條。

【醬板豆草】即馬牙半支之古籍別名。典見家寶方。詳『馬牙半支』條。

【醬茄】基本 此即人家醬中食茄也。陳年者佳。

主治 擠汁滴入耳內。治耳膿。燒灰爲末。療牙疼。燒灰和麝香輕粉。貼腹內驚風。

【醬瓣半支】即馬牙半支之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『馬牙半支』條。

【醬瓣草】即醬瓣半支之別名。詳『馬牙半支』條。即地錦之別名。詳『地錦』條。

【鈔羊角】即鈔羊角之處方用名。詳『鈔羊角』條。

【鎖陽】命名 本品功能與陽固精。故名。

處方用名 製鎖陽。

外國名詞 Balanophora
基本 爲菌類生化之一種。
產地 陳仁山藥物生產辨云。鎖陽山西、陝西、河南等省。均有出產。

形態 鎖陽發起如筍。上豐下

倫。縫甲櫛比。筋脈達絡。狀類男子陽具。即肉蓯蓉之一類。

製法 掘取洗淨去皮。薄切。曬乾用。

性質 甘。溫。無毒。

效能 潤腸通便。補陽起陰。療用作滋養強壯藥。

主治 大補陰氣。益精血。利大便。虛人大便燥結者。啖之。可代菴蓉。煮粥。彌補不燥結者勿用。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論鎖陽曰。潤燥養筋。治痿弱。【明】李士材本草圖解論鎖陽曰。鎖陽甘溫入腎。補陰益精。潤燥養筋。凡大便燥結。腰膝軟弱。珍爲要藥。酒潤焙用。【清】黃宮繡本草求真論鎖陽曰。鎖陽本與菴蓉同爲一類。甘鹹性溫。潤燥養筋。凡陰氣虛損。精血衰敗。大便燥結。治可用此以啖。并代菴蓉。煮粥。彌補。則知其性雖溫。其體仍潤。未可云爲命門火衰必用之藥也。故書有載。大便不燥結者勿用。益知性屬陰類。即有云可補陽。亦不過云其陰補而陽自興之意。豈眞性等桂附而爲燥熱之品哉。但古人表著

藥功。多有隔一隔二立說。以致茫若觀火。究之細從藥之氣味形質考求。則孰陰孰陽。自爾立見。又奚必沾沾於書之治功是求者乎。狀類男陽。宜用酥炙。

用量 錢半至三錢。

應用宜忌 凡便瀉不實及陽易舉者禁用。

著名方劑 鎖陽丹。治脫精滑泄。【沈氏尊生方】桑螵蛸三兩。龍骨茯苓各一兩。共研末。煉蜜爲丸。梧子大。每服七十丸。鹽湯下。

【鎖山威】即鹿角之古籍別名。典見和漢藥考。詳『鹿角』條。

【鎖風石】即明礬之古籍別名。典見和漢藥考。詳『明礬』條。

【鎖頭迴】即柿之古籍別名。典見綱目。詳『柿』條。

【雙珠草】即狗卵草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『狗卵草』條。

【雙鉤鉤】即鉤藤之處方用名。詳『鉤藤』條。

【雙蘭菊】即草烏頭之別名。詳『草烏頭』條。

【薑】即蘿摩之古籍別名。典見陸機詩疏。詳『蘿摩』條。即鴉鴉之古籍別名。典見爾雅。詳『鴉鴉』條。

【薑芥】即水楊之古籍別名。典見綱目。詳『水楊』條。

【藿菌】命名 藿作雀。乃藿葦之屬。本品生於其下故名。

古籍別名 藿蘆。【本經】

產地 生蘆葦池澤中。鹹鹼地亦多有之。

形態 藿菌爲葉類菌類之一種。其菌色白。輕虛。表裏相似。與衆菌不同。秋雨時行。即生。天旱久雨。即稀。採得可供藥用。

採取 八月採之。陰乾。

性質 鹹。平。有小毒。

主治 心痛。溫中去長蟲。白癰。蛇螫。瘡癰。諸蟲。【本經】痘。去蛇蟲。寸白。惡瘡。【別錄】

歷代記述攷證 【唐】甄權藥

崔實月令詳「踴豆」條。

【轆轤】即大棗之古籍別名。典見和漢藥考。詳「大棗」條。

【醫草】即艾葉之古籍別名。典見別錄詳「艾葉」條。

【醬】命名 本品係用麥、麵豆、米等舂黃加鹽曝而成之調味品。其所以呼爲醬者以其能制食物之毒如將之能平暴惡也。

【糧類】①用大豆三升水煮糜以麵二十四斤拌成黃。每十斤入鹽八斤。井水四十斤。攪曬成油收取之者名豆醬油。②用豆炒磨成粉一斗入麵三斗和勻切片。舂黃曬之。每十斤入鹽五斤。井水淹過曬成收之者名大豆醬。③用豆磨淨和麵舂黃。次年再磨。每十斤入鹽五斤。以鹽水淹過曬成收之者名小豆醬。④用豆水浸蒸軟曬乾去皮。每一斗入小麥一斗。磨麵和切。蒸過舂黃。曬乾。每十斤入鹽五斤。水二十斤。曬成收之者名踴豆醬。⑤用小麥熟蒸熟。舂黃。曬乾。磨碎。每十斤入鹽三斤。熟湯二十斤。曬成收之者名鉄醬。⑥用小麥麵和劑切片。蒸熟舂黃。曬乾。每十

斤入鹽三斤。熱水二十斤。曬成收之者名甜麵醬。⑦用生麵水和布包踏餅。舂黃。曬乾。每十斤入鹽五斤。水二十斤。曬成收之者名小麥鉄醬。⑧用黑豆一斗。炒熟。水浸半日。同煮爛。以大麥麵二十斤拌勻。篩下麵。用煮豆汁和劑。切片。蒸熟。舂黃。曬乾。每一斗入鹽二斤。井水八斤。曬成黑甜而汁清者名大麥醬。⑨用麻姑餅搗燕。以麵和勻。舂黃如常用。鹽水曬成。色味甘美者名麻洋醬。

採取 入藥用以豆醬及陳久者良。

性質 鹹。冷。利。無毒。

主治 除熱止煩。滿殺百藥及熱湯火毒。

歷代記述攷證 【宋】日華諸

家本草論醬曰。殺一切魚肉菜蔬蠶毒。并治蛇蟲蜂蠆等毒。【明】李時珍本草綱目論醬曰。醬汁灌入下部。治大便不通。灌耳中。治飛蛾蟲蟻入耳。塗獺犬咬。及湯火傷灼。未成瘡者有效。又中砒毒。調水服。即解。【明】經希雅本草經疏論醬曰。按醬之品不一。惟豆醬陳久者

入藥。其味鹹酸冷利。故主除熱止煩。滿及湯火傷毒。也能殺一切魚肉菜蔬蠶毒。本經云。殺百藥毒者。誤也。聖人不得其醬。不食。朱子云。食肉用醬。各有所宜。玩一宜字。則不宜者必有傷害於人。非特悅口而已。如食蟹用橙醬。或薑醬。麥魚用茱萸醬。取其能殺毒之義耳。又有榆仁醬。味辛美。殺諸蟲。利大小便。心腹惡氣。無莧醬主療相同。茱萸醬作法不用麵豆鹽。只以河水量茱萸多少。稍稍加石灰。摻入拌勻。藏藏。殺一切魚腥毒。用時洗去石灰。搗爛。煮水族入之良。【清】黃宮繡本草求真論醬曰。醬本豆與麵蒸。加鹽與水曬成。雖曰經火。經日煎熬。然味鹹性冷。火不勝水。仍爲解熱解毒瀉火之劑耳。是以書載一切魚肉菜蔬蠶毒。皆當用此。以調蛇蟲蜂蠆犬咬毒。火砒霜蠱毒。皆當用此以解。與夫手指掣痛。癢癢風。大便不通。飛蟲入耳。浸淫瘡癰。輕粉毒。中身土乾燥。妊娠下血。尿血等症。無不當用此以治。但此氣鹹性冷。小兒過服。則恐生痰動氣。妊娠合雀肉以食。則恐

令兒面黑。所當避也。取豆醬陳久者佳。【清】王士雄飲食譜論醬曰。醬純以白麵造者。鹹甘而平。調饌最勝。豆醬以金華蘭谿造者佳。鹹平。蜀油則豆醬爲宜。日曬三伏。晴則夜露。深秋第一。鶩者勝。名秋油。即母油。調和食味。葷素皆宜。痘痂新脫時食之。則癢。嘉興造者鹹寒。以少日曬之功也。油亦質薄味淡。不耐久藏。獺犬咬及湯火傷未成瘡者。以醬塗之。中砒毒。豆醬調水服。胎氣上衝及虛逆嘔吐。好醬油開水調服。亦解雅片毒。

參攷資料 ①小麥醬殺藥力不如豆醬。又有麋鹿兎雉及鱧魚醬。皆不可久食也。【孟詵】②聖人不得醬。不食。意欲五味和五臟悅而受之。此亦安樂之一端也。【寇宗奭】③麵醬。鹹豆醬。甜醬。豆油。大麥醬。鉄醬。皆鹹甘。【李時珍】④多食發小兒無辜生痰動氣。妊娠合雀肉食之。令兒面黑。【孟詵】⑤麥醬和鯉魚食。生口瘡。【蘇頌】⑥【醬瓜】即越瓜之俗名。詳「越瓜」條。

【醬瓜天麻】即天麻之古籍別名。

凡補腎者皆屬溫藥。不知腎陰腎陽藥物各有專主。滋養真陰者。必非溫藥。讀本草者。必以本經為主。而別錄輔之。後人雜說。徒多紛亂。不可不分別觀之。

配合應用 治夢遺洩精。用覆盆子、黃蘗、沙苑、蒺藜、蓮鬚、五味子、砂仁、魚膠、山茱萸。

治男子精氣虧乏。中年無子。用覆盆子、車前子、五味子、菟絲子、蒺藜子、為五子衍宗丸。

加入巴戟天、臘腦、補骨脂、鹿茸、白膠、山茱萸、肉蓯蓉、治陽虛陰痿、臨房不舉、或精寒精薄。

治陽事不起。覆盆子酒浸焙研為末。每日酒服三錢。(集簡方)

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡陽強不倒。小便不利者禁用。

參攷資料 覆盆蓬蘽。功用大抵相近。雖是二物。其實一類。而二種也。一早熟。一晚熟。兼用無妨。其補益與桑椹同功。若樹莓則不可混採者也。李時珍。佛說蘇密那花點燈。正言此花也。此花有三種。以四月熟。狀如覆盆。味甘美。

十八畫 覆

豐 獾 蹕

者為是。餘不堪入藥。今人取茅莓當覆盆誤矣。(陳藏器) 處處有之。秦州、永興、華州尤多。長條。四五月紅熟。山中及人時採來賣。其味酸甘。外如荔枝。大如櫻桃。軟紅可愛。失時則就枝生蛆。食之多熱。收時五六分熟。便可採。烈日曝乾。今人取汁作煎為果。採時着水。則不堪煎。(寇宗奭) 蓬蘽子以八九月熟。故謂之割田蘽。覆盆以四五月熟。故謂之插田蘽。正與別錄五月採相合。二蘽熟時色皆烏赤。故能補腎。其四五月熟而色紅者。乃藉田蘽也。不入藥用。陳氏所謂以茅莓當覆盆者。蓋指此也。(李時珍)

【覆盆根】 主治 痘後目翳。取根洗搗澄粉。日乾。蜜和少許。點於翳丁上。日二三次。自散。百日內治之。久即難療。

【覆盆葉】 性實 鹹平。微酸。無毒。主治 授校取汁。滴目中。去翳赤。出蟲如絲線。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論覆盆葉曰。明目止淚。

收溼氣。

參攷資料 按崔元亮海上集驗方。治目暗不見物。冷淚浸淫不止。及青盲天行目暗等疾。取西國草一名畢楞伽。一名覆盆子。日曬乾。搗極細。以薄綿裹之。用飲男乳汁浸。如人行八九里。久用點目中。即仰臥。不過三四日。視物如少。年禁酒麵油物。(蘇頌) 按洪邁夷堅志云。潭州趙太尉母病爛弦。瘡眼二十年。有老嫗云。此中有蟲。吾當除之。入山取草。蔓葉咀嚙。留汁入筒中。還以草紗蒙眼。滴汁漬下弦。轉盼間。蟲從紗上出。數日下弦乾。復如法滴上弦。又得蟲數十。而愈。後以治人多驗。乃覆盆子葉也。蓋治眼妙品。(李時珍)

【覆盆膠】 即阿膠之古籍別名。典見和漢藥考。詳「阿膠」條。

【覆菴】 即藜藿之古籍別名。典見別錄。詳「藜藿」條。

【覆藺】 即菴藺子之古籍別名。典見綱目。詳「菴藺子」條。

【豐本】 即韭之古籍別名。典見禮記。詳「韭」條。

【豐蘆】 即藜蘆之古籍別名。典見

吳普本草。詳「藜蘆」條。

【獾】 命名 本品皮為坐毯臥褥。能消膜外之氣。故名。

古籍別名 貊(綱目)

外國名詞 Tapirus Tapir (拉丁) バク(日本)

基本 係脊椎動物哺乳類有胎盤類有蹄類之奇蹄類獾科。產地 出印度、南美洲諸地之山林及水邊。

形態 獾為獸類之一種。體形似豚。大小不一。四肢長短適中。前肢有四趾。後肢有三趾。皆有蹄。皮似犀而厚。毛短項粗。耳短眼小。尾亦小。鼻長向前突出為吻狀。能隨意伸縮。常夜出覓食草木嫩莖幼芽。性柔易馴。其皮可供藥用。

主治 瘰之可驅溫癰。辟溼氣邪氣。

【獾屎】 主治 吞銅鐵入腹者。水和服之。即化為水。

參攷資料 獾膏性利。銅鐵瓦器盛之。悉透。惟以骨盛則不漏。(李時珍)

【蹕豆】 即豌豆之古籍別名。典見

十八畫 覆

藥用。①一種樹生者。樹高四五尺。葉似櫻桃葉。而狹長。四月開小白花。結實與覆盆子一樣。但色紅爲異。俗亦名藤。卽爾雅所謂山莓。陳藏器本草所謂懸鉤子者也。蓋懸鉤是樹生。而色紅赤。覆盆是藤生。而色烏亦故也。②一種就地引細蔓。節節生根。每枝三葉。葉有齒刻。四五月開小黃花。五出。結實鮮紅。狀似覆盆。而面與蒂則不同也。其根甚細。本草用汁。當是取其莖葉並根也。仇遠稗史詭作蛇纏草。言有五葉七葉者。又言俗傳食之能殺人。亦不然。止發冷涎耳。

採取 每年四五月間採收。綠色未熟者。烈日曝乾。不爾易爛。若樹莓則不可混採也。

製法 雷斅曰。凡使用東流水淘去黃葉并皮蒂。取子以酒拌蒸一宿。以東流水淘兩遍。又曬乾方用。李時珍曰。採得搗作薄餅。曬乾蜜貯。臨時以酒拌蒸尤妙。

性質 甘平。無毒。

成分 爲林檎酸、酒石酸、揮發油、糖分等。

效能 補肝腎。縮小便。強陽事。

療陰痿。用爲滋養強壯藥。

主治 益氣。輕身。令髮不白。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥

性本草論覆盆子曰。男子腎精虛竭。陰痿。能令堅長。女子食之有子。【唐】陳藏器本草拾遺論覆盆子曰。食之令人好顏色。榨汁塗髮不白。【宋】馬志開寶新詳定本草論覆盆子曰。補虛續絕。強陰健陽。悅澤肌膚。安和五臟。溫中益力。療勞損。風虛。補肝明目。並宜搗篩。每旦水服三錢。【宋】寇宗奭本草衍義論覆盆子曰。益腎臟。縮小便。取汁同少蜜煎爲稀膏。煎服治肺氣虛寒。【明】繆希雍本草經疏論覆盆子曰。覆盆子得木氣而生。本經味甘氣平。無毒。甄權微熱。寇宗奭酸甘。深得其義。入足少陰經。其主益氣者。言益精氣也。腎藏精。腎納氣。精氣充足。則身自輕。髮不白也。蘇恭主補虛。續絕。強陰。建陽。悅澤肌膚。及和臟腑。甄權主男子腎精虛竭。陰痿。女子食之有子。大明主安五臟。益顏色。養精氣。長髮。強志。皆取其益腎添精。甘酸收斂之義耳。【明】李士材本草圖解論覆盆子

曰。覆盆子甘平入腎。起陽治痿。固精攝溺。強腎而無燥熱之偏。固精而無凝滯之害。金玉之品也。【清】黃宮繡本草求真論覆盆子曰。覆盆子甘酸微溫。性稟中和。功能溫腎而不燥。固精而不凝。故服之陰痿能強。肌膚能澤。臟腑能和。鬚髮不白。女子服之多孕。既有補益之功。復多收斂之義。名爲覆盆子者。服之能使溺盆皆覆也。

辦偽 藥肆中恒以樹莓代充。故多偽品。欲辨真偽。以酒浸之。其色紅者是真。

近人學說 張山雷曰。本經止有蓬蘽。而曰一名覆盆。至別錄乃別出覆盆子。雖氣味主治。與本經蓬蘽不同。而性情功用。可以相通。其爲一物。蓋無可疑。御覽引吳普本草。缺一。名決益。又引甄氏本草。覆盆子一名陸荆。考說文。蘽木也。蘽草也。二字有別。二物雖同爲蘽生。然本草本蘽各異。覆盆屬蔓草類。則字當作蘽。而本草俱作蓬蘽。恐傳寫有僞。又說文。韋。缺盆也。廣雅。缺盆。陸英。葇也。爾雅。葇。缺盆。郭注。覆盆也。毛詩。葛藟。藥之陸璣

詩疏。似燕巢。亦連蔓。是覆盆。缺盆。陸英。陸葇。皆卽古之所謂蘽也。李瀕湖綱目。詳言。一類五種。雖微有別。然亦自言覆盆蓬蘽功用相近。又言實是一類。而二種。茲故以本經別錄二者。合爲一條。李氏綱目謂蓬蘽一名覆盆。出於別錄。茲據孫淵如問經堂辨刻本草經。則出於本經。蓋所據大觀本。黑白字之白字。定爲本經也。長陰令堅。綱目引本經。令下行。人字。遂不成句。茲據孫本。無人字。又曰。覆盆爲滋養真陰之藥。味帶微酸。能收攝耗散之陰氣。而生精液。故寇宗奭謂益腎縮小便。服之當覆其溺器。語雖附會。尙爲有理。本經主安五臟。臟者陰也。凡子皆堅。實多能補中。况有收斂之力。自能補五臟之陰。而益精氣。凡子皆重。多能益腎。而此又專入腎陰。能堅腎氣。故曰長陰令堅。強志。倍力有子。皆補益腎陰之效也。久服輕身不老。則極言其功耳。別錄益氣輕身。令髮不白。仍卽本經之意。惟此專養陰。非以助陽。本經別錄並未言溫。其以爲微溫微熱者。皆後人臆測之辭。一似

嶺、吳越東南諸郡皆有之。以用瀝
衡永產者爲勝。蠟樹枝葉狀類冬
青。四時不凋。五月開白花。成叢結
實。纍纍大如薔荊子。生青熟紫。冬
青樹子則紅色也。其蟲大如虱。虱
芒種後則延緣樹枝。食汁吐涎。黏
於嫩莖。化爲白脂。乃結成蠟狀。如
凝霜。處暑後則剝取。謂之蠟渣。若
過白露。即黏住難剝矣。其渣煉化
濾淨。或甑中蒸化。瀝下器中。待凝
成塊。卽爲蠟也。其蟲嫩時白色。作
蠟及老則赤黑色。乃結苞於樹枝
初若黍米大。入春漸長大如雞頭
子。紫赤色。纍纍抱枝。宛若樹之結
實也。蓋蟲將這卵作房。正如雀窠
蟬蛻之類爾。俗呼爲蠟種。亦曰蠟
子。子內皆白卵。如細乳。一包數百
次年立夏日摘下。以箬葉包之。分
繫各樹。芒種後苞坼卵化。蟲乃延
出葉底。復上樹作蠟也。樹下要潔
淨。防蟻食其蟲。又有水蠟樹。葉微
似榆。亦可放蟲生蠟。甜櫚樹亦可
產蠟。(李時珍) ①白蠟係從漆樹
科之黃植樹 (Rhus Succed-
anea, L.) 及漆樹 (Rhus Ver-
nifera, DC.) 實所採取之蠟

十八畫 蟲

蠟 蠟 覆

質。此外或從山漆樹 (Rhus Ti-
choaerpa, Miq.) 等樹實亦可
採取。日本藥局方之白蠟。係黃蠟
曬白者。漆樹日本陸羽地方頗多
爲落葉樹。老者高及三丈。葉爲
羽狀複葉。附有七葉至九葉。小葉
作卵圓形或橢圓形。六月間開花
垂長穗。呈黃色。果實作扁圓形。大
三分許。作黃褐色。鋸傷樹皮則有
漆汁滲出。黃樹植爲落葉樹。日本
九州及中國產此。老者高及三
丈。葉作羽狀複葉。小葉作長卵圓
形。附有九葉至十七葉。六月間於
梢頭下垂穗。開黃色小花。果實
作扁圓形。大二三分。作黃色。(黃
植樹或呼黃植漆。或呼蠟樹。) (和
漢藥考)

【蟲損】卽青雌之古籍別名。典見
別錄。詳「青雌」條。

【蟲積】卽青雌之古籍別名。典見
別錄。詳「青雌」條。

【蟲蟬】卽玉竹之古籍別名。典見
吳普本草。詳「玉竹」條。

【蟲蠟】卽蟲白蠟之處方用名。詳
「蟲白蠟」條。

【蠟】卽蠟之古籍別名。典見綱目。

詳「蠟」條。

【蠟蟬】卽青雌之古籍別名。典見
綱目。詳「青雌」條。

【覆盆】卽蓬蘽之古籍別名。典見
別錄。詳「蓬蘽」條。

【覆盆子】 命名。子似覆盆之
形故名。

古籍別名 葑子。缺盆子。(爾
雅) 西國草子。畢楞伽子。(圖經)
大麥葑子。插田蕪子。烏蕪子。栽秧
蕪子。馬蕪子。陸荊子。(綱目) 蘇密
那子。(藏器)

外國名詞 Rubus Tokuna,
Sieb.

基本 屬薔薇科。其所結之果
實。卽覆盆子。

產地 凡山野向陽之林中。恒
多產焉。陳仁山藥物生產辨云。產
浙江寧波府六月新。

形態 覆盆子爲亞灌木本。其
莖有刺。葉爲複葉。小葉作卵圓形。
其邊緣有鋸齒。花紫白色。五出。相
綴而爲複繖狀花。雌雄兩全。果實
小而攢簇。形如圓錐。或若彈丸。初
時色綠。熟則暗紅。

種類 覆盆子。卽葑也。品類甚

夥。產於歐美者。凡百五十有餘種。
產於日本者。亦四十有餘種。或名
之曰蓬蘽。日本向入藥用。歐洲製
造之覆盆子糖漿。覆盆子水。覆盆
子醋等。其原料係取成熟之新鮮
果實爲之。其母植物是否爲葑不
可知。學者往往譯作蓬蘽云。①一
種蓬蘽繁衍。莖有倒刺。逐節生葉。
葉大如掌。狀類小葵葉。面青背白
厚而有毛。六七月開小白花。就蒂
結實。三四十顆成簇。生則青黃。熟
則紫黯。微有黑毛。狀如熟棗而扁。
冬月苗葉不凋者。俗名割田蕪。卽
本草所謂蓬蘽也。②一種蔓小於
蓬蘽。亦有鉤刺。一枝五葉。葉小而
面背皆青。光澤而無毛。開白花。四
五月實成。子亦小於蓬蘽而稀疏。
生則青黃。熟則烏赤。冬月苗凋者。
俗名插田蕪。卽本草所謂覆盆子。
爾雅所謂葑。缺盆也。此二種者。俱
可入藥。③一種蔓小於蓬蘽。一枝
三葉。葉面青背淡白而微有毛。開
小白花。四月實熟。其色紅如櫻桃
者。俗名蕪田蕪。卽爾雅所謂蕪者
也。故郭璞註云。蕪卽葑也。子似覆
盆而大。赤色。酢甜可食。此種不入

十八蠶 蟬 蟲

濟方)

③治頭風旋暈。用蟬殼一兩。微炒爲末。不時酒下一錢。白湯亦可。(聖惠方)

④治皮膚風癢。蟬蛻、薄荷葉、等分爲末。酒服一錢。日三。(集驗方)

⑤治痘瘡作癢。蟬蛻三七枚。甘草炙各一錢。水煎服之。(心鑑方)

⑥治痘後目翳。蟬蛻爲末。每服一錢。羊肝煎湯下。日二。(錢氏方)

⑦治聾耳出膿。蟬蛻半兩。燒存性。麝香半錢。炒共爲末。綿裹塞之。追出惡物效。(海上方)

⑧治小兒陰腫。多因坐地風襲。及蟲蟻所吹。用蟬蛻半兩。煎水洗。仍服五苓散。卽腫消痛止。(危氏方)

⑨治胃熱吐食。清膽散。用蟬蛻五十個。去泥滑石一兩。爲末。每服二錢。水一盞。入蜜調服。(衛生家寶方)

⑩治丁瘡毒腫。不破則毒入腹。用蟬蛻炒爲末。蜜水調服一錢。外以津和塗之。(青囊雜纂方)又用蟬蛻、僵蠶等分爲末。醋調塗瘡四圍。候根出。拔去再塗。(醫方大成)

方)

用蠶 八分至錢半。

施用宜忌 凡無風熱者禁用。著名方劑 蟬花散治肝經經熱風毒之氣。內搏上攻。眼目赤腫。翳膜疼痛。昏濇。內外障翳。成治之。

(局方) 蟬蛻、穀精草、刺蒺藜、甘菊、防風、草決明、蜜蒙花、甘草、羌活、黃芩、荊子、川芎、木賊、荊芥等分。爲末。每服二錢。茶清調。食後臨臥各一服。

【蠶 蟬】卽青蛻之古籍別名。典見綱目。詳「青蛻」條。

【蟲 白蠟】 命名 本品非蜂蜜之蠟。乃小蟲所作於樹枝間之蠟質。故名。

處方用名 蟲蠟、樹蠟、白蠟。

古籍別名 木蠟(和漢藥考) 外國名詞 Cera Chinensis

(拉丁) (Chinese or Insect Wax) White wax (英)

基本 屬漆樹科爲落葉喬木冬青 (shussuodanea) 之果實漿液所成。

產地 凡四川、安徽、雲南、湖南諸省之山谷原野間。恒有生長焉。

形體 白蠟爲黃白色。有光澤之固塊。比重〇・九七至〇・九八。不溶於水及冷酒精。溶於沸騰酒精。伊打脂肪油等。逢五十二度至五十五度之溫度。熔化。一百五十度而沸騰。逢苛性鹼則鹼化。

採取 採蠟之法。各國不同。但皆大同小異。今述其一。斑如左。冬青十月間。葉落。果實成熟時。採取之。入刀搗碎。用箕鏟分粉與核。於釜中列置木材上。鋪席。將粉撒布其上。蒸之。次入麻袋。再蒸。用壓搾器壓搾。採收流出之蠟。入盆。冷成餅。謂之生蠟。再待其入鍋熔化。另用大桶盛冷水。浮置小箱。箱下邊隅有孔。將熔化蠟傾入箱內。則蠟從箱孔流入水中。乃以手揉之。次將其蠟列置席上。置日光下曬乾。約二星期。卽變爲白色。謂之曬蠟。

(黃蠟之曬白者。亦呼曬蠟。不可與此混同) 蠟蠟白法。中有加灰汁法。

性質 甘溫。無毒。

成分 概爲軟脂 (Palmitine $C_{25}H_{51}$ $C_{26}H_{53}$) 效能 續筋。接骨。生肌。止血。專

一八二二

作膏藥原料。治創傷出血。爲外科要藥。

作用 有直接凝固血液之功。主治 生肌止血。定痛補虛。續筋接骨。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論蠟白蠟曰。入丸散服。殺瘰癧。

用蠟 八分至錢半。

施用宜忌 凡無蟲積者禁用。參攷資料 ①白蠟爲外科要藥。與合歡皮同入長肌肉膏中。用之神效。但未試其可服否也。(朱震亨) ②蠟樹葉。亦治瘡腫。故白蠟爲外科要藥。正如桑螵蛸與桑木之氣相通也。(李時珍) ③蠟白蠟與蜜蠟之白者不同。乃小蟲所作也。其蟲食冬青樹汁。久而化爲白脂。黏敷樹枝。人謂蟲屎。皆樹而然。非也。至秋刮取。以水煮淨。澀置冷水中。則凝聚成塊。碎之。文理如白石。膏而蠟微。人以和油。澀燭火。勝蜜蠟也。(汪機) ④唐宋以前澀燭。入藥所用白蠟。皆蜜蠟也。此蟲白蠟。則自元以來。人始知之。今則爲日用物矣。四川、湖廣、滇南、閩

哭夜啼。陰腫。〔清〕黃宮繡本草求
眞論蟬蛻曰蟬蛻止一蟲殼味甘
氣寒。如何主治甚多蓋蟬本木餘
氣所化飲風露而不食其言能治
肝經風熱者因體氣輕虛而味甘
寒之意也。其言能治婦人生子不
下及退醫膜浸睛。腎肉滿背者因
其性有善脫之意也。其言能治皮
膚瘡疥癢疹者以其所取在殼之
意也。其言能治中風不語者以其
蟬聲清響之意也。其言能治小兒
夜啼者以其晝鳴夜息之意也。古
人立藥治病。何在不有義存。惟在
人細自審用耳。色黑而大者良。入
藥洗去泥土翹足。漿水煮曬乾用。
近人學說 張山雷曰蟬蛻亦
作蟬退。一稱蟬衣。王充論衡謂蟬
蟬化腹蟄。腹蟄析背出而爲蟬。近
之譌昆蟲學者謂蟬在土中約有
二年之久。迨出土脫殼生翼而飛
其生命不過二十日。蓋此蟲蟄土
最久得陰氣甚深。故其性寒涼。本
經謂蟬主小兒驚癇夜啼。癇病
寒熱。別錄謂蟬主驚悸。蟬蛻主
小兒驚癇。蓋幼科驚癇內熱爲多。
卽素問之所謂血與氣并交走於

上。則爲薄厥。〔薄音博。迫也。言氣
血上壅。迫之爲厥。〕亦卽西學家
之所謂血冲腦治以寒涼降其氣
火使不上冲。此所以能治癇癇之
眞義也。甄權謂蟬蛻治小兒壯熱
其意亦同。宗爽謂除目昏障翳。治
小兒瘡疹出不快。則以此蟲出土
卽蛻。取其速脫之意。且目之翳膜。
兒之痘瘡。實熱爲多。寒能勝熱。是
以主之。按之古義本無祛外風療
聲嘶之說。惟陳藏器始有治啞病
一說。則是臆見。若謂詩稱鳴蜩當
能助人聲音。抑知蟬以翼鳴。豈能
發人之聲。且蟬之有蛻。尙在未飛
未鳴之時。而謂能治啞病可笑孰
甚。此未嘗研究物理之眞。而作半
面理想。似是實非。最爲可哂。古人
誤會恒有此蔽。原不足異。今當開
明之。世學者必須識得此中眞相。
李氏瀕湖更謂蟬之爲物。秋風吸
露。其氣清虛。故主一切風熱。遂於
蟬蛻主治條中加入頭風。眩暈。皮
膚風熱。破傷風。及大人失音。小兒
喉風。天吊云云。又是添出許多風
病。豈知方其蛻時。風尙未發。露亦
未吸也耶。惟蛻是外皮。而性則涼

若謂能療皮膚輕淺之風熱。庶乎
近之。瀕湖又謂治痘疹作痒。則實
熱有餘者宜之。如其氣虛作痒。不
混用。迨至楊氏玉衡竭力爲此物
鼓吹。竟謂輕清靈透。爲治血病聖
藥。又謂蛻者退也。脫然無恙云云。
措辭尤其鄙陋。究竟無氣無味。豈
有能當大任之理。乃偏有以臭腐
爲神奇。如楊氏者不知何以覽障
至此。要之不學無術。欺人適以自
欺。耳實地極輕。止可偶作佐使之
用。自二三分至四五分而止。或用
五六枚至十枚亦可。今人恒去嘴
足用之。蓋惟取輕揚者耳。
配合應用 ①治目盲障翳。用
蟬蛻。羚羊角。蜜蒙花。白蒺藜。草決
明。木賊草。穀精草。甘菊花。夜明沙。
生地黃。黃連。女貞實。
②治小兒風熱。急驚癇病。用蟬
蛻。丹砂。茯神。真珠。牛黃。礞石。天竺
黃。鈎藤。鈎犀角。珀琥。全蝎。
③治痘瘡血熱出不快。用蟬蛻。
犀角。生地黃。紫草。麥門冬。連翹。金
銀花。
④治大人小兒痧癘。用蟬蛻。石
青。昆蟲子。赤檳木。薄荷。玄參。甘草。

葛根。栝樓根。麥門冬。
⑤治小兒夜啼。小兒一百二十
日內夜啼。用蟬蛻四十九個。去前
截用。後截爲末。分四服。鈎藤湯調
灌之。〔心鑑方〕。普濟蟬花散。治小
兒夜啼不止。狀若鬼祟。用蟬蛻下
半截爲末。一字。薄荷湯入酒少許
調下。或者不信。將上半截爲末。煎
湯調下。卽復啼也。古人立方。莫知
其妙。
⑥治小兒驚啼。啼而不哭。煩也。
哭而不啼。躁也。用蟬蛻二七枚。去
翅足爲末。入硃砂末一字。蜜調與
吮之。〔活幼口議方〕。
⑦治小兒天甲。頭目仰視。痰塞
內熱。用金牛兒卽蟬蛻。以漿水煮
一日。曬乾爲末。每用一字。冷水調
下。〔衛生易簡方〕。
⑧治小兒喉風。初生口噤。不乳。
用蟬蛻二七枚。全蠍去毒二七枚。
爲末。入輕粉末少許。用乳汁調灌。
〔全幼心鑑方〕。
⑨治破傷風病發熱。用蟬蛻炒
研。酒服一錢。神效。〔醫學正傳方〕。
又用蟬蛻爲末。葱涎調塗破處。卽
時取去。惡水立效。名追風散。〔普

歷代記述攷證

【唐】蘇恭新

修本草論蟬曰小兒痢絕不能言

【唐】甄權藥性本草論蟬曰小兒

驚哭不止殺疳蟲去壯熱治腸中

幽幽作聲

參攷資料

●蟬腦煮汁服之

主產後胞衣不下自有正傳（陳

藏器）●蟬主產難下胞衣亦取

其能退脫之義聖惠治小兒發痢

有蚱蟬湯蚱蟬散蚱蟬丸等方今

人只知用蛻而不知用蟬也（李

時珍）

【蟬皮】即蟬蛻之古籍別名典見

和漢藥考詳【蟬蛻】條

【蟬衣】即蟬蛻之處方用名詳【

蟬蛻】條

【蟬花】

命名 本品以其形象

花故名

古籍別名 冠蟬（禮記）胡蟬

蟬蛻（毛詩）蛻（綱目）

產地 出蜀中

形態 蟬花為蟬類之一種其

頭上有一角如花冠狀可供藥用

性質 甘寒無毒

主治 小兒天疳驚瀉癰癧夜啼心忪

歷代記述攷證

【明】李時珍

本草綱目論蟬花曰功同蟬蛻又

止瘡疾

【蟬退】即蟬蛻之處方用名詳【

蟬蛻】條

【蟬殼】即蟬蛻之處方用名詳【

蟬蛻】條

【蟬蛻】

命名 蟬者禪也變化

相禪之謂蓋蟬蛻化腹

蟬腹蟬者蟬也而蛻乃蟬之殼故

名

處方用名 蟬退蟬衣蟬殼

古籍別名 枯蟬腹蟬（別錄）

金牛兒（綱目）蟬甲蟬皮（和漢

藥考）

外國名詞 Cicada-shell（英）

基本 屬昆蟲類中有吻蛻為

幼蟬出地時脫下之皮殼

產地 陳仁山藥物生產辨云

蟬蛻以浙江省金華府蘭溪縣等

為上福建次之惟黃背嶺產者亦

佳

形態 蟬之種類極多故形態

大小色彩等亦皆不同大抵頭部

稍方有一雙複眼與單眼小觸角口作吻狀便於吸收液汁胸部如管腹略作三角式背部色茶褐或黑腹部作白粉狀胸部有翅兩對足三對翅透明如膜而有黑色之網眼與斑點便於飛翔止則疊翅作屋脊狀雄者胸腹間具有起皺變之小膜依呼吸作用而發喧聲長鳴而使雌者知其所在雌者產卵樹上卵孵化為幼蟲下樹而入地中幼蟲之期間有長至數年者形狀類似螭蟬頭大觸角長吸收樹根之液汁而發育幼蟲之將為成蟲也必出地上至樹上一二尺高處首足具備終自背部綻裂而脫皮此時呼為木蟬其皮殼乾燥則現茶褐色堅硬而黏有泥土以之入藥下品也又經數日更上樹三五尺脫皮如前且生翅而飛去此二次所脫之皮殼較前所脫者軟而且清淨藥用乃為上品

種類

夏月始鳴大而色黑者

曰蚱蟬曰蛻曰馬蛻頭上有花冠

者曰蟬蛻曰蟬具五色者

曰蟬蛻此數種之皮殼皆可入藥

小而有文者曰蟬曰麥蛻小而色

青綠者曰茅蛻曰茅蛻秋月鳴而

色青紫者曰蟬蛻曰蛻蛻曰蛻蛻

曰蟬蛻曰蟬蛻其小而色青赤者

曰蟬蛻曰蟬蛻曰蟬蛻曰蟬蛻

秋風則瘡不能鳴者曰蟬蛻曰蟬

蟬二三月間鳴而小於寒蟬者曰

蟬母此數種之皮殼皆不入藥

採取 五六月間採收之

製法 李時珍曰凡用蟬蛻沸

湯洗去泥土翅足漿水煮過曬乾

用

性質

鹹甘寒無毒

效能 散風熱宜肺氣發疹瘡

治驚瀉用作熱病藥及為小兒瀉

藥

主治 鹹甘寒無毒主治小兒

驚瀉婦人生子不下燒灰水服治

久痢

歷代記述攷證

【唐】甄權藥

性本草論蟬蛻曰小兒壯熱驚瀉

止渴【唐】陳藏器本草拾遺論蟬

蛻曰研末一錢井華水服治噤病

【宋】寇宗奭本草衍義論蟬蛻曰

除目昏障翳以水煎汁服治小兒

瘡疹出不快甚良【明】李時珍本

草綱目論蟬蛻曰治頭風眩暈皮

膚風熱瘡疹作癢破傷風及丁腫毒瘡大人失音小兒喉風天用驚

主治 功同蟹

【蜚蠊】卽蟹之古籍別名。典見綱目。詳「蟹」條。

【蟠桃草】卽接骨仙桃之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『接骨仙桃』條。

【烏蠱蚤】 古籍別名。蜈蚣。爾雅。負蠱。蠱。蚤。蚱。蟻。烏。

外國名產 Oxya verox,

Feb.

形體 蟲爲卵生蟲類蝗屬之一種種類甚多體長寸許有深灰黃綠青黑等色頭爲三角形翅爲革質能飛後肢腿腳甚大能跳夏月卵化而出長七八分綠色冬月蟄土產卵好食禾稻穀類實爲農田之害蟲可供藥用

種類 ①在草上者名草蠹 ②名負鑿 ③在土中者名土蠹 ④一名蟻舘 ⑤似草蠹而大者名蠹斯 ⑥一名蠹舘 ⑦似蠹斯而細長者名蟻蠹 ⑧一名蟻斯

採取 以大而青黑者入藥用。

性質 辛平微毒。

主治 咳嗽驚風。破傷。癱折損。凍瘡。癰疹不出。

配合應用 ●治鷓鴣瘟其症。

咳嗽不已連作數十聲類哮喘非哮喘
似喘非喘小兒多患此取穀田內
蚱蜢十個煎湯服三劑愈（王氏
效方）
鷓鴣鬱小兒有之其症如
物哽咽欲吐難出之狀久之出瘰
少許日久必死治以乾蚱蜢煎湯
服（百草鏡方）

②治破傷風用霜降後稻田內

收方頭灰色蚱蜢同穀裝入布袋內曬乾勿令受溼致生蟲蛀壞。嘗曬爲要遇此症用十數個瓦上槌存性酒下立愈（救生苦海方）

③治痧脹用蚱蜢五六個煎湯溫服。(養素園驗方)

④治凍瘡。用方頭黃色蚱蜢風乾。煨研。香油和搽。摻亦可。（養書園驗方）

方

▲治產後冒風。乾炸蜈蚣數十個。瓦上煨存性。好酒調服。(王良生救急方)

參攷資料。①蟲彙五月五日。

候交時收取夫婦佩之令相愛媚
 (陳藏器) 蠶得夏之氣以生
 得秋之氣而繁性竄烈能開關透
 竅治暴疾氣閉大抵取其竄捷之
 功(趙學敏)

【蟲螻】卽蟲螻之古籍別名典見網目詳『蟲螻』條。

【蟾子】①即蜘蛛之長脚者性質功効與『蜘蛛』同。詳『蜘蛛』條。②即壁錢之別名。性質功効與『壁錢』同。詳『壁錢』條。

【蟻兒草】卽鏡面草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『鏡面草』條。

【蟻蚱】即金龜子之別名詳『金龜子』條。

【蟻蟻】卽蟻蟻之古籍別名。典見本經詳「蟻蟻」條。

【螻蛄】卽螻蛄之古籍別名。典見本經。詳『螻蛄』條。

【蟪魚】卽衣魚之古籍別名。典目圖經本草詳『衣魚』條。

古籍別名 蚱蟬（本經）

蠅 蠅齊女(本草綱目)馬蠅
最大者名緬馬蠅(爾雅)蜘蛛
(俗名)

基本係節肢動物昆蟲類有

吻類蟬科之蟬

形體 蟬爲化生蟲類之一種。種類甚多。體長頭短。觸角亦短。計有七節。複眼突出。單眼三。吻爲針狀。長短不一。胸背多斑紋。腹部分七節。雄者腹部有鳴器一對。雌者無之。故不能鳴。稱爲啞蟬。翅翼有透明者。有具五色者。前翅比後翅大。前肢腿部粗大。下面有齒。可供藥用。其蛻詳見該條。



採取 五月間採之蒸乾勿令
蟲用。

性質 鹹甘寒無毒
主治 小兒驚癇夜啼。癰病瘰癧。
熱。本經。驚悸。婦人乳難。胞衣不
出。能墮胎。(別錄)

十八畫 藏 藐 薔 蛄 蟬 蟻 蟻

序常發生。其汁可作染料。花葉莖等。亦可供藥用。



草 薔

性質 苦。平。無毒。

主治 久嗽上氣喘逆。久寒驚悸。痲疥。白禿。瘍氣。殺皮膚小蟲。

歷代記述攷證 【魏】吳普本草論薔草曰。治身熱邪氣。小兒身熱。【宋】大明諸家本草論薔草曰。洗一切惡瘡有效。

參攷資料 薔草生青衣川谷。九月十月採取。可以染作金色。【別錄】青衣縣名。在益州。今處處平澤溪澗。側皆有。葉似竹而細薄。莖亦圓。小今荊襄人煮以染黃色。極鮮好。俗名綠薔草。【蘇恭】

【藏紅花】即西藏紅花之處方用名。詳「西藏紅花」條。【即紅花之處方用名。詳「紅花」條。

【藏香】命名 本品出西藏而香故名。

古籍別名 吉吉香。【拾遺】

製法 趙恕軒云。王景略曾製藏香。其方云。得自拉藏。予求得其法。用速香二片。沉香。黃熟香。黃檀。香。廣木香。各四兩。春花。甘松。三奈。玫瑰。瓣母。丁香。細辛。檜皮。生軍。排草。乳香。金顏香。噠叭。槐油。蘇合油。伽楠水。安息各二兩。冰片一兩。右各爲極細末。以頂好榆麵二斤。火硝十兩。化水。加老醇酒調和爲香。

主治 殺邪治瘴。透斑愈癰。催生明目。透發痘瘡。

參攷資料 出西藏作團成餅者良。如香炷者次之。色紫黃色。氣甚猛烈。焚之香聞百步外者佳。僞者名京香。不入藥用。又有出打箭爐者。不及西藏出者第一。有紅藏黃藏紫藏之分。藏香有紫黃二色。粗細二種。各處皆有。惟產於巴塘者爲最。【蕭騰麟】藏香中有一種白色小丸子。焚之氣頗幽爽。亦係番僧所貢。不知何名。其氣香。嗅之可治老人腸燥氣虛。便閉。入廁時焚一二丸。最妙。亦可治痘。【葉明齋】藏香有黑如墨者。燃之催生甚妙。【朱大駿】藏香有綠色者。云最貴。焚之嗅其烟。可清

目。不知彼中何草合成。【聞人達遠】

【藏棗】命名 本品爲棗樹之產於西藏者故名。

形態 藏棗爲棗類之一種。其實大者長二寸許。形味絕如南棗。核似蠶蛹形。而無仁。其實可供藥用。

主治 補虛勞。定神志。療怯如神。益氣功同人參。

【藐】即紫草之古籍別名。典見爾雅。詳「紫草」條。

【薔】即雀麥之古籍別名。典見外臺。詳「雀麥」條。

【蟬王蛇】即蟬蛇之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「蟬蛇」條。

【蟬蛇】古籍別名 王蛇。蟬王蛇。王字蛇。黑色者名烏蟬。網目拾遺。

產地 深山間處處多有之。

形態 蟬蛇爲蛇類之最大者。全體長達二丈餘。有鱗。背鱗小。頭部及眼部鱗大。背色黃褐。有褐色大斑。腹部白色。肛門兩側尙存後脚之跡。額部有天生王字。常蟠居樹間。以何食物。體大如麋鹿。亦能

絞殺而食之。其脂肪熬取之油。可供藥用。

製法 收蟬油銅鍋內熬熟。隨將黃蠟入油內攪勻。油紙攤膏用。

主治 漏瘡貼之。

【蟬蛇草】即赤車使者之日本名。詳「赤車使者」條。

【蟬龜】即蟬龜之古籍別名。典見漢書。詳「蟬龜」條。

【蟬】即蟬蟬之古籍別名。典見嘉祐圖經本草。詳「蟬蟬」條。

【蟬蟬】基本 本品即蟹之生於陂池中。似蟬蟬而大者。



蟬 蟬

外國名詞 Crapaud sp.

性質 鹹。冷。有毒。

主治 取膏塗溼癬疽瘡。

【蟬蟬】即蟹之古籍別名。典見綱目。詳「蟹」條。

【蟬蟬】基本 本品即蟹之小。而無毛者。

loria, L.) 爲一年生或越年生

草本。莖高二三尺。葉在下部者爲倒卵圓形有柄。在上部者爲披針形無柄。花爲黃色四瓣花。作總狀花序排列。果實爲扁平翅果。日本於享保年中始傳入云。(二)山藍

係屬大戟科之山藍 (Mercurialis Leiocharva, S. et Z.) 產台灣及琉球。爲常綠草本。自生於陰地。莖高一二尺。葉對生。爲橢圓形有長柄。花爲單性。花呈黃綠色也。(三)琉球藍 (馬藍) 係屬爵牀科之琉球藍 (Strobilanthes

Flaccidifolius, Nees.) 多產於熱帶地方。莖粗有節。葉對生。花爲紫色。(四)木藍。係屬豆科之木藍 (Indigofera Tinctoria, L.) 適於熱帶地方。台灣產頗多。莖作灌木狀。葉爲倒卵圓形。小葉合成之羽狀複葉。類槐葉。花爲雜黃色及赤色之蝶形花。俗呼印度藍顏料。

即從此植物葉採製之青色天然顏料。玉藍澱之製法。先刈取藍之莖葉。曬乾取葉。葉名揉藍。鋪置棧房中地板上。灑水使之醱酵。經數週後。則葉中所含糖原質分解。生

出藍素 (Indigo) 名爲藥。將此和水共置臼搗。使成一團。名爲藍球。染坊於藍或藍球。加石灰木灰。絨及水入藍。使起乳酸酸酵。則藍素受還元作用。變成白藍。以之溶於鹼液中。於液面浮上藍青色一塊者。即謂之藍澱或藍花。其味辛苦。性寒無毒。並能解諸毒。小兒禿瘡。熱腫。止血殺蟲。又治噎膈。染坊藍液亦有解諸毒功效。如中河豚毒。服藍液一二碗。其毒即解。(和漢藥考)

【藍澱】 命名 本品係以藍與石灰製成之澄澱物。故名。性質 辛苦寒。無毒。主治 解諸毒。傳熱瘡。小兒禿瘡。熱腫。歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論藍澱曰。止血殺蟲。治噎膈。

配合應用 ①治時行熱毒。心神煩躁。用藍澱一匙。新汲水一盞服。(聖惠方) ②治小兒熱丹。藍澱傳之。(祕錄方)

出藍素 (Indigo) 名爲藥。將此和水共置臼搗。使成一團。名爲藍球。染坊於藍或藍球。加石灰木灰。絨及水入藍。使起乳酸酸酵。則藍素受還元作用。變成白藍。以之溶於鹼液中。於液面浮上藍青色一塊者。即謂之藍澱或藍花。其味辛苦。性寒無毒。並能解諸毒。小兒禿瘡。熱腫。止血殺蟲。又治噎膈。染坊藍液亦有解諸毒功效。如中河豚毒。服藍液一二碗。其毒即解。(和漢藥考)

③治口鼻急疳。數日欲死。以藍澱敷之。令徧。日十度。夜四度。(千金方)

④治誤吞水蛭。青澱調水飲。即瀉出。(普濟方)

參攷資料 ①澱。石澱也。其滓澄澱在下也。亦作澱。俗作靛。南人掘地作坑。以藍浸水一宿。入石灰攪至千下。澄去水。則青黑色。亦可乾收。用染青碧。其攪濁浮沫。掠出陰乾。謂之靛花。即青黛。(李時珍)

②澱乃藍與石灰作成。其氣味與藍稍有不同。而其止血拔毒殺蟲之功。似勝於藍。按廣五行記云。唐永徽中。絳州一僧病噎。不可食。數年臨終。命其徒曰。吾死後。可開吾胸喉。視有何物。苦我如此。及死。其徒依命開視。胸中得一物。形似魚而有兩頭。徧體悉似肉鱗。安鉢中。跳躍不已。戲投諸味。雖不見食。皆化爲水。又投諸毒物。亦皆消化。一僧方作藍澱。因以少澱投之。即怖懼奔走。須臾化爲水。世傳澱水能治噎疾。蓋本於此。今方上或以染水。願飲人治噎膈。皆取其殺蟲也。(李時珍)

③治口鼻急疳。數日欲死。以藍澱敷之。令徧。日十度。夜四度。(千金方) ④治誤吞水蛭。青澱調水飲。即瀉出。(普濟方) 參攷資料 ①澱。石澱也。其滓澄澱在下也。亦作澱。俗作靛。南人掘地作坑。以藍浸水一宿。入石灰攪至千下。澄去水。則青黑色。亦可乾收。用染青碧。其攪濁浮沫。掠出陰乾。謂之靛花。即青黛。(李時珍) ②澱乃藍與石灰作成。其氣味與藍稍有不同。而其止血拔毒殺蟲之功。似勝於藍。按廣五行記云。唐永徽中。絳州一僧病噎。不可食。數年臨終。命其徒曰。吾死後。可開吾胸喉。視有何物。苦我如此。及死。其徒依命開視。胸中得一物。形似魚而有兩頭。徧體悉似肉鱗。安鉢中。跳躍不已。戲投諸味。雖不見食。皆化爲水。又投諸毒物。亦皆消化。一僧方作藍澱。因以少澱投之。即怖懼奔走。須臾化爲水。世傳澱水能治噎疾。蓋本於此。今方上或以染水。願飲人治噎膈。皆取其殺蟲也。(李時珍)

【藍藤】 產地 出朝鮮半島。形態 藍藤爲蔓草類之一種。根如細辛。可供藥用。

性質 辛溫無毒。主治 冷氣咳嗽。煮汁服。

【藍葉】 即藍蛇之古籍別名。典見本草拾遺。詳「藍蛇」條。

【藍露】 即青黛之古籍別名。典見和漢藥考。詳「青黛」條。

【藍草】 古籍別名 蓑竹。(詩小雅) 蓑草。(唐本草) 黃草。(吳普) 藍草。王芻。(爾雅) 藍草。(許氏說文) 鴟脚莎。(綱目)

外國名 Arhaxon cilare, Beauv. (拉丁) ノバナダサ ハチヂヤウカリヤス (日本)

基本 禾本科藍草屬。爲藍草之花葉莖根。

產地 山野川谷均有出。

形態 藍草爲澤草類之越年或一年生草本。細莖布地。莖末豎立。分枝爲數枝。高一二尺。葉廣披針形。或長卵形。有尖端。九月間枝梢着花。集成長穗狀花序。約一寸許。與芒之穗相似。褐紫色。且數花

【藍葉汁】即藍葉搗取之汁。詳『藍葉』條。

【藍實】 命名 本品莖葉可染碧色。故名。

古種別名 大青子。青黛實。(和漢藥考) 麥藍。(嘉祐圖經本草)

外國名詞 Polygonum tinctorium, Lour.

基本 屬蓼科為麥藍之實。



(一) 實藍



(二) 實藍

形態 藍為溼草類之一年生草本。栽植者頗多。莖高一二尺。葉互生。作橢圓或卵圓形。葉柄基部有膜狀繃。將莖包攏。夏月於莖頂葉腋抽出長梗。開淡紅色小花。相綴作穗狀。花被為五裂花。蓋花後

結赤褐色有光澤之小閉果。可供藥用。

採取 五月六月間採之。製法 採得洗淨曬乾用。

性質 苦寒。無毒。效能 清熱毒。消腫痛。專作解毒藥。

主治 解諸毒。殺蟲蚊注鬼螫毒。久服頭不白。輕身。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論藍實曰。填骨髓。明耳目。利五臟。調六腑。通關節。治經絡中結氣。使人強健。少睡。益心力。【唐】蘇恭新修本草論藍實曰。療毒腫。

【明】繆希雍本草經疏論藍實曰。藍實味苦寒而無毒。其用主解諸毒。殺蟲蚊注鬼螫毒。久服頭不白。頭白者血熱也。藍能涼血而解熱。故令髮不白也。熱去而血得所養。故身輕。其葉汁解百藥毒。解狼毒。射罔毒。藥性論云。藍實味甘。能填骨髓。益心力。止心煩躁。由此觀之。苦寒而兼甘可知矣。日華子又云。治天行熱狂。行瘡。遊風。熱毒。腫毒。風癰。除煩止渴。殺疳。解毒。藥毒。箭金瘡。血悶。排膿。小兒熱疳。小兒

丹熱。最為要藥。其功用之廣。具如本草所載。麥藍最堪入藥。甘藍人食去熱黃。

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡無實熱火毒者禁用。

參攷資料 按陸佃埤雅云。月令仲夏。令民無刈藍以染。鄭玄言恐傷長養之氣也。然則刈藍先王有禁。制字從藍。以此故也。(李時珍)

藍實生河內平澤。其莖葉可以染青。(別錄) 藍有三種。一種葉圓徑二寸許。厚三四分者。填染青。出嶺南。太常名為木藍子。陶氏所說。乃是菰藍。其汁採為澱。其青者。本經所用。乃是麥藍實也。其苗似麥。而味不辛。為澱。惟作碧色爾。(蘇恭) 藍處處有之。人家蔬圃作畦種。至三月四月生苗。高二三尺許。葉似水蓼。花紅白色。實亦若薔子。而大黑色。五月六月採實。但可染碧。不堪作澱。此名麥藍。即醫方所用者也。別有木藍。出嶺南。不入藥。有菰藍。可為澱。亦名馬藍。爾雅所謂箴馬藍是也。又揚州一種馬藍。四時俱有。葉類苦實菜。

土人連根採服。治敗血。江寧一種臭藍。二月內生。如蒿。葉青花白。亦解熱毒。此二種雖不類。而俱有藍名。且古方多用臭藍。或恐是此。故并附之。(蘇頌) 藍實即大藍實也。謂之麥藍者。非是。乃爾雅所謂馬藍者。解諸藥毒。不可闕也。實與葉兩用。(寇宗奭) 藍凡五種。各有主治。惟藍實專取麥藍者。藍實如麥。五六月開花。成穗細小。淺紅色。子亦如麥。歲可三刈。故先王禁之。菰藍葉如白菰。馬藍葉如苦蕒。即郭璞所謂大葉冬藍。俗中所謂板藍者。二藍花子。並如麥藍。臭藍莖如蒿。而花白。臭人種之。木藍莖如決明。高者三四尺。分枝布葉。葉如槐葉。七月開淡紅花。結角。長寸許。藥藥如小豆角。其子亦如馬蹄。決明子而微小。迥與諸藍不同。而作澱則一也。別有甘藍。可食。蘇恭以馬藍為木藍。蘇頌以菰藍為馬藍。宗奭以藍實為大葉藍之實。皆非矣。(李時珍) 世上所熟知之藍。麥藍之外。尚有主要者四種如下。(一) 菰藍。(大青) 係屬十字花科之大青 (Isatis tinctoria)

如蝮蛇而有約。其尾可供藥用。

採取 從約斷之。頭有毒。取尾

用良。

主治 用頭合毒藥。毒人至死。

以尾作脯。食之即解。

【藍葉】即甘藍之古籍別名。典見

千金食治。詳【甘藍】條。

【藍葉】原名 藍葉汁。

製法 採葉搗汁用。

性質 苦甘寒。無毒。

主治 殺百藥毒。解狼毒。射罔

毒。

歷代記述攷證 【南北朝】陶

弘景本草集註論藍葉曰。汁塗五

心。止煩悶。療蜂螫毒。【明】李時珍

本草綱目論藍葉曰。斑蝥。芫青。椿

雞毒。朱砂。砒石毒。

近人學說 張山雷曰。藍草味

苦氣寒。為清熱解毒之上品。專治

溼邪熱病。實熱蘊結。及癰瘍腫毒

諸證。可以內服。可以外敷。其用甚

廣。又能殺蟲。療諸蟲毒螫者。蓋百

蟲之毒。皆由溼熱凝結而成。故凡

清熱之品。即為解毒殺蟲之品。并

能殺蟲者。蠱亦南方溼熱之毒。本

為毒蟲之類。又凡苦寒之物。其性

多燥。苟有熱盛津枯之病。苦寒在

所。顧忌。而藍之鮮者。大寒勝熱。而

不燥。尤為清火除中。劇良品也。

配合應用 ①治上氣咳嗽。呷

呀息。氣喉中作聲。唾黏。以藍葉水

浸搗汁一升。空腹頓服。須臾。以杏

仁研汁。煮粥食之一兩日。將息。依

前法。更服。吐痰盡。方瘥。【梅師方】

②治飛血赤目。熱痛。乾藍葉切

二升。車前草半兩。淡竹葉切三握。

水四升。煎二升。去滓溫洗。冷即再

熨。以瘥為度。【聖濟總錄方】

③治腹中蠱瘕。藍葉一升。搗。以

水三升。絞汁服一升。日二次。【千

金方】

④治天泡熱瘡。藍葉搗傅之。良

【集簡方】

⑤治唇邊生瘡。連年不瘥。以八

月藍葉一升。搗汁洗之。不過三度

瘥。【千金方】

⑥治小兒赤痢。搗青藍汁二升。

分四服。【子母祕錄方】

⑦治小兒中蠱。下血欲死。搗青

藍汁頻服之。【聖惠方】

⑧治陰陽易病。傷寒初愈。交合

陰陽。必病拘急。手足攣。小腹急熱。

頭不能舉。名陰陽易。當汗之。滿四

日。雖治。藍一把。雄鼠屎三七枚。水

煎服。取汁。【聖惠方】

①治驚癇發熱。乾藍。凝水石等

分為末。水調傅頭上。【聖惠方】

②治應聲蟲病。腹中有物作聲。

隨人語言。名應聲蟲。病用板藍汁

一盞。分五服。效。【夏子益奇疾方】

③治卒中水毒。搗藍青汁。傅頭

身令腫。【肘後方】

④治服藥過劑煩悶。及中毒煩

悶欲死。搗藍汁服數升。【肘後方】

⑤治卒自縊死。以藍葉汁灌之

【千金方】

⑥治毒箭傷人。藍青搗飲并傅

之。如無藍。以青布漬汁飲。【肘後

方】

⑦治瘡疹不快。板藍根一兩。甘

草一分。為末。每服半錢。或一錢。取

雄雞冠血三二點。同溫酒少許調

下。【錢氏小兒方】

⑧治齒齬腫痛。紫藍燒灰敷之。

日五度。【聖惠方】

⑨治白頭禿痛。煎藍煎汁頻洗。

【聖濟總錄方】

參攷資料 ①解毒不得生藍

汁。以青布漬汁亦善。【陶弘景】

②藍汁治蟲多傷。劉禹錫傳信方

著其法云。取大藍汁一盞。入雄黃

麝香二物少許。以點咬處。仍細服

其汁。神異之極也。張蕪員外住劍

南。張延實判官忽被斑蜘蛛咬頭

上。一宿咬處有二道赤色。細如箸

繞項上。從胸前下至心經。兩宿頭

面腫疼大如數升。益肚漸腫。幾至

不救。張公出錢五百千。并薦家財

又數百千。募能療者。忽一人應召

云。可治。張公甚不信之。欲驗其方

其人云。不諳方。但療人性命爾。遂

取大藍汁一盞。以蜘蛛投之。至汁

而死。又取藍汁加麝香。雄黃。更以

一蟻投入。隨化為水。張公因其異

之。遂令點於咬處。兩日悉平。作小

瘡而愈。【蘇頌】③諸藍形雖不同

而性味不遠。故能解毒除熱。惟木

藍葉力似少劣。藍子則專用。藍藍

者也。至於用礬與青布。則是刈藍

浸水。入石灰澄成者。性味不能不

少異。不可與藍汁一槩論也。有人

病嘔吐服玉璽諸丸不效。用藍汁

入口即定。蓋亦取其殺蟲降火爾

如此之類。不可不知。【李時珍】

十八畫 蕺

藉 藕 藍

也。且據書言。能治胃風泄瀉。又治粉刺酒癰。亦是風於太陽連累而及。治則與之俱治。豈但治風頭痛而已哉。或謂其性頗有類於芎藭。皆能以治頭痛。然一主於肝膽。雖行頭目。而不及於巔頂。一主太陽及督。雖其上下皆通。而不兼及肝膽之爲異耳。但春夏溫熱頭痛。及血虛火炎頭痛者。切忌。根紫色。似芎藭而輕虛。氣香味麻。

近人學說 張山雷曰。蕺本味辛氣溫。上行升散。專主太陽太陰之寒風寒溼。而能疏達厥陰鬱滯。功用與細辛川芎羌活近似。本經主婦人病瘕。陰中寒。腫痛腹中急。皆清陽不振。厥陰之氣鬱窒不伸。爲病溫以和之。升以舉之。解結除寒。斯急痛可已。疝瘕可除。而陰虛內熱。肝絡結滯之疝瘕急痛。非其治也。除風頭痛者。升陽以散太陽之寒。正與細辛芎藭之主頭痛同。例而肝膽陽邪。化風上升之頭痛。正是背道而馳。長肌膚者。亦寒溼除而陽和敷布。氣血乃調。若血虛多火。而肌肉消瘦者。寧非燭毒。悅顏色者。作爲外治敷藥。亦所以搜

肌表之寒溼。別錄所謂沐藥面脂。即是長肌膚之意。若多火而面色

肝癰者。又豈所宜。別錄謂辟霧露潤澤者。溫升助陽。能勝寒溼。此即仲景所謂清邪中上之病。亦即經言陽中霧露之氣也。又謂療風邪痺曳。則風寒襲絡。而經壅不仁。步履無力之症。庶幾近之。亦有陰虛與力。痿躄不用。而肢體痺曳者。則更非風藥所可妄試。此皆讀古書之不可死於字句間者。若不分虛實。不辨病因。而昧然從事。亦何往而不爲古人所誤耶。

配合應用 ①治寒邪鬱於足太陽經。頭痛顙頂痛。用蕺本羌活細辛川芎葱白。

②治務露療清邪中於上焦。蕺本與木香同用。

③治大實心痛。已用利藥。用此敵其毒。蕺本半兩。蒼朮一兩。作二服。水二鍾。煎一鍾。溫服。(活法機要方)

④乾洗頭屑。蕺本白芷。等分爲末。夜擦。日梳垢自去也。亦可作面脂。(便民圖纂方)

⑤治小兒疥癬。蕺本煎湯浴之。

并以澣衣。(保幼大千方)

用量 八分至錢半。

施用宜忌 凡陰虛火炎。及無風寒實邪者。禁用。惡菌茹。長青箱子。

參攷資料 ①邵氏聞見錄云。

夏英公病泄。太醫以虛治。不效。霍翁曰。風客於胃也。飲以蕺本湯而止。蓋蕺本能去風溼故耳。(李時珍)

②俗中皆用芎藭根鬚。其形氣乃相類。而桐君藥錄說芎藭苗似蕺本。論說花實皆不同。所生處又異。今東山別有蕺本。形氣甚相似。惟長大耳。(陶弘景) ③蕺本莖葉根味與芎藭小別。今出宕州者佳。(蘇恭) ④今西川河東州郡及

兗州杭州皆有之。葉似白芷香。又似芎藭。但芎藭似水芹。而大。蕺本葉細。爾五月有白花。七八月結子。根紫色。(蘇頌) ⑤江南深山中皆有之。根似芎藭而輕虛。味麻。不堪作飲也。(李時珍) ⑥蕺本於流行性腦脊髓膜炎。能緩解劇甚之頭痛與頸部強直。有特效。通常俱應用於婦人之頭痛。(日本漢醫學說) ⑦今人只知蕺本爲治顙頂

一八一四

頭腦之聖藥。而本經治婦人疝瘕。腹中急。陰中寒等證。皆太陽經寒

溼爲病。亦屬客邪內犯之候。故用蕺本去風除溼。則中外之疾皆痊。豈特除風頭痛而已哉。(張石頑)

【葉本實】 主治 風邪流入四肢。

【蕺菜】 即蕺本之古籍別名。典見山海經。詳「蕺本」條。

【藉姑】 即藉姑之古籍別名。典見別錄。詳「慈姑」條。

【菹豆】 即白扁豆之原名。詳「白扁豆」條。

【藍布裙】 蕺本 藍布裙爲雜草類之一種。可供藥用。

產地 出四川。

主治 腳氣壯筋骨。

【藍姑草】 即鴨跖草之古籍別名。典見綱目。詳「鴨跖草」條。

【藍青】 即青黛之古籍別名。典見和漢藥考。詳「青黛」條。

【藍蛇】 古籍別名 藍藥。(綱目拾遺)

產地 出廣西舊蒼梧縣諸地。

形態 藍蛇爲蛇類之一種。狀

住(李時珍)●薺草葉功用與葦同而發散力較多(醫學大辭典)

【薺菜】即薺摩之古籍別名。詳『薺摩』條。

【薺草】即佩蘭之處方用名。詳『佩蘭』條。

【薺梅】即烏梅之古籍別名。典見綱目詳『烏梅』條。

【薺金紙】即烏金紙之古籍別名。性質功效與烏金紙同。詳『烏金紙』條。

【薺葵子】即胡葵之古籍別名。典見和漢藥考。詳『胡葵』條。

【薺陸香】即乳香之原名。詳『乳香』條。

【薺渠】即阿魏之古籍別名。典見唐本草。詳『阿魏』條。

【薺蹄】即火腿之古籍別名。典見東陽縣志。詳『火腿』條。

【薺】即香附子之古籍別名。典見爾雅。詳『香附子』條。

【薺芥】即薺薺子之古籍別名。典見神志。詳『薺薺子』條。

【薺菜】即薺薺子之古籍別名。典見埤雅。詳『薺薺子』條。

【薺本】 命名 本品根上苗下而似禾莠故名。本者根之謂也。

處方用名 川薺本。

古籍別名 鬼卿鬼新。(本經)

微莖(別錄)薺茛(山海經)土芎地新鬼神兒卿山蘭安保生薺(和漢藥考)

外國名詞 Notosmyrnum japonicum, Miq. (拉丁)

基本 屬繖形科。爲薺本之根。

產地 陳仁山藥物生產辨云。薺本產廣東北江樂昌城口等處。實則凡山野川谷間恒多生焉。

形態 薺本爲深山自生之草。本高三四尺。形狀略類川芎。莖葉俱有疎毛。夏月開白色五瓣花。至秋季結平圓形一分餘之果實。薺本爲經數年亦不枯死大如著之簇生根。作角質狀。長六七寸。外面呈灰褐色。處處疣起。皮部之厚殆與木部同。內部呈黃白色。味有一種不快收斂性。此謂之眞薺本。或當歸薺本。

採取 正二月間採根曝乾。三十日成。

製法 去蘆頭。水洗淨用。性質 辛溫無毒。

效能 散風寒溼邪。療頭腦作痛。用作驅風燥溼藥。又爲癰疽疥癬藥。

主治 婦人疝瘕。陰中寒腫痛。腹中急。除風頭痛。長肌膚。悅顏色。(本經)辟瘴露。酒澤療風邪。痺曳金瘡。可作沐藥面脂。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論薺本曰。治一百六十種惡風。鬼疰流入腰痛。冷能化小便。通血去頭風。野炮【宋】大明諸家本草論薺本曰。治皮膚疵疥。酒蘄粉刺。癰疾【金】張元素珍珠囊論薺本曰。治太陽頭痛。顛頂痛。大寒犯腦痛。連齒痛【元】李東垣用藥法象論薺本曰。頭面身體皮膚風溼【元】王好古湯液本草論薺本曰。督脈病。脊強而厥【明】李時珍本草綱目論薺本曰。治癰疽。排膿內寒【明】經希雅本草經疏論薺本曰。薺本味辛氣溫。別錄兼苦從火化也。無毒。入足太陽經。溫能通苦能洩。大辛則善散。氣厚則上升。婦人疝瘕。陰中寒腫。腹中急。皆

太陽經寒溼邪爲病也。風頭痛者。風中於太陽經也。此藥正入本經。故悉主之。凡癰瘡皆血熱壅滯。毒氣浸淫於肌肉。以致潰爛不收。辛散苦洩。則毒解滯消。肌肉自長矣。悅顏色者。即去風作面脂之義也。辟瘴露療風邪者。辛溫芬芳。開發升散之力也。痺曳金瘡。及甄權治一百六十種惡風。鬼疰流入。腰痛。冷能化小便。通血。作沐藥面脂。日華子去皮膚疵疥。酒蘄粉刺。元素主太陽經頭痛。顛頂痛。及大寒犯腦痛。連齒痛。東垣主頭面身體皮膚風溼。皆風邪溼氣。干犯太陽經所致也。好古主督脈爲病。脊強而厥者。督脈並足太陽經。夾脊而上。故也。清黃宮繡本草求真論薺本曰。薺本據書載屬辛溫氣雄。能治太陽風犯顛頂。腦後俱痛。號爲是經要藥。且復言治脊強而厥。並婦人疝瘕。急迫腫痛。此雖病屬下見。及係太陽本經寒溼所致。然非風邪內犯。則病易形。薺本氣味辛溫。性雖上行。而亦下達。非謂用此以治太陽顛頂。頭齒痛。功止上建。而於脊強而厥。竟不循經下行。

薺 釋名杏參。亦名杏葉沙參。言其根似沙參。葉似杏葉也。黃宮繡本草求真云。似人參而無心。似桔梗而味甘。今市上無薺。人亦少有識者。吾鄉有草。葉似杏葉。花紫形如鈴鈴。根似菜菔。時人名之曰鮮沙參。採而曝乾入藥。名爲南沙參。按本草載沙參。本無南北之別。綱目只云產於沙土者。根長而大。產於黃土者。根矮而小。蓋土性之懸。堅使然也。吳儀洛本草從新分南北兩種。復出一空沙參。註即薺。今人徒知有薺之名。無復能識薺之藥。豈不惑哉。余考諸本草。驗諸藥物爲辨。今市上之南沙參。即古之薺。南北沙參功用同。母須混分。人人繫諸口實。則菜陽與海南。非沙土產者。皆可稱之爲南矣。

【薺】即桔梗之古籍別名。典見本經。詳「桔梗」條。

【薺菜】 原名 隱忍葉。性質 甘苦寒。無毒。

主治 主腹臟風壅。咳嗽上氣。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論薺菜曰。蠱毒腹痛。

面目青黃。林露骨立。煮汁一二升飲。

【薺菜】 命名 本品濟濟而生。故名。

古籍別名 護生草。細小者名沙薺。莖梗有毛者名薺菜。【綱目】外國名詞 Capsella Bursa-pastoris, Moench. (拉丁) ナ

ツナベンベングサ(日本) 薺菜 係十字花科薺屬。爲薺菜之莖葉。其子花詳見各條。

產地 原野間處處有之。

形態 薺菜爲菜類之一。年或越年生。草本。莖高數寸至尺餘。下部葉叢生。而作羽狀分裂。上部葉作箭形。無柄。有缺刻。春夏間開花。花小白色。作總狀花序。結實爲裂果。扁平三角形。中有細子。其嫩莖葉有一種香氣。可供蔬茹與藥用。



薺 菜

性質 甘溫。無毒。主治 利肝和中。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論薺菜曰。根葉燒灰。治赤白痢極效。【宋】大明諸家本草論薺菜曰。利五臟。根治日痛。【明】李時珍本草綱目論薺菜曰。明目益胃。

【薺菜子】 原名 薺寶。採取 三月三日。四月八日。採之陰乾。

性質 甘平。無毒。主治 明目。日痛。

歷代記述攷證 【魏】吳普本草論薺菜子曰。治腹脹。【唐】甄權藥性本草論薺菜子曰。補五臟不足。治青盲不見物。【唐】陳士良食性本草論薺菜子曰。去風毒邪氣。治墮去翳。解熱毒。久服視物鮮明。

參攷資料 ①薺菜子水調成塊。煮粥作餅。甚黏滑。可充飢。【綱目】②薺菜子患氣人食之。動冷痰。【甄權】③薺菜子不可與麪同食。令人胸悶。服丹石人不可食。【孟詵】

【薺菜花】 主治 療久痢。陰乾研末。煮湯下。

參攷資料 薺菜花布席下。辟

蟲。又辟蚊蠅。【陳士良】 薺菜粥 主治 明目。利肝。

【薺菜】 古籍別名 臭薺。【日華】青白薺。【綱目】外國名詞 Mosla Grosseserrata, Maxim. (拉丁) エンジリミソカウジュ(日本)

基本 係唇形科薺屬。藥用其莖葉。

產地 多出林野原澤間。

形態 薺菜爲芳草類之野生草本。莖高尺許。單葉對生。有柄。葉身略作斜方形。葉脈分枝。秋日稍上開唇形花。綴成穗狀。花淡紅色。有香氣。其香略似紫蘇。其莖葉可供藥用。

性質 辛溫。無毒。

主治 冷氣洩痢。生食除胸悶。酸水。按碎傳蟻瘻。

參攷資料 ①薺菜。蘇恭言江左名水蘇爲薺菜。按水蘇葉有雁齒。氣香而辛。薺菜葉稍長。其上有毛。氣臭。亦可爲生藥。【陳藏器】②薺菜處處平地有之。葉似野蘇而稍長。有毛。氣臭。山人茹之。味不甚

中醫雖以爲解毒利肺之要藥。然依余之試驗其作用不甚鮮明。似不能謂之有特殊之利肺作用也。然則中醫往昔之經驗豈有謬乎。是則不然。吾人欲強爲之解說時。其解毒作用。因薺苳含有多量之黏滑性物質。能緩和諸種刺激。並能防礙諸種物質之吸收。故時現解毒之作用。至其利肺之作用。因薺苳含有多量之甘味物質。故如一般糖質同。在矯正藥味之外。能促進咽喉氣管之分泌。使喀痰容易。故如氣管支加答兒等。未嘗不可用之。亦未嘗必不能奏效也。

配合應用

●強中消濕。薺苳腎薺苳湯。治強中之病。莖長興盛。不交精液自出。消渴之後。即發癰疽。皆由恣意色慾。或餌金石所致。宜此以制腎中熱也。用薺苳一具。薺苳石膏各三兩。人參、茯苓、磁石、知母、葛根、黃耆、栝樓根、甘草各二兩。黑大豆一升。水一斗半。先煮薺苳大豆。取汁一斗。去滓下藥。再煮三升。分三服。後人名爲石子薺苳湯。又薺苳丸。用薺苳、大豆、茯苓、磁石、栝樓根、熟地、黃地、骨皮、玄參、石斛。

鹿茸各一兩。人參、沉香各半兩。爲末。以豬肚治淨。煮爛。杵和丸。梧子大。每服七十丸。空心鹽湯下。(千金方)

●治丁瘡腫毒。生薺苳根。搗汁服一合。以滓傳之。不過三度。(金翼方)

●治面上疥癩。薺苳、肉桂各一兩。爲末。每用方寸匕。酢漿服之。日一服。又滅癰瘡。(聖濟總錄方)

●解諸蟲毒。薺苳根。搗末。飲服方寸匕立瘥。(陳延之小品方)

●解鈎吻毒。鈎吻葉與芹葉相似。誤食之殺人。惟以薺苳八兩。水六升。煮取三升。每服五合。日五服。(金匱方)

●解五石毒。薺苳生搗汁。多服之立瘥。(圖經方)

用鹽八分至錢半。

參攷資料 ●薺苳根莖似人參。而葉小異。根味甜。絕能殺毒。以其與毒藥共處。毒皆自然歇。不正入方家用也。又曰。魏文帝言。薺苳亂人參。卽此也。薺苳葉甚似栝樓。但葉下光明。滑澤無毛爲異。又不如人參相對耳。(陶弘景) ●人參

苗似五加而闊短。莖圓有三四極。極頭有五葉。陶引薺苳亂人參誤矣。且薺苳栝樓又有藥互者。亦有葉三四對者。皆一莖直上。葉旣相亂。惟以根有心爲別爾。(蘇恭)

●今川蜀江浙皆有之。春生苗莖都似人參而小異。根似栝樓。但無心爲異。潤州陝州尤多。人家收以爲果。或作脯啖。味甚甘美。兼可寄遠。二月八月採根曝乾。(蘇頌) ●薺苳苗似栝樓根。似沙參。故奸商往往以沙參薺苳通亂。人參蘇頌圖經所謂含參。周憲王救荒本草所謂香葉沙參。皆此薺苳也。圖經云。杏參生潯州田野。根如小葉根。土人五月採苗莖。治咳嗽上氣。救荒本草云。杏葉沙參。一名白鵝根。苗高一二尺。莖色清白。葉似杏葉而小。微尖而背白。邊有人牙。杪間開五瓣白盤子花。根形如野胡蘿蔔。顯肥皮色灰黯。中間白毛。味甜微寒。亦有開碧花者。嫩苗燻熱水淘。油鹽拌食。根換水煮亦可食。人以蜜煎充果。又陶弘景註栝樓言其葉名隱忍。可煮食之。治蟲毒。謹按爾雅云。旁。隱忍也。郭璞註云。似蘇

有色。江東人藏以爲糖。亦可啗食。葛洪肘後方云。隱忍草苗似栝樓。人皆食之。搗汁飲。治蟲毒。據此則隱忍非栝樓。乃薺苳苗也。薺苳苗甘可食。栝樓苗苦不可食。尤爲可證。神農本草經無薺苳。止有栝樓一名薺苳。至別錄始出薺苳。蓋薺苳栝樓乃一類。有甜苦二種。則其苗亦可呼爲隱忍也。(李時珍) ●愚按神農本草經無薺苳。止有栝樓一名薺苳。至別錄始出薺苳。另爲一種。是則可以形似相亂者。在栝樓與薺苳也。第二味俱用根。乃栝樓味苦辛。而薺苳味甘寒。因味以別之。固易明也。卽就時珍所云。薺苳根與沙參根相似。然亦就其味別之。沙參甘淡而寒。且有言其甘而微苦者。若薺苳根。在弘景謂其根味甜。絕能解毒。大甘能解毒。而味之絕甘。而能寒者。更解百藥之毒。是雖與沙參同有甘。而甘之各具者亦大殊。蓋甘而微苦者。卽不能解毒。此別錄之言。解百藥毒。不爲無據也。故細究其形似。而更精審於味。則庶乎無誤。不致用而罔功矣。(劉潛江) ●李時珍本草綱目

類沙參根。

採取 二八月間採根曝乾。

製法 凡採得水洗曬乾或蒸

製之

性質 甘寒無毒。

效能 利肺止咳嗽。解毒療瘡

腫。專作解毒藥。

主治 解百藥毒。

歷代記述攷證【唐】孟詵食

療本草論薺危曰食之壓丹石發

動【宋】大明諸家本草論薺危曰

殺蟲毒治蛇蟲咬熱狂溫疾署毒

箇【明】李時珍本草綱目論薺危

曰主咳嗽消渴強中瘡毒丁腫辟

沙蟲短狐毒【清】黃宮繡本草求

真論薺危曰薺危即甜桔梗似人

參而體虛無心似桔梗而味甘不

苦按據諸書有因味甘載能和中

止嗽消渴然力專主解毒以毒性

急迫甘以和之故也觀葛洪肘後

方云一藥而解毒者惟薺危汁

濃飲一升或煮嚙之亦可作散服

此藥在諸藥中毒皆自解也又張

鷲朝野食載云名醫言虎中藥箭

食清泥而解野猪中藥箭應薺危

此洵為解毒之最且更能治強中
精出消渴之後發為癰疽之症亦
以取其清熱解毒之功無他義耳
但市肆多取此苗以亂人參不可
不察

近人學說 袁淑範曰試驗液

之調製法取市中販賣之普通純

良薺危一〇〇搗為粗末用蒸餾

水再三溫浸之集合其濾液用電

扇於蒸鍋上蒸發使之乾燥然後

再以五〇〇之水溶之後乃更

改為中性液以供試驗以下稱之

謂水製越幾斯薺危之毒力及作

用皆不鮮明故簡略述之於左讀

者如能明其真相亦云足矣注射

其溶液於蛙及小白鼠時動物雖

有時陷於安靜狀態中然經數分

後無不恢復者况其大多數並不

現何等之異常症候如注射其極

大量後動物則先陷於麻痺狀態

經數小時後乃死去蓋薺危對動

物之毒性極微弱用其大量後對

於中樞乃現麻痺之作用也次乃

檢查其對於心臟之作用依費納

氏 (Steinhilber) 之方法

(Ringer) 液灌養之後乃加薺
危水製越幾斯時用少量則不現
何等作用大量時則現心臟搏動
慢而且小之作用然於此時加阿

刀冰 (Atropin) 時搏動則即恢

復加 Ba Cl₂ 時心臟搏動則即

停止如此得知薺危對於心臟之

作用亦只攻擊其支配神經而已

後更檢查其對於血壓及呼吸之

作用此則用家兔試驗之注射其

溶液於靜脈內時少則不現作用

多則亦不過血壓少下降呼吸

微許增大而已皆不堪令人注意

者也至其血壓下降之原因恐因

後述之血球溶解作用也薺危依

上述之動物試驗既知其毒性及

作用皆極微弱次乃更進而追求

其成分以各種之植物鹽基試藥

(Alkaloids) 試驗定其

成分非屬於植物鹽基因振盪其

水溶液易生泡沫疑其為一種配

糖體乃更用費林氏 (Fehling)

液檢其有無還元力時則現陽性

之反應後將此水溶液加鹽酸煮

證據愈多次更檢查其有無赤血
球溶解作用時則現著明之血球
溶解作用因此吾人則思其有效
成分恐為一種 Saponinkörper

故用次之方法提取之取市中販

賣之薺危研為粗末用熱水 Met-

hylalcohol 浸出之乘熱濾過

之待濾液冷後再用以脫 (Ac-

ter) 沈澱之後乃乾燥其沈澱再

溶之於 Methylalcohol 濾過

再以以脫沈澱之後乃乾燥其沈

澱再溶之於 Methylalcohol 濾

過再以以脫沈澱之如斯再三反

復後乃得白色無結晶之粉末本

粉末富於引滲性易溶於水及熱

酒精不溶於以脫奔苛羅仿等

溶點為一六〇—一八〇度本

粉末之水溶液有還元費林氏液

之力並且如加鹽酸煮沸後其還

元力亦更增加本粉末依 Lab-

aigne 氏法檢查時並未含有甾

素本品之水溶液與薺危之水製

越幾斯同樣振盪易生泡沫並能

溶解赤血球依以上之化學及物

理的性狀本粉末為一種 Sapo-

ninkörper 似無疑也薺危

以短總狀花序。花冠紅紫色。實爲莢果。黑中有子。似豌豆。粒小。色綠。農家播種田間。翌年埋入土中。以爲肥料。其莖葉可供食與藥用。

性質 辛平無毒。

主治 破血止血。生肌。搗汁服之。療五種黃病。以療爲度。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論翹搖曰。利五臟。明耳目。

去熱風。令人輕健。長食不厭。甚益人。【明】李時珍本草綱目論翹搖曰。止熱瘧。活血平胃。

參攷資料 翹搖羹食佳。生食令人吐水。【孟詵】

【翹搖子】 主治 活血明目。爲末甘草湯下。

【翻山虎】即羊躑躅根之別名。詳『羊躑躅』條。

【翻白草】 古籍別名 雞腿根。【救荒】天藕。【野菜譜】湖雞腿。【本草綱目】

外國名詞 Potentilla discolor, Ege. (拉) ツチギリ

ツチナ アクレウサウ (日本) 基本 係薔薇科委陵菜屬。爲翻白草之根。

十八畫 翹

產地 生原野田澤間。

形態 翻白草爲菜類之多年生草本。地下有塊根。早春羽狀複葉布地叢生。各小葉邊緣有齒牙。

葉背及柄白毛最多。初夏葉間抽莖。莖頭高達尺餘。莖端分歧。綴以散花。花冠黃色。花後結實。實中有細子。其塊根大如指。長數寸。皮赤肉白。有粉。可供食與藥用。

性質 甘微苦。平無毒。

主治 吐血下血。崩中。瘧疾。癰瘡。

【翻翹雞】即反毛雞之別名。功效與反毛雞同。詳『反毛雞』條。

【翻胃木】即常山之古籍別名。典見和漢藥考。詳『常山』條。

【麝香】即麝香之古籍別名。典見和漢藥考。詳『麝香』條。

【麝堂】即麝香之古籍別名。典見和漢藥考。詳『麝香』條。

【臍帶】 命名 胎在母腹。臍連於胞。胎息隨母。胎出母腹。臍帶既剪。一點眞元。屬之命門。

丹田。臍乾自落。如瓜脫蒂。故臍者人之命蒂也。以其當心腎之中。前直神關。後直命門。故謂之臍。臍之

爲言齊也。

古籍別名 命蒂。坎炁。【綱目】

主治 燒末飲服。止瘧。

翻 臍 舊 薯 蕷

爲言齊也。

古籍別名 命蒂。坎炁。【綱目】

主治 燒末飲服。止瘧。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論臍帶曰。解胎毒。傳臍

【舊坑砂】即硃砂之古籍別名。典見綱目。詳『硃砂』條。

【舊麻布】 命名 本品係麻質所織之舊布。故名。

主治 同旱蓮草等分。瓶內泥固。煨研。日用揩齒。能固牙烏鬚。

【薯蕷】 產地 閩廣諸山中均有出焉。

形態 薯蕷爲蔓草類之一種。葉尖長節。節生小刺。根圓如芋子。又似柚。大小不一。有鬚叢生。皮紫黑。肉紅黃。其根可供藥用。

主治 活血浸酒服。

參攷資料 薯蕷煮汁可染紗。網之屬。爲暑用之衣。謂之薯蕷網。亦謂之拷網。【醫學大辭典】

【薯蕷】即山藥之古籍別名。典見和漢藥考。詳『山藥』條。

【薯蕷】即山藥之原名。詳『山藥』條。

【薯蕷】即山藥之原名。詳『山藥』條。

命名 本品多有潰澆之狀。濟澆者。濃露也。故以名之。

處方用名 空沙參。

古籍別名 杏參。【圖經】蕪花。【爾雅】杏葉沙參。甜桔梗。【綱目】白麵根。地參。救荒。土桔梗。【原始】臭蘇賊參。【和漢藥考】

學名 Adenophora reme-tifolia. Adenophora polymorpha, var alternifolia.

基本 屬桔梗科。爲蕪花之根。

產地 凡山野平原恒有生長。

蕪 花

形態 蕪花爲多年生草本。春日生苗似桔梗。莖高三四尺。葉作橢圓或長卵圓形。末端帶尖。邊緣有粗鋸齒。長三寸許。有長柄。皆互生。傷其莖葉。則有白汁滲出。夏間梢頭開淡紫色喇叭花。連綴而爲穗狀花序。但多不開。足便已下垂。果實爲圓形之蒴果。根形似紡錘。

一八〇九



故也。濕熱客中焦。則清濁不分而爲霍亂。通利溼熱。則霍亂自解矣。

【明】李士材本草圖解論瞿麥曰。瞿麥之功用。惟破血利竅四字。可以盡其效能。非久任之品也。炒用。

【清】黃宮繡本草求真論瞿麥曰。瞿麥味苦性寒。功專瀉心利水。故

書載利小便。決腫癰。去癰閉。拔肉。刺下胎產。除目翳。然其氣稟純陽。

必其小腸氣厚。服此疏泄之味。病始克除。若使小腸素虛。經云。心屬

有熱。不惟其熱不除。則虛而益虛。必致變生他疾矣。妊娠產後。小便

不利。及脾虛水腫。均並禁焉。【清】鄒澍本經疏證論瞿麥曰。瞿麥小

便不利。微熱消渴者。五苓散主之。瞿麥湯主之。小便不利。有水氣。其

人若渴。枯樓瞿麥丸主之。夫均用利水。則皆有水氣可知。且同爲小

便不利而渴。其用藥殊異。乃爾何也。然此固有傷寒雜證之分。亦卽此可見。諸苓澤瀉。能治動而不化

之源。可見係胃乾求助於水。水不

行而爲患。病自寒來。仍不能離辛

甘發散之旨。諸苓湯證。其上有陽

明病。脈浮緊。發熱汗出。不惡寒。反

惡熱。身重之源。可見亦係胃熱飲

水而停。特以陽明屬燥金。不比太

陽寒水之化。故辛甘不用。改參入

鹹味。湧洩以除熱也。枯樓瞿麥丸

證。固係水停爲患。特其方下注云。

以腹中溫爲知。又可見其爲本寒

標熱矣。本寒標熱。用辛甘則嫌於

助熱。用鹹湧又嫌其助寒。故別出

清上溫下之法。以瞿麥茯苓二味

挾作病之由。此固難與前兩證並

言者也。以是知水之動而不定者。

非瞿麥所能治矣。

近人學說 張山雷曰。瞿麥卽

今恒時之所謂洛陽花。花色紅紫

斑斕。其性陰寒。泄降利水。除導滯

逐熱外。無他用。本經謂其明目去

翳。別錄謂其養腎。則邪熱清而真

陰復。非通利之品。果能養陰也。出

刺決離。隨胎其力猛矣。別錄又稱

其主霍亂。則溼熱內阻。清濁不分

者。以爲分泄逐溼之用。非主陰寒

不通。景岳謂合涼藥。亦消眼目腫

痛。合血藥。則通經破血。下胎宣導

下焦溼熱。石頑謂利小便之君藥。

日華又謂其葉主痔漏。瀉血解丹

石藥發。搗敷腫毒。浸淫瘡。無一非

清熱利導之用。然必實有溼熱壅

滯者爲宜。寇宗奭謂專通小腸。若

心經有熱。而小腸虛者。弗用。辨別

最爲清徹。石頑亦謂妊娠產後。小

水不利。及脾虛水腫者。禁用。頤按

又有老人虛人。氣化不利。而爲癰

閉。瘦少等證。亦非溼熱蘊積。治宜

宣化氣分。五苓八正。徒耗津液。皆

爲禁藥。

配合應用 一八八正散。利小

腸實熱結閉。

一立效散。治下焦結熱。小便淋

閉。或有血出。或大小便出血。瞿麥

穗一兩。炙甘草七錢五分。山梔仁

炒半兩。爲末。每服七錢。連服葱白

七箇。燈心五十莖。生薑五片。水二

盞。煎至七分。時時溫服。千金方

一治小便石淋。宜破血。瞿麥子

搗爲末。酒服方寸匕。日三服。三日

當下石。外臺祕要方

麥丸主之。瞿麥二錢半。枯樓根二

兩。大雞子一箇。茯苓山芋各三兩

爲末。蜜和丸。梧子大一服。三九。日

三。未知。益至七八九。以小便利。腹

中溫爲知也。張仲景金匱方

一治子死腹中。或產經數日不

下。以瞿麥煮濃汁服之。千金方

一治九竅出血。服藥不止者。南

天竺草。卽瞿麥母指大一把。山梔

子仁三十個。生薑一塊。甘草炙半

兩。燈草一小把。大棗五枚。水煎服。

聖濟總錄方

一治目赤腫痛。浸淫等瘡。瞿麥

炒黃爲末。以鵝涎調塗。皆頭卽開

或搗汁塗之。普濟方

一治眼目生翳。其物不出者。生

膚翳者。瞿麥乾薑炮爲末。井華水

調服二錢。日二服。聖惠方

一治魚臍疔瘡。瞿麥燒灰和油

傳之。其佳。崔氏方

一治咽喉骨哽。瞿麥爲末。水服

一寸匕。日二。外臺祕要方

一治竹木入肉。瞿麥爲末。水服

方寸匕。或煮汁日飲三次。梅師

方

一治小便不利。有水氣。枯樓瞿

一治箭刀在肉。及咽喉胸膈諸

大如桃李。又生刺重累於下。以護衛其實。五月成熟。剥去其皮。煮其肉而乾之。皮皆筋絲。與大腹皮同也。按漢俞益期與韓康伯牋云。檳榔子既非常。木亦特異。大者三圍高者九丈。葉叢樹端。房棲葉下。華秀房中。子結房外。其攏穗似黍。其殼實似穀。其皮似桐而厚。其節似竹而概。其內空。其外勁。其風如伏虹。其中如縮繩。本不大。末不小。上不傾。下不斜。調直享亭。千百如一。步其林則窺明。庇其陰則蕭條。信可長吟遠想。但性不奈霜。不得比植。必當選樹。海南遼然萬里。弗遇長者之目。令人恨深也。又竺法真羅山疏云。山檳榔一名荔子。生日南樹似柗欄而小。與檳榔同狀。一叢十餘幹。一幹十餘房。一房數百子。子長寸餘。五月採。味近苦甘。觀此則山檳榔即荔子。豬橫榔即大腹子也。蘇頌以味甘者為山檳榔。還者為豬橫榔。似欠分明。(李時珍)此物與烟性略同。但烟性峻勇。用以散表逐寒。則煙勝於此。檳榔稍緩。用以和中緩胃。則此勝於烟。二者皆壯氣辟邪之要藥。故

滇廣中人。一日不可少也。(張景岳)檳榔是木之子。其性能沉然。沉降之性。自上而下。且性不烈。故降性亦緩。按此說。似與張石頑不同。然彼以鐵石比其堅。非喻其速。則沉而降。降而緩。二說固未有參商也。(唐容川)嶺南人常食代茶。交州廣州人。凡有貴客。必先呈之。若遞返不設。往往銜恨。名曰檳榔。取義由此。蓋南方地溼。不食之。無以祛瘴癘也。生食味苦澀。與蠟蚌蚶等灰同咀嚼之。則柔轉甘美。(和漢三才圖會)暹羅交趾國俗。客來必先出檳榔食之。一若他處以煙草餉客者然。後乃出茶菓。因彼國於南方。檳榔能去溼熱故也。本草云。嶺南人當作果食。嶺南者。中國之漳州福州等處也。該處人食檳榔法。以之與石灰或蜆灰同咀。則不覺澀。嘗以銀錫製小盒。貯到碎之檳榔。出以敬客。見范石湖桂海志。(大和本草)東印度及馬來半島土人。常以檳榔細切。包以似胡椒之葉而食之。若嚼煙草然。故土人口中色鮮紅。齒則作黑色。以多食檳榔故也。中國人

亦有嗜之者。據云。嚼此則呼吸清涼。齒牙堅固。胃及神經並強壯云。(和漢藥考)【檳榔條】即檳榔之古籍別名。典見和漢藥考。詳「檳榔」條。【檳】即商麻之古籍別名。典見綱目。詳「商麻」條。【檳】即檳之古籍別名。典見集韻。詳「檳榔白皮」條。【歸尾】即當歸之處方用名。詳「當歸」條。【歸梢】即當歸梢之處方用名。詳「當歸」條。【歸澤麻】即五母麻之古籍別名。典見別錄。詳「五母麻」條。【歸鬚】即當歸鬚之處方用名。詳「當歸」條。【瀉利鹽】古籍別名。舍利鹽。(和漢藥考)

外國名詞 Epsomite. (英)產地 瀉利鹽生於石灰洞中。附石面而如絲。有玻璃光澤。又或為土壤。自然出產之數甚少。今皆以人工製成之。形體 為稜柱狀之結晶體。無色透明。水能溶解。而不溶解於酒。精。製法 以苦土石入硫酸內。使起硫化作用。再以水溶解。繼續發其溶液。而使結晶。復精製之。性質 味苦而鹹。成分 瀉利鹽。化學上謂之硫酸。酸。偏。氫。度。誤。Mg SO₄ 7H₂O。效能 專用為緩下劑。國外學說 日本藥局方述曰。瀉利鹽一名硫酸苦土。為無色之稜柱狀小結晶。置空氣中。無何變化。味清涼苦鹹。以等分之水。并三分之熱。能溶解之。現中性。反應。酒精不能溶解。用量 四錢至八錢。【瀉葉】即番瀉葉之處方用名。詳「番瀉葉」條。【瀉】即貫衆之古籍別名。典見和漢藥考。詳「貫衆」條。【番耳子】即番耳子之古籍別名。典見陸機詩疏。詳「番耳子」條。【番李仁】即郁李仁之古籍別名。典見本經。詳「郁李仁」條。【爵牀】古籍別名。爵麻。(吳普)香蘇。(別錄)赤眼老母草。(唐本草)

十八畫 檳

明方)

①治傷寒結胸。已經汗下後者。檳榔二兩。酒二盞。煎一盞。分二服。亦治蛇厥腹痛。(龐安時傷寒論方)

②治心脾作痛。雞心檳榔。高良薑各一錢。牛陳米百粒。同以水煎服之。(直指方)

③治勝脫諸氣。檳榔十二枚。一生一熟。爲末。酒煎服之。良。此太醫秦鳴鶴方也。(海藥本草方)

④治本臟氣痛。雞心檳榔。以小便磨半箇服。或用熱酒調末一錢服之。(斗門方)

⑤治腰重作痛。檳榔爲末。酒服一錢。(斗門方)

⑥治脚氣腫痛。以沙牛屎一盞。磨檳榔一枚。空心暖服。(梅師脚氣論方)

⑦治脚氣衝心。悶亂不識人。用白檳榔十二枚。爲末。分二服。空心暖小便。五合調下。日二服。或入薑汁。溫酒同服。(廣利方)

⑧治脚氣脹滿。非冷非熱。或者人弱人病。此用檳榔仁爲末。以檳榔殼煎汁。或茶飲蘇湯。或鼓汁調

服二錢。甚利。(外臺秘要方)

⑨治乾霍亂病。心腹脹痛。不吐不利。煩悶欲死。用檳榔末五錢。童子小便半盞。水一盞。煎服。(聖濟總錄方)

⑩治大腸溼悶。腸胃有滯。大便秘塞。大檳榔一枚。麥門冬煎湯磨汁。溫服。或以蜜湯調末二錢服。亦可。(普濟方)

⑪大小便閉。檳榔爲末。蜜湯調服二錢。或以童子小便。葱白同煎服之。亦良。(普濟方)

⑫治小便淋痛。麵煨檳榔。赤芍藥各半兩。爲末。每服三錢。入燈心水煎。空心服。日二服。(十便良方)

⑬治血淋作痛。檳榔一枚。以麥門冬煎湯細磨濃汁一盞。頓熱空心服。日二服。

⑭治蟲痔裏急。檳榔爲末。每日空心以白湯調服二錢。

⑮治寸白蟲病。檳榔二七枚。爲末。先以水二升。煮檳榔皮。取一升。空心調末方寸匕服之。經日蟲盡出。未盡再服。以盡爲度。(千金方)

⑯治諸蟲在臟。久不瘥者。檳榔

牛兩。炮爲末。每服二錢。以蜜酒煎湯調服一錢。(聖惠方)

⑰治金瘡惡心。白檳榔四兩。橘皮一兩。爲末。每空心生薑湯服二錢。(聖惠方)

⑱治丹從臍起。檳榔末醋調傳之。本事方)

⑲治小兒頭瘡。木磨檳榔。曬取粉。和生油塗之。(聖惠方)

⑳治口吻生瘡。檳榔燒研入輕粉。未傳之良。

㉑治辟耳出膿。板榔研末吹之。(鮑氏方)

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡氣虛下陷。及無積滯者。禁用。忌火。

參攷資料

①按羅大經鶴林玉露云。嶺南人以檳榔代茶。禦瘴其功有四。一曰醒能使之醉。蓋食之。則熏然煩赤。若飲酒然。蘇東坡所謂紅潮登煩。醉檳榔也。二曰醉能使之醒。蓋酒後嚼之。則寬氣下痰。餘醒頓解。朱晦菴所謂檳榔收得爲祛痰也。三曰饑能使之飽。四曰飽能使之饑。蓋空腹食之。則充然氣盛如飽。飽後食之。則飲食

快然易消。又且賦性疏通而不洩氣。稟味嚴正而更有餘甘。有是德。故有是功也。又按吳興章傑瘴說云。嶺表之俗。多食檳榔。日數十數。夫瘴癘之作。率因飲食過度。氣痞積結。而檳榔最能下氣消食。去痰故人明於近利。而罔於遠患也。大嶠南地熱。四時出汗。人多黃瘠。食之則臟腑疏洩。一日病瘴。不敢發散攻下。豈靈氣候所致。檳榔蓋亦爲患。殆未思爾。又東陽盧和云。閩廣人常服檳榔。云能祛瘴。有療服之可也。無瘴而服之。寧不損正氣。而有開門延寇之禍乎。南人喜食此果。故備考諸說。以見其功過焉。又朱晦菴檳榔詩云。憶昔南遊日。初嘗面發紅。藥囊知有用。苦澀詎能同。獨疾收殊效。修真錄異功。三彭如不避。糜爛七非中。亦與其治疾殺蟲之功。而不滿其代茶之俗也。李時珍云。檳榔樹初生若筍。竿積硬引莖直上。葉幹頗似桃椰子。而有節。旁無枝柯。條從心生。端頂有葉如甘蔗。條派開破。風至則如羽翼掃天之狀。三月。葉中腫起一房。因自折裂出穗。凡數百顆。

華子下一切氣。通關節。利九竅。健脾胃。調中。破瘕結。李珣主黃豚氣。五膈氣。風冷氣。脚氣。宿食不消。皆取其辛溫走散。破氣堅積。能下腸胃。有形之物耳。【清】黃宮繡本草求眞論橫椰子曰。橫椰辛苦而溫。書何言其至高之氣。彼獨能瀉使之下行。以至於極。以其味苦主降。性如鐵石之重。故爾有墜下之力耳。是以無堅不破。無脹不消。無食不化。無痰不行。無水不下。無氣不降。無蟲不殺。無便不開。故凡裏急後重。嵐瘴癘瘧。並水腫脚氣。酒醉不醒。無不因其苦溫辛瀝之性。以爲開泄行氣破滯之地耳。至書所云。飽能使之餓。醉能使之醒者。以其能下氣也。饑能使之飽。醒能使之醉者。以橫椰必用蒟葉裹嚼。蒟葉氣味辛溫。得此能除中外之氣。以散瘴癘之邪也。然非瘴之地。不可常服。恐其能洩眞氣耳。鷄心尖長勢之作錦紋者良。【清】王士雄隨息居飲食譜論橫椰子曰。橫椰苦甘溫。瀝下氣消痰。辟瘴殺蟲。析醜化食。除脹泄滿。宜滯破堅。定痛和中。通腸逐水。制肥甘之毒。青梁家

十八畫 檳

宜之。尖長質較硬。色紫而香。俗呼棗兒橫椰者良。且能堅齒解口氣。惟虛弱人及澹泊家忌食。【清】賈九如藥學指南論橫椰子曰。橫椰體重而實。味厚而沈。沈實主降。專壓諸藥。以導中焦下焦結滯之氣也。故能逐水氣。消穀食。除痰癖。制積塊。追諸蟲。攻脚氣。通痢疾。後重數症之功。性若鐵石。驗如奔馬。東垣言之詳矣。但瀉至高之氣。較枳實青皮尤甚。不可過服。

國外學說 英美學說謂橫椰子一名仁類。產中國之交州。廣州。愛州等處。而印度國亦產之。樹高約五丈至七丈九丈不等。取該樹之子。可爲藥品。至其醫治作用內。能收斂驅蟲。治腹內蛔蟲。外則能燒成炭研末。以作刷牙散。每服半兩至一兩。日本學說謂近時獨逸ヤーンズ氏。分析本藥。檢明三種類鹽基。一稱爲「アレコリン」。一稱爲「アレカイン」。一甚少。而其性狀不明。右三種中。唯「アレコリン」有效。依コルメ氏之試驗云。其作用與「ペレチーリ」(石榴根皮之成分)或「ヒ

ロカルベン」相髣髴。驅蟲劑之用。量橫椰子末。或其流動。越幾斯四。○至六。○止。一回內服。

猪子氏和漢藥論。蓋橫椰子者。乃驅除條蟲之藥也。前有中村俊士者。日本三河人。以橫椰浸(橫椰三。○)三。○。○。治惡阻病。一日分六次服。連服八日。惡心。嘔吐。全然消退。其治法。經過等詳見明治二十七年十二月東京醫事

新誌第八百七十二號。古方藥品考曰。橫椰有二種。來自中國者。形扁圓。味澁。斂。爲大腹橫椰。佳品也。大腹皮卽其殼。(形圓。通體白毛。宛如筆毫。味淡。)來自外番者。頭尖微長。澁味不厚。此爲下品。又一

本堂藥選曰。凡選橫椰子。以存坐穩正。心堅有文。白而新者爲佳。此乃輪舶所來。祇此一種。本國絕無。此物其心虛及帶黑色者。皆非用。用時水洗到細。不用煨。熱麵煨。焙等法。此物到細。經七八日。必作餿氣。可惡。故須臨用方割。不可到置

經日。又和漢藥考曰。橫椰子之細長者。曰雞心橫椰。又名公橫椰。扁平而大者。曰大腹子。又名母橫椰。

亦呼豬橫椰。兩頭尖如樞實者。曰梭身橫椰。

配合應用 ①治食滯。用橫椰。草果。枳實。橘皮。消一切堅硬肉食。及諸米麵生冷。食積成塊。作痛。加

三稜。蓬朮。紫紅。紅。山查。麥。蓮肉。橘紅。白芍藥。紅。烏梅。葛根。枳殼。

②治小兒疳。橫椰。雷丸。使君子。白。薤。薤。薤。肉豆。蔻。胡。黃。連。

③治一切寸白蟲。用橫椰。棟根。鶴。龜。錫。灰。瑟。或。根。貫。衆。烏。梅。

④治山嵐瘴氣。發。瘧。用橫椰。蒼。朮。草。果。青。皮。甘。草。

⑤治痰涎爲害。橫椰爲末。白湯。每服一錢。(御藥院方)

⑥治嘔吐痰水。白橫椰一顆。煨。熱。橘皮二錢。半。炙。爲。末。水一盞。煎。半。盞。溫。服。(千金方)

⑦治醋心吐水。橫椰四兩。橘皮一兩。爲末。每服方寸匕。空心生蜜。湯調下。(梅師方)

⑧治傷寒痞滿。陰病下早成痞。按之虛軟而不痛。橫椰。枳實等分。爲末。每服二錢。黃連煎湯下。(宜

十八畫 檳

外國名詞 Semen Areca.

(拉卜) Arecanut Betel-nut.

(英) Arecanusi, Betelnusi.

(德)

基本 屬棕櫚科。爲檳榔之子

實。

產地 以廣東瓊州海南產者

爲最。名南尖。即鷄心檳也。小粒如

鷄心也。其次則印度安南南洋羣

島均有出。大粒名西尖。功力不及

南尖三分之一也。和漢藥考曰。產於

亞洲之熱帶地方。如東印度馬來

半島是臺灣之南方亦有之。



檳 榔

形體 檳榔。喬木也。似椰子。細

而長。高至四五丈。無枝。梢端生類

似芭蕉葉之羽狀複葉。花爲六片

花被。雌雄異株而生。葉底出花梗

三四相綴而爲穗狀。果實爲卵大

之漿果。外有帶黃色之薄殼皮包

之一穗約結實三四百顆。每樹結

實最多者。自第五年至三十年而

止。其子形球圓或卵圓。長寸餘。直徑約五分。多附有纖維之毛冠。外面色灰褐。內堅實有紋理。味甘而爲收斂性。

種類 大腹檳榔。形扁圓。即母

柗榔。砮板榔。鷄心檳榔。形細長。即

公檳榔。棗兒檳榔。梭身檳榔。即兩

頭尖如樞實者。亦曰尖檳榔。檳榔

孫即檳榔之小者。亦曰蒜子。又即

所謂山檳榔。又有馬檳榔。一名紫

檳榔者。乃蔓生結實。大如葡萄。色

紫味甘。核仁亦甜。功用與此不同。

採取 五月採之。

製法 雷斅曰。凡使檳榔。頭圓

矮吡者爲榔。形尖紫文者爲檳。槓

力小。榔力大。凡使用白檳及存坐

穩。正心堅有錦文者爲妙。半白半

黑。并心虛者不入藥。用以刀刮去

底細切之。勿令經火。恐無力。若熟

使不如不用。李時珍曰。近時方藥

亦有以火煨到用者。然初生白檳

榔。須本境可得。若他處者。必經煮

熏。安得生者耶。又檳榔生食。必以

扶留藤。古黃灰爲使。相合嚼之。吐

出紅水一口。乃滑美不澀。下氣消

食。此三物相去甚遠。爲物各異而

相成相合如此。亦爲異矣。俗謂檳榔爲命賴扶留。以此古黃灰即蠣蚌灰也。黃乃蠣字之訛。瓦屋於灰亦可用。

性質 苦。辛。溫。澀。無毒。

成分 檳榔子中有阿萊可林

(Arecolin, $C_8H_9NO_2$) 及阿萊

加茵 (Arecolin, $C_7H_9NO_2 + H_2O$) 之植物鹽基。其構造有人發

明。爲水分一·三·三五。窒素總量

一·五三。咖啡溼二·〇八。伊打

製越幾斯一·三五。澱粉四五·

四四。鞣酸三·七九。木纖維七·

〇。其餘無窒素物一八·二一。

無機物二·九。見藥學雜誌第

一百五十九號。

效能 瀉氣攻積。殺蟲行水。用

作消化及殺蟲藥。

作用 在胃中能激胃黏膜。使

分泌增加。至腸與線蟲相遇。能殺

死之。或混於大便內排出。同時又

能刺激迷走神經。使腸之蠕動迅

速。入血中有縮小瞳孔之能。

主治 消穀逐水。除痰癖。殺三

蟲。伏尸寸白。

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新

一八〇一一

修本草論檳榔子曰。治腹脹。生搗

末。服利水。穀道傳。瘡生肌肉。止痛

燒灰。傳口吻白瘡。【唐】甄權藥性

本草論檳榔子曰。宜利五臟六腑

壅滯。破胸中氣。下水腫。治心痛積

聚。【唐】李珣海藥本草論檳榔子

曰。主賁豚。膀胱諸氣。五臟氣。風冷

氣。脚氣。宿食不消。【宋】大明諸家

本草論檳榔子曰。除一切風。下一

切氣。通關。節利九竅。補五勞七傷

健脾調中。除煩。破積結。【元】王好

古湯液本草論檳榔子曰。治衝脈

爲病。氣逆裏急。【明】李時珍本草

綱目論檳榔子曰。治瀉痢後重。心

腹諸痛。大小便氣。秘瘕。氣喘急。療

諸瘧。瘰癧瘡。【明】繆希雍本草經

疏論檳榔子曰。檳榔味辛。氣溫。無

毒。大明言溫。元素言苦。入手足陽

明經。夫足陽明爲水穀之海。手陽

明爲傳道之官。二經相爲貫輸。以

運化精微者也。二經病則水穀不

能以時消化。滯留而成痰癖。或濕

熱停久。則變生諸蟲。此藥辛能散

結破滯。苦能下泄殺蟲。故主如上

諸證也。甄權宜利五臟六腑壅滯

破胸中氣。下水腫。治心痛積聚。日

十七畫 麋

古籍別名 牡者名驢。牝者名麋。子名麋。沙鹿。

外國名詞 Alces machia.

Elle 或 Moose (拉丁) オホシカ (日本)

產地 出俄國、挪威、瑞典、及北美洲、亞洲之北方諸地。

形態 麋爲獸類鹿屬之一種。其體似鹿而大。高七尺。四肢較長。全體暗赤褐色。眼小耳闊。頸有短鬚。胸及喉下密生長毛而下垂。牡者生後九月而生角。逐年脫換而生枝。枝短而粗。枝末分簪。日下有二簪。爲夜目。能夜視。常至叢林中食樹皮樹葉及嫩芽等。其肉可供食與藥用。

性質 甘。溫。無毒。

主治 益氣補中。治腰脚。

歷代記述攷證 【宋】掌禹錫補註本草論藥肉曰。補五臟不足氣。

參攷資料

●麋肉不可合豬肉雉肉食。發痼疾。合蝦及生菜梅李食損男子精氣。陶弘景。●多食令人弱房發脚氣。妊婦食之。令子目病。【孟詵】●按陸農師云。鹿

以陽爲體。其肉食之煖。麋以陰爲體。其肉食之寒。觀此則別錄麋脂令人陰痿。孟詵解多食肉令人弱房。及角肉不同功之說。亦此意也。【李時珍】

【麋皮】 主治 除脚氣。作靴襪著之。

【鹿角】 製法 雷斅曰。麋角以頂根上有黃毛若金線。

兼旁生小尖色蒼白者爲上。孟詵曰。凡用麋角。可五寸截之。中破炙黃爲末入藥。李時珍曰。造麋角膠與藥角霜。並與鹿角膠鹿角霜同法。又集靈方云。用麋角一雙。水浸七日。刮去皮。錯屑以銀瓶盛。牛乳浸一日。乳耗再加至不耗乃止。用油紙密封瓶口。別用大麥鋪鍋中三寸。上安瓶。再以麥四周填滿。入水浸一伏時。水耗旋加。待屑軟如麋取出。焙研成霜用。

性質 甘熱無毒。

主治 風痺止血。益氣力。

歷代記述攷證 【南北朝】陶弘景本草集註論麋角曰。刮屑熬

香酒服大益人。【唐】孟詵食療本草論麋角曰。作粉常服。治丈夫冷

氣及風筋骨疼痛。若卒心痛。一服立瘳。藥水磨泥塗面。令人光華。赤白如玉可愛。【宋】日華諸家本草論麋角曰。酒服補虛勞。添精益髓。益血脈。暖腰膝。壯陽悅色。療風氣。偏治丈夫。【明】李時珍本草綱目論麋角曰。滋陰養血功與茸同。

參攷資料 ●麋角常服大益陽道。不知何因與肉功不同也。煎

膠與鹿角膠同功。茸亦勝鹿茸。仙方甚重之。【孟詵】●鹿之茸角補陽。右腎精氣不足者宜之。藥之茸角補陰。左腎血液不足者宜之。此乃千古之微祕。前人方法雖具。而理未發出。故論者紛紜。又楊氏家藏方。治虛損有二至丸。兩角並用。但其藥性過溫。止宜於陽虛寒溼血痺者耳。於左腎無與焉。孫思邈千金方言。麋角丸凡一百一十方。惟容成子羔所服者特出衆方之外。子羔服之羽化。【李時珍】

【藥角霜】 性質效能及製法。均與鹿角霜同。參見該條。補益陰血之功則過之。詳「鹿角膠」條。

【藥角膠】 卽取藥角煎熬製膠。看性質效能及製法。均與鹿角膠同。

一八〇〇

【麋脂】 古籍別名 官脂。【本經】

採取 十月間取脂。煉過收用。性質 辛溫無毒。

主治 癰腫惡瘡。死肌寒熱。風寒溼痺。四肢拘緩不收。風頭腫氣。通腠理。【本經】柔皮膚不可近陰。令痿。【別錄】

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論麋脂曰。治少年氣盛面生瘡。化脂塗之。

施用宜忌 畏大黃。忌桃李。

【麋茸】 製法 詳鹿茸條。性質 甘溫無毒。

主治 陰虛勞損。一切血病。筋骨腰膝酸痛。滋陰益腎。

【麋骨】 主治 虛勞至良。煮汁釀酒飲。今肥白美顏色。

【麋骨酒】 基本 本品係用藥骨煮汁。同麴米如常釀成之酒。

主治 陰虛腎弱。久服令人肥白。

【藥銜】 卽微銜之古籍別名。典見本經。詳「微銜」條。

【藥鵠】 卽雉雞之古籍別名。典見

愈。灰爲丸。綿裹納喉中。吐去惡涎卽

【鮓魚】卽鮓魚之古籍別名典見綱目詳『鮓魚』條。

【鮓】即魚子之古籍別名典見綱目詳『魚子』條。

【鮮大青】卽大青之處方用名詳『大青』條。

【鮮子】卽山梔子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『山梔子』條。

【鮮支】卽山梔子之古籍別名。典見綱目。詳『山梔子』條。

【鮮毛薑】卽骨碎補之處方用名。詳『骨碎補』條。

【鮮生地】卽生地黃之處方用名。詳『生地黃』條。

【鮮石斛】卽石斛之處方用名詳『石斛』條。

【鮮竹茹】即竹茹之處方用名詳『竹茹』條。

【鮮竹葉】卽竹葉之處方用名。詳『竹葉』條。

【鮮奇良】卽土茯苓之處方用名。詳『土茯苓』條。

【鮮扁斛】卽石斛之處方用名詳『石斛』條。

【鮮首烏】卽何首烏之處方用名。詳『何首烏』條。

【鮮草果】 古籍別名 杜若（綱目拾遺）

形態。粵志云。廣人多種之爲香料。卽杜若。非藥中草果也。其苗

似縮砂。三月開花作穗。色白微紅。五六月結子。其根勝於葉。

性質 辛溫無毒
主治 除瘴氣益精明目。

【鮮荷葉】卽荷葉之處方用名。詳『荷葉』條。

【鮮菖蒲】卽菖蒲之處方用名。詳『菖蒲』條。

【鮮藕節】卽藕節之處方用名。詳『藕節』條。

【鮮藿香】即藿香之處方用名。詳『藿香』條。

【鵲鹿】卽雉雞之古籍別名。典見爾雅。詳『雉雞』條。

【鴻】卽雁之大者其功用詳【雁】條。

【鴻頭】卽茭實之古籍別名。典見韓愈文。詳『茭實』條。

【鴻蒼】卽薤之古籍別名典見說文詳『薤』條。

【鴻藏】卽胡麻之古籍別名典見別錄詳『胡麻』條。

【鴻苞】卽葑草之古籍別名。典見類篇。詳『葑草』條。

【鵓母】卽鵓之別名。典見綱目。詳「鵓」條。

【鷓鴣】卽鷓鴣之古籍別名。典見綱目。詳『鷓鴣』條。

【鵠】即鵠鵠之原名。詳『鵠鵠』條。
命名 禽經云白鵠相

睨而孕。本品交睛而孕。

古籍別名 交隲（說文）莢雞。
鴉（綱目）赤頭鷺（動物學大辭

inosceles Swinh(拉丁) Chinese
squacco heron(英) アカクビ

類鷺科之鵪鶉
產地 出南方池澤間。及印度

等處。形態。鵠鵠爲水禽類。鵠屬之。

一種其體之上面概白色頭頸赤褐。胸背之叢毛混交綠色。狀如野

鴨喙長脚高趾無蹼翼與尾灰白色腹白脚灰黃恒棲河川池畔捕

食魚蛙。其肉可供藥用。
性質 甘。鹹。平。無毒。

主治 解諸魚蝦毒。炙食之。
鵠鵠 卽鴈鵠之古籍別名。典見

爾雅詳『鴈』條。
【鴈】卽鴈之古籍別名。典見禽

經詳『景泉』條。
鵠鵬】卽鵠鵬之古籍別名。典見

綱目詳『鵜鶘』條

基本 係脊椎動物。哺乳

類有胎盤類有蹄類反芻

黑而且光。

用量 三錢至四錢。

參攷資料 ①是作鍼家磨瀝

之細末也。須真鋼砂乃堪用。人多

以柔鐵砂雜和之。飛爲粉。大莫能

辨也。亦堪染皂。陳藏器②鍼砂

酸半。是作鍼家磨瀝細末也。鍼砂

寒降。善治溼熱爲消脾胃堅積黃

腫之專藥。丹溪溫中丸用之。(盧

飛鵬)

【關綠】即葦筍之古籍別名。典見

綱目拾遺。詳『葦筍』條。

【園莫伽】即川芎之古籍別名。典

見金光明經。詳『川芎』條。

【隱上座】即郁李仁之古籍別名。

典見和漢藥考。詳『郁李仁』條。

【隱忍葉】即薺危莖之原名。詳『

隱忍葉』條。

【隱展】即阿魏根之古籍別名。典

見綱目。詳『阿魏』條。

【隱鼠】古籍別名。偃鼠。鼠母。

集註)

產地 出山林間。

形態 隱鼠爲獸類之一種。其

狀頭脚似鼠。口銳色蒼。大如水牛。

謹脚類象而蹄啼。毛色灰赤。胸部

及尾白色有力而鈍。肉可食。味如

牛肉。其脂可供藥用。

主治 痔瘻。惡瘡。

【霜】即冬霜水之簡稱。詳『冬霜

水』條。

【霜花】即朴硝之古籍別名。典見

和漢藥考。詳『朴硝』條。

【霜桃】即桃之花。開於冬霜時者。

功用詳『冬桃』條。

【霜桑葉】即經霜桑葉之處方用

名。詳『桑葉』條。

【霜桑葉露】性質 甘。苦。微

寒。無毒。

效能 去風。明目。清熱。潤燥。

主治 頭痛。咳嗽。消渴。盜汗。

參攷資料 桑葉經霜者。得金

氣之全。故清燥救肺之功爲尤多。

【霞天半夏麴】基本 本品

一種。係和牛汁製成者。

製法 用半夏爲末。和入霞天

膏。草蜜七日。待生黃衣。懸掛風乾。

入藥用。

採取 以陳久者良。

主治 療痢疾。沈疴。

【霞天膏】即霞天膠之原名。詳『

霞天膠』條。

【霞天膠】原名 霞天膏。

製法 用嫩黃牛肉

三四十斤。洗極淨。水煎成糜。濾去

渣。再熬成膏用。

性質 甘。溫。無毒。

主治 中風。偏廢。口眼歪斜。痰

涎壅塞。五臟六腑留痰宿飲。癱塊。

手足皮膚中痰核。

配合應用 霞天膠。橘皮。白茯

苓。蘇子。白芷。薤仁。半夏。若朮。爲麴。

治脾胃積痰。以橘皮。蘇子。貝母。栝

樓根。及仁。蓬砂。爲麴。治積熱痰結。

(本草經疏)

【霞天麴】製法 霞天麴爲麴

之一種。用霞天膏四

兩。川貝母八兩。將膏烱化。和入貝

母粉成餅用。

主治 健脾胃。消痰飲。

【霞片】即鴉片之古籍別名。典見

和漢藥考。詳『鴉片』條。

【霞貝】即貝子之黃黑文相間者。

功能殺蛆蟲。餘詳『貝子』條。

【霞雀花】即金雀花之古籍別名。

【韓信草】產地 出粵省南海

大瀝。

採取 三四月新時採之。

性質 甘。辛。平。

效能 治跌打。祛風。散血。消腫。

壯筋骨。理蛇傷。

【韓國參】即高麗參之別名。詳『

高麗參』條。

【類凍】即款冬花之古籍別名。典

見附錄。詳『款冬花』條。

【類塊】即硃砂之古籍別名。典見

綱經本草。詳『硃砂』條。

【類鹽】即鹽之出於池而未經煉

治者。其鹽爲類。其味鹹苦。餘詳『

食鹽』條。

【餽餽青】原名 餽餽莖。

命名 本品即薺實

之產於嘉興而形似餽餽者。故名。

形態 餽餽青爲薺實之一種。

較小於他薺。而大於沙角。可供藥

用。

性質 甘。寒。無毒。

主治 生食解積。暑。煩熱。生津。

養食健脾。和胃。益氣。

【餽餽莖】即餽餽青之原名。詳『

餽餽青』條。

十七畫 鍛

鍼

一七九六

末四兩。蓮肉去心淨末四兩。白糖四兩。共和勻。每服三五匙。日三次。食遠下。(梁侯適集驗方)

●治白濁不止。乾飯鍋粳二兩。松花二兩炒。臘肉骨頭五錢。烘脆共爲末。砂糖調。不拘時服。(種福堂方)

●治脾胃不健。鍋焦二斤。蓮肉一斤。白糖半斤。蜜一斤。丸如桐子大。每服數十丸。空心白湯下。(祝氏效方)

●玉露霜。治老人脾泄最效。白朮炒二兩。陳皮一兩五錢。蓮肉去心四兩。慈苳仁四兩。糯米一升。炒。菜荳一升。炒熟。陳米鍋粳一升。炒。糖霜量加。共爲末。每用二三錢。滾水調勻服之。(行篋檢祕方)

●治頑瘡痘疹。銀花陰乾。鍋粳每一升入銀花一兩。共研末。用洋糖或做糕餅。或開水調和。每日令小兒食之。(不藥良方)

【鍛石】即石灰之古籍別名。典見日華諸家本草。詳「石灰」條。

【鍛樹】

產地 出吉林等處。形態 鍛樹爲喬木類之一種。其樹似杜仲。葉如烏桕。柏

葉。而大如團扇。邊有鋸齒。嫩時可裹餅餌蒸食。霜後鮮赤。若丹楓。照耀巖谷。其皮紅色。柔如麝。作繩可燃。作魚網入水不濡。可供藥用。

主治 小兒胎疳。及一切折傷。肉破骨斷。搗碎酒煎服。澄傳患處。參攷資料 有人取鍛樹皮。包切肉數瓣。抵家啓視。則合成一片。始見其皮能合肉接骨。爲治折傷要藥。(綱目拾遺)

【鍛樹葉】 主治 小兒胎疳。皮膚難忍者貼之。參攷資料 幼兒患疳。由於胎中得者。亦能戕命。此葉久貼皮膚。裂處自然復合。永無患矣。但非幼童之年。則不可治。方用鍛樹皮。或搗爛。或削片。以油潤溼。黏布上貼患處。外以布牢繫腰間。或半年三個月方愈。(趙學敏)

【鍼石】即砭石之古籍別名。典見綱目。詳「砭石」條。

【鍼砂】

命名 本品乃鍼家磨鍼之細末。如砂。故名。基本 係金屬原質之一種。性質 酸。辛。無毒。

效能 消水腫。治黃疸。用作利尿消腫藥。

主治 功同鐵粉。和沒食子。染髮至黑。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論鍼砂曰。消積聚。腫滿。黃疸。平肝氣。散瘕。(李時珍)

配合應用 ●治風溼脚痛。鍼砂。川烏頭爲末。和勻炒熱。綿包熨之。(摘玄方)

●治風痺暖手。鍼砂四兩。礱砂三錢。黑脚白礬六錢。研末。以熱醋或米泔。溼油紙裹。置袋內。任意執之。冷再拌。(聖濟總錄方)

●治脾勞黃疸。鍼砂四兩。醋炒七次。乾漆燒存性三錢。香附三錢。平胃散五錢。爲末。蒸餅丸。梧子大。任湯使下。(摘玄方)

●治溼熱黃疸。助脾去溼。鍼砂丸。用鍼砂不拘多少。搗盡。鑊淘洗。白色。以米醋於鐵銚內浸過一指。炒乾。再炒三五次。候通紅。取出。用陳粳米半升。水浸一夜。搗粉作塊。煮半熟。杵爛。入鍼砂二兩。百草霜炒一兩。半。搗下。梧子大。每服五十丸。用五加皮。牛膝根。木瓜浸

酒下。初服若泄瀉。其病源即去也。(乾坤生意方)

●治水腫尿少。用鍼砂醋煮炒。乾。豬苓生地龍各三錢。爲末。煎。研和。傅臍中。約一寸厚。縛之。待小便多。爲度。日二易之。入甘遂更妙。(德生堂方)

●治泄瀉無度。諸藥不效。方同上之水腫尿少方。惟不用甘遂耳。(醫學正傳方)

●治虛寒下痢。腸滑不禁。鍼砂七錢。半。官桂一錢。枯礬一錢。爲末。以涼水調。攤臍上下縛之。當覺大熱。以水潤之。可用三四次。名玉胞肚。(仁存方)

●治項下氣癭。鍼砂入水缸中。浸之。飲食皆用此水。十日一換砂。半年自消散。(楊仁齋直指方)

●染白髮髮。鍼砂醋炒七次。一兩。訶子白芨各四錢。百藥煎六錢。綠礬二錢。爲末。用熱醋調。刷鬚髮。藥包。住。次早酸漿洗去。此不壞髮。亦不作紅。又方。鍼砂。蕎麥各一兩。百藥煎爲末。茶調。夜塗。旦洗。再以訶子五錢。沒石子醋炒一箇。百藥煎少許。水和塗。一夜。溫漿洗去。

③ 蠱之戲。蟋蟀最盛。其百戰百勝者。俗呼爲將軍。其蟲至冬必死。勿輕棄去。留以救產厄神驗。凡產不下。用乾者一枚。煎湯服。卽生。并無橫倒之患。趙際昌

④ 促織可治水蠱。昔有人患水蠱。百治不效。一日偶飲開水。水中先有促織一對在內。其人倉卒一併吞之。越數日其病漸消。方知促織可治此症。後傳此方數人。無不驗者。一對不足。連服二三對自效。朱煥齋任城日鈔方

【蠅螂】卽蜚蠊之古籍別名。典見綱目拾遺詳「蜚蠊」條。

【蠅螂花根】卽老鴛蒜之古籍別名。典見王都官方。詳「老鴛蒜」條。

【蠅螂】卽桑螵蛸之古籍別名。典見別錄。詳「桑螵蛸」條。

【衡薇草】卽杜衡之古籍別名。典見和漢藥考。詳「杜衡」條。

【謝漆菜】卽水苦蕒之古籍別名。典見圖經本草。詳「水苦蕒」條。

【谿鷺】卽鷺鷥之古籍別名。典見說文。詳「鷺鷥」條。

【豁雞】 命名 本品鳴聲豁豁故名。

產地 出粵中。

形態 豁雞爲雞類之一種。雞頭鳥喙。色黃。腹毛純黑。尾長下垂。性嗜蛇。其哺子時。取雞折其兩足。乃以蛇飼之。三日卽復。屢折屢復。故可供藥用。

主治 骨節折傷。捕食之。

【蠶豆】卽蠶豆之古籍別名。典見綱目拾遺詳「蠶豆」條。⑤ 卽鹿藿之俗名。詳「鹿藿」條。

【蠶蠶】卽蠶蠶之古籍別名。典見綱目。詳「蠶蠶」條。

【魏狸】卽黃鼠狼之古籍別名。典見綱目。詳「黃鼠狼」條。

【養牡丹】卽鹽春花之古籍別名。典見和漢藥考。詳「鹽春花」條。

【養空青】卽空青之處方用名。詳「空青」條。

【養桂香】卽砂仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳「砂仁」條。

【穀饒鷹】卽鴟鵂之古籍別名。典見綱目。詳「鴟鵂」條。

【轄脂】卽車脂之古籍別名。典見綱目。詳「車脂」條。

【避役】卽壁虎之古籍別名。典見綱目。詳「壁虎」條。

【避驚風石】卽辟驚石之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「辟驚石」條。

【還丹金】卽金之生於丹穴中。體含丹砂。色尤赤。可合丹服者。性質功用。詳「金」條。

【還元大品】卽大生地之古籍別名。典見和漢藥考。詳「大生地」條。

【還元水】卽金汁之古籍別名。典見救急圖記。詳「金汁」條。


【還元湯】卽童便之古籍別名。典見綱目。詳「童便」條。

【還筒子】卽天麻子之原名。詳「天麻子」條。

【還精草】卽望江青之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「望江青」條。

【還魂丹】 產地 以四川山中爲多出。

形態 還魂丹根如大蒜。黑褐色。葉似葶藶而更細密。可供藥用。



還魂丹

主治 跌打損傷。

【還魂酒】卽童便之古籍別名。典見

見和漢藥考。詳「童便」條。

【還膽子】卽青箱子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「青箱子」條。

【醃草】卽酸草之原名。詳「酸草」條。

【鍋底墨】卽釜臍墨之古籍別名。典見綱目。詳「釜臍墨」條。

【鍋炙】卽豆腐乾之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「豆腐乾」條。

【鍋焦】 原名 飯鍋焦。基本 本品卽煮飯時。附著於鍋底之焦飯。

古籍別名 黃金粉。（綱目拾遺）

採取 以僧寺中米多焦厚者。入藥用良。

性質 苦。甘。平。無毒。

主治 補氣運脾。消食積。止泄瀉。入珍粉中用之。

配合應用 ① 鍋焦丸。小兒常用。健脾消食。用鍋焦炒黃三斤。神麴炒四兩。砂仁炒二兩。山查四兩。蒸蓮肉去心四兩。雞腕皮一兩。炒共爲細末。加白糖米粉和勻。焙作餅用。（家寶方）

② 治老幼脾胃久不愈。鍋焦爲

藥。各有主義。胡得妄行配製。以失效用。伏望熱心同道與藥商知好者。將此通告。苦勸改良。幸勿再蹈故轍。是所企禱。◎曹炳章曰。按王士雄云。潮州蔗田接壤。食蔗之蟲。形如蠶蛹。而小味極甘美。性涼解熱。毒助痘漿。可與蘭蟲並傳。施可齊圖雜記云。漳泉各處。二三月間。市上賣生熟甘蔗蟲。甘蔗老根中。生也。生者如蠶而細。灰白色。光潤無茸毛。熟者以油灼過。拳曲如蜂。淡黃色。味極鮮。佐酒尤佳。考甘蔗性寒。故王維謝賜櫻桃詩。飽食不須愁。內熱大官。還有蔗漿寒。此蟲既生蔗中。宜亦性寒矣。而吾鄉醫者。治小兒痘漿不起。多用之。或有云。性熱。本草不載。不能辨也。又據兩般秋雨庵隨筆。載姚承憲咏甘蔗蟲詩。蘊隆連日賦蟲蟲。渴念寒漿解熱中。佳境不須愁。有蟲庶生原可慶。斯禽似誰折。節吟腰細。笑彼含花蜜。口空畢竟冰心難共語。一樓愁絕對蠻風。玩詩次句。似亦謂其性寒。惟云蘊隆連日。則是夏月方有。詩在粵中所作。豈粵中夏月始賣。而漳泉獨早在二三月耶。

而鄭君出產時期。亦未辨明。惟氣味甘微寒。發痘行漿等效用。確與王施二君發明吻合。鄭君所言。可見皆從實驗。吾於斯益信。惟履蟲確是地蠶蟲。即仲景大黃廔蟲丸等用之。以化癥瘕去瘀血。端不能以甘蔗蟲代之。吾謂以後業藥者。暇時亦宜閱覽本草。參對方書。庶不致再誤人命矣。

配合應用 ①大黃廔蟲丸。治產婦腹痛有乾血。用履蟲二十枚。去足。桃仁二十枚。大黃二兩。為末。煉蜜和。分為四丸。每以一九酒一升。煮取二合。溫服。即當下血也。(張仲景方)

②治水舌腫強。塞口。不治殺人。履蟲炙五枚。食鹽半兩。為末。水二盞。煎十沸。時時熱含。吐涎。瘥乃止。(聖惠方)

③治腫舌塞痛。地蠶蟲和生薄荷研汁。帛包捻舌下腫處。一名地蟬蟲也。(鮑氏方)

④治腹痛夜啼。履蟲炙。芍藥。芍藥各二錢。為末。每用一字。乳汁調下。(聖惠方)

⑤折傷接骨。用土蠶焙存性。為

末。每服二三錢。接骨神效。一方生者。搗汁酒服。(楊拱摘要方)用蚶蚶即土蠶六錢。隔紙砂鍋內焙乾。自然銅二兩。用火煨醋淬七次。為末。每服二錢。溫酒調下。病在上。食後。病在下。食前神效。(袖珍方)用土蠶陰乾一箇。臨時旋研入藥。乳香。沒藥。龍骨。自然銅。火煉醋淬各等分。磨香少許。為末。每服三分。入土蠶末。以酒調下。須先整定骨。乃服藥。否則接性也。此乃家傳秘方。慎之又可代杖。(董炳集驗方)

用量 八分至錢半。

施用宜忌 凡有瘀滯積結者。禁用。畏皂莢。菖蒲。屋遊。

參攷資料 ①生河東川澤及沙中。人家牆壁下。土中。溼處。十月探曝乾。(別錄) ②形扁如蠶。有甲不能飛。小有臭氣。(陶弘景) ③此物好生鼠壤土中。及屋壁下。狀似鼠婦。而大者寸餘。形小似蠶。無甲而有鱗。小兒多捕捉。以真物為戲。(蘇恭)

【蟋蟀】 處方用名 將軍乾。古稱別名 促織。(綱目拾遺) 圖鑑(俗名) 蜻蛉(韻

會) 吟蛩(埤雅)

外國名詞 Gryllodes bertellus, Sauss (拉丁) Cricket. (英)

產地 多生原野陰溼諸地。形體 蟋蟀為化生蟲類之一種。全體黑色。長約六七分。雄者能鳴。善跳。前翅翼左下。右上有相重疊。連接處有剛強之聲器。末端有尾毛二。較長。雌者。尾毛間又有產卵管。一能穿地穴居。捕得可供藥用。



採取 以成對者入藥。性質 辛。鹹。溫。無毒。主治 通小便。發瘡瘡。解熱毒。配合應用 ①治小兒遺尿。取全蟋蟀一個。焙末。滾水下。照歲服。如兒十一歲者。每次服一個。服至十一個為止。(慈航活人書方)

②治男婦小水不通。痛服不止。蟋蟀一個。陰陽瓦焙乾。為末。白滾湯下。小兒半個。即通。(集驗方)

之謬。則大黃廔蟲丸下必脫金匱要略五勞以下法語。而本草治產婦腹痛條上。脫下瘀血湯四字矣。大觀本草所引蘇頌圖經蟪蟪條曰。張仲景治雜病方。大廔蟲丸中用蟪蟪。以其主脇下堅滿也。由此觀之。則十二味方者。名大廔蟲丸。而大字之下無黃字。此非大黃廔蟲丸也。又廔蟲條曰。張仲景治雜病方。主久痼積結。有大黃廔蟲丸。乃今下瘀血湯也。然則本是一方。而金匱要略十二味方者。蓋古名大廔蟲丸。猶大柴胡湯。大承氣湯。大青龍湯。大半夏湯。大建中湯。大陷胸湯之大也。當須別有小廔蟲丸之方矣。疑今下瘀血湯。蓋名大黃廔蟲丸。故以大黃廔蟲爲主藥也。且今名下瘀血湯者。疑非方之名。而當須以下此瘀血之湯主之之意矣乎。後之錄方者。誤脫大黃廔蟲丸五字。而稱之曰下瘀血湯乎。又後之輯金匱要略者。遂謂之下瘀血湯。而名此方者矣。猶抵當烏頭桂枝湯。救逆湯。新加湯類乎。況此方是丸方。猶抵當丸。以水煮之。然則此方亦不可名湯也。由

此觀之下瘀血湯。宜稱大黃廔蟲丸。而十二味大黃廔蟲丸。宜稱大廔蟲丸矣。東洞翁嘗謂大黃廔蟲丸。乃十二味之方。說非疾醫之言。蓋指五勞虛極。及七傷緩中補虛之語乎。夫羸瘦腹滿。不能飲食。內有乾血。肌膚甲錯。兩目黯黑。數語。可謂此方之證具矣。若按其腹狀。而內外諸證。診察相應。則此方當須奏其功耳。明者其謂之何矣。歷代記述改證【唐】甄權藥性本草論廔蟲曰。月水不通。破留血積聚。【宋】寇宗奭本草衍義論廔蟲曰。通乳脈用一枚。搗水半合。濾服。勿令知之。【明】李時珍本草綱目論廔蟲曰。行產後血積。折傷瘀血。治重舌木舌。口瘡。小兒腹痛夜啼。【明】繆希雍本草經疏論廔蟲曰。廔蟲生於下溼土壤之中。故其味鹹氣寒。得幽暗之氣。故其性有小毒。以刀斷之。中有白汁如漿。湊接即連。復能行走。故今人以之治跌撲損傷。續筋骨有奇效。乃足厥陰經藥也。夫血者身中之真陰也。灌漑百骸。周流經絡者也。血若凝滯。則經絡不通。陰陽之用互乖。

而寒熱洗生焉。鹹寒能入血。凝堅。故主心腹血積。瘀血閉諸證。血和而營衛通暢。寒熱自除。經脈調勻。月事時至。而令婦人生子也。又治瘕母爲必用之藥。【清】黃宮繡本草求真論廔蟲曰。廔蟲卽屬地鼈。又名土鼈者是也。味鹹性寒。其物生於土中。伏而不出。善攻隨穴。以刀斷之。中有汁如漿。屬接即連。復能行走。故書載跌撲損傷。續筋骨。義由此耳。真奇物也。且人陰血貫於周身。雖賴陽和。亦忌燥烈。若氣內鬱。則陰陽阻隔。而經絡不通。因而寒熱頓生。得此鹹寒入血。轉堅。則凡血聚積塊。癥瘕。不因是而除。而血脈調和。營衛暢達。月事時至。又安有血枯血閉。而不見其生育者乎。故又能治諸般血症。而使挾孕而有子也。是以古人用此。以治跌撲損傷。則多含白然銅。龍骨。血竭。乳香。沒藥。五銖錢。黃荊子。麻皮。灰狗頭骨。以治下腹痛。血痛。血閉。則合桃仁。大黃以治各隨病症。所因而用之耳。陰乾臨時所入。

名地鼈。別錄名土鼈。形扁如鼈。有甲不能飛。小有臭氣。此物好生鼠壤。及屋壁地棚之下。氣味鹹寒。有毒。喜破癥瘕。考仲景金匱醫甲煎丸用之。殆病癥日久。結爲癥瘕。大黃廔蟲丸用之。治虛勞腹滿。內有乾血。下瘀血湯用之。治產後腹痛。內有瘀血。土瓜根散用之。治經水不利。少腹滿痛。以其消癥而破瘀也。去冬因用廔蟲以催痘漿。調查各藥舖。方知所製鼈甲煎丸。大黃廔蟲丸。皆用廔蟲。以訛傳訛。皆由吾國藥劑師互相傳授。未讀方書。不明本草。以致貽誤匪少。堪發一嘆。不觀夫古人制字。廔字其下從蟲。廔字其上從草。一或作廔。旁從木。一足證廔蟲由草木而化生。非如廔蟲之從溼土而出也。又按廔蟲氣味甘。微寒。爲發痘行漿。托癰清毒之妙品。且能化痰醒酒。和中利小便。產廣東潮州。及福建漳泉。蔗田中。形如蠶蛹。食蔗根而化生。土名蔗姑。其味甘美。土人有用之以佐酒席。考本草拾遺及南京醫學報。均有發明。可見廔蟲與廔蟲。性味不同。形質亦異。古人定方用

十七畫 蟻

蟻 蟻 蟻

故能作聲。雌者長一寸許。色濃綠。微雜褐色。翅短於雄。尾端有產卵器突出。性質效能見。『蟻』條。



斯 蟻

【螻蛄】即螻蛄小而黃者之別名。典見崔豹古今注。詳『螻蛄』條。

【蟻】即白蟻之古籍別名。典見綱目。詳『白蟻』條。

【蟻】即蚯蚓之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蚯蚓』條。

【蟻】即蚯蚓之古籍別名。典見綱目。詳『蚯蚓』條。

【蟻】即蚯蚓之古籍別名。典見綱目。詳『蚯蚓』條。

【蟻】即蚯蚓之古籍別名。典見綱目。詳『蚯蚓』條。

【蟻】即蚯蚓之古籍別名。典見綱目。詳『蚯蚓』條。

【蟻】即蚯蚓之古籍別名。典見綱目。詳『蚯蚓』條。

脚、麪舖、油坊、並陰溼之地恒有生焉。

形態 蟻蟲體長寸許。前狹後闊。色黑而亮。大小不等。頭小六足。背有橫紋錯起。伏土而善攻隙穴。傷之不易死。

採取 十月間採之。

製法 採得用沸水泡洗曝乾。

性質 鹹。寒。有毒。

效能 破血瘀。消堅癖。專作通經藥。

主治 心腹寒熱洗滌。血積瘕瘕。破堅下血。閉。生子大良。

張仲景之發明 蟻蟲一味。經張仲景之實驗。認為『主治乾血。故兼治少腹滿痛及婦人經水不利』。茲考徵如下。下瘀血湯證曰：『產婦腹痛。土瓜根散證曰：『帶下。經水不利。少腹滿痛。又曰：『經一月再見者。右二方。皆以蟻蟲為主藥。似為婦人血毒設之。雖然。或云治瘕或云內有乾血。肌膚甲錯。何必婦人血毒之治乎。由此觀之。則蟻蟲及此三方。不啻治婦人血毒矣。雖男子亦可用之。但臍下有血毒者。

婦人最多。故仲景嘗立此方法。以治婦人。是其遺法耳。凡一身之內。有血毒所著者。必見肌膚甲錯。證若著臍下。則有兩目黯黑。羸瘦。腹滿。不能飲食。證後世不知此證名曰五勞。為爾申約。其審聽之。曰七日虛勞。曰勞瘵。皆屬空談理義。我們所不取也。是以如下瘀血湯。亦治男子少腹滿痛。小便不利。及淋瀝。或血自下者。此人當必有肌膚甲錯等證。又按此方服法曰：『頓服之。新血下如豚肝。然亦謂腹中有乾血著臍下。則似言相矛盾。此方本為乾血而設之。今服此方而其血下。謂之新血可乎。凡用蟻蟲三方。皆為治乾血之方。蓋乾血。乃久瘀血也。若治新血不下。證則別有。桃仁承氣湯。大黃牡丹皮湯。大黃甘遂湯。若治蓄血。則有抵當湯及丸。故治乾血。則有此方。及土瓜根散。大蟻蟲丸。是皆以蟻蟲為主藥。此為蟻蟲能破久瘀血之用也。由是觀之。則新血下如豚肝者。是蓋蓄結之血。新下如豚肝色之謂乎。土瓜根散證曰：『經水不利。少腹痛。經一月再見者。下瘀血湯證曰：『乾血著臍下。經水不利者。然則經水不利者。是乾血所為明矣。又曰：『主陰癰腫。按丈夫陰器遠少腹。愈痛。謂之癰也。此證亦瘀血所為也。此雖其證不具。然據少腹愈痛證。則自有此方證具矣。大蟻蟲丸證曰：『羸瘦。腹滿。不能飲食。內有乾血。肌膚甲錯。兩目黯黑。此證者。乃後世所謂勞瘵。五勞七傷是也。皆是世醫常談。其說屬臆度也。但羸瘦腹滿。至兩目黯黑。其證不可廢也。其證不可廢。則此方亦不可廢也。是必仲景遺方。而有所可徵者。至五勞虛極。及七傷。及緩中補虛。證。則後人妄添。不俟余言矣。李時珍本草。蟻蟲附方有之。大蟻蟲丸。治產婦腹痛。有乾血者。用蟻蟲二十枚。去足。桃仁二十枚。大黃二兩。為末。煉蜜和。分為四丸。每以一九酒一升。煮取二合。溫服。當下血也。張仲景方云云。按是下瘀血湯之方。而非大蟻蟲丸之方也。李時珍何以稱此方。而謂大蟻蟲丸乎。其文亦大同小異。蓋時珍所見金匱要略有別所傳之本乎。又本草傳寫之謬誤乎。若夫本草

能見愈。外此箭鏃入肉。用此塗貼患處。則箭即克見拔。究其治效。總因性善攻火。其性急迫。故能如此取效也。味鹹氣寒。俗名土狗。凡用此藥。宜審其體質。方可却取。若使體虛氣薄。但見書載治功。任意妄施。其不傷人性命者鮮矣。此與草麻子等藥。同爲一類。用時須當細審取雄。去翅足炒用。

配合應用 ①治十種水病。腹滿喘促不得臥。以蠅貼五枚。焙乾爲末。食前白湯服一錢。小便利爲效。楊氏加甘遂末一錢。商陸汁一匙。取下水爲效。忌鹽一百日。小便祕者。用蠅貼下截。焙研。水服半錢。立通。(聖惠方) ②又用蠅貼一箇。葡萄酒。同研。露一夜。日乾研末。酒服。(保命集方) ③又用端午日取蠅。貼陰乾。分頭尾焙收。治上身用頭末七箇。治中用腹末七箇。治下用尾末七箇。食前酒服。(乾坤祕鑑方)

④治大腹水病。用蠅貼炙熱。日食十箇。肘後方) ⑤又半邊散。治水病。用大戟。芫花。甘遂。大黃各三錢。爲末。以土狗七枚。五月能飛者。搗

葱鋪新瓦上焙之。待乾去翅足。每箇剪作兩半。邊分左右。記收欲退。左即以左邊七片。焙研。入前末二錢。以淡竹葉。天門冬煎湯。五更調服。候左退。三日後服右邊。如前法。(普濟方)

⑥治喘鼻消水。面浮甚者。用土狗一箇。輕粉二分半。爲末。每噴少許。入鼻內。黃水出盡爲妙。(楊氏家藏方)

⑦治小便不通。用大蠅貼二枚。取小體。以水一升漬飲。須臾即通。(葛洪方) ⑧又用土狗下截。焙研。調服半錢。生研亦可。(壽域方) ⑨又加車前草同搗汁服。(談楚翁方) ⑩又用土狗後截。和麝搗納臍中。縛定即通。(唐氏經驗方) ⑪又用土狗一箇。炙研。入冰片。麝香少許。翎管吹入莖內。(醫方摘要方)

⑫治大小便閉。經月欲死。用土狗。推車客各七枚。並男用頭。女用身。瓦焙焦爲末。以向南棗皮煎汁飲一服。神效。(普濟方)

⑬治胞衣不下。困極腹脹。則殺人。蠅貼一枚。水煮二十沸。灌入下喉。即出也。(延年方)

⑭治脾風出汗。蠅貼。甘草等分。並炙爲末。傅之。(聖濟總錄方)

⑮治齒牙疼痛。土狗一箇。舊糟裹定。漚紙包煨焦。去糟研末。傅之。立止。(本事方)

⑯治緊唇裂痛。蠅貼燒灰。傅之。(千金方)

⑰塞耳治聾。蠅貼五錢。穿山甲炮五錢。麝香少許。爲末。葱汁和丸。塞之外。用嚼鼻藥即通。(普濟方)

⑱治頭項癰癰。用帶殼蠅貼七枚。生取肉。入丁香七粒於殼內。燒過。與肉同研。用紙花貼之。(救急方)

⑲治箭鏃入肉。以蠅貼杆汁。滴上三五度。自出。亦能治鍼刺在咽。(千金方)

⑳治誤吞鈎線。蠅貼去身。吞其頭數枚。勿令本人知。(聖惠方)

㉑用蠅 七隻或三對。施用宜忌 凡非氣壯邪實者。禁用。

參攷資料 ①自腰以前甚濕。能止大小便。自腰以後甚利。能下大小便。(陶弘景) ②今方家治石淋。導水。用蠅貼七枚。鹽二兩。新瓦

上鋪蓋。焙乾研末。每溫酒服一錢。匕即愈也。(蘇頌) ③今處處有之。穴地蟄壤中。而生。則出外求食。荀子所謂蛄風。五技而窮。蔡邕所謂碩鼠。五能不成。一技者。皆指此也。魏詩碩鼠。乃大鼠。與此同名。而技不窮。固不同耳。五技者。能飛不能過屋。能緣不能窮木。能游不能度谷。能穴不能掩身。能走不能免人。(蘇頌) ④此蟲立夏後至夜則鳴。聲如蚯蚓。月令蠅螋鳴者是矣。(寇宗奭) ⑤蠅貼治水甚效。但其性急。慮人戒之。(朱丹溪) ⑥蠅貼穴土而居。有短翅四足。雄者善鳴而飛。雌者腹大羽小。不善飛翔。吸風食土。喜就燈光。入藥用雄。或云用火燒地。赤置蠅於上。任其跳死。覆者雄。仰者雌也。類從云。應鐵致。汗蟬引兔。物相感也。(李時珍)

【蠅螋】即蠅貼之古籍別名。典見月令詳「蠅螋」條

【蠅斯】係蠅之同類。爲草蟲之大者。體長色綠或褐。觸角爲鞭狀。複眼在觸角之基部。無單眼。大顯強壯。翅半透明。前翅右左上。互相重疊。接合處成堅硬之發聲器。

十七畫 螺

蝸牛。其類衆多。故名。

產地 生湖澤淡水中。

形態 螺螄爲介類螺屬之一種。大如指頭。長寸許。殼色黑而厚。

於田螺肉可供食與藥用。其微泥詳見各該條。

性質 甘寒。無毒。

主治 明目。下水。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器

本草拾遺論螺螄肉曰止渴【明】

李時珍本草綱目論螺螄曰醒酒

解熱。利大小便。消黃疸水腫。治反

胃痢疾。脫肛痔漏。

參攷資料 螺螄於清明後殼

中有蟲。不堪食用(李時珍)

【螺螄泥】 採取 用螺螄一斗。

水洗之。澄泥。曬乾用。

性質 涼。

主治 反胃吐食。酒服之。

【螺螄殼】 古醫別名 鬼眼睛。

採取 以泥中及牆壁上年久

者良。

製法 凡使火煨過用。

性質 甘溫無毒。

主治 痰飲積及胃脘痛。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論螺螄殼曰反胃。膈氣。

痰嗽。鼻淵。脫肛。痔疾。瘡癰。下疳。湯

火傷。

參攷資料 螺乃蚌蛤之類。其

殼大抵與蚌粉。蛤粉。蚌蛻之類同

功合而觀之。自可神悟(李時珍)

【螺螄草】 命名 本品莖葉狀

如螺螄。故名。

古醫別名 鏡面草(綱目)

外國名詞 Dymnaglossum

subcordatum, Fee. (拉丁) ヲ

メツタ(日本)

基本 係羊齒門羊齒類水龍

骨科。螺螄草屬之螺螄草。

產地 蔓生石間。

形態 螺螄草爲石草類之一

種。根莖爲絲狀而匍匐。有長達數

尺者。莖面有鱗片狀之暗褐色毛。

葉有裸葉實葉。裸葉通常爲卵圓

形或圓形。實葉狹長。採得可供藥

用。

性質 辛。

主治 癰腫。風疹。腳氣腫。搗爛

本草綱目論螺螄草曰。治小便出

血。吐血。衄血。齒齦痛。

參攷資料 按陳日華經驗方

云。年二十六。忽病小便後出鮮血

數點而不疼。如是一月。飲酒則甚。

市醫張康。以草藥汁一器入少蜜

水進兩服而愈。求其方。乃鏡面草

也(李時珍)

【螺螄】 命名 螄者臭也。本品

氣臭。故得螄名。

古醫別名 螄。天蠶。蠶。 (本

經) 螄。月令。仙姑。石風。 (古

今注) 梧鼠。 (荀子) 砧鼠。土廟

(和漢藥考) 土狗。 (普濟方)

外國名詞 Mole cricee (英)

基本 屬直翅類中蟋蟀科之

螄。

產地 凡平澤卑溼之地均產。

形態 螄螄爲害植物之昆

蟲。作巢於枯死植物之根間。全身

黑褐色。長一寸許。形似蝗首圓而

長。其翅雄長雌短。不能高飛。雄者

喜撲燈火。雌者則否。春秋善鳴。入

冬棲息土中。掘土而行。頗爲捷速。

此蟲於七月上旬產卵。土中多至

一七九〇

四五月間。已全長成。

採取 夏至。採取夜出者。曝乾。

製法 大明曰。去翅足。炒水

煎。或刺末。

性質 鹹寒。無毒。

效能 逐水邪。通二便。用作利

尿藥。

主治 產難。出肉中刺。潰癰腫。

下疳。噤喉。除惡瘡。

歷代記述攷證 【宋】日華諸

家本草論螄螄曰。治水腫。頭面腫。

【元】朱丹溪本草衍義補遺論螄

螄曰。治口瘡甚效。【明】李時珍本

草綱目論螄螄曰。利大小便。通石

淋。治癰癤骨哽。【清】黃宮繡本草

求真論螄螄曰。螄螄氣味寒鹹。性

甚奇特。書言將此分爲上下左右

四截。若以上截治腫。則腫即見上

消。下截治腫。則腫即見下消。左截

治腫。則腫即見左消。右截治腫。則

腫即見右消。又載自腰以上以治

則能拔水上行。而使二便皆滯。自

腰以下以治。則能使便立下。婦人

難產。亦可照此以治。而產即解。癰

腫癰癤肉刺。若生搗汁以塗。則刺

與腫皆治。骨蝕入喉不下。吹吹即

母。土蜘蛛。(綱目)

外國名詞 Ctenizus fodiens

Trap-door spider (拉丁) トタ

テダモ (日本)

基本 係節肢動物蜘蛛類之
蠅蠅蟲

形態 蠅蠅爲卵生蟲類之一
種。體呈長橢圓形。頭胸部比腹部
稍大。上面圓。色黑。有光澤。胸中有
溝。腹卵圓形。有白色橫紋七條。尾
端有大小紡績突起二對。體長不
足五分。營巢土中。爲圓筒狀。上有
橢圓形之蓋一方。連於筒壁。內面
滿附蛛絲。甚光澤。蓋上附有苔蘚
與地面同平。時或仰開其蓋。何他
蟲誤入而攫食之。捕得可供藥用。
性質 有毒
主治 一切疔腫。附骨疽蝕等
瘡。宿肉贅瘤。燒爲末。和臘月豬脂
傅之。亦可同諸藥傅。疔腫出根爲
上。

【螳螂】 命名 本品兩臂如斧。
當職不避。故有當郎之
名也。

古籍別名 螳螂。刀螳。(綱目)
拒斧。(說文)不過。(爾雅)蝕肌。

十七蠶螳

(別錄)野狐鼻涕。(西陽雜俎)兎
羊七。(揚雄方言)當郎。數常。刀娘。
(綱目)天馬。天蠅。(和漢藥考)石
娘。(俗名)

外國名詞 Tenodera aridi-

folia, Stoll

基本 屬直翅類之螳螂。

產地 凡原野樹木上恒多產
焉。



(一) 螳螂



(二) 螳螂

形態 螳螂體細長。前胸頗長。
腹部肥滿。脊有翅。前翅作角質。全
體淡綠色。時或作褐色。頭小。作三
角形。觸角爲鞭狀。由多數之節而
成。有六脚。前脚長。末端彎曲作鉗

螳螂

狀。有鋸齒。爲捕捉他蟲之具。中肢
短。後肢長。適於跳躍。夏秋間潛伏
樹葉下。捕食農家害蟲。

採取 三四月採之。

製法 採得焙乾用。但恒以剉
末用。

效能 定驚風。療創傷。用作創
傷刺傷藥。

主治 小兒急驚風。搐搦。又出
衛。生者能食疔目。

配合應用 驚風定搐。中分
散。用螳螂一箇。蜥蜴一條。赤足蜈
蚣一條。各中分之。隨左右研末。記
定。男用左。女用右。每以一字吹鼻
內。指之吹左。即左定。吹右。即右定
也。(普濟方)

箭鏃入肉。不可拔者。用螳螂
一箇。巴豆半箇。同傅研傷處。微痒
且忍。極痒乃擲拔之。以黃連黃芩
湯洗拭。石灰傅之。

用量 一個至三個。

施用宜忌 同桑螵蛸。

參攷資料 螳螂俗名石娘。

逢樹便產。惟以桑上者爲好。是藥
得桑皮之津氣也。以連枝斷取者
爲真。僞者亦以膠着桑枝之上也。

【陶弘景】螳螂古方不見用者。

惟普濟方治驚風。吹鼻定搐法中
用之。蓋亦蠶蟄定搐之義。古方風
藥多用螳螂。則螳螂治風同一理
也。又醫林集要方出箭鏃亦用之。
(李時珍)

螳螂腰首。修頸
大腹。二手四足。善緣而捷。以鬚代
鼻。喜食人髮。能翳葉捕蟬。或云術
家取鬚作法。可以引形。深秋乳子
作房。黏着枝上。即螳螂也。房長寸
許。大如拇指。其內重重有隔房。每
房有子如蛆。卵至芒種節後一齊
出。故月令有云。仲夏螳螂生。是也。
(李時珍)

【螳螂蟲】即桑螵蛸之古籍別名。

典見和漢藥考。詳「桑螵蛸」條。

【蠟子蠶】即青黛之古籍別名。典
見和漢藥考。詳「青黛」條。

【蠟巴】即貝子之古籍別名。典見
和漢藥考。詳「貝子」條。

【蠟兒青】即青黛之古籍別名。典
見和漢藥考。詳「青黛」條。

【蠟青】即青黛之古籍別名。典見
和漢藥考。詳「青黛」條。

和漢藥考。詳「青黛」條。

【蠟蠟】原名 蠟蠟。

命名 師衆多也。形似

物品功用各殊。如起而研究。藥理昭然。病證亦特效。則幸甚矣。①朱石華曰。神農嘗百草。而辨性之寒溫。質之浮沉。示人以大關節。目至其藥力之大小。藥品之複雜。以及性之果屬燥熱寒涼。質之果屬升降浮沉。病至幾分。脈至幾動。而可用麻黃大黃於分量適中。而能達其汗下之目的。不至陷於過汗亡陽。過下亡陰之覆轍。總在吾人歷練揣摩。詳細研究。穎悟心得之所。從出渾而言之。無論何種藥品。而一藥必有一藥之升降宜散。竊之以理想證之。以實驗。庶乎可耳。固古人有大匠使人規矩。不能使人巧之斷語。歷鍊研究。誠為萬世不易之定理也。僕於薤白三致意焉。夫薤白之功用。為利竅宣陽之妙品。疏竅活鬱之良藥。而世人竟不及察。以為薤菜本食料之品。烏能治大病。藥店置之敝屣。醫生視為無用。嗚呼。薤白何其不幸之甚也。僕在醫界中。每嘗詳細剖解。不敢研究一有用之品。抱為己得。而不公聞者也。人聞之有掩耳而走者。有不以理而駁者。謂草芥之類。豈

能療沉疴之病乎。豈不知仲景重用其方。曰括薤白白酒湯。曰枳薤白半夏湯。曰枳實薤白桂枝湯。而論胸痺之證。洞若觀火。詳解薤白之性。大有發明。故僕恪守金匱一隅三反。而於胸痺之外。與斯症同源而異流者。無論其為寒為火。無一病而不用之者。因寒而重用。因火而少用。寒之為患。每兼凝滯。故薤白氣味辛溫。其性又能從下而上。主助生陽之氣。上升者也。仲聖三用之。皆取自下而上。從陰出陽之義也。因火者亦用之。不過為寒劑之反佐。以作嚮導之義耳。百用而百效。誠為利竅宣陽活血潤澤之須臾不可缺少之良品也。有清萊天土亦有發明。謂其氣溫。稟天春和之木氣。入足厥陰肝經。味辛苦滑無毒。得地西南金火之味。而有潤澤之性。入手大陰肺經。味升多降也。至若常用以應敵藥。侮者。如王肯堂信用以治產後胸中煩熱氣逆。以成薤白湯。沈金鰲信用以治嘔。又信用以治老人冷痢。以成薤白粥。王孟英專用以治霍亂。名之曰獨行方。種種功用。不

待研究而後知。不第此也。明末大家喻嘉言。謂其宣陽疏滯而不傷胃氣。為中風門中左宜右有之捷品也。

配合應用 ①治胸痺刺痛。張

仲景栝樓薤白湯。治胸痺痛。微心

背。喘息欬唾。短氣。喉中燥。寸脈

沉遲。關脈弦數。不治殺人。用栝樓

實一枚。薤白半升。白酒七升。煮二

升。分二服。千金治胸痺。半夏薤白

湯。用薤白四兩。半夏一合。枳實半

兩。生薑一兩。栝樓實半枚。咬咀。以

白朮漿三升。煮一升。溫服。日三。治

胸痛。瘕而復發。薤根五升。搗汁飲

之。立瘳。戴音在。酢漿也。(肘後方)

②治卒中惡死。卒死。或先病。或

平居寢臥。奄忽而死。皆是中惡。以

薤汁灌入鼻中。便省。(肘後方)

③治霍亂乾嘔不止者。以薤一

虎口。水三升。煮取一牛頓服。不過

三作。即已。(韋宙獨行方)

④治奔豚氣痛。薤白搗汁飲之。

(肘後方)

⑤治赤痢不止。薤同黃蘗煮汁

服之。(藏器方)

煮粥日食之。(食醫心鏡方)

①治小兒疳痢。薤白生搗如泥。以粳米粉和。蜜作餅炙熟。與食。不過三兩服。楊氏產乳方)

②治產後諸痢。多煮薤白食。仍以羊脂同炒食之。(范汪方)

③治妊娠胎動。腹內冷痛。薤白一升。當歸四兩。水五升。煮二升。分三服。古今錄驗方)

④治體肉腫毒。杵薤汁服二三升良。(葛洪方)

⑤治瘡犯惡露。甚者殺人。薤白搗爛。以帛裹煨熱。去帛傳之。冷即易換。亦可搗作餅。以艾炙之。熱氣入瘡。水出即瘳也。(梅師方)

⑥治手指赤色。隨月生死。以生薤一把。苦酒煮熟。搗爛塗之。愈乃止。(肘後方)

⑦治瘡疥痛癢。煮薤葉搗爛塗之。(肘後方)

⑧治炎瘡腫痛。薤白一升。豬脂一斤。切以苦酒浸一宿。微火煎。三上三下去滓塗之。(梅師方)

⑨治手足癰腫。生薤一把。以熱醋投入。以封瘡上。取效。(千金方)

⑩治毒蛇螫傷。薤白搗傳。(徐

(以上一方。薤白三兩。)歷觀上列三方。則薤白所主治也。不辨而自明矣。

歷代記述攷證

【唐】孟詵食療本草論薤白曰。治女人帶下赤白。養食之。骨哽在咽不去者。食之即下。【唐】孫思邈千金翼論薤白曰。心病宜食之。利產婦。【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論薤白曰。補虛解毒。【宋】日華諸家本草論薤白曰。養食耐寒。調中補不足。止久痢冷瀉。肥健人。【元】李東垣用藥法象論薤白曰。治洩痢下重。能泄下焦陽明氣滯。【明】李時珍本草綱目論薤白曰。治少陰病厥逆洩痢及胸痺刺痛。下氣散血安胎。【清】黃宮繡本草求真論薤白曰。薤亦動滑藥耳。故書皆載調中助陽散血疏滯。定喘安胎利產及治陽火傷損。綠薤味辛則散。散則能使在上寒滯立消。味苦則降。降則能使在下寒滯立除。氣溫則散。散則能使在中寒滯立除。體滑則通。通則能使久痢寒滯立解。是以下痢可除。瘀血可散。喘急可止。水腫可數。胸痺刺痛可愈。胎產可治。湯火及

中惡卒死可救。實通氣滑竅。助陽佳品也。功用有類於韭。但韭則入血行氣。及補腎陽。此則專通寒滯。及兼滑竅之爲異耳。取白用。【清】王士雄隨息居飲食譜論薤白曰。薤辛溫散結。定痛。寬胸。止帶。安胎。活血。治痢多食發熱。忌與韭同。

辨偽

鄭肯巖曰。薤白氣味辛溫無毒。根如小蒜。色白者辛而不苦。近有以鬼蒜僞充。壁開無瓣。噫。薤白爲處處皆有之業。值亦甚賤。胡味良者。偏以僞亂眞乎。曹炳章曰。按薤白各處皆產。生土填上。卽俗謂葉葱之根。葉如細韭菜。色綠空心。根如小蒜頭。若採時去鬚。莖蒸熟晒乾。則質堅緊。不致脫皮。且晒之易燥。若生晒則質鬆。層層脫皮。且不易乾燥。故近今皆用蒸曬者多。惟僞者少見。

近人學說

謝安之曰。薤白爲菜類尋常之食品。用之利竅宣陽。泄瀉活血。頗奏奇效。敝縣諸醫棄之不用。甚可惜也。考仲景方用薤白者四。一爲栝薤薤白白酒湯。二爲栝薤薤白半夏湯。三爲枳實薤白桂枝湯。四爲四逆散。泄利下

重者。以薤白煮水調散服之。觀上四方。其氣味效能可想而知。但仲景對於胸痺。甚有發明。所謂胸痺之病。喘息欬唾。胸背痛。短氣。寸口脈沉而遲。關上小緊數。又曰。胸痺不得臥。心痛徹背。胸中氣塞。心下痞氣。氣結在胸。胸滿脇下逆搶心。無不以薤白配合枳實厚朴桂枝。括薤白。白酒半夏等藥。以通穢濁之氣。以散陰寒之結。心胸之氣得以調和。周身之血得以環轉。獨四逆散用之。治泄利下重者。阻鬱於下。故加薤白以通之。是從治之法。不可以其阻結而用攻下。惟錢氏對於四逆散之加味。疑爲未必皆出於仲景。柯氏疑爲叔和編輯之誤。恐二賢想像如是。實未試用。但鄙人累見胸痺及下重等症。按法煮服薤白。無不奏效也。本經主治金瘡之敗。輕身不饑。耐老。辛苦溫無毒。似韭而葉闊。黃帝云。薤不可共牛肉作羹。食之成瘕。又俗謂生用能引潑唾。杜甫詩云。衰年關腸冷。味暖並無憂。可見辛溫而散胸膈中之結氣。又陶弘景謂仙方。王孟英謂辛溫散結。定痛。寬胸。止帶。

安胎。活血。治痢等症。及服食家皆須之。張石頑謂諸瘡中風寒水腫。生搗敷之。能吐胃中痰食。蟲積。屢驗。金匱救卒死。搗汁灌鼻中。效。薤葉治肺氣喘急。喻嘉言葉天士輩。讀其宣陽疏滯而不傷胃氣。亦爲中風門左宜右有之捷品。此外如王肯堂治產後胸中煩熱氣逆之薤白湯。沈金齋治嘔吐老人冷痢之薤白粥。王孟英治霍亂之獨行方。張文仲治傷寒下利如爛肉汁。赤滯伏氣腹痛之豉薤湯。(卽仲景梔子豉湯加薤白一兩)儀禮十相見禮曰。蕙薤之屬。食之止臥。韓雄詩薤葉照人呈。夏竦魏文帝塋上行。念君若苦悲。夜夜不能寐。莫以魚肉賤。棄捐蕙與薤。說文。薤。鴻薤也。因薤似韭。故功用相類。總之薤白辛溫滑利。上能開胸痺。下能泄大腸氣滯。實肺與陽明藥也。然多食發熱。神昏目暗。能發宿疾。無滯者亦當禁用。俗謂補虛之說。尤是謬說。深望醫界同志。勿以尋常菜蔬之品。或因假賤。不足以治大病。棄之不用。並望吾縣醫家及病家。萬勿誤認薤字爲韭字。以致

① 治骨髓。薤根末。水服方寸匕。日三。外臺祕要方。
 ② 治小兒睡中遺尿不自覺。以薤根剉。以酒飲之。(外臺祕要方)

③ 治口瘡。以根煮濃汁。溫含冷。易神驗。(肘後方)

④ 治消渴尿多。薤根一把。水煎。日服之。(千金方)

⑤ 治小便失禁。用薤根煮汁。飲。或爲末酒服。野生白花者更良。(聖惠方)

⑥ 治小兒疳痢頻數。用生薤根洗切。煎濃汁。細飲之。以愈爲度。(千金方)

⑦ 治口咽痛痒。語聲不出。薤根皮。射干一兩。甘草炙半兩。每服二錢。水煎服之。(普濟方)

⑧ 治小兒月蝕。薤根四兩。地榆二錢。爲末。先以鹽湯洗過。傳之。(全幼心鑑方)

⑨ 治癰腫癰毒。潰爛疼痛。用薤根皮更炙熨之。(千金方)

⑩ 治筋骨疼痛。因患楊梅瘡。服輕粉毒藥成者。薤根白皮洗三斤。水酒十斤。煮一炷香。每日在

飲。以愈爲度。又用刺薤根三錢。五加皮。木瓜。當歸。茯苓各二錢。以酒二盞。煎一盞。日服一次。(鄧筆峯雜興方)

⑪ 治箭刺入肉。膿囊不出。以薤根末搽之。服鼠璞十日。即穿皮出也。(外臺祕要方)

【薤根微露】 基本 係薤根花蒸取之露。

性質 氣芳香。味辛散。
 主治 建中達表。解散風邪。驅除客熱。

【薤根仁】 卽薤黃之古籍別名。典見綱目。詳「薤黃」條。

【薤蕪】 卽酸模之古籍別名。典見和漢藥考。詳「酸模」條。

【薤荔】 卽木蓮之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「木蓮」條。

【薤蒲】 卽菖蒲之古籍別名。典見和漢藥考。詳「菖蒲」條。

【薤薺】 卽薺之古籍別名。典見爾雅。詳「薺」條。

【薤盾子】 卽決明子之古籍別名。典見爾雅。詳「決明子」條。

十七釐薤

薤薺 薤薺 薤薺 薤薺

【薤】 命名 本品非類。故字從非。藥用其白者之鱗莖。故名曰薤白。

處方用名 薤白。薤白頭。

古籍別名 薤芝。(別錄) 薤子。薤子。火薤。(綱目) 鴻薤。(說文) 天薤。野薤。薤葱。(俗名) 山薤。(爾雅) 辣薤。(日本)

外國名詞 Allium Bakeri, 呂(拉丁) ラツキヤウ, ギヤウジヤヒル(日本)

基本 係百合科薤屬。藥用薤之鱗莖。

產地 凡山野平原間恒有生長。陳仁山藥物生產辨云。薤白以產江蘇浙江爲正。廣東產者係薤頭耳。



薤

形 薤爲菜類之多年生草本。高尺許。葉細而長。稍爲三角形。有平行脈。色深綠。莖莖均有臭氣。秋日莖間抽花。莖高尺餘。開紫色

花。作繖形花序。有六瓣。雄蕊比花稍長。其地下鱗莖叢生。其色白如指大者。卽薤白頭也。入藥用。又可供食用。

種植 閩閩四野恒有栽時。八月下種。正月分之。植於肥壤者則易繁茂。

採取 夏五月間採之。採得鱗根。去淨泥。陰乾用。

用法 與他藥水煎。或生搗取汁。亦可浸酒與焙剉爲末。

性質 辛苦。溫。滑。無毒。效能 通陽泄濁。利竅滑腸。開胸。散結。氣用作。鎮痛及健胃藥。

主治 金瘡瘡敗。輕身不飢耐老。(本經) 歸骨。除寒熱。去水氣。溫中散結。氣。作羹食。利病人。諸瘡中風寒水氣。腫痛。搗塗之。(別錄)

張仲景之發明 薤白一味經張仲景之實驗。認爲主治「心胸痛而喘。息咳唾也。旁治胃痛。心中痞」。茲考徵如下。① 栝薤白白酒湯證曰。喘。息咳唾。胸背痛。② 枳實薤白桂枝湯證曰。胸痹。心中痞。以上二方。薤白皆用半升。③ 栝薤白半夏湯證曰。心痛。徹背。

十七畫 薑

薑

●治胎寒腹痛。啼哭吐乳。大便色青。狀若驚搐。出冷汗。薑黃一錢。沒藥。乳香二錢。爲末。蜜丸。交子大。每服一丸。鉤藤煎湯化下。(和劑局方)

●治產後血痛。有塊。用薑黃。桂心等分。爲末。酒服。方寸匕。血下盡。即愈。(普救產寶方)

●治瘡癰初生。薑黃末。摻之。妙。

(千金方)

用量 八分至錢半。

施用宜忌 凡無瘀滯及非氣壯邪實者。禁用忌火。

參攷資料 ●薑黃。鬱金。蓬萊。

三物。形狀功用皆相近。但鬱金入心治血。而薑黃兼入脾。兼治氣。蓬萊則入肝。兼治氣中之血。爲不同。爾古方五痺湯。用片子薑黃。治風寒溼氣。手臂痛。戴原禮要訣云。片子薑黃。能入手臂。治痛。其兼理血中之氣可知。(李時珍) ●薑黃根。葉都似鬱金。其花春生。於根與苗並出。入夏花爛。無子。根有黃青白三色。其作之方法。與鬱金同。西戎人謂之莛。其味辛少苦多。亦與鬱金同。惟花生異耳。(蘇恭) ●薑黃

眞者是經種三年以上老莖。能生花。花在根際。一如蘗荷。根節堅硬。氣味辛辣。種薑處有之。終是難得。西番亦有來者。與鬱金蓬萊相似。如蘇恭所說。即是莛藥。而非薑黃。又言薑黃是莛。鬱金是胡莛。如此則三物無別。遞相連名。總稱爲莛。則功狀當不殊。而今鬱金味苦寒。色赤。主馬熱病。薑黃味辛溫。色黃。莛味苦。色青。三物不同。所用各別。(陳藏器) ●海南生者。即莛莖莖。江南生者。即爲薑黃。(大明) ●薑黃。今江廣蜀川多有之。葉青綠。長一二尺許。闊三四寸。有斜文。如紅蕉葉。而小花紅白色。至中秋漸凋。春末方生。其花先生。次方生葉。不結實。根盤屈黃色。類生薑。而圓有節。八月採根。片切。曝乾。蜀人以治氣脹。及產後敗血攻心。其驗。蠻人生嗽云。可以祛邪辟惡。按鬱金。薑黃。蓬萊。三物相近。蘇恭不能分別。乃爲一物。陳藏器以色味分別。三物。又言薑黃是三年老薑所生。近年汴都多種薑。往往有薑黃出。質乃是老薑。市人買嗽云。治氣爲最。大方亦時用之。又有廉薑。亦是其

類。而自是一物。(蘇頌) ●近時以扁如乾薑形者。爲片子薑黃。圓如蟬腹形者。爲蟬肚鬱金。並可浸水染色。莛形雖似鬱金。而色不黃也。(李時珍) ●試管之。果辛多苦少。詳其功用。似辛勝者。爲是。又曰。此味有云。不宜見火者。良然。蓋此味之辛勝者。是其功用之微。見火則去其辛矣。(劉潛江) ●有二種。蜀川生者。色黃。質嫩。有鬚折之。中空。有眼切之分。爲兩片者。爲片子薑黃。江廣生者。質粗形扁。如乾薑。僅可染色。不入湯藥。今藥肆混市。誤人。徒有耗氣之患。而無治療之功也。(張石頑)

性實 辛溫。無毒。

主治 食醢成瘕。搗汁飲。即消。

【薑葉】 ●即廉薑之古籍別名。典見綱目。詳「廉薑」條。

基本 本品係用生薑

【薑露】 蒸取之露。

性質 味辛。性熱。

主治 辟寒。解中。霜。瘧。癘。瘧。消食化痰。

【薑】 卽水蓼之古籍別名。典見爾雅。詳「水蓼」條。

一七八四

【薔薇子】 卽薔薇之古籍別名。典見別錄。詳「薔薇」條。

性實 苦。溫。冷。無毒。

主治 止洩痢腹痛。五臟客熱。除邪逆氣。疳積。諸瘡。瘡。金瘡。傷。癰。生肉。復肌。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥

性本草論薔薇根曰。治頭瘡白禿。

【宋】大明日華諸家本草論薔薇

根曰。治熱毒風。除邪氣。止赤白痢。

腸風瀉血。通結血。治牙齒痛。小兒

疳蟲肚痛。癰疽疥癬。【明】李時珍

本草綱目論薔薇根曰。除風熱。溼

熱。縮小便。止消渴。

國外學說 英美學說謂薔薇

花各國均有。取該花之瓣。可爲藥

品。其功用能作汽水。配香水等用。

取其味美。處方以鮮薔薇花瓣一

分。水五分。入飯蒸出一分。作洗水

類常用之。配他藥取其臭香。每服

一兩至二兩。(薔薇花汽水又名

薔薇露方)

配合應用 ●治金瘡發熱。用

薔薇根灰一方寸匕。日三。(葛洪

方)

黃薑產四川、湖北老河口、廣東番禺、高塘司等西北江各屬均有出。安南印度亦均有出。

形態 薑黃產於中國及東印度地方，為多年生草本。有野生者，有栽種者。葉形橢圓，有長柄，背生軟毛。一窠生四五葉，四五月發芽，花莖同生，高五七寸，下有二小葉包之，全體互生鱗狀之苞。苞內開花兩朵，黃色，狀如喇叭，其根莖色黃，稠作橢圓或長橢圓形，長約一二寸，微扁平，外面被有塵粉，有如輪之突起或結節，頗為緻密。內面作黃色或橙黃色，似鬱金而色略淡，味芳香而苦，然緩和咀嚼之，唾液亦變黃色。

採取 八月間採之，採得切片曝乾，不宜見火。

性質 辛苦大寒，無毒。

成分 為揮發油脂、脂肪、黃色素等。黃色素名曰克兒克明。

效能 專行氣破血，治風痺臂痛，用作風痛藥。

主治 心腹結積，注忤下氣，破血除風熱，消癰腫，功力烈於鬱金。

歷代記述攷證 【宋】大明諸

十七畫 薑

家本草論薑黃曰：治癰瘕血塊，通月經，治撲損瘀血，止暴風痛，冷氣下食。【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論薑黃曰：祛邪辟惡，治氣脹，產後敗血攻心。【明】李時珍本草綱目論薑黃曰：治風痺臂痛。【清】黃宮繡本草求真論薑黃曰：薑黃味辛而苦，氣溫，色黃，功用頗類鬱金。三稜、蓬朮、延胡索，但鬱金入心，專瀉心胞之血，我尤入肝，治氣中之血，三稜入肝，治血中之氣，延胡索則於心肝血分行氣，氣分行血，此則入脾，既治氣中之血，復兼血中之氣。耳陳藏器曰：此藥辛苦多苦，性氣過於鬱金，破血立通，下氣最速。凡一切結氣積氣、癰瘕瘀血、血閉癰疽，並皆有效，以其氣血兼理耳。若血虛腹痛臂痛，而非瘀血凝滯者，用之反劇。蜀川產者，色黃質嫩，有鬚折之中，空有眼，切之分為兩片者，為片子薑黃，廣生者，質粗形扁，如乾薑，僅可染色，不可入藥，服之有損無益。

辨偽 鄧肯巖曰：子薑黃氣味辛苦而溫，是經種三年以上老薑所生，色黃入脾，兼治氣，匪特破

血除風，聞有以黃北薑偽充，則貽害多矣。曹炳章曰：按子薑黃，福建邵武出者，色黃皮黃，黑色有節，皺紋者佳。四川產者，名川黃，略次。江南北地產者，色深黃，作顏料用之。廣西柳州產者，形似蟬肚，色深黃，兼黑者次，作香料用之。鄧肯巖曰：李時珍云，以扁如乾薑形者為片子薑黃，治風痺臂痛有奇功。今肆中有偽品，即薑黃假充，粒大皮粗，味辣，內不結潤，非片子也。勿用為是。曹炳章曰：按片子薑黃與子薑黃大小塊色皆不同，片子薑黃比子薑黃大六七倍，切厚片，色淡黃，兼黑，邊有鬚根，廣東潮州浙江溫州俱出。

近人學說 張山雷曰：薑黃始見唐本草，稱其辛苦大寒，藏器已辨其非，謂辛少苦多，性熱不冷，則唐本寒字，蓋亦傳寫之誤。石頑謂有二種，川蜀生者，色黃質嫩，有鬚折之中，空有眼，切之分為兩片者，為片子薑黃，江廣生者，質粗形扁，為乾薑，僅可染色，不入湯藥，藥肆混市，誤人，徒有耗氣之患，則無治療之功。頃按今市肆薑黃，確有兩

種，名片薑黃者，是本已切為厚片，而後晒乾，形似乾薑，色不黃，質亦不堅，治風寒溼者，即此。又一種則堅實光亮，其色深黃，乃如鬱金，是為染色之用，不入藥劑者。唐本謂治心腹結積，注忤下氣，破血，蓋辛能散，溫能通，故可破結辟惡，消癰下氣，是物功用，即在此數者之中。然又謂除風熱，消癰腫，功力烈於鬱金，則正以入血泄散，故癰瘍之堅腫，可消，湯科普通敷藥之如意金黃散用之，即是此意。固非疎風清熱之作用，而乃竟以為除風熱，宜乎有辛苦大寒之誤矣。大明謂治癰瘕血塊，撲損瘀血，通月經，止暴風痛，冷氣下食，蘇頌謂治氣脹，產後敗血攻心，戴原禮謂片子薑黃入手臂治痛，石頑謂血虛臂痛者，服之必增劇，蓋辛溫本以祛寒，溼而血虛者，更得此迅利流動，以耗其氣，則非徒無益而又害之矣。

配合應用 薑黃得當歸生、地、牛膝、延胡索、肉桂，治一切積血在腹中作痛。

●治心痛難忍，薑黃一兩，桂三兩，為末，醋湯服一錢（經驗方）

歷代記述攷證 【唐】李珣海

藥本草論薇曰。利水道。下浮腫。潤大腸。

【薇草】即白薇之古籍別名。典見別錄。詳「白薇」條。

【薇御草】即鹿御草之古籍別名。典見本經。詳「鹿御草」條。

【薇衡】即薇衡子。詳「薇衡子」條。

【薇衡子】原名 延壽果。古籍別名 藥衡子。

（綱目）無類。吳普本草。

性質 甘微溫。無毒。

主治 理血中邪淫。溫補下元。

祛風痺。歷節痛。定小兒驚悸。

參攷資料 薇衡子不特有益

老人。而嬰兒先天不足者。尤爲上

藥。惜乎南方罕得。（本草逢原）

【薇蕪】即薇蕪之古籍別名。典見別錄。詳「薇蕪」條。

【薇】即蓮肉之古籍別名。典見爾雅。詳「蓮肉」條。

【藹】即香附子之古籍別名。典見爾雅。詳「香附子」條。

【藹】即藹之短小中空。皮厚色

青者。功用詳「藹」條。即小蒜之

古籍別名。典見蜀本草。詳「小蒜」

條。

條。

【藹米仁】即藹仁之處方用名。詳「藹仁」條。

【藹藹】即藹藹之原名。詳「藹藹」條。

【藹珠子】即藹仁之古籍別名。典見圖經本草。詳「藹仁」條。

【藹黍】即藹仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳「藹仁」條。

【藹半夏】製法 用大半夏。照法半夏法製。復以生

薑自然汁漬焙乾用。

主治 寒痰者宜之。

性質 辛溫潤。無毒。

【藹汁】主治 噎膈反胃。救暴卒。療狐臭。搽手足凍瘡。貼風溼痺痛。

【藹皮】處方用名 藹衣。外國名詞 Zingiber officinale, Rose. (拉丁)

性質 辛涼。無毒。

主治 消浮腫。腹脹。痞滿。和脾胃去瀉。

歷代記述攷證 【明】李士材

本草圖解論藹皮曰。藹皮性涼。和脾胃。消水腫。除脹滿。去目翳。【清】

黃宮繡本草求真論藹皮曰。藹皮辛涼。和脾胃。利水消腫。取其以皮行

皮之義。

配合應用 蘇頌圖經本草治

拔白換黑方。用刮老生藹皮一大

升。於久用油膩鍋內。不須洗刷。固

濟勿令通氣。令精細人守之。文武

火煎之。不得火急。自旦至夕即成

矣。研爲末。拔白後。先以小物點麻

子。大入孔中。或先點鬚下。然後拔

之以指擦入。三日後。當生黑者。神

似藹根。可供藥用。

採取 以不見日光。色白而爛

不穢者良。

性質 鹹寒。無毒。

主治 熱豌豆瘡。疔毒等腫。

【藹汁炒山梔】即山梔子經藹汁

焙炒成者之處方用名。詳「山梔

子」條。

【藹衣】即藹皮之處方用名。詳「

藹皮」條。

【藹芥】即荊芥之古籍別名。典見別錄。詳「荊芥」條。

【藹根】即生薑之古籍別名。典見和漢藥考。詳「生薑」條。

【藹酒】基本 本品係用藹塊

浸成之酒。或以藹汁和

麴釀者。

主治 偏風。中惡。疰忤。心腹冷

痛。

【藹黃】外國名詞 Curcuma longa, L. (拉丁)

處方用名 片薑黃。黃蘗。

古籍別名 薑黃。寶鼎香。嫩芽相

連者名子母薑黃。（綱目）

基本 屬薑科。爲薑黃之根莖。

產地 陳仁山藥物生產辨云。

形鑑 薑石爲石類之一種。狀

製法 以薄荷油可製為薄荷精、薄荷水、薄荷錠三種。

性質 辛涼無毒。

效能 油與霜俱作衝動藥、鎮

瘧與驅風藥並為殺菌藥。

主治 散風熱、清頭目、治咽喉

牙痛、癢擦皮膚風痒、及金瘡湯火傷塗擦之。

參攷資料 據日本農商務省

農務局調查輸出重要品要覽薄荷油薄荷霜部所載山形縣薄荷油製法云於有水利之處築竈安置大釜上覆蒸桶蒸桶長約四尺五寸上部直徑約三尺五寸底之中央有孔於此桶裝積乾葉八貫至十二貫每貫為六斤四兩架置盛水大釜之上更於其上置一底面作圓錐形之釜滿盛冷水然後燃火使下釜之湯沸騰則蒸氣經蒸桶與薄荷質共達上釜底面由其圓錐形尖端流下受器滴下另置於水槽中之磁製壺中此壺口徑六寸高約一尺其底有小孔上釜由貯水桶用管不斷補給冷水使與溫水調和蒸溜液已注滿壺中時即用指頭塞住底孔一面

十七畫 薄

薇

注視壺中徐徐從水槽中取上一面放去指頭則水從小孔流出祇餘薄荷液留於壺中再用指將孔塞住移於他器如此所得之液為霜與油之混合物日本名為取卸薄荷將此取卸薄荷移於罐或甕使接觸華氏驗溫器四十五度以下之冷氣經二小時即開始結晶用網杓子攪取此結晶移於他器一二次後即於殘留之油中再加取卸薄荷稍用火焙化再照前法冷卻則再開始結晶如此則可將霜與油分離又法將取卸薄荷置入銅製蒸溜器 (Retort) 中通蒸氣蒸溜之將溜出物置入銑製罐 (高一尺五寸方一尺) 中復置入盛冰之大木箱 (可置八罐) 中夏置寒冷處冬置溫暖處約經三日則成結晶體將此傾注別器則油滴下祇留結晶體即薄荷霜也再將餘留結晶體之罐列置於有管之斜形棚上斜置之則油質自然流出經管而滴下受器結晶體由三層而成上層斜立中層直立下層作綿狀油質悉已流出將罐取下祇取其中層 (即

直立部分) 盛於木製淺箱放置空氣中乾燥三日則得純粹薄荷霜又將殘餘上層及下層部分再加入取卸薄荷照前法為之大約乾葉百貫可得取卸薄荷一貫左右取卸薄荷一貫可得霜四十兩油五十三兩

【薄荷梗】即薄荷之處方用名。詳『薄荷』條。

【薄荷圈】即薄荷霜之別名。詳『薄荷霜』條。

【薄荷腦】即薄荷之處方用名。詳『薄荷』條。

【薄荷葉】即薄荷之處方用名。詳『薄荷』條。

【薄荷精】即由薄荷油而製成者。詳『薄荷油』條。

【薄荷錠】即由薄荷油而製成者。詳『薄荷油』條。

【薄荷霜】即薄荷油之固體者。詳『薄荷油』條。

【薄荷油】條。

【薄荷露】 基本 本品係用薄荷梗及葉所蒸取之

性質 辛涼無毒。

主治 清涼解熱發散風寒。

【薇】 命名 本品似薔乃榮之微者故名。

古籍別名 垂水 (爾雅) 野豌豆大巢菜 (綱目)

外國名詞 *Osmunda regia*

lis, L. var. japonica, Milde

(拉丁) センパイ (日本)

基本 係羊齒門羊齒類薇科

為薇之莖葉。

產地 原野田澤間多有之。

形態 薇為榮類之一年生草本高二三尺無地上莖其葉自地下莖叢出尖端卷曲如漩渦葉有

二種一為綠色二回羽狀複葉由

長卵形之小葉而成一為褐色由

細長小葉而成葉間着生多數胞

子囊其莖葉可供食與藥用。



薇

性質 甘寒無毒。

主治 久食不飢調中利大小

能發散。專於消散風熱。涼能清利。故治咳嗽失音。性浮上升。能開鬱散氣。然所用不過二三分。以其辛香伐氣。非久服多服之品。按外治風熱生瘡。麥汁和入消腫。末藥敷之。涼入肌膚。立能止痛。今西藥製精成錠。外擦頭痛。能泄外風。能抑肝陽。皆有捷驗。

配合應用 ①清上化痰。利咽膈。治風熱。以薄荷末煉蜜丸。如芡子大。每嚥一丸。白沙糖和之亦可。
②簡便單方

③治風氣瘕瘕。用大薄荷、蟬蛻等分。為末。每溫酒調服一錢。(永類鈴方)

④治舌胎語蹇。薄荷自然汁。和白蜜薑汁擦之。(醫學集成方)

⑤治眼眩赤爛。薄荷以生薑汁浸一宿。曬乾為末。每用一錢。沸湯泡洗。(明目經驗方)

⑥治瘰癧結核。或破未破。以新薄荷二斤。取汁。皂莢一挺。水浸去皮。搗取汁。同於銀石器內熬膏。入連翹末半兩。連白青皮、陳皮、黑牽牛半生半炒各一兩。皂莢仁一兩。中同搗和。入梧子大。每服三十九。

煎連翹湯下。(濟生方)

⑦治衄血不止。薄荷汁滴之。或以乾者水煮。綿裹塞鼻。(許學士本事方)

⑧治血痢不止。薄荷葉煎湯常服。(普濟方)

⑨治水入耳中。薄荷汁滴入立效。(外臺祕要方)

⑩治蜂螫螫傷。薄荷葉按貼之。(外臺祕要方)

⑪治火毒生瘡如炙。火毒氣入內。兩股生瘡。汁水淋漓者。用薄荷煎汁頻塗立愈。(張景岳說方)

用量 八分至錢半

施用宜忌 凡氣虛血燥。及無外感風寒熱邪者禁用

參攷資料 ①薄荷能引諸藥入營衛。故能發散風寒。(陳士良)

②小兒驚狂壯熱。須此引藥。又治骨蒸熱勞。用其汁與柴胡煎為膏。貓食薄荷則醒。物相感爾。(寇宗奭)

③薄荷手足厥陰氣分藥也。能搜肝氣。又主肺盛有餘。肩背痛及風寒汗出。(王好古)

④薄荷辛能發散。涼能清利。專於消風散熱。故頭痛頭風。眼目咽喉口齒諸病。

小兒驚熱及瘰癧瘡疥為要藥。戴原禮氏治貓咬。取其汁塗之有效。蓋取其相制也。(李時珍)

⑤薄荷貓之酒也。犬虎之酒也。桑椹樹之酒也。茵草魚之酒也。皆戕食害心。鏡云薄荷煎湯煖酒和飲。新茶生食並宜。蓋菜之有益者也。(陸農師)

⑥同種作薑食相宜。新病瘥人勿食之。令人虛汗不止。瘦弱人久食之。動消渴病。(甄權)

⑦薄荷處處有之。莖葉似荏而尖長。經冬根不死。夏秋採莖葉曝乾。古方稀用。或與薤作薑食。近世治風寒為要藥。故人家多蒔之。又有胡薄荷與此相類。但味少甘為別。生江浙間。彼人多以作茶飲之。俗呼新羅薄荷。近汴洛僧寺或植一二本。部天寶單方所謂連錢草者是也。

⑧又有石薄荷。生江南山石間。葉微小。至冬紫色。不聞有別功用。(蘇頌)

⑨薄荷人多栽蒔。二月宿根生苗。清明前後分之。方莖赤色。其葉對生。初蒔形長而頭圓。及長則尖。吳越川湖人多以代茶。蘇州所蒔者莖小而氣芳。江西者稍粗。川蜀者更粗。入藥以蘇產為勝。物類

相感志云。凡收薄荷須隔夜以蕪水澆之。雨後乃悉刈。則性涼。不爾則不涼也。野生者莖葉氣味都相似。(李時珍)

【薄荷水】即由薄荷油而製成者。詳「薄荷油」條

【薄荷油】基本 本品係用薄荷葉蒸溜所取之揮發油。

外國名詞 Oleum menthae (拉丁) Peppermint oil. (英)

形態 薄荷油含有同質異性體二種。一為液體(薄荷油)一為固體(薄荷霜或呼薄荷圖)薄荷油為無色透明或淡黃色液。一般帶綠色。經久漸成黃色。有薄荷葉香氣。味初如灼。後變清涼。比重約〇.九。不溶於水。逢酒精及冰醋酸等。則善能溶解。沸點為二百〇四度至二百十度。薄荷霜 Menthol C₁₀H₁₈O(OH) 為無色針狀結晶體。氣味俱同薄荷油。稍溶於水。投入時。於水面旋轉。逢酒精伊打哥羅仿姆冰醋酸等。善能溶化。又熱至四十三度則融化。二百十三度則沸騰。沸破則呈藍紫色。

相感志云。凡收薄荷須隔夜以蕪水澆之。雨後乃悉刈。則性涼。不爾則不涼也。野生者莖葉氣味都相似。(李時珍)

歷代記述攷證

【唐】孫思邈千金翼論薄荷曰。作菜久食。卻胃氣。辟邪毒。除勞氣。令人口氣香潔。煎湯洗漆瘡。【唐】甄權藥性本草論薄荷曰。通利關節。發毒汗。去積氣。破血止痢。【唐】陳士良食性本草論薄荷曰。療陰陽毒。傷寒頭痛。四季宜食。【唐】孟詵食療本草論薄荷曰。杵汁服去心腹風熱。【宋】日華諸家本草論薄荷曰。治中風失音吐痰。【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論薄荷曰。主傷風頭痛。通關格。及小兒風涎爲要藥。【元】李東垣用藥法象論薄荷曰。清頭目。除風熱。【明】李時珍本草綱目論薄荷曰。利咽喉口齒諸病。治癰癰瘡。疥風癢癰。搗汁含漱去舌胎。語澀。探葉塞鼻止衄血。塗蜂螫蛇傷。【清】黃宮繡本草求真論薄荷曰。薄荷氣味辛涼。功專入肝與肺。故書載辛能發散。而於頭痛頭風。發熱惡寒則宜。辛亦能通氣。而於心腹惡氣痰結則治。涼能清熱。而於咽喉口齒眼耳。癰疹瘡疥。驚熱骨蒸衄血則妙。是以古方追遙。用此以爲開鬱散氣之具。小兒驚癇。用

此以爲宜風向導之能。腸風血痢。用此以爲疎氣清利之法。然亦不敢多用。所用不過二三分而止。恐其有泄真元耳。蘇產氣芳者良。貓傷用汁塗之最妙。【清】王士雄隨息居飲食譜論薄荷曰。薄荷葉辛甘苦溫散風熱。清利頭目。咽喉口齒諸病。和中下氣。消食化痰。開音聲。舒鬱滯。辟穢惡邪氣。療霍亂癰瘡。釀酒蒸饅饊。糖造露均妙。惟虛弱多汗者忌之。

國外學說 日本學說謂薄荷各國皆有。藥中所用。卽薄荷之乾燥葉也。其主治用量爲健胃驅風。劑又能靜止胃痛。腸痛。一日數回。自一、〇至二、〇。爲到劑散劑。浸劑。投之。製劑以薄荷油。薄荷水。薄荷精。各一滴至三滴爲調味藥。又薄荷腦爲鎮痛藥。齒痛時。入其結晶於齒腔內。偏頭痛時。塗擦其杆。又爲防腐藥。於肺結核等。爲丸劑或酒精劑。內服之一日數回。自〇、〇五至〇、二。又日本藥局方曰。薄荷葉係採取薄荷 (*Mentha Arvensis* L. var. *Piparacens*, Benth.) 之葉陰乾者。本品

爲卵圓形或披針形。長三至七仙米。上端尖銳。邊緣有不等銳鋸齒。葉面散有毛茸。附有多數腺鱗。本品氣味特異。芳香峻烈而清涼。又和漢藥考曰。日本之主要產地爲山形縣。岡山。廣島。二縣次之。此外新潟。長野。愛知。千葉。諸縣亦產之。惟不多。但日本產薄荷有赤莖。青莖二種。赤莖所含薄荷霜量較青莖爲多。

辨偽 鄭肖巖曰。土薄荷色淡無香味。不若蘇州所蒔者佳。莖小氣芳。方堪入藥。故陳士良食性本草謂之吳荻蘭。〔發音按活〕可見薄荷當以吳產者爲上品。曹炳章曰。按薄荷六七月出。蘇州學宮內出者。其葉小而茂。梗細短。頭有螺螄蒂。形似龍頭。故名龍頭薄荷。氣清香。味涼。沁爲最道地。太倉。常州。產者。葉略大。梗亦細。一莖直上。無龍頭形。氣味亦略淡。有頭二刀之分。頭刀力全。葉粗梗長。香氣濃厚。二刀乃頭刀割去後。留原根抽莖再長。故莖梗亦細。葉亦小。氣味亦略薄。尚佳。杭州。葛橋。產者。梗紅而粗長。氣濁臭。味辣。甚次。

山東產者。梗粗葉少不香。更次。二種皆爲側路。不宜入藥。

近人學說 顧子靜曰。薄荷爲唇形科植物。薄荷之葉有特異奇烈之香氣。味始如灼。後清涼。含一種揮發油。其內更含一種固體名薄荷腦。日本產之薄荷。含薄荷腦較多。於製得之薄荷油中。寒冷之後。卽有薄荷腦析出。沉於器底。薄荷之醫療應用。以其葉一錢三分。浸於一茶杯之熱水中。分三次。一日服用。以治胃痛。疝痛。張山雷曰。薄荷方莖。而色紫帶赤。可以子種。宿根亦能自生。氣味芳烈。頗與紫蘇相類。但葉不赤。而無鋸齒。氣味雖濃。而入口清冽爲異。故孫星衍輯刻本草經。逕謂薄荷蘇類。確乎可信。唐本草謂爲辛溫。亦以蘇類例之。然冷冽之氣。能散風熱。決非溫藥。故潔古直謂之辛涼。其主治則唐本謂賊風傷寒。惡氣。心腹脹滿。霍亂。宿食不消。下氣。又皆與紫蘇大略相近。惟辛而涼降。微與溫散者不同耳。蘇頌謂主傷風。頭脹。風寒。垣謂清頭目。除風熱。瀨湖謂利喉。噎口。齒諸病。石頑謂辛

產地 陳仁山藥物生產辨云。薄荷產江西吉安府湖南九州府河南禹州府江蘇太倉州夏季出新。

形態 薄荷爲山野自生或栽植之宿根草。春從宿根生。面莖方。形高一二尺。葉對生。作卵圓形而尖。有淺銳鋸齒。採揉嗅之。有辛涼香氣。表面深綠色。背面紫色。長則作綠色。秋季於葉腋叢生淡紫色唇形花。其葉作卵圓形或長橢圓形而帶尖。長一二寸。邊緣有銳鋸齒。有葉柄。葉莖有軟毛。有芳香及清涼味。



荷 薄

種植 ①氣候及土質。凡溫帶溼潤之氣候。皆合其生育。而過溼亦不佳。又稍寒地方。亦可使其生育。土地以膏沃之黏質壤土。爲最適其生長。無黏質壤土之處。而欲栽培。則土壤亦可。或者砂質之壤土。亦可使其生長。惟品質則必較

栽於黏質壤土者爲劣。其餘土質皆不適於栽培。②產地及種類。產地極廣。僅以吾國言之。幾無省不有。吾國產出之品質。亦有上中下之分。產於南省者爲最劣。產於外省者爲最優。產於北省者次之。外國以美國產出者爲最佳。法國產出者次之。其種類有赤質青質二種。赤質者因莖帶赤色。油腦多而枝葉茂。爲佳良種。青質者因莖帶青色。枝葉雖茂。而品質不良。油腦較少。故栽培薄荷者。多取赤質種。而不取青質種。亦其宜也。吾國中省所產。雖較南北各省爲佳。然亦有優劣之分。如四川湖北江西浙江等所產出者爲佳良。餘若湖南安徽江蘇等所產出者次之。故欲栽培薄荷。當取四川或湖北或江西或浙江之赤質種而栽之。爲佳也。選擇品種既畢。乃可整理土地。擇定時期。而後栽植。未栽以前。當注意整理土地之事。且時期亦不可悞忽也。③整地。耕起黏質之壤土。必須耕深至七八寸方可。而打碎土塊。使成粉細。並耙平土面。再作畦。幅一尺五寸至二尺。作畦既

畢。可以擇時栽種也。④期節。栽植有春秋二季之分。秋植與春植各有不同。今分條述之。一春植者。於冬季即宜耕地作畦。畦之幅約一尺二寸至一尺五寸。每株距離約三寸。於三月下旬。可栽植其種。是爲適期。二秋植者。畦稍闊於春植。約一尺七寸至二尺。每株距離約四寸。於七月下旬八月上旬。是其適宜之種植期。以上二種。春植爲佳。欲栽薄荷。當栽春植種爲要。⑤栽植。栽植之法。取薄荷每隔四五寸處切斷之。而後栽植於既竣之畦上。俟其漸漸生長可也。⑥施肥。肥料以人糞尿油粕堆肥爲主。每畝地積約需人糞尿七百餘兩。堆肥六七百斤。油粕八九百兩。油粕與堆肥混和而堆積之。使之腐熟。而後於未植以前施之。作爲基肥。待既栽之後。施以稀薄之人糞尿。分作三次換之可也。⑦中耕。中耕於栽後三四十日時行之爲宜。⑧除草。栽後二十日間。即宜除草。除草之際。見有根大之草。宜用手拔去。不可用器割除。蓋根大之草。其入土亦深。用器除之。則有害於薄荷之根株。故用手拔之爲佳。

荷之根株。故用手拔之爲佳。

採取 採取之期。因其供用之目的而不同。例如供食用者。當五六月之交。取其葉。以供肉汁中之用。若製精油之用者。則分七月上旬與十月上旬二次採取。以上皆就春植者之採取而言。採取之法。專以銳鑷刈。亦間有拔取者。採得陰乾用。

用法 與他藥水煎。或對末和作丸散。但入煎藥中。宜後下。數沸。則氣味全而功效足。與鈎藤同。

性質 辛溫無毒。

成分 含有一種揮發油。及單寧少許。

效能 發汗散風熱。解鬱治傷寒。爲驅風防腐藥。用於腸之異常酸酵。又爲清涼藥。用於夏日之中暑及霍亂。並可作眼藥。鎮痙健胃。通經藥。又治偏頭痛。肺支管炎。

作用 由腸壁吸入血中。能減少白血球之數。同時由交感神經而傳達大腦。使之麻痺。

主治 賊風傷寒發汗。惡氣。心腹脹滿。蜜蠟宿食不消。下氣。煮汁服之。發汗。大解勞乏。亦堪生食。

液。味辛酸入肝膽。制脾鬼故也。(李時珍) ①石膽生秦州羌道山谷大石間。或羌里旬青山二月庚子辛丑採爲石也。青色多白文。易破狀空青。能化鐵爲銅。合成金銀。(別錄) ②仙經時用。俗方甚少。此藥殆絕。今人時有採者。色青綠。狀如玻璃而有白文。易破折。梁州信都無復有。俗乃以青色礬當之。殊無髣髴。(陶弘景) ③此物出銅處有之。形似層青。兼綠相間。味極酸苦。磨鐵作銅色。此是真者。出蒲州虞鄉縣東亭谷窟及薛集窟中有塊如雞卵者爲真。向云似玻璃者乃礬礬也。比來人亦以有之。又以醋揉青礬之。並僞矣。(蘇恭) ④今惟信州鉛山縣有之。生於銅坑中。採得煎煉而成。又有自然生者尤爲珍貴。並深碧色。今南方醫人多使之。又著其說云。石膽最上出蒲州大者如拳小者如桃栗。擊之縱橫解皆成聲。文色青見用久則綠。擊破其中亦青。其次出上饒曲江銅坑間者。粒細有廉稜。如釵股米粒。本草言僞者以醋揉青礬爲之。全不然。但取粗礬石膽合消石

消溜而成之。塊大色淺。渾渾無脈理。擊之則碎。無廉稜者是也。亦氣扶石者。乃割取石膽狀。溜造時投消石中。乃凝則相著也。(蘇頌) ⑤石膽出蒲州山穴中。鴨嘴色者爲上。俗呼膽礬。出羌里者。色少黑。次之。信州又次之。此物乃生於石。其經煎鍊者。即多僞也。但以火燒之。成汁者僞也。塗於鐵及銅上。燒之紅者真也。又以銅器盛水。投少許入中。及不青碧數日不異者真也。玉洞要訣云。石膽陽石也。出嵩岳及蒲州中條山。稟靈石異氣。形如瑟瑟。其性流通。精感入石。能化五金。變化無窮。沈括筆談載鉛山有苦泉。流爲澗。挹水熬之。則成膽礬。所熬之釜。久亦化爲銅也。此乃煎熬作僞。非真石膽也。不可入藥。(李時珍) ⑥膽礬功力。能嘔能補。能收斂。外用殺浮肉。內服一釐至二釐。補而收斂。治發羊釣久痢。作嘔藥。每服七釐至一分。眼炎證。用膽礬四釐至八釐。配溫水八錢洗。(內科新說)

【膽陀】即鸚鵡之古籍別名。典見梵書。詳「鸚鵡」條。

十七畫 膽

燥 舉 薤 薺 蒨 萸 薄

【舉岸茶】即茶之產於浙江舊金華府境者。性質功用。詳「茶葉」條。【舉卿古拜散】即荊芥之古籍別名。典見和漢藥考。詳「荊芥」條。【薤】古籍別名。空心菜。aquatic, Forster (拉丁) ヒウサイ(日本) 基本 係旋花科牽牛子屬。爲薤菜之莖葉。產地 水陸諸地多有之。形態 薤菜爲菜類之一種。性宜溼地。長霜雪。九月藏於土窖中。三四月取出。壅以糞。即節節生芽。一本可成一畦。幹柔如蔓而中空。葉似菠薐。秋開白花。其菜可供蔬茹與藥用。性質 甘。平。無毒。主治 解胡荽毒。即野葛毒。煮食之。亦生瘡服。歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論薤菜曰。搗汁和酒服治產難。【薺】即魚腥草之原名。詳「魚腥草」條。【蒨草】即魚腥草之古籍別名。典

見和漢藥考。詳「魚腥草」條。【薺菜】即魚腥草之古籍別名。典見和漢藥考。詳「魚腥草」條。【薺葉】即魚腥草之處方用名。詳「魚腥草」條。【預藥】即山藥之古籍別名。典見和漢藥考。詳「山藥」條。【萸李】即郁李仁之古籍別名。典見陸璣詩疏。詳「郁李仁」條。【薄】即芒之日本名。詳「芒」條。【薄荷】原名 荜蘭。命名 薄荷爲荜蘭之音訛。處方用名 薄荷葉。薄荷梗。薄荷腦。古籍別名 蔞荷菜。吳荜蘭。(食性) 荜蘭(楊雄甘泉賦) 荜苦(呂忱字林) 南薄荷(衍義) 金錢薄荷(綱目) 番荷(千金方) 連錢草。天寶單方。英生。荜薺。薄荷冬蘇。雞蘇。石薄荷。冰喉尉。(和漢藥考) 外國名詞 Folia mentha (拉丁) pepper-mint(英) Pfefferling(德) 基本 屬唇形科薄荷之莖葉。

十七畫 膽

溶液。則爲收斂劑。因其能收縮細胞及血管。消退炎症之效。故用於注入白帶。淋病。慢性膀胱炎等。患慢性淋症者亦可以一服也。(二)膽藥用濃厚溶液。則變爲殺菌和腐蝕作用。普通腐蝕用十倍至二十倍之溶液。殺菌用百倍至千倍之溶液。凡患顆粒性結膜炎。惡性潰瘍及水痘贅等宜之。膽藥之配合和適應症。(一)治喉痺乳蛾。用米醋煮真鴨嘴。膽藥爲末。醋調。探吐膠痰即瘥。(二)治紫白癰風。膽藥和牡蠣生研醋調。摩磨之即愈。(三)治走馬牙疳。用紅棗去核。入膽藥煨赤。研末敷之。追出痰即效。(四)治胃脘蟲痛。以茶清調膽藥末吐之即除。(五)膽藥二分。開水八十分。糖漿四十分。每隔五分鐘服一匙。得吐即止。可解鴉片黃磷各種毒藥。

配合應用 ●治老小風癩。膽藥末一錢。小兒一字。溫醋湯調下。立吐出涎。便自醒。(譚氏小兒方) ●治女人頭暈。天地轉動。名曰心眩。非血風也。膽子礬一兩。細研。用胡餅劑子一箇。按平一指厚。以

篋子勒成骰子大塊。勿界斷。於瓦上焙乾。每服一骰子爲末。燈心竹茹湯調下。(許學士本事方)

●治喉痺喉風。二聖散用鴨嘴膽藥二錢。半白僵蠶炒五錢。研末。每以少許吹之。立吐痰涎。(濟生方)

●治齒痛及落。研細石膽以人乳和膏擦之。日三四次。止痛復生齒。百日後復故乃止。每日以新汲水漱淨。(王爾外科祕要方)

●治口舌生瘡。衆療不差。膽藥半兩。入銀鍋內火煨赤。出毒一夜。細研。每以少許傳之。吐出酸涎水。二三次瘥。(勝金方)

●治走馬牙疳。北棗一枚。去核。入鴨嘴膽藥。紙包煨赤。出火毒。研末傳之。追涎。(楊起簡便方)

●治小兒齒疳。鴨嘴膽藥一錢。匙上煉紅。麝香少許。研勻傳於齦上。立效。(活幼口議方)

●治小兒鼻疳。蝕爛。膽藥燒烟。盡研末。搽之一二日愈。(簡要方)

●治風眼赤爛。礬膽二錢。燒研。泡湯日洗。(明目經驗方)

●治百蟲入耳。礬膽末和醋灌

之即出。(千金方)

●治風犬咬毒。膽藥末敷之。立愈。(濟急方)

●治一切諸毒。膽子礬末。糯米糊丸。如雞頭子大。外以朱砂爲衣。仍以朱砂養之。冷水化一丸服。愈。(勝金方)

●治挑生蠱毒。胸口痛者。膽藥二錢。茶清泡服。即吐出。(嶺南衛生方)

●治腋下胡臭。膽藥半生。牛熟入膩粉少許。爲末。每用半錢。以自然薑汁調塗。十分熱痛乃止。數日一用。以愈爲度。(黎居士簡易方)

●治赤白癰風。膽藥。牡蠣粉各半兩。生研醋調。摩之。(聖濟總錄方)

●治甲疽腫痛。石膽一兩。燒烟。盡研末。傳之。不過四五度瘥。(梅師方)

●治痔瘡熱腫。鴨嘴背膽藥煨研。蜜水調敷。可以消脫。(直指方)

●治腫毒不破。膽藥。雀屎各少許。點之。(直指方)

●治楊梅毒瘡。醋調膽藥末。搽之。痛甚者。加乳香。沒藥。出惡水一

一七七六

二上即乾。又方。膽藥。白礬各三錢。半。水銀三錢。半。研不見星。入香油。津唾各少許。和勻。坐帳內。取藥塗兩足心。以兩手心對足心摩擦。良久。再塗。再擦。盡即臥。汗出。或大便去垢。口出穢涎爲驗。每一次強者用四錢。弱者二錢。連用三日。外服疎風散并澡洗。(劉氏經驗方)

用量 三分至五分

施用宜忌 凡非氣壯邪實者。禁用。畏牡桂。菌桂。羌花。辛夷。白薇。水英爲之使。

參攷資料 ●石膽氣寒。味酸。而辛。入少陽膽經。其性收斂。上行能消風熱。痰涎。發散風木相火。又能殺蟲。故治咽喉口齒諸毒。有奇功也。周密齊東野語云。嘗過南浦。有老醫授治喉痺。極速。垂死方用。真鴨嘴膽藥末。醋調。灌之。大吐。膠痰。數升。即瘥。臨汀一老兵。妻苦此。絕水粒三日矣。如法用之。即瘥。屢用無不立驗。神方也。又周必大陰德錄云。治蠱脹及水腫。祕方有用蒲州信州膽礬。明亮如翠。琉璃似鴨嘴者。米醋煮。以君臣之藥服之。勝於鐵沙鐵蠟。蓋膽礬乃銅之精。

古籍別名 黑石。石響。畢石。

本經(君石(當之)銅勒。(吳普)立制石。丹響。青石子。(和漢藥考)

外國名詞 Sulfus cupreus.

(拉丁) Copper-vitriol, blue

Vitriol. (英) Blauer Vitriol.

(德)

基本 係銅礦中自然生成。或

藍青色玻璃狀光澤之結晶塊。或

垂下作鐘乳狀。

產地 陳仁山藥物生產辨云。

膽礬產德國爲上。架喇吉打來者

亦可。日本來者次之。和漢藥考曰

日本各地銅山岩孔或洞穴中產

此。

形態 膽礬卽化學上之硫酸

銅($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$)爲藍青色透

映斜方柱稜柱狀結晶體。(煮膽

礬或熟礬)放置乾燥空氣中卽

漸漸風化變爲白色(生礬)溶於

冷水熱湯尤易。但不溶於酒精。味

爲收斂性。

採取 春季採之。須採形似空

青鴨嘴色。磨鐵作銅色者良。昔時

用天產品。現時概用金銀精鍊處

副產物精製。供藥用。

性質 酸。辛寒。有毒。

效能 吐風痰毒物。治喉痺咳

逆。外用作腐蝕藥。內服作催吐藥

及爲收斂性眼科藥。

主治 明目目痛。金瘡。諸癰瘡。

女子陰蝕痛。石淋寒熱。崩中下血

諸邪毒氣。令人有子。鍊餌服之不

老。久服增壽神仙(本經)散癥積

咳逆上氣及風痰惡瘡(別錄)

歷代記述攷證 【唐】蘇頌新

修本草論膽礬曰。帶下赤白。面黃

女子臍急【宋】蘇頌嘉祐圖經本

草論膽礬曰。加入吐風痰藥最快

【宋】大明諸家本草論膽礬曰。治

蟲牙。鼻內息肉【清】黃宮繡本草

求真論膽礬曰。膽礬又名石膽。產

於銅坑之中。得銅精氣而成。味酸

而辛。氣寒而澀。功專入膽涌吐。風

熱痰涎。使之上出。蓋五味惟辛爲

散。惟酸爲收。五性惟寒勝熱。風熱

盛於少陽。結於痰。垢汗之氣。橫而

不解。下之沉寒而益甚。凡因溼熱

淫火。見爲陰蝕。崩淋。寒熱。風痰。毒

氣。結聚牢固。見爲咽齒喉痺。乳蛾

風熱。痰核結聚。見爲咳逆癰瘡。目

痛。難忍。及金瘡不愈。諸毒。內閉膠

結。見爲蟲痛牙疳。種種等症。服此

力能涌吐上出。去其膠痰。化其結

聚。則諸症悉除。故古人之治喉痺

乳蛾。用米醋煮真鴨嘴。礬礬爲末

醋調。探吐膠痰。卽瘳。又治紫白癰

風。同牡蠣生研。醋調摩之。卽愈。又

治胃脘蟲痛。以茶清調膽礬末。吐

之。卽除。又治馬牙疳。紅棗去核。入

膽礬煨赤。研末敷之。追去痰涎。卽

效。百蟲入耳。用膽礬和醋灌。卽出

按此功專涌吐。何書又言酸寒能

收。不知書言收斂。乃是取辛。收其

熱毒。上涌而出。非以收其入內而

不宜散出表之意也。凡書所論藥

性。每有以收爲散。以散作補。不爲

剖析明白。多有意義難明。以致用

之者之誤耳。磨鐵作銅色者。真形

似空青之色。爲上【清】黃元御玉

樞藥解論膽礬曰。膽礬酸澀。收

能。越化癥結。消散腫毒。治齒痛牙

疳。喉痺牙蟲。鼻內陰蝕。脚疳。痔瘡

楊梅。金瘡。白癰。一切腫痛。療帶下

崩中。治上氣。眼疼。弦爛。喉。狗咬傷

百蟲入耳。腋下狐臭。吐風痰最捷

國外學說 日本藥局方曰。硫

酸銅爲藍色。透映結晶。於乾燥空

氣中。徐徐風化。溶於三・五分之

水。及一分沸湯。現酸性反應。不溶

於酒精。

近人學說 鄒爾凱曰。膽礬產

地和製法。產于銅坑內。倘用人工

製法。可將銅與濃硫酸加熱。或使

黃銅養化。而多量製出之。其成分

在化學上的記號是 CuSO_4 。故

又稱爲硫酸銅。爲酸性反應。其性

質和效能。係青藍色之結晶。味酸

而辛。澀。極易溶于水。但不甚溶于

酒精。普通多用爲催吐腐蝕收斂

諸劑。其作用。(一)此物因能刺戟

胃之知覺神經。反射延髓而惹起

惡心。故爲催吐良劑。又因他種催

吐藥。或使吐大久。常致腦呈不安

惟膽礬可免此弊。尤其對於服礬

毒者。苟將膽礬四厘。溶溫水一碗

服之。則膽礬所含之銅質細末。包

圍礬之表面。可妨礬之劇烈作用。

倘礬已吐出。可服陳松節油少許。

和生雞蛋白四五枚。以解餘毒。此

爲救解礬毒最便利最簡便之法。

附帶錄出。惟此法只宜於服毒之

最短期間。如過時稍久。則不適用。

當以瀉藥爲宜矣。(二)膽礬稀薄

【篋竹葉】

性質 苦平。無毒。

主治 咳逆上氣溢。筋急惡瘍。

殺小蟲（本經）除煩熱風癰。喉痺嘔吐（別錄）

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論篋竹葉曰。煎湯熨霍亂轉筋。

【篋竹筍】

食皆宜。

主治 消渴風熱。益氣力消腹脹。煮炒。

【篋竹茹】

水不斷。小兒熱疳。

主治 勞熱傷寒。勞復。齒血不止。婦女月。

【篋竹瀝】

主治 風症。

【篋竹】即百葉竹之柔輾可爲繩索者。功用詳「百葉竹」條。

【糞金子】

命名 本品係雲臺老根內之子。千百株中。不過數十粒。以其貴重。故名。

採取 於枯時採之。有聲。收種子時。剖其中。幹內取出。形如鼠糞。而色黑。大小如麥粒。田種者尤佳。

主治 血症。炒研白湯下。並療小兒慢驚神效。

【糞霜】即白秋霜之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「白秋霜」條。

【糞清】即金汁之原名。詳「金汁」條。

【糞蛆】即五穀蟲之古籍別名。典見和漢藥考。詳「五穀蟲」條。

【糞藍】基本 糞藍爲雜草類之一種。可供藥用。

性質 苦。

主治 療癰瘡白禿。洗漆瘡。

【糞蟲】即五穀蟲之古籍別名。典見和漢藥考。詳「五穀蟲」條。

【糟】即酒糟之原名。詳「酒糟」條。

【糟底酒】基本 本品即經過三年。臘糟下之酒。

主治 止嘔噦。摩風癢。腰膝疼痛。

歷代記述攷證 【宋】日華諸家本草論糟底酒曰。開胃下食。暖水臟。溫腸胃。消宿食。禦風寒。殺一切蔬菜毒。

【糟油】主治 摩風癢。腰膝痛。開胃。暖臟。止嘔噦。解疏菜毒。

【糟茄】製法 以茄子切條。晒乾。淹於酒糟中。半月後。可以取用。

主治 此茄燒灰存性。可塗鵝口疳。

【糟筍節中酒】性質 鹹平。無毒。

主治 飲之。主療噦氣。嘔逆。或加小兒乳及牛乳同服。又摩癰瘍風。

【糠莧】即野莧之俗名。詳「野莧」條。

【糠鳩】即斑鳩之古籍別名。典見綱目。詳「斑鳩」條。

【縮砂仁】即砂仁之處方用名。詳「砂仁」條。

【縮砂殼】即砂仁之壳。性味較砂仁爲差。功用同於砂仁。

【縮砂密】即砂仁之原名。詳「砂仁」條。

【縵華】即茉莉花之古籍別名。典見和漢藥考。詳「茉莉花」條。

【繁露】即落葵之古籍別名。典見別錄。詳「落葵」條。

【縵膠】即縵膠之古籍別名。典見綱目。詳「縵膠」條。

【縵絲湯】主治 止消渴。殺府瘕。

【鰾魚】即鰾魚之別名。典見動物學大辭典。詳「鰾魚」條。

【聯步】即縵隨子之古籍別名。典見斗門方。詳「縵隨子」條。

【聯貼】即豬脾之原名。詳「豬脾」條。

【膽八香】產地 生安南諸地。形態 膽八爲香水類之一種。幹如稚木。厚葉鮮紅色。類霜楓。其實榨油以和諸香。可供藥用。

主治 辟惡氣。

【膽星】即天南星之處方用名。詳「天南星」條。

【膽草】即龍膽之古籍別名。典見和漢藥考。詳「龍膽」條。

【膽南星】即天南星之處方用名。詳「天南星」條。

【膽瓶蕉】即芭蕉之古籍別名。典見和漢藥考。詳「芭蕉」條。

【膽礬】命名 本品色味似膽。故名。俗因其狀似礬。遂呼爲膽礬也。

出。或赤或白。子若杜棠子。(韓保昇) 薔薇野生林壑間。春抽嫩蘗。小兒拈去皮刺食之。既長。則成叢似蔓。而莖硬多刺。小葉尖薄。有細齒。四五月開花。四出黃心。有白色粉紅二者。結子成簇。生青熟紅。其核有白毛。如金櫻子核。八月採之。根採無時。人家栽玩者。莖細葉大。延長數丈。花亦厚大。有白黃紅紫數色。花最大者。名佛見笑。小者名木香。皆香豔。可人。不入藥用。南番有薔薇露。云是此花之露水。香醴異常。李時珍。 禹功湯。行水之效最著。故以禹功湯名之。方用營實三錢。水一盞半。煎至一盞。空心頓服。大禹功湯。即於原方加大黃八分。大禹功丸。營實六錢。大黃一錢六分。研末糊丸。綠豆大。白湯下。按營實新效方。經驗主治條云。百般水腫。屬實者。可悉用之。但脚氣衝心。病後產後。老幼諸腫。須斟酌。又微瘡結疥。毒癰。風諸瘡。毒用之皆效。又諸瘡用外敷之藥。或製為藥湯洗浴。凡毒氣內攻。致腫滿。咳嗽喘急。呼吸迫促。大小便不通。心腹脹悶。垂死者。非此湯不奏。

起死回生之效。又微毒咽喉腐爛。久年不愈。男女腹血淋下。疳痛。癰無常。痔疾。翻花。疼痛。大便祕結。瘡癰潰爛。疼痛。頭項。白亮。當合諸藥用之。又男女諸疳。肩背胸脇強痛。自腰脚牽引。小腹。急難於屈伸。烏附之劑。不能奏效者。用此殊有奇效。又婦人素有瘀血。或經水前後。熱入血室。或子宮熱。腫脫下。皆使小腹。急難。疼痛。腰脚不伸。此症世俗誤認。為寸白。與此湯多瀉水。則子宮腫消。痛除。又婦人經閉。半年或一年。腹滿拘攣。用之妙不可言。又諸中毒症。腹脹悶亂。或乾霍亂。悉效。風眼疼痛。天行赤眼。積年頭痛。欲裂。小便頻數。小兒遺尿。諸症。俱有效。又凡男婦身體壯實者。病係危急者。或微家。或常服。瀉藥。雖瀉者。俱宜大禹功湯。稟賦虛弱者。疾病緩久者。宜禹功湯。患諸難症。或須合諸藥用。不能煎湯者。宜大禹功丸。加減而用。其餘則隨時應變。酌用。(和漢藥考)

【營實葉】

主治 下疳瘡。烙研洗傳之。黃花者更良。

【燭夜】即雞之古籍別名。典見綱

目。詳「雞」條。

【蟾蜍】即蛇牀子之古籍別名。典見別錄。詳「蛇牀子」條。

【瘡】即水獺肝之古籍別名。典見綱目。詳「水獺肝」條。

【瘦留】即木天蓼之古籍別名。典見和漢藥考。詳「木天蓼」條。

【瘦殼】即鴨鵝之古籍別名。典見爾雅。詳「鴨鵝」條。

【蠶】即金之古籍別名。典見爾雅。詳「金」條。

【瑞草子】即蒼耳子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蒼耳子」條。

【環兒花】即忍冬藤之古籍別名。典見和漢藥考。詳「忍冬藤」條。

【環蛇】形態 環蛇形如環。大

數圈。以至數十圈。逐獸則疾行如轉車輪。若獸入環中。即斃。口眼俱生環之半。與尻相對。其脂可供藥用。

主治 其皮可以繫刀劍。臨陣服之。刀劍不能傷。

【環腸草】基本 環腸草為雜草類之一種。可供藥用。

主治 蠱脹。晒乾水煎服。以小便利為度。

【環餅】即寒具之古籍別名。典見要術。詳「寒具」條。

【璫珠】即真珠之處方用名。詳「真珠」條。

【璫珠粉】即真珠之處方用名。詳「真珠」條。

【療愁】即萱草之古籍別名。典見綱目。詳「萱草」條。

【瘤卵石】主治 治痞結。腸症。參攷資料 高陽民

家子。方十餘歲。忽臂上生宿癰。痛痒不可忍。醫皆不辨何症。一日忽潰。中有圓卵。墜出。尋化為石。劉工部。以一金售之。用治腸症。如神。

【蟠蒿】即白蒿之古籍別名。典見爾雅。詳「白蒿」條。

【礪石】即雲母之古籍別名。典見綱目。詳「雲母」條。

【礪黃】即石硫黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳「石硫黃」條。

【葦竹根】主治 作湯。益氣止渴。補虛下氣。(本經)

消毒。(別錄)

樹葉皆似荔枝。皮青色而澤滑。葉延珪香譜云。皮實而色黃者爲黃。檀皮潔而色白者爲白。檀皮腐而色紫者爲紫。檀其木並堅重清香。而白檀尤良。宜以紙封收。則不洩氣。正佐格古論云。紫檀諸溪峒出。之性堅。新者色紅。舊者色紫。有蟹爪文。新者以水浸之。可染物。真者指壁上。色紫。故有紫檀色。黃檀最香。俱可作帶。髹扇骨等物。(李時珍) ①白檀香善調。隔上諸氣。散冷氣。引胃氣上升。進飲食。兼通陽明之經。鬱抑不舒。嘔逆吐食。宜之。(張石頑)

【檀香片】即檀香之處方用名。詳「檀香」條。

【檀香】條。

【檀香百合】即山百合之一種。詳「山百合」條。

【檀香油】性質 味苦。

主治 除惡開胃。止吐逆。并治白濁。

【檀香泥】基本 檀香心中所含脂肪。

主治 胃氣滯痛。肝鬱不舒。

【檀香梅】即蠟梅花之香濃色如紫檀者。功用詳「蠟梅花」條。

十七畫 檀

樹 檀

【檀根皮】性質 辛。平。有小毒。

主治 塗瘡疥。殺蟲。

【檀桓】即黃柏根之原名。詳「黃柏」條。

【槲刺】即雲實之古籍別名。典見綱目。詳「雲實」條。

【檀乳】即檀柳脂之原名。詳「檀柳脂」條。

【檀柳】命名 本品爲木之聖。故名。

處方用名 西河柳。

古籍別名 赤柳。(日華) 赤楊。(古今注) 河柳。(爾雅) 雨師。(詩疏) 三眠柳。(衍義) 雨絲。垂絲柳。

蜀柳。人柳。觀音柳。長壽仙人柳。三春柳。(綱目) 御柳。(日本)

外國名詞 Tamarix chinensis, Lour. (拉) ギヨリウ (日本)

基本 係檀柳科檀柳屬。藥用其柔條。

產地 陳仁山藥物生產辨云。各省有出。廣東番禺及河南多有種植。

形態 檀柳爲落葉喬木。高丈餘。皮色赤。枝細長。密生小葉如鱗。

狀。夏月自枝梢抽出花軸。作穗狀。花序如穗狀。花小。萼片五枚。綠色。花瓣五枚。紫紅色。五雄蕊。一雌蕊。此植物更有特性。至秋能再開花。可供玩賞。



採取 夏秋間採得枝木葉。陰乾用。

性質 甘。鹹。溫。無毒。

效能 發疹。解毒。專作透發癩疹藥。

主治 疎散。驅風。解表。發癩疹瘡。癩不出。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論檀柳曰。枝葉消痞。解酒毒。利小便。【明】李士材本草圖解論檀柳曰。檀柳即西河柳。甘鹹而平。治痧癘熱毒。消痞療風。

近代學說 張山雷曰。檀柳似柳色赤。古名赤柳。爾雅謂之河柳。此吾吳俗所以皆名之爲西河柳也。枝葉極細。垂垂如絲。輕揚之最盛者。而經霜不凋。其色轉絳。故性溫入血。而善於發泄。治癩疹之不能透發者。甚效。乃瀕湖綱目所未詳者。但透達之性極速。入煎劑不當過二錢。俗又以此煎湯。作薰蒸。指洗外治之法。則癩疹既不透發。最忌感寒冒風。而乃脫衣露體。雖用熱湯。必有流弊。不可輕試。如在春冬天寒。尤爲大忌。

配合應用 ①治腹中痞積。觀音柳煎湯。露一夜。五更空心飲數次。痞自消。(衛生簡易方)

②治一切諸風。不問近遠。檀葉半斤。切枝亦可。荊芥半斤。水五升。煮二升。澄清。入白蜜五合。竹瀝五合。新瓶盛之。油紙封入。重湯煮一伏時。每服一小盞。日三服。(普濟方)

③酒多致病。長壽仙人柳。晒乾爲末。每服一錢。溫酒調下。(衛生簡易方)

④治癩疹瘡。或因風而閉者。俱用西河柳葉。同櫻桃核。煎湯洗之。即透出。(經驗方)

⑤治小兒痧疹不出。喘嗽煩悶。躁亂。用西河柳葉。風乾爲末。水調

十七畫 檀

寒味鹹。專入血分。

國外學說 貿易備考（日本大藏省記錄局藏版。明治十八年十月刊行）云。白檀爲檀香之一種。檀香本有白檀、黃檀二種。進口貨中。黃色者呼白檀。油色者呼黃檀。皆上品也。惟內黃外白者爲下品。多供佛前燃燒用。又其輕而脆者曰沙檀。其下者曰星香。又曰破漏香。日本所稱之白檀木有二種。一種樹葉似樅俗呼奇楠香。一種類似扁柏。幹必左撓。木理似白檀。微有香氣。然實非白檀。所謂左紐柏是也。白檀雖亦名檀香。其實與黃檀顯然不同。白檀專用木心。黃檀專用外層。其基本植物亦全異。以白檀木製出之油。不惟色澤香味有別。即其含有之成分亦各殊也。又日本藥局方曰。白檀爲白檀樹緻密堅硬之木材。以顯微鏡檢視橫斷面。見有細胞一二列構成之髓線。其細胞延長爲半徑性。木纖維有堅厚之壁。脈管或單獨。或二三連合。內含黃色之油滴。木細胞中含有菱形之萜酸鹽單晶。受熱則發固有之芳香。又和漢藥考

曰。白檀油。以白檀木削片。與水一同蒸餾。遂得淡黃之濃稠液體。有特殊之芳香。味奇烈稍苦。比重〇・九五至〇・九八五。於分極光線爲左旋性。水難溶解。酒精則易溶。現中性或弱酸性之反應。又荷蘭藥鏡載有檀香之產地。形態。效能等。錄之如左。產地。檀香有二種。一種產印度之地。木兒島最多。而印度南海之馬羅克諸島及爪哇島亦產之。一種產美洲（形態）。產印度者樹高如胡桃樹。數枝歧分。葉對生。如十字。色綠如梨葉。長四指橫徑許。廣三指橫徑許。老樹則葉色帶黃。花單瓣。鐘狀。四出。色深紫。雄蕊八。雌蕊一。實如櫻子。又似杏子。初綠色。熟則青黑。味淡。產美洲者樹高一丈五尺許。亦分枝。葉橢圓。末微尖。色暗綠。有光澤。長三指橫徑。花生葉底。攢簇如車輪。芳香可愛。花瓣六。雄蕊五（一說雄蕊六）。雌蕊一。萼六。出子圓。微有稜。色紫。有二室。仁圓如卵。樹幹之中心爲黃檀。外層爲白檀。黃檀質重實。有光澤。色淡黃。或帶微赤。脈理味微苦。有佳香。摩

擦或截斷之。氣尤馥郁。若合薝蔔、麝香、肉桂諸香於一處者。或云根亦香者。方爲上品。或云黃色如雞子黃。帶微赤之脈理。香氣烈者。乃稱上品。白檀白色。質亦重實。微有香氣。或無香氣。生樹及新伐者。皆無香氣。乾則生香。地木兒島所產之嫩木。色白。無香氣。經年中心變黃。或云島北多產黃檀。運銷中國及印度。或云爪哇島所產皆白檀。下品爲多（效能）。白檀黃檀俱用。黃檀尤效。欲稀釋血液。或令其發汗。宜製爲泡劑用。以之解散胃寒及傷冷毒。微毒。宜製爲煎劑用。兼治諸症。發汗。利小便。治頭眩。眩冒。心動悸。使頭腦健運。精神活潑。白檀有稀釋稠血之效。善治脾病及心氣病。煎劑用錢半至二錢。散劑爲末。用一錢已足。此藥因有佳香。故多用爲香料。以水與黃檀蒸餾。而取其油。冷則稠厚。香氣似龍涎香。以燒酒蒸餾。則得有佳香之華爾斯。均以製香料用。

參攷資料 ①白檀調氣引芳香之物。上至極高之分。最宜檀橘之屬。佐以薝蔔。輔以葛根。精砂。益智。豆蔻。通行陽明之經。在胸膈之上處。咽嗝之間。爲理氣要藥。（李杲）②楞嚴經云。白旃檀。揀身。能除一切熱惱。今西南諸番皆用。諸香塗身。取此義也。杜寶大業錄云。隋有壽禪師。妙醫術。作五香飲。濟人。沉香。飲檀香。飲丁香。飲澤蘭。飲甘松。飲。皆以香爲主。更加別藥。有味而止渴。兼補益人。也。道書檀香。謂之浴香。不可燒供上真。（李時珍）③檀善木也。故字從堦。堦善也。釋氏呼爲旃檀。以爲湯沐。猶言離垢也。番人詛爲真檀。雲南人呼紫檀。爲勝。沉香即赤檀也。（李時珍）④白檀出海南。其樹如檀。（陳藏器）⑤紫真檀。出昆侖盤。國雖不生。中華人間遍有之。（蘇恭）⑥檀香有數種。黃白紫之異。今人盛用之。江淮河朔所生檀木。即其類。但不香爾。（蘇頌）⑦按大明一統志云。檀香出廣東。雲南及古城。真臘。爪哇。渤泥。暹羅。三佛齊。回回等國。今嶺南諸地亦皆有之。

【嬌醋草】條。

【嬌孩草】即香草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳【香草】條。

【嬌醋草】
古籍別名 香草。
綱目拾遺 嬌孩兒。

(俗名)

形態 嬌醋草爲芳草類之一種。葉尖大如指甲。有枝梗。夏月開細花成簇。結子亦細。植於盆內。暑月採置髮際。芳香可辟風塵。亦供藥用。

性質 辛溫。無毒。

主治 辟惡行氣。和中活血。止霍亂吐瀉。去臭氣。發瘧者寒鼻。能令寒漸輕。

【嬰古】即嬰奧之古籍別名。典見廣雅。詳【嬰奧】條。

【應條】即蟬蟪之古籍別名。典見吳普本草。詳【蟬蟪】條。

【戀角】即羚羊角之古籍別名。典見和漢藥考。詳【羚羊角】條。

【鰕】即山韭之古籍別名。典見綱目。詳【山韭】條。

【擊正】即鵠之古籍別名。典見綱目。詳【鵠】條。

【擊李子】即李子熟而自裂者之

別名。典見綱目。詳【李子】條。

【擊藍】即甘藍之古籍別名。典見農政。詳【甘藍】條。

【檀】即櫟之日本名。詳【櫟子】條。

【檀】

命名 本品善木也。故字從檀。而名之曰檀。

形態 檀爲喬木類之一種。有黃白兩色。皮青而澤。肌細而膩。質重而堅。狀與梓榆相似。惟無香氣。木材常爲杵槓槌器之用。其木皮可供藥用。

性質 辛平。有小毒。

主治 和榆皮爲粉食。可斷穀救荒。

【檀香】原名 旃檀。
命名 檀香木也。故字從檀。檀者善也。而氣芬芳馥郁。故名。

處方用名 檀香片。

古籍別名 浴香。旃檀。(綱目)

真檀。攪檀。白銀香。黃英香。旃檀。娜(和漢藥考)

外國名詞 Santalum album, I. (拉丁) Lignum Santali album (英)

基本 屬檀香科。爲檀之木質。

產地 陳仁山藥物生產辨云。

檀香產美國屬地們爲正。英國雪梨等卑次之。和漢藥考曰。無日本產。多係產生東印度及馬來半島。

形態 白檀樹爲常綠喬木。之寄生性植物。樹幹高二丈至三丈。

葉作長卵圓形。末端尖銳。基部亦作銳形。具短葉柄。皆對生。花爲裸花。有四裂或五裂之萼。果實爲核果。檀香爲四五寸粗之幹木。色黃褐或淡黃。質緻密。有一種芳香。販賣品中有橫斷薄片如煎餅狀者。最良品木質堅硬。色帶黃。燒之發一種異香。甚爽適。

一種異香。甚爽適。



檀香

製法 宜以紙封收。不令洩氣。

性質 辛溫。無毒。

成分 爲揮發油及樹脂等。

效能 理氣。止痛。溫中。和胃。用作香。宣衝動藥。

主治 消風熱。腫毒。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器

本草拾遺論檀香曰。治中惡鬼氣。殺蟲。宋大明日華諸家本草論檀香曰。煎服止心腹痛。霍亂腎氣痛。水磨塗外腎。并腰腎痛處。金張元素珍珠囊論檀香曰。散冷氣。引胃氣上升。進飲食。明李時珍

本草綱目論檀香曰。噎膈吐食。又面生黑子。每夜以漿水洗拭。令赤。臍汗塗之甚良。明繆希雍本草經疏論檀香曰。本經無正文。弘景云。白檀消熱。驅藏器主心腹霍亂中惡鬼氣。殺蟲。日華子云。檀香熱無毒。治心痛。霍亂。腎氣腹痛。濃煎服。水磨傳外腎。并腰腎痛處。詳其所主諸證。亦是芬芳開散。辟惡散結。除冷之藥也。今人多供燃熱。非上乘沈水者不入藥。清黃宮繡

本草求真論檀香曰。白檀香氣味辛溫。薰之清爽。可愛。凡因冷氣上結。飲食不進。氣逆上吐。抑鬱不舒。服之能引胃氣上升。且能散風辟邪。消痛住腫。功專入脾與肺。不似沉香力專主降。而能引氣下行也。但此動火耗氣。陰虛火盛者切忌。取白潔色白者佳。紫色爲紫檀。氣

十六畫 龜

十七畫 優 壓 嫺

（酒炙）熟地黃各六兩。黃柏、知母各四兩。右爲末。以猪脊髓搗和爲丸。梧子大。每服百丸。空心溫酒或鹽湯下。⑤龜鹿二仙膠。大補精血。益氣養神。鹿角（血者）十斤。龜版（自敗者）五斤。甘杞子三十兩。人參十五兩。右用鉛罐如法熬膠。初服酒化一錢五分。漸加至三錢。空心下。

參攷資料 ①龜版膠用自敗龜版洗淨搗碎。浸三日。以桑柴火熬煎二晝夜。其膏始成。（今人熬膏止在釜中煎一晝夜。如何能成膠）夫龜之爲物。至靈多壽。靈可供卜。壽至千年。其甲名敗龜版。以此入藥。大有補陰之功。常居水中。稟北方之氣。以生。故能補陰。治陰治勞。也。凡有陰虛血弱。寒熱傷勞。癥瘕痞癥。五痔溼痺。以及婦兒一切虛勞風瘡。服之最宜。②秦龜卽生於秦者。秦地山中多老龜。極大而壽。龜甲卽非止秦地。有四方皆有之。但取秦地所出大者爲勝。今河北獨流釣臺甚多。取龜筒治療亦入衆藥。止此二種。各逐本條。以其燻於物。方家故用以補心。然甚

有驗。（寇宗奭）③格物考云。天有先春之覺。山多自死之龜。龜聞雷音。則口中所含以養者。便吐而昂首。因時令尙早。無蟲可食。多致餓死。血肉腐爛。滲入下甲。此眞敗龜版也。故取水龜當用下甲。（李士材）④龜鼈二甲。本經所主大略相似。今人有喜用鼈甲。惡用龜甲者。有喜用龜甲。惡用鼈甲者。皆一偏之見也。二者咸至陰之物。鼈甲走肝。益腎。以除熱。龜甲通心。入腎以滋陰。第鼈甲無毒。可多用。龜甲非千年自死者。則有毒。故方書所用曰敗龜版者。取其長年則得陰氣多。故有益陰之功用耳。若今新剖之甲。斷平有毒。不宜頻使用者。不可不詳辨也。（繆希雍）⑤龜版爲治痛風要藥。丹溪於陰火痛風。必用之。蓋因其多屬血虛。實取其能益陰氣。按丹溪更取龜版以治癢。觀於虎潛丸而益見。意龜版善滋肝腎之陰。故於筋骨之病。無不宜之。歟。龜膠以龜版煎就。本草載版不如膠之說。以版炙酥。煨用。氣味尙淡。而膠之味較濃。故用版不如用膠耳。合鹿膠。名龜鹿二仙膏。

爲一陰一陽。鹿膠峻補腎陰中之陽。龜膠峻補腎陰中之陰也。（劉潛江）⑥龜鹿皆靈而有壽。龜首常藏向腹。能通任脈。故取其甲以補心。補腎。補血。皆以養陰也。鹿鼻常反向尾。能通督脈。故取其角以補命。補精。補氣。皆以養陽也。乃物理之玄微。神工之能事。觀龜甲所主諸病。皆屬陰虛血弱。自可心解矣。（李時珍）

【龜背玄精石】卽玄精石之處方用名。詳『玄精石』條。

【龜溺】採取 取龜置瓦盆中。淫發失尿。急以物收取之。又法以紙炷火。以點其尻。亦致失尿。但差緩耳。李時珍曰。今人惟以豬鬃或松葉刺其鼻。卽尿出。似更簡捷也。

主治 滴耳。治聾。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論龜溺曰。點舌下。治大人中風。舌瘳。小兒驚風。不語。摩胸背。治龜胸龜背。

參攷資料 龜尿走竅透骨。故能治瘡癰及龜背。染髮髮也。按呻吟語神書言。龜尿磨瓷器。能令輾磨。

一七六八

墨書石。能入數分。卽此可推知矣。（李時珍）

【龜筒】卽蠟龜皮之原名。詳『蠟龜皮』條。

【龜脚】卽石蚰之古籍別名。典見綱目。詳『石蚰』條。

【龜脚蛭】卽石蚰之俗名。詳『石蚰』條。

【龜尊】卽尊之古籍別名。典見綱目。詳『尊』條。

【龜膽汁】性質 苦。寒。無毒。主治 痘後目腫。經月不開。取點之良。

十七畫

【優曇華】卽芭蕉之古籍別名。典見梵語譯『芭蕉』條。

【優曇鉢】卽無花果之古籍別名。典見廣州志。詳『無花果』條。

【壓驚】卽貝子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『貝子』條。

【壓驚螺】卽貝子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『貝子』條。

【綱汁】卽人乳之古籍別名。典見綱目。詳『人乳』條。

【嫺孩兒】卽嫺醋草之俗名。詳『

少陰經。方家多入補心藥用。以心藏神而龜性有神。借其氣以相通。且得水火既濟之義。實非補心之正藥也。其主骨中寒熱及傷寒勞復。肌體寒熱欲死。痰癰者。皆陰虛而邪熱為病。經曰。傷於濕者。下先受之。溼痺四肢重弱。亦腎陰虛而邪氣易犯。腎主骨。腎虛則小兒顫門不合。腎為五臟。陰中之陰。陰虛則火熱偏至而為驚悸氣心腹痛。此藥補腎家之真陰。則火氣自降而寒熱邪氣俱除矣。益陰除熱。輒堅。故主漏下赤白。瘰癧五痔。陰蝕陰瘡。及小兒頭瘡也。經曰。邪熱不殺穀。熱去故人能食。能食則脾胃得所養而能思。思作睿。故資智之功也。【明】李士材本草圖解論龜版曰。龜甲鹹平。腎經藥也。稟北方純陰之氣而生。大有補水制火之功。故能強筋骨。益心智。止咳嗽。截久瘡。去瘀血。止新血。大凡滋陰降火之藥。多是寒涼損胃。惟龜甲益大腸止泄瀉。使人進食。真神良之品也。龜鹿皆靈而壽。龜首藏向腹。能通任脈。故取其甲以養陰。鹿

鼻反向尾。能通督脈。故取其角以養陽。去脇用底去黑皮。酥炙。【清】黃宮繡本草求真論龜版曰。龜版甘鹹微寒。稟北方之氣而生。乃陰中至陰之物。入足少陰腎經。兼龜性有神。故能入心以通腎。凡心虛血弱而見勞熱骨蒸。腰脚酸疼。老瘧瘵。癰癩漏瀉。五瀉難產。小兒顫門不合等症。服此皆能見效。李時珍云。龜鹿靈而壽。龜首常藏向腹。能通任脈。故取其腹以通心。補腎補血。皆養陰也。鹿鼻常反向尾。能通督脈。故取其角以補命。補精補氣。皆養陽也。龜性治與鱉甲相類。但鱉甲色青。應木。走肝。益腎以除熱。龜甲色黑。應水。通心入腎以滋陰。然皆至陰大寒。多用必傷脾土。龜大自死者良。酥炙。煨灰用。惡人參。龜尿走竅透骨。染髮髮。治啞聲。服板不宜中溼。中溼則板末變為瘰癧。

近人學說 賈九如曰。龜甲。龜之性善靜。常居土中。近水澤。遇陰雨則出行。其頭常縮。眼耳口鼻皆伏於地。得地之陰氣最厚。其底甲純陰。氣味厚濁。為濁中濁品。專入

腎臟。主治咽痛口燥。乾喘咳嗽。或勞熱骨蒸。四肢發熱。產婦陰脫發燥。病後腎水虛致相火無依。此非氣柔貞靜者。不能息其炎上之火。古云至靜而能制。輦動誠為妙理。又取其汁潤滋陰。味鹹養脈。主治朝涼夜熱。盜汗遺精。神疲力怯。腰痛腿酸。癱瘓拘攣。手足虛弱。久瘧血枯。小兒顫顛不合。病由真臟衰。致元陰不生。非此味濁純陰者。不能補其不足之陰。古云養養腎精。職此義耳。

配合應用 ①治瘡疾不止。龜版燒存性。研末。酒服方寸匕。【海上名方】

②治邪結不散。用龜下甲酒炙五兩。側柏葉炒一兩半。香附童便浸炒一兩。為末。米糊丸。梧子大。每空心溫酒服一百丸。
③治胎產下痢。用龜甲一枚。醋炙。為末。水飲服一錢。日一。【經驗方】

④治難產催生。祕錄用龜甲燒末。酒服方寸匕。摘玄治產三五日不下。垂死及矮小女子交骨不開者。用乾龜殼一個。酥炙。婦人頭髮

一握。燒灰。川芎。當歸各一兩。每服秤七錢。水煎服。如人行五里許。再一服。生胞死胎俱下。
⑤治腫毒初起。敗龜甲一枚。燒研。酒服四錢。亦治婦人乳毒。【小品方】

⑥治小兒頭瘡。用龜甲燒灰敷之。亦治月蝕耳瘡。又治口吻生瘡。【聖惠方】

⑦治瘰癧瘡朽臭。生龜一枚。取殼醋炙。黃更煨存性。出火氣。入輕粉麝香。葱湯洗淨。搽敷之。【急救方】

⑧治人咬傷瘡。龜版骨。龜肚骨各一片。燒研。油調搽之。【葉氏摘玄方】

⑨治蝕咬成瘡。龜版燒研。香油調搽之。【葉氏摘玄方】

用量 三錢至八錢。
施用宜忌 陰虛而無熱者。禁用。惡沙參。蜚蠊。畏狗。貼。瘦。銀。凡入丸散藥中。須研極細。否則留滯腸胃。能生瘰癧。並須勿令中溼。中溼即有毒。

著名方劑 ①大補陰丸。治陰虛火旺。骨蒸勞熱。耳聾耳鳴。脈洪大。不能峻補者。【丹溪方】。敗龜版

十六畫 龜

【龜甲】即龜版之原名。詳「龜版」條。

【龜肉】性質 甘酸。溫無毒。主治 煮食。除溼痺。風痺。身腫。膝折。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論龜肉曰。治筋骨疼痛及一二十年寒嗽。止瀉血。血痢。參攷資料 龜肉作羹。麗大補而多神靈。不可輕殺。書家所載甚多。此不具說。（陶弘景）六甲日十二月俱不可食。損人神。不可合豬肉。菰米。瓜。克。害人。（孫思邈）按周處風土記云。江南五月五日。煮肥龜入鹽鼓蒜麥食之名曰菹龜。取陰內陽外之義也。（李時珍）

【龜肉酒】基本 本品係用水。龜肉和麴釀成之酒。

主治 多年咳嗽。大風緩急。四肢拘攣。或久癱緩不收。皆痊。性質 鹹寒。無毒。【龜血】主治 塗脫肛。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論龜血曰。治打撲傷損和酒飲之。仍搗生龜肉塗之。

【龜兒草】即天穗草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「天穗草」條。

【龜版】原名 龜甲。命名 說文龜頭與蛇同。故從它。下象其甲足尾之形。故曰龜。它古蛇字。藥用其甲。故俗名之曰龜版。

處方用名 元武版。敗龜版。炙坎版。生龜版。古釋別名 玄衣督。神屋。（本經）敗將。（日華）漏天機。（圖經）下甲。（和漢藥考）水馬兒（綱目）外國名詞 Tortoise shell（英）基本 龜屬於爬蟲類之龜族。板者其甲殼也。產地 陳仁山藥物生產辨云。湖北安徽沿揚子江下游一帶均有出。江蘇鎮江府亦有出。三月新。又有一種產自暹羅名為洋版。形態 龜棲息於川澤池沼。以蠕蟲及小魚類為其食餌。亦有椎動物之一也。（龜為兩棲動物。血溫頗低。較氣中溫度僅高約一二度）體軀扁平。略帶橢圓形。背腹

兩面俱有堅甲。連結若匣。內具骨骼。其背腹兩甲。係變性之皮膚所成。頭部形如圓錐。口無齒。而有如鳥之角嘴。四趾皆短。趾端有爪。便掘土之用。背甲有六角紋十三分三行並列。周圍有六角紋二十五繞。其邊緣腹甲有縱橫溝。作暗黑色。一旦遇敵。則其頭尾四肢俱縮入甲中。故有六藏之名。性質最鈍。運動亦甚遲緩。然生活頗強。雖數月斷食亦可不死。且得保五百歲之長壽。（龜之長壽與鶴相並。人皆重之。中國自古以龜占吉凶。謂之龜卜。）春日掘穴地中。產卵其間。覆以落葉。更覆以砂。受太陽之熱。自然孵化。至冬則蟄伏不出。

採取 靈山諸谷。因風墜自敗者最佳。田池自敗者次之。打壞者又次之。近時恒在秋冬間採殺取之。製法 以龜甲鋸去四邊。石上磨淨。更以灰火炮過。塗酥炙黃。用亦有酒炙。醋炙。豬脂炙。燒灰用者。性質 甘平。有毒。效能 養陰液。潛風陽。用作強壯藥。

壯藥。

主治 甲治漏下赤白。破癥瘕。瘕瘕。五痔。陰蝕溼痺。四肢重弱。小兒體不合。久服輕身不飢。（本經）驚患氣心腹痛。不可久立。骨中寒熱。傷寒勞復。或肌體寒熱欲死。以作湯良。久服益氣資智。使人能食。燒灰治小兒頭瘡難燥。女子陰瘡（別錄）

歷代記述攷證 【南北朝】陶弘景本草集註論龜版曰。殼主久嗽。斷癰。唐甄權藥性本草論龜版曰。燒灰治脫肛。宋日華諸家本草論龜版曰。版治血麻痺。元朱丹溪本草衍義補遺論龜版曰。下甲補陰。主陰血不足。去瘀血。止血痢。續筋骨。治勞倦。及四肢無力。【明】李時珍本草綱目論龜版曰。治腰脚酸痛。補心腎。益大腸。止久痢。久洩。主難產。消癰腫。燒灰傳臟瘡。【明】繆希雍本草經疏論龜版曰。介蟲三百六十。而龜為之長。稟金水之氣。故味鹹而甘。氣平。其性神靈能變化。凡入藥勿令中溼。中溼則遂其變化之性。而成癥瘕於腹中。故言有毒也。氣味俱陰。入足

瀉則其性能守而行之於內故獨以治骨熱者餘則清泄肝膽有餘之火疏通下焦溼熱之結足以盡其能事而微瘡之毒疔瘰之瘍皆屬相火猖狂非此等大苦大寒不足以瀉其烈燄是又疏泄下焦之餘義矣

配合應用 ①草龍膽同白芍藥甘草茯苓麥門冬木通主小兒驚癇入心壯熱骨熱時疾熱黃口瘡

②同苦參牛膽治穀疸

③同苦參蛆蟲灰青黛治小兒一切疳熱狂語及瘡疥

④治蛇蟲攻心如刺吐清水龍膽二兩去頭對水二盞煎取一盞去滓隔宿勿進食平日時一頓服之即差

⑤同生地黃等分治溼熱傷血分侵大腸以致卒下血多服必效

用量 八分至錢半

施用宜忌 凡脾胃虛弱作瀉與無溼熱實火者禁用及空心餌之令人溺不禁惡地黃小豆貫衆爲之使

著名方劑 龍膽瀉肝湯治脇

痛口苦耳聾耳腫筋癢陰溼熱痒陰腫白濁溼血(局方)龍膽三分(酒炒)黃芩(炒)梔子(酒炒)澤瀉各一錢木通車前子各五分當歸二分柴胡一錢甘草生地各三分(酒炒)右十味水煎服

參攷資料 ①龍膽味苦性寒氣味俱厚沉而降陰也足厥陰少陽經氣分藥也其用有四除下部風溼一也及溼熱二也躋下至足腫痛三也寒熱脚氣四也下行之功與防己同酒浸則能上行外行以柴胡爲主龍膽爲使治眼中疾必用之藥(張元素)②相火寄在肝膽有瀉無補故龍膽之益肝膽之氣正以其能瀉肝膽之邪熱也但大苦大寒過服恐傷胃中生發之氣反助火邪亦久服黃連反從火化之義別錄久服輕身之說恐不足信(李時珍)③胃氣虛者服之必嘔脾氣虛者服之必瀉(張石頑)

【龍膽草】即龍膽之處方用名詳

【龍膽】條

【龍鯉甲】即穿山甲之古籍別名典見郭璞賦詳「穿山甲」條

【龍鬚】①即石龍芻之古籍別名典見本經詳「石龍芻」條②即天生牙之別名典見綱目詳「天生牙」條③即銀箔之古籍別名典見和漢藥考詳「銀箔」條

古籍別名 又雞草

【龍鬚草】綠袍草鐵線草鐵線筒人字草棒槌草丁雞草鹿跑草(綱目拾遺)草龍芻(述異記)

產地 多生山澤間

形態 龍鬚草爲澤草類之一種穀雨後發苗似扁蓄而小又似野席草相類橫生布地小滿時抽莖開花色青細可供藥用

性質 溫無毒

主治 散風火理溼熱療一切瘡疥口咽諸毒火瘡牙痛

【龍鬚草】①即野席草之古籍別名典見綱目拾遺詳「野席草」條

②即石龍芻之處方用名詳「石龍芻」條

產地 生海邊石間

【龍鬚菜】形態 龍鬚菜爲菜類之一種叢生無枝葉狀如柳根鬚細如絲長者尺餘如髮菜而色白可供藥用

性質 甘寒無毒

主治 癰結熱氣利小便

【龍鬚菜】①即鹿角菜之古籍別名典見盛京誌詳「鹿角菜」條②即魚腥草之古籍別名典見和漢藥考詳「魚腥草」條

產地 出廣東東莞縣境

形態 龍鬚藤爲蔓草類之一種其藤微細如髮直起數丈而無一節飛越數樹如千百游絲牽縈或紅或紫或具有五色生無根掛樹長發蒂其花與子可供藥用

主治 補筋骨祛風解毒能循經絡無微不至酒服

參攷資料 龍鬚藤之液汁和細土石灰塗置瘡釜其堅如鐵雖猛火不裂(趙學敏)

【龍鬚香】即沈香之埋土中日久不待削而成薄片者功用詳「沈香」條

【龍鬚草】即景天之古籍別名典見和漢藥考詳「景天」條

【龍鬚荔莖】即常春藤之古籍別名典見日華諸家本草詳「常春藤」條

十六畫 龍

之中下二焦者。非此不去。熱去則諸證自解。五臟有熱則不安。熱除則五臟自定。苦澀而寒。故殺蠱毒。大苦大寒。故能滌除胃中所伏實熱。及時氣溫熱熱洩。下痢。去腸中小蟲。熱清則肝膽之氣亦清。故益肝膽氣而止驚悸也。久服益智不忘。輕身耐老。則非其任矣。【明】李士材本草闡解論龍膽曰。龍膽苦澀大寒。肝膽經藥也。主肝經邪熱。下焦溼熱。目病赤腫。瘰癧肉。小兒客忤疳氣。去腸中小蟲。【清】黃宮繡本草求真論龍膽曰。龍膽草大苦大寒。性真純陰。大瀉肝膽火邪。兼入膀胱腎經。除下焦溼熱。與防己功用相同。故書載治骨間寒熱。驚癇蠱脹。天行瘟疫。熱利黃疸。寒溼脚氣。咽喉風痺。並酒炒同柴胡則治赤睛肉。但此苦寒至極。馮兆張云。其等於嚴冬。黠淡慘重。萬草凋殘。苦寒伐標。宜實而不宜久。如聖世不廢刑罰。所以佐德意之無窮。苟非氣壯實熱者。率爾輕投。其敗也必矣。

國外學說 和漢藥考曰。龍膽根莖長約十仙米。粗約五密米。作

暗灰褐色。有不整輪節。上面帶莖痕。間附有殘莖。兩側及下面簇生多數副根。橫斷面作暗褐色。其木心中有錯亂脈管束。副根則帶黃褐色。有縱紋。橫斷面呈褐色。木部有暗色。其邊緣有作放射狀排列之脈管。本品不含澱粉。味甚苦。又依日本藥局方云。龍膽（即健實亞那根）者。爲苦味健胃劑。於癡的性消化不良。無胃加答兒症狀之消化不良。酒客之消化不良等。均用之一日數回。自〇・三至一〇。爲浸劑。剉散劑。製劑如左。一健實亞那越幾斯〇・五至二〇。丸劑溶劑。二健實亞那丁幾一〇・〇至二〇。水劑。三苦味丁幾一〇・〇至二〇。水劑。英美學說謂龍膽草產中國之齊胸山谷。及歐羅巴之南方等處。該草高約三尺。其根可入藥。內含一精。即珍提昆。盡近藥肆中所出售者多爲次等。惟切成大片者爲上品。有數種常出售之龍膽草。根如紫色。龍膽草。有點龍膽草。藍縷形龍膽草等。而植物學家或以爲紫色龍膽草根。即藥肆中常出售之紅色龍

膽草根也。英國出售之龍膽草根。多從日耳曼與瑞士運至。而瑞士人喜用此爲補胃藥。其作用爲苦性補藥。如胃不消化。並病方退而欲補其精神。惟此爲有名之藥。間有人用以治依時而作之病。並用爲驅蟲藥。與他種苦性藥相同。用水泡酒泡均可。處方以龍膽草一分。切片沸汽水十分。泡兩點鐘。再加火熬一刻鐘。去渣。用絞盤絞之。入燒鍋散氣成膏爲度。常用以配藥丸。每服四釐至二分。（龍膽草膏方）又方龍膽草膏大黃末。番離各等分。即以龍膽草膏加水。和勻爲丸。每服丸一二粒。如身弱胃不消化服之甚效。（龍膽草丸方）又方龍膽草二錢。柑皮五分末。大茴香五分末。火酒二兩。清水六兩五錢。先以火酒浸龍膽草。柑皮。大茴香。待兩點鐘後。然後將水加入。漱淨。每服四錢至八錢。能開胃補身。如虛弱神氣不足。胃不消化。及病後熱度太低服之均妥。（龍膽草柑皮茴香方）

近人學說 賈九如曰。龍膽草秋開花。得金令司。權金能制木。

且味苦如膽。故專瀉肝膽之火。主治目痛。頸癰。兩脇疼痛。驚癇邪氣。小兒疳積。凡屬肝經熱邪爲患。用之神妙。其氣味厚重而沉下。善清下焦溼熱。若癰癰便毒下疳。及小便澀滯。男子陽挺腫脹。或光亮出膿。或莖中痒痛。女人陰癰痒痛。或發痒生瘡。以此入龍膽瀉肝湯治之。皆苦寒勝熱之力也。亦能除胃熱。止蛔蟲。蓋蛔得苦即安耳。但脾胃虛者少用。①張山雷曰。龍膽草亦大苦大寒之品。純以清熱見長。主骨間熱者。大寒能清骨熱也。主驚癇。止驚悸。皆清熱寧心之效。邪氣者。即邪熱之氣也。續絕傷。定五臟。則因其却熱除邪。而虛言之耳。蟲毒。是南方溼毒之厲氣。腸中之蟲。皆溼熱蘊生所生也。大苦大寒。燥溼勝熱。自能辟蟲殺蟲。別錄主胃中伏熱。時氣溫熱。苦寒之用。主熱泄下利。亦苦燥溼。寒勝熱。與芩連之治溼熱泄瀉。而并治積滯熱痢同義。益肝膽氣者。清其邪熱。即所以益其正氣。非謂苦寒之品。能補肝膽也。又曰。龍膽草大苦大寒。亦與連芩同功。但本經稱其味

詳「婆律香膏」條。

【龍蝨】形蟲。龍蝨爲卵生蟲。類甲蟲屬之一種。其體扁平如卵形。似小蟬螂及金龜子。長六七分。前翅小而色黑。後翅甚扁。雄者膨大而圓。性善游泳。常居水中。覓食小魚。夜出飛翔。亦能蠕人。可供藥用。

主治 除面上黴點赤氣。美顏色。

【龍齒】性質 溫。涼。無毒。主治 殺精物。大人驚癇。諸瘧疾狂走。心下結氣。不能喘息。小兒五驚十二癇。本經。小兒身熱不可近。大人骨間寒熱。殺蟲毒。別錄。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論龍齒曰。鎮心安魂魄。【宋】日華諸家本草論龍齒曰。治煩悶熱狂鬼魅。

施用宜忌 畏石膏。鐵器。得人參。牛黃。良。

參攷資料 龍者。東方之神。故其骨與角。齒皆主肝病。許叔微云。肝藏魂。能變化。故魂遊不定者。治之以龍齒。卽此義也。李時珍。

【龍癪癪】卽香牙蕉之汁也。功用詳「香牙蕉」條。

【龍膽】命名 本品葉如龍葵。味苦如膽。故名。

處方用名 龍膽草。

古醫別名 陵游。本經。苦膽草。觀音草。斜枝大夫。斜枝大士。和漢藥考。鉅龍膽。日本。草龍膽。山龍膽。俗名。

外國名詞 Radix Gentiane Scabra, (拉丁) Japanese, gentian-root (英) Japanisch Gentianwurzel (德)

學名 Gentiana Scabra, Bge var. Buengeri, Maxim.

基本 屬龍膽科。爲龍膽草之根。

產地 陳仁山藥物生產辨云。龍膽西藥名眞仙。產安徽省。由漢口運來。一產江蘇鎮江府。由上海運來。一產吉林。奉天。洮南。由山東煙臺。牛莊幫運來。各處出產。味不相上下。春秋兩次出新。

形態 龍膽爲山野自生之宿根草。莖直立。高達一二尺。葉似竹葉。作廣披針形。或長卵圓形。對生。

而無葉柄。十月間於莖之頂部及上部葉腋。開藍青色合瓣花三五朵。晝展而夜合。其根形如牛膝。



(一) 龍膽



(二) 龍膽

採製 每年八月、十一月、十二月。採根陰乾。

製法 雷斂曰。凡使龍膽。採得陰乾。用時銅刀切去鬚上頭子。剉細甘草湯浸一宿。漉出曝乾。用龍膽苦寒。空腹餌之。令人瀉不禁。

性質 苦。澀。大寒。無毒。

成分 爲苦味越幾斯質。黃色素。脂肪油等。

效能 瀉肝火。清溼熱。用條瀉火燥溼之健胃藥。又治慢性胃黏膜炎。

作用 助胃液分泌之不足。以促進消化之功能。并能激腸壁神經。使腸之微血管收縮。且含有糖質。能助長酵素之作用。

主治 骨間寒熱。驚癇邪氣。續絕傷。定五臟。殺蟲毒。本經。除胃中伏熱。時氣溫熱。熱泄下痢。去腸中小蟲。益肝膽氣。止驚傷。久服益智。不忘。輕身耐老。別錄。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論龍膽曰。治小兒壯熱。骨熱。驚癇入心。時疾熱黃。癰腫口乾。

【宋】大明日華諸家本草論龍膽曰。客忤疳氣。熱狂。明目。止煩治瘡疥。【金】張元素珍珠囊論龍膽曰。去目中黃及睛赤。腫脹。瘰癧肉高起。痛不可忍。元李東垣用藥法象論龍膽曰。退肝經邪熱。除下焦溼熱之腫。瀉膀胱火。明李時珍本草綱目論龍膽曰。療咽喉痛。風熱。

盜汗。明經希聖本經疏論龍膽曰。草龍膽其味大苦。澀。其性大寒。而無毒。足厥陰虛少陰足陽明三經藥。入足少陰。除本經之熱。腎主骨。故主骨間寒熱。熱極生風。則發驚搖。重則變爲癇病。溼熱邪氣。

發驚搖。重則變爲癇病。溼熱邪氣。

發驚搖。重則變爲癇病。溼熱邪氣。

發驚搖。重則變爲癇病。溼熱邪氣。

發驚搖。重則變爲癇病。溼熱邪氣。

發驚搖。重則變爲癇病。溼熱邪氣。

發驚搖。重則變爲癇病。溼熱邪氣。

發驚搖。重則變爲癇病。溼熱邪氣。

發驚搖。重則變爲癇病。溼熱邪氣。

典見新中藥。詳「龍涎香」條。

【龍葛】即烏鐵華之古籍別名。典見爾雅。詳「烏鐵華」條。

【龍葵】 古籍別名 苦菜。(唐本草) 苦葵。天茄子。老

鷄眼睛草。(圖經) 水茄。天泡草。老鷄酸漿草。(綱目) 犬酸漿。牛酸漿。

(日本)

外國名詞 Solanum nig-

um, L. (拉丁) イヌホホツキ

ヤマホホツキ ウシホホツキ

(日本)

基本 係茄科茄屬。爲龍葵之

苗。

產地 原野溼地恒多有出。



龍葵

形態 龍葵爲澤草類之一年

生草本。春月萌生。高約二三尺。葉

卵形。全邊或呈波狀。夏日梢葉之

中間。抽出花莖。花小白色。花冠五

裂。雄蕊之藥。近集於雌蕊花柱之

周圍。作繖形花序。果實小爲漿果

球形。生青熟黑色。大與豌豆之種子略等。此與龍珠相異者。以龍珠常以兩花集生於葉腋。果實紅熟爲不同耳。其子根莖葉俱可供藥用。

性質 苦。微甘。滑寒。無毒。

主治 食之解勞少睡。去虛熱

腫。

歷代記述攷證 【宋】蘇頌嘉

祐圖經本草論龍葵曰。治風補益

男子元氣。婦人敗血。【明】李時珍

本草綱目論龍葵曰。消熱散血。壓

丹石毒。宜食之。

近人學說 張山雷曰。此草性

質。亦寒涼滑利。故亦名葵。莖柔而

嫩。似蔓非蔓。延引甚長。故以龍爲

名。言其蜿蜒不已也。吾吳土俗。亦

呼爲老鷄眼睛。藤結子渾圓。一簇

數顆。生青熟黃。故有老鷄眼睛之

名。亦有生青熟紅者。其莖葉花萼

皆同。蘇頌圖經謂之赤珠。陳藏器

本草拾遺謂之龍珠。實卽一類二

種。唐本草謂龍葵去熱退腫。蘇頌

謂治婦人敗血。瀕湖謂消熱散血

壓丹石毒。療癰疽腫毒。跌仆傷損

孟詵謂搗敷疔腫火丹。蓋可服可

敷。以清熱通利爲用。故并治跌仆血瘀。尤爲外科退熱消腫之良品也。

參攷資料 龍葵言其性滑

如葵也。苦以菜味名。茄以莢形名。

天泡。老鷄眼睛。皆以子形名也。與

酸漿相類。故加老鷄以別之。五爪

龍亦名老鷄眼睛草。敗醬苦苣並

名苦菜。名同物異也。(李時珍) 龍

葵龍珠。一類二種也。皆處處有

之。四月生苗。嫩時可食。柔滑漸高

二三尺。莖大如筋。似燈籠草而無

毛。葉似茄葉而小。五月以後開小

白花。五出黃蕊。結子正圓。大如五

味子。上有小蒂。數顆同綴。其味酸

中有細子。亦如茄子之子。但生青

熟黑者爲龍葵。生青熟赤者爲龍

珠。功用亦相彷彿。不甚遠。

【龍葵子】 採取 七月採之。

主治 疔腫。

歷代記述攷證 【唐】甄權

藥性本草論龍葵子曰。明目。輕身

【宋】蘇頌圖經本草論龍葵子曰

治風。益男子元氣。婦人敗血。

主治 通利小便。同

木通胡荽煎湯服。

【龍葵莖葉】 性質 苦。微甘。滑寒。無毒。

主治 燒爛和土傅疔腫火丹

瘡良。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論龍葵莖葉曰。療癰疽

腫毒。跌撲傷損。消腫散血。

古籍別名 勝志。(

【龍窩石】 綱目拾遺)

產地 廬山溪中。

性質 大寒。無毒。

主治 磨面能滅癰疽。解熱瘡

毒。蝦粉撲。暑癰立消。

參攷資料 深山有龍窩處皆

有之。土人俟龍升去乃跡而獲之。

有五色以透明者。煨用。生用有毒。

敲碎投醋中。切片能動而相合者

良。(王伯厚)

【龍銜】 卽黃精之古籍別名。典

見廣雅。詳「黃精」條。 卽女青人

者之別名。典見綱目。詳「女青」條。

【龍鳳團】 卽茶之產於福建舊建

寧府境者。功用詳「茶」條。

【龍撫芎】 卽川芎之處方用名。詳

「川芎」條。

【龍腦香膏】 卽婆律香膏之原名。

熟。殺青黃色。文作鑄甲。形圓大如彈丸。核若木患子而不堅。肉薄於荔枝。白而有漿。其甘如蜜。實極繁。每枝三二十顆。作穗如荔枝。漢時南海常貢之。大爲民害。臨武長唐羌上書言狀。和帝感其言。下詔止之。(蘇頌) ②龍眼正圓。其木性畏寒。白露後方可採摘。曬焙令乾。成朶。乾者名龍眼錦。按范成大桂海志。有山龍眼。出廣中。色青。肉如龍眼。夏月實熟可噉。此亦龍眼之野生者與。(李時珍) ③龍眼肉純甘而溫。大補血液。蒸透者良。(王秉衡)

【龍眼中】即龍眼之古籍別名。典見和漢藥考。詳「龍眼」條。

【龍眼核】主治 一切疥癬瘡。毒刀斧損傷。腦漏。小腸疝氣。

配合應用 ①治腦漏。用廣東圓眼核。入銅爐內燒。煙起。將筒熏入患鼻孔內。數次即愈。(黃氏醫抄方)

②治一切瘡疥。用龍眼核煨存性。麻油調敷。即愈。(高只元傳世方)

③治癰。圓眼核二個。去外黑皮。搗碎。雄黃。硫黃。陀僧。枯礬。川椒末。各三分。共爲細末。以生薑蘸擦患處。即愈。(祝氏效方) ④又治患癰用龍眼核。去外黑殼。用內核。米醋磨搽。(集聽方)

⑤張觀齋云。桂圓核仁。凡人家有小子女者。不可不備。遇面上或磕傷。及金刃傷。以此敷之。定疼止。血生肌。愈後無癢。若傷髮際。愈後更能生髮。不比他藥。愈後不長髮也。

⑥治小腸疝氣。荔枝核。龍眼核。各七枚。俱燒灰。大茴二粒。炒。共爲末。好酒調下。外用生薑搗爛。敷腎即消。(不藥良方) ⑦又治疝氣偏墜。小腸氣痛。神效。荔枝核炒。龍眼核炒。小茴香炒。各等分。爲細末。空心服一錢。以升麻一錢。水酒煮送下。(經驗廣集方)

⑧念珠丸。治陰疝偏腫。囊中疼痛。難忍。乳香去油淨二錢。圓眼核三錢。黃蠟二兩。和藥末。成丸。彈子大。分爲一百零八丸。蛤粉爲衣。用線穿起。露一宿。收貯。遇症。每服三丸。乳香湯下。(張氏必效方)

⑨治小便不通。用龍眼核。去外黑殼。打碎。水煎服。如通後欲脫者。以圓肉湯飲之。

⑩治足指癰爛。用桂圓核燒灰。搽之。立效。(藥鏡方)

⑪治無名腫毒。桂圓核以水調塗。俱效。能止折傷出血。療金瘡。滅斑。(黃氏醫抄方)

⑫治煙筒傷喉。萬近蓬云。凡煙管誤戳傷喉。出血不止者。用桂圓核。去外黑皮。惟取內核仁。精搗爲極細末。看喉中傷處。用筆管安末。吹之。即定疼止。血而愈。屢試果驗。

⑬治刀傷出血。以龍眼核炒搗磨細。敷之。(殷仁趾傳方)

⑭治刀斧傷。桂圓核不拘多少。用火燒枯存性。研末。搽患處。即愈。(黃氏醫抄方) 按陳杰回生集。大興李振祖西平云。龍眼核末。敷金刃傷。昔在西秦及巴理坤軍營救愈多人。

【龍眼殼】基本 本品即龍眼實裏肉之殼。

主治 敷湯泡傷。煨存性爲末。桐油調塗。止痛。無癢。

參攷資料 龍眼實殼。本熬黃

色。閩人恐其易蛀。輒用蠶黃末拌之。令黃。且易悅目也。廣中桂圓。多不用蠶黃拌。故今廣中桂圓。猶存本色。入藥用殼。須先去外色。黃者。【龍眼錦】即龍眼肉曝乾之古籍別名。典見和漢藥考。詳「龍眼」條。

【龍移草】即水英之古籍別名。典見唐天寶單方圖。詳「水英」條。

【龍蛇】即斑蝥之古籍別名。典見和漢藥考。詳「斑蝥」條。

【龍葉】即澤蘭葉之古籍別名。典見本經。詳「澤蘭葉」條。

【龍絲竹】即竹之產於湖南舊辰州府境者。高不盈尺。細僅如針。其葉或細或大。各功用詳「竹」條。

【龍華】即石龍芻之古籍別名。典見別錄。詳「石龍芻」條。

【龍睛】即楊梅之古籍別名。典見和漢藥考。詳「楊梅」條。

【龍腦香】即冰片之原名。詳「冰片」條。

【龍腦薄荷】即雞蘇之古籍別名。典見日用本草。詳「雞蘇」條。

【龍腦薄荷葉】即雞蘇之處方名。詳「雞蘇」條。

【龍腹香】即龍涎香之古籍別名。

虛。長智。【明】經希雍本草經疏論龍眼曰。龍眼稟稼穡之化。故其味甘氣平無毒。入足太陰。手少陰經。少陰爲君主之官。藏神而主血。甘能益血。補心則君主強。神明通五臟。龍氣俱除矣。甘味補脾。脾得補則食自寡而飢心得補。則火下降而坎離交。故能安志。肝藏魂。主納血。心家血滿。則肝有所受而魂強。甘能解毒。故主去毒。久服聰明耳目。輕身不老。總之補益心脾之驗也。至於除蟲。非其所能略之可也。【清】黃宮繡本草求真論龍眼曰。龍眼氣味甘溫。多有似於大棗。但此甘味更重。潤氣尤多於補氣之中。又更有補血之力。故書載能益脾長智。養心保血。爲心脾要藥。是以心思勞傷。而見健忘怔忡驚悸。腎腸風下血。俱可用此爲治。蓋血雖屬心生。而亦賴脾以統。思慮而氣既耗。則非甘者不能以補。思慮而神更損。則非潤者不能以濟。龍眼甘而兼潤。既能補脾固氣。復能保血不耗。則神氣自爾長養。而無驚悸健忘之病矣。按古歸脾湯有用龍眼肉以治心脾傷損。義實

基此。非若大棗力專補脾。氣味雖甘。其性稍燥。而無甘潤和柔。以至於極之妙也。至書有言。久服令人輕身不老。百邪俱辟。豈止神智長養之謂。蠱毒可除。三蟲可殺。豈止氣血充足。而蟲不食之謂。但此味甘體潤。凡中滿氣壅。腸滑泄利。爲大忌。耳。桂產者佳。粵東者性熱。不堪入藥。【清】王士雄隨息居飲食譜論龍眼曰。龍眼甘溫。補心氣。定志安神。益脾陰。滋營充液。果中神品。老弱宜之。以核小肉厚味純甘者良。

【國外學說】日本學說謂龍眼肉者在漢藥中殊貴重。價亦不廉。爲各種練藥類之主藥。習慣用之。又爲緩和營養品。其用量自二〇至六〇。又謂龍眼肉呈酸性反應。味甚甘。香味俱稍似棗與乾葡萄。依藥學士村山長之助氏及藥劑師伊藤禎次郎氏之試驗云。龍眼肉中含有之成分。爲葡萄糖。蔗糖。澱粉。煙幾斯。篤林。纖維素。酸類。含鞣素。脂肪等。而舉其百分中所含之數。且有纖維素之定量試驗等。

配合應用 ①同生地黃、天麥冬、丹參、柏子仁、遠志、蓮實、五味子、茯神、人參。能補心保神。益氣強志。②方外服龍眼法。五更將不見水。乾龍眼。以舌在齒上。取肉去核。即舌攪華池法。細細嚼至渣如膏。連口中津。汨汨嚥之。如嚥甚硬。物畢。又如前法。食第二枚。共服九枚。約一時許。服畢。方起。晨巳二時。未申及臨臥。一日服四次。服時氣和心靜。且漱津納嚥。是取坎納離之法。勞證勤行。一月自愈。

③玉靈膏（二名代參膏）自剝好龍眼肉。盛竹筒式瓷碗內。每肉一兩。入白洋糖一錢。素體多火者。再入西洋參片。如糖之數。梳口。以絲絲一層。日於飯鍋上蒸之。蒸至百次。凡衰弱老弱。則無痰火。便滑之病者。每以開水。淪服一匙。大補氣血。力勝參耆。產婦臨盆服之尤妙。

用量 一錢至三錢。
施用宜忌 外有感邪。內有鬱火。以及停飲脹滿等症。禁用。
著名方劑 歸脾湯。治思慮過度。勞傷心脾。健忘怔忡。虛煩不眠。

自汗。驚悸。【濟生方】龍眼肉、酸棗仁、炒。炙黃耆、炒。白朮、茯神。各一兩。水香牛兩。炙甘草二錢。右藥咬咀。每服五錢。薑三片。棗一枚。水二鍾。煎一鍾。溫服。

參攷資料 ①龍眼本經名曰益智。今專爲果。未見入藥補。注不言神農本草綱入木部中品。畢部中復不曾收入。今除爲果之外。別無龍眼者。謂爲益智子。則專調諸氣。今爲果者。復不能也。矧自有益智條。遠不相當。故知木部龍眼。卽便是今爲果者。按今注云。甘味歸脾。而能益智。此說甚當。②食品以荔枝爲貴。而資益則龍眼爲良。蓋荔枝性熱。而龍眼性和平。不也。嚴用和濟生方。治思慮勞傷。有歸脾湯。取甘味歸脾。能益人智之義。③龍眼生者。沸湯淪過。食不動脾。李廷飛。④荔枝繞過。龍眼卽熟。故南人目爲荔枝奴。又名木彈。曬乾寄遠。北人以爲佳果。目爲亞荔枝。【蘇頌】⑤今廣漢蜀道出荔枝處。皆有之。橘含南方草木狀云。木高二二丈。似荔枝。而枝葉微小。凌冬不凋。春末夏初。開細白花。七月實。

豆島掘出俗所謂龍骨者。經東京大學教授布瑞恩氏之鑑定。言係漂積期中所棲息之牛族。一種名 *Biston Priscus* 者之頭骨。又手板發蒙亦載有小豆島所掘出者。當係大魚之骨云。

古籍別名 蕁。鼠壳。

【龍常草】(爾雅) 棕心草。(綱目) 棧心草。(植物學大辭典)

外國名詞 *Diarrhena japonica*, *Cry. var. Koenigii*, *Hackl. (拉丁) タツノヒゲ (日本)*

基本 禾本科龍常草屬。藥用其莖。

產地 凡山川河澤均有出。

形態 龍常草爲澤草類之多年生草。本莖初略臥地。自下部之節生根。高一二尺。葉頗長大。廣亦四五分。葉端尖銳。七八月間梢端抽穗。疎着長形之小穗。花作綠色。其莖冬夏俱生。如龍鬚。亦可織席。

性質 鹹溫。無毒。

主治 輕身。益陰氣。療痺寒。濕。

參攷資料 ① 俚俗五月採繫角黍之心。呼爲棕心草是也。(李

時珍) ② 生河水旁。狀如龍芻。冬夏生。(李時珍) ③ 按爾雅云。蕁。鼠壳也。鄭樵解爲龍芻。郭璞云。纖細似龍鬚。可爲席。蜀中出者好。恐即此龍常也。蓋是龍鬚之小者。爾故其功用亦相近云。(李時珍)

命名 形象龍目。故名。

【龍眼】 處方用名 桂圓肉。

古籍別名 龍目。(吳普) 圓眼。(俗名) 益智。(別錄) 木彈。荔枝奴。

(圖經) 亞荔枝。(開寶) 魁圓。比目。龍月。荔枝。荔枝。細荔枝。益志。蜜脾。燕卵。鯪珠。海球。叢海球。藥龍眼。錦龍眼。巾荔枝。奴川。彈子。繡水圓。(和漢藥考) 鬼眼。(俗名)

外國名詞 *Nephelium Lonnana, Camb. (拉丁)*

基本 係屬無患樹科龍眼樹之果肉。

產地 產東印度、中國福建、廣東諸省及臺灣、琉球等。陳仁山藥物生產辨云。桂圓肉。以廣西鬱林爲最好。其次則廣東、廣利。三則廣州、北海。四則廣西北流、貴縣。五則江口。六則羅定、琼州。海口來者。溼但其味最清甜。俱銷於北省。臺灣

來者味淡。水東陽江來者。亦溼而色黑。

形態 龍眼係產熱帶地方之常綠喬木。枝葉繁茂。高三四丈。葉互生。爲羽狀複葉。小葉作革質。卵圓形。五月間開白色五瓣花。有香氣。果實大四分至六分許。作帶赤色或紫紅色。球圓形。表面有皺紋。乾燥則成褐色。破之空虛。正中有類似枇杷核之種子。其種子被其暗褐色柔韌肉質。是爲龍眼內味。甘。類乾葡萄。其實外被有剛毛。種子具肉質之假種皮。其肉薄於荔枝。色白有漿凝而結實作穗。每穗生實五六十顆。

採取 龍眼木畏寒。白露後。方

採取 龍眼木畏寒。白露後。方

採取 龍眼木畏寒。白露後。方

採取 龍眼木畏寒。白露後。方

採取 龍眼木畏寒。白露後。方

採取 龍眼木畏寒。白露後。方

採取 龍眼木畏寒。白露後。方

採取 龍眼木畏寒。白露後。方

採取 龍眼木畏寒。白露後。方

採取 龍眼木畏寒。白露後。方

採取 龍眼木畏寒。白露後。方

採取 龍眼木畏寒。白露後。方

採取 龍眼木畏寒。白露後。方

採取 龍眼木畏寒。白露後。方

採取 龍眼木畏寒。白露後。方

採取 龍眼木畏寒。白露後。方

採取 龍眼木畏寒。白露後。方

採取 龍眼木畏寒。白露後。方

採取 龍眼木畏寒。白露後。方

採取 龍眼木畏寒。白露後。方

採取 龍眼木畏寒。白露後。方

採取 龍眼木畏寒。白露後。方

採取 龍眼木畏寒。白露後。方

採取 龍眼木畏寒。白露後。方

採取 龍眼木畏寒。白露後。方



龍眼

可採摘曬乾。用法 剝去外殼及核。入水煎。或酒浸。或搗爛和丸。性質 甘平。無毒。成分 水〇・八四五。乾燥殘渣九九・一四五。(內可溶性成分七九・七七。不溶成分一九・三八五) 灰三・三六。(內得自可溶性成分者二・八七三) 葡萄糖二四・九一。蔗糖〇・二二。堿性纖維素一・〇五三。纖維素二・一八五。酸類(假定作酒石酸等)一・二六。含淡物六・三〇。脂肪二・四九四等。效能 補心脾。療虛羸。用作緩和滋養藥。又治神經衰弱。貧血。作用 入胃後與胃酸化合成爲消化蛋白與澱粉之酵素。一部分仍不被化合。及至小腸。始漸次由腸壁吸而達血中。能增加血液之熱能與酵素之作用。主治 五臟邪氣。安志厭食。除蟲毒。去三蟲。久服強魂聰明。輕身不老通神明。歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論龍眼曰。開胃。益脾。補

十六畫 龍

治產後惡血撲心。妄語癲狂。如傷寒發狂者。切不可認作傷寒治。誤則殺人。

①同牛黃、犀角、鉤藤、丹砂、生地黃、茯神、琥珀、金箔、竹瀝、天竹黃、蘇合香。治大人小兒驚癇癲疾。

②治健忘。久服聰明益智。慧用白龍骨。遠志等分。爲末。食後酒服。方寸匕。日三。(千金方)

③治勞心夢洩。龍骨、遠志等分。爲末。煉蜜丸。如梧子大。硃砂爲衣。每服三十九。蓮子湯下。(食醫心鏡方)

④暖精益陽。前方去硃砂。每冷水空心下三十九。(經驗方)

⑤治遺尿淋瀝。白龍骨、桑螵蛸等分。爲末。每鹽湯服二錢。(梅師方)

⑥治老瘡不止。龍骨末。方寸匕。先發一時。酒一升。煮三沸。及熱服盡。溫覆取汗。卽效。(肘後方)

⑦治傷寒毒痢。傷寒八九日至十餘日。大煩渴作熱。三焦有瘡。膿下痢。或張口吐舌。自爛。口舌生瘡。不識人。用此除熱毒止痢。龍骨半斤。水一斗。煮四升。沉之井底。冷服。

五合。漸漸進之。(外臺秘要方)

⑧治熱病下痢欲死者。龍骨半斤。研。水一斗。煮取五升。候極冷。稍欲得汗。卽愈效。(肘後方)

⑨治久痢休息不止者。龍骨四兩。打碎。水五升。煮取二升半。分五服。冷飲。仍以米飲和丸。每服十九。(肘後方)

⑩治鼻衄眩冒欲死者。龍骨末吹之。(梅師方)

⑪治吐血衄血。九竅出血。並以龍骨末吹入鼻中。昔有人衄血一斛。衆方不止。用此卽斷。(三因方)

⑫治耳中出血。龍骨末吹入之。(三因方)

⑬治男婦溺血。龍骨末水服方寸匕。日三。(千金方)

⑭治小兒疳瘡。龍骨煨研。傅之。(聖惠方)

⑮治陰囊汗癢。龍骨、牡蠣粉撲之。(醫宗三法方)

用量 三錢至一兩。

施用宜忌 凡洩痢腸澼崩漏諸症。並屬於虛。而由於熱鬱積滯者。禁用。畏石膏。川椒。忌魚及鐵。得牛黃。人參良。

參攷資料 ①氣入丈夫腎臟中。故益腎藥宜用之。(雷斅) ②瀝可去脫。故成氏云。龍骨能收斂浮越之正氣。固大腸而鎮驚。又主帶脈爲病。(李時珍) ③許洪云。牛黃惡龍骨。而龍骨得牛黃更良。有以制伏也。其氣收陽中之陰。入手足少陰厥陰經。(李時珍) ④龍骨又名尺水龍。無尺水不能升天。呵氣成雲。既能變水。又能變火。陸佃埤雅云。龍火得溼則焰。得水則燄。以人火逐之。則息。故人之相火。似之。龍卵生思。抱雄鳴上風。雌鳴下風。因風而化。釋典云。龍交則變爲二小蛇。又小說載。龍性粗猛。而愛美玉空青。喜嗜燕肉。畏鐵及茜草。蜈蚣。棟葉。五色絲。故食燕者忌渡水。祈雨者用燕。鎮水患者用鐵。渡龍者用茜草。祭風原者用棟葉。色絲。衰樓投江。醫家用龍骨者。亦當知其性之愛惡如此。(李時珍) ⑤生晉地川谷。及太山。巖水。岸土穴中。死龍處。採無時。(別錄) ⑥剡州。滄州。太原者。爲上。其骨細。文廣。是雌骨。粗文狹者。是雄。五色具者。上。白色黃色者。中。黑色者。下。凡經落不

淨。及婦人採者不用。(雷斅) ⑦龍骨色青白者良。(吳普) ⑧今河東州郡多有之。李肇國史補云。春水至時。魚登龍門。蛟骨甚多人採爲藥。有五色者。龍門是晉地。與本經合。豈龍骨卽此魚之骨乎。又孫光憲北夢瑣言云。五代時。鎮州闢殺一龍。鄉豪賈寬。取其雙角。角前一物。如藍色。文如亂錦。人莫之識。則龍亦有死者矣。(蘇頌) ⑨諸說不一。終是臆度。曾有崖中崩出一副皮骨。頭角皆備。不知蛟耶。鼉耶。謂之蛟。鼉。則有形之物。不得生見。死方可見。謂之化。則其形獨不可化。與(寇宗奭)經文言死龍之骨。若以爲蛟。終是臆說。(汪機) ⑩龍骨本經以爲死龍。陶氏以爲蛟骨。蘇寇諸說皆兩疑之。竊謂龍神物也。似無自死之理。然觀蘇氏所引關死之龍。及左傳云。秦龍氏。醢龍以食。洮異記云。漢和帝時。大雨。龍墮宮中。帝命作羹。賜羣臣。博物志云。張華得龍肉。詐言得醅。則生五色等說。是龍固有自死者矣。當以本經爲正。(李時珍) ⑪東洋學藝雜誌第三號。載有日本讀較國小

龍

入藥須用水飛過曬乾。每斤用黑豆一斗。蒸一伏時曬乾。否則着人腸胃。晚作熟也。

性質 甘平。無毒。

效能 欽心神。潛浮陽。固精。燥溼。鎮驚。安寐。用作強壯藥。

主治 心腹鬼疰。精物老魅。咳逆。洩痢。膿血。女子漏下。癥瘕。堅結。小兒熱氣驚癇。(本經)心腹煩滿。恚怒氣伏。在心下不得喘息。腸癰內疰。陰蝕。四肢痿枯。夜臥自驚。汗出。止汗。縮小便。溺血。養精神。定魂魄。安五臟。白龍骨主多寐。鴻精。小便洩精。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥

性本草論龍骨曰。逐邪氣。安心神。止夜夢鬼交。虛而多夢。粉紆。止冷痢下。膿血。女子崩中。帶下。【宋】日華諸家本草論龍骨曰。懷孕漏胎。止腸風。下血。鼻洪吐血。止瀉痢。渴疾。健脾。潤腸胃。【明】李時珍本草綱目論龍骨曰。益腎氣。驚止。陰癰。收溼氣。脫肛。生肌。欽瘡。【明】繆希雍本草經疏論龍骨曰。龍巢陽氣以生。而伏於陰。爲東方之神。乃陰中之陽。鱗蟲之長。神靈之物也。故

十六畫 龍

其骨味甘平。氣微寒。無毒。內應乎肝。入足厥陰。少陽。少陰。兼入手少陰。陽明。經。神也者。兩精相合。陰陽不測之謂也。神則靈。靈則能辟邪惡。蠱毒。魘魅之氣。及心腹鬼疰。精物老魅。遇之則散也。咳逆者。陽虛而氣不歸元也。氣得欽攝而歸元。則咳逆自止。其性瀉以止脫。故能止洩痢。膿血。因於大腸虛。而久不得止。及女子漏下也。小兒心肝二臟。虛則發熱。熱則發驚。驚氣入腹。則心腹煩滿。欽攝二經之神氣。而平之以清其熱。則熱氣散。其驚癇。及心腹煩滿。皆自除也。肝氣賊脾。脾主四肢。故四肢痿枯。肝寧則熱退。而脾亦獲安。故主之也。汗者心之液也。心氣不收。則汗出。肝心腎三經虛。則神魂不安。而自驚。收欽三經之神氣。則神魂自安。氣得歸元。勿降利而喘息自平。汗自止也。肝主怒。肝氣獨盛。則善恚怒。魂返乎肝。則恚怒自除。小腸爲心之腑。膀胱爲腎之腑。二經之氣虛脫。則小便多而不禁。臟氣欽則腑亦隨之。故能縮小便。及止夢寐洩精。小便洩精。兼主溺血也。其主養精

神。定魂魄。安五臟者。乃收攝神魂。閉精氣之極功也。又主癥瘕。堅結。腸癰。內疰。陰蝕者。以其能引所治之藥。黏着於所患之處也。【明】李士材本草圖解論龍骨曰。龍骨甘平。性澀。澀可去脫。故能收欽浮越之氣。固大腸。止遺泄。下血。定驚。止汗。除崩帶。煨赤。研細。水煎。耐不細。則沾着腸胃。晚年作熱。【清】黃宮繡本草求真論龍骨曰。龍骨甘澀。微寒。功能入肝欽魂。不令浮越之氣。遊散於外。故書載能鎮驚。辟邪。止汗。定喘。瀉可去脫。故書載能以治脫肛。遺精。崩帶。瘡口不欽等症。功與牡蠣相同。但牡蠣鹹。瀉入腎。有軟堅化痰清熱之功。此屬甘瀉入肝。有收欽止脫。鎮驚安魂之妙。如徐之才所謂瀉可止脫。龍骨牡蠣之屬。白地錦紋。紙之黏舌者佳。【清】黃元御長沙藥解論龍骨曰。龍骨味鹹。微寒。性瀉。欽神魂而定驚悸。保精血而收滑脫。傷寒桂枝甘草龍骨牡蠣湯。治太陽傷寒火逆下後。因燒鍼煩躁者。火逆之證。下之亡其裏陽。又後燒鍼發汗。亡其表陽。神氣離根。因之煩躁不

安。龍骨欽神氣而除煩躁也。柴胡加龍骨牡蠣湯。治少陽傷寒下後。胸滿煩驚譫語。小便不利。一身盡重。不可轉側者。以下敗裏陽。膽氣拔根。是以驚生。膽水逆衝。是以胸滿。相火升炎。故心煩而語妄。水泛土溼。故身重而便難。龍骨欽魂而鎮逆也。

辨偽 白地錦紋。紙之黏舌者眞。

配合應用 ①同牡蠣。入柴胡桂枝各湯內。取其收欽浮越之正氣。固脫而鎮驚。(張仲景方)

②治勞心夢遺。同遠志等分爲末。煉蜜丸。如梧子大。硃砂爲衣。每服三十丸。蓮心湯下。睡即洩精。白龍骨四分。韭子五合。爲散。空心酒服。方寸匕。(梅師方)

③又方。治泄瀉不止。白龍骨。白石灰等分。爲末。水丸。梧子大。紫蘇木瓜湯下。量大人小兒用。亦治久痢休息。

④治久痢脫肛。白龍骨粉撲之。(姚和衆方)

⑤龍齒同荊芥。澤蘭。牡丹皮。蘇木。人參。牛膝。紅花。蒲黃。當歸。童便。

則成塊。黃黑色。如百藥煎而膩理。久則紫黑。如五臟脂而光澤。其體細細以浮石而腥臊。其說亦未確核。蓋所云魚腹中得者。即札記所云海鯨魚之精也。亦名龍涎。出壺灣。不若大洋中產者佳。夫龍腦。龍胎。世上所無。龍涎則閩粵貨售者多東壁。何得於罕見者載之。於所有者反略之耶。則甚矣該博之難也。入藥用隔湯頓化。如膠糖狀者佳。〔綱目拾遺〕①龍涎過煙煤則不散。入藥忌鐵器。及石膏。〔西陽雜俎〕②在澳門見倭夷用合舶硫。及他藥作種子丸。云漢時衛士和丹用此。倭夷皆有其方。祕不傳中國。〔陳良士〕③出淡水者。止心痛。助精氣。〔札記〕④龍涎能生口中津液。凡口患乾燥者。含之。能津流盈頰。微若有腥氣。粵中夷人合龍涎丸。和以他藥。便不腥。入口亦不耗滅。一丸可用數十年。不敗。如單用龍涎入藥。須先用雞湯將龍涎涎死。則入腹便化。否則入腹絲毫不損。蓋極難化者。方書云。焚之。其煙能入水。孟詵嘗試之。多不驗。〔周曲大〕

【龍珠】 命名 本品即龍葵子。之色赤者。象形也。故名。

古籍別名 赤珠。〔綱目〕

外國名詞 Capsicum ano-malum, Fr. et Sev. (拉一)

基本 係茄科番椒屬為龍葵之子實。

產地 山野有出。

形態 龍珠為溼草類之一。年生草本。葉長卵形。夏日開花。有花柄。常二花叢生於葉腋。亦有兩花以上者。花冠淡黃色。果實紅色。球形而多汁。其子與根。俱可供藥用。

性質 苦寒。無毒。

主治 能變白髮。令人不睡。主諸熱毒。石氣發動。調中解煩。

參攷資料 ①龍珠服之。變白。

令黑。耐老。若能生食。得苦者不食。

他菜。十日後。即有靈異也。不與葱。

薤同噉。根亦入藥用。〔甄權〕②龍。

葵赤珠者。名龍珠。按去汁可食。能。

變白。令黑。〔甄權〕③龍珠生道旁。

子圓似龍葵。但熟時正赤耳。〔陳。

藏器〕④龍珠龍葵。雖以子之黑。

赤分別。其實一物二色。強分為二。

者也。〔李時珍〕

【龍珠子】 性質 苦寒。無毒。主治 疔腫。〔陳藏。

器〕

【龍脊茶】 產地 出廣西。主治 除痰解毒。治。

赤白痢。

【龍芻草】 即石龍芻之處方用名。

詳「石龍芻」條。

【龍荔】 命名 本品狀如荔枝。

而味似龍眼。其木及葉。

亦似二果。故名。

產地 出嶺南諸地。

形態 龍荔為果類之一種。三。

月間開小白花。結實與荔枝同時。

成熟。不可生噉。但可煮食。

性質 甘熱。有小毒。

參攷資料 龍荔實。生食之。令。

人發癩。或見鬼物。〔李時珍〕

【龍蛭】 即斑蝥之古籍別名。典見。

綱目。詳「斑蝥」條。

【龍退】 即蛇蛻之古籍別名。典見。

綱目。詳「蛇蛻」條。

【龍骨】 處方用名 蝦龍骨。花。

龍骨。

古籍別名 陸虎遺生。〔和漢。

藥考〕那伽骨。〔梵書〕青花龍骨。

基本 為象類動物之骨埋沒土中。化石者。往往從地下掘出。謂之龍骨。

產地 陳仁山藥物生產辨云。

龍骨產直隸山西岱州五臺山等。

處。一經在山尋獲。全條係在數十。

擔之多。所謂在天成象。在地成形。

觀此。亦不謬也。和漢藥考曰。概產。

四川成都。山東沂州。山西太原等。

處。

形態 其骨細文廣者。是雌骨。

粗文狹者。是雄。亦有五色者。又有。

白色。黃色。黑色者。其形有九形。頭。

似駝。角似鹿。眼似鬼。耳似牛。項似。

蛇。腹似蜃。鱗似鯉。爪似鷹。掌似虎。

背有八十一鱗。其聲如蠶銅盤口。

旁有鬚髯。領下有明珠。喉下有逆。

鱗。頭上有博山。

製法 雷斅曰。凡使龍骨。先煮。

香草湯浴兩度。搗粉絹袋盛之。用。

燕一。一對去腸肚。安袋於內。懸井。

面上一宿。取出。研粉。入補腎藥中。

其效如神。李時珍曰。近世方法。但。

煨赤。為粉。亦有生用者。事林廣記。

云。用酒浸一宿。焙乾。研粉。水飛三。

度用。如急用。以酒煮焙乾。或云。凡。

人言於樹收之。最收香氣。今大內甜香用之。(綱目拾遺) ①大食國產龍涎香。爲上西洋產。於伯西兒海焚之。則羣煙浮空。結而不散。坐客可用一翦以分煙縷。(澳門記略) ②嶠南瑣記。龍涎香新者色白。久則紫。又久則黑。白者如百藥煎。黑者次之。似五靈脂。其氣近腥。和香焚之。則羣煙浮空不散。試法將結塊者。奮力投沒水中。須臾突起。浮水面。即取一錢口含之。微有腥氣。經宿其細沫已噀。餘膠結舌上。取出。就溼秤之。仍重一錢。又乾之。其重如故。雖極乾枯。用銀簪燒極熱。鑽入枯中。乘暖抽出。其涎引絲不絕。驗此不分。褐白褐黑俱真。海東札記。海翁魚大者三四千斤。小者千餘斤。即海鯨也。皮生砂石。刀箭不入。或言其魚口中噴涎。常自爲吞吐。有遺於海濱者。黑色淺黃色不一。即龍涎香也。聞上淡水有之。欲辨真贋。研入水攪之。浮水面如膏。以口沫擦成丸。擲案有聲。噀之通背不耗分毫者爲真。每兩值數十金。廣志新安有龍穴洲。每風雨即有龍起。去地不數丈。朱鬣

金鱗。兩目如電。其精華在浮沫時。噴薄如澹泉。如雨。土人爭承取之。稍緩則入地中。是爲龍涎。或謂龍涎多積於海上枯木。如鳥遺狀。其色青紫。其香腥雜。百和焚之。羣煙千結。蜿蜒空中。經時不散。可以翦分香縷。然多不真。從番舶來者。出大秦波斯。於雨中焚之。飄膊有聲者真。坤輿圖記。龍涎香。黑人國與伯西兒兩海最多。有大塊重千餘斤者。望之如鳥。每爲風濤湧泊於岸。諸島獸亟喜食之。汪機本草。龍吐涎沫可制香。(嶠南瑣記) ③龍涎香傳爲鯨魚精液。泡水面。凝爲涎。能止心痛。助精氣。以淡黃色。嚼而不化者爲佳。出淡水者皆淡黃色。無黑色。(范咸臺海府志) ④龍涎香出蘇門答臘國。西有龍涎嶼。峙南巫里大洋之中。羣龍交戲其上。遺涎焉。國人駕獨木舟伺採之。舟如龍形。浮水面。伏其中。隨風潮上下。停亦用槳。龍遇之亦不吞也。每一斤值其國金錢一百九十二枚。准中國銅錢九千文。嘉靖三十四年。下戶部取香百斤。遍市京師。不得。下廣東濠司採買部文。

至臺司集議。懸價每斤銀一千二百兩。僅得十一兩。上進內驗不同。姑存之。亟取真者。部文再至廣州。夷囚馬那別的。貯有一兩三錢。上之。黑褐色。密地都密地山夷人。繼上六兩。白褐色。細問狀之。黑者採在水。白者採在山。皆真不贗。尋有密地山商再上。通前共得十七兩二錢五分。次年進入內。辨驗是真。許留用。自後夷船開上。供稍稍狹。來市始定價。每一兩價百金。龍涎之爲用也。入香合。和能收斂。腦膠清氣。雖數十年。香味仍存。得其真者。和香焚之。羣煙疊空不散。涎沫有三品。曰汎水。曰滲沙。曰魚食。汎水則輕浮水面。善水者伺龍出。取之。滲沙則凝結。年久氣滲沙中。魚食。則化。薰於沙磧。惟汎水者可食。香用。又言魚食亦有二種。海旁有花。若木芙蓉。春夏間盛開。花落。海大魚吞之。若腹腸先食。龍涎花。噀食。久即脹闊。昂頭向石上吐沫。乾枯可用。惟薰者不佳。(朱國楨大政記) ⑤諸香龍涎最貴。市值每兩不下百千次。亦五六十。出大食國近海。有雲氣罩上。間知有龍睡

下。或中年一二載。土人守視雲散。則龍已去。必得其涎五七兩。或十餘兩。衆共分之。又大洋中有渦旋處。龍在其下。湧出之涎。日燦成片。風漂至岸。取之。又嶺外雜記。龍枕石而睡。涎浮水積而堅。新者色白。久紫。甚久者黑。氣近腥。形如浮石。而輕。感理光澤。入香焚之。羣煙浮空。結而不散。又出沒海上。吐出涎沫。有三品。一汎水。二滲沙。三魚食。汎水輕浮水面。善水者伺龍出。隨取。滲沙凡風浪飄泊丹嶼。積年氣盡於沙土中。魚食涎作。薰散沙磧。氣腥穢。進貢亦不過四兩。(嶺南雜記) ⑥按龍涎論色。則瑣記言有白與紫黑之分。而札記又有淺黃色。廣志有黑青色。辨真偽亦諸說互異。大抵不必論其色。總以含之不耗。投水不沒。雨中焚之。能爆者良。東壁綱目。鱗部龍下。龍腦。龍胎俱有主治。而於龍涎獨遺之。惟附其名云。龍涎。方藥鮮用。惟入諸香。云能收腦。歷數十年不散。出。西南海。洋春間。羣龍所吐。涎沫浮出者。番人採食之。亦有從大魚腹中剖得者。其狀初若脂膠。黃白色。乾

主治 活血利水。助陽道。益精髓。通利血脈。治氣結。癥結。心痛。諸淋。辟精魅鬼邪。逐勞蟲尸疰。

參攷資料 ①龍涎可以製香。②龍涎方藥鮮用。惟入諸香。能收腦麝。數十年不散。焚之則翠煙浮空。(李時珍)

【龍涎石】 (綱目)
古籍別名 龍仙石
基本 龍涎石為石類之一種。可供藥用。

主治 大風。癩瘡。
古籍別名 龍涎。(綱目拾遺) 鯨涎。(和漢藥考) 龍腹香。(新中藥)

外國名詞 Ambra (德)
基本 屬游水類抹香鯨(真甲鯨) *Physeter Macrocephalus* 之腸及膀胱所分泌之凝結物。浮漾海上。為人所採取者。

產地 陳仁山藥物生產辨云。龍涎香產南洋羣島之山邊。海鯨山打根亦有出。乃鯨魚鯨魚所吐之涎云。

形態 抹香鯨為鯨之一種。春

夏間羣集日本之太平洋沿岸。頭位於其體之三分之一處。牡者大至十五尋。牝者約其半。噴潮不直立。以四十五度傾向前方。與他鯨類異。其所謂龍涎香為不透明蠟狀固塊。大者有重至一百五十斤者。有白色。灰色。淡赤色。黑白相間者。有暗褐色。而有黑斑者。有各種色層相疊作大理石狀者。質脆弱而輕。浮水上。嚼之如蠟。黏著齒牙。不溶於水。逢溫湯酒精。則溶解過半。伊打善能溶解。無何氣味。摩擦之或置掌中溫之。則柔軟如蠟。稍發甘味。狀香氣。投入火中則燃燒。發灰色煙。有佳香。

性質 味甘。氣腥。性瀉。

效能 利氣和血止痛。辟穢。效能與麝香無大異。惟較劣耳。多用作香料。又能治神經衰弱。陰痿等症。

主治 活血。益精髓。助陽道。通利血脈。

近人學說 程登瀛曰。龍涎香之藥效。尙有待事實來證驗者。據海濱漁人傳說。為海王或海和尚所吐之唾涎。究其所謂海王海和

尚者。形狀何若。乃泛指名稱無定或稀有之海大魚而言。究實是真甲鯨腹裏之脂肪。說為可靠。海人以旋風所捲起之水柱曰龍車水。鯨為水族之甚大者。於一定時間須浮水面呼吸。噴水如霧。或誤以為龍。因此而有龍涎之名。亦未可定。真甲鯨腹裏之脂肪。能如海燕之吐涎成窩一樣。底自行吐出。漂浮近岸與草木結合。拾得之是為龍涎。一堆有多至三五擔者。余昔年漫游南洋。得華僑之贈送者。凡五塊。色質各異。大別有二。(一)膏藥狀。灰黑色。質重。有膠黏性。恰似丹油膏藥一樣。灼使溶解。魚腥氣甚濃。以紙條拌燃之有煙。(二)水波狀。黃褐色。似土塊。質輕。飄如海棉。以指壓之。成粉。取一塊大與杯等者。放杯中溶解之。約剩二分之一。油液不黏。無甚氣味。和鴉片煙吸之才。能感覺其固有之臭氣。上述兩種色質不同。乃經過許久天然力所造成之。得暹羅鹿哥港一炭。鄭拾得之例證。可以推知其變化之原因。該炭鄭在海濱拾水流樹燒炭。嘗發見一大堆黑而稠黏有

腥氣者。或以為龍涎。乃收拾純油部份。餘仍棄置港濱。經日曝水澆數月之後。漸變乾硬。隙隙間較稀薄者。已成輕質。單此可知脂涎受過日光海水之曬。澆分析。於是黏質腥氣逐漸減少。同時受太陽之適度溫熱(火熱灼之即溶解)熬起微細泡沫凝固而成。為輕鬆的固體。前人或以色質辨真偽者。乎明變化之歷程。可無須辨矣。顧拾得此物。所以不甚寶貴者。因攜出都市各藥行。大多託故不買。有時或以賤價售出。少許。且純屬油質。氣腥不香。或謂可供製香料。想亦有名無實耳。故傳說甚珍貴。而實際上絕無價值可言。其所以無價值。不能通銷於市面者。因本品治療上無著明之效用故也。余嘗以之治哮喘。咳嗽。氣痛。諸病。垂無功效。

附量 一分至五分。

參攷資料 ①質品有用蠟加蘇合香。安息香及芳香油製成者。亦有於蘇合香。松脂。蠟等加麝香製成者。(和漢藥考) ②通雅。龍涎有。在花面國傍。獨立南海中。彼

有。形狀何若。乃泛指名稱無定或稀有之海大魚而言。究實是真甲鯨腹裏之脂肪。說為可靠。海人以旋風所捲起之水柱曰龍車水。鯨為水族之甚大者。於一定時間須浮水面呼吸。噴水如霧。或誤以為龍。因此而有龍涎之名。亦未可定。真甲鯨腹裏之脂肪。能如海燕之吐涎成窩一樣。底自行吐出。漂浮近岸與草木結合。拾得之是為龍涎。一堆有多至三五擔者。余昔年漫游南洋。得華僑之贈送者。凡五塊。色質各異。大別有二。(一)膏藥狀。灰黑色。質重。有膠黏性。恰似丹油膏藥一樣。灼使溶解。魚腥氣甚濃。以紙條拌燃之有煙。(二)水波狀。黃褐色。似土塊。質輕。飄如海棉。以指壓之。成粉。取一塊大與杯等者。放杯中溶解之。約剩二分之一。油液不黏。無甚氣味。和鴉片煙吸之才。能感覺其固有之臭氣。上述兩種色質不同。乃經過許久天然力所造成之。得暹羅鹿哥港一炭。鄭拾得之例證。可以推知其變化之原因。該炭鄭在海濱拾水流樹燒炭。嘗發見一大堆黑而稠黏有

腥氣者。或以為龍涎。乃收拾純油部份。餘仍棄置港濱。經日曝水澆數月之後。漸變乾硬。隙隙間較稀薄者。已成輕質。單此可知脂涎受過日光海水之曬。澆分析。於是黏質腥氣逐漸減少。同時受太陽之適度溫熱(火熱灼之即溶解)熬起微細泡沫凝固而成。為輕鬆的固體。前人或以色質辨真偽者。乎明變化之歷程。可無須辨矣。顧拾得此物。所以不甚寶貴者。因攜出都市各藥行。大多託故不買。有時或以賤價售出。少許。且純屬油質。氣腥不香。或謂可供製香料。想亦有名無實耳。故傳說甚珍貴。而實際上絕無價值可言。其所以無價值。不能通銷於市面者。因本品治療上無著明之效用故也。余嘗以之治哮喘。咳嗽。氣痛。諸病。垂無功效。

附量 一分至五分。

參攷資料 ①質品有用蠟加蘇合香。安息香及芳香油製成者。亦有於蘇合香。松脂。蠟等加麝香製成者。(和漢藥考) ②通雅。龍涎有。在花面國傍。獨立南海中。彼

有。形狀何若。乃泛指名稱無定或稀有之海大魚而言。究實是真甲鯨腹裏之脂肪。說為可靠。海人以旋風所捲起之水柱曰龍車水。鯨為水族之甚大者。於一定時間須浮水面呼吸。噴水如霧。或誤以為龍。因此而有龍涎之名。亦未可定。真甲鯨腹裏之脂肪。能如海燕之吐涎成窩一樣。底自行吐出。漂浮近岸與草木結合。拾得之是為龍涎。一堆有多至三五擔者。余昔年漫游南洋。得華僑之贈送者。凡五塊。色質各異。大別有二。(一)膏藥狀。灰黑色。質重。有膠黏性。恰似丹油膏藥一樣。灼使溶解。魚腥氣甚濃。以紙條拌燃之有煙。(二)水波狀。黃褐色。似土塊。質輕。飄如海棉。以指壓之。成粉。取一塊大與杯等者。放杯中溶解之。約剩二分之一。油液不黏。無甚氣味。和鴉片煙吸之才。能感覺其固有之臭氣。上述兩種色質不同。乃經過許久天然力所造成之。得暹羅鹿哥港一炭。鄭拾得之例證。可以推知其變化之原因。該炭鄭在海濱拾水流樹燒炭。嘗發見一大堆黑而稠黏有

腥氣者。或以為龍涎。乃收拾純油部份。餘仍棄置港濱。經日曝水澆數月之後。漸變乾硬。隙隙間較稀薄者。已成輕質。單此可知脂涎受過日光海水之曬。澆分析。於是黏質腥氣逐漸減少。同時受太陽之適度溫熱(火熱灼之即溶解)熬起微細泡沫凝固而成。為輕鬆的固體。前人或以色質辨真偽者。乎明變化之歷程。可無須辨矣。顧拾得此物。所以不甚寶貴者。因攜出都市各藥行。大多託故不買。有時或以賤價售出。少許。且純屬油質。氣腥不香。或謂可供製香料。想亦有名無實耳。故傳說甚珍貴。而實際上絕無價值可言。其所以無價值。不能通銷於市面者。因本品治療上無著明之效用故也。余嘗以之治哮喘。咳嗽。氣痛。諸病。垂無功效。

見綱目。詳『移』條。

【龍爪稗】即稗子之古籍別名。典見救荒本草。詳『移』條。

【龍牙】即天生牙之別名。典見綱目。詳『天生牙』條。

【龍牙草】即馬鞭草之古籍別名。典見圖經本草。詳『馬鞭草』條。

【龍牙燕】即燕窩之處方用名。詳『燕窩』條。

【龍涎石】即龍涎石之古籍別名。典見綱目。詳『龍涎石』條。

【龍仙草】即雷公藤之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『雷公藤』條。

【龍汁】即黃丹之古籍別名。典見和漢藥考。詳『黃丹』條。

【龍白泉粉】即磨刀涎之古籍別名。典見綱目。詳『磨刀涎』條。

【龍目】即龍眼之古籍別名。典見吳普本草。詳『龍眼』條。

【龍石膏】**產地** 產杜陵。**形態** 龍石膏爲石類之一種。狀如鐵脂。黃色。可供藥用。

性質 無毒。**主治** 消渴。益壽。

【龍立】即續斷之古籍別名。典見

和漢藥考。詳『續斷』條。

【龍吐珠】**產地** 以南海屬多**出**。

主治 跌打洗蛇茸爛肉。散毒乾水。

【龍羊草】即鸞春花之古籍別名。典見圖經本草。詳『鸞春花』條。

【龍舌草】**產地** 生池澤湖泊**間**。

形態 龍舌草爲水草類之一種。葉如大葉慈菜。或如米苣狀。根生水底。抽莖出水。開白花。其根似胡蘿蔔根而氣香。搗汁。能輟鷄鴨卵。可供藥用。

性質 甘。鹹。寒。無毒。**主治** 癰疽湯火灼傷。搗塗之。

參攷資料 龍舌草根。可煮丹砂。煨白礬。制三黃。李時珍。

【龍衣】即蛇蛻之處方用名。詳『蛇蛻』條。

【龍沙】即麻黃之古籍別名。典見本經。詳『麻黃』條。

【龍角】**性質** 甘。平。無毒。**主治** 驚癇癰瘰。身熱如火。腹中堅。及熱洩。久服輕身。通神明延年。

【龍角】**性質** 甘。平。無毒。**主治** 驚癇癰瘰。身熱如火。腹中堅。及熱洩。久服輕身。通神明延年。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥

性本草論龍角曰。小兒大熱。【宋】蘇頌圖經本草論龍角曰。心熱風癰。以爛角磨濃汁。二合。食上服。日二次。

施用宜忌 長乾漆。蜀椒。理石。參攷資料 骨齒醫家常用。角則稀使。惟深師五邪丸用之。云無角用齒。而千金治心病。有角齒同用者。【蘇頌】

【龍豆】即續斷之古籍別名。典見別錄。詳『續斷』條。

【龍泄】即龍涎香之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『龍涎香』條。

【龍芝】即青芝之古籍別名。典見別錄。詳『青芝』條。⑤即五靈脂之古籍別名。典見和漢藥考。詳『五靈脂』條。

【龍花】即那耆悉之古籍別名。典見綱目。詳『那耆悉』條。

【龍芽草】即石打穿之古籍別名。典見綱目。詳『石打穿』條。

【龍挂香】即線香之古籍別名。典見綱目。詳『線香』條。

【龍泉粉】即龍白泉粉之簡稱。詳『龍白泉粉』條。

【龍白泉粉】條。

【龍白泉粉】條。

【龍胎】**古籍別名** 龍胞。【綱目】

產地 出蜀中山洞。**形態** 龍胎大類乾魚鱗。煎時氣甚腥臊。可供藥用。

主治 產後餘疾。婦女經閉。

參攷資料 ①龍胎治女經積年不通。同瓦松。景天各少許。以水兩盞。煎一盞。去滓分二服。少頃腹中轉動便下。按此物方家罕知。而昔人曾用。世當有識者。【蘇頌】②龍胎。龍胞。俱出巴蜀。皆下血疾。蓋一物也。李時珍。

【龍胞】即龍胎之古籍別名。典見綱目。詳『龍胎』條。

【龍修】即石龍芻之古籍別名。典見山海經。詳『石龍芻』條。

【龍涎】**命名** 本品即龍所吐之涎沫。故名。

產地 出西南海洋島中。**形態** 龍涎初出。形若脂膠。黃白色。乾則成塊。黃黑色。如百藥煎而膩理久。則紫黑如五靈脂而光澤。其體輕飄。似浮石而腥臊。可供藥用。

性質 微酸。鹹。無毒。

【龍涎】**命名** 本品即龍所吐之涎沫。故名。

【龍涎】**命名** 本品即龍所吐之涎沫。故名。

條。

【鴨跖草】 古籍別名 莽雞舌
草碧竹子（拾遺）竹

雞草。竹葉菜。淡竹葉。耳環草。碧輝
花。蔞姑草（綱目）露草。帽子花
（日本）

外國名詞 Comelina co.

immunis, L. (拉丁) ユニクサ

パウシバナ(日本)

基本 係鴨跖草科。藥用其苗

莖。

產地 山野原澤及路旁水田

間恒有出



鴨 跖 草

形態 鴨跖草爲澤草類之多
年生草本。莖高尺餘。質柔常傾臥
於地面。葉廣披針形。與竹相似。較
厚而柔闊。有平行脈。葉柄如鞘狀。
圓於莖上。互生。夏日莖梢着花。花
冠藍色。花瓣二片。不整齊。外部有
大苞。呈佛焰狀。自晨開放至午後
卽萎縮。此花所榨出之藍汁浸紙。

鵝 鵪 鵠 鵒 鵓 鵙 鵔 鵖 鵗 鵘 鵙 鵚 鵛 鵜 鵝 鵞 鵟 鵠 鵡 鵢 鵣 鵤 鵥 鵦 鵧 鵨 鵩 鵪 鵫 鵬 鵭 鵮 鵯 鵰 鵱 鵲 鵳 鵴 鵵 鵶 鵷 鵸 鵹 鵺 鵻 鵼 鵽 鵾 鵿

則爲藍紙。故可供繪具之顏料。花
後結角如鳥喙。實在角中大如小
豆。中有細子。灰黑而皺。狀如蠶屎。
其苗莖可供藥用。

性質 苦。大寒。無毒。

主治 寒熱瘧瘵。痰飲。疔腫。肉
瘰。癰滯。小兒丹毒。發熱。狂癲。大腹
痞滿。身面氣腫。熱痢。蛇犬咬。癰疽
等毒。

歷代記述攷證 【宋】大明諸

家本草論鴨跖草曰。和赤小豆煮
食。下水氣。溼痺。利小便。【明】李時

珍本草綱目論鴨跖草曰。消喉痺。

參攷資料 鴨跖生江東淮

南平地。葉如竹。高一二尺。花深碧
色。有角如鳥嘴。【陳藏器】竹葉

菜處處平地有之。三四月生苗。紫

莖。竹葉。嫩時可食。四五月開花。如

蛾形。兩葉如翅。碧色可愛。結角尖

曲如鳥喙。實在角中大如小豆。豆

中有細子。灰黑而皺。狀如蠶屎。巧

匠採其花取汁。作畫色及彩羊皮

燈。青碧如黛也。【李時珍】

主治 凍瘡。取塗之良。

【鴨鵝】

【鴨脚】卽劉寄奴草之古籍別名。

典見和漢藥考。詳「劉寄奴草」條。

【鴨脚子】卽白果之古籍別名。典

見綱目。詳「白果」條。

【鴨脚皮】 產地 廣東各屬。以

東江爲多出。

性質 淡。甘。辛。溫。

主治 酒頂。洗爛脚。敷跌打。

【鴨脚金星】卽辟瘟草之古籍別

名。典見綱目。拾遺。詳「辟瘟草」條。

【鴨脚青】 基本 鴨脚青爲雜

草類之一種。可供藥

用。

採取 以如連珠者良。

主治 疔瘡。

【鴨脚葵】卽葵之最小者。功用詳

「冬葵子」條。

【鴨褥】卽浮萍之古籍別名。典見

和漢藥考。詳「浮萍」條。

【鴨頭】 主治 煮服。治水腫。通

利小便。

【鴨膽汁】 性質 苦。辛。寒。無毒。

主治 塗痔核良。又

點赤目初起。亦效。

【鵝鴨】卽鴨之古籍別名。典見廣

雅。詳「鴨」條。

【鵝鵝】卽鵝鵝之古籍別名。典見

【鵝鵝】卽鵝鵝之古籍別名。典見

周禮。詳「鵝鵝」條。

【鵝】卽鵝子之別名。典見綱目。詳

「鵝」條。

【鵝蛇】卽白花蛇之古籍別名。典

見和漢藥考。詳「白花蛇」條。

【鵝鼠】卽鼯鼠之古籍別名。典見

廣雅。詳「鼯鼠」條。

【鵝子皮】卽蛇蛻之古籍別名。典

見別錄。詳「蛇蛻」條。

【鵝子衣】卽蛇蛻之古籍別名。典

見本經。詳「蛇蛻」條。

【龍井茶】卽雨前茶之產於浙江

龍井者。功用詳「雨前茶」條。

【龍公竹】卽竹之葉若芭蕉者。功

用詳「竹」條。

【龍手藤】 產地 生石間。

形態 龍手藤爲雜

草類之一種。葉如龍手。莖如藤狀。

可供藥用。

性質 甘。溫。無毒。

主治 偏風口喎。手足攣緩。補

虛。益陽。去冷氣風痺。以醇酒浸。近

火令溫。空心服之。取微汗。

【龍月】卽龍眼之古籍別名。典見

和漢藥考。詳「龍眼」條。

【龍爪粟】卽稔子之古籍別名。典

拭淨。入大棗肉二升。參耆平骨散末一升。縛定。用沙壺一箇。置鴨在內。以炭火慢煨。將陳酒一瓶。作三次入之。酒乾爲度。取起食鴨及棗類。作取愈。(十藥神書方)

①治大腹水病。小便短少。百一方。用青頭雄鴨煮汁飲。厚蓋取汗。又治十種水病。垂死。用青頭鴨一隻。如常治切。和米并五味煮作粥食。又方。用白鴨一隻。治淨。以豉半升。同薑椒入鴨腹中。縫定。蒸熟食之。(食醫心鏡方)

參攷資料 鴨。水禽也。治水利小便。宜用青頭雄鴨。取水木生發之象。治虛勞熱毒。宜用烏骨白鴨。取金水寒肅之象也。(李時珍) 鴨通作水。養性實木而無他心。故庶人以爲贊。曲禮云。庶人執匹匹雙鶩也。匹夫車末。故廣雅謂鴨爲鶩。禽經云。鴨鳴呶呶。其名自呼。鳥能高飛。而鴨舒緩不能飛。故曰舒鳥。(李時珍) 按格物論云。鴨雄者綠頭。文翅。雌者黃斑色。但有純黑純白者。又有白而烏骨者。藥食更佳。鴨皆雄精雌鳴。重陽後乃肥。脂味美。清明後生卵。則內陷

不滿。伏卵聞磨磨之聲。則孵而不成。無雄抱伏。則以牛屎壚而出之。此皆物理之不可曉者也。(李時珍) 黃雌鴨爲補最勝。(陶弘景) 白鴨肉最良。黑鴨肉有毒。滑中發冷。利脚氣。不可食。目白者殺人。(孟詵) 腸風下血。人不可食。(吳瑞) 嫩者毒。老者良。尾脾不可食。見禮記。昔有人食鴨肉成瘕。用稗米治之而愈。(李時珍)

【鴨子】即鴨卵之古籍別名。典見綱目。詳「鴨卵」條。【鴨爪稗】即稗子之古籍別名。典見綱目。詳「稗」條。

【鴨汁粥】基本 本品係以鴨肉汁和米煮成之粥。主治 消水腫。

【鴨舌】主治 痔瘡。殺蟲。

【鴨舌草】即地膚子之古籍別名。典見圖經本草。詳「地膚子」條。

【鴨血】性質 鹹冷無毒。主治 解毒。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論鴨血曰。熱飲解野葛毒。已死者入鴨卵。活。【明】李時珍本

草綱目論鴨血曰。熱血。解中生金生銀丹石砒霜諸毒。射工毒。又治中惡及溺水死者。灌之。即活。蚯蚓咬瘡。塗之。即愈。

【鴨卵】古籍別名 鴨子。(綱目) 鴨蛋。(俗名)

性質 甘。鹹。微寒。無毒。主治 心腹胸膈熱。

參攷資料 鴨卵多食發冷氣。令人氣短背悶。小兒多食脚軟。鹽藏食之。即宜人。(孟詵) 生瘡毒者食之。令惡肉突出。(陳士良) 鴨卵不可合蟹肉。李子。食害人。合棗食。令人生子不順。(陶弘景)

④今人鹽藏鴨子。其法多端。俗傳小兒泄痢。夾鹹卵食之。亦間有愈者。蓋鴨肉能治痢。而炒鹽亦治血痢。故耳。(李時珍)

【鴨屎草】即常山之古籍別名。典見日華諸家本草。詳「常山」條。

【鴨兒芹】即三葉之原名。詳「三葉」條。

【鴨肪】原名 鴨肪。命名 本品即鴨之脂肪。故名。

製法 凡使鍊過入藥用。

性質 甘。大寒。無毒。主治 風虛寒熱。水腫。

【鴨肺衣】命名 本品即肺腔內之皮。故名。

主治 諸骨哽。炙研水服一錢。即愈。取其消導也。

【鴨青】即野靛青之俗名。詳「野靛青」條。

【鴨屎】原名 白鴨通。性質 冷。無毒。

主治 殺石藥毒。解結縛。散蓄熱。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論鴨屎曰。主熱毒。毒痢。又和雞子白塗熱瘡。腫毒。即消。塗蚯蚓咬亦效。【明】李時珍本草綱目論鴨屎曰。絞汁服。解金銀銅鐵毒。

【鴨屎草】即常山之古籍別名。典見日華諸家本草。詳「常山」條。

【鴨屎礬】即明礬之有雜色如鴨屎者。性質功用。詳「明礬」條。

【鴨涎】主治 小兒疳。頭及四肢皆往後。以鴨涎滴之。又治蚯蚓吹小兒陰腫。取雄鴨抹之。即消。

【鴨蛋】即鴨卵之俗名。詳「鴨卵」

十六畫 鴉 鴉

主治 頭風。目眩。顛倒。癰疾。

主治 癰癩。食之即愈。

【鴉肉】 歷代記述攷證 【明】

李時珍本草綱目論鴉肉曰。食之消雞肉。鴉鴉成積。

【鴉尾草】 即鴉尾之日本名。詳『蒿尾』條。

【鴉骨】 主治 鼻衄不止。取老鴉翅關大骨。微炙研末吹之。

【鴉脚莎】 即蓋草之古籍別名。典見綱目。詳『蓋草』條。

【鴉鴉】 命名 本品狀似鴉而有毛角。故名。

古籍別名 角鴉（說文）怪鴉。

鴉老兔（爾雅） 鈎鴉。鴉鴉。穀鴉。鷹呼。鴉夜食。鷹快扛鳥車載板。

（綱目）鴉木兔（動物學大辭典）

貓頭鷹（俗名）

外國名詞 Scops semitorquatus T. & S. (拉丁) Feathered-toed (英) ミツク或オホノ

ハツク（日本）

基本 係脊椎動物鳥類猛禽

類鴉科之鴉鴉。

產地 出山野森林間。

形態 鴉鴉爲山禽類之一種。其頭圓上嘴鈎曲。尖端銳。以覆下嘴。眼圓大。周圍有毛。眼頭之兩旁有角。羽突出如耳。頭形似貓。體色概淡褐。多黑斑。後頸有蒼色闊紋。足趾亦被羽毛。爪銳利。與嘴俱黑。晝伏夜出。能於暗中視物。捕小鳥。兔。鼠爲食。其肝法術家用之內可供藥用。

性質 酸。微鹹。有小毒。

主治 癰疾。去毛腸。油燉食。風虛。眩暈。麥食。以骨燒存性。酒服。

參攷資料 鴉鴉肉酒煮焙乾。同大鐵鑊攤薄。荷上蒸爛。和薯蕷。搗焙。爲細末。空腹酒下。能治傳屍勞瘵者。蓋取陰毒毒味。以殺陰毒之蟲。其功與鴉肝彷彿。古方罕用。

（醫學大辭典）

【鴉龜】 即攝龜之古籍別名。典見本草集註。詳『攝龜』條。

原名 鴉。

命名 本品鳴聲唧唧。故名曰鴉。

古籍別名 鴉（別錄）舒鳧。

（爾雅）家鳧。鴉鴉（廣雅）

基本 係水禽類鴨屬之內。

形態 鴨爲禽類之一。有家野之分。家畜者其頸長。嘴扁平。尾脚皆短。兩翼皆小。拙於飛翔。趾有連蹼。善游泳。恒棲於海川池沼。雄者頭綠。文翅。雌者黃斑。色亦有純黑純白者。性木鈍。產卵不擇地。其肉既可供食。亦可供藥用。

採取 秋冬兩季採用之良。

製法 凡藥用以老而白者。及白而烏骨者更佳。

用法 煮取汁。或焙乾研到和藥。

性質 甘。大寒。無毒。

效能 滋陰。補虛。用作滋補強壯藥。

主治 補虛。除客熱。和臟腑及水道。療小兒驚風。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論鴨肉曰。頭生瘡腫。和葱豉煮汁飲之。去卒然煩熱。宋日華諸家本草論鴨肉曰。解丹毒。止熱痢。明李士材本草圖解論鴨肉曰。鴨味甘。性平。主虛勞。骨蒸。惟白毛黑嘴者。方有其功。取金肅水寒之象也。嫩者毒。老者良。清黃宮繡本草求真論鴨肉曰。鴨肉氣

味甘溫。遇火而生。啖水而長。未出卵時。先得火氣。故不彈冰雪。偏喜淫雨。而尾腭臃腫。最甚。故羣雌一被其氣。皆得化生之機。不待鳩尾之逼也。溫中補虛。扶陽利水。是其本性。此主性溫而言者也。有言其性微冷。能入肺腎血分。滋陰補虛。除癆。止嗽。化痰利水。消腫爲要服之陰虛。亦不見燥。陽虛亦不見冷。非其性平。烏能若是乎。但雌則微溫。而雄則微冷。不可不辨。若黑骨白毛者。爲虛勞聖藥。亦金水相生之義耳。老者良。鴨血解金銀丹石砒霜百毒。及中惡溺死者。清王士雄隨息居飲食譜論鴨肉曰。鴨甘涼。滋五臟之陰。清虛勞之熱。補血行水。養胃生津。止嗽息。爲消蠶癭積。雄而肥大。極老者良。同火腿海參煨食。補力尤勝。多食滯氣滑腸。凡陽虛脾弱。外感未清。痞脹脚氣。便溏風。皆忌之。

配合應用 ①白鳳膏。葛可久云。治久虛發熱。咳嗽吐痰。咳血。火乘金位者。用黑嘴白鴨一隻。取血入溫酒量飲。使直入肺經。以酒補之。將鴨乾搗去毛。脇下開竅。去腸

味甘溫。遇火而生。啖水而長。未出卵時。先得火氣。故不彈冰雪。偏喜淫雨。而尾腭臃腫。最甚。故羣雌一被其氣。皆得化生之機。不待鳩尾之逼也。溫中補虛。扶陽利水。是其本性。此主性溫而言者也。有言其性微冷。能入肺腎血分。滋陰補虛。除癆。止嗽。化痰利水。消腫爲要服之陰虛。亦不見燥。陽虛亦不見冷。非其性平。烏能若是乎。但雌則微溫。而雄則微冷。不可不辨。若黑骨白毛者。爲虛勞聖藥。亦金水相生之義耳。老者良。鴨血解金銀丹石砒霜百毒。及中惡溺死者。清王士雄隨息居飲食譜論鴨肉曰。鴨甘涼。滋五臟之陰。清虛勞之熱。補血行水。養胃生津。止嗽息。爲消蠶癭積。雄而肥大。極老者良。同火腿海參煨食。補力尤勝。多食滯氣滑腸。凡陽虛脾弱。外感未清。痞脹脚氣。便溏風。皆忌之。

配合應用 ①白鳳膏。葛可久云。治久虛發熱。咳嗽吐痰。咳血。火乘金位者。用黑嘴白鴨一隻。取血入溫酒量飲。使直入肺經。以酒補之。將鴨乾搗去毛。脇下開竅。去腸

味甘溫。遇火而生。啖水而長。未出卵時。先得火氣。故不彈冰雪。偏喜淫雨。而尾腭臃腫。最甚。故羣雌一被其氣。皆得化生之機。不待鳩尾之逼也。溫中補虛。扶陽利水。是其本性。此主性溫而言者也。有言其性微冷。能入肺腎血分。滋陰補虛。除癆。止嗽。化痰利水。消腫爲要服之陰虛。亦不見燥。陽虛亦不見冷。非其性平。烏能若是乎。但雌則微溫。而雄則微冷。不可不辨。若黑骨白毛者。爲虛勞聖藥。亦金水相生之義耳。老者良。鴨血解金銀丹石砒霜百毒。及中惡溺死者。清王士雄隨息居飲食譜論鴨肉曰。鴨甘涼。滋五臟之陰。清虛勞之熱。補血行水。養胃生津。止嗽息。爲消蠶癭積。雄而肥大。極老者良。同火腿海參煨食。補力尤勝。多食滯氣滑腸。凡陽虛脾弱。外感未清。痞脹脚氣。便溏風。皆忌之。

味甘溫。遇火而生。啖水而長。未出卵時。先得火氣。故不彈冰雪。偏喜淫雨。而尾腭臃腫。最甚。故羣雌一被其氣。皆得化生之機。不待鳩尾之逼也。溫中補虛。扶陽利水。是其本性。此主性溫而言者也。有言其性微冷。能入肺腎血分。滋陰補虛。除癆。止嗽。化痰利水。消腫爲要服之陰虛。亦不見燥。陽虛亦不見冷。非其性平。烏能若是乎。但雌則微溫。而雄則微冷。不可不辨。若黑骨白毛者。爲虛勞聖藥。亦金水相生之義耳。老者良。鴨血解金銀丹石砒霜百毒。及中惡溺死者。清王士雄隨息居飲食譜論鴨肉曰。鴨甘涼。滋五臟之陰。清虛勞之熱。補血行水。養胃生津。止嗽息。爲消蠶癭積。雄而肥大。極老者良。同火腿海參煨食。補力尤勝。多食滯氣滑腸。凡陽虛脾弱。外感未清。痞脹脚氣。便溏風。皆忌之。

味甘溫。遇火而生。啖水而長。未出卵時。先得火氣。故不彈冰雪。偏喜淫雨。而尾腭臃腫。最甚。故羣雌一被其氣。皆得化生之機。不待鳩尾之逼也。溫中補虛。扶陽利水。是其本性。此主性溫而言者也。有言其性微冷。能入肺腎血分。滋陰補虛。除癆。止嗽。化痰利水。消腫爲要服之陰虛。亦不見燥。陽虛亦不見冷。非其性平。烏能若是乎。但雌則微溫。而雄則微冷。不可不辨。若黑骨白毛者。爲虛勞聖藥。亦金水相生之義耳。老者良。鴨血解金銀丹石砒霜百毒。及中惡溺死者。清王士雄隨息居飲食譜論鴨肉曰。鴨甘涼。滋五臟之陰。清虛勞之熱。補血行水。養胃生津。止嗽息。爲消蠶癭積。雄而肥大。極老者良。同火腿海參煨食。補力尤勝。多食滯氣滑腸。凡陽虛脾弱。外感未清。痞脹脚氣。便溏風。皆忌之。

味甘溫。遇火而生。啖水而長。未出卵時。先得火氣。故不彈冰雪。偏喜淫雨。而尾腭臃腫。最甚。故羣雌一被其氣。皆得化生之機。不待鳩尾之逼也。溫中補虛。扶陽利水。是其本性。此主性溫而言者也。有言其性微冷。能入肺腎血分。滋陰補虛。除癆。止嗽。化痰利水。消腫爲要服之陰虛。亦不見燥。陽虛亦不見冷。非其性平。烏能若是乎。但雌則微溫。而雄則微冷。不可不辨。若黑骨白毛者。爲虛勞聖藥。亦金水相生之義耳。老者良。鴨血解金銀丹石砒霜百毒。及中惡溺死者。清王士雄隨息居飲食譜論鴨肉曰。鴨甘涼。滋五臟之陰。清虛勞之熱。補血行水。養胃生津。止嗽息。爲消蠶癭積。雄而肥大。極老者良。同火腿海參煨食。補力尤勝。多食滯氣滑腸。凡陽虛脾弱。外感未清。痞脹脚氣。便溏風。皆忌之。

味甘溫。遇火而生。啖水而長。未出卵時。先得火氣。故不彈冰雪。偏喜淫雨。而尾腭臃腫。最甚。故羣雌一被其氣。皆得化生之機。不待鳩尾之逼也。溫中補虛。扶陽利水。是其本性。此主性溫而言者也。有言其性微冷。能入肺腎血分。滋陰補虛。除癆。止嗽。化痰利水。消腫爲要服之陰虛。亦不見燥。陽虛亦不見冷。非其性平。烏能若是乎。但雌則微溫。而雄則微冷。不可不辨。若黑骨白毛者。爲虛勞聖藥。亦金水相生之義耳。老者良。鴨血解金銀丹石砒霜百毒。及中惡溺死者。清王士雄隨息居飲食譜論鴨肉曰。鴨甘涼。滋五臟之陰。清虛勞之熱。補血行水。養胃生津。止嗽息。爲消蠶癭積。雄而肥大。極老者良。同火腿海參煨食。補力尤勝。多食滯氣滑腸。凡陽虛脾弱。外感未清。痞脹脚氣。便溏風。皆忌之。

味甘溫。遇火而生。啖水而長。未出卵時。先得火氣。故不彈冰雪。偏喜淫雨。而尾腭臃腫。最甚。故羣雌一被其氣。皆得化生之機。不待鳩尾之逼也。溫中補虛。扶陽利水。是其本性。此主性溫而言者也。有言其性微冷。能入肺腎血分。滋陰補虛。除癆。止嗽。化痰利水。消腫爲要服之陰虛。亦不見燥。陽虛亦不見冷。非其性平。烏能若是乎。但雌則微溫。而雄則微冷。不可不辨。若黑骨白毛者。爲虛勞聖藥。亦金水相生之義耳。老者良。鴨血解金銀丹石砒霜百毒。及中惡溺死者。清王士雄隨息居飲食譜論鴨肉曰。鴨甘涼。滋五臟之陰。清虛勞之熱。補血行水。養胃生津。止嗽息。爲消蠶癭積。雄而肥大。極老者良。同火腿海參煨食。補力尤勝。多食滯氣滑腸。凡陽虛脾弱。外感未清。痞脹脚氣。便溏風。皆忌之。

【鰩】即瓦楞子之古籍別名。典見劉珣表錄。詳「瓦楞子」條。

【鮓】即比目魚之古籍別名。典見上林賦。詳「比目魚」條。

【鮓】即比目魚之別名。典見動物學大辭典。詳「比目魚」條。

【鮓魚】即嘉魚之古籍別名。典見綱目。詳「嘉魚」條。

【鴛鴦】**命名** 本品雄曰鴛。雌曰鴦。終日並游。有宛在水中央之意。故名。

古籍別名 黃鴨。匹鳥。綱目。

外國名詞 Aix galericulata L. (拉丁) Manarin duck (英) Brantente (德) オシドリ 或ラシドリ (日本)

基本 係脊椎動物鳥類游禽類鴨亞科。爲鴛鴦之肉。

形態 鴛鴦爲水禽類之一種。形似鴨而小。嘴扁頸長。翼長能飛。趾有蹼。雄者羽毛美麗。頭有紫黑色毛冠。翼之上部有黃褐色飾羽。一對形如銀杏葉。嘴紅足黃。其雌者之羽毛不及雄者鮮美。全體蒼褐。腹胸間有白斑。常偶居池沼其肉可供食與藥用。

【鴛鴦木鼈】即天越草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「天越草」條。

【鴛鴦梅】即梅花之一蒂雙實者。功用詳「梅實」條。

【鴛鴦菊】即草烏頭之古籍別名。典見綱目。詳「草烏頭」條。

【鴛鴦藤】即忍冬藤之古籍別名。



鴛 鴦

性質 鹹。平。有小毒。

主治 諸癰疥癤以酒浸。炙令熱。傅貼瘡上。冷即易。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論鴛鴦肉曰。清酒炙食。治瘰癧。作羹。臘食之。令人肥麗。夫婦不和者。私與食之。即相愛憐。【唐】孫思邈千金翼論鴛鴦肉曰。炙食。治夢寐思慕者。

參攷資料 鴛鴦肉多食。令人患大風。【子孟詵】

產地 山野及森林間多有之。

形態 鴛鴦爲山禽類之一種。形圓嘴短。上嘴鈎曲。覆被下嘴。眼大。緣邊環生硬羽。鼻孔隱於粗毛間。頭頂濃褐。顏面灰色。體之上部。色灰而有褐色條紋。肩部各羽色。亦有褐色細條紋。而外。背白色。翼。尖白。又有淡褐色條紋。尾羽淡褐。有不規則之斑點。其羽輕軟。飛時無聲。晝伏夜出。覓食昆蟲。小鳥。桑椹等物。其肉可供藥用。

性質 甘。溫。無毒。

主治 鼠瘻。炙食之。

典見綱目。詳「忍冬藤」條。

【鴛鴦】即鴛鴦之古籍別名。典見綱目。詳「鴛鴦」條。

古籍別名 梟鴞。土梟。【鴞】

附雅。山鴞。鴞。【國史】

【漢書】訓狐。拾遺。流離。【詩經】

【鴞】魂。幸。胡。梟。【綱目】

外國名詞 Strix uralensis Pail (拉丁) Owl 或 Ural owl (英) Eule (德) フクロフ 或 フクロ (日本)

基本 係脊椎動物鳥類猛禽類鴞科。

產地 山野及森林間多有之。

形態 鴞爲山禽類之一種。形圓嘴短。上嘴鈎曲。覆被下嘴。眼大。緣邊環生硬羽。鼻孔隱於粗毛間。頭頂濃褐。顏面灰色。體之上部。色灰而有褐色條紋。肩部各羽色。亦有褐色細條紋。而外。背白色。翼。尖白。又有淡褐色條紋。尾羽淡褐。有不規則之斑點。其羽輕軟。飛時無聲。晝伏夜出。覓食昆蟲。小鳥。桑椹等物。其肉可供藥用。

性質 甘。溫。無毒。

主治 鼠瘻。炙食之。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論鴞肉曰。風癰瘰癧。食病。取初生無毛者。一對。黃泥固濟。煨存性。爲末。酒服。

【鴞目】 **主治** 吞之。令人夜視見物。

【鴞頭】 **主治** 痘瘡。黑陷。用臘月者一二枚。燒灰。酒服。之。當起。

【鴞】 **命名** 鴞字篆文形象。故名。

古籍別名 雀鴞。【詩疏】鴞。【詩經】

【爾雅】擊正隼。隼。【綱目】

形態 鴞爲山禽類之一種。其體圓。嘴短而大。上嘴鈎曲。翼長大。張度至四尺許。飛時若靜懸空中。喜迴旋作大環。尾常開展。或平。或傾側。以調節其勢。尖端頗廣。頭色稍白。有暗黑色條紋。背部赤褐。下部呈褐色。棲人家近處。常食蛇鼠。雞雛等。及腐敗之肉。其頭可供藥用。肉。詳見各條。

採取 入藥以雄者良。

製法 凡使須微炙用。

性質 鹹。平。無毒。

十六鰓鮑 鮑鮮鮑網鮑缺鮑

血。血瘰。在四肢不聚者。女子崩中血不止。

歷代記述攷證

【明】李時珍本草綱目論鮑魚肉曰。黃汁治女子血枯病傷肝利腸同麻仁。豉豉煮羹通乳汁。

參攷資料

古言傳鮑魚爲人體重要之健康要素。日人白根敏郎氏。發見鮑魚對於不治之肺病有非常之效果。此可怕之亡國肺病。謂有全愈之可能。是否鑒實可信。則未敢必。茲將其事實約略介紹於下。白根氏在廿年前。慨國產鮑魚有多量之營養素。而其極優秀之肉盾。輸出甚少。懷發奮研究之決心。遂想單身視察中國及美國之沿岸。後因在大磯創立鮑魚研究所而作罷論。但其時偶然發見鮑魚中有名福鮑之一種。中含福壽。該物在人體中。助白血球之活動。有極大撲滅結核菌之作用。其結果。重惡之肺病。可治愈於一個月左右。可怕之肺病。在此情形之下。可謂不足懼矣。未略血及下痢氣味之肺結核。極易治愈。此種症狀。卽至二三期亦無妨礙。但血

腺血炎之程度至略血。及喉頭結核。腸結核。腎臟結核。膀胱結核。辜丸結核等。雖在初期。難在一月中治愈之。雖然。因體質之不同。自服用始經四五日後。卽現效果者。再越二十日。其效能始能顯著。此爲患者表面的簡單之作用。在殺菌程度。無甚變化。但因病症之驟然輕重。在全身有衰弱程度之差異者。全瘡上當然有多少之差異。

鮑魚頭

主治 黃汁治眼目。燒灰療疔腫。瘟氣。

【鮑魚】卽鮑魚之古籍別名。典見綱目。詳「鮑魚」條。

鮑魚

古鑑別名 石蠶。馬蠶。石緒丹。(和漢藥考)

基本 係牛馬腸內之結石。由生病或食物等關係而生者。

產地 鮑魚不僅生於牛馬腸中。凡諸獸腸內亦往往生之。例如

有鐵片等入腸內。則漸次重疊。生成一石質塊。和漢藥考曰。在習慣上。則概稱爲馬蠶石者。卽鮑魚也。

形態 鮑魚形狀大小不一。小者如豆。大者如雞卵。更有大如西瓜者。其實質或重或輕。未有一定。

外觀作灰色。油色。褐色。黑色等。剖之。單有過文。輕虛者中有褐色或黃色。毛謂之毛毯。

性質 甘鹹平。無毒。

成分 其無機質爲磷酸鎂。炭酸鈣。炭酸鎂等。

效能 用治驚癇癰癰。

主治 驚癇癰癰。

國外學說 增補手板發蒙曰。鮑魚來自渤泥。巴爾齊亞。應帝亞等國者。謂之「柏曹亞魯斯典」。俗謂之「歌依沙拉末沙拉」。卽撞達石也。作黃褐色而有光。刮而燒之有香氣。乃駝羊腹中鮑魚。非出自牛馬腹中。原名「末沙魯」。誤呼

「末沙拉」。又和漢三才圖會曰。自阿蘭陀來。其形如鳥卵。長寸許。淺褐色。潤澤。似石。非石。重可五六錢。研磨之。有層層理。如卷成者。主治痘瘡危症。解諸毒。俗傳云。緩爲獵人所傷。其疵痕成贅肉塊。實則此亦鮑魚也。俗說不可信。

參攷資料 鮑魚生走獸及牛馬諸畜肝膽之間。有肉囊裹之多至升許。大者如雞子。小者如栗。如榛。其狀白色。似石。非石。似骨。非

一七四八

骨。打破層疊。嘉靖庚子年。蘇州侯屠殺一黃牛。得此物。人無識者。有番僧云。此至寶也。牛馬諸畜皆有之。可以祈雨。西域有密呪。則霖雨立至。不知呪者。但以水浸撥弄。亦能致雨。後考陶九成輟耕錄所載鮑魚。卽此物也。其言曰。蒙古人禱雨。惟以淨水一盆。浸石子數枚。淘漉玩弄。密持呪語。良久。輒雨。石子名鮑魚。大者如雞卵。小者不等。乃走獸腹中所產。獨牛馬者最良。蓋牛黃狗寶之類也。又按京房易占曰。兵強主武。則牛腹生石。據此則鮑魚狗寶同一類也。但生於狗腹者爲狗寶耳。(李時珍) 鮑魚卽馬寶真者難得。主治癲癰。(李士材)

【鮑魚】卽鮑魚之古籍別名。典見綱目。詳「鮑魚」條。

【鮑魚】卽鮑魚之古籍別名。典見綱目。詳「鮑魚」條。

【鮑魚】卽鮑魚之古籍別名。典見綱目。詳「鮑魚」條。

【鮑魚】卽鮑魚之古籍別名。典見綱目。詳「鮑魚」條。

【鮑魚】卽鮑魚之古籍別名。典見綱目。詳「鮑魚」條。

【鮑魚】卽鮑魚之古籍別名。典見綱目。詳「鮑魚」條。

【鮑魚】卽鮑魚之古籍別名。典見綱目。詳「鮑魚」條。

【鮑魚】卽鮑魚之古籍別名。典見綱目。詳「鮑魚」條。

【鮑魚】卽鮑魚之古籍別名。典見綱目。詳「鮑魚」條。

【鮑魚】卽鮑魚之古籍別名。典見綱目。詳「鮑魚」條。

【鮑魚】卽鮑魚之古籍別名。典見綱目。詳「鮑魚」條。

【鮑魚】卽鮑魚之古籍別名。典見綱目。詳「鮑魚」條。

【鮑魚】卽鮑魚之古籍別名。典見綱目。詳「鮑魚」條。

【鮑魚】卽鮑魚之古籍別名。典見綱目。詳「鮑魚」條。

【鮑魚】卽鮑魚之古籍別名。典見綱目。詳「鮑魚」條。

【鮑魚】卽鮑魚之古籍別名。典見綱目。詳「鮑魚」條。

【鮑魚】卽鮑魚之古籍別名。典見綱目。詳「鮑魚」條。

【鮑魚】卽鮑魚之古籍別名。典見綱目。詳「鮑魚」條。

【鮑魚】卽鮑魚之古籍別名。典見綱目。詳「鮑魚」條。

【鮑魚】卽鮑魚之古籍別名。典見綱目。詳「鮑魚」條。

【鮑魚】卽鮑魚之古籍別名。典見綱目。詳「鮑魚」條。

【鮑魚】卽鮑魚之古籍別名。典見綱目。詳「鮑魚」條。

【鮑魚】卽鮑魚之古籍別名。典見綱目。詳「鮑魚」條。

十六畫 錫

隨 霍 錠 頭 賴 頻 餞 鋪 餘 駱

一七四六

形鑑

錫爲金類金屬原質之一種由天產之錫石內提取之白色光如銀質硬於鉛但黏韌而易融解置空氣中及水中皆不蝕可供工業中之需用以製器具亦可供藥用

性質 甘寒微毒 惡毒風瘡

參攷資料 錫遇羚羊角五

靈脂則伏遇伏龍肝馬鞭草則縮遇礞砂則硬遇巴豆蓖麻薑汁地黃則伏(獨孤酒) 洪遇夷堅志云汝人多病癭地饒風沙沙入井中飲其水則生癭故金房間人家以錫爲井閘皆夾錫錢填之或洗錫井中乃免此患(李時珍)

錫悵脂

基本 本品乃波斯國之銀銖也

古籍別名 悉蘭脂(綱目)

主治 目生翳膜用火燒銅針輕點乃傳之不痛又主一切風氣及三焦消渴飲水煎入丸藥用

錫蛇 卽金蛇之古籍別名典見綱目詳金蛇條

錫銅鏡鼻 卽古鏡鼻之原名詳古鏡鼻條

古鏡鼻條

【錫蘭椰子】卽椰子之古籍別名典見植物學大辭典詳椰子條

【隨岐伯】卽白石脂之古籍別名典見吳普本草詳白石脂條

【隨風子】卽訶子熟後隨風飄墮者典見嘉祐圖經本草詳訶子條

【隨脂】卽麥門冬之古籍別名典見吳普本草詳麥門冬條

【隨湯給事中】卽甘遂之古籍別名典見和漢藥考詳甘遂條

【霍山石斛】卽石斛之處方用名詳石斛條卽霍石斛之處方用名詳霍石斛條

【霍石斛】處方用名 霍山石斛風石斛

產地 出江南霍山

形態 較欒斛細小色黃而形曲不直有成穗者

性質 甘平味鹹無毒

主治 清胃除虛熱生津已勞損定驚療風能鎮涎痰解暑甘芳降氣

辨偽 風斛真者甚少市買每以風蘭根僞充但風蘭形直不縮色青黯嚼之不黏齒味微辛石斛

則嚼之微有漿黏齒味甘微鹹形縮者眞

參攷資料 石斛近時有一種形短祇寸許細如燈心色青黃咀之味甘微有滑涎係出六安州及潁州府霍山縣名霍山石斛最佳咀之無涎者係生木上不可用其功長於清胃熱惟胃腎有虛熱者宜之虛而無火者忌用(百草鏡) 集驗良方長生丹用甜石斛卽霍石斛也范瑤初云霍山屬六安州其地所產石斛名米心石斛以其形如累米多節類竹鞭乾之成團他產者不能米心亦不成團也(年希堯) 本草多言石斛甘淡入脾鹹平入胃今市中金欒及諸斛俱苦而不甘性亦寒且形不似金欒當以霍斛爲眞金欒斛(陳延慶)

【霍石斛】卽石斛之處方用名詳石斛條

【石斛條】

【錠花】卽青黛之古籍別名典見綱目詳青黛條

【頭痛花】卽羌花之古籍別名典見綱目詳羌花條

【頭黃】卽煙草葉之次於蓋露者

性質功效與煙草葉同詳煙草葉條

【頭顏骨】卽天蠟蓋之古籍別名典見和漢藥考詳天蠟蓋條

【賴蛇珠】卽荔枝之古籍別名典見和漢藥考詳荔枝條

【賴婆】卽蘋果之古籍別名典見綱目詳蘋果條

【俄馬黃】卽鹿藿之俗名詳鹿藿條

【舖】卽飴餠之古籍別名典見和漢藥考詳飴餠條

【餘子】卽山藥之古籍別名典見和漢藥考詳山藥條

【餘甘子】卽菴摩勒之古籍別名典見唐本草詳菴摩勒條

【餘泉】卽貝子之古籍別名典見和漢藥考詳貝子條

【餘容】卽白芍之古籍別名典見別錄詳白芍條

【餘糧】卽遠志之古籍別名典見和漢藥考詳遠志條

【餘糧石】卽馬餘糧之處方用名詳馬餘糧條

駱駝 原名駝

古籍別名 駝駝(漢

月水不利。搗汁。酒服之。

十六畫
醞

鐵包生鐵。泥封鍊。令相入。謂之團。

鑿
 醒
 鋸
 鋼
 錄
 錐
 錢
 錦
 錫

遠山巖間鎮安歸順柳州皆有之。

錫
古鑑別名
白鑑
網目

典見植物名實圖考。詳「白頭翁」條。

【貓頭骨】 性質 甘溫。無毒。 主治 鬼注。瘰癧。心腹痛。殺蟲。治疳。及瘰癧變黑。癰癰。鼠瘻。惡瘡。

參攷資料 古方多用狸。今人多用貓。雖是二種。性氣相同。故可通用。孫氏治痘瘡倒靨。用人貓。豬犬四頭骨。方見人類（李時珍）

【貓頭鷹】 即鴟鵂之俗名。詳「鴟鵂」條。

【貓薊】 即大薊之古籍別名。典見本草集註。詳「大薊」條。

【蝮蛇】 即蝮蛇之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蝮蛇」條。

【賴師草】 即荔枝草之古籍別名。典見本草藥方。詳「荔枝草」條。

【經紋】 即臘脂之古籍別名。典見綱目。詳「臘脂」條。

【諸丹】 即鮮苔之古籍別名。典見和漢藥考。詳「鮮苔」條。

【赭魁】 命名 本品其根如魁。魁乃酒器。有汁如諸故名。

產地 生山野間。

形態 赭魁為蔓草類之一種。葉似羅羅。根如魁。皮紫黑。肉黃赤。可供藥用。

性質 甘平。無毒。 主治 心腹積聚。除三蟲。

【輭石膏】 即石膏之鬆柔易碎者。詳「石膏」條。

【辦佐匪酸】 即安息香之西名。詳「安息香」條。

【辨慶草】 即景天之古籍別名。典見和漢藥考。詳「景天」條。

【遺尿窩】 即桑螵蛸之古籍別名。典見和漢藥考。詳「桑螵蛸」條。

【遼參】 原名 遼東參。基本 本品即人參產於遼東各地者。

古籍別名 紅旗參。產地 出奉天。吉林等處。

形態 遼參形似人參。其根黃潤。纖長。子粒大如黃豆。根可供藥用。

性質 甘。微寒。無毒。 主治 補五臟。安精神。定魂魄。止驚悸。除邪氣。明目。開心。益智。久服輕身延年。

近人學說 張山雷曰。遼參產

於遼瀋。即奉天。吉林等處。地屬北方陰寒之域。且其秉性背陽而向陰。氣味皆清。色淡黃或白。故稟陰凝之氣。而微寒。功能養陰。而清虛火。今用之於陰虛。有火。及吐衄失血後之宜於清養。或汗家。失精家。陰液耗損。虛陽偏熾者。甚有經驗。

以遼參稟性向陰。味甘而微苦。確含有清淨性質。多見風日則易旺。喜陰惡陽。尤其明證。故富有養液而為補陰之最。脫血脫汗失精家。宜之固也。而肺燥乾咳。胃枯燥渴。或乾嘔呃逆者。皆賴以滋液生津。而無寒降戕伐。黏膩濁滯之弊。功在沙參。玉竹。二冬。二母之上。奚啻倍蓰。此其稟中和之氣。不升不降。不倚不偏。所以可貴。或以有為陽藥而補陽者。固非。即以有為補氣而能挽回元氣者。亦妄也。

【遼參條】 基本 本品係生於遼參蘆上之橫條。

主治 生津止渴。

參攷資料 遼參條。得參之餘氣。其力甚薄。止可調理常病。性能橫行手臂。凡指臂無力者。服之甚效。（本草從新）

【遼參鬚】 基本 本品即生遼參蘆上較其橫條而更細如鬚者。

性質 苦。無毒。 主治 胃虛嘔逆。咳嗽。失血。

配合應用 治脚瘡濕爛。同芽茶等分。研末。搽之。

① 固牙補腎。用生熟石膏各五錢。甘松。山桑。各三錢。細辛。三錢。寒水石。二錢。升麻。一錢五分。青楓參鬚。各三錢。北五味子。五十粒。畢澄茄。四十五粒。共研末。每晨擦牙。漱口。甚效。（祝氏方）

參攷資料 遼參鬚性與參條相同。而力尤薄。（本草從新）

遼參鬚性專下行。若久痢滑精。崩中。下血。每至增劇。以其味苦。降洩也。（逢原）

【遼葉】 即藥葉之古籍別名。典見綱目。詳「藥葉」條。

【遼葉】 即藥葉之古籍別名。典見黨參新研究。詳「黨參」條。

【醒醐】 基本 本品出酥中。乃酥之精液。

製法 以好酥一石熬之。可得醍醐三四升。盛冬不凝。盛夏不融。

參攷資料 莫際華云。胃脘痛。非服貓胞不能除根。金御乘云。貓胞衣。凡患小產婦於產後。或爲糞。或爲末服。即不小產。(綱目拾遺)

【貓涎】 主治 療癰。刺破塗之。

【貓眼睛】 主治 療癰。鼠瘻。燒灰。并華水服方寸匕。日三。

【貓睛石】 產地 雲南。緬甸。寶井中多有之。

古籍別名 貓兒眼。
主治 解蟲毒。

參攷資料 宣和閩外夷貢方。有石圓如龍眼實。色若綠葡萄。號貓眼睛。能息火。燃炭方熾。投之即滅。按此即寶石中又一種貓兒眼也。(墨莊漫錄)

【貓腦】 製法 於紙上陰乾。用。 主治 療癰。鼠瘻。潰爛。同葦草等分爲末。納孔中。

【貓狸】 命名 本品形似貓而穴居。狸伏之獸。故名。 古籍別名 野貓。(綱目)其子名緣。(爾雅)海狸(廣雅)虎狸(正字通)

基本 係脊椎動物哺乳類。有胎盤類。食肉類。裂腳類。貓科。爲狸之肉。其骨。脂。肝。尿。陰莖。詳各條。

產地 生山林及原野間之土窟中。

形態 貓狸爲獸類之一種。種類亦多。其體比狐稍小。頭圓。四肢皆短。口吻尖耳短而廣。尾長大。爲總狀。達於足踵。毛褐帶淡黑色。有斑紋。目邊白色。性殘暴。晝伏夜出。捕食魚鼠。尤善竊食雞鶩。其肉可供藥用。

種類 大小如狐。毛雜黃黑。有斑如貓。而頭大尾者爲貓狸。善竊雞鶩。其氣臭。肉不可食。有斑如狸。虎而尖頭方口者爲虎狸。善食蟲鼠果實。其肉不臭可食。似虎狸而尾有黑白錢文相間者爲九節狸。皮可供裘。有文如豹而作麝香氣者爲香狸。即狸貓。

有白面而尾似牛者爲牛尾狸。亦曰玉面狸。喜上樹木。食百果。冬月極肥。人多精爲珍品。大能醒酒。捕畜之鼠。皆帖伏不敢出。似貓狸而絕小。黃斑色。居澤中。食蟲鼠及草根者名汎。海島上有狸頭而

魚尾者爲海狸。

採取 以文如連錢及虎文者入藥用。

性質 甘。平。無毒。

主治 諸症。

歷代記述攷證 【唐】孫思邈千金翼論貓狸肉曰。補中益氣。去遊風。【宋】蘇頌圖經本草論貓狸肉曰。作羹臠。治痔及鼠瘻。不過三頓甚妙。【明】李時珍本草綱目論貓狸肉曰。治溫鬼毒氣。皮中如針刺。

施用宜忌 反藜蘆。

參攷資料 貓狸肉。正月勿食。食之傷神。(孟詵) 貓狸肉。宜留正骨。食去之不利人。(李時珍)

【貓狸肝】 主治 鬼瘻。

【貓狸尿】 採取 五月間。收乾用。 主治 燒灰水服。主鬼癰寒熱。

歷代記述攷證 【唐】孫思邈千金翼論貓狸尿曰。燒灰和臘豬脂。傅小兒鬼頭瘡。

肉。

【貓狸骨】 採取 頭骨尤良。 性質 甘溫。無毒。

主治 風注。尸注。鬼注。毒氣在皮中。淫瀝如針刺著心。腹痛走無常處。及鼠瘻惡瘡。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論貓狸骨曰。炒末。治瘡病。不通飲食。【唐】孟詵食療本草論貓狸骨曰。燒灰水服。治食野鳥肉中毒。頭骨炙研。或燒灰酒服。二錢。治尸注。邪氣。腹痛及痔瘻。十服後見驗。【宋】寇宗奭本草衍義論貓狸骨曰。炙骨和雄黃。麝香爲丸服。治痔瘻。【明】李時珍本草綱目論貓狸骨曰。殺蟲。治疳。癰瘻及燒灰酒服。治一切遊風。

參攷資料 華陀治尸注。有狸骨散。用其頭。(蘇頌) 狸骨。貓骨。性相近。可通用之。衛生寶鑑。治諸風。心補。神應丹。用狸全身。燒過入藥。(李時珍)

【貓狸陰莖】 主治 女人月水不通。男子陰

癰。燒灰。東流水服。

【貓頭花】 即白頭翁之古籍別名。

十六畫 貓

貓油條。

【貓】 命名 鼠害苗而貓捕之。故字從苗而貓乃苗茅二音。其各自呼故名。

古羅馬名 家貓(綱目)
外國名詞 Felis domestica

British (拉丁) (Cat) (英)

基本 係脊椎動物哺乳類有胎盤類食肉類裂腳類貓科。

形態 貓為家畜類之一種。面略圓軀幹長四肢短尾有長短之別耳殼短小末端尖常向前能自由轉動以兜聲。故善聽。眼大瞳孔能感光之強弱而收放。午則收縮如線。夜則放大而圓。唇有鬚。舌面糙密生逆鉤。適於舐食。鼻善嗅。前肢五趾。後肢四趾。皆有伸縮之銳爪。掌部有肉塊如墊。行走無聲。舉動輕捷。毛軟。色有白黑灰褐等。齒凡三十六齒及白齒均發達。善捕鼠。人多畜之。其肉可供藥用。

性質 甘酸溫無毒。

主治 勞注鼠瘻蟲毒。

參攷資料 本草以貓狸為一類註解。然狸肉入食。貓肉不佳。亦不入食品。故用之者稀。胡漫易簡

方云。凡預防蟲毒。自少食貓肉。則蟲不能害。此亦隨書所謂貓鬼野

道之蟲乎。肘後治瘰鼠核腫。或已潰出膿血者。取貓肉如常作羹。空心食之。云不傳之法也。昔人皆以癰子為鼠涎毒所致。此乃淮南子所謂狸頭治癰。及鼠嚼人瘡。又云狐目狸腦。鼠去其穴。皆取其相制之義耳。李時珍。

【貓牙】

主治 小兒疳瘡。倒懸。欲死。同人牙。豬牙。犬牙。燒灰。等分研末。蜜水服一匙。即便發起。

參攷資料 痘瘡歸腎。則變黑。凡牙皆腎之標。能入腎發毒也。內有貓牙。又能解毒。而熱證亦可用云。(李時珍)

【貓牛】 即犛牛之古籍別名。典見漢書。詳「犛牛」條。

【貓古都】 即白頭翁之古籍別名。典見植物名實圖考。詳「白頭翁」條。

【貓皮毛】

主治 瘰癧諸瘻。癰疽潰爛。

【貓舌】

主治 瘰癧鼠瘻。生曬研敷。

【貓舌仙橋】

產地 多生水澤旁。

形態 貓舌仙橋為雜草類之一種。莖面生刺。場地而生。花色青紫。可供藥用。

主治 疥瘡。理黃疸。及一切溼火。

【貓尾血】

主治 急驚風。剪破貓尾。滴血。滾水沖下。

【貓尿】

採取 以薑或蒜擦牙鼻。或生葱紮鼻中。即遺出。

主治

癰腫諸蟲入耳。滴入即出。煎塗蠱毒。整傷及癰偷糞老鼠和井底泥團之立愈。

【貓肝】 主治 勞瘵。殺蟲。取黑貓肝一具。生曬研末。每

朔望五更酒調服之。

【貓兒卵】 即白欽之古籍別名。典見綱目。詳「白欽」條。

【貓兒刺】 即枸骨之古籍別名。典見綱目。詳「枸骨」條。

【貓兒眼】 即貓睛石之別名。詳「貓睛石」條。

【貓兒眼睛草】 即澤漆之古籍別名。典見綱目。詳「澤漆」條。

一七四二

【貓兒頭】 即毛筆之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「毛筆」條。

採取 臘月收乾之。

【貓屎】 製法 凡使以泥固封。燒存性。研用。

主治 燒灰水服。治寒熱。鬼瘧。發無期度者極驗。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論貓屎曰。治痘瘡倒陷。瘰癧潰爛。惡瘡。癰疽。蚊咬。鼠咬。

【貓胎】 主治 療癰疽。泥裏煨。研菜油調搽。

採取 貓將產時。以木枷枷之。恐生出即

【貓胞衣】 木枷枷之。恐生出即為所食。取得焙乾。

主治 反胃吐食。燒灰入硃砂末少許。壓舌下。其效。

配合應用 治腸疳。用貓初生胞衣。以新瓦焙乾。研細末。每服一二分。好酒送下。口含竹筆管。睡恐咬牙及咳嗽。米不下者五六服即愈。(同壽錄方)

治貓胃。貓胞衣三個。好酒洗用豬肉四兩。淡煮。熟服之。數年立效。(鳳聯堂方)

施用宜忌 忌燒酒。

亂病吐下已斷。汗出而厥。四肢厥急。脈微欲絕者。通脈四逆湯加豬膽汁主之。蓋陽氣太虛。陰氣獨勝。純與陽氣。恐陰氣格拒不得入。故加豬膽汁。苦入心而通脈。寒補肝而和陰。不致格拒也。(成無己) 朱奉議治傷寒五六日瘥出。有豬膽雞子湯。(汪機) 方家用豬膽取其寒能勝熱。滑能潤燥。苦能入心。又能去肝膽之火也。(李時珍)

【豬膽皮】 主治 目翳如重者。取皮曝乾。作兩股繩如筋大。燒灰出火毒點之。不過三五度瘥。

【豬橫榔】 卽大腹子之古籍別名。典見新修本草圖經詳「大腹子」條。

【豬藍子】 基本 豬藍子爲雜草類之一種。可供藥用。

主治 聾耳。研末吹之。

【豬脂】 卽豬脂之別名。詳「豬脂」條。

【豬懸蹄甲】 原名 豬退。製法 孫思邈曰。酒浸半日。炙焦用。

性質 鹹。平。無毒。主治 五痔。伏熱在腹中。腸癰內蝕。

參攷資料 豬懸蹄同赤木燒烟薰辟一切惡瘡。(張仲景)

【豬腸】 卽豬腸。詳「豬腸」條。

古籍別名 豬氣子。(綱目) 豬咽舌。(玉靈)

形態 豬鬃在豬喉系下。肉團一枚。大如棗。微扁。色紅者。是可供藥用。

主治 項下瘰癧。瓦焙研末。每夜酒服一錢。

性質 甘。寒。無毒。主治 撲損惡瘡。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論豬髓曰。塗小兒解顛頭瘡及腫。眉瘡癩疥。服之補骨髓。益虛勞。

參攷資料 按丹溪治虛損補陰。凡多用豬骨髓和丸。取其通腎命。以骨入骨。以髓補髓也。(李時珍)

【豬獾】 原名 獾。命名 獾屬也。其狀圓肥。故名。

古籍別名 權純。(本草拾遺)

基本 係脊椎動物哺乳類有胎盤類。有蹄類。野豬科之獾。產地 山野間處處有之。

形態 豬獾爲獸類之一種。其形似豬而喙尖。足尾皆短。前肢有銳爪。便以掘地。毛黃褐色。脊上有黑毛一道。體肥行鈍。性甚敏捷。穴土而居。夜出覓食小動物及瓜果。其肉可供食與藥用。

性質 甘。酸。平。無毒。主治 水脹久不瘥。垂死者。作羹食之。下水大效。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論豬獾肉曰。服丹石動熱。下痢赤白。久不瘥。煮肉露一宿。空腹和醬食。一頓卽瘥。瘦人煮和五味食。長肌肉。【明】吳瑞日用本草論豬獾肉曰。治上氣虛乏。咳逆。勞熱和五味煮食。

【豬獾胞】 主治 蠱毒。以臘月乾者。湯摩如雞子許。空腹服之。

【豬獾脂】 原名 獾油。基本 本品卽豬獾之脂肪油。

主治 塗一切內外痔瘡。和酒服。止咳。血胸中噎噎。休休如蟲行。及以火燒。擦頭上白禿。並煎服。拘杞子湯。能生髮。入膏中用。能拔溼。又解蟻蠅蟲毒。

參攷資料 豬獾脂油。舊時煉廠作地燈。非此不可。他油輒爲地風吹滅。惟豬油作燈。能禦地風也。(趙學敏)

【豬獾脂膏】 主治 蟻蠅蟲毒。胸中噎噎。休休如蟲行。如蟲行。咳血。以酒和服。或下或吐。或自消也。

【豬獾骨】 主治 上氣咳嗽。多研酒服。三合。日二取。

【眼肉】 卽豬肉之古籍別名。典見綱目。詳「豬肉」條。

【眼鼠矢】 卽鼠糞之處方用名。詳「鼠糞」條。

【眼豬肉】 卽豬肉之處方用名。詳「豬肉」條。

【眼豬屎】 卽豬糞之古籍別名。典見本經。詳「豬糞」條。

【獾】 卽豬獾之原名。詳「豬獾」條。

【獾油】 卽豬獾油之原名。詳「豬獾」條。

十六畫 豬

【治】 一切瘡毒。箭傷。研細酒服。并塗之。

【豬腰子】 卽豬腎之原名。詳『豬腎』條。

【豬腸】 性實 甘。微寒。無毒。
【治】 虛渴。小便數。補下焦虛竭。

【歷代記述攷證】 【唐】孫思邈

千金翼論豬腸曰。洞腸。治洞腸。挺

出下血。【宋】日華諸家本草論豬

腸曰。止小便。【宋】蘇頌經本草

論豬腸曰。去大小腸風熱。宜食之。

【明】李時珍本草綱目論豬腸曰。

潤腸治燥。調血痢。職毒。

【豬零】 卽豬耆之古籍別名。典

見和漢藥考。詳『豬耆』條。卽豬

屎之原名。詳『豬屎』條。

【豬膏】 卽豬脂之處方用名。詳『

【豬膏母草】 卽豬鬚草之古籍別名。

性實 辛苦。平。

【治】 金瘡。止痛。斷血。生肉。除

諸惡瘡。消浮腫。搗封之。湯潰散傳

【豬鼻唇】 性實 甘。鹹。微寒。無

【治】 上唇。治凍瘡。瘡痒。

【歷代記述攷證】 【宋】寇宗奭

本草衍義論豬鼻唇曰。煎湯。調蜀

椒目末半錢。夜服。治盜汗。【明】李

時珍本草綱目論豬鼻唇曰。鼻治

目中風翳。燒灰水服。

【參攷資料】 豬鼻唇。多食動氣。

【豬槽頭肉】 卽豬項肉之別名。詳

【豬項肉】條。

【豬膚】 基本 本品卽豬膚草

性實 甘寒。無毒。

【治】 少陰下痢。咽痛。

【參攷資料】 少陰下痢。咽痛。

【豬頤】 卽豬頤之別名。詳『豬頤』

條。

【豬齒】 性實 甘。平。

【治】 小兒驚癇。五月

五日。取燒灰服。

【歷代記述攷證】 【宋】日華諸

家本草論豬齒曰。治蛇咬。【明】李

時珍本草綱目論豬齒曰。中牛肉

毒者。燒灰。水服一錢。又治痘瘡倒

陷。

【豬蹄】 性實 甘。鹹。小寒。無毒。

【治】 養汁服下乳汁。

【歷代記述攷證】 【宋】蘇頌

經本草論豬蹄曰。滑肌膚。去寒熱。

【明】李時珍本草綱目論豬蹄曰。

養羹。通乳脈。托癰疽。壓丹石。煮清

汁。洗癰疽。潰熱毒。消毒氣。去惡肉

有效。

【參攷資料】 外科精要。洗癰疽。

有豬蹄湯數方。用豬蹄煮汁。去油

煎藥。藥洗也。【李時珍】

【豬頭肉】 採取 以假豬者良。

【治】 豬者亦可。

【歷代記述攷證】 【唐】孟詵食

性實 有毒。

【治】 寒熱。五癰。鬼毒。

【歷代記述攷證】 【唐】孟詵食

性實 有毒。

【治】 寒熱。五癰。鬼毒。

【歷代記述攷證】 【唐】孟詵食

性實 有毒。

損陽(蘇頌)●豬脰爲甘寒滑澤

之物。甘寒則津液生滑澤則垢膩去。故主如上諸證也。男子多食損陽。薄大腸。其能專在去垢膩。可用以浣垢衣。(穆希雍)●豬爲食味中常用之物。臟腑腸胃。咸無塞焉。然其一身除肚膏外。餘皆有毒發病人。習之而不察也。壯實者。或暫食無害。有疾者。不可不知其忌。故利其害於後肉多食。令人虛肥。生痰熱。熱病後食之。復發。不宜與薑同食。食則發大風。病頭肉有病者。食之生風發疾。腦食之損男子陽道。臨房不能行事。酒後尤不可食。血能敗血損陽。服地黃何首烏諸補藥者。尤忌之多。食耗心氣。不可合吳茱萸食。肝餌藥人不可食。合魚鱸食。生癰疽。合鯉魚腸子食。傷人神。延壽書云。豬臨宰驚氣入心。絕氣歸肝。俱不可多食。必傷人脾。孫思邈云。凡六畜脾。人一生莫食之。肺不可與白朮菜合食。令人氣滯發霍亂。八月和飴食。至冬發疽。腎久食。令人傷腎。少子冬月不可食。損人真氣。兼發虛癰。腸多食動冷氣。鼻唇多食動風。古多食損心。

(穆希雍)

【豬脾】 原名 聯貼。主治 脾胃虛熱。同陳橘紅。人參。生薑。葱白。陳米。煮羹食之。

參攷資料 凡六畜之脾。人宜一生莫食之。(孫思邈)

【豬腎】 原名 豬腰子。性質 鹹冷無毒。主治 理腎氣。通膀胱。

歷代記述攷證 【唐】孫思邈千金翼論豬腎曰。除冷氣。(宋)大明日華諸家本草論豬腎曰。補膀胱水臟。暖腰膝。治耳聾。(宋)蘇頌圖經本草論豬腎曰。補虛壯氣。消積滯。(明)李時珍本草綱目論豬腎曰。止消渴。治產勞虛汗。下痢崩中。

參攷資料 ●豬腎別錄謂其理腎氣。通膀胱。日華亦曰。補水臟。膀胱。暖腰膝。而又曰。雖補腎。久食令人少子。孟詵亦曰。久食令人腎虛。兩相矛盾。知如何說。蓋豬腎性寒。不能補命門精氣。方藥所用。借其引導而已。別錄理字通字。最爲有理。日華暖腰膝。補膀胱水臟之

說爲非矣。腎有虛熱者。宜食之。若腎氣虛寒者。非所宜矣。今人不達此意。往往食豬腎爲補。不可不審。又千金治消渴。有豬腎薺菜湯。補腎虛勞損諸病。有腎瀝湯。方甚多。皆用豬羊腎煮湯煎藥。俱是引導之意。李時珍。●豬腎味鹹氣冷。能瀉腎氣。腎虛寒者。不宜食。本經主理腎氣。乃借其同氣以引導之。耳。不言補而言理。其意有在矣。腎與膀胱爲表裏。故復能利膀胱也。今人誤認以爲補腎。恣意食之。大爲差謬。不觀日華子云。久食令人無子。孟詵云。久食令人傷腎。其非補腎之物。明矣。(本草經疏)

【豬腎脂】 即豬脰之原名。詳『豬脰』條。

【豬腎粥】 基本 本品係用豬腎和米煮成之粥。

主治 補腎虛諸疾。

【豬耳草】 即耳草之別名。詳『耳草』條。

【豬脊】 即豬脊之古籍別名。典見和漢藥考。詳『豬脊』條。

【豬項肉】 原名 槽頭肉。主治 酒積面黃。腹

脹。以一兩切如泥。令甘遂末一錢。作丸。紙裹煨香食之。酒下。當利出酒布袋也。

參攷資料 豬項肉肥脆。能動風。綱目

【豬腦】 性質 甘寒有毒。主治 風眩。腦鳴。凍瘡。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論豬腦曰。主癰腫。塗紙上貼之。乾則易治。手足皸裂。出血以酒化洗併塗之。

參攷資料 ●禮記云。食豚去腦。孫真人食忌云。豬腦損男子陽道。臨房不能行事。酒後尤不可食。延壽書云。今人以鹽酒食豬腦。是自引賊也。李時珍。●喉痺已破。瘡口痛者。豬腦髓煮熟。入薑醋食之。即愈。(普濟方)

【豬腰子】 命名 本品莢生。其子大。狀若豬之內腎。故名。

產地 出廣西諸地。

形態 豬腰爲灌木類之一種。其莢莢生。實爲莢。果中有子。長三四寸。色紫。肉輕白。可供食與藥用。

性質 甘微辛。無毒。

十六畫 豬

●治小兒瘰癧。小兒百日內風。口中物如蝸牛。或如黃頭白蟲者。薄豬肪擦之即消。(聖惠方)

●治小兒蛇病癰瘡。豬膏服之。(千金方)

●治產後虛汗。豬膏、姜汁、白蜜各一升。酒五合。煎五上五下。每服方寸匕。(千金方)

●治胞衣不下。豬脂一兩。水一盞。煎五七沸。服之當下。(聖惠方)

●治吹奶寒熱。用豬肪冷水浸搗。熱即易之。立效。(子母祕錄方)

●治髮落不生。以酢泔洗淨。布指令熱。以臘豬脂入生鐵。煮三沸塗之。遍生。(千金方)

●治冬月唇裂。煉過豬脂。日日塗之。(十便良方)

●治熱毒攻手。腫痛欲脫。豬膏和羊屎塗之。(外臺祕要方)

●治手足皸破。豬脂着熱酒中洗之。(千金方)

●治代指疼痛。豬膏和白墻土傅之。(小品方)

●治口瘡塞咽。用豬膏、白蜜一斤。黃連末一兩。合煎取汁。熬稠。每服茶下。日五服。(千金方)

●治疥瘡有蟲。豬膏煎芫花塗之。(肘後方)

●治鼠癰瘰癧。用豬膏淹生地黃。煮六七沸塗之。

●治漏瘡不合。以紙黏臘豬脂。納瘡中。日五夜三。(千金方)

●治漆瘡作痒。用豬膏頻塗之。(千金方)

●治咽喉骨哽。吞脂膏一團。不達更吞之。(千金方)

●治身面疣。以豬脂搗之。令血出少許。神驗。不可加。(千金方)

●治誤吞鐵釘。豬脂多食令飽。自然裹出。(普濟方)

●治雜物入目。豬脂煮取水面如油者。仰臥去枕。點目中。不過數度。與物俱出。(聖惠方)

●治蜈蚣入耳。炙豬肪掩耳自出。亦治蟲蟻入耳。(梅師方)

●治發背發乳。豬脂切片。冷水浸貼。日易四五片。甚妙。(急救方)

●用鹽 錢半至三錢。

●施用宜忌 凡脾虛滯滯腹滿便滑者。禁用。反烏梅梅子。

●參攷資料 臘月煉之。瓷器收。

一七三八

藏。每油一斤。入糖霜一錢於內。經久不壞。暑月生豬脂。以糖霜醃之。亦可久藏。此物性之相制也。外感諸病。大便滑瀉者。均忌。(王士雄)

【豬退】即豬懸蹄甲之原名。詳「豬懸蹄甲」條。

【豬骨】 主治 中馬肝漏。肺葉。榮諸毒。燒灰。水服。方寸。七日。三服。頰骨。燒灰。治痘陷。煎汁。服。解丹藥毒。

【豬婆蛇】即石龍子之古籍別名。典見綱目。詳「石龍子」條。

【豬婆龍】即鼉之古籍別名。典見動物學大辭典。詳「鼉」條。

【豬板榔】即大腹皮之古籍別名。典見綱目。詳「大腹皮」條。

【豬脬】 古鑑別名 豬胞。(綱目)

性質 甘。鹹。寒。無毒。

主治 夢中遺溺。疝氣。腰痛。陰囊。溼痒。玉莖生瘡。

參攷資料 豬胞所主。皆下焦病。亦以類從爾。疝有一妓。病轉。小。便不通。腹脹如鼓。數月垂死。一醫用豬脬吹脹。以翎管安上。插入陰孔。捻脬氣吹入。即大尿而愈。此

法載在羅天益衛生寶鑑中。知者頗少。亦機巧妙術也。(李時珍)

【豬莧】即野莧之古籍別名。典見嘉祐圖經本草。見「莧」條。

【豬麻】即益母草之古籍別名。典見綱目。詳「益母草」條。

【豬椒】即蔓椒之古籍別名。典見別錄。詳「蔓椒」條。

【豬脰】 原名 豬腩。命名 本品生兩腎中間。似脂非脂。似肉非肉。乃人物之命門。三焦發原處也。肥則多。瘦則少。蓋頤養賴之。故謂之頤。

古鑑別名 豬腎脂。豬頤。性質 甘。平。無毒。

主治 通乳汁。

歷代記述按證 【唐】陳藏器本草拾遺論。豬脰。肺痿。咳嗽。和棗肉。浸酒服。亦治痰癖。瘋癱。宋蘇頌圖經本草論。豬脰。曰。療肺氣乾脹。喘急。潤五臟。去痰。野。斷殺斑。蠶地。膽毒。治冷痢。成。唐明常效。先食。腎心。錢論。豬脰。曰。一切肺病。咳嗽。膿血不止。以薄竹筒盛於

塘火中。煨熟。食上。噴之。良。

參攷資料 ●豬脰。男子多食。

●參攷資料 臘月煉之。瓷器收。

●參攷資料 臘月煉之。瓷器收。

●參攷資料 臘月煉之。瓷器收。

主治 煎膏藥。解斑蝥、羌青毒。膏生髮悅面。

歷代記述攷證 【南北朝】徐之才雷公藥對論豬脂曰。胎產衣不下。以酒多服佳。【南北朝】陶弘景本草集註論豬脂曰。悅皮膚作手膏。不敷製。唐蘇恭新修本草論豬脂曰。治癰疽。【唐】孫思邈千金翼論豬脂曰。破冷結。散宿血。【宋】日華諸家本草論豬脂曰。殺蟲治皮膚風。塗惡瘡。【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論豬脂曰。利血脈。散風熱。潤肺。入膏藥。主諸瘡。【明】李時珍本草綱目論豬脂曰。解地膽。亭長。野葛。硫黃毒。諸肝毒。利腸胃。通小便。除五疸水腫。生毛髮。【明】繆希雍本草經疏論豬脂曰。肪膏。即脂油也。味甘寒。性滑澤。能涼血解毒。潤燥。故主煎諸膏藥。及解斑蝥。羌青毒也。又能利腸胃。通大小便。能散風熱。癰疽瘡。【清】王士雄隨息居飲食譜論豬脂曰。豬脂甘涼潤肺。澤槁濡枯。滋液生津。息風化毒。殺蟲清熱。消腫散癰。通腑除黃。滑胎長髮。以白厚而不腥臊者良。

十六畫 豬

國外學說 英美學說謂煉豬油係提淨之豬油。有醫士喜用近於腰子之油。因較他處之油堅固。至於板油與胰子油。亦有人用之。又有不用豬身之外層油者。尋常出售之豬油。大率含鹽。故不合於作藥品。必在沸水內化之。去其鹽方為合用。藥品內準用之。豬油為腹內之油。去其各膜質。融化而濾之。必加熱至一百二十度。持續多時。調之不停。方其融化時。能助鹽與松香之融化。又合於蠟類。能變為肥皂。遇空氣則能變酸。味辣而臭。近時出售之豬油。謀利者常以異質加入。曾有人將數種出售之豬油。化分之。每百分中計得小粉與麵等二十分。又有稱為美國豬油。其實則係英國之所作者。故凡用豬油作藥料。必先試其含異質與否。更不可含有鹽類。製法用鮮豬脂十四斤。將其胞膜除去。懸掛而風乾之。切成碎塊。入石臼搗勻。再入燙鍋（加熱不過一百三十度。或用磁盆浮開水鍋內亦可）。化透。過細呢子布為度。（照此製成以配藥最合宜。如加大熱則變

形。）其作用為潤外皮藥。與他種油類同。能為數種蠟膏與油膏之本質。又有時用為外導瀉藥之配料。用數藥類。將此油攤上。易於取去。若搽髮際。其功用能藥虱。又和漢藥考曰。取豚體中脂肪最多之組織。細到洗淨血液及黏液質等。入鍋中與水同熱。熔之。脂肪即浮其上。因取而精製之。又日本藥局方云。豚脂得自壯健之豕。其大網膜及腎臟周圍之脂肪組織。可製出脂油。但須擇新鮮者。並宜洗淨。方可製之。製成之後。為色白柔軟。通體均勻之凝塊。臭氣微弱。毫無腐敗性。熱至四十三至五十一。五度即熔。變澄清之液。在厚一仙米以下之層。液即無色。其沃度數四十六至八十。酸度二以下。

配合應用 ①治傷寒時氣。豬膏如彈丸。溫水化服。日三次。（肘後方）

②治五種疸疾。黃疸。殺疸。酒疸。黑疸。女勞疸。黃汗如黃蘗汁。用豬脂一斤。溫熱服。日三。當利乃愈也。（肘後方）

③治赤白帶下。煉豬脂三合。酒

五合。煎沸頓服。（千金方）

④治小便不通。豬脂一斤。水二升。煎三沸。飲之立通。（千金方）

⑤治關格閉塞。豬脂。薑汁各二升。微火煎至二升。下酒五合。和煎分服。（千金方）

⑥治痘瘡便秘。四五日。用肥豬鹽一塊。水煮熟。切如豆大。與食自然臟腑滋潤。痢疔易落。無損於兒。（陳文中方）

⑦治卒中五尸。仲景用豬脂一雞子。苦酒一升。煮沸灌之。（肘後方）

⑧治中諸肝毒。豬膏頓服一升。（千金方）

⑨治食癢成癢。心腹作痛。咽間如有蟲上下。嗜食與油者是也。用豬脂二升。酒三升。煮三沸。服。日三次。

⑩治上氣咳嗽。豬肪四兩。煮百沸。以來。切和醬醋食之。（食醫心鏡方）

⑪治肺熱暴瘡。豬脂油一斤。煉過。入白蜜一斤。再煉少頃。濾淨。冷定。不時挑服一匙。即愈。無疾常服。亦潤肺。（萬氏方）

所治之證曰陽明病脈浮發熱渴欲飲水小便不利者豬苓湯主之曰少陰病下利咳而嘔渴心煩不得眠者豬苓湯主之曰諸病在臟欲攻之當隨其所得而攻之如渴者與豬苓湯曰嘔吐而病在膈上後思水者豬苓散主之統而覈之莫不有渴若五苓散則其治有渴者有不渴者至茯苓入他方所治之病則不渴者居多蓋渴者水氣被陽逼迫欲得陰和而不能也與之豬苓使起陰氣以和陽化水譬之楓葉已丹遂能即落也

近人學說 賈九如曰豬苓味淡淡主於滲入脾以利水道用治水瀉瀉瀉通淋除溼消水腫療黃疸獨此為最捷故云與琥珀同功但不能為主劑助補藥以實脾領泄藥以理脾佐溫藥以煖脾同涼藥以清脾凡脾虛甚者恐泄元氣慎之

配合應用 ①入五苓散為除溼之要藥

②佐白芍藥白茯苓人參橘皮尤澤瀉治水腫之屬陽分者

③佐白芍藥生地黃桑寄生桑

根白皮茯苓澤瀉琥珀石斛靈苒仁肉桂治水腫之屬陰分者均為要藥其功長於利水故善除溼

④治傷寒口渴邪在臟也豬苓湯主之豬苓茯苓澤瀉滑石附膠各一兩以水四升煮取二升每服七合日三服嘔而思水者亦主之(張仲景方)

⑤治小兒祕結用豬苓一兩以水少許煮雞屎白一錢調服立通(外臺祕要方)

⑥治通身腫滿小便不利豬苓五兩為末熟水服方寸匕日三服(楊氏產乳方)

⑦治妊娠腫滿從腳至腹小便不通微渴引飲方同上法(子母祕錄方)

⑧治妊娠子淋方同上法日三夜二以通為度(小品方)

用量 二錢至四錢 施用宜忌 凡脾腎虛而無溼熱者禁用忌火及鐵氣

參攷資料 ①豬苓淡滲氣升而又能降故能開腠理利小便與茯苓同功但入補藥不如茯苓也(李時珍) ②豬苓生衡山山谷及

濟陰冤句二月八月採陰乾(別錄) ③是楓樹苓其皮黑色內白而實者佳削去皮用(陶弘景) ④今蜀州習州亦有之生土底不必楓根下始有也(蘇頌) ⑤豬苓亦是木之餘氣所結如松之餘氣結茯苓之義他木皆有楓木為多耳(李時珍)

【豬桃】卽山梔子之古籍別名典見和漢藥考詳『山梔子』條

【豬氣子】卽豬鬃之古籍別名典見綱目詳『豬鬃』條

【豬膜】卽豬脰之古籍別名典見綱目詳『豬脰』條

【豬脂】 命名 凡凝者為肪為脂釋者為膏為油本品乃豬腹中凝聚之脂肪故名

處方用名 煉豬油板油豬膏古籍別名 豬肪(綱目)豚脂家豬脂陰龍膏萬貞鹿(和漢藥考)熟豬油熟火油(俗名)豬臘

項下膏名貢羊肪(本草集註)外國名詞 Adeps Praeparatus (拉丁) Prepared Lard (英)

基本 屬偶蹄類為家腹網膜

及腎臟周圍之脂肪

形態 豬脂色純白有緩和之甘味比重約〇・九三八熱至三十五至四十度即融解而為無色透明之油遇無水酒精伊打硫化炭素偏蘇爾等俱溶解

採取 每年臘月煉淨收用者佳

製造 蘇恭曰十二月上亥日取入新瓶埋亥地百日用之名臘脂每升入雞子白十四枚更良陶弘景曰勿令中水臘月者歷年不壞項下膏謂之貢羊肪入道家煉五金用

性質 甘微寒無毒

成分 豚脂為三種成分構造而成一為沃來茵 Oleine C₅₇H₁₁₁(OC₁₈H₃₅O₂)占百分之六十一

二為瑪爾加林 Margarine C₅₇H₁₁₁(OOC₁₈H₃₅O₂) 三為斯推阿林 Stearine C₅₇H₁₁₁(OC₁₈H₃₅O₂) 均百分之三十八然因熔解點有高低各成分遂有多少故亦不定也

效能 殺蟲療惡瘡解毒益血脈用作製造膏藥之原料又為緩

和滋養藥

參攷資料 御藥院方。治瘡瘡

黑陷無價散。錢仲陽治急驚風。痼
惺惺丸。皆用之。取其除熱解毒也
(李時珍)

【豬屎草】即玉淨瓶之古籍別名。

典見綱目拾遺。詳「玉淨瓶」條。

【豬胃】即豬肚之原名。詳「豬肚」
條。

【豬胞】即豬脬之古籍別名。典見
綱目。詳「豬脬」條。

【豬苓】 命名 本品塊黑而零
落似豬屎。故名。

處方用名 粉豬苓。

古籍別名 假豬屎。(本經)豕

彘。(莊子)地烏桃。(圖經)荖。荖苓。

朱苓。豬苓。豬苓。導河椽。(和漢藥
考)

外國名詞 Figs tuber (英)

基本 係生於楓樹根部之一
種茸類。但他樹根部亦生之。

產地 陳仁山藥物生藥辨云。

豬苓產舊陝西省興安縣。漢中府
等爲上。四川亦可。雲南次之一。產
河北齊堂地方。乃山下之朽木變
化而生俗云樹根菌也。

形態 爲不正圓塊。狀類豬屎。

質輕。外皮黑色。或深褐色。內部白
色。

採取 二月八月採。陰乾。

製法 雷斅曰。凡使豬苓。採得
用銅刀刮去粗皮。薄切。以東流水

浸一夜。至明漉出。細切。以升麻葉
對蒸一日。去葉。曬乾。用。李時珍曰。

豬苓取其行淫。生用更佳。

性質 甘平。無毒。

效能 行水。利溼。消腫。止瀉。專
作利尿藥。

主治 痰癰。解毒。蟲疰。不祥。利
水道。久服輕身耐老。

張仲景之發明 豬苓一味。經
張仲景之實驗。認爲『主治渴而

小便不利』。茲考徵如下。豬苓湯

證曰。渴欲飲水。小便不利。豬苓散
證曰。思水者。(以上二方。豬苓諸

藥等分)五苓散證曰。小便不利。
微熱消渴。(以上一方。豬苓十八

銖)歷觀此三方。豬苓所主治。渴
而小便不利也。明矣。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥

性本草論豬苓曰。解傷寒溫疫大
熱。發汗。主腫脹滿腹急痛。(金)張

元素珍珠囊論豬苓曰。治渴。除淫

去心中懊憹。(元)王好古湯液本

草論豬苓曰。瀉膀胱。(明)李時珍
本草綱目論豬苓曰。開腠理。治淋

腫脚氣。白濁帶下。妊婦子淋。胎腫
小便不利。(明)繆希雍本草經疏

論豬苓曰。豬苓本經謂其味甘。應
苦兼淡。其氣平。而無毒。氣味俱薄。

其主痰癰者。瘕必由暑。暑必兼溼。
溼以利發引。暑溼之氣。從小便出。

所以分消之也。淡滲之性。故利水
道。溼勝則身重。溼去則身輕。利竅

之藥。必能走泄精氣。其日久服耐
老。必無是理矣。解穢毒。注不祥。義

將安出。亦未可盡信也。(清)黃宮

繡本草求真論豬苓曰。豬苓甘淡
微苦。性平。無毒。得風濕之餘氣。以

成形。如豬屎。故以豬名。凡四苓五
苓等方。並皆用此。性雖有類澤瀉。

同入膀胱。腎經。解熱除淫。行竅利
水。然水消則脾必燥。水盡則氣必

走。澤瀉雖同利水。性亦類燥。然鹹
性居多。尚有潤存。澤瀉治火。性亦

損氣。然潤能滋陰。尚有補在。故豬
苓必合澤瀉同用。則潤燥適均。而

無偏峻之患矣。至於茯苓雖屬滲
劑。有溼自可以去。然茯苓則入氣而

上行。此則入血而下降。且與澤瀉

利水消腫。治癰止痢等藥。審屬暑
邪溼熱。內閉無不藉此。以爲宣導

之需。古人已云。清利小便。無若此
藥。以故滋陰藥中。止有澤瀉。而不

用及豬苓。正謂此耳。但此專司引
水。津液易耗。久服多致損目。白而

實者良。去皮用。(清)鄒樹本經疏
證論豬苓曰。茯苓。豬苓。得木氣而

生於地下。既不苗萌挺莖。又不潰
腐消敗。是其卻溼可知。乃復久而

不變。則非特能卻溼。且能化溼氣
爲生氣矣。雖然。茯苓可利水道。豬

苓亦利水道。則凡木之苓。皆能利
水道。是豬苓不必定以生楓下者。

且茯苓。豬苓。儘可混用。乃仲景書
中茯苓。豬苓。各自爲功。又每相連

爲用。似若難離。相混者何說。蓋亦
可察物理而知之矣。夫松之概。挺

拔。助正楓之概。柔弱易搖。松之理
屬疎。楓之理堅。細松之葉至冬益

蒼翠。而不凋。楓之葉至冬遂鮮赤
而即落。是其一柔一剛。顯然殊致。

茯苓屬陽。治停蓄之水。不從陽化
者。豬苓屬陰。治鼓溢之水。不從陰

化者。是故仲景以豬苓名方者。其

十六畫 豬

禿髮落。

【豬肚】

原名 豬胃。性質 甘微溫。無毒。

主治 補中益氣。止瀉。斷暴痢。

虛弱。

歷代記述攷證 【魏】吳普本草論豬肚曰。消積聚。療瘕。治惡瘡。

【宋】日華諸家本草論豬肚曰。補虛損。殺勞蟲。蠱黃糯米蒸搗爲丸。治勞氣。并小兒疳。魃黃瘦病。【宋】蘇頌圖經本草論豬肚曰。主骨蒸熱勞。血脈不行。補羸助氣。四季宜食。

配合應用 治水瀉不止。用豬肚一枚。煮爛。入平胃散。搗丸服。

效（普濟方）

●豬肚黃連丸。治消渴。用雌豬肚一枚。入黃連末五兩。括模根。白梁米各四兩。知母三兩。麥門冬二兩。縫定。蒸熟。搗丸。梧子大。每服三十丸。米飲下。（仲景方）

參攷資料 ●豬水齋而胃腸

土。故方藥用之補虛。以胃治胃也。

（李時珍）●豬胃乃豬一身無害之物。爲補脾胃之要品。脾胃得補。則中氣益利。自止矣。日華子主補

虛損。蘇頌主骨蒸勞熱。血脈不行。皆取其補益脾胃。則精血自生。虛勞自愈。根本固而後五臟皆安也。

（經希雍）

【豬肝】

性質 苦。溫。無毒。

主治 小兒驚癇。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論豬肝曰。作生脰。以薑醋食。走脚氣。當微洩。若先利。即勿服。【宋】蘇頌圖經本草論豬肝曰。

治冷勞。賊虛。冷洩。久滑。赤白帶下。以一葉薄批。攪着。訶子末。炙之。再溫。再炙。盡。宋半兩。空腹細嚼。陳米飲送下。【明】李時珍本草綱目論豬肝曰。補汗明目。療肝虛浮腫。

參攷資料 ●肝主藏血。故諸

血病。用爲嚮導。入肝于金翼。治痢疾。有豬肝丸。治脫肛。有豬肝散。諸眼目方。多有豬肝散。皆此意也。（李時珍）●餌藥人不可食之。合魚鱸食。生癰疽。合鯉魚腸子。食傷人神。合鷄鴨食。生面黥。延壽書云。豬臨殺。驚氣入心。絕氣歸肝。俱不可多食。必傷人。（李時珍）

【豬肝赤】即赤豆之別名。詳『赤小豆』條。

【豬乳】

採取 李時珍曰。取法須馴豬。待兒飲乳時。提後脚。急以手捋而承之。非此法不得也。

性質 甘。鹹。寒。無毒。

主治 小兒驚癇。及鬼毒。去來寒熱。五癰。藥綿吮之。

歷代記述攷證 【宋】日華諸家本草論豬乳曰。小兒天中大人

豬。雞。癰病。參攷資料 小兒體屬純陽。其驚癇。亦生於風熱。豬乳氣寒。以寒治熱。謂之正治。故錢乙云。初生小兒。至滿月。以豬乳頓滴之。最佳。張煥云。小兒初生。無乳。以豬乳代之。出月。可免驚癇痘疹之患。楊士瀛云。小兒口噤。不開。豬乳飲之。甚良。月內胎驚。同硃砂牛乳少許。抹口中。甚妙。此法諸家方書未知用。予傳之東宮。吳觀察子病。此用之有效。（李時珍）

【豬兒牙皂】即皂莢之處方用名。詳『皂莢』條。【豬油】即豬膏之古籍別名。典見綱目。詳『豬脂』條。【豬肪】即豬脂之古籍別名。典見

一七三四

綱目。詳『豬脂』條。

【豬肺】

性質 甘。微寒。無毒。

主治 補肺。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論豬肺曰。療肺虛咳嗽。以一具。竹刀切片。麻油炒熟。同粥食。又治肺虛嗽血。煮藥蔥改仁末食之。

參攷資料 豬肺得大麻仁良。若與白菜菜合食。令人氣滯發霍亂。八月和飴食。至冬發疽（蘇頌）

【豬臥草】即七葉黃荊之古籍別名。典見綱目。拾遺。詳『七葉黃荊』條。

【豬咽舌】即豬腦之古籍別名。典見王璣『豬腦』條。

【豬屎】

原名 豬零。性質 寒。無毒。

主治 寒熱。黃疸。溼痺。

歷代記述攷證 【宋】日華諸家本草論豬屎曰。主蠱毒。天行熱病。並取一升。浸汁。頓服。【明】李時珍本草綱目論豬屎曰。燒灰。發痘。瘡。治驚癇。除熱。解毒。治瘡。【明】吳瑞日用本草論豬屎曰。血澀。出血。不止。取新屎。壓之。

穀塗之(千金方)

治男女陰蝕。肥豬肉煮汁洗。不過二十斤瘰。千金方

治山行辟蛇。山中草木枝上。有石蛭着人足。則穿肌入肉中害人。但以鹽豬肉和鹽塗足脛趾。即不着人也。千金方

治竹刺入肉。多年爛肉。切片包裹之。即出(救急方)

用薑一匙至二匙

施用宜忌 凡有風熱痰火者。禁用反烏梅桔梗黃連。犯之則瀉痢。

參攷資料 按錢乙法。小兒疳病。麝香丸。以豬膽和丸。豬肝湯服。疳渴者。以豬肉湯或燂豬湯服。其意蓋以豬屬水而氣寒能去火熱耶(李時珍) 豬爲用最多。惟肉不宜多食。令人暴肥。蓋虛風所致也(陶弘景) 豬肉滯氣。世俗以爲補誤矣。惟補陽爾。今之虛損者。不在陽而在陰。以肉補陰。是以火濟水。蓋肉性入胃。便作溼熱。熱生痰。痰生則氣不降。而諸證作矣。諺云。豬不食之發大風。中年氣血衰。面發黑點也(朱震亨) 凡

肉有補。惟豬肉無補。人習之說也。

(韓愈) 限豬肉治疾。凡豬肉能閉血脈。弱筋骨。虛人肌。不可久食。

病人金瘡者。尤甚(別錄) 他豬肉久食。令人少子。精發宿病。豚肉久食。令人偏體。筋肉碎痛。乏氣。江豬多食。令人體重。作肺少。有腥氣。

(孫思邈) 久食殺業動風。發疾。傷寒瘧疾。痰癰痔漏。諸疾食之。必再發(孟詵) 按揚雄方言。曰。燕朝鮮之間。謂豬爲猒。關東謂之彘。

或曰。豕。南楚曰豕。吳揚曰豬。其實一種也。禮記謂之剛鬣。崔豹古今注謂之參軍(蘇頌) 凡豬骨細筋多。高大。有重百餘斤。食物至寡。甚易畜養。甚易生息(蘇頌) 豬雖天下畜之。而各有不同。生青兗徐淮者。耳大。生燕冀者。皮厚。生梁雍者。足短。生遼東者。頭白。生豫州者。味短。生江南者。耳小。謂之江豬。

生嶺南者。白而極肥。豬孕四月而生。在畜屬水。在卦屬坎。在禽應室星。李時珍 溫疫症邪火已衰。津不能回者。宜用鮮豬肉數斤。切大塊。急火煮清湯。吹淨浮油。恣意涼飲。乃急救津液之無上妙品也。

(溫熱經緯) 汪赤厓治張姓夏月途行受暑。醫藥半月。水漿不入。大便不通。唇焦舌黑。骨立皮乾。目合肢冷。診脈模糊。此因邪熱薰灼。津血已枯。形肉已脫。亡可立待者。

僅以草木根皮。滋養氣血。何能速生。囑市豬肉與粳米煮汁。一晝夜。呷盡。目微開。手足微動。喉間略有呻吟。如是者三日。唇舌轉潤。退去黑殼一層。始開目能言。是夜下燥屎。脈稍應指。再與養陰。匝月而愈。

(名醫類案)

【豬舌】 主治 健脾。補不足。令人能食。和五味。煮汁食。性質 鹹平。無毒。

【豬血】 主治 生血。療黃。脈暴氣。及海外瘴氣。

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新修本草論豬血曰。中風絕傷。頭風眩運。及淋瀝。唐孫思邈千金翼論豬血曰。卒下血不止。清酒和炒食之。明吳瑞日用本草論豬血曰。壓丹石。解諸毒。明李時珍本草綱目論豬血曰。清油炒食。治嘈雜有蟲。

參攷資料 服地黃。何首烏。

諸補藥者忌之。云能損腸也。同黃豆食滯氣。李時珍 按陳自明云。婦人嘈雜。皆血液溼汗變而爲痰。或言是血嘈。多以豬血炒食而愈。蓋以血導血。歸原之意。爾此固一說。然亦有就蟲作嘈雜者。蟲得血腥。則飽而伏也(李時珍)

【豬血丹參】 即丹參用豬血拌成者之處方。用名詳丹參條。

【豬卵】 基本 本品即壯豬之古籍別名 豚臚(本經) 豬石子(別錄)

採取 以幼豬者良。製法 採得陰乾藏之。勿令敗壞用。

性質 甘溫。無毒。主治 驚癇癰疾。鬼疰蠱毒。除寒熱。黃豚。五癰邪氣。繫絡。

歷代記述攷證 【唐】孫思邈千金翼論豬卵曰。除陰室中痛。明李時珍本草綱目論豬卵曰。治陰陽易病。少腹急痛。用熱酒吞二枚。即瘳。

參攷資料 臘月者。燒灰水。服治喉痺。和豬脂。塗赤。

十六 豕 豬

金翼論豬肉曰。補腎氣虛竭。【宋】日華諸家本草論豬肉曰。療水銀風。并中土坑惡氣。【清】黃宮繡本草求真論豬肉曰。豬肉味雖雋永。食之能潤腸胃。生津液。豐肌體。澤皮膚。爲補肉補形之要味。然性屬陰物。凡人臟氣純陽。火盛水衰。服則以水濟火。血脈周流。自有豐體澤膚之妙。若使臟體純陰。少食或未見損。多食必有阻滯。助熱生痰。動風作溼之虞耳。况風寒初感。血脈有礙。其於豬肉固不可食。久病初愈。血後。其於豬肉更不宜食。雖曰先王教民。畜彘爲先。非是厲民。又胡不聞大易之頤有云。宜節飲食乎。

近人學說 丁福保曰。豬肉爲亞於牛肉之貴重肉類。歐洲諸國消費之額。平均之。每日每人當於二十八錢餘。日本則有嫌忌之風。而需用甚稀。蓋豬肉常因一種之寄生蟲而生條蟲。食之殊爲危險。其原因多由飼法之不熟練。或不注意之所致也。然豬肉最富於脂肪。食用以外。得其利益者頗多。分析之。則其成分爲水分五五。蛋白

質一四。脂肪二八。鹽類二六。比之牛肉雖稍劣。而亦不至遠下。最適於貯藏。爲食肉中之第一等。又適於臘乾。或鹽漬。外人之貴重豬肉。良有以也。其效能不獨供於食用。且其脂肪於器械上亦大有效用。屠一頭之豚。可得多量之肉。骨髓皮毛等。可爲特效之肥料。其他用途甚多。無用而廢棄者殊少。其飼育法甚易。人人得而爲之。除金石以外。無不可爲其食料。又因其爲動物。故以廢棄物爲飼料。已可世俗常言。無家畜者無肥料。蓋農家肥料第一之製造者。實家畜也。惟對於豚肉之調理。不得相宜。則與不消化物相同。無益於營養。而反有害。故食豚肉者。宜選精良之品。於高度之熱而煮熟。注意以調理爲要。飼料雖用廢棄物而已足。然亦不可不加選擇。凡脂肪質最弱者。必因飼料之惡劣。其肉食之有害。最良而最適當者。以小麥。玉蜀黍粉。甘藷。馬鈴薯等爲第一。魚獸肉之腐敗者。使多量食之。則僅增其脂肪。而不能得良肉。於製造臘乾。最不適當。故以甘藷馬鈴薯

之莖根。蕪菁。南瓜。醬油渣之類。溶和於水。而與食爲良。其他富於澱粉者。爲最良。但蕪胡椒之類。決不可與食。

配合應用 ①治禁口痢疾。臘肉脯煨熟食之妙。【李樓奇方】

②治小兒刮腸痢疾。禁口閉目。至重者。精豬肉一兩。薄切炙香。以膩粉末半錢。鋪上。令食。或置鼻頭。聞香。自然要食也。【活幼口議方】

③治上氣咳嗽煩滿。用豬肉切作鏈子。豬脂煎熟食之。【食醫心鏡方】

④治浮腫脹滿不食。用豬脊肉一雙。切生以蒜雜食之。【食醫心鏡方】

⑤治身腫攻心。用生豬肉以漿水洗壓乾。切。膾。蒜。噉。之一日三次。下氣去風。乃外國方也。【張文仲方】

⑥治破傷風腫。新殺豬肉。乘熱割片。貼患處。連換三片。其腫立消。【簡便方】

⑦治風狂歌笑。行走不休。用臘豬肉一斤。煮熟切。膾。和醬食。或羹粥炒任服之。【食醫心鏡方】

一七三二

①解丹石毒。發熱困篤。用肥豬肉五斤。葱。薤。半斤。煮食。或作臘食。必腹鳴。毒下。以水淘之。沙石盡。則愈。【千金方】

②解鍾乳毒。下利不止。食豬肉則愈。【千金方】

③服石英法。白石英一斤。袋盛水三斗。煎四升。以豬肉一斤。鹽豉煮食。一日一作。【千金方】

④治傷損不食。凡打撲傷損三五日。水食不入口。用生豬肉二大錢。打爛。溫水洗去血水。再搗爛。以陰陽湯打和。以半錢。用雞毛送入咽內。却以陰陽湯灌下之。其食蟲聞香。竅開。瘀血而上。胸中自然開解。此乃損血凝聚。心間蟲食血飽。他物蟲不來探故也。謂之驅通之法。【邵氏方】

⑤治打傷青腫。用炙豬肉搗之。【千金方】

⑥治小兒重舌。取三家屠肉。切指大。摩舌上。兒立噤。【千金方】

⑦治小兒痘瘡。豬肉煮汁洗之。【譚氏方】

⑧小兒火丹。豬肉切片貼之。

⑨治漆瘡作癢。宜噉豬肉嚼擦。

予爲一物也。按本草綱目曲節草

又有綠豆青蛇藍諸名。與衛矛分

列。衛矛入木部。曲節草入草部。植

物名實圖考亦列衛矛入木類。曲

節草入溫草類。徒以二物均有六

月凌之名。故疑爲一物。實則二書

所載曲節草圖與衛矛之形態不

同。當非同物也。(植物學大辭典)

【衛足】即蜀葵之古籍別名。典見

和漢藥考。詳「蜀葵」條。

【衛足葵】即蜀葵之古籍別名。典

見和漢藥考。詳「蜀葵」條。

【衛與】即茵芋之古籍別名。典見

和漢藥考。詳「茵芋」條。

【褥水簾】即浮萍之古籍別名。典

見和漢藥考。詳「浮萍」條。

【鑾鼻蛇】即白花蛇之古籍別名。

典見和漢藥考。詳「白花蛇」條。

【親晨粧】即白桃花之古籍別名。

典見和漢藥考。詳「白桃花」條。

【諫果】即橄欖之古籍別名。典見

農書詳「橄欖」條。

【諸乘】即蜻蜓之古籍別名。典見

本草集註。詳「蜻蜓」條。

【諸葛菜】即蕪菁之古籍別名。典

見綱目。詳「蕪菁」條。

【諫草】即萱草之古籍別名。典見

毛詩。詳「諫草」條。

【諸藤斷】即續斷之古籍別名。典

見和漢藥考。詳「續斷」條。

【豫】即烏樟之古籍別名。典見綱

目。詳「烏樟」條。

【豬心】性質甘。鹹。平。無毒。

主治驚邪。憂悲。

歷代記述攷證【唐】孫思邈

千金翼論豬心曰。虛悸。氣逆。婦人

產後中風。血氣驚恐。【唐】蘇恭新

修本草論豬心曰。五臟。主小兒驚

癇。【宋】蘇頌圖經本草論豬心曰。

補血不足。虛劣。

參攷資料豬心多食。耗心氣。

不可合炙菜羹食。【蘇頌】豬水畜

也。故心可以鎮恍惚。【劉完素】

主治驚癇。癰疾。調

碌砂末服。

歷代記述攷證【明】李時珍

本草綱目論豬心血曰。治卒惡死。

及痘瘡倒靨。

參攷資料古方治驚風。癰癩。

痘疾。多用豬心血。蓋以心歸心。以

血導血之意。用尾血者。取其動而

不息也。豬爲水畜。其血性寒。而能

解毒制陽故也。韓飛霞云。豬心血

能引藥入本經。實非其補。沈存中

云。豬血得龍腦直入心經。是矣。(

李時珍)

【豬毛】主治燒灰。麻油調塗

湯火傷。留竅出毒。則無

痕。

【豬牙石】命名本品文理如

產地西番諸地。

形態豬牙石爲石類之一種。

其色栗紅。可供藥用。

主治明目去翳。

【豬牙阜莖】即阜莖之小如豬牙

者。詳「阜莖」條。

【豬牙草】即饅腸之古籍別名。典

見綱目。詳「饅腸」條。

【豬石子】即豬卵之古籍別名。典

見別錄。詳「豬卵」條。

【豬耳子】即蒼耳子之古籍別名。

典見綱目。詳「蒼耳子」條。

【豬耳垢】主治蛇傷。狗咬。塗

之。

命名本品爲豬類之總

稱。字象毛足而後有尾

形。故名。本品爲豬之肌肉。

古籍別名豕肉。豚肉。(本經)

豕肉。豚肉。豕肉。豚肉。(綱目)

肉。(禮記)參軍肉。(雀豹古今注)

形態豬爲家畜類動物。乃野

豬之變種。其體肥滿。鼻長尾短。全

身黑色。毛粗且硬。性喜不潔。恒在

穢泥水溼之地而臥。伏取冷。每年

生產二次。每次可產十餘頭。故繁

殖甚速。肉供吾人食用。常品。其臟

腑骨髓皮毛等。又可供藥用。

製法凡使豬肉。煮取清汁。或

養成膏用。

性質酸。冷。無毒。

效能益腎陰。補虛羸。用作滋

養強壯藥。

主治癰疽。痼疾。久不愈。

歷代記述攷證【唐】陳藏器

本草拾遺論豬肉曰。壓丹石。解熱

毒。宜肥熱人食之。【唐】孫思邈千

一七三一



豬

十六畫 藪

衛

【藪】即蟻姑之古籍別名。典見本經。詳『蟻姑』條。

【衛矛】

命名 本品幹有直羽。如箭矛刃自衛之狀故名。

處方用名 鬼箭羽。

古籍別名 鬼箭（別錄）神箭（廣雅）錦木（日本）六月凌（但名）枸骨（綱目）

外國名詞 Euconymus alatus, K. Koch. (拉丁) ニシキギ

トニ（日本）

基本 係衛矛科。衛矛之枝幹。

產地 陳仁山藥物生產辨云

鬼箭羽以廣東陽江、惠州、博羅等處產者為幼細。廣西各屬產者粗條。



衛矛

形態 衛矛為落葉灌木。高丈許。莖有羽狀突起。葉對生。橢圓形。邊緣有鋸齒。至秋季葉色變紅。顏面美。夏月開小花。黃綠色。作聚繖花序。

果為蒴果。至秋成熟則開裂。現出種子。外圍有赤色之被包。樹皮供製紙料。木材供細木工之料。亦充藥用。

採取 八月採之。陰乾。

製法 雷斂曰。採得只使箭頭。用拭去赤毛。以酥拌緩炒。每一兩用酥二錢半。

性實 苦寒。無毒。

功用 破瘀。行血。用作通經藥。又為殺蟲辟惡藥。

主治 女子崩中下血。腹滿汗出。除邪殺鬼毒。瘰癧（本經）中惡腹痛。去白蟲。消皮膚風毒。腫。令陰中解（別錄）

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新修本草論衛矛曰。療婦人血氣大效。【唐】甄權藥性本草論衛矛曰。破陳血。能落胎。主百邪鬼魅。【宋】大明諸家本草論衛矛曰。通月經。破瘀結。止血崩帶下。殺腹臟蟲。及產後血咬腹痛。【明】李士材本草圖解論衛矛曰。衛矛即鬼箭羽。苦寒無毒。攻腹痛。破瘀結。【清】楊時泰本草述鈞元論衛矛曰。本經鬼箭羽。似專功於女子之血分。蘇頌

所述古方。更似專功於惡症及中惡氣之毒。以病於血者。第方書治女子經閉有牡丹皮散。而治男子眼滿有見凌丸。則固非專治女子血病也。大抵其功力專於血分。女子以血為主。故之取效於男子。更為切中耳。

配合應用 ①治產後敗血。兒枕塊。硬。疼痛發歇。及新產乘虛風寒。內搏。惡露不快。臍腹堅脹。當歸散。用當歸炒。鬼箭去心。中木。紅藍花。各一兩。每服三錢。酒一大盞。煎七分。食前溫服。（和劑局方）

②治鬼瘧。日發。鬼箭羽。鱧鱖甲。燒灰二錢。半為末。每以一字發時。噴鼻。又法。鬼箭羽末一分。砒霜一錢。五靈脂一兩。為末。發時冷水服一錢。（聖濟總錄方）

用量 錢半至二錢。

施用宜忌 凡無瘀積者。禁用。

參攷資料 ①古方崔氏療惡症。在心。痛不可忍。有鬼箭羽湯。姚僧垣集驗方。療卒暴心痛。忽中惡氣。毒痛。大黃湯亦用之。並大方也。見外臺祕要千金諸書中。（蘇頌）

②凡婦人產後血暈。血結。血聚於胸中。或偏於少腹。或運於脇肘者。四物湯四兩。倍當歸。加鬼箭紅花。玄胡索。各一兩。為末。煎服。（李時珍）

③衛矛生霍山山谷。八月採陰乾。（別錄）④葉如桃。箭如羽。正月二月七月採。陰乾。或生田野間。（吳普）⑤山野處處有之。創取皮羽入藥。為用甚稀。（陶弘景）⑥今江准州郡亦或有之。三月以後生莖。莖長四五尺許。其幹有二羽狀如箭翎。葉似山茶。青色。八月十一月十二月採。條莖陰乾。其木亦名枸骨。（蘇頌）⑦所在山谷皆有。平陸未嘗見也。葉絕少。其莖黃褐色。若鱗皮。三面如鋒刃。人家多燔之。遺藥方藥少用。（寇宗奭）⑧鬼箭生山石間。小株成叢。春長嫩條。條上四面有羽。如箭羽。視之若三羽。耳。青葉狀似野茶。對生。味酸澀。三四月開碎花。萎綠色。結實大如冬青子。山人不識。惟樵採之。（李時珍）

⑨衛矛湖南便醫謂之六月凌。又植物名實圖考。曲節草條下。謂鬼箭羽。湖南呼為六月冷。或恐一物。因本草綱目有曲節草一名六月凌。六月雪。故疑曲節草與衛

矛

矛

矛

矛

矛

矛

矛

矛

矛

矛

矛

爾雅。詳『蟲彙』條。

基本係節肢動物昆蟲類鞘翅類螢科之螢。

篇載務成螢火丸事蹟甚詳而
安常總病論亦極言其效驗云。

整休」即甘遂之古籍別名。典見和漢藥考。詳『甘遂』條。

十六畫 蕪

〔蘇恭〕①河東河西處有之。〔馬志〕②近道亦有之。以太原者良。大抵榆類而差小。其實亦早成。此榆乃大氣臭。郭璞爾雅注云。無姑姑榆也。生山中。葉圓而厚。剝取皮合漬之。其味辛香。所謂蕪蕪也。採實陰乾用。今人又多取作屑。以芼五味。惟陳者良。人收藏之多。以鹽漬。則失氣味。但宜食品。不填入藥。〔蘇頌〕③按廣州記云。生大秦國。是波斯蕪蕪也。〔李珣〕④蕪蕪有大小兩種。小者即榆莢也。採取仁。醞爲醬。味尤辛。人多以外物相和。不可不擇去之。入藥皆用大蕪蕪。別有種。〔李時珍〕

〔蕪蕪醬〕

性實 辛溫。微臭。無毒。

主治 殺三蟲。功力強於榆仁。

醬。

參攷資料

①蕪蕪醬多食落髮。〔綱目〕②北人亦多食乳酪酥脯甘美之物。皆生蟲之萌也。而不生蟲者。蓋食中多胡荽。蕪蕪。鹵汁殺九蟲之物也。〔張從正〕

〔蕪菁〕

古籍別名 蕪菁。〔唐本草〕九英菴。〔食療〕

諸葛菜。〔綱目〕大芥。〔揚雄方言〕

外國名詞 Brassica caudata, pestris, L. (拉丁) カブラ (日本)

基本 係十字花科。雲臺屬之

蕪菁。

產地 園圃多有之。

形態 蕪菁爲菜類之一。年或越年生。草本。根多肉。有扁圓或稍長者。葉大略似匙狀。緣邊微有缺刻。春開黃花。總狀花序。似雲臺花。結實爲長莢。莢中有種子。其根可供藥用。



蕪菁

性質 苦溫。無毒。

主治 利五臟。輕身益氣。可長食之。

歷代記述攷證

〔唐〕孟詵食療本草論蕪菁曰。消食下氣。治嗽。止消渴。去心腹冷痛。及熱毒。風腫。乳癰。妬乳。寒熱。〔宋〕蘇頌圖經本草論蕪菁曰。常食通中。令人肥健。

參攷資料 ①蕪菁是芥屬。根

長而白。其味辛苦。而短莖粗葉大。而厚闊。夏初起莖。開黃花。四出如芥。結角亦如芥。其子均圓。宛似芥子。而紫赤色。蘆根是菘屬。根圓。亦有長者。有紅白二色。其味辛甘。而永葉不甚大。而糙。亦有花葉者。夏初起莖。開淡紫花。結角如蟲狀。腹大尾尖。子似胡盧巴。不均不圓。黃赤色。如此分之。自明白矣。其蕪菁六月種者。根大而葉蘆。八月種者。葉美而根小。惟七月初種者。根葉俱良。擬賣者。純種九英。九英。根大而味短。削淨爲菹。甚佳。今燕京人以瓶醃藏。謂之閉菜。〔李時珍〕

②九英菴出河西。葉大根亦粗長。和羊肉食甚美。常食都不見發病。冬日作菹。煮羹食。消宿食下氣。治嗽。諸家商略其性冷。而本草云溫。恐誤也。〔孟詵〕③蕪菁多食動氣。〔寇宗奭〕

〔蕪菁子〕

性質 苦辛。平。無毒。

主治 明目。

歷代記述攷證 〔唐〕蘇恭新修本草論蕪菁子曰。療黃疸。利小便。水麥汁服。主癰瘰。積聚。少少飲。

汁。治霍亂。心腹脹。爲末服之。主目暗。爲油入面膏。去黑點。〔唐〕

陳藏器本草拾遺論蕪菁子曰。和油。傅蜘蛛咬。〔唐〕孟詵食療本草論蕪菁子曰。壓油塗頭。能變髮。〔唐〕蕭炳四聲本草論蕪菁子曰。入丸藥服。令人肥健。尤宜婦人。

參攷資料

①仙經言蕪菁子九蒸九曝。搗末。長服。可斷髮。長生。蜘蛛咬者。恐毒入內。搗末酒服。亦以油和。傳之。蕪菁園中無蜘蛛。是其相畏也。〔陳藏器〕②蕪菁子可升。可降。能汗。能吐。能下。能利。小便。又能明目。解毒。其功甚偉。而世罕知用之。何哉。夏初採子。炒過。榨油。同麻油。鍊熟。一色無異。西人多食之。點燈甚明。但烟亦損目。北魏祖珽因地窖中。因蕪菁子油。燈燭明。即此也。〔李時珍〕

〔蕪菁花〕

採取 三月間採之。

性質 辛平。無毒。

主治 療虛勞。明眼目。久服長生。

〔蕪菁葉〕

性質 苦溫。無毒。主治 消食下氣。利。

子、豆、蔻、良。【宋】大明諸家本草論

蕪荑曰。治腸風痔瘻及惡瘡疥癬。

【明】繆希雍本草經疏論蕪荑曰。

蕪荑本經味辛氣平。無毒。甄權加

苦李珣加溫。詳其功用。應是苦辛

溫平之藥。非辛溫則不能散五臟

皮膚骨節中邪毒氣。非苦平則不

能去三蟲。化食逐寸白。療腸中

嘔喘息。然察其所主。雖能除風淫

邪氣之爲害。而其功則長於走腸

胃。殺諸蟲。消食積也。故小兒疳瀉

冷痢。爲必資之藥。【清】黃宮繡本

草求真論蕪荑曰。蕪荑味辛而苦

氣溫無毒。功專燥脾去風。化食殺

蟲。緣蟲生於人腹。多口溼爲之兆

滯爲之得。風爲之助。寒爲之成。直

指方云。嗜酒人血入於酒爲酒瘡

多氣人血入於氣爲氣瘡。虛勞人

敗血雜痰爲血瘡。搖頭掉尾如蟲

之行。上侵入咽。下蝕人肛。或附脇

背。或隱胸腹。大則如蠶。小則如錢

治法。惟當用此煎服。兼用煖胃益

氣理中之類。乃可殺之。且不獨殺

蟲如是。即其皮膚骨節。溼熱內入

留連不解。以致穢垢不清。得以合

氣血調和。肢節安養。而無癢癢

痺之候矣。奈世僅知掃蟲殺蟲。而

不知此更散皮膚骨節淫溼。其亦

未達本經之旨耳。形類榆莢。陳久

氣擅者良。

配合應用 ①和豬脂搗塗熱

瘡和蜜治溼癬和津牛酪或馬酪

治一切瘡

②同肉豆蔻胡黃連盧會使君

子青黛五穀蟲雷丸檳榔橘皮治

小兒疳熱瀉痢及腹大羸瘦面黃

好喫泥土

③治脾胃有蟲食卽作痛面黃

無色以石州蕪荑仁二兩和麵炒

黃色研爲末非時米飲服二錢匕

(千金方)

④制殺諸蟲生蕪荑生檳榔各

四兩爲末蒸餅丸梧子大每服二

十九丸白湯下(本事方)

⑤治疳熱有蟲瘦悴久服充肥

用榆仁一兩黃連一兩爲末豬膽

汁七枚和入盤內飯上蒸之一日

蒸一次九蒸乃入麝香半錢湯浸

蒸餅和丸綠豆大每服五七丸至

一二十九米飲下(錢氏小兒方)

危惡與瘤相似。用白蕪荑乾漆燒

存性。等分爲末。米飲調服。一字至

一錢。(杜壬方)

⑥治結陰下血蕪荑一兩搗爛

紙壓去油爲末。以雄豬膽汁丸梧

子大每服九丸甘草湯下。日五服

三日斷根。(普濟方)

⑦治脾胃氣泄久患不止蕪荑

五兩搗末飯丸梧子大每日空心

午飯前陳米飲下三十丸久服去

三尸益神駐顏(王紹頤續傳信

方)

⑧治膀胱氣急宜下氣用蕪荑

搗和食鹽末等分以綿裹如棗大

納下部或下惡汗並下氣佳(外

臺秘要方)

⑨肥兒丸治嬰孩驚瘡風後失

瘡不能言用蕪荑炒神麴炒麥麴

炒黃連炒各一錢爲末豬膽汁打

糊丸黍米大每服十九丸木通湯下

黃連能去心竅惡血(全幼心鑑

方)

⑩治蟲牙作痛以蕪荑仁安蛀

孔中及縫中甚效(危氏得效方)

⑪治腹中蠶瘕平時嗜酒血入

氣則爲氣蠶。虛勞痢冷敗血雜痰

則爲血蠶。搖頭掉尾如蟲之行。上

侵入咽。下蝕人肛。或附脇背。或隱

胸腹。大則如蠶。小或如錢。治法惟

用蕪荑煎服之。兼用暖胃益血理

中之類。乃可殺之。若徒事雷丸錫

灰之類。無益也。(仁齋直指方)

用量 錢半至二錢

施用宜忌 凡脾胃虛弱及無

蟲積者禁用

著名方劑 蕪荑散治蟲咬心

痛欲驗之大痛不可忍或吐青黃

綠水涎沫或吐蟲發有休止(古

方)蕪荑雷丸各半兩乾漆(研

碎炒烟盡)一兩上共爲末每服

三錢調和服

參攷資料 ①按說文云。檳山

粉榆也。有刺。實爲蕪荑。爾雅云。無

姑其實蕪荑。又云。蕪荑蕪荑。則此物

乃虛樹之蕪荑故名也。李時珍云。②

葭藶乃葭藶二字之誤(蘇恭)③

蕪荑生晉山川谷三月採實陰乾

(別錄)④今惟出高麗狀如榆莢

氣臭如狐彼人皆以作醬食之性

能殺蟲置物中亦辟蛀但患其臭

蕤蕤蕤

用得效也。(蘇頌)●爾雅。械。白樺。

即此也。其花實蕤蕤下垂。故謂之。樺。後人作蕤。柞木亦名械。而物異。

(李時珍)●蕤核生函谷川谷巴。

西(別錄)●今出彭城。大如烏豆。

形圓而扁。有文理。狀似胡桃核。今

人皆合殼用。此應破取仁。秤之。

(陶弘景)●今出雍州。樹生細葉。

似枸杞而狹長。花白子附莖生。紫

赤色。大如五味子。莖多細刺。五月

六月熟。採實日乾。(韓保昇)●今

河東并州亦有之。木高五七尺。莖

間有刺。(蘇頌)●郭璞云。白樺小

木也。叢生有刺。實如耳瑱。紫亦可

食。即此也。(李時珍)

【蕤核】即蕤仁之原名。詳『蕤仁』

條。

【蕤核仁】即蕤仁之處方用名。詳

『蕤仁』條。

【蕤】命名 本品初生無葉。狀

如雀足之拳。又如人足之

蹠。故名。

古籍別名 蕤苗名蕤蕤。(綱

目)

外國名詞 Pteridium aquilinum, Kuhn. (拉丁) フライム

(日本)

基本 係羊齒科蕤蕤。為蕤之

根。

產地 山野多有之。

形態 蕤為菜類之多年生草。

本莖長。匍匐於地。隨處生葉。葉大

為數回複葉。長三四尺。小葉有缺

刻。初夏葉之下面緣邊生繁殖器

根甚長。色紫。皮內有白色澱粉。搗

爛。釐取謂之蕤粉。色淡紫。故根可

供食與藥用。

性質 甘寒。滑。無毒。

主治 燒灰。油調。傳蛇蟲螫傷。

基本 本品為蕤苗與

【蕤其】莖之乾者。

採取 春夏間採苗莖之嫩者。

以灰湯煮。去涎滑。曬乾。作蔬茹與

藥用。

性質 甘寒。滑。無毒。

主治 去暑熱。利水道。令人睡。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食

療本草論蕤其曰。補五臟不足。氣

壅。經絡。筋骨。間毒氣。

參攷資料 ●蕤久食令人目

暗。鼻塞。髮落。又冷氣人食多腹脹。小兒食之。脚弱不能行。(孟詵)●

蕤。多食消陽氣。故令人睡。弱人脚。

四皓食芝而壽。夷齊食蕤而夭。固

非良物。干寶搜神記云。鄒鑑。鎮丹

徒。二月出獵。有甲士折蕤一枝。食

之。覺心中淡淡成疾。後吐一小蛇。

縣屋前。漸乾成蕤。遂明此物不可

生食也。(陳藏器)●蕤之無益。為

其性冷而滑。能利水道。洩陽氣。降

而不升。耗人真元也。四皓採芝而

心逸。夷齊採蕤而心憂。其壽其夭。

於蕤何與焉。陳公之言。可謂迂哉。

然饑人瀕死。賴蕤延活。又不無濟

世之功。(李時珍)

【蕤部】即蕤魚之俗名。詳『蕤魚』

條。

【蕤魚】即杜父魚之別名。詳『杜

父魚』條。

【蕤蕤】原名 蕤蕤。

命名 本品乃蕤樹之

蕤。蕤者實也。故名。

處方用名 臭蕤蕤。白蕤蕤。

古籍別名 莖蕤仁。(爾雅)無

姑仁。(本經)蕤蕤仁。山榆莢。(綱

目) 姑榆仁。蕤蕤仁。(和漢藥考)

基本 屬山榆科。為蕤蕤之子

產地 陳仁山藥物生蘆辨云。

蕤蕤產直隸西陵。乃柯樹之花。開

殘落地。即用該地之坭。弄成片塊。

曬乾是也。氣味臭而撲鼻。

形態 蕤蕤為落葉喬木。自生

於山野川谷。其狀如榆。葉圓而厚。

莢氣臭如狐。

採取 三月採實陰乾。

用法 凡使常用。大者蓋小者。

榆莢仁也。尤以陳久者良。炒去殼

用其氣。性平。無毒。

性質 辛。平。無毒。

效能 散風。澤消。蟲積。用為小

兒殺蟲消疳藥。

主治 五內邪氣。散皮膚骨節

中淫淫溫行毒。去三蟲。化食。(本

經) 逐寸白。散腸中。喝喝喘息。(

別錄)

歷代記述攷證 【唐】韓保昇

蜀本草論蕤蕤曰。主積冷氣。心腹

痼痛。除肌膚節中風。淫淫如蟲行。

【唐】孟詵食療本草論蕤蕤曰。五

臟皮膚肢節邪氣。長食治五痔。殺

中惡蟲毒。諸病不生。【唐】李珣海

藥本草論蕤蕤曰。殺蟲止痛。治婦人子宮風虛。孩子疳瀉。痢得訶

冷淋之即辟也。(李珣)①菖車香楚詞註留夷與菖車別。昔人常栽薜之與今蘭香零陵相類也。(李時珍)

【黃】①即羊蹄之古籍別名。典見和漢藥考。詳「羊蹄」條。②即益母草之古籍別名。典見和漢藥考。詳「益母草」條。

【薺仁】即木槿之古籍別名。典見詩經。詳「木槿」條。

【薺仁】原名 薺核。命名 本品花實薺核。下垂而葉用其核仁故名。

處方用名 薺核仁。製薺仁。古籍別名 白接仁。鹹仁。(爾雅)

基本 爲薺之核仁。產地 陳仁山藥物生產辨云。薺仁產河南禹州。

形態 薺屬灌木類之叢生小。木高數尺。莖多刺。虛狹而長。開白花。實附莖生。色紫赤。圓扁有紋。大如五味子。可供食用。

採取 五六月實熟時。採之日乾。製法 雷斅曰。凡使薺核仁。以

湯浸去皮。尖。擘作兩片。每四兩用芒硝一兩。木通草七兩。同水煮一伏時。取仁研膏入藥。

性質 甘溫。無毒。效能 祛風熱。明目。專作眼科藥。

主治 心腹邪熱結氣。明目。目赤痛傷。淚出。目腫。皆爛。久服輕身。益氣不飢。(本經)破心下結。療痞氣。腸鼻。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】吳普蜀本草論薺仁曰。強志明耳目。【唐】甄權藥性本草論薺仁曰。治鼻衄。

【唐】陳藏器本草拾遺論薺仁曰。生治足腫。熟治不眠。【明】經粹雅本草經疏論薺仁曰。薺核神農味。甘氣溫。別錄加微寒。無毒。氣薄味。厚。入足厥陰經。厥陰爲風木之臟。開竅於目。風熱乘肝。則肝血虛而目爲之病。或爲赤痛腫傷。或爲淚出。皆爛。此藥溫能散風寒。能除熱。甘能補血。肝氣和而目疾悉瘳矣。其主心腹邪結氣者。即邪熱氣也。熱則生痰。痰凝中焦。氣爲之痞。甘寒除熱。溫主通行。熱邪去而痰白不生。痰結解而氣自通暢矣。鼻衄

者。熱在上焦。心肺之分也。甘寒總能除上下之熱。故亦主之。非養性益精之藥。而云輕身益氣不飢者。未必然也。【清】黃宮繡本草求真論薺仁曰。薺核眼科藥也。凡眼病多因風熱乘肝。以致血虛而目不得明。故病必見上下眼胞風腫。弦爛。左右皆熱障。得此溫能散風。寒能勝熱。甘能補血。俾火退淚止。而目疾瘳矣。赤筋在翳膜外者。得此則宜湯浸去皮。尖。擘作兩片。芒硝。木通。通草同煎。一伏時。取出研膏入藥。

配合應用 ①春雪膏。治肝虛風熱。上攻。眼目昏暗。痒痛。隱澀。赤腫。羞明。不能遠視。迎風有淚。多見黑花。用薺仁去皮。壓去油。二兩。腦子二錢。牛研勻。生蜜六錢。和收點眼。(和劑局方)

②百點膏。治一切眼疾。薺仁去油。三錢。甘草。防風。各六錢。黃連五錢。以三味熬取濃汁。次下薺仁膏日點。(孫氏集效方)

③撥雲膏。取下翳膜。薺仁去油五分。青鹽一分。豬脂子五錢。共搗二千下。如泥。罐收點之。又方。薺仁

一兩。去油。入白蓬砂一錢。麝香二分。研勻。收之。去翳妙不可言。

④飛血眼藥。薺仁一兩。去皮。細辛半兩。苦竹葉三握。洗水二升。煎一升。濾汁。頻澀洗之。(聖濟總錄方)

⑤治赤爛眼。用薺仁四十九個。去皮。胡粉。煨如金色。一雞子大。研勻。入酥一杏仁許。龍腦。三豆許。研勻。油紙裹收。每以麻子許。塗大小。皆上。頻用取效。(近效方)又用薺仁杏仁各一兩。去皮。研勻。入膩粉少許。爲丸。每用熱湯化洗。(經驗良方)

用量 錢半至三錢。施用宜忌 凡無風熱者禁用。參攷資料 ①醫方惟以療眼。仙經以合守中丸也。(陶弘景)②按劉禹錫傳信方。所著治眼法。最奇。云。眼風痒。或生翳。或赤。皆一切皆主之。宜州黃連。連末。薺核仁。去皮。研膏。等分。和勻。取無蚶乾。棗二枚。割下頭。去核。以二物填滿。却以割下頭合定。用少薄綿包之。大茶盃盛於銀器中。文武火煎。取一雞子大。以綿濾。收點眼。萬萬不失。前後試驗十數人。皆應。今醫家亦多

十六畫 蔞

蔞 蕙 蔞

【蔞草】即甘草之古籍別名。典見別錄。詳「甘草」條。

【蕙花】 命名 蕙者饒也。其花繁饒。故名。

古籍別名 黃芫花。(和漢藥考)

外國名詞 Wikstroemia japonica, Miq. (拉丁)

基本 屬瑞香科。為蕙花之花。

產地 凡山野川谷間恒多生焉。

形態 蕙花為落葉小灌木。山地自生之植物也。高三四尺。其樹皮為製紙之原料。故暖地亦栽種之。春季發芽。葉為橢圓形。末端尖銳。長五六分至寸許。枝葉皆對生。入秋枝梢與葉腋之間。俱抽花梗。開黃色四瓣之花。其狀如筒。長二分許。

採取 六月間採花陰乾。

性質 苦寒。有毒。

效能 利水。破積。用治水腫。及祛痰藥。

主治 傷寒溫瘧。下十二水。破積聚。大堅癥瘕。蕩滌胸中留癖飲食。寒熱邪氣。利水道。(本經)療痰

飲咳嗽。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論蕙花曰。治咳逆上氣。喉中腫滿。疰氣蠱毒。痰癖氣塊。【清】黃宮繡本草求真論蕙花曰。蕙花雖與芫花形色相同。而究絕不相似。蓋芫花葉尖如柳。花紫似荊。蕙花苗莖無刺。花細色黃。至其性味。芫花辛苦而溫。此則辛苦而寒。若論主治。則芫花辛溫多有達表行水之力。此則氣寒。多有入裏走泄之效。故書載能治痢。然要皆屬破結逐水之品。未可分途而別視也。但藥肆混收。亦可見效。以其主治差同故耳。【清】鄭澍本經疏證論蕙花曰。傷寒表不解。心下水氣乾嘔發熱而咳。若微利者。去麻黃加蕙花。如雞子大。然令赤色。注云。下利者。不可攻其表。汗出必脹滿。去麻黃。惡發汗。夫太陽與陽明合病。下利者。與葛根湯。其中未嘗無麻黃。不慮其脹滿何哉。蓋葛根湯所治證。其表但有風寒。風寒者。標在外。本亦在外。小青龙湯證。則本雖風寒。標已化水。風寒雖仍在。外水飲則已內連。若徒發其外。則在外之風寒。緣故內連之水氣。必隨出於表。於是水入經隧。為脹滿。不可與葛根湯同論也。雖然。治水之出於表者。有防已。有大戟。治水之為咳喘者。有芫花。此則用蕙花者。何蓋防已主傷寒溫瘧熱氣。此則未化為熱也。大戟治風與水在皮膚疼痛。此則不疼痛也。芫花治因水咳喘。僅能下氣。不能治利。故主以蕙花。然主治惟與芫花為近。故後世或有以芫花代者。焉於此見蕙花與芫花。功用略同。而芫花惟下氣行水。蕙花兼破飲食積聚。利水道。差有別矣。

用量 八分至錢半。

參攷資料 ●張仲景傷寒論以蕙花治利者。取其行水也。水去則利止。其意如此。今用之當斟酌。不可過使與不及也。須有是證。乃用之。(寇宗奭) ●蕙花生咸陽川谷及河南中弁。六月採花陰乾。(別錄) ●中弁者。時從河上來。形似芫花。而極細白色。(陶弘景) ●苗似胡荽。莖無刺。花細黃色。四月五月收。與芫花全不相似也。(蘇恭) ●所在有之。以雍州者為好。

一七二四

生岡原上。苗高二尺許。(韓保昇)

●按蘇頌圖經言絳州所出。芫花黃色。謂之黃芫花。其圖小株花成簇生。恐即此蕙花也。生時色黃。乾則如白。故陶氏言細白也。或言無芫花。以桃花代之。取其利耳。(李時珍)

●蕙花形如芫花。而小色黃者是。又有白花者。藥舖無此。可以芫花代之。按其味甘辛。利水之功。一如芫花。(和漢藥考)

【蕙草】即佩蘭之古籍別名。典見別錄。詳「佩蘭」條。

【蕙蘭】即建蘭之古籍別名。典見綱目。詳「建蘭花」條。

【藟車香】 性質 辛溫。無毒。

主治 鬼氣。臭。及蟲魚蛇蠱。

歷代記述攷證 【唐】李珣海藥本草論藟車香曰。治蠶亂。辟惡氣。薰衣佳。

參攷資料 ●藟車香。氣味微寒。李珣) ●藟車香。廣志云。藟車香生徐州。高數尺。黃葉白花。爾雅藟車。乞與郭璞云。香草也。(陳藏器) ●藟車香。生海南山谷。齊民要術云。凡諸樹木蟲蛇者。煎此香

遇胃寒踏冷。其血必往來心腹間。刺痛不可忍。謂之血母。并治產後心腹諸疾。產後三日。不可無此。用

薑子炒。當歸。桂心。赤芍藥等分。每酒服二錢。趕下惡物。(楊氏產乳方)

①治產後血暈。薑子。生地黃。等分。爲末。每服三錢。薑七片。酒水各半。煮。童便半。煮。煎七分。溫服。即甦。(溫隱居海上方)

②追氣丸。治婦人血刺。小腹痛。不可忍。亦可常服。補血虛。破氣塊。甚效。用薑子微炒。桂心各一兩。高良薑半兩。爲末。醋糊丸。梧子大。每淡醋湯下五丸。(沈存中靈苑方)

③治腸風臟毒下血。薑子生用。甘草炙。爲末。每服二錢。水煎服之。(普濟方)

④治頭風作痛。薑子一分。大黃三分。爲末。噉鼻。

⑤治風熱牙痛。薑子。白芥子。角茴香。等分。爲末。噉鼻。左噉右。右噉左。(聖惠方)

⑥治小兒天釣。薑子。生烏頭。去皮尖。各二錢。爲末。每用一錢。水

調塗頂上。名塗頂散。(聖濟總錄方)

⑦治風疳不愈。陳菜子油同穿山甲。未熬成膏。塗之。即愈。(攝生衆妙方)

⑧治熱癰腫毒。薑子。狗頭骨。等分。爲末。醋和。傅之。(千金方)

⑨治傷損接骨。薑子。一兩。小黃米炒二合。龍骨少許。爲末。醋調成膏。攤紙上貼之。(乾坤秘製方)

⑩治湯火傷灼。菜子油調蚯蚓屎。搽之。(楊起簡便單方)

⑪治蜈蚣螫傷。菜子油傾地上。擦地上。油擦之。即好。(陸氏積德堂方)

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡無滯及腸滑者禁用。

參攷資料 薑子。菜子。葉同功。

其味辛。氣溫。能溫能散。其用長於行血滯。破結氣。故古方治腫散結。

治產後一切心腹氣血痛。諸逆風丹毒熱腫。瘡痔諸藥。咸用之。經水行後。加入四物湯服之。云能斷產。

又治小兒驚風。貼其頂額。則引氣上出也。婦人方治產難。歐。黃金

花結粟米實。細研。酒下十五粒。靈丹功效妙如神。難產之時能救急。(李時珍)

【薺】即薺草之古籍別名。典見本草拾遺。詳「薺草」條。

【薺草】古醫別名 馬唐。馬飯。羊麻。羊粟。(別錄) 薺。

(拾遺) 薺子。(爾雅) 軒于。(綱目) 雁音草。(日本)

外國名 國 Caryopelia di-

Verstea, Maxin. (拉丁) カ

リガネサウ ホカケサウ ヤ

マドリサウ ムラチドリ モ

モチドリ(日本)

基本 係馬鞭科段菊屬。爲薺

草之根葉。

產地 山野原澤間。



薺草

形態 薺草爲澤草類之野生

雜草。有臭氣。甚烈。莖方形。高至三四尺。葉卵形而尖。有鋸齒。對生。秋日枝梢分叉。開花。唇形花冠。青紫

色。雌蕊突出於花外。花序比較大。數倍。着花疎散而不密。

性質 甘寒。無毒。

主治 調中。明目。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器

本草拾遺論。薺草曰。煎取汁。明目潤肺。又曰。薺消水氣。逐痺脚氣。頑痺虛腫。小腹急。小便赤澀。並合赤小豆。煮食。勿與鹽絞汁。服止消渴。搗葉。傅毒腫。

參攷資料 ①馬食之。如餅如飯。故名馬唐。馬飯。(陳藏器) ②羊

亦食之。故曰羊麻。羊粟。其氣瘡臭。故謂之薺。薺者。瘡也。朽木臭也。此草莖頗似薑。而臭。故左傳云。一薺

一薺。十年尚猶有臭是也。孫升談園。以爲香薺者。誤矣。即別錄馬唐也。今并爲一。(李時珍) ③馬唐生

於澤地。莖有節。生根。五月採。(別錄) ④生南方。廢稻田中。節節有根。着土。如結縷草。堪飼馬。又曰。薺

生水田中。狀如結縷草。而葉長。馬食之。(陳藏器) ⑤薺草與馬唐。本

分列二種。本草綱目始併爲一。但考馬唐。係禾本科植物。與薺實非一物也。(植物學大辭典)

菜子油。

採取 二月間採之。

性質 辛溫無毒。

效能 散血消腫毒。瀉熱。治遊丹。用作破癰藥。

主治 風遊丹腫。乳癰。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器

本草拾遺論蓼曰。煮食治脚痺。搗葉傳女人吹奶。【宋】開寶重

定新本草論蓼曰。破癰瘕結血。

【宋】日華諸家本草論蓼曰。治產後血風及瘀血。【明】李時珍本

草綱目論蓼曰。治癰疽。碗豆瘡。

散血消腫。伏蓬砂。【清】王士雄隨

息居飲食諸論蓼曰。蓼辛滑甘溫。煮食可散血消腫。破結通

腸。子可榨油。故一名油菜。形似菘

而本削莖狹葉銳。俗呼青菜。以色較深也。發風動氣。凡患腰脚口齒

諸病及產後癆瘡家鋼疾目證時感皆忌之。

配合應用 ①治天火熱瘡。初起似癰。漸如水泡。似火燒瘡。赤色

急速能殺人。蓼葉搗汁調大黃

芒硝生鐵衣等分塗之。【近效方】

②治風熱腫毒。蓼臺苗葉根。蔓

莖根各三兩爲末。以雞子清和勻

貼之即消。無蔓莖即以商陸根代之亦甚效也。【近效方】

③治手足癢疽。此疽喜著手足肩背。累累如赤豆。剝之汁出。用蓼

臺葉煮汁服一升。并食乾熟菜數頓。少與鹽醬。冬月可用子研水服

（千金方）

④治異疽似癰。而小有異。膿如小豆汁。今日去。明日滿。用蓼臺搗

熟布袋盛。於熱灰中煨熟。更互熨之。不過三二度。無葉用乾者。【千金方】

⑤治豌豆斑瘡。蓼臺葉煎湯洗之。【外臺祕要方】

⑥治血痢腹痛。日夜不止。以蓼臺葉搗汁二合入蜜一合。溫服亦

治腸風下血。【聖惠方】

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡無瘀滯及腸滑者禁用。

參攷資料 ①蓼臺破血。故產婦宜食之。【陳藏器】 ②貞觀七年

三月。予在內江縣。飲多。至夜覺四

體骨肉疼痛。至曉頭痛。額角有丹

如彈丸。腫痛。至午通腫。目不能開。

經日幾斃。予思本草蓼臺治風遊

丹腫。遂取蓼臺傳。隨手即消。其驗如神也。亦可搗汁服之。【孫思邈】

③春月食之。能發膝痠痺。【別錄】

④先患腰脚者。不可多食。食之加劇。又損腸氣。發瘡及口齒病。胡臭

人不可食。又能生腹中諸蟲。道家特忌。以爲五葷之一。【孟詵】 ⑤此

菜易起瘡。須採其蓼食。則分枝必多。故名蓼臺。而准人謂之蓼芥。即

今油菜。爲其子可榨油也。羌隴氏胡。其地苦寒。冬月多種。此菜能歷

霜雪。種自胡來。故服虔通俗文謂之胡菜。而胡治居士百病方謂之

寒菜。皆取此義也。或云塞外有地名蓼臺。始種此菜。故名。亦通。【李時珍】 ⑥別錄云。蓼臺乃人間

所噉菜也。【蘇恭】 ⑦蓼臺不甚香。經冬根不死。辟蠹。於諸菜中亦不甚佳。【寇宗奭】 ⑧蓼臺方藥多用。

諸家註亦不明。令人不識爲何菜。珍訪考之。乃今油菜也。九月十月

下種生葉。形色微似白菜。冬春採

臺心爲茹。三月則老。不可食。開小

黃花。四瓣如芥花。結莢收子。亦如

芥子。灰赤色。炒過榨油。黃色。燃燈

甚明。食之不及麻油。近人因有油

利。種者亦廣云。【李時珍】

【蓼臺子】 命名 本品易起瘡。須採其蓼食。則分枝必多。故名。

處方用名 蓼臺子。油菜子。外國名詞 Rape（英）

基本 屬十字花科蓼臺之種子。

產地 凡江浙諸省之田野間。恒有產焉。

採取 三四月間採之。採得曝乾用。

性質 辛溫無毒。

效能 行血利產消腫。治瘡。用作利產下瘀藥。

主治 風遊丹腫。乳癰。

歷代記述攷證 【唐】孫思邈

千金翼論蓼臺子曰。夢中洩精。與鬼交。【唐】陳藏器本草拾遺論蓼

臺子曰。取油傳頭。令髮長黑。【明】

李時珍本草綱目論蓼臺子曰。行

滯血。破冷氣。消腫散結。治產難。產

後心腹諸疾。赤丹熱腫。金瘡血痔。

配合應用 ①蓼臺散。治產後惡露不下。血結衝心刺痛。將來穢

惡露不下。血結衝心刺痛。將來穢

惡露不下。血結衝心刺痛。將來穢

惡露不下。血結衝心刺痛。將來穢

風。首製重綿三十年不愈。予以蕎麥粉二升。水調作二餅。更互含頭上微汗即愈。(怪證奇方)

●頭風風服。蕎麥作錢大餅。貼眼四角。以米大艾炷灸之。即效如神。

●染髮令黑。蕎麥針砂二錢。醋和。先以漿水洗淨。塗之。荷葉包至一更洗去。再以無食子。詞子皮。大麥麵二錢。醋和塗之。荷葉包至天明洗去即黑。(普濟方)

●治絞腸痧痛。蕎麥麵一撮。炒黃水蒸服。(簡便方)

●治小腸疝氣。蕎麥仁炒去尖。胡盧巴酒浸曬乾。各四兩。小茴香炒一兩。爲末。酒糊丸。梧子大。每空心鹽酒下五十丸。兩月大便出白膿去根。(孫天仁集效方)

用薑 三錢至五錢
施用宜忌 凡脾胃虛寒者禁

參攷資料 ●本草言蕎麥能鍊五臟滓穢。俗言一年沉積在腸胃者。食之亦消去也。(玉類) ●蕎麥最降氣寬腸。故能鍊腸胃滓滯。而治濁帶。痢腹痛。上氣之疾。氣

盛有溼熱者宜之。若脾胃虛寒人食之。則大脫元氣而落鬚眉。非所宜矣。孟詵云。益氣力者。殆未然也。

按楊起簡便方云。肚腹微微作痛。出即瀉。瀉亦不多。日夜數行者。用蕎麥麵一味作飯。連食三四次。即愈。予壯年患此。兩月瘦怯尤甚。用消食化氣藥。俱不效。一僧授此。而愈。轉用皆效。此可徵其鍊積滯之功矣。普濟治小兒天疳。及歷節風方中亦用。李時珍云。

●酸微寒。食之難消。久食動風。令人頭眩。作麵和豬羊肉熟食。不過八九頓。即患熱風。鬚眉脫落。還生亦希。涇陽以北多此疾。又不可合黃魚食。(孫思邈) ●蕎麥南北皆有。立秋前後下種。八九月收割。性最長霜。苗高一二尺。赤莖綠葉。如烏柏葉。開小白花。繁密粲然。結實纍纍如羊蹄實。有三稜。老則烏黑色。王禎農書云。北方多種。磨而爲麵。作煎餅配蒜食。或作湯餅。謂之河漏。以供常食。滑細如粉。亞於麵麥。南方一種。但作餅餌食。乃農家居冬穀也。(李時珍)

【蕎麥粉】即蕎麥之處方用名。詳

『蕎麥』條。

【蕎麥葉】 主治 作茹食。下氣。利耳目。多食即微瀉。

參攷資料 蕎麥葉生食。動刺風。令人身痒。(千金)

【蕎麥】即薺之俗名。詳『薺』條。

【蕎麥稽】 主治 燒灰淋汁。取饅然乾。同石灰等分。蜜收。能爛癰疽。蝕惡肉。去腐瘰。最良。穰作薦辟風。

參攷資料 ●燒灰淋汁。洗六畜瘡并驅馬躁蹄。(日華)

【薺】即草薺之古籍別名。典見本經。詳『草薺』條。

【薺子】 產地 出粵、桂、安南及熱帶諸地。

形態 薺子爲夷果類之一種。藤緣樹木而生。正二月開花。四五月實熟如梨。赤如雞冠。核如魚鱗。可供食與藥用。

性質 甘平。無毒。

主治 中惡蠱邪。心腹卒痛。疫癘狂邪。心神顛倒不寧。昏冒如癡。以及驚癇恍惚。或言語不倫。歌笑不徹。燒研七枚。入硃砂少許。薑湯下。

【薺根】即防風之古籍別名。典見別錄。詳『防風』條。

【薺華】即連翹之古籍別名。典見和漢藥考。詳『連翹』條。

【薺薺】 處方用名 薺薺藥。油菜葉。

古鑑別名 寒菜。胡菜。(胡居士) 臺菜。(埤雅) 薺芥。(沛志) 油菜。油菜。油(綱目) 真菜。(和漢藥考)

外國名詞 Brassica campestris, L. (拉丁)

基本 屬十字花科。爲薺薺之華葉。

形態 薺薺爲二年生草。各地多栽培之。莖高四五尺。葉大而互生。作廣披針形。呈濃綠色。稍帶紫色。葉之基部包莖。四月梢上開黃色四瓣花。作繖狀花序。排列花後結角實。熟則裂開。中有黑色小粒狀種子。攢其種子。得脂肪油。謂之



薺 薺

十六畫 蕎

古稱別名 蕎麥。烏麥。(吳瑞)
花蕎。甜蕎。(綱目)

外國名詞 Fagopyrum es-
culentum, Moench. (拉丁) N
P (日本)

基本 係蓼科蕎麥屬。藥用其
子實。

產地 陳仁山藥物生產辨云。
蕎麥產廣東東西江等處。植物學
大辭典曰中央亞細亞及東印度
為原產地。

形態 蕎麥為麥類之一年或
越年生草本。莖高一二尺。葉為心
臟形。如三角狀。有長柄而互生。邊
緣生細毛。晚秋葉頂葉腋出花梗。
開小白花。列為錐圓花序。果實為
乾果。作三稜形。熟則色黑。其中澱
粉可供麵粉醬油等之原料。又與
莖葉俱可充藥用。



蕎 麥

採取 八九月採之。採得曝乾
去殼用。

用法 恒以磨粉和藥。
性質 甘平。寒。無毒。

效能 下氣利腸消積寬胸。用
作健胃消化藥。

主治 實腸胃。益氣力。續精神。
能鍊五臟滓穢。

歷代記述攷證 【唐】蕭炳四

聲本草論蕎麥曰作飯食。歷丹石
毒甚良。【明】吳瑞日用本草論蕎

麥曰以醋調粉塗小兒丹毒。亦腫
熱瘡。【明】李時珍本草綱目論蕎

麥曰降氣寬腸。磨積滯。消熱腫風
痛。除白濁白帶。脾積洩瀉。以沙糖

水調炒麵二錢。服治痢疾。炒焦熱
水衝服。治絞腸痧痛。【清】黃宮繡

本草求真論蕎麥曰蕎麥味甘性
寒。治能降氣寬腸。消積去穢。凡白

帶白濁泄痢。疳積潰爛。湯火灼傷
氣盛溼熱等症。是其所宜。且炒焦

熱水衝服。以治絞腸痧腹痛。醋調
塗之。以治小兒丹毒赤腫。亦妙。蓋

以味甘入腸。性寒瀉熱。氣動而降
能使五臟滯滯。皆練而去也。若使

脾胃虛弱。不堪服食。食則令人頭
眩。作麵和猪羊肉食。食則令人鬚
眉脫落。又不可合黃魚以食。皆是

其性動降之故。燒灰淋汁即驗。用
化石灰能去腐肉。【清】王士雄隨

息居飲食譜論蕎麥曰政麥甘溫
羅麵麥食開胃寬腸。益氣力。禦風

寒。鍊滓穢。磨積滯。與蘆根同食良
以性有微毒而發痼疾。蘆根能制

之也。而更易長易收。尤為救荒極品
各處皆宜。廣種為是。另有一種味

苦者。雖不堪食。亦可濟荒。
近人學說 丁福保曰蕎麥含

一種之加里性。且有黏滑性。故為
一種疏濬劑。功能滑潤腸裏面而

通大便。吸收於血中則循行黏膜。
入腎而有利尿之效。

配合應用 ①治咳嗽上氣。蕎
麥粉四兩。茶末二錢。生蜜二兩。水

一碗。順手攪下。飲之。良久下氣
不止。即愈。(儒門事親方)

②治十水腫喘。生大戟一錢。蕎
麥麵二錢。水和作餅炙熟。為末。空

心茶服。以大小便利為度。(聖惠
方)

③治男子白濁。用葭麥炒焦。為
末。雞子白和丸。梧子大。每服五十

丸。鹽湯下。日三服。亦治赤白帶下。
(魏元君濟生丹方)

④治禁口痢疾。蕎麥麵每服二
錢。炒。糖水調下。(坦仙方)

⑤治癰疽發背。一切腫毒。政麥
麵。硫黃各二兩。為末。井華水和作

餅。曬收。每用一餅。磨水傅之。痛則
令不痛。不痛則令痛。即愈。(直指
方)

⑥治瘡頭黑凹。蕎麥麵煮食之。
即發起。(直指方)

⑦治痘瘡潰爛。用蕎麥粉頻
傅之。(痘疹論方)

⑧治湯火傷灼。用蕎麥麵炒黃
研末。水和傅之。如神。(奇效方)

⑨治蛇盤瘰癧。圍接項上。用蕎
麥炒去殼。海藻白。鹽炒去絲。等

分為末。白梅浸湯。取肉減中和丸。
綠豆大。每服六七十丸。食後臨臥

米飲下。日五服。其毒當從大便泄
去。若與淡菜連服尤好。淡菜生於

海藻上。亦治此也。忌豆腐雞羊酒
麵。(阮氏方)

⑩通仙散。治男子敗精。女人敗
血。不動真氣。用政麥麵三錢。大黃

二錢。半為末。臥時酒調服之。(多
能鄙事方)

⑪治頭風長冷。李樓云。一人頭

本種植物之成熟果實曬乾者。本品呈赤色或赤褐色。作長圓錐形或紡錘形。有光澤。往往弧曲。粗一仙米長至十仙米。有附有萼及果梗者。果殼內面空洞。通常分爲二室。黃色。扁平。粗至五密米。藏有多數種子。又和漢藥考曰。蕃椒製劑有蕃椒酒。用於空扶斯末期。惡性咽喉炎及衰弱諸病。日本向用以調味之七色蕃椒。七色唐辛係用下方配成。將蕃椒分爲二。一用炭火焙。一即用臼搗碎爲末。另將陳皮。薑。胡椒。麻子。蜀椒。青海苔。用鐵鍋焙然。然後搗碎篩過。每蕃椒末三匙。加前六味各二匙。入桶混和。納邊藏之。日本之有蕃椒。在慶長十年。與煙草同由南蠻傳入。故有南蠻胡椒之名。又豐臣太閤征朝鮮時。由加藤清正攜歸。故又有高麗胡椒之名。

配合應用 ●治外痔。以象牙辣茄煎熟者。剉細。甜醬拌食。(百草鏡方)

●治毒蛇傷。用辣茄生嚼十一二枚。即消腫定痛。傷處起小泡。出黃水而愈。食此味反甘而不辣。或

嚼爛敷傷口。亦消腫定痛。(百草鏡方)

●祛臭蟲方。用羊頭骨一個。秦椒半斤。共入火盆內。同鋸木屑燒之。門窗閉緊。勿令出烟。其蟲自死。敏按木屑用樟木者佳。(經驗廣集方)

●治凍瘡。剝辣茄皮貼上。即愈。(蔡白雲方)

●治痢積水瀉。用辣茄一個。爲衣。清蒸。以熱豆腐皮裹。吞下。即愈。(醫宗彙編方)

用量 三分至八分。

施用宜忌 凡陰虛有火者禁用。

參攷資料 ●人家園圃多種之。深秋山人多挑販入市貨賣。取以熬辣醬及洗凍瘡用之。所用甚廣。而綱目不載其功用。陳吳堯食物宜忌云。食菜莢即辣茄陳者爲良。其種類大小方圓黃紅不一。惟一種尖長者名象鼻辣茄。入藥用。(趙恕軒)

●又一種木本者名番薑。范成臺海府志。番薑木本。種自荷蘭。開花白瓣。綠實尖長。熟時朱紅。奪目。中有子。辛辣。番人帶殼啖之。內地名番椒。更有一種結實圓而微尖。似奈。種出咬嚼吧。內地無所出也。(趙恕軒) ●辣茄一名臘茄。臘月熟。故名。亦入食料。苗葉似茄葉。而小。莖高尺許。至夏乃花。白色。五出。倒垂。如茄花。結實青色。其實有如柿形。如秤錘形。有小如豆者。有大如橘者。有仰生於頂者。有倒垂葉下者。種種不一。入藥。惟取細長如象牙。又如人指者。作食料皆可用。(藥檢) ●食之走風動火。病目發瘡。痔。(陳吳堯) ●味辛。性大熱。入口即辣。舌能祛風行血。散寒。解鬱。導滯。止群。治癰。癰。藥檢) ●蒸壁風。洗凍瘡。浴冷芥。瀉大腸。寒。辭(百草鏡) ●按花鏡。番椒一名海風藤。俗呼辣茄。木高二三尺。夏生白花。秋來結子。儼如禿筆頭。倒垂。初綠後朱紅。懸掛可觀。其味最辣。人多採用。研極細。冬月以代胡椒。蓋其性熱而散。能入心脾二經。亦能祛水滯。癸亥子在臨安。有小僕於暑月食冷水。臥陰地。至秋病發。百藥罔效。延至初冬。偶食辣醬。適口。每食需此。又用以煎粥。食未幾。瘧自愈。良由胸膈積水。變

爲冷痰。得辛以散之。故如湯沃雪耳。又名秦椒。李成裕遼載。秦椒一名番椒。形如馬乳。色似珊瑚。非本草秦地之花椒。即中土之辣茄也。(趙恕軒) ●秦地乃草本辣椒。綱目諸註誤爲秦地。花椒不知即今之辣茄。又名辣皮。性熱。味辣。溫中散寒。除風發汗。去冷癖。行痰逐滯。多食眩暈。動火故也。久食發痔。令人齒痛。咽腫。龍柏藥性考)

【番鱸魚】即海鰻魚之古籍別名。典見綱目。詳「海鰻魚」條。

【草薑】即薑之古籍別名。典見本經。詳「薑」條。

【薑】即薑之一種。性質功效與茵同。詳「茵」條。

【蕉子】即芭蕉實之簡稱。詳「芭蕉」條。

【箭】即澤瀉之古籍別名。典見和漢藥考。詳「澤瀉」條。

【薑】即大戟之古籍別名。典見爾雅。詳「大戟」條。

命名 本品莖幹柔弱。而趨然。易長易收。其實磨麵如麥。故名。

處方用名 蕎麥粉。甜蕎麥。

殺魚。

參攷資料 蕁麻葉。不可服。令人吐利不止。(綱目)

【蕃荷菜】即薄荷之古籍別名。與見食性本草詳「薄荷」條。

【蕃椒】

原名 辣椒。本品莖葉花序

一似茄狀。而子味極辛辣。故稱辣椒。番人常帶微暖之故名蕃椒。

處方用名 辣椒。辣醬。

古籍別名 番椒。番姜。(范咸臺灣府志) 番薑。(綱目拾遺) 海

瘋藤。(花鏡) 秦椒。辣虎。(龍柏藥性考) 赤椒。海椒。臘茄。山珊瑚。地

珊瑚。海風藤。南蠻胡椒。高麗胡椒。(和漢藥考)

外國名詞 Fructus Capsici (拉丁) Red Pepper. Capsicum Frut. (英) Spanischer Pfeffer. (德)

基本 屬茄科蕃椒之實。形態 蕃椒為一年生草。高有至二三尺者。葉作卵圓形或長卵

圓形。略帶尖。有長葉柄。夏季開花。為淡黃色或白色。合瓣花冠。有長

花梗。實細長。初綠色。熟則呈赤

色而下垂。為長圓形。莢果。粗如小

指。有赤色或黃褐色薄膜。作革質狀。有光澤。莢中大半為空洞。中有無數黃色心臟形種子。新鮮者。有惡臭。但乾後則消失。味辛辣。如灼貼於皮膚。則刺戟該部分而充血。多食則發諸瘡云。



椒 蕃

採取 臘月實熟時採之。其嫩者秋季採之。曬乾。

性質 辛苦。大熱。無毒。成分 為辛味樹脂。蠟質。色素。

鹽類等。為辛味樹脂。蠟質。色素。用酒精及伊打混和液浸出。將液

蒸發。可得黃赤色或赤褐色之濃稠液體。即此物也。放置空氣中。即

行凝結。逢水及醋。稍溶。逢酒精。伊打松節油。苛性鈉液。善能溶解。熱

之則變為稀薄液體。再加熱。則發煙揮散。

效能 溫中。散寒。殺蟲。擦癬。用於消化器衰弱。水腫。咽喉喉衝。風

痛等。又用以代樟腦。藏置箱櫃中。

主治 溫中下氣。散寒除濕。開鬱去痰。消食殺蟲。治嘔逆。痰噎。腸

止瀉。痢。祛風。腳氣。

國外學說 英美學說謂辣椒一名大椒。產中國。西國等處。其乾

熟之果。可為藥品。酒水。油類。均能提出功力。此草高約一二尺。果內

之子極繁。辣椒有數種。其原產地。在南亞美利加。從該處傳至歐羅

巴。西亞。亞等處。因東方各國之人。喜用辣味之實。故其傳布甚速。

印度人雖多種辣椒。尚未特設一名。故謂之紅椒。凡椒類必種於各

熱地。所以西國之種辣椒。常在玻璃房內。有一種辣椒。俗名幾尼椒。

產亞非利加。又有一種辣椒。名英椒。產印度與西印度列島各處。今

西國所用者。係產印度亞非利加等處。其體小如豆粒。而其力則較

大。其形狀不等。有圓形。有橢圓形。有心形。有牛角形。色或紅或黃。入

藥。則用其尖長者。宜用酒及水浸之。其嗅略香。味最辣者。有之。稍辣

者。亦有之。其作用為引火藥。又為解性行氣藥。能開胃暖胃。治肚瀉

霍亂。黃熱症。吐黑水。積滯。暈船。痛

熱症。宜和金雞納霜同服。在熱地。則多用為加味之料。又如喉失音。

則用為漱喉藥。又作糖片服之。蓋內服辣椒。能令腹暖。及能助胃消

化。塗在皮膚。能發紅熱。久則並作水泡。又如外搽風溼骨疼。跌打等

症。甚驗。處方以辣椒。半分。搗爛。濃酒。四十分。先用酒。三十分。浸二天。

間時搖動。裝淋。濾。加餘酒。漂淋。用絞盤絞。濾。過。淋。紙。再加酒。仍

足。四十分。為度。每服。一分。七釐。牛至。三分。牛。(辣椒酒方) (此酒

不適口。宜加陳皮酒。或陳皮糖和服) 又方。辣椒酒。五。分。二。釐。半。至

一。錢。零。五。釐。玫瑰。泡。水。八。兩。和。勻。為。度。治。咽。喉。類。症。(辣椒水方)

又方。辣椒。一分。濃。酒。三。分。浸。七。天。過。淋。紙。為。度。治。凍。瘡。用。呢。子。布。蘸

酒。擦。患。處。治。牙。痛。用。棉花。蘸。酒。塞。牙。穴。內。(辣椒擦酒方) 辣椒。內。含

有。精。而。其。功。力。則。全。在。此。精。之。名。之。所。謂。法。西。先。者。即。係。該。精。之。名。

如。用。法。取。出。則。有。異。常。之。辣。若。將。中。煎。放。於。座。上。凡。嗅。其。臭。者。莫。不

噴。嚏。日。本。藥。局。方。曰。蕃。椒。係。採。取

【篇迦】即栗之古籍別名。典見梵書。詳「栗」條。

【篇榲香】基本 本品即篇榲樹之木脂。色白氣香。

古籍別名 黑色者名黑篇榲。

(綱目)

外國名詞 Pistacia Terebinthus, L. (拉丁) トクノウカウ (日本)

基本 係漆樹科。爲篇榲樹之香脂。

產地 出真臘國。

形態 篇榲樹爲香木類之一種。樹形如松。其香脂老則溢出。色白而透明。盛夏不融。香氣清遠。可供藥用。

採取 採香後。夏月以火炙樹令脂液再溢。至冬乃凝。復採收之。以瓠瓢盛置陰涼處。乃得。

主治 面黥野雞。同白附子。冬瓜子。白及。石榴皮。等分爲末。酒浸三日。洗面後。傳之久。則面瑩如玉。

【糖結】即伽楠香木死本。存蜜氣膏於枯根。潤若錫片。而質靛。色黑或黃。或黃黑相兼。或黑質白點者。其功用較伽楠香爲良。

【糖棧子】即山查之古籍別名。典見和漢藥考。詳「山查」條。

【糖橘紅】命名 本品係蜜橘霜餞製而成之橘紅。故名。

採取 以產浙江杭屬塘棲鎮者良。

性質 甘。辛。溫。無毒。

主治 理氣。快膈。消痰。止嗽。參改盜料。糖橘紅清香入肺。經性不峻。削治痰之功。不下化產。其效力與橘餅相同。南人體弱者宜之。 (醫學大辭典)

【糖糟】基本 本品即製糖剩。下之渣滓也。

性質 甘。溫。無毒。

效能 益氣。緩中。暖脾胃。化食。主治 反胃。吐食。

【稷】①即粳米之古籍別名。典見綱目。詳「粳米」條。②即麥粳之古籍別名。典見綱目。詳「麥粳」條。③即小麥粳之原名。詳「小麥粳」條。【稻靈草】即石龍芻之古籍別名。典見綱目。詳「石龍芻」條。【綠】即帛之古籍別名。典見綱目。詳「帛」條。

【練絲草子】即蒼耳子之古籍別名。典見綱目。詳「蒼耳子」條。

【練絲菜子】即蒼耳子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蒼耳子」條。

【練木藤】即省藤之別名。詳「省藤」條。

【殺菜】即白英之古籍別名。典見別錄。詳「白英」條。

【羶羊】即山羊之古籍別名。典見綱目。詳「山羊」條。

【羶羊角】即羚羊角之古籍別名。典見和漢藥考。詳「羚羊角」條。

【羶草】即蒲公英之古籍別名。典見綱目。詳「蒲公英」條。

【膩粉】即輕粉之古籍別名。典見綱目。詳「輕粉」條。

【藋子】即芡實之古籍別名。典見和漢藥考。詳「芡實」條。

【藋草】即煙草之古籍別名。典見和漢藥考。詳「煙草」條。

【藋藋】即芡實之古籍別名。典見和漢藥考。詳「芡實」條。

【蕁麻】古籍別名 毛蕁。 (綱目) 刺草。痛痛草。真蟲草。 (日本)

外國名詞 Urtica Thun.

Boraginaceae (拉丁) イラクサ イタイトグサ ヤムシグ (日本)

基本 係蕁麻科蕁麻屬。

產地 生山野間。

形態 蕁麻爲毒草類之多年生草本。春月抽莖。高二三尺。莖葉皆生毛。有刺戟性。觸之即毛端分泌液汁。能傷筋肉。如蜂螫。整蠱。濕以人溺即解。葉作卵形。端尖。緣邊有粗鋸齒。柄長對生。托葉互相結合。夏秋間葉腋綴以穗狀花序。單性。雌雄同株。花小。色白。無花。瓣。萼有四片。有花無實。秋日剝取其皮之纖維。色白。有絹光。可供織物原料。其葉可供藥用。

性質 辛。苦。寒。有大毒。

主治 蛇咬。搗塗之。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論蕁麻藥曰。風癢初起。取汁點之。一夜皆失。又投水中。能

一七一七



十六畫 篇 糖 棧 縑 練 縛 穀 源 構 膩 蕁 蕁

所謂化人心爲血者。亦甚言其不可多服爾。張杲玉洞要訣云。北庭砂乘陰石之氣。含陽毒之精。能化五金八石。去穢益陽。其功甚著。力並硫黃。獨孤酒丹房鑑源云。礞砂性有大毒。爲五金之賊。有沉冷之疾。則可服之。疾減便止。多服則成。擁塞難腫。二說甚明。而唐宋醫方乃有單服之法。蓋欲得其助。陽以經慾而不虞其損陰以發禍也。其方唐慎微已收附本草後。今亦存之以備考者。知警(李時珍)①伏礞藥甚多。牡蠣海螵蛸晚蠶沙羊鬍骨。河豚魚膠魚腥草。蘿蔔獨帶。卷柏羊蹄商陸冬瓜羊躑躅蒼耳烏梅(抱朴子)②礞砂性毒服之使人咆亂。故曰礞砂狄人以當鹽食土宿本草云。礞性透物。五金藉之以爲先鋒。故號爲透骨將軍。炳日生北庭者爲上人呼爲北庭砂(李時珍)③礞砂出西戎形如牙消以光淨者良(蘇恭)④今西涼夏國及河東陝西近邊州郡亦有之。然西戎來者顆塊光明。大者有如拳。重三五兩。小者如指。而入藥最緊。邊界出者雜碎如麻豆粒。又

夾砂石。用之須水飛。澄去土石。迄亦無方。彼人謂之氣砂(蘇頌)⑤

礞砂亦消石之類。乃鹽液所結。出於青海。與月華相對而生。附鹽而成。質。磨人採取淋鍊而成。狀如鹽塊。以白淨者爲良。其性至透。用礞礞盛懸火上。則常乾。或加乾薑同收。亦良。若近冷及得溼。卽化爲水。或滲失也。一統志云。臨洮蘭縣有洞。出礞砂。張匡鄴行程記云。高昌北庭山中。常有煙氣湧起。而無雲霧。至夕光焰若炬火。照見禽鼠皆赤色。謂之火礞山。採礞砂者。乘木展取之。若皮底卽焦矣。北庭卽今西域火州也(李時珍)

【磨刀石】卽羊肝石之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「羊肝石」條。

【磨刀石】卽羊肝石之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「羊肝石」條。

【磨刀石】卽羊肝石之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「羊肝石」條。

【磨刀石】卽羊肝石之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「羊肝石」條。

【磨刀石】卽羊肝石之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「羊肝石」條。

【磨刀石】卽羊肝石之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「羊肝石」條。

【磨刀石】卽羊肝石之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「羊肝石」條。

【磨刀石】卽羊肝石之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「羊肝石」條。

【磨刀石】卽羊肝石之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「羊肝石」條。

【磨刀石】卽羊肝石之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「羊肝石」條。

【磨刀石】卽羊肝石之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「羊肝石」條。

【磨刀石】卽羊肝石之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「羊肝石」條。

典見和漢藥考。詳「茉莉花」條。

【磨沈香】卽沈香之處方用名。詳「沈香」條。

【磨盆草】產地 南海屬。主治 跌打。

【磨羚羊角】羚羊角之處方用名。詳「羚羊角」條。

【磨犀角】卽犀角之處方用名。詳「犀角」條。

【磨髮草】產地 以南海大瀝。性實 甘平。效能 散風血熱。主治 跌打耳鳴耳聾。

【磨口梅】卽蠟梅花之已接者。典見綱目詳「蠟梅花」條。

【磨兒梨】卽梨之古籍別名。典見綱目詳「梨」條。

【磨】卽稷米之古籍別名。典見綱目詳「稷米」條。

【積雪草】卽連錢草之古籍別名。典見本經。詳「連錢草」條。

【穆】命名 穆乃不黏之稱。亦不實之貌。本品子粒似之。故名。

古籍別名 龍爪粟。鴨爪稗。

古籍別名 龍爪粟。鴨爪稗。

古籍別名 龍爪粟。鴨爪稗。

(綱目)龍爪稷。救荒本草。

外國名詞 Panicum frumentaceum, Roxb. (拉丁) a

基本 係禾本科稷屬。爲稷之子實。

產地 山東、河南諸地。田野間多有之。

形態 稷爲穀類之一。一年生草。本高三四尺。葉細長而尖。有平行脈。初秋生花。作圓錐。花序懸狀。彎曲有芒者。有無芒者。所結子實如黍粒而細。赤色。稈甚薄。味粗澀。可炊粥飯食。與供藥用。

性實 甘。瀉。無毒。

主治 補中。益氣。厚腸胃。濟飢。

【實】卽竹之古籍別名。典見嘉祐圖經本草。詳「竹」條。

【筍】卽筍葉之古籍別名。典見綱目。詳「筍葉」條。卽竹筍之古籍別名。典見竹筍。詳「竹筍」條。

古籍別名 龍爪粟。鴨爪稗。

古籍別名 龍爪粟。鴨爪稗。

古籍別名 龍爪粟。鴨爪稗。

古籍別名 龍爪粟。鴨爪稗。

古籍別名 龍爪粟。鴨爪稗。



稷

礪拌灰乾溼得所。以瓶盛灰半寸入礪於內。以灰壘蓋固濟。文武火煨赤。冷定取出。研以箕鋪紙三重。安礪於上。以熱水淋之。直待礪味盡。即止。以鉢盛汁於熱灰火中養之。常令魚眼沸。待汁乾入瓶。再煨一食頃。取出重研。以粟飯和丸。綠豆大。每空心酒下五丸。病去即止。
(聖惠方)

⑥治噎膈反胃。鄧才清與用北庭砂二錢。水和蕎麥麵包之。煨焦待冷。取中間溼者焙乾。一錢入檳榔二錢。丁香二箇。研勻。每服七釐。燒酒送下。日三服。意即止。後喫白粥半月。仍服助胃丸藥。又方。平胃散各一錢。入礪砂。生薑各五分為末。沸湯點服二錢。當吐出黑物如石。屢驗。

⑦治一切積病。礪砂丹。用礪砂、朱砂各二錢。半為末。用黃蠟半兩。巴豆仁三七粒。去膜。同入石器內。重湯煮一伏時候。豆紫色為度。去二七粒。止。將一七粒同二砂研勻。溶蠟和收。每旋丸綠豆大。或三九五丸。淡薑湯下。(本事方)

⑧治月水不通。臍腹積聚疼痛。

礪砂一兩。皂角五挺。去皮子。到為末。以頭醋大一盞。熬膏。入陳橘皮末三兩。搗三百杵。丸梧子大。每溫酒下五丸。
(聖惠方)

⑨治死胎不下。礪砂。當歸各半兩。為末。分作二服。溫酒調下。如人行五里再一服。
(瑞竹堂方)

⑩治喉痺口噤。礪砂。馬牙消等分。研勻點之。
(聖濟方)

⑪治懸癰。半兩。礪砂半兩。綿裹含之。噤津即安。
(聖惠方)

⑫治牙齒腫痛。老鼠一箇。去皮。以礪砂淹擦三日。肉爛化盡。取骨放瓦上焙乾。為末。入樟腦一錢。蟾酥二分。每以少許點牙根上立止。
(孫氏集效方)

⑬治偏頭風痛。礪砂末一分。水潤鼓心一分。搗丸。皂子大。綿包。露出一頭。隨左右內鼻中立效。
(聖惠方)

⑭治損目生瘰。赤肉弩出。不退。杏仁百箇。煮熟。去皮尖。研濾取淨汁。入礪砂末一錢。水煮化。日點一二。次自落。
(普濟方)

⑮治鼻中息肉。礪砂點之。即落。
(白飛霞方)

⑯治鼻中毛出。晝夜可長一二尺。漸漸粗圓如繩。痛不可忍。搗去復生。此因食豬羊血過多所致。用生乳香。礪砂各一兩。為末。飯丸梧子大。每空心臨臥各服十丸。水下自然退落。
(夏子金奇疾方)

⑰治魚骨哽咽。礪砂少許。嚼嚙立下。
(外臺秘要方)

⑱治蝨蟬入耳。礪砂。膽礬等分。為末。每吹一字。蟲化為水。
(聖濟總錄方)

⑲治割甲傷肉。久不瘳。礪砂。礬石為末。裹之。以瘳為度。
(外臺方)

⑳治蠟蠶叮螫。水調礪砂塗之。立愈。
(千金方)

㉑治代指腫痛。唾和白礪砂。以麵作盞子。套指入內。一日瘳。
(千金方)

㉒治面上疣目。礪砂。礬砂。鐵鏽。麝香等分。研搽三次。自落。
(集效方)

㉓治疔瘡腫毒。好礪砂。雄黃等分。研。以銀篋刺破瘡口。擠去惡血。

安藥一豆入內。抵花貼住。即效。毒氣入腹。嘔吐者。服護心散。
(瑞竹堂方)

㉔治疝氣卵腫。脹痛不可忍。念珠丸。用礪砂。乳香各二錢。黃蠟一兩。研溶和丸。分作一百單。八九以綿縫露一夜。次日取出。蛤粉為衣。每用一丸。乳香湯吞下。日二服。取效。
(本事方)

用量 三分至八分。或〇・三至一・〇瓦。

施用宜忌 凡非邪實氣壯之惡瘡等症。及內服藥中禁用。畏藥水。忌羊肉。反昆布。海帶。銀粉。錫鉛。丹。密陀僧。

參攷資料 ①一飛為酸砂。二飛為伏鼠。三飛為定精。色如鷄兒黃。入諸藥為丸。服之有暴熱。

(陳藏器) ②金銀有偽。按礪砂鍋中偽物盡消化。況人腹中有久積。豈不腐潰。

(寇宗奭) ③礪砂破堅。辦不可獨用。須入羣陰藥中用之。

(張元素) ④礪砂大熱有毒之物。噎膈反胃。積塊內癥之病。用之則有神功。蓋此疾皆起於七情飲食。

所致。痰氣鬱結。遂成有形。妨礙道路。吐食痛脹。非此物化消。豈能去之。其性善爛。金銀銅錫。施人煮硬。

肉入礪砂少許。即爛。可以類推矣。

十六 蠶 礪

於醫藥及針藥等。今則專從煤炭之煤油油 (Coal oil) 製造之。

辨偽 鄭肖嚴曰。李時珍曰。

礪砂性毒。服之使人礪亂。故名蘇恭曰。礪砂出西戎。形似牙硝。光淨者良。蘇頌曰。西戎來者。顆塊光明。大者有如拳。重三四兩。小者如指。而入藥。近有一種如秋石味鹹。又一種如豬肝色。有星點。不知是何石所混充。皆爲贗品。不用爲善。曹炳章曰。按石雅云。礪砂者何。卽綠化阿麻尼亞是也。或作礪。方書一名狄鹽。日華本草一名北庭砂。蒼炳四聲又名氣砂。(圖經本草) 或作礪砂。礪砂古以出北庭爲顯。故名北庭砂。北庭卽西域火州。在漢爲東師前王地。隋爲高昌。唐置西州。宋時回鶻居之。元時始名火州。明史云。其地多山。青紅若火。故名火州。方輿紀要云。火礪山在柳陳城東。連互火州。是火礪山。以火礪山得名也。高昌國傳云。北庭山中出礪砂。山中有煙氣湧起。無雲霧。至日光燄若炬火。照見禽鼠皆赤。探者着木底靴。取之皮底者卽焦。下有穴生青泥。出穴

外卽變爲砂石。土人取以治皮。蘇頌圖經云。今西涼夏國及河東陝邊州郡亦有之。西戎來者顆粒光明。大者如拳。重三四兩。小者如指。邊界出者。雜砂如麻豆粒。彼土人爲之氣砂。方輿紀要謂蘭州南四十五里有礪砂洞。出礪砂。又太原府河曲縣西五里有火山。上有礪砂。窟下有氣砂。窟若然則礪砂亦出內地邊界矣。然而碎如麻豆。又雜砂石。則疑與西土來者。精粗或異矣。於今所見。形塊粗末。色帶黃赤。味辛。鹹多孔。遇火自煙如雲起。古曰氣砂。洵可謂名符其實矣。新疆礦產調查記云。礪砂產于蘭之魯村達爾烏蘭布孫山。及拜城礪砂山者。爲紅礪砂。產於庫車者。爲白礪砂。新疆雜記云。礪砂產于蘭礪村達爾烏蘭布孫山。及拜城之礪砂山。庫車之大鶴山。徐星伯云。其山極熱。望之若列燈。取礪砂者。春夏不敢近。惟嚴寒時取之。入山採取。亦必去其衣服。著以衣包。僅露二目。至洞內鑿之。不過二皮包已焦。取出砂石。每千斤得純砂石少許。著石上。紅色星。攪此必

用瓦罍盛之。但罍不可太滿。滿則受火氣薰蒸。致於破裂。礪砂善揮發。受風受溼。皆可發揮淨盡。故經藏必須密閉。買人在此時行數日。遇天氣晴明。無風時。則稍揭其封口。以出火氣。又云。運庫車時。曾攜數十罍。行抵伊犁。則石皆化爲黃粉。而純砂不見矣。若白色成塊者。不易化。可以及遠。內地所謂礪砂。卽此是也。以上所辨爲上品之淡礪。內地不能可得。近今所通行者。皆鹹礪。石礪爲不道地。亦有高下不同。如色如硃砂。或淡紅起鏡面。西土產者佳。如豬肝色者。名豬肝礪。或曰洋礪者。次之。山西出者。爲石礪。亦次。陝西出者。爲香礪。紅色者。亦佳。湖廣出者。爲鹹礪。又名江砂。其色要白者佳。食鹽色者次。

配合應用 服食法 礪砂丸 礪砂不計多少。入罐子內。上面更坐罐子一箇。紙筋白土。上下通泥。曬乾。上面罐子內盛水。以蒼耳乾葉爲末。鋪頭蓋底。以火燒之。火盡旋添水。水盡旋添水。從辰初起至戌止。一伏時。住火勿動。次日取出研米醋。醱和丸。梧子大。每服四五丸。溫酒或米飲下。並無忌。久服進食無缺。(經驗方)

治元臟虛冷。氣攻臍腹疼痛。用礪砂一兩。以蠶蠶草末二兩和勻。用小砂罐不固。濟浸火燒赤。乃入礪在罐內。不蓋口。加頂。待火盡爐寒。取出。用川烏頭去皮。臍生研末二兩。和勻。湯浸蒸餅丸。梧子大。每服三九。水香湯醋湯。任下。日一服。(陳巽方)

治腎臟積冷。氣攻心腹疼痛。面青足冷。礪砂二兩。桃仁一兩。去皮。酒一斗。小盞煎礪十餘沸。去礪砂入桃仁泥。旋旋煎成膏。蒸餅和丸。梧子大。每熱酒下二十九。(聖惠方)

治穢年氣塊。臍腹疼痛。礪砂醋煮二兩。木瓜三枚。切須去瓢。入礪在內。盤盛置於日中。曬至瓜爛。研勻。以米醋五升。煎如稀粥。蜜收。用時旋以附子末和丸。梧子大。熱酒化下一丸。(聖惠方)

治痰癖癥塊。礪砂丸。治痰癖癥塊。煨水臍。殺三蟲。婦人血虛。子宮冷。臘月收。桑條灰。淋去苦汁。日乾。每礪砂一兩。用水三兩。以水化

【盧精】 基本 盧精爲雜草類之一種可供藥用。

性質 平。

主治 蟲毒。

【盧蠶】 即蠶壘之古籍別名。典見唐本草。詳「蠶壘」條。

【盧橘】 即金橘之古籍別名。典見漢書。詳「金橘」條。

【盧橘葉】 即枇杷葉之古籍別名。典見文選。詳「枇杷葉」條。

【晉子草】 即羅勒之古籍別名。典見綱目。詳「羅勒」條。

【礪砂】 原名 礪砂。本品性毒。服之令人礪亂。故名。

處方用名 礪砂霜。製礪砂。

古藥別名 礪砂。狄鹽（日華）北庭砂（四聲）氣砂（圖經）透骨將軍（土宿）神砂。戎鹽。戎焉金賊硝礪粗砂。濃沙。無情子。白海精（和漢藥考）

外國名詞 Sal ammoniac, salmiac. (英) Salmiak (德)

基本 係非金屬之鹽類。爲等軸系八面體之礦物。

產地 陳仁山藥物生產辨云。

礪砂產廣東新安、平海。

形態 礪砂爲白色結晶性粉末。或纖維狀。堅硬。結晶塊。無氣味。

在空氣中並不變化。熱之則發散。溶於三分之一之水及等量之沸湯。酒精難溶。

製法 寇宗奭曰。凡用須水飛過去。壓碎。入瓷器中。重湯煮乾。則殺其毒。李時珍曰。今時人多用水飛淨。醋煮乾如霜。刮下用之。

用法 恒以剉研和入外治藥。間有和作丸散用。

性質 鹹。苦。辛。溫。有毒。

效能 消癥瘕。癰積。去目翳。肉。用作發汗。祛痰及通經藥。又治氣管枝加答兒急性喉頭炎。

作用 在胃中能解除胃黏液之滯積。而助消化。至腸中能激腸之蠕動及分泌之增加。使積滯易於排出。入血中能促進血液之循環。使血壓增高。心跳有力。中樞神經興奮。而增加氣管黏膜及汗腺之分泌。使積痰易於驅出。而胃臟亦被激而增進排泄之功。

主治 積聚。破結。止血。下氣。療咳嗽。宿冷。去惡肉。生好肌。爛唇。

亦入驢馬藥用。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器

本草拾遺論礪砂曰。主婦人丈夫羸瘦。積病。血氣不調。腸鳴。食飲不消。腰脚痛冷。痼癖痰飲。喉中結氣。反胃吐水。令人能食。肥健。【唐】甄

權藥性本草論礪砂曰。除冷病。大益陽事。【宋】大明諸家本草論礪砂曰。補水臟。煖子宮。消瘕。血宿食不消。食肉飽脹。夜多小便。丈夫腰

膝酸重。四肢不仁。婦人血氣疼痛。氣塊。痼瘕。及血崩帶下。惡瘡。患肉。傅金瘡。生肉。【宋】寇宗奭本草衍

義論礪砂曰。去目翳。腎肉。【元】王好古湯液本草論礪砂曰。消內積。【明】李時珍本草綱目論礪砂曰。

治噎膈。癰瘕。積痢。骨哽。除患。癰疣。【明】楊希雅本草經疏論礪砂曰。礪砂乃鹵液所結。秉陰毒之氣。含陽毒之精。其味極鹹。極苦。極辛。氣溫有毒。甄權酸鹹有大毒。能消

五金八石。腐壞人腸胃。生食之化。人心爲血。其毒之猛烈如此。可畏矣。其主積聚。結血。宿冷者。以鹹能入血。輕堅。辛能散結。溫能除冷。故也。積聚散則痛自止。氣自下。因寒

以致頑痰癰結。則咳嗽作。故暫用以散之。柔金化石之性。故能爛胎及去惡肉也。金石見之即化。其能生好肌乎。此前人之誤耳。【清】黃

宮繡本草求真論礪砂曰。礪砂係鹵液所結而成。秉兼陰毒之氣。合陽毒之精。其味苦鹹。與辛。其性大熱。五金八石。俱能消磨。硬肉難化。入砂即爛。其性猛烈。殆不可言。況

人腸胃薄弱。其堪用此消導乎。第或藥與病對。有非峻迫投治。不能奏效。如穀不消。則必處以麵藥。魚

蟹不消。則必用以橘葉。紫蘇。生薑。菜蕈不消。則必用以丁香。桂心。飲

水不消。則必用以牽牛。芫花。至於肉食不消。又安能舍此阿魏。礪砂

而不用乎。第當詳其虛實。審其輕重。緩急。以求藥與病當耳。如其害症不明。妄爲投治。禍由指掌。不可不慎。出西戎。如牙硝。光淨者。良用

水飛過。醋煮乾。如霜。刮下用之。

國外學說 和漢藥考曰。埃及

乏薪炭。以駱駝糞爲燃料。因之燻

突自然附有礪砂。即綠化安母尼

亞是也。【NH₄Cl】乃取而再製。

運銷他國。日本昔時亦有運入。用

一七三

十六畫 盧

礪

砂

鹽

類

藥

考

曰

埃

及

十六畫 獨 獾 壁 瑤 盧

一七二

之。亦無形迹。倘得之者。不論何等

毒蛇咬。以根擦摩。蛇毒即盡。如有誤服。蛇變驚者。以少許煎湯服之。即痊。併能解一切毒蟲咬螫。一切

毒蟲。草木毒。咽喉一十八症。皆驗如神。凡人鼻發紅色。生瘰癧。瘰癧異常者。名榜蟲食鼻。以此根磨塗立愈。此乃天生神物。有山行遇之者。不論持何物先擲之以鎮住。然後再掘。即不能遁形。凡生獨葉花地。四圍約尺許。無草其上。不可手

取。亦勿以鐵刀取。須用竹刀掘取。則不傷根。蓋此草蛇最喜蟠其旁。凡蛇咬人。亦中人毒。必退殺若覓此物臥其旁一宿。則人毒解。可免退殺之患。大毒蛇都喜蟠其根旁。故土最毒。近人手則手爛。然得其根。反能解百種大惡蛇毒。巧者覓此以爲得寶云。

【獨腳蜂】**產地** 出嶺南諸地。**形態** 獨腳蜂爲蜂之一種。狀如小而蜂色黑。一足連樹根。不得去。亦不能動搖。可供藥用。

主治 疔腫。癰疽。燒研油塗。

【獨腳蓮】即鬼臼之古籍別名。典

見土宿本草。詳「鬼臼」條。

【獨脚蟾蜍】即金線釣蝦蟆之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「金線釣蝦蟆」條。

【獨葉一枝花】即八角連之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「八角連」條。即獨腳蓮之古籍別名。典見祝氏效方。詳「獨腳蓮」條。

【獨葉一枝鎗】**產地** 多生深山高原諸地。

形態 獨葉一枝鎗爲山草類之一種。清明時節發苗。長約二三寸。一莖二梗。一梗有葉。其葉如兔耳。又似箭頭。一梗細尖。如新抽竹芽。花如椎鑽。至穀雨便枯。可供藥用。

採取 四五月採之。**性質** 甘淡。無毒。

主治 諸毒蟲咬生瘰癧之即愈。功與兔耳一枝箭同。

【獨蜂窠】即露蜂房之古籍別名。典見綱目。詳「露蜂房」條。

【獨龍鬚根】即櫟根之別名。詳「櫟根」條。

「狼」條。

【壁】**命名** 壁是衆珀之長。故號壁珀。壁亦作璧。即琥珀之色。故名。

古鑒別名 璧珀。〔綱目〕木璧。〔新修本草〕固經。

形態 璧爲琥珀之一種。狀如玄石。色潤而質輕。可供藥用。

性質 甘平。無毒。**主治** 補心。安神。破血。生肌。治婦人癥瘕。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論壁珀曰。小兒帶之辟惡。磨滴目醫赤障。

參攷資料 古來相傳。松脂千年爲茯苓。又千年爲琥珀。又千年爲璧。二物燒之。皆有松氣。狀似玄玉。而輕出西戎。而有茯苓。處無此物。今西州南三百黑磧中。得者大則方尺。黑潤而輕。燒之腥臭。高昌人名爲木璧。謂玄玉爲石璧。共

州土石間得者。燒作松氣。功同琥珀。見風折破。不堪爲器。恐此二種及琥珀。或非松脂所爲也。〔蘇恭〕

梁公子傳。梁公云。交河之閒平磧中。掘深一丈。下有璧珀。黑逾純

漆。或大如車輪。未服。攻婦人小腸癥瘕諸疾。〔唐〕慎微。璧即琥珀之黑色者。或因土色薰染。或是一種木蔕結成。未必是千年琥珀復化也。玉篋經言。松脂千年作茯苓。茯苓千年作琥珀。琥珀千年作石膽。石膽千年作威喜。大抵皆是神異之說。未可深憑。〔李時珍〕

【璧珀】即璧之古籍別名。典見綱目。詳「璧」條。即珀琥之古籍別名。典見雷公炮炙論。詳「琥珀」條。

【瑤田草】即鬼臼之古籍別名。典見綱目。詳「鬼臼」條。

【瑤枝】即石花菜之古籍別名。典見綱目。詳「石花菜」條。

【瑤茅】即紫草之古籍別名。典見和漢藥考。詳「紫草」條。

【瑤漿】即玉泉之古籍別名。典見綱目。詳「玉泉」條。

【瑤茹】即桔梗之古籍別名。典見吳普本草。詳「桔梗」條。

【盧都子】即胡頹子之古籍別名。典見綱目。詳「胡頹子」條。

【盧會】即盧會之古籍別名。典見開寶本草。詳「盧會」條。

曉易簡方云。羌活須用紫色有蟹頭鞭節者。獨活是極大羌活。有口如鬼眼者。尋常皆以老宿前胡爲獨活者非矣。近時江淮山中出一種土當歸。長近尺許。白肉黑皮。氣亦芳香如白芷。氣人亦謂之小白芷。用充獨活。解散亦或用之。不可不辨。李時珍。

【獨茅】即仙茅之古籍別名。典見開寶本草。詳「仙茅」條。

【獨豹】即鴛之古籍別名。典見綱目。詳「鴛」條。

【獨眼龍】產地 各屬均有出。主治 跌打。

【獨脊屎】即五靈脂之古籍別名。典見綱目。詳「五靈脂」條。

【獨荷草】即鬼白之古籍別名。典見本草。詳「鬼白」條。

【獨搖】即白楊之古籍別名。典見綱目。詳「白楊」條。

【獨搖草】即獨活之古籍別名。典見別錄。詳「獨活」條。

【獨搖草】即獨活之古籍別名。典見別錄。詳「獨活」條。

【獨搖草】即獨活之古籍別名。典見別錄。詳「獨活」條。

十六畫 獨

別錄。詳「黃耆」條。

【獨滑】即獨活之古籍別名。典見和漢藥考。詳「獨活」條。

【獨腳一枝蓮】形態 山間苗發。生管芽。俗名乾荷。叢中獨莖無葉。高尺許。莖細。強青白色。莖端有一疙瘩。至晚秋時。疙塔生花。類蓮。其根與黃麻根相似。主治 疔腫。癰毒。流注。

【獨腳仙】產地 生山林間。或陰溼地亦多有之。形態 獨腳仙爲雜草類之一種。春生苗。葉圓形。下有紫葉如腳長三四寸。秋冬葉落。其根葉可供藥用。

採取 夏月採之。焙乾爲末用。主治 婦人血塊。

【獨腳金雞】即辟瘟草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「辟瘟草」條。

【獨腳馬蘭】形態 此草生對葉圓梗。根下微紅。主治 治發背。諸腫毒。熱癰。搗汁一杯入酒二杯。服之。未成膿者即消。有膿者即出。重極者服半碗。

或一碗。再劑渣。【獨腳連】古籍別名 獨葉一枝花。〔祝氏效方〕

形態 根大如拳。春月發苗。經霜雪則死。若善藏過冬。則來年宿根復發。苗高丈許。葉大如杯。宛似荷葉。色綠柔厚。莖有細毛。六七月起。莖有白色。開花微垂。似山蘭而小。其色微紅。

主治 治疔腫癰疽。以根或醋酒磨塗。葉貼癰腫能消。

配合應用 治蛇咬。用獨葉一枝花生溪灘浮土上。根如鼠鼯。用根口嚼搗膏上。〔祝氏效方〕

退行奪命丹。專治疔瘡。防風八分。青皮七分。羌活獨活黃連各一錢。赤芍六分。細辛八分。鹽薑一錢。蟬退四分。澤蘭葉五分。金銀花七分。甘草節一錢。獨腳連七分。紫河車即金線重樓七分。上到五錢。先服倍金銀花一兩。澤蘭一兩。少用葉生薑十片。同搗爛好酒燉熱。

泡之。去渣熱服。不飲酒者水煎亦可。然後用酒水各一半煎生薑十片。熱服出汗。病退減後。再加大黃。

五錢。同煎熱服。以利二三次。去餘毒。如有膿。加何首烏白芷梢。在脚加檳榔木瓜。要通利。加青皮木香。大黃。梔子。牽牛。〔萬病回春方〕

參攷資料 稗史。都陽山間生一種草。始萌芽時。便似蓮蓬。俗呼爲獨腳連。移植於居宅隙地及園圃中。蛇虺不敢過其下。王季光宅後。榛莽叢中有蛇穴。常出爲人害。乃種此草數本於穴外。自是其患不作。至暑月間。穴內臭甚。使園丁掘土。訪求得死蛇十數。蓋爲草氣所熏潰也。又一小蛇來到草旁。立化爲水矣。〔粵西偶記〕生廣西。

草如黃連根極大。持入藥肆。則諸藥香氣薰消。爲眞三腳五腳者次之。自按綱目。鬼白亦名獨腳連。無治疔之說。至集解下註。形狀又小有異。同故仍爲補之。庚戌予在臨安。有醫士盛天然言。其地古城與餘杭接界。產獨葉花生山坑。不見天日。其形一葉中含紅花一朵。儼如蓮花狀。其花從葉心透出。下有根作獨蒜狀。其花葉聞人聲。輒縮入根內。不可見。遇之者記其處。縮之亦止。有根。其花與葉。雖剖根覓。

實導主耳。石頑乃欲一例禁絕之何耶。

配合應用 ①君麻黃、甘草。主冬月即病傷寒。太陽經頭疼。發汗解表。

②君麥門冬、前胡、黃芩。佐以甘草。治春時瘟疫。邪在太陽頭痛。

③入葛根湯。治太陽陽明頭痛。兼遍身骨痛。口渴煩熱。不得眠。若渴甚煩熱甚。頭痛甚。則加石膏。知母、竹葉各兩許。

④瘡發太陽經。頭痛者於治瘡藥中加之。痛止則去之。

⑤同白朮、蒼朮、秦艽、生地黃、薏苡仁、木瓜、石斛、黃蘗。治下部一切風溼淫熱。

⑥同生地黃、赤芍藥、生甘草、牡丹皮、石膏等水煎。治風熱上攻牙腫痛。

⑦治中風口噤。通身冷。不知人。用獨活四兩好酒一升。煎半升服（千金方）

⑧治中風不語。獨活一兩。酒二升。煎一升。大豆五合炒有聲。以藥酒熱投蓋之。良久溫服三合。未瘥再服（陳延之小品方）

⑨治產後風虛。獨活、白鮮皮各三兩。水三升。煮二升。分三服。耐酒者入酒同煮（小品方）

⑩治風牙腫痛。用獨活煮酒熱漱之（肘後方）文潯公藥準用獨活、地黃各三兩爲末。每服三錢。水一盞煎和滓溫服。臥時再服。

用量 八分至錢半

施用宜忌 凡血虛而無風。寒實邪者禁用。豚寶（即蠶寶）爲之使。

著名方劑 獨活寄生湯。治風寒溼痺。偏枯脚氣（千金方）獨活三兩。桑寄生、秦艽、細辛、歸身、生地、白芍、川芎、桂心、茯苓、杜仲、牛膝、人參、甘草各等分。上十四味爲粗末。每服四錢。煎服。一方用防風。

參攷資料 ①療風宜用獨活。

衆水宜用羌活。劉完素曰。獨活不搖風而治風。浮萍不沉水而利水。因其所勝而爲制也（蘇恭）②風能勝溼。故羌活能治水溼。獨活與細辛同用。治少陰頭痛。頭暈目眩。非此不能除。羌活與川芎同用。治太陽少陰頭痛。透關利節。治督脈爲病。脊強而厥（張元素）③羌活

獨活。皆能逐風勝溼。透關利節。但氣有剛劣不同。爾素問云。從下上者引而去之。二味皆辛而溫。味之薄者陰中之陽。故能引氣上升。通達周身而散風勝溼。按文系曰。唐劉師貞之兄病風。夢神人曰。但取胡王使者浸酒服。便愈。師員訪問。皆不復夢。曉其母曰。胡王使者。卽羌活也。求而用之。兄疾遂愈（李時珍）④獨活是羌活母也（大明）⑤獨活以羌中來者爲良。故有羌活、胡王使者諸名。一物二種也。正如川芎、撫芎、白朮、蒼朮之義。入用微有不同。後人以爲二物者非矣（李時珍）⑥獨活生雍州川谷。或隴西南要。二月八月採根曝乾（別錄）⑦此州郡縣並是羌地。羌活形細而多節。輭潤。氣息極猛。烈出。益州北都西川者爲獨活。色微白。形虛大。爲用亦相似。而小不如至易。杜宜密器藏之（陶弘景）⑧獨活羌活。今出蜀漢者佳。春生苗葉如青麻。六月開花作叢。或黃或紫。結實時葉黃者是。夾石上所生葉青者是。土脈中所生。本經云。二物同一類。今人以紫色而節密

者爲羌活。黃色而作塊者爲獨活。而陶隱居言獨活色微白。形虛大。用與羌活相似。今蜀中乃有大獨活。類桔梗而大。氣味亦不與羌活類。用之微寒而少效。今又有獨活。亦自蜀中來。類羌活。微黃而極大。收時寸解乾之。氣味亦芳烈。小類羌活。又有槐葉氣者。今京下多用之。極效驗。意此爲眞者。而市人或擇羌活之大者爲獨活。殊未爲當。大抵此物有兩種。西蜀者黃色。香如蜜。隴西者紫色。秦隴人呼爲山前獨活。古方但用獨活。今方既用獨活。而又用羌活。茲爲譌矣（蘇頌）⑨本經獨活一名羌活。本非二物。後人見其形色氣味不同。故爲異論。然物多不齊。一種之中。自有不同。仲景治少陽所用獨活。必緊實者。李東垣治太陽所用羌活。必輕虛者。正如黃芩取枯澀者名芩片。治太陰條實者名片子。治陽明之義同也。況古方但用獨活。無羌活。今方俱用。不知病宜兩用耶。抑未之考耶（汪機）⑩獨活羌活乃一類二種。以中國者爲獨活。西羌者爲羌活。蘇頌所說頗明。按王

性質 苦甘平無毒。
效能 搜伏風燥寒溼專作風氣藥。

主治 風寒所繫金瘡止痛。奔豚痼疾女子疝瘕久服輕身耐老。
（本經療諸賊風百節痛風無間久新（別錄））

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論獨活曰獨活治諸中風溼冷奔喘逆氣皮膚苦痒手足攣痛勞損風毒齒痛【清】黃宮繡本草求真論獨活曰獨活辛苦微溫比之羌活其性稍緩凡因風干足少陰腎經伏而不出發爲頭痛則能善搜而治矣以故兩足溼痺不能動履非此莫痊風毒齒痛頭眩目暈非此莫攻緣此有風不動無風反搖故名獨搖草因其所勝而爲制也且有風自必有溼故羌則療水溼遊風而獨則療水溼伏風也羌之氣清行氣而發散營衛之邪獨之氣濁行血而溫養營衛之氣羌有發表之功獨有助表之力羌行上焦而上理則遊風頭痛風溼骨節疼痛可治獨行下焦而下理則伏風頭痛兩足溼痺可治二

活雖屬治風而用各有別不可不細審耳。去皮焙用。

近人學說 賈九如曰獨活

氣香而渾味苦而沉能宣通氣道自項至膝以散腎經伏風凡頸項難舒腎經疼痛兩足痠痺不能動移非此莫能效也取其香氣透心用爲心經引藥療赤眼痛因其枝莖遇風不搖能治風風則勝溼專疏濕氣若腰背酸重四肢攣痺肌黃作塊稱爲良劑又佐血藥活血舒筋殊爲神妙○張山雷曰獨活氣味雄烈芳香四溢故能宣通百脈調和經絡通筋骨而利機關凡寒溼邪之痺於肌肉着於關節者非利用此氣雄味烈之品不能直達於經脈骨節之間故爲風痺痿痺諸大證必不可少之藥惟古時羌活獨活未嘗分別故古書以獨活通治內外上下諸證凡頭面肢體無一不在獨活範圍之內自宋以來則羌活別爲一條而芳香之氣尤爲濃郁則散上旁行合讓羌活占其優勝而獨活之味較厚則以專治腰膝足脛等證雖古人尙未明言而海藏已謂羌活氣雄獨

活氣細石頑亦稱其升中有降皆隱然有上下之別顧業師朱氏家法恒以獨活治下凡自腰及少腹

以下通用獨活不僅風寒溼氣痿痺酸痛可以立已即瘍證之發於陰分者未潰易消已潰易斂功績顯然確乎可信此古人未嘗明言之真旨也互詳下文羌活條又曰羌獨活皆辛溫之質主治風邪以外來之寒風言之故所治皆寒溼之證古恒以羌活治傷寒表病井及四時不正之表邪固皆指寒邪而言也若大江以南地氣溫暖寒風恒少昔人久稱南方無眞傷寒病而四時外感又皆溫熱雖有表邪亦非羌活等之辛散溫升所宜此荊防敗毒散九味羌活湯藹藹解肌湯等方古書皆稱四時感冒之神劑而江浙所不任用者亦病情病證之使然也且辛溫之不宜於東南又非僅時病已也即如羌獨本屬風寒溼邪痺着癢癢之良藥而在此邦之人陰血素薄即有是證亦半由於血虛而來果屬風寒亦係血虛生風氣虛生寒與西北之風痺悉因於賊風大寒者證

情亦復大異而一味辛溫剛燥之藥又須隨時留意不容信筆塗鴉無所顧忌矣而李東垣竟謂獨活

治諸風痺眩潔古亦謂與細辛同用治少陰頭痛眩暈海藏又謂搜肝風瀉肝氣則所述諸病皆屬陰不陽勝肝腎不攝之證明是內虛生風非外來賊邪可比潛藏鎮定之爲宜何乃以溫升之藥助其狂肆抱薪救火之禍捷於影響最宜慎用然如着痺痿贅諸候又多氣血虛寒不得流利苟非羌獨辛散亦難速效則病本雖屬血虛又宜於養血滋液之中參入宣絡溫運徐圖奏績而石頑遂原又謂氣血虛者之痺痛肢節痛禁用羌獨又未免一偏之見非通論矣蓋羌獨治風本治外邪侵入之寒風非能治血虛內發之熱風所以肝陽眩暈必非辛溫升泄所能治若犯斯禁則烈熾愈騰燎原可畏然氣血虛寒而癢癢不仁非吹以和煦之氣亦不能振作有爲春回黍谷所以滋調血液之劑亦必以宣通溫養之藥相輔而行但佐使之功止可少少參加用作引導不得喧

十六畫 燕 獨

液之凝固物而成者。如巢之後壁。即草片毛髮較多之處也。此皆天然燕窩成因之原委耳。

【燕窩草】 命名 本品即燕窩中之草故名。

性質 無毒。
主治 眼中遺尿。亦止嘔嘔。研末水服。

歷代記述攷證 【唐】孫思邈千金翼論燕窩草曰。治丈夫婦人無故尿血。用胡燕窩中草。燒末酒服之。【明】李時珍本草綱目論燕窩草曰。治渴。飲水一切瘡痕不滅。及浸淫瘡。出黃水。燒灰傳之。

【燕窩菜】 即燕窩之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「燕窩」條。

【燕齒】 基本 燕齒為雜草類之一種。可供藥用。

採取 五月五日採之。
主治 寒熱小兒痢疾。

【燕翼】 即燕翼之古籍別名。典見毛詩。詳「燕翼」條。

【燕領】 即燕之古籍別名。典見郭義恭廣志。詳「燕」條。
【燕覆子】 即木通子之古籍別名。典見綱目。詳「木通」條。

【燐豬湯】 基本 本品即洗豬刮毛之熱水。
主治 解諸毒蟲覺。

歷代記述攷證 【明】汪機本草會編論燐豬湯曰。產後血刺心痛欲死。溫飲一盞。【明】李時珍本草綱目論燐豬湯曰。治消渴。濾淨飲一碗。勿令病人知。又洗諸瘡。良。

【燐雞湯】 基本 本品即洗雞之水。故名。
主治 消渴。飲水無度。濾澄服之。

【獨占釭子】 即決明子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「決明子」條。

【獨用將軍】 基本 屬澤草類。為獨用將軍之根葉。
產地 林野有出。
性質 辛無毒。

主治 毒腫乳癰。解毒。破惡血。參攷資料 生林野中。節節穿葉心生。苗其葉似楠。不時採根葉用。(蘇恭)

【獨用藤】 形態 獨用藤為藤類之一種。野地蔓生。四時有葉。無花。葉有倒刺。其藤皮

可供藥用。
性質 苦。辛。熱。無毒。
主治 心氣痛。研末酒服。

【獨白草】 即草烏頭之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「草烏頭」條。

【獨行虎】 即紫花地丁之古籍別名。典見綱目。詳「紫花地丁」條。

【獨行根】 即青木香之古籍別名。典見唐本草。詳「青木香」條。

【獨行散】 即荊芥之古籍別名。典見和漢藥考。詳「荊芥」條。

【獨角仙】 即天牛之一角者。典見綱目。詳「天牛」條。

【獨帶】 即地膚子之古籍別名。典見圖經本草。詳「地膚子」條。

【獨活】 命名 本品一莖直上。不為風搖。故曰獨活。
處方用名 川獨活。
古藥別名 羌活。羌青。護羌使者。(本經)獨搖草。(別錄)胡王使者。(吳普)長生草。(綱目)獨滑。天名精。山前獨活。地頭乙戶邑。(和漢藥考)

外國名詞 Archenangelica gmelini, DC. (拉丁)
學名 Coelopleurum Gmel.

lini, Ledeb. Angelica Gela-berra, Mak.

基本 屬繖形科獨活之根。
產地 陳仁山藥物生產辨云。獨活產湖北興山縣。巴東縣。沙市內資。邱山為最。四川夔州府板橋山次之。有產廣東北江。名為水活。全不適用。獨銷東京。安南人用之。

形態 獨活為山野自生之二年生草。春季抽莖。莖葉俱類土當歸。富毛茸。夏月莖高達六七尺。葉柔輭。為分枝數回之羽狀複葉。作橢圓或卵圓形。前端尖。邊緣有鋸齒。其葉鞘頗大。秋季於枝梢簇生多數小白花。作繖形花序排列。實作橢圓形。大二分許。根在生鮮時呈白色。臭氣其烈。曬乾則外皮作灰黑色。內部淡黃色。其質輕虛。有辛味。

採取 二月八月採根。曬乾。
製法 雷斅曰。採得細剉。以淫羊藿拌搗二日。曝乾。去霜。用。免煩人心。李時珍曰。此乃服食家治法。尋常去皮或焙用。

用法 與他藥水煎。或酒浸。或剉末和作丸散。

既盛銷於中國。能售高價。以博厚利。故吾國人之僑爪哇。婆羅洲等地者。特建築適宜之屋宇。以飼養海燕。而取償於其所營之窩。爪哇之東有城市。曰格利斯者。人口約有一萬。飼養海燕之業。十分發達。欲參觀飼養屋。往往見拒於主人。一因海燕見生人。不免驚擾飛散。既逸之海燕。勢將不復歸巢。一因地方上有盜取海燕之惡習。爲盜之人。間有借端入室。窺察路徑。使其盜劫之技。盡奪其燕窩者。有此二因。故不得當地人之介紹。不易入室參觀海燕飼養室。大抵兩層樓房。樓下僅有入口。設以堅固之板門。四壁粉刷白垩。不設窗戶。亦無樓梯。僅於樓板上開一方四五尺之戶口。樓上亦無窗戶。開小孔一二。僅足容海燕之出入。故室內光線甚弱。所以防盜賊也。樓上下天花板之高度。約在一丈三四尺左右。天花板之下。面每格一尺二寸三寸之距離。側置木板。廣約五六寸。厚約七八分。形如樓梯。供海燕築巢之基礎。一室之內。可營巢至三百以上。巢板之側。又處處支

以橫桿。爲海燕息足之所。海燕之棲止於室中者。皆甚安靜。僅微動其首而已。據飼養海燕者之言。謂海燕皆盲其目。雖登梯採取其巢穴。亦不知逃避。設以海燕自甲巢移至乙巢。當立足未穩時。必拍其兩翼。如欲下墜。由此觀之。似海燕之盲目。當屬非虛。但其目既盲。勢必無以覓食。是所謂盲目。必非真盲也。(顧紹衣)●海濱涯岸石齒嵯峨。多洞壑。海燕千百成羣。巢於洞中。自萬丹。巴城。三寶壟。竭力石。南旺。馬辰。蘇拉巴。實不下數十處。皆荷蘭之有力者。掌握焉。天然燕窩。巢於海外斷崖絕壁。如暹羅燕。毛燕是也。近來南洋爪哇等處。以天然採取甚艱險。有築室培養營巢。如龍牙燕。大峙燕是也。其色白嫩質鬆。因不見天日故也。其產額以婆羅洲爲最多。後由此地方輸入我國。據十年前之統計。每年運入值銀有三百五十萬兩之多云。(海島逸志)●海燕爲海濱所產之燕。巢於沿海之巖壁。故南洋羣島土人見礁巖絕壁下有燕窩。卽真簾帶刀。懸繩冒險採取。時

有落於海中。而飽魚腹者。是故爪哇一帶之華僑。多用人工設梯。場飼養海燕。安安逸逸。取其窩而販賣之。其法用堅牢煉瓦。作成倉庫形狀。周圍留有多數小窗。以便燕之出入。內部則甚陰暗。內壁以木材製成方格。海燕卽於方格之隅。營巢有雛。至成飛而至他處。翌年復尋舊巢。開爪哇地方。經營此業者。以華僑爲最多。日人亦間有之。所產燕窩。每年由新嘉坡輸出。價值達四十萬元云。(張祿)●燕窩乃海燕所營之巢。富於膠質之物也。非若普通燕巢。疊積柴草泥土而成。而此種海燕之巢。則從口內泌出唾液狀之物質。而成。試觀燕窩之質。物色白而強韌。光澤甚顯。略如黏著牢固之纖維。可知燕窩之材料。決非直接採取於外界。而吐出於口中者也。考其膠狀質之成。因有謂海燕能採海邊所生之海藻。如眞珠苔等。而成之者。先取藻類吞入胃中。經胃液醱酵後。吐出遂成膠狀質。或謂此乃該燕口中分泌之黏液也。或謂海燕啣海藻等物質於口中。而溶解之。復以

其瓊脂質混合他物而成。依此說。則燕窩純爲海藻之瓊脂質所製成。然燕窩一物。經化學方法分析之結果。所得之成分。與海藻大不相同。亦有謂將燕窩染色。而觀察於顯微鏡之下。毫無細胞膜與細胞核等。可認植物之組織。惟有黏液之凝固物。全體均一成。所謂無構造之物而已。由前說則海藻之變爲膠質物。依何作用。尙未明瞭。由後說則與實物之狀態相符。故燕窩可決其爲海燕之唾腺分泌一種纖細黏液凝合而成。決無疑義。●海燕在生殖期內。舌下亦唾腺特形發達。善於分泌黏液濃厚。如阿刺伯樹膠。能膠著紙片等物。設膠著此黏液於棒上。而過轉之。能自其口中繼續引出。不啻餡糖之卷繞指端。且此黏液質自舌下唾腺之開口分泌而出。要言燕窩乃海燕之自身產出物。略似蠶之吐絲以作繭。亦如蜂之釀蜜而營巢。當其營巢之際。先由其嘴之作用。塗著黏液於巖石或板上。然後引黏液腺於左右。漸次疊積。以成燕窩。亦有採集毛髮等物。混入唾

十六畫 燕

溼。爲療治痛風輭痺之要藥。燕之

身有寄生生物曰燕虱。遺留於窩中甚多。噉人能使紅腫發熱。收窩者多視髮如僧。以避其棲息。燕窩之本質無味。而有蛋香氣。含炭分

平均二〇。五能全溶於鹽液中。加水分解時。發生還原性之炭水化合物。此化合物中含蛋白質最多。凡津液涸竭。對於多澱粉質之米

穀類食難下咽者。胃燥惡食。以及肺炎乾咳。以此爲食養。其滋陰養液之功。遠非無情草木所能比擬。蓋以鳥之唾液。故得有奇妙之

特效也。燕所營窩之巖壁。櫛比鱗疊之窟。各佔一窟。究其構成之原因。殆此巖壁初係灰土質。經鳥

之爬挖。及歷次以鐵匙括窩所攝成者。歷年既久。窟漸深而巖已成石。以是乃有種種傳說。以爲天造

地設之神境。不足信也。

配合應用 ●治膈上熱痰。燕窩入雅梨。加冰糖蒸食。(嶺南雜記方)

●治老年痰喘。秋白梨一個。去心。入燕窩一錢。先用滾水泡。再入冰糖一錢。蒸熟。每日早晨服下。勿

間斷。神效。(文堂集驗方)

●治瘰癧口痢。白燕窩二錢。人參四分。水十分。隔湯頓熱。徐徐食之。立效。(救生普濟方)

●治老年瘧疾及久瘧。小兒虛癆。胎熱。燕窩二錢。冰糖錢半。頓食數次。(試驗方)

●治翻胃。久吐。服人乳。兼吃燕窩而愈。(文堂集驗方)

●治小兒氣液不足。痘頂凹陷。燕窩二錢。生黃菁錢半。煎濃汁服。(經驗方)

參攷資料 ●遠海近番處有燕名金絲燕。首尾似燕而甚小。毛如金絲。隨卵育子時。啄蠶螺而食。土番云。蠶螺背上肉有兩筋。爲風

蠶絲。堅潔而白。可補虛損。已勞利。燕食之。肉化而筋不化。併津液嘔出。結爲小窩。附石上。久之燕雛能

飛。海人依時拾之。(泉南雜誌) ●燕窩有數種。乃海燕食海邊蟲。其筋不化。復吐出而爲燕窩。綴山海

石壁上。土人攀援取之。春取者白。夏取者黃。秋冬不可取之。則燕無所棲。凍餓而死。次年無窩矣。(嶺南雜記) ●燕窩出廣東。乃海燕

食小魚。吐涎液。營巢於巖石。故名

燕窩。湖海樓奇。●崖州海中石島有玳瑁山。其洞穴皆燕所巢。大者如鳥。啖魚。輒吐涎沫。以備冬月

退毛之食。土人皮衣皮帽。乘炬採之。是爲燕窩。(崖州志) ●燕含取小魚。黏之於石。久而成窩。有黑白

紅三色。黑最下。紅最難得。能益小兒痘疹。白色能愈痰疾。(閩小記)

●海燕拾海上無毒香蔬。結巢。燕去人取而食之。(庶物異名疏)

●海燕大如鳩。春日巢於危巖絕壁。葺壘乃白海窩也。鳥夷伺其秋去。以修竿接鏟。取而鬻之。(華夷

鳥獸叢考) ●燕窩乃燕窠。燕食海菜。吐而成窩。歲冬夏二收。如取蜂蜜。多收則敗矣。(海島逸志) ●

金絲燕。燕之異種也。體小於燕。背褐色。尾度間白色。產我國及印度。恒居巖穴中。營巢即燕窩。(清科

類鈔) ●海濱石上有海粉。積結之苦。燕啄食之。吐出爲窩。藥巖壁間。島人俟其秋去。以竹竿接鏟取之。海粉性寒。而爲燕所吞吐。則暖。海粉味鹹。而爲燕所吞吐。則甘。其形質盡化。故可以清痰開胃云。

一七〇六

他如蠶絲錄。某餘客語。亦云產巖壁。或云窮巖遠谷。均言黏着石壁

或洞穴。不能移動。其間雖有云啄蠶。或云食海邊蟲。或云食小魚。或云食無毒香蔬。或云採海菜。或

云食海粉。然皆屬海產小生物。皆經過海。經胃中消化。而吐出唾腺

分泌一種黏液。所造成。皆營巢於危崖絕壁。而爲天然燕窩之生。誠無疑。然諸說中。猶以一二七八十五

說理由較爲詳實。(粵錄) ●海際砂洲。生蠶。背有兩筋。堅潔而白。燕啄食之。肉化而筋不化。并津

液吐出。結爲小窩。唧飛渡海。倦則漂水上。身棲其中。少頃。又含以飛

海人依時拾之以貨。王世懋閩部疏亦云。燕窩海燕所築。唧之飛渡於海。翻倦則躡置海面。身坐其中

久之。復唧以飛。查浦。聞云。海燕南海歸。海外水邊。雖達。因啄小魚肉作窩。口唧之。而飛倦。即投窩水

中。棲止其上。少息。復舍之。而飛。故東南風。則飄掠近岸。人就取之。(威鉞齋臆) ●海燕營巢於沿海石壁。土人取其巢爲食品。故原其始。燕窩實野生之物也。南洋燕窩。

取實情。得以隨貨物報告於諸君之前。想亦醫藥界所樂聞也。燕鳥之種類大別分爲吐窩與營窠二種。不吐窩者有烏燕、紅領燕二種。春分前後羣遷至我國沿海各地。合泥草築巢以營生。殖。秋分後回歸熱帶地。以是國人稱之爲季鳥。有種種神話傳說。吐窩者舊稱金絲燕。究其羽毛絕不像金絲。我暫時簡稱爲小燕。因爲牠是燕類中之最小者。小燕之外另有土種燕。依其棲息地以區別其窩。大別有洞燕、厝燕、毛燕三種。細目繁多。另分述於後。小燕之形態背灰黑色。腹部灰白或褐赤。大體上都不似烏燕之烏黑。背光其翼不尖。飛時尾平圓如紙扇狀。尾椎部平列一行白星點。其性喜羣居。終年不遷居異地。雖者在吐窩前最肥大。約有二三錢重。雖較小。吐涎亦較少。但其性善飛。常飛翔於高空覓食。歸宿洞穴中。陰雨天亦飛入陸地。朝出夕歸。從不曾見其棲息於陸地。或沙灘。舊說謂其食海粉、海藻、蠶螺者誤也。以其飛行空間所食必是飛蟲之類。有時撲水亦僅能

得浮游之小魚。不能啄食植物。或固著之動物也。（燕屎似蠅蠅屎。可確定其食蚊蟲之類。不食植物也。）至於何以能吐涎成窩。則非愚所能索解矣。大概如蠶能吐絲。亦自然物之奇妙也。燕窠遍地產甚多。暹西勢兩海濱各島。年產二百五十萬擔。暹灣平常產額計呈養半一百二十萬擔。宋卡共七十八萬擔。西海岸臨印度洋。自馬里灣至實突約五十萬擔。此項植利屬國有由政府招商投承。以三年爲一期。現期爲萬興公司。以六十四萬投得南路東海收取。權設總機關於曼谷。分設收燕廠於呈養、萬崙、宋卡。正月初即用人守管燕窩島。由公司船運送飲食。法禁森嚴。外船不得駛進其界內。出產地不零售。食已疲倦。其毛易於脫落。口涎未甚乾燥。便隱伏於其中。故細毛交錯。且必待新鳥出洞才收取。經過日期較久。凡窩色灰黃。中心薄而邊厚者。細毛黏雜。有血絲狀者。即爲第三水燕。即通銷我國市肆所謂毛燕是也。至土種云者。所以別於正種之燕鳥也。其

形色與小燕稍異。另佔洞穴。啄小燕之毛及自捋其毛。攪雜做成之窩。本地稱毛燕。烏燕。含唾涎之成份各地不同。呈養年產五六萬擔。毛草居大半。不堪食。只煨研調油。搽湯火灼。頗有效。宋卡十餘萬擔。下西勢活吞大年等地。出窩三十餘萬擔。幾全爲毛。其含涎成分較多。此種毛燕。概售與香港製造廠。（據報由香港轉運之燕窩。十八年全產達五百三十萬擔。）該製燕廠專收南洋各地之毛燕。將窩溶解。濾去粗水草。復以藥物溶解其細毛。加海菜粉類。做成塊。曰燕餅。其色呆白。無毛。無盡緣。無纖維。國內市肆每謂有一種假貨。殆即此物。抑另有不含燕涎之質貨。亦未可知。但稍留意。不難立辨真偽。燕鳥皆棲息於海濱。但以距淡水港較遠者。曰鹹水燕。其實較佳。價值較昂。暹屬普吉省會曰通扣。年產十餘萬。其地榜孟加拉灣。北與緬甸接壤。羣鳥錯列。離淡水地極遠。出品最佳。惟無適當之大洞穴。使鳥聚集於其中。故地方遼闊。出產無多。收獲管理殊不易。前幾年招

商投承。納餉萬銖。便能投得專賣權。設機關於沿海各地。無論何人。向其領取牌照。便可出島覓食。惟探得概以平價售與專賣人。因收取時候不一。致其燕窩新舊大小駁雜。此殆因地域廣闊使然。暹產之外。安南緬甸亦有但產量不若暹之多。且良也。厝燕就海濱築屋宇。使燕鳥集於其中。營窩於人家屋簷下。故曰厝燕。產日里亞齊各地。荷屬亦採洞燕。燕之色質與時價。蘇門答臘產者。以及日里阿齊之厝燕。其色鮮白。不耐火。食時只以滾水泡浸。若煨煮二小時。則完全溶化。不知者或以爲假貨。其價較暹產爲低。暹產呈養色。稍黃。最耐鹹。香氣甚濃。正開膨大。燕一斤值百末。普通四五十末。較石叻報紙所報荷屬之厝燕洞燕之行。情爲高。燕窩收入後。略吹曬。使乾燥。即剪削盡蒂。及邊緣之尖突者。所剪下之燕腳。分赤角、白角二種。窩被鹹水淋淨。則變紅。硬化。浸泡不開。赤角乃所貼之石。有鹹氣。所致。窩鳥因未生羽毛之鳥。因味甘微鹹。氣溫功能補血生精。祛風勝

十六畫 燕

其點者將果餌傾巖竄間。剝塞滿囊盡燕窩矣。空而復去。尤爲便值。猿一值數百金。貨數倍於拙者云。張祿燕窩談云。南洋羣島土人常乘小舟。見巖礁絕壁下有燕窩。即背掛網籃。腰帶長刀。用繩之一端繫巖壁草木上。一端勝於腿。依繩上去。採得後放背籃內。復依繩而下。但此法非常危險。偶不小心。卽落於海中。而飽魚腹。如天然燕窩採取方法。雖各有不同。然營單於危巖絕壁則無異。採得不易。故更珍貴。不若飼養燕窩。隨時採取。無甚爲難也。

製法 人造燕窩之原料及製法。日本島國四面環海。故海產植物亦不少。被用種種方法。爲人造燕窩。所取原料。卽海藻之屬。乃係海藻類之石花菜。烏足藻等。其法卽以此類海藻。曬於海臺陸地。俟其將乾。以淡水洒之。如是一曬。一洒。約至七八次。則海藻變爲淡黃色。俗名漂白。於是商人等買此漂白海藻。用水煮後。以布袋濾之。以所得濾液。冷却凝固。卽成爲瓊脂質（俗名洋菜）是實除做燕窩

輸入吾國外。凡輸出法德等國。作絲織物之原料。每年出口值銀一百五十萬元云。

性質 甘平無毒。

成分 據張祿燕窩談考得。自

海藻之唾腺分泌一種黏液。製成之天然燕窩。分析之結果。其成分爲水分一〇・四〇%。一含鹽素物質五七・四〇%。脂肪〇〇・〇〇%。纖維一・四〇%。一灰分八・七四%。又以水蒸氣處理之。溶解於水者。爲有機物質七四・三〇%。一無機物質七・一四%。又據美國生物化學雜誌。載吾國王女士對於燕窩之研究。大要謂淨去燕窩之毛。加以試驗。其灰分之平均百分數。爲二・五二。此灰分溶於鹽酸。其中有燒百分〇・〇三五。有硫百分之一・一〇。當燕窩起加水分解時。得還原性炭水化合物。至少百分之一七・四。其所含之蛋白質。有數種。其氮之分佈約略如下。酪氨酸以〇・〇八%。肥蛋蛋白質以六・六八%。黏膠蛋白質以三・九五%。

尿酸蛋白質以二・三九%。單經基氮以五・一九%。水解酸酥蛋白質以二・四四・六%。組織蛋白質以六・二二%。非經基氮以七・二二%。據研究所得。胃液酸質及脾液酸質。解消化燕窩。惟不知消化。養過雞蛋白之易用。之以飼動物。實驗之結果。表示燕窩蛋白質。亦非佳滋養品。不足代替其他緊要之蛋白質。爲食物之原料云。

主治 大養肺陰。化痰止咳。補而能清。爲調理虛損勞瘵之聖藥。一切病之由於肺虛。不能清肅下行者。用此皆可治之。

近人學說

●曹炳章曰。海燕

御蠶螺海粉魚蟲小生物。經胃中甜肉汁酸汁化爲唾液。吐而作高得風日陽之和氣。其味甘淡微鹹。能使金水相生。俾腎氣上滋於肺。而胃氣亦得以安。爲食補品中之最馴良者矣。如養胃液滋肺津。潤燥澤枯。生津益血。止虛嗽虛痢。理膈上熱痰病後諸虛。尤爲妙品。治高年虛嗽虛癆。小兒胎熱及痘疹元虛項陷者。爲最效。今人以之調

一七〇四

補虛損勞瘵。咳吐紅痰。每羹冰糖。養食。往往見效。一切病由肺脾氣虛。肝陽上擾。不能清肅下行。皆可治之。久任斯優。若陰火方熾。逆上奔。雖服無濟。以其幽柔無剛毅之力耳。飲食辨錄云。性能補氣。凡脾肺虛弱。及一切虛在氣分者。宜之。又能固表。表虛漏汗。畏風者。服之最佳。每枚可重在一兩以上。色白如銀。瓊州人呼爲崖燕。力猶大。一種色紅者。名血燕。能治血痢。兼補血液。有表邪人切忌。從新云。今人用以煮粥。或用雞汁煮之。雖甚可口。然亂其清補之本性。豈能已痰耶。有與冰糖同煮。則甘壅矣。亦豈能助肺金清肅下行耶。此皆關於燕窩效用宜忌之發明。大要也。服之者宜注意之。●程登瀛曰。燕窩者。小海燕所營之巢也。遲遲年產二百餘。增大部分運銷於我國。顧文人學者。到遐遊歷者。罕有樂意到那懸崖絕壁去考察燕之形態。與吐窩狀況者。而本地人習見無奇。又以爲細事。不值記錄。故書籍所載。都語焉不詳。不揣拙陋。爰就耳目所及。屑細誌之。使本品之

【燕脂菜】即落葵之古籍別名。典見綱目。詳『落葵』條。

【燕草】即佩蘭之古籍別名。典見綱目。詳『佩蘭』條。

【燕麥】即雀麥之古籍別名。典見唐本草。詳『雀麥』條。

【燕窠】即燕窩。詳『燕窩』條。

【燕窠中草】即燕窩草。詳『燕窩草』條。

【燕窩】命名 本品係雨燕科中之金絲燕食海生物所化之唾液吐出營造之窩巢故名。

處方用名 上官燕。淨毛燕。暹羅燕。龍牙燕。牡丹毛燕。光燕。

古籍別名 燕蔬菜。(綱目拾遺)

產地 產於閩廣漳泉沿海等處。南洋之婆羅洲、紐幾尼亞、馬達加斯加、蘇門答臘、馬來羣島、與爪哇、西伯里斯、暹羅、印度、日本、亦均有出之。

基本 屬脊椎動物鳥類鳴禽類雨燕科。爲金絲燕之高。

形態 燕窩爲金絲燕以唾液及其他物質所釀成之窩巢。係管

於斷崖峭壁之上。形狀如兜。其純粹由唾液造成者。則爲內包纖維質。類如海綿珊瑚之着生。排列無序。其實白色之細條。侵水則柔順漲大。蘇門答臘產者。其色鮮白。不耐火。暹羅產者。稍間黃黯。最耐燉。大香氣甚烈。爲貴重之補劑。並可供藥用。

種類 天然燕窩之品質不一。上品者曰頭水。暹羅燕質白。光潔。透明。壘厚。內有網絲。落水膨脹力甚強。一錢能漲至一兩七八錢。此爲第一次營巢。故曰頭水燕。其精力最足。第二次營巢。則質薄。色白。黃帶灰色。或間有紅斑。雖亦產暹羅。質性已薄弱。膨脹力亦大減。每錢刺發至七八錢。產南洋爪哇各島巖穴者。曰洞燕。在飼養室營巢者。曰厝燕。洞燕糯米色。質堅。間有細毛。厝燕色白。質鬆。毛少。落水漲力雖亦有以一分至十分可漲。然一煮即碎。其力不及天然頭水燕之強。歷燕產龍牙島者。曰龍牙燕。以囊厚色白有神。內有網絲。細滿者爲優。福建漳泉沿海產者。夾毛者多名。曰毛燕。(外國格里斯

亦產之)亦以肉厚色白有神。紅根毛輕。每隻有簾串眼者。曰牡丹毛。燕爲最佳。其他燕毛重。色白帶灰黑者。次大抵採下之後。不加精製。亦不整齊。乃浸於水中。拋其結合。除去羽毛及其他夾雜物。再乾燥之。他如天然燕窩與日本人造燕窩。凡有經驗者。亦各有區別。若天然燕窩。色澤較潤。有神光。雖夾雜有毛。出於自然。且有鯛魚味。人造燕窩。色呆白。無神。質粗略堅。硬有海藻氣。或全無氣味。以此分辨。一無道形。凡天然燕窩以帶紅紫色者爲最上品。白色者亦佳。帶黑色多毛者最下也。

採取 採取時期。金絲燕爲維持自身生活之安寧計。營窩於斷崖絕壁。非常危險之海島上。約費三月之工作。方能成功。一窩土人於其未產卵以前。採取之。而海燕再築第二窩。一月落成。復被採取。又再築第三次之窩。燕居窩中。產卵。不數日。孵化成雛。發育甚速。其產卵分早春近冬二時期。俟雛燕完全成長之時。母子即離去。近海。率南方暖陸飛去。採集者復攀

登絕壁。從事第三次之採集。動物學大辭典云。燕窩品質之高下。與該燕所棲之洞穴。及採取之時節。有關係。欲得上品。須於雛之羽毛未發育時。併窩中之卵而採取之。若雛已發育而飛去者。則呈黑色。且帶血痕。甚或羽毛交雜。幾不可用。其採取時期。概在四月八月十二月間。爲優。採取方法。蓋餘錄云。燕窩產危巖絕壁。採取非易。業此者。每尋鮑魚爲導線。蓋燕窩下必有鮑魚。自海岸起。相離數尺。則銜一介。捕者先持鐵鏈。輕繫鮑魚。鮑即緊吸石壁。其動力甚大。乃足踐其一手。持其一。陸續緣之而上。燕窩既得。即順絲而下。隨下。隨將鮑魚刺下。故燕窩所得。鮑魚值亦稱之。茶餘客話云。許青巖方伯語予云。燕窩產海島中。窮巖處。谷足力繩竿之所不及。故舶養小猿猴。善解人意。至山島間。以小布繫猿猴背上。縱之。往升木深處。窺剔燕窩中。而歸。猿猴之去也。若不得食。三數日始返。海客治果餌充囊中。俾之遠出不餓。拙者出。即刺塞囊中。歸即傾囊。不過數片。爲鼠餌。與地也。

十六畫 燒

燕

佛鬱而消沉積。通膈噎而散痰飲。治泄瀉而止冷痛也。辛先入肺。和水飲之。即押使下行。通調水道。而小便長。白熱能燉金耗血。大腸受利。故令大便燥結。與薑蒜同飲。即生痔也。若夫餐月飲之。汗出而膈快身涼。赤目洗之。淚出而腫消。赤散。此乃從治之方焉。過飲不節。殺人頃刻。近之市沽。又加以砒石草烏。辣灰香藥。助而引之。是假盜以方矣。善攝生者。宜戒之。按劉克用病機賦云。有人病赤目。以燒酒入鹽飲之。而痛止腫消。蓋燒酒性走引。鹽通行經絡。使鬱結開而邪熱散。此亦反治劫劑也。(李時珍) 過飲敗胃。傷腦喪心。損壽甚。則黑腸腐胃而死。與薑蒜同食。令人生痔。鹽冷水綠豆粉解其毒。(李時珍) 燒酒非古法也。自元時始創其法。用濃酒和糟入甑蒸。令氣上用器承取滴露。凡酸壞之酒。皆可蒸燒。近時惟以糯米或粳米或黍或秫或大麥蒸熟。和麴醱甕中七日。以甑蒸取其清如水。味極濃烈。蓋酒露也。(李時珍) 暹羅酒以燒酒復燒二次。入珍寶異香。其

燕

場每個以檀香十數斤。燒烟薰令如漆。然後入酒甕封埋。土中二三年。絕去燒氣。取出用之。曾有人攜至船。能飲三四盃。即醉。價直數倍。也有積病。飲一二盃。即愈。且殺蟲。予親見二人飲此。打下活蟲長二寸許。謂之魚蠱云。(汪穎)

【燒酒火】

性質 大熱。辛。甘。溫。中行氣。動血。入十二經。

參攷資料

酒本米麴之精華。屬陽。燒酒則又為酒之精華。乃陽中之陽。燃之色綠。陽極陰生之象。與石硫性同。皆以陽為體。藏陰於用也。故其光照人面。皆作青灰色。照魘魘則不能遁形。以陰為用者。多含毒。今人率以此酒。冬月為火碗。用以煖物代炭火。久食則發癰毒。默受其毒而不覺。然維臟寒者。宜之。氣能透達骨髓。輾堅燥滯。熏衣著之。能發骨髓中汗。(趙恕軒)

【燒鹽】

命名 本品為鹽之燒過者。故名。

主治

入粥食。止血痢。

【燕】

古籍別名 乙鳥。說文。玄鳥。禮記。鷩鳥。(古今

注) 鷩鳥。(莊子) 游波。(炮炙論) 天女。(易占)

外國名詞

Hirundo rustica gutturalis Scop. (拉丁) East-ern chimney swallow 或 Swallow (英) Schwalbe (德) シバメ 或 ツハクロ (日本)

基本 係脊椎動物鳥類鳴禽類燕科。

形態

燕為原禽類。燕屬之一種。體大似雀。頭頂背及翼黑色。有青光。額與喉栗色。胸有黑條紋。腹純白。形闊而凹。頸短。嘴短闊。腳細小。目之視力甚銳。翼甚長而狹小。稍呈鐮狀。尾翼十二枚。分歧為叉狀。亦黑色。每年春分前後。來自暖地。銜泥作巢於屋宇秋分後復去。伏盤窟中。其肉可供藥用。



燕

性質

酸。平。有毒。

一七〇一

主治 殺痔蟲。瘡蟲。

參攷資料 燕肉不可食。損人神氣。(陶弘景)

【燕口香】即沉香形如燕口者之古籍別名。典見綱目。詳「沉香」條。

【燕支】即胭脂。詳「胭脂」條。

【燕卵】即龍眼之古籍別名。典見和漢藥考。詳「龍眼」條。

【燕尾香】即草蘭之古籍別名。典見開寶本草。詳「草蘭」條。

【燕尾草】即慈姑之古籍別名。典見大明本草。詳「慈姑」條。

性質 辛。平。有毒。

【燕屎】

主治 蠱毒。鬼疰。逐不詳邪氣。破五癰。利小便。熬香用之。

歷代記述攷證 【南北朝】陶弘景本草集註論燕屎曰。作湯浴小兒驚癇。唐蘇恭新修本草論燕屎曰。療痔殺蟲。去目翳。唐孫思邈千金翼論燕屎曰。治口瘡。癰疾。

【燕面】即夏枯草之古籍別名。典見別錄。詳「夏枯草」條。

【燕胎子】即荔枝之古籍別名。典見和漢藥考。詳「荔枝」條。

【燕脂】即胭脂。詳「胭脂」條。

〔濟濟方〕

①治冬月唇裂。香油類類抹之。
〔相感志方〕

②治身面白癩。以酒服生胡麻油一合。一日三服。至五斗癩。忌生冷豬雞魚蒜等百日。〔千金方〕

③治小兒丹毒。用生麻油塗之。〔千金方〕

④治打撲傷腫。熱麻油和酒飲之。以火燒熱地臥之。覺即疼腫俱消。松陽民相傳。用此法。經官驗之。了無痕迹。〔趙葵行營錄方〕

⑤治虎爪傷人。先吃清油一盞。仍以油淋洗瘡口。〔趙原陽濟急方〕

⑥治毒蜂螫傷。用清油擦之。妙。〔趙原陽濟急方〕

⑦治毒蛇螫傷。飲好清油一二錢。解毒然後用藥也。〔濟急良方〕

參攷資料 ①大寒。乃常食所用。而發冷疾。滑精髓。發臟腑。困脾臟。令人體重損聲。〔陳藏器〕
②有牙齒疾及脾胃疾。人切不可吃。治飲食物須逐日熬熟用之。若經宿即動氣也。〔陳士良〕 ③油生

於麻。麻溫而油寒。同質而異性也。

〔劉完素〕 ④香油乃炒熟脂麻所出。食之美。且不致疾。若煎煉過。與火無異矣。〔朱震亨〕 ⑤張華博物志言。積油滿百石。則自能生火。陳

霆羣談言。衣綳有油。蒸熱。則出火星。是油與火同性矣。用以煎煉食物。尤能動火生痰。陳氏謂之大寒。珍意不然。但生用之。有潤燥解毒止痛消腫之功。似乎寒耳。且香油能殺蟲。而病髮癢者。嗜油。煉油能自焚。而氣盡則反冷。此又物之玄理也。〔李時珍〕

〔燈蛾〕 原名 飛蛾。 命名 本品為蛾之能飛而喜撲燈火者。故名。 外國名詞 *Arctia coja, L.* (拉丁)



蛾 燈

形體 燈蛾為卵生蟲類。蠶蛾屬之一種。其體肥大。密生軟毛。前翅赤褐色。白色粗條。後翅赤。有黑紋。幼蟲白色。密生赤黑色長毛。有脚八對。夏月疾行路中。能為植物之害。長成便為飛蛾。捕得可供藥用。

主治 趙學敏曰。治痔管。法用蠶蠟一個。同埋燈蛾一個。放罐內一宿。加麝香一錢。陰乾。為末。吹入管內。自能出水。水乾即愈。

〔燈籠油〕 即燈籠殘油。詳「燈籠殘油」條。
〔燈臺草〕 即澤漆之俗名。詳「澤漆」條。
〔燈籠花〕 即山慈姑之俗名。詳「山慈姑」條。
〔燈籠草〕 即酸漿之古籍別名。典見唐本草。詳「酸漿」條。
〔燒金草〕 即蒲公英之古籍別名。典見土宿本草。詳「蒲公英」條。

〔燒酒〕 基本 本品係用糯米或須米或黍稷或大麥蒸熟。和麴。釀中七日。以飯蒸取汁。所成之酒。故名。
古醫別名 火酒。氣酒。網口。阿刺吉酒。飲膳正要。性質 辛。甘。大熱。有大毒。

主治 李時珍曰。消冷積寒氣。燥淫痰。開鬱結。止水泄。治霍亂。瘧疾。噎膈。心腹冷痛。陰毒欲死。殺蟲辟瘴。利小便。聖大便秘。赤白痢。腫痛有效。

配合應用 ①治冷氣心痛。燒酒入飛鹽飲即止。
②治陰毒腹痛。燒酒溫飲。汗出即止。
③治嘔逆不止。真火酒一盞。新汲井水一杯。和服甚妙。
④治寒溼泄瀉。小便清者。以頭燒酒飲之。即止。
⑤治耳中有核。如棗核大。痛不可動。苦以火酒滴入。仰之半時。即可拊出。〔李樸奇方〕

⑥治風蟲牙痛。燒酒浸花柳。頻頻漱之。
⑦治寒咳。咳嗽。用燒酒四兩。豬脂。蜜。香油。茶末各四兩。同浸酒內。養成一處。每日挑食。以茶下之。效。

參攷資料 ①燒酒純陽毒物也。面有細花者為真。與火同性。得火即燃。同乎紹酒。北人四時飲之。南人止暑月飲之。其味辛甘。升陽發散。其氣燥熱。勝濕祛寒。故能開

一七〇一

十六畫 燈

熱毒。又治割火咬傷。潰瘡口甚良。

配合應用 ①治髮癢飲油。外

臺云。病髮癢者。欲得飲油。用油一

升入香澤煎之。盛置病人頭邊。令

氣入口鼻。勿與飲之。疲極眠睡。蟲

當從口出。急以石灰粉手捉取。抽

盡。即是髮也。又云。治胸喉間覺有

癢蟲上下。嘗聞微鼓食香。此乃髮

癢蟲也。二日不食。開口而臥。以油

煎葱鼓令香。置口邊。蟲當出。以物

引去之。必愈。

②治髮癢腰痛。南史云。宋明帝

宮人腰痛。牽心發。則氣絕。徐文伯

診曰。髮癢也。以油灌之。吐物如髮

引之。長三尺。頭已成蛇。能動搖。懸

之。滴盡。唯一髮爾。

③治吐解蟲毒。以清油多飲取

吐。(續南方)

④解河豚毒。一時倉卒無藥。急

以清麻油多灌取吐。出毒物即愈。

(衛生易簡方)

⑤解砒石毒。用麻油一盞灌之。

(衛生方)

⑥治大風熱疾。近效方云。婆羅

門僧療大風疾。并熱風。手足不遂。

壓丹石熱毒。用消石一兩。生烏麻

油二大升。同納罈中。以土豎蓋口。

紙泥固濟。細火煎之。初煎氣腥。藥

熟則香氣發。更以生脂麻油二大

升。和合微煎之。以意斟量得所。即

內不津器中。凡大風人。用紙屋子

坐病人外面。燒火發汗。日服一大

合。壯者日二服。三七日。頭面皴瘡

皆滅也。(圖經方)

⑦治傷寒發黃。用生烏麻油一

盞。水半盞。雞子白一枝。和攪服盡。

(外臺祕要方)

⑧治小兒發熱。不拘風寒飲食。

時行痘疹。並宜用之。以葱涎入香

油內。手指蘸油。摩擦小兒五心頭

面項背諸處。最能解毒涼肌。(直

指方)

⑨預解痘毒。時行喧暖。恐發痘

瘡。用生麻油一小盞。水一盞。旋旋

傾下油內。柳枝攪稠如蜜。每服三

三。蠟殼大人二合。臥時服之。三五

服。大便秘利。瘡自不生矣。此扁鵲

油劑法也。(外臺祕要方)又或用

麻油童便各半盞。如上法服。(直

指方)

⑩治小兒初生。大小便不通。用

真香油一兩。皮消少許。同煎滾。冷

定。徐徐灌入口中。嚥下即通。(蘭

氏經驗方)

⑪治卒熱心痛。生麻油一合服

之良。(肘後方)

⑫治鼻衄不止。紙條蘸真麻油

入鼻取嚏。即愈。有人一夕衄血盈

盆。用此而效。(普濟方)

⑬治胎死腹中。清油和蜜等分。

入湯頓服。(普濟方)

⑭治漏胎難產。因血乾澀。也用

清油半兩。好蜜一兩。同煎數十沸。

溫服。胎滑即下。他藥無益。以此助

血爲效。(胎產須知方)

⑮治產婦不收。用油五斤。煉熟

盆盛。令婦坐盆中。飯久。先用皂角

灰去皮。研末吹少許入鼻。作嚏立

上。(斗門方)

⑯治癰疽發背。初作即服。此使

毒氣不內攻。以麻油一斤。銀器煎

二十沸。和醇醋二盞。分五次。一日

服盡。(直指方)

⑰治腫毒初起。麻油煎葱黑色。

趁熱通手。旋塗自消。(百一選方)

⑱治喉痺腫痛。生油一合。灌之

立愈。(總錄方)

⑲治丹石毒發發熱者。不得食

熱物。不用火爲使。但著厚衣。腰臥

取油一匙。含嚥。戒怒二七日也。枕

中記云。服丹石人。先宜以麻油一

升。薤白三升。切納油中。微火煎黑。

去滓。合酒。每服三合。百日氣血充

盛也。亦治身面瘡疥。

一七〇〇

①治梅花禿癬。用清油一盞。以

小竹子燒火入內煎沸。瀝豬膽汁

一箇。和勻。刺頭擦之。二三日即愈。

勿令日曬。(普濟方)

②治赤禿髮落。用香油水等分。

以銀釵攪和。日日擦之。髮生乃止。

(普濟方)

③治髮落不生。生胡麻油塗之。

(普濟方)

④令髮長黑。生麻油桑葉煎過

去滓。浸髮令長數尺。(普濟方)

⑤治聾。生油滴耳中三五次。

候耳中塞出即愈。(普濟方)

⑥治蛇蟻入耳。用胡麻油作煎

餅。枕臥。須臾自出。李元淳尙書。在

河陽。日蛇蟻入耳。無計可爲。腦悶

有聲。至以頭擊門柱。奏狀危困。因

發御醫。醫之不驗。忽有人獻此方

乃愈。劉禹錫傳信方)

⑦治蜘蛛咬毒。香油和鹽搽之。

伏熱。五淋之聖藥也。燒可治喉痺。及以灰塗乳上。則兒飼不夜啼。縛把擦癰。則蟲從草出。浮水可見。且能斷根。矣。氣虛小便不禁者。忌服。【清買九知辨藥指南論燈心曰。燈心氣味俱輕。輕者上浮。專入心肺。其味最淡。淡能利竅。使上部鬱熱下行。從小便而出。主治咳嗽咽痛。眼赤目昏。淋閉水腫。小便不利。暑熱便濁。小兒夜啼。皆清熱之功也。世疑輕淡之物。以爲力薄而忽之。不知輕可去實。淡生於滲。惟此能導心肺之熱。自上順下。通調水道。下輪膀胱。其力獨勝。

近人學說 張山雷曰。本經止有石龍芻。云一名龍鬚。即今織蓆之草也。宋開寶本草。乃有燈心草。其形較之織蓆者爲粗。其實較鬆。今剖其穰爲燈心。而以其壳爲蓆衣。二草雖非一種。然是同類。皆生於下溼之地。味淡質輕。故專於通利。能泄溼熱而清導小水。亦降心肺之火。本經謂石龍芻味苦微寒。主心腹邪氣。小便不利。淋閉。風溼。鬼疰。惡毒。其所謂邪氣惡毒者。即以溼熱之邪言之也。治風溼者。亦

取其利溼之意。別錄謂治瘡漏。除莖中熱痛。仍是泄熱利水之義。陳藏器謂敗蓆治淋。及小便卒不通。開寶本草謂燈心草主五淋。織蓆更良。潔古謂瀉肺。通瀉滯。閉。行水。治腫。丹溪謂治急喉痺。燒灰吹之以灰飼小兒。止夜啼。瀨湖謂降心血。止血熱。通氣消腫。又無一非泄熱利水之用。又燈心之質。尤爲輕虛。故開肺泄水。尤其專長。以開喉痺。其義在此。但研末燒灰。其法甚難。以米粉漿之。則可研塞。繫於竹節中。雜火煨之。則成炭。要之質賤而味淡。除利水以外。無用。韓氏醫通有天一丸。必以燈心爲末。合滑石二。荖荖荖。澤瀉。再用人參膏爲丸。其用亦不過通利小水而已。可謂矯揉造作。是亦醫界之覽矣。

配合應用 ①治破傷出血。燈心草嚼爛傅之立止。(勝金方) ②治衄血不止。燈心一兩爲末。入丹砂一錢。米飲每服二錢。(聖濟總錄方) ③治喉風痺塞。用燈心一握。陰陽瓦燒存性。又炒鹽一匙。每吹捻數次立愈。一方用燈心灰二錢。蓬

砂末一錢吹之。一方燈心簪。一方燈心簪葉灰等分。(瑞竹堂方) 又用燈心草紅花燒灰酒服一錢。即消。(惠濟方)

④治痘瘡煩喘。小便不利者。燈心一把。豨甲二兩。水一升。煎六分。二服。(龐安常傷寒論方)

⑤治夜不合眼。難睡。燈草煎湯代茶飲。即得睡。(集簡方)

⑥治通利水道。白飛霞自制天一丸。用燈心十斤。米粉漿。曬乾。研末。入水澄去粉。取浮者。曬乾。二兩五錢。赤白茯苓去皮共五兩。滑石水飛五兩。猪苓二兩。澤瀉三兩。人參一斤。切片熬膏。和藥丸。知龍眼大。碌砂爲衣。每用一丸。(韓氏醫通方)

⑦治溼熱黃疸。燈草根四兩。酒水各半。入瓶內。煮半日。露一夜。溫服。(集玄方)

用量 五分至八分。

施用宜忌 凡中寒而小便不禁者禁用。

參攷資料 ①燈草降心火通氣。爲燈草專長。心火降。則肺氣下行而氣通。故曰瀉肺。心主血。火降

氣通。則血和而水源暢矣。其治喉痺最捷者。降心火。下肺氣。和血散氣之義也。(劉潛江) ②燈心草生江南澤地。叢生莖圓細而長。直。人將爲薪。(馬志) ③陝西亦有之。熟待乾。折取中心白。穰燃燈者是。謂熟草。又有不熟者。但生乾。剉取爲生草。入藥宜用生草。(寇宗奭)

④此即龍鬚之類。但龍鬚緊小而瀝實。此草稍粗而瀝虛。白吳人栽蓆之取。穰爲燈炷。以草織蓆及蓆他處野生者不多。外丹家以之伏硫砂。雷公炮炙論序云。礪過赤鬚。永留金鼎。注云。赤鬚亦呼虎鬚草。麥礪住火。不知是否。即此虎鬚也。(李時珍)

【燈心】即燈心草之處方用名。詳

【燈心草】條。

【燈心草】即燈心草之處方用名。詳

【燈心草】條。

【燈盞殘油】 基本 燈盞內。古以麻油燃燈。所謂殘油者。指殘餘之麻油而言。若棉油菜油。及近日之煤油。皆不在本條範圍之內。主治 能吐風痰食毒。塗難腫

五錢脂加入參、鼈甲、香附、麥門冬。

治產後諸虛百病。肺熱者去人參。

④ 治產後水腫、血虛、浮腫、澤蘭、防己等分爲末，每服二錢，醴酒下。

（張文仲備急方）

⑤ 治小兒麻疹、喉嚨、關心封之良。子母祕錄方）

⑥ 治瘡腫初起。澤蘭搗封之良。亦治損傷瘀腫。（集簡方）

⑦ 治產後陰翻。產後陰戶燥熱。遂成翻花。澤蘭四兩煎湯熏洗二三次，再入枯礬煎洗之，即安。（集簡方）

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡無瘀血者禁用。

參攷資料 ① 蘭草，澤蘭，氣香而溫，味辛而散。陰中之陽，足太陰

脾經所主。則三焦通利而正氣和，肝鬱散，則營衛流行而病邪解。蘭草

走氣道，故能利水道，除痰癖，殺蟲辟惡，而爲消渴良藥。澤蘭走血分，

故能治水腫，塗癰毒，破瘀血，消癥瘕，而爲婦人要藥。雖是一類，而功用稍殊。正如赤白茯苓、芍藥、補瀉

皆不同也。雷斅言：雌者調氣，生血。

雄者破血通經。正合二蘭主治。大澤蘭之爲蘭草，尤可懸擬。血生於氣，故曰調氣生血也。又荀子云：澤

芷以養鼻。謂澤蘭白芷之氣芳香，通乎肺也。（李時珍）② 齊安人呼

爲風藥。吳普本草：一名水香。陶氏云：亦名都梁香。今俗通呼爲孩兒

菊。則其與蘭草爲一物二種，尤可證矣。其根可食，故曰地笋。（李時

珍）③ 生地下水旁。葉如蘭。二月生苗。赤節四葉，相植支節間。（吳

普）④ 今荊徐隨壽蜀梧州河中府皆有之。根紫黑色，如粟根。二月

生苗，高二三尺，莖幹青紫色，作四稜葉生相對，如薄荷。微香。七月開

花，三葉白，色萼通紫色，亦似薄荷。花三葉，苗陰乾，荊湖嶺南人家

多種之。壽州出者無花子。此與蘭草大抵相類，但蘭草生水旁，葉光

潤，根小紫。五六月盛，而澤蘭生水澤中及下澤地，葉尖微有毛，不

光。潤方莖紫節。七月八月初採，微辛。此爲異爾。（蘇頌）

【澤蘭】即澤中結凝之鹽也。性質功用與海鹽同。詳「食鹽」條。

【澱花】即青黛之古籍別名。典見

和漢藥考。詳「青黛」條。

【澱沙】即礪砂之古籍別名。典見和漢藥考。詳「礪砂」條。

【礪塞】即石硫黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳「石硫黃」條。

【燈心草】處方用名 燈芯。燈

古籍別名 虎鬚草、碧玉草。（綱目）燈草、席草、赤鬚、古乙心（和漢藥考）

外國名詞 Juncea effusa, L. var. decipiens, F. Bu. (拉

丁)

基本 屬燈心草科。爲燈心之莖、根。

產地 凡江南澤地。恒多叢生。陝西亦有出。



燈心草

形態 燈心爲多年生草。莖圓作綠色細線狀。高達四五尺。中有

白髓。葉在莖之基部，作鱗狀。夏月於莖之上部，生多數花梗，開黃綠

色小花。燈心草用以織席。莖中白髓，即入藥之燈心草。

採取 六七月採莖。取穰日乾，製法 李時珍曰：凡用燈心草，

難研，以粳米粉漿染過曬乾，研末入水澄之，浮者是燈心也，曬乾用。

用法 水煎或到末用。

性質 甘寒，無毒。

效能 利水通淋，清熱安神。專作利尿劑。

主治 五淋生瘻服之。敗席煮服更良。

歷代記述攷證 【金】張元素珍珠囊論燈心曰：瀉肺，治陰痰瀰

不利行水。除水腫癰閉。【元】朱丹溪本草衍義補遺論燈心曰：治急

喉痺，燒灰吹之，甚捷。燒灰塗乳上，飼小兒，止夜啼。【明】李時珍本草

綱目論燈心曰：降心火，止血通氣，散腫止渴，燒灰入輕粉磨膏，治陰

疳。【清】黃宮繡本草求真論燈心曰：燈草味淡而寒，體小氣微，諸

書皆稱能降心火，以其心治心也。心火清則肺金肅，心小腸相表裏，

則熱盡從小便而出矣。且熱去而血亦寧，故能止血通淋，清上焦

用法 與他藥水煎或到末和作丸散。

性質 苦。微溫。無毒。

成分 澤蘭之成分爲揮發油、

單寧酸、

效能 行血。行水。用作婦人調經藥。及治水腫藥。並治月經過多。

作用 在胃中微能阻止消化之功。用入腸能激腸黏膜。使吸收力增加。并能減少黏膜之分泌。由腸壁而至血中。微能凝固血液。使進行緩慢。更能激子宮神經。使子宮四周之黏膜收縮。

主治 金瘡癰腫瘡膜（本經）產後金瘡內塞（別錄）

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論澤蘭曰。產後腹痛頻產血氣衰冷成勞瘦羸。婦人血滯腰痛。【宋】大明日華諸家本草論澤蘭曰。產前產後百病通九竅利關節養血氣破宿血消癥瘕通小腸長肌肉消撲損瘀血治鼻血吐血頭風目痛婦人勞瘦丈夫面黃

【明】繆希雍本草經疏論澤蘭曰。澤蘭感土澤之氣故味甘而入血微溫而無毒桐君兼酸苦能洩

熱。甘能和血。酸能入肝。溫通營血。故又主癰腫瘡膜及婦人吹乳乳結止衄血并中風餘疾。佐以益脾土之藥而用防己爲之使。則主大腹水腫。身面四肢浮腫。骨節中水氣。日華子云。澤蘭通九竅利關節養血氣破宿血消癥瘕。產前產後百病通小腸。長肉生肌。消撲損瘀血。治鼻洪吐血頭風目痛婦人勞瘦丈夫面黃。又藥性論云。澤蘭使味苦辛。主產後腹痛頻產血氣衰冷成勞瘦羸。又治通身面目浮腫。主婦人血滯腰痛。總其洩熱和血行而帶補之能也。【明】李士材本草圖解論澤蘭曰。澤蘭芳香悅脾可以快氣疎利悅肝。可以行血流行營衛暢達膚竅。遂爲女科上劑。【清】黃宮繡本草求真論澤蘭曰。澤蘭苦甘而辛。即今婦人採置髮中除垢者是也。玩書所論澤蘭。與本經蘭草同爲一體。其生澤旁紫莖素枝。赤節綠葉對節生。有細齒。但蘭草則莖圓節長。葉光有歧。澤蘭則莖微短節方。葉有毛之爲異耳。二物並於嫩時。皆可刈佩。以其花葉皆香。置於髮中能辟邪省

頭。故雖呼爲香草。俗則呼爲孩兒菊。與於山蘭。其花雖香而葉絕無氣者。迥不相同。蘭草莖圓葉光。其性專主入氣。雖書載有久服益氣輕身不老腎語。然究止屬利水除痰殺蟲辟惡。而爲消渴良藥。即內經所謂數食肥甘。傳爲消渴。治之以蘭。以除陳氣是也。澤蘭莖方葉毛。雖書載有和血舒脾。長養肌肉之妙。然究皆屬入脾行水入肝治血之味。是以九竅能通關節能利宿食能破月經能調癥瘕能消水腫能散產後血淋腰痛能止吐血衄血目痛風癰癰毒撲損能治。觀此則書所云舒脾和血。不過因其水消血除之意。豈真舒脾和血之味也乎。入補氣補血之味同投。則消中有補。不致損真。誠佳品也。

近人學說 張山雷曰。澤蘭產下隕大澤之旁。本與蘭草相似。故主治亦頗相近。本經大腹水腫。身面四肢浮腫。骨節中水。皆苦溫勝溼之功效。亦即蘭草利水道之意。其治金瘡癰腫瘡膜者。專入血分而行瘀排膿消腫也。惟本經所謂乳婦內衄。頗不可解。蓋印後世新產通瘀之意。別錄內塞。當亦以瘀露不通言之。（廣義）甄權謂治產後腹痛。固苦溫行瘀之功。又謂治類產血氣衰冷。成勞瘦羸。婦人滯血腰痛。則以溫和能利血脈言之。然通利之品。能走未必能守。此當以意逆之。而可知其非虛症久服之藥矣。顏湖謂澤蘭氣香而溫。味辛而散。陰中之陽。脾喜芳香。肝宜辛散。脾氣舒則三焦通利。肝鬱散則營衛流行。蘭草走氣道故能利水道除痰癖殺蟲辟惡。而爲消渴良藥。澤蘭走血分故能治水腫塗毒破瘀血消癥瘕。而爲婦人要藥。雖是一類。而功用稍殊。石頑謂入肝脾二經血分。專治產後血敗流於腰腹。拘攣疼痛。破宿血消癥瘕。皆散血之功。爲產科要藥。

配合應用 ①澤蘭。婦人方中。最爲急用。古人治婦人。澤蘭丸甚多。

②澤蘭得炒黑豆。炮乾薑。當歸。芎藭。乾地黃。牛膝。益母草。赤芍藥。蒲黃。五靈脂。治產後惡露不盡。少腹作痛。俗名兒洗痛。寒月加桂。多火及內熱虛勞人。去桂加童便。去

臟。益氣力。起陰氣。補虛損。五勞之功而已。雖能瀉腎。從於諸補藥。羣衆之中。則亦不能瀉矣。(王履) 澤瀉氣平。味甘而淡。淡能滲洩。氣味俱薄。所以利水而洩下。脾胃有濕熱。則頭重而目昏耳鳴。澤瀉滲去其濕。則熱亦隨去。而土氣得令。清氣上行。天氣明爽。故澤瀉有養五臟。益氣力。治頭旋。聰明耳目之功。若久服則降令太過。清氣不升。真陰潛耗。安得不目昏耶。仲景地黃丸。用茯苓。澤瀉者。乃取其瀉膀胱之邪氣。非引接也。古人用補藥。必兼瀉邪。邪去則補藥得力。一闢一闢。此乃玄妙。後世不知此理。專一於補。所以久服。必至偏勝之害也。(李時珍) 澤瀉生汝南池澤。五月採葉。八月採根。九月採實。陰乾。(別錄) 汝南郡屬豫州。今近道亦有。不堪用。惟用漢中南鄭青州代州者。形大而長。尾間必有兩歧。爲好。此物易朽蠹。常須密藏之。叢生淺水中。葉狹而長。(陶弘景) 今汝南不復採。惟以涇州華州者爲善。(蘇恭) 今山東河陝江淮亦有之。漢中者爲佳。春生苗多

在淺水中。葉似牛舌。獨莖而長。秋時開白花。作叢似穀精草。秋末採根。曬乾。(蘇頌) 肺金爲氣化之源。伏火煎灼。則水道必淤。淤則金氣不行。而金益病。且水停下流。則中土濡瀝。而奉上無力。故余治勞嗽吐血之症。未有不以導水爲先務者。古人每稱澤瀉有神。禹治水之功。夫亦嘗究其命名之義矣。蓋澤者。澤其不足之水。瀉者。瀉其有餘之火。惟其澤也。故能使生地。白芍。阿膠。人參。種種補益之品。得其前導。則補而不滯。惟其瀉也。故但走濁道。而不走清道。非若猪苓。木通。腹皮等味之。剝陰破氣。直走無餘。要知澤瀉一用。肺脾胃三部咸宜。所謂功同神禹者此也。(理虛元鑑)

【澤瀉炭】即澤瀉炒成炭者之處方用名詳「澤瀉」條

【澤瀉葉】 性質 鹹平。無毒。 主治 大風。乳汁不出。產難。強陰。氣久服輕身。

歷代記述攷證 【宋】日華諸家本草論澤瀉葉曰。壯水臟。通血脈。

【澤瀉實】 性質 甘平。無毒。 主治 風痺。消渴。益腎氣。強陰。補不足。除邪溼。久服面生光。令人無子。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論澤瀉實曰。別錄言澤瀉葉及實。強陰氣。久服令人無子。而日華子言澤瀉實。補女人血。令人有子。似有不同。既云強陰。何以令人無子。既能催生。何以令人有子。蓋澤瀉同補藥。能逐下焦溼熱邪垢。邪氣既去。陰強海淨。謂之有子可也。若久服則腎氣大洩。血海反寒。謂之無子可也。所以讀書不可執一。

【澤蘭子】 性質 苦。微溫。無毒。 主治 婦人三十六疾。

【澤蘭根】 原名 地笋。 性質 甘辛。溫。無溫。 主治 利九竅。通血脈。排膿治血。

歷代記述攷證 【宋】大明日華諸家本草論澤蘭根曰。止鼻衄。吐血。產後心腹痛。產婦可作蔬菜食佳。

【澤蘭葉】 命名 本品生於淺水沼澤旁。葉形如蘭故名。

古籍別名 虎蘭葉。龍葉。(本經) 虎蒲葉。(別錄) 水香葉。(吳普) 都梁香葉。陶弘景。孩兒菊葉。風藥葉。孤兒菊葉。綱目。九畹菜葉。(和漢藥考)

外國名詞 Aethusa japonica, A. Gr.

基本 屬菊科澤蘭之葉莖。產地 凡溪澗池澤間恒多生焉。陳仁山藥物生。攷辨云。澤蘭產廣東清遠石潭等處。

形態 澤蘭爲草本植物。春抽方莖高二三尺。呈紫赤色。葉類薄荷。枝節對生。四葉秋季開白色或淡紫色花。其根爲紫黑色。

採取 三月間採其莖葉陰乾用。

製法 雷斅曰。凡使澤蘭。須別雌雄。大澤蘭莖葉皆圓。根青黃。能生血調氣。與小澤蘭迥別。小澤蘭葉上斑根頭尖。能破血通久積。須採來細剉。以絹袋盛懸於屋南畔角上令乾用。

湖謂經言面生光。能行水上。與術又云。久服身輕。日行五百里。走水上諸說。陶貞白。蘇恭信之。愚竊疑之。蓋澤瀉行水瀉腎。久服且不可安得有此神功云云。蓋謂瀉湖網目於古書最多。驚信。時且失之穿鑿。而獨於此條能見其真。知荒誕不經之說。固不可爲天下後世法也。別錄謂治五臟痞滿。蓋祇以瀉阻之痞滿而言。止泄精者。亦惟瀉熱蘊於下焦。而相火妄行。其疏泄之令者。乃宜此瀉去。溼熱而龍相自安。非可以概虛人之滑泄。而又謂補虛損。起陰氣。則大與溼泄傷陰之義矛盾矣。又曰。澤瀉味淡。體輕。故性善滑泄。生長水中。故善利水逐溼。此藥性情功用。即此兩言而已足。更無條義可言。其兼能滑痰化飲者。痰飲亦積水停滯爲痛。惟其滑利。故可消痰。總之。溼泄滑瀉之藥。必無補養之理。本經養五臟。益氣力云云。已屬溢美太過。而甄權竟謂可治腎虛精自出。大明且謂補女人血海。令人有子。潔古亦謂入腎經。去舊水。養新水。皆非藥理之真。徒眩初學耳目。殊堪

詫異。若仲景八味丸用之者。原爲小水不利而設。金匱中屢有明文。後人妄謂六味專於補腎。則未學之謬見。非古人製方真意也。

配合應用 ①水腫。晝則夜平者。陽水也。澤瀉同猪苓。白茯苓。人參。白朮。白芍藥。赤小豆。桑白皮。橘皮治之多服必愈。夜則晝平者。陰水也。同車前子。赤茯苓。生地黃。白芍藥。赤小豆。桑根白皮。木瓜石斛。慈苡仁治之多服必愈。

②治一切溼熱。澤瀉入五苓散。四苓散。

③治陰虛病有溼熱者。澤瀉入六味地黃丸。

④治一切停飲。停水。澤瀉同人參。白朮。半夏。茯苓。橘皮。紫蘇。豬苓。爲治飲之要藥。

⑤仲景治心下支飲。澤瀉五兩。尤二兩。水二升。煎取半升。分溫再服。

⑥素問身熱解。汗出如浴。惡風。少氣。名曰酒風。服之以澤瀉。尤各十分。麋衡五分。合以二指撮。食後服之。

⑦治飲證病甚欲眩者。用澤瀉

五兩。炒尤二兩。水三升。煮濃服。必效。

⑧仲景治水善渴。煩。小便不利。或吐或瀉。五苓散主之。

⑨治水溼腫脹。白朮。澤瀉各一兩。爲末。或爲丸。每服三錢。茯苓湯下。(保命集方)

⑩治胃氣亂。小便不利。頭暈。引飲。三白散。用澤瀉。白朮。白茯苓。各三錢。水一盞。薑五片。燈心十莖。煎八分溫服。

⑪治腎臟風。澤瀉。皂莢。水炙。焙研煉蜜丸。如梧子大。空心溫酒下十五丸。至二十丸。(經驗方)

⑫治癰後怪症。口鼻中氣出。盤旋不散。凝如黑蓋色。過十日漸至肩肉肉相連。堅勝金石。無由飲食。煎澤瀉湯。日飲三盞。連服五日愈。(夏子益奇疾方)

用量 二錢至四錢。

應用宜忌 肝腎虛而無溼熱者。禁用。畏海蛤。文蛤。忌錢。

參攷資料 ①素問治酒風。身熱汗出。用澤瀉。尤。深師方。治支飲。亦用澤瀉。尤。但煮法小別耳。張仲景治雜病。心下有支飲。苦冒有澤

瀉湯。治傷寒有大小澤瀉湯。五苓散。皆用澤瀉。行利停水。爲最要藥。(蘇頌) ②澤瀉乃除溼之聖藥。入腎經。治小便淋瀝。去陰間汗。無此疾服之。令人目盲。(張元素) ③澤瀉之功。長於行水。張仲景治水善渴。煩。小便不利。或吐或瀉。五苓散主之。方用澤瀉。故知其長於行水。本草引扁鵲云。多服病人眼。誠爲行去其水也。凡服澤瀉。散人未有不小便多者。小便既多。腎氣將得復實。今人止洩精。多不敢用之。仲景八味丸用之者。亦不過引接桂附等歸就腎經。別無他意。(寇宗奭) ④本經云。久服明目。扁鵲云。多服昏目。何也。易老云。去浮中留垢。以其味鹹。能瀉伏水故也。瀉伏水去留垢。故明目。小便利。腎氣虛。故昏目。(王好古) ⑤寇宗奭之說。王好古之竊謂八味丸以地黃爲君。餘藥佐之。非止補血。兼補氣也。所謂陽旺則能生陰血也。地黃。山藥。萸。茯苓。牡丹皮。皆腎經之藥。附子。官桂。乃右腎命門之藥。皆不待澤瀉之接引而後至也。則八味丸之用此。蓋取其瀉腎邪。養五

故精搖而洩。病在脾胃。溼熱盡則洩精自止矣。止消渴者。單指溼熱侵脾。脾爲邪所干。則不能致津液也。繼之其性利水除溼。則因溼熱所生之病。雖不除矣。【明】黃宮繡本草求真論澤瀉曰。澤瀉甘淡微寒。能入膀胱氣分。以瀉腎經火邪。功利水除溼。故五苓散用此以除溼熱。八味丸用此以瀉腎經之火。俾其補不偏勝。則補始無礙耳。豈曰澤瀉補陰。功同於地黃之列哉。第其溼熱不除。則病症莫測。故有消渴嘔吐痰飲腫脹脚氣陰汗尿血洩精種種等症。用此甘淡微鹹。以爲滲泄。則濁氣既降。而清氣上行。所謂一除而百病與之俱除也。但小便過利。則腎水愈虛。而目必昏。此一定之理耳。鹽水炒。或酒拌。忌鐵。【清】葉天士本草經解論澤瀉曰。澤瀉氣寒。甘味無毒。其主風寒溼痺者。風寒溼三者合而成痺。痺則血閉。而肌肉麻木也。澤瀉味甘益脾。脾溼去。則血行而肌肉活。痺症寢矣。其主乳難者。脾統血。血不化乳。所以難也。味甘益脾。脾溼行。則血運而乳通也。其主養五

臟益氣力肥健者。蓋五臟藏陰者也。而脾爲之原。脾主肌肉而性惡溼。澤瀉瀉溼。溼去則脾健。脾乃後天之本。所以肌肉長而氣力益。陰氣充而五臟得所養也。其消水者。入膀胱氣寒下洩也。久服耳目聰明不飢。延年輕身者。腎與膀胱爲表裏。膀胱水道通。則腎之精道固。精足則氣充。腎開竅於耳。所以耳聰水之精爲目瞳子。所以明目。腎者胃之關。關門固。所以不饑。腎氣納所以延年輕身也。其言面生光。能行水上者。脾爲溼土。溼則重。燥則輕。輕則能行水上。脾統血。血充則面有光彩也。蓋表其有利水固腎之功。燥溼健脾之效也。【清】徐洄溪本草經百種錄論澤瀉曰。澤瀉乃通利脾胃之藥。以其淡滲。能利土中之水。水去則土燥而氣充。脾惡溼。故也。但溼氣必自膀胱而出。澤瀉能下達膀胱。故又爲膀胱之藥。【清】黃元御玉楸藥解論澤瀉曰。澤瀉味鹹微寒。燥土泄溼。利水通淋。除飲家之眩冒。療經病之燥渴。氣鼓水脹。皆靈。膈噎反胃。俱效。【清】吳儀洛本草從新論澤瀉

曰。澤瀉甘鹹微寒。入膀胱。利小便。瀉腎經之火邪。功尚利溼行水。治消渴痰飲。嘔噎瀉痢。腫脹水痞。脚氣痼痛。淋瀝陰汗。尿血洩精。一切溼熱之病。溼熱既除。則清氣上行。又能止頭旋。有聰耳明目之功。

近人學說 賈九如曰。澤瀉色白微苦入肺。味鹹以利膀胱。凡屬瀉病。小水必短數。以此清潤肺氣。通調水道。下輸膀胱。主治水瀉。溼瀉。使大便得實。則脾氣自健也。因能利水道。令邪水去。則真水得養。故消渴能止。又能除溼熱。通淋瀝。分消痞滿。透三焦蓄熱停水。此爲利水第一良品。金爲腎水之母。故云水出高源。此能引肺氣從上順下。如雨露之膏澤。故名澤瀉。所以六味丸中。同茯苓山藥補肺金。導引於上源。降下而生腎水。用療精泄。退陰汗。去虛煩。又有熟地山茱丹皮補肝木。以生心火。上下相生。陰陽交互。取易理地天泰水火濟之義。如斯玄妙。非達造化之微者。孰能制此良方。昧者誤爲泄腎減之。若小便不通。而口渴者。熱在上焦。氣分宜用澤瀉。茯苓以清肺

氣。滋水之上源也。如口不渴者。熱在下焦血分。則用知母黃柏以瀉膀胱。滋水之下源也。須分別而用。【張山雷曰】澤瀉產於水中。氣味淡泊。而體質又輕。故最善滲泄水道。專能通行小便。本經氣味雖曰甘寒。兼以其生長水澤。因謂之寒。其實輕淡無味。甘於何有。此藥功用。惟在淡則能通。本經稱其治風寒溼痺。亦以輕能入絡。淡能導溼耳。云治風寒。殊非其任。其能治乳難者。當以煖後無乳者言。此能通絡滲泄。則可下乳汁。非產乳百病之通用品。故別錄亦言葉主乳汁不出。若曰養五臟益氣力肥健。則以溼邪不答。而痺運自健。斯有養臟益氣之效。蓋已屬充分太過之辭。壽頤案本經此藥主治太燂浮泛。殊無精當之義。恐已屬漢魏間數淺之說。頗與本經辭旨不類。故原文更有久服耳目聰明不饑延年輕身。面生光。能行水上云云。豈獨非藥理之真。抑亦怪誕太甚。離本經諸藥。間亦有輕身延年等溢分之語。然從無如能行水上之荒唐者。其爲方士臆雜。不問可知。瀨

【澤藜】①即小藜之古籍別名。典見王禎農書。詳「小藜」條。②即藜之生於澤畔者。典見和漢藥考。詳「山藜」條。

【澤麥】即水麥之古籍別名。典見綱目。詳「水麥」條。

【澤瀉】**命名** 去水曰瀉。如澤水之瀉也。故名澤瀉。又夏禹治水。故又名禹孫。

處方用名 福澤瀉。澤瀉炭。

古籍別名 水瀉。鵲瀉。(本經)及瀉。芒芋。(別錄)瀉。禹孫。禹瀉。澤芝。蘭江。牛耳菜。酸慈俞。(和漢藥考)如意菜。(綱目)

外國名詞 Alisma. Planta-go. (拉丁) Waterplantain.

基本 屬澤瀉科。藥用係取水瀉之根。

產地 陳仁山藥物生產辨云。澤瀉產福建省建寧府爲上。其次江西省。四川省均有出。但甜味以四川爲濃厚。市上所用者。以福建爲多。

形態 水澤瀉爲生於水澤池沼之宿根草。葉叢生。作匙形。似車

前葉而大。有葉柄。夏末抽花莖。高三四尺。每節分三枝。每枝復三分。開三瓣白色小花。後結球形圓形瘦果。爲黃色球圓形。根大四五分至寸許。有根鬚。味鹹。生根汁峻烈。

採取 九月採根曬乾。

製法 雷斅曰。不計多少。細到酒浸一宿。取出曬乾。任用。

用法 與他藥水煎。或到糊作丸散。

性質 甘。寒。無毒。

效能 利溼熱。治瀉痢。消腫。通淋。用作利尿及治水腫中壅藥。

主治 風寒溼痺。乳難。養五臟。益氣力。肥健消水。久服耳目聰明。不饑延年。輕身面生光。能行水上。(本經)補虛損。五臟痞滿。起陰氣。止洩精。消渴。淋瀝。逐膀胱三焦停水。(別錄)

張仲景之發明 澤瀉一味。經張仲景之實驗。認爲主治小便不利。胃脘旁治渴。茲考徵如下。①澤瀉湯證曰。心下有支飲。其人苦冒眩。②五苓散證曰。小便不利。微熱消渴。(以上二方以澤瀉爲君藥。澤瀉湯澤瀉五兩。五苓散一兩六

銖半) ③茯苓澤瀉湯證曰。吐而渴。欲飲水。(以上一方。澤瀉四兩) ④八味丸證曰。小便不利。又曰。消渴。小便反多。(以上一方。澤瀉三兩) ⑤猪苓湯證曰。渴欲飲水。小便不利。(以上一方。澤瀉一兩) ⑥牡蠣澤瀉散證曰。從腰以下有水氣。(以上一方。用澤瀉與餘藥等分。茯苓澤瀉湯以下四方。以澤瀉爲佐藥也) 歷觀上諸方。澤瀉所主治。也不辨而明矣。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論澤瀉曰。主腎虛。精自出。治五淋。宣通水道。【宋】大明日華諸家本草論澤瀉曰。主頭眩耳鳴。筋骨攣痛。通小腸。止尿血。主難產。補女人血海。令人有子。【金】張元素珍珠養論澤瀉曰。入腎經。去舊水。養新水。利小便。消腫脹。滲洩止渴。【元】李東垣用藥法象論澤瀉曰。去胛中留垢。心下水痞。【明】李時珍本草綱目論澤瀉曰。滲溼熱行。痰飲止。嘔吐。瀉痢。疝痛。脚氣。【明】李士材本草圖解論澤瀉曰。澤瀉甘鹹微寒。腎與膀胱藥也。利水道。通小便。補虛積。理脚氣。按本

經云。久服明目。而扁鵲云。多服病眼。何相反耶。蓋水道利。則邪火不于空竅。故云。明目。水道過於利。則腎氣虛。故云。病眼。又別錄稱其止遺泄。而寇氏謂泄精者。不敢用。抑何相刺謬也。蓋相火妄動。而遺泄者。得澤瀉清之。而精自藏矣。氣虛下陷。而精滑者。得澤瀉降之。而精愈滑矣。况滑竅之劑。腎虛失閉。藏之職者。亦宜禁也。夫一藥也。一症也。而或禁。或取。變化殊途。自非博洽而神明者。未免對卷而疑。臨症而眩。若格於理者。變變化化。而不離乎宗。故曰。醫不執方。合宜而用。斯言至矣。【明】繆希雍本草經疏論澤瀉曰。澤瀉味甘寒。別錄益之。以鹹。腎與膀胱爲表裏。鹹能入腎。甘能入脾。寒能去熱。蓋淡滲利。致之藥也。其曰主風寒溼痺。乳難。消水。養五臟。皆以利水燥溼。則脾得所養。脾得所養。則五臟皆得所養。益氣力。肥健者。皆水利則溼去。溼去。則脾強之功效也。又云。主腹痞滿。淋瀝。逐膀胱三焦停水。其能利水祛溼。益無疑矣。洩精者。溼熱下流。客腎與膀胱。是民火扇君火也。

作水腫藥。及祛痰藥。

主治 皮膚熱。大腹水氣。四肢面目浮腫。丈夫陰氣不足。(本經)利大小腸。明目輕身。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新

修本草論澤漆曰。主蠱毒。【宋】大明日華諸家本草論澤漆曰。止癰疾。消痰。【清】鄒樹本經疏證論澤漆曰。歷考澤漆治水。非不暫與防

己大黃。澤漆甘遂。雖相合成方而決瀉瀉實。然終共人澤。白朮。茯苓。桂心。慈苳等。治因虛成水者居多。如千金與鯉魚人澤。甘草。生薑。赤小豆。茯苓。麥冬。冬同用。治或從消渴。或從黃疸。致內虛不足。營衛不通。血氣不化。氣實皮膚中。偏身洪腫。四肢無堪。喘息不安。腹中嚮嚮。脹滿。眼不得視。崔氏與白朮。生薑。橘皮。桑根。白皮。元澤。郁李。杏仁。杏仁同用。治水腫盛。滿氣急喘咳。小便瀉。如血。古今錄驗與鯉魚人澤。甘草。茯苓。麥冬。冬同用。治水在五臟。令人咳嗽。上氣。腫大嚮嚮。兩足腫。目下臥。顴胸滿。隱痛。吸吸寒熱。小便數少。甚至古今錄驗與鯉魚人澤。甘草。茯苓。澤瀉。杏仁同用。治緣

三焦決瀉。精液不通。水氣都行。致通身手足面目浮腫。食飲減少。且云年八十。病大困者。服此亦差。可見澤漆所治之大腹水氣。四肢面目浮腫。必兼喘咳。上氣。小便不利者。澤漆誠行水中返顧根本之劑也。

配合應用 ①治心下伏。大如盃。不得食。澤漆四兩。大黃。葶藶。紫兩。搗篩。蜜丸。梧子大。每服二

丸。日三服。(肘後方)

②治十種水氣。澤漆十斤。夏月取嫩莖葉。入水一斗。研汁。約二斗。於銀鍋內。慢火熬如稀餡。入瓶內。收。每日空心溫酒調下一匙。以愈為度。(聖惠方)

③治水氣癰病。生鮮貓眼睛草。曬乾。為末。棗肉丸。彈子大。每服二丸。白湯下。日二服。覺腹中暖。小便利。為度。(乾坤秘韞方)

④治脚氣赤腫。行步脚痛。貓兒眼睛草。鷺鷥藤。蜂窠等分。每服一兩水五碗。煎三碗。薰洗之。(易簡方)

⑤治牙齒疼痛。貓兒眼睛草一掬。研爛。湯泡取汁。含漱吐涎。(易簡方)

簡方

①治男婦瘰癧。貓兒眼睛草一。二捆。井水二桶。五月五日午時。鍋內熬至一桶。去滓澄清。再熬至一碗。瓶收。每以椒葱。槐枝。煎湯洗瘡。淨。乃擦此膏數次。愈。(便民圖彙方)

②治癰瘡有蟲。貓兒眼睛草。曬乾。為末。香油調塗之。(易簡方)

用量 錢半至三錢

施用宜忌 惡薯蕷。小豆。為之使。

著名方劑 澤漆湯。治咳而脈沉者。此湯主之。(金匱)半夏半升。紫參(一作紫苑)五兩。澤漆三斤。(以東流水煮取一斗五升)生薑。前胡各五兩。甘草。黃芩。人參。桂枝。各三兩。上九味。咀。納澤漆汁中。煮五升。溫服五合。至夜盡。

參攷資料 ①澤漆利水。功類

大戟。故人見其莖有白汁。遂誤以為大戟。然大戟根皆有毒。而苗皆有毒。洩人。而澤漆根硬。不可用。苗亦無毒。可作菜食。而利丈夫陰氣。盛不相侔也。(李時珍) ②澤漆。大戟苗也。生太山川澤。三月三日七

月七日。採莖葉陰乾。(別錄) ③此即大戟花。川澤中有莖。極小花黃色。葉似嫩桑。五月採之。(大明) ④今冀州。鼎州。明州。及近道皆有之。(蘇頌) ⑤別錄。陶氏皆言澤漆是大戟苗。日華子又言是大戟花。其苗可食。然大戟苗能洩人。不可為菜。今考土宿本草及寶藏論諸書。並云澤漆是貓兒眼睛草。一名綠葉綠花。一名五鳳草。江湖原澤平陸多有之。春生苗。一科分枝。成叢。柔莖如馬齒莧。綠葉如苜蓿。葉圓而黃綠。頗似貓睛。故名貓兒眼。莖頭凡五葉。中分。中抽小莖五枝。每枝開細花。青綠色。復有小葉承之。齊整如一。故又名五鳳草。綠葉綠花。草稻莖有白汁黏人。其根白色。有硬骨。或以此為大戟苗者。誤也。五月採汁。煮雄黃。伏鐘乳。結草砂。據此。則澤漆是貓兒眼睛草。非大戟苗也。今方家用治水。蠱脚氣有效。尤與神農本草相合。自漢人集別錄。誤以為大戟苗。故諸家錄之。爾用者宜審。(李時珍)

【澤漆葉】即澤漆之處方用名。詳『澤漆』條。

家本草論橡斗殼曰止腸風崩中帶下冷熱瀉痢并染鬚髮

【橡木皮根皮】 性質 苦平無毒

主治 惡瘡因風犯露致腫者煎汁日洗令膿血盡乃止亦治痢

歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草論橡木皮及根皮曰止水痢消瘰癧

【橡實】 原命 櫟。古籍別名 橡斗。皂斗。

（說文）櫟枝杵子栲（綱目）芋

外國名詞 Quercus serrata, Thunb. (拉丁) クヌギ (日本)

基本 係殼斗科櫟屬。橡樹之子實

產地 山谷原野多有之。形態 橡為落葉喬木高數丈樹皮灰褐色粗而厚縱裂甚深葉與栗相似披針形嫩枝之葉倒卵形有尖端緣邊有鋸齒新葉表裏皆有白毛老葉無之初夏新葉間生花單性雌雄同株穗狀花序雄者常下垂結實為堅果小而圓大如拇指頭在碗狀之殼斗內其

殼內之子實可供藥用。

採取 於霜後採之。

製法 雷斅曰凡使去殼蒸之從已至未到作五斤日乾周意王曰取子換水浸十五次淘去澀味蒸極熟食之可以濟飢

性質 苦微溫無毒。主治 下痢厚腸胃肥健人。

歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草論橡實子曰瀝腸止瀉養食止飢禦寒

參攷資料 橡子非果非穀而最益人服食未斷穀啖之尤佳無氣而受氣無味而受味消食止痢令人強健不飢（孫思邈）

木實為果。橡蓋果也。歡歲人皆取以充飢昔攀虞入南山飢甚拾橡實而食唐杜甫客棗州採橡栗自給是矣（李時珍）

【橫行介士】即蟹之古籍別名。典見蟹譜。詳「蟹」條。

【橫唐】即莢荳子之古籍別名。典見本經。詳「莢荳子」條。

【榲木】即榲木之古籍別名。詳「榲木」條。

【搗】即搗之古籍別名。典見左傳。

詳「檮梔白皮」條。

【欽朮】即白朮之一種。產安徽歙縣之黃山脈中者其根白而瘦小功用較尋常白朮良。詳「白朮」條。

【欽墨】墨之一種。產於安徽歙縣者詳「墨」條。

【澤小車】即狗舌草之日本名。詳「狗舌草」條。

【澤半支】 形態 澤半支為山草類之一種。葉如鼠牙半支。生山潤處葉皆對節夏開黃花如瓦松。

主治 蛇咬。疔腫。

【澤乳】即磐石之古籍別名。典見吳普本草。詳「磐石」條。

【澤姑】即瓜蒌仁之古籍別名。典見別錄。詳「瓜蒌仁」條。

【澤芝】即澤瀉之古籍別名。典見和漢藥考。詳「澤瀉」條。

【澤肉】即蓮肉之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蓮肉」條。

別錄。詳「敗醬」條。

【澤莖】即大戟之古籍別名。典見和漢藥考。詳「大戟」條。

【澤漆】 原名 大戟苗。命名 本品生時摘葉有白汁如漆故名。

處方用名 澤漆葉。古籍別名 漆莖（本經）貓兒眼睛草綠葉綠花草五鳳草（綱目）奶奶草五苦頭燈臺草（俗名）

基本 屬大戟科。為澤漆之莖。

產地 凡山谷川澤間恒多生焉。

形態 澤漆為有毒草本植物。路旁溼地。往往自生莖高尺許有白汁葉互生作倒卵圓形類馬齒莖五月間於莖端對生五葉分五枝開淡綠色四瓣小花狀類燭臺故俗呼為燈臺草。

採取 三月七月間採莖葉陰乾。

用法 水煎或到末用。

性質 苦微寒無毒。效能 通便利水消腫逐痰用。

十六薑 橙 檳 櫟

【橙皮】 命名 按陸佃埤雅云。橙柚屬也可登而成之。故字從登。又諧聲也(李時珍)

古籍別名 金毯皮 鵝殼皮。(和漢藥考)

外國名詞 Cortex aurantii

Fructus (拉丁) Orange peel.

(英) Pomarzenschale. (德)

基本 爲芸香科柑屬橙之果皮。

產地 凡江浙、閩、廣諸省及印度、西班牙、法國均有出。

形態 橙爲適於暖地之常綠樹。高丈餘。嫩樹有刺。老樹則無。葉互生。似革質。作尖卵圓形。有半透明小斑點。其柄具有翼葉。初夏開白色五瓣花。果實爲球形。上下稍扁。表面滑澤。熟則呈黃赤色。入藥係將成熟橙實之外皮。縱斷剝下。使之乾燥。者外面呈黃褐色。有皺紋。凹陷小點。生有油胞。內部爲肉。氣味芳香而苦。

採取 八月採皮日乾。

用法 水煎或浸酒用。

性質 苦辛溫無毒。

成分 含有發揮油及苦味越

幾斯等。

效能 專用作健胃藥。及胃弛緩症。急性胃加答兒。急性腸加答兒。

作用 刺激胃黏膜。使分泌增多。運動加速而一部分之 H₂O peridin 由微血管而達中樞神經。使大腦被激而興奮。全身血液流動因是而增進。

主治 作醬醋。香美。散腸胃惡氣。消食下氣。去胃中浮風氣。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論橙皮曰和鹽貯食。止惡心解酒病。【明】李時珍本草綱目論橙皮曰糖作橙丁甘美消痰下氣利膈寬中解酒。

配合應用 治痔瘡腫痛。隔年風乾橙子桶內燒煙薰之神效。

(摘要方)

●香橙湯 寬中快氣。消酒。用橙皮二斤。切片。生薑五兩。切焙。搗爛。入炙甘草末一兩。檀香末半兩。和作小餅。每嚼一餅。沸湯入鹽送下。(奇效良方)

用量 一錢至錢半。

應用宜忌 胃液溢反南星。

參攷資料 ●橙餅主治消頑痰降氣。和中開胃。寬膈健脾。解魚蟹毒。醒酒者氣虛癱瘓者勿服。其製法擇牛黃無傷損。橙子大青者。性硬難酥。將小刀切成穢入淨水。浸去酸澀水一二天。每日須換水。待軟取起。擠去核。再浸一二天。取起。將粹腳插入。每縫。燭碎內。飄然後入鍋。用清水煮之。勿令焦。約有七八分爛。取出。拌上潔白洋糖。須乘熱即拌。即日曬之。待糖吃進。再摻再曬。令糖吃足。將乾糖再塞入橙肚內。略壓扁之。入瓶貯用。亦可點湯服。(書錄方)

●橙樹似橘而葉大。形圓大於橘。而香皮厚而皺。八月熟。(馬志)

●橙產南土。其實似柚而香。葉有兩刻缺。如兩段。亦有一種氣臭者。柚乃柑屬之大者。早黃難留。橙乃橘屬之大者。晚熟耐久。皆有大小二種。按事類合璧云。橙樹高不甚類橘。亦有刺。其實大者如盤。頗似朱欒。經霜早熟。色黃皮厚。盛吸如沸。香氣馥郁。其皮可以薰衣。可以茗鮮。可以和和菹醃。可以爲醬。可以蜜煎。可以糖製。爲橙丁。可以蜜製。爲橙膏。嗅之則

香。食之則美。誠佳果也。(李時珍)

●橙皮今比以爲果。或合湯待賓。未見入藥。宿酒未解者食之速醒。(寇宗奭)

●第三版改正日本藥局方曰橙皮係將成熟橙實之外皮剝離。而切斷乾燥者。本品外面呈褐色。現粗糙凹點。內面類於白色。氣味芳香而甚苦。用時浸冷水十五分鐘。待其軟化。取出。去其水分。復將軟化海綿狀組織除去。乾燥用之。(和漢藥考)

●第四版改正日本藥局方曰橙皮應去內皮用之。(和漢藥考)

●橙皮酸寒無毒。降氣消積。殺疳積蟲。(和漢藥考)

【擇木】即樸木之古籍別名。典見綱目詳【樸木】條。

【樸斗】即樸實之古籍別名。典見說文。詳【樸實】條。

【橡斗殼】製法 大明曰。入藥並宜搗細炒焦。或燒存性研用。

性質 溫。溫無毒。

主治 爲散及煮汁服。止下痢。并可染皂。

時出黃水。或癰腫潰爛。(濟生方) 橘核、炒、海藻昆布海帶(各泡) 川棟肉(炒)桃仁(麸炒)各一兩 厚朴木通枳實(麸炒)延胡索(炒)桂心木香各一兩上為細末 酒丸桐子大每服七十丸酒下或 鹽湯下

參攷資料 橘核入足厥陰。與

青皮同功。故治腰痛瘡疔在下之 病。不獨取象於核也。和劑局方治 諸疔痛及內卵瘡腫偏墜。或硬如 石或腫至潰。有橘核丸用之有效 品味頗多。詳見本方。(李時珍)

【橘絡】 原命 橘蠟上筋膜。 古籍別名 橘蠟上絲。

(綱目拾遺) 主治 白濁吐酒。炒熟煎湯飲 甚效。

歷代記述攷證 【清】張隱庵 本草崇原論橘絡曰。能行胸中之 飲。而行於皮膚。故又能疏達絡氣。

【清】趙學敏本草綱目拾遺論橘 絡曰。通經絡滯氣。治衛氣逆於肺 之脈。脹。脇皮裏膜外積痰。活血 辨偽 鄭肖巖曰。橘絡即橘

蠟上筋膜。日華子謂口渴吐酒煎

湯飲之甚效。貨缺之時。開價值甚 昂。射利之徒。用白萊膜細切如絲。

晒乾。以橘皮煎濃汁浸潤。再曬。偽 充。橘絡色香。幾無以辨。巧則巧矣。 如斷喪天良。何。曹炳章曰。按金

御乘云。橘絡能宣通經絡滯氣。予 屢用以治衝氣逆於肺之脈脹。甚 有效。趙超軒云。通經絡氣滯脈脹。

驅皮裏膜外積痰。活血此其效用 之實驗也。其種甚多。如出廣東者 名廣橘絡。色白條細。帶少。出浙江

衢州者名衢橘絡。色白絡細長。皆 佳。出四川者色白黃。絡粗略次。出 台州者名台橘絡。絡細少帶蒂。為 最次。

【橘葉】 形態 橘葉與柑葉同。 均為長卵形。

性質 苦平無毒。 主治 導胸膈逆氣。入厥陰。行 肝氣。消腫散毒。乳癰脇痛。用之行 經。

歷代記述攷證 【明】繆希雍 本草經疏論橘葉曰。橘葉能散陽 明厥陰經滯氣。婦人妬乳。內外吹 乳。嚴乳。難用之。皆效。以諸證皆二 經所生之病也。

【橘實】即橘子之原名。詳『橘子』 條。

【橘餅】 命名 本品係以大福 餅。入蜜糖釀製而乾之 餅。故名。

古籍別名 出閩中漳泉者。名 麥芽橘餅。(綱目拾遺)

形態 橘餅。圓徑四五寸。面有 白霜。肉厚味重。以閩產者為第一。 其出浙省者。乃衢橘所作。圓徑不 及三寸。且皮色黯黑。而肉薄味亦 苦劣。又出杭屬之塘棲者。味勝。俱 可供食與藥用。

性質 甘溫無毒。 主治 下氣寬中。消痰。運食。黃 疸。膨脹。除膈。止消。

配合應用 治諸色痢。用橘 餅一兩。圓眼肉五錢。冰糖五錢。水 二碗。煎一碗。露一宿。溫服。不露亦 可。至重者。不過二三服。無不神驗。 (行錢檢秘方)

治瀉。夏月。喫瓜果太多。以致 洩瀉。不休息。漳州好橘餅一枚。細 切薄片。分作二次。放茶鍾內。沖服 (梁氏集驗方)

橘餅湯。治傷食生冷瓜果。泄

瀉不休。橘餅一個。切薄片。放碗內。 以沸湯澆蓋住。泡汁出。即餘湯連 餅食。一餅可作數次服。(經驗廣 集方)

百菓酒。香。佛手各二個。核 桃肉。圓眼肉。蓮肉。橘餅各半。筋。柏 子仁。四兩。松子三兩。紅棗二十兩。 黑糖三觔。燒酒五十觔。浸此酒。補 虛益腎。(李太守秘方)

橘蠟上筋膜。即橘絡之原名。詳 『橘絡』條。

【橘蠟上絲】即橘絡之古籍別名。 典見綱目拾遺。詳『橘絡』條。

【橙子肉】 性質 酸寒無毒。 主治 洗去酸汁。切 和鹽。蜜煎成。貯食。止惡心。能去胃 中浮風惡氣。

歷代記述攷證 【唐】陳士良 食性本草論橙肉曰。行風氣。療瘧 氣。發瘧。殺魚蟹毒。

參攷資料 橙多食傷肝氣。 發虛熱。與瘧肉同食。發頭旋。惡心 (陳士良) 撰。乃水類之屬也。諸 家本草。皆作檳榔。誤矣。(李時珍)

【橙子核】 主治 面黧粉刺。經 研。夜夜塗之。

皮最厚而虛紋更粗色黃內多膜無筋其味甘多辛少但以此別之則不差矣橘皮性溫柑橘皮性冷不可不知今天下多以廣中來者爲勝江西者次之然亦多以柑皮雜之柑皮猶可用橘皮則懸絕矣(李時珍)橘皮味辛氣溫能耗散真氣中氣虛氣不歸元者忌與耗氣藥同用胃虛有火嘔吐不宜與溫熱香燥藥同用陰虛咳嗽生痰不宜與半夏南星等同用瘧非寒甚者亦勿施(繆希雍)橘從喬音譌諧聲也又雲五色爲慶二色爲喬喬雲外赤內黃非烟非霧郁郁紛紛之象橘實外赤內黃剖之香粉紛郁有似乎喬雲橘之從喬又取此意也(李時珍)橘之皮厚味甘不似橘皮味辛苦其肉亦如橘有甘有酸酸者名柑柑今俗謂橙爲橘非矣按郭璞云橘似橙而實酢大於橘孔安國云小曰橘大曰柚皆爲柑也(蘇恭)橘柚今江浙荆襄湖嶺皆有之木高一二丈與枳無辨刺出莖間夏初生白花六七月成實至冬黃熟舊說小爲橘大爲柚今醫家乃用黃

橘青橘不言柚豈青橘是柚之類乎(蘇頌)橘柚自是兩種本草云一名橘皮後人誤加柚字妄生分別且青橘黃橘治療尙殊況柚爲別種乎惟郭璞所言乃真識橘柚者若不如此分別誤以柚皮爲橘皮是貽無窮之患矣(寇宗奭)橘柚蘇恭所說甚是蘇頌不知青橘即橘之未黃者乃以爲橘誤矣夫橘柚柑三者相類而不同橘實小其瓣味微酢其皮薄而紅味辛而苦柑大於橘其瓣味甘其皮稍厚而黃味辛而甘柚大小皆如橙其瓣味酢其皮最厚而黃味甘而不甚辛如此分之即不誤矣按事類合璧云橘樹高丈許枝多生刺其葉兩頭尖綠色光面大寸餘長二寸許四月著小白花甚香結實至冬黃熟大者如盃包中有瓣瓣中有核宋翰直著橘譜三卷甚詳其略云柑橘出蘇州台州西出荊州南出閩廣撫州皆不如溫州者爲上也柑品有八橘品十有四多是接成惟種成者氣味尤勝黃橘扁小而多香露乃橘之上品也朱橘小而色赤如火綠橘紺碧

不待霜後色味已佳隆冬採之生意如新乳橘狀似乳柑皮堅瀟多味絕酸芳壩橘狀大而扁外緣心紅瓣巨多液經春乃甘美包橘外潭內盈其脈瓣隔皮可數綿橘微小極饒美可愛而不多結沙橘細小甘美油橘皮似油節中堅外黑乃橘之下品也早黃橘秋半已丹凍橘八月開花冬結春採穿心橘實大皮光而心虛可穿荔枝橘出橫陽理緻密如荔枝也俗傳橘下埋鼠則結實加倍故物類相感志云橘見尸而實繁涅槃經云如橘見鼠其果實多周禮言橘路之而自變爲枳地氣然也餘見柑下(李時珍)

橘紅 基本 即橘皮之去白者

性質 苦辛溫無毒

橘苓 形態 橘苓生橘樹上形如木薑色紅如棗供藥用

主治 乳癰煎酒服

橘核 製法 李時珍曰凡用須以新瓦焙香去壳取

仁研碎入藥

性質 苦平無毒

主治 腎疰腰痛膀胱氣痛腎冷炒研每溫酒服一錢或酒煎服之

歷代記述攷證 【宋】寇宗奭本草衍義論橘核曰治酒癰風鼻赤炒研每服一錢胡桃肉一箇搗酒服以知爲度【明】李時珍本草綱目論橘核曰小腸疝氣及陰核腫痛炒研五錢老酒煎服或酒糊丸服甚效【明】繆希雍本草經疏論橘核曰橘核出日華子其味苦溫而下氣所以能入腎與膀胱除因寒所生之病也疝氣方中多用之【清】楊時泰本草述鈞元論橘核曰橘必成熟之實乃有核青橘稟金令之初氣取其極小者入藥不得有核然則核之性味不可謂其止入肝經日華子故有腎疰腰痛膀胱氣痛之治後人用治癰疝者緣疝固肝病亦因腎與膀胱之氣化鬱以病乎肝也

著名方劑 橘核丸治四種疝疝卵核腫脹偏有大小或堅硬如石痛引臍腹其則腐爛腫脹成瘡

●化食消痰。胸中熱氣。用橘皮半兩。微熬爲末。水煎代茶細細呷。(心鏡方)

●治下焦冷氣。乾陳橘皮一斤爲末。蜜丸。梧子大。每食前溫酒下三十丸。(食療方)

●治途中心痛。食魚蟹毒。橘皮並湯飲之甚良。(談藝翁方)

●治風痺麻木。凡手及十指麻木。大風麻木。皆是溼痰死血。用橘紅一斤。逆流水五碗。煮爛去渣。再煮至一盃。頓服。取吐。乃吐痰聖藥。也不吐。加瓜蒂末。(摘玄方)

●治小兒疳瘦。用陳橘皮一兩。黃連以米泔水浸一日。一兩半。研末入麝三分。用豬膽盛藥。以漿水煮熟。取出。用粟米飯和丸。綠豆大。每服一二十丸。米飲下。(錢氏小兒方)

●治產後尿閉不通者。陳皮一兩。去白爲末。每空心溫酒服二錢。一服即通。此張不愚方也。(婦人良方)

●治產後吹奶。陳皮一兩。甘草一錢。水煎服即散。

●治野耳出汁。陳皮燒研一錢。

十六畫 橘

麝香少許爲末。日搽。名立效散。

●治嵌甲作病。不能行履者。濃煎陳皮湯浸良久。甲肉自離。輕手剪去。以虎骨末傅之。即安。(醫林集要方)

●治魚骨鯁咽。橘皮常含。咽汁卽下。(聖惠方)

●寬中丸。治脾氣不和。冷氣客於中宮。壅遏不通。是爲脹滿。用橘皮四兩。白朮二兩。爲末。酒糊丸。梧子大。每食前木香湯下三十丸。日三服。(指迷方)

用量 一錢至二錢。

施用宜忌 凡無溼無滯。無痰者禁用。

著名方劑 ●二陳湯。治肥盛之人。溼痰爲患。喘嗽脹滿者。(局方) 陳皮(去白)二錢。製半夏。茯苓各三錢。甘草一錢。上四味。姜三片。水煎服。●潤下丸。治溼痰。因火上升。停滯胸膈。咳嗽稠黏。(丹溪方) 陳橘皮半斤。鹽五錢。甘草二兩。去皮蜜炙。上以橘皮入砂鍋內。與鹽化水淹過。煮乾。同甘草共研淨末。蒸餅和丸。梧子大。每服百丸。白湯下。

參攷資料 ●橘皮氣味濃厚。陽中之陰。也可升可降。爲脾肺二經氣分藥。留白則補脾胃。去白則理肺氣。同白朮則補脾胃。同甘草則補肺。獨用則瀉肺損脾。其體輕浮。一能導胸中塞邪。二能滯氣。三益脾胃。加青皮減半。用之去滯氣。推陳致新。但多用久服。能損元氣也。(李杲)

●橘皮能散能瀉。能溫能補。能化痰治嗽。順氣理中。調脾快腸。通五淋。療酒病。其功當在諸藥之上。(寧原) ●橘皮苦。能泄能燥。辛能散。溫能和。其治百病。總是取其理氣燥溼之功。同補藥則補。同瀉藥則瀉。同升藥則升。同降藥則降。脾乃元氣之母。肺乃攝氣之嚮。故橘皮爲二經氣分之藥。但隨所配而補瀉升降也。潔古張氏云。陳皮枳殼利其氣而痰自下。蓋此義也。同杏仁治大腸氣。同桃仁治大腸血。同青取其通義也。詳見杏仁下。按方句泊宅編云。橘皮寬腸降氣。消痰飲極有殊功。他藥貴新。惟此貴陳。外舅莫強中令。豐城時得疾。凡食已。輒胸滿不下。百方不效。偶家人合橘紅湯。因取嘗

之。似相宜。連日飲之。一日忽覺胸中有物墜下。大驚。目睜。自汗如雨。須臾腹痛。下數塊如鐵彈子。臭不可聞。自此胸次廓然。其疾頓愈。蓋脾之冷積也。其方用橘皮去穢一斤。甘草鹽花各四兩。水五碗。慢火煮乾。焙研爲末。白湯點服。名二賢散。治一切痰氣特驗。世醫徒知半夏南星之屬。何足以語此哉。珍按二賢散。丹溪濕之爲濁下丸。用治痰氣有效。惟氣實人服之相宜。氣不足者不宜用之也。(李時珍) ●橘皮療氣大勝。以東橘爲好。西江者不如。須陳久者爲良。(陶弘景) ●橘皮以色紅日久者爲佳。故曰紅皮。陳皮去白者。曰橘紅也。(王好古) ●本草橘。柚作一條。蓋傳誤也。後世不知。以柚皮爲橘皮。是貽無窮之患矣。此乃六陳之一。天下日用所須。今人又多以乳柑皮亂之。不可不擇也。柑皮不甚苦。橘皮極苦。至熟亦苦。或以皮之緊慢分別。又因方土不同。亦互有緊慢也。(慈宗疏) ●橘皮紋細而澤。色紅。內多筋脈。其味苦辛。柑皮紋粗而厚。色黃。內多白膜。其味辛甘。柚

二斤。河水浸一日。竹刀輕刮去渣。白貯竹篾內。沸湯淋三四次。用冷水洗淨。不苦爲度。曬之半乾。可得淨皮一斤。初次用甘草、烏梅肉各四兩。煎汁。并日曬夜露。俟酥捻碎如豆大。再用川貝母去心四兩。青鹽三兩。研爲細末。拌勻。再曬。候乾收貯。或名參貝陳皮。亦同此法。

近人學說

●張山雷曰。新會皮。橘皮也。以陳年者辛辣之氣稍和爲佳。故曰陳皮。市肆中有多種。以廣東化州產者爲最佳。有茸毛。故曰毛橘紅。亦曰化州橘紅。今有所謂賴家園橘紅者。則化州賴氏所植者也。其通用者則新會所產。故通稱曰新會皮。味和而辛。不甚烈。其福州及浙衢之產。味苦而氣亦濁。且辛辣更烈。鄉僻市廛中多用之。非佳品矣。留白者通稱陳皮。去白則曰橘紅。降氣和中。泄化痰飲。宜留白爲佳。若專作疏散用。取其氣勝。則宜橘紅。連白者用一錢。至一錢五。去白者不當過一錢。以上若刮下之白。無味無氣。實是廢材。今世俗上有以橘白作化痰降

氣用者。甚屬無謂。又凡用陳皮。無非取其芳香而味辛者。力能開泄疏通。今俗子且有蜜炙之例。以黏膩減其芬芳。尤爲可哂。

配合應用

●橘皮留白。補脾胃和中。去白。消痰理肺氣。同白。尤則補脾。同甘草則補肺。同補氣藥則益氣。同瀉氣藥則破氣。同消痰藥則能去痰。同消食藥則能化食。各從其類以爲用也。

●治三日瘧寒多。橘皮、人參、何首烏、桂枝、當歸、薑皮。

●治胃家有寒痰。或偶感寒氣。傷冷食嘔吐不止。用橘皮、白豆蔻、生薑、藿香、半夏。

●治脾胃虛。飲食不化。或不欲食。食亦無味。用橘皮、人參、白朮、白茯苓、甘草、山藥、白豆蔻、藿香、麥芽、山查、白蘿蔔。

●治上氣咳嗽。用橘皮、蘇子、貝母、枇杷葉、麥門冬、桑根白皮、沙參、栝樓根、五味子。百部能消痰下氣。

●治氣實。人暴氣壅脹。用橘皮、枳殼、烏藥、木香、草豆蔻、檳榔。

●治胸中脹滿。用橘皮、蒼朮、厚朴、甘草。爲平胃散。

●治脾胃濕痰。及寒痰痰飲。橘皮入二陳湯。

●橘皮湯。治男女傷寒。并一切雜病嘔噦。手足逆冷者。用橘皮四兩。生薑一兩。水二升。煎一升。徐徐呷之。即止。(仲景方)

●治霍亂吐瀉。但有一點胃氣存者。服之。卽生。廣陳皮去白五錢。真薑香五錢。水二盞。煎一盞。時時溫服。(百一選方)

●治脚氣衝心。或心下結硬。腹中虛冷。陳皮一斤。和杏仁五兩。去皮尖。熬少許。蜜搗和丸。如梧桐子大。每日食前米飲下三十九丸。(食療方)

●大腸悶塞。陳皮連白。酒煮。焙乾研末。每服二錢。米飲下。(普濟方)

●脾寒諸瘧。不拘老少。孕婦。只兩服。便止。真橘皮去白。切。生薑自然汁浸過一指。銀石器內重湯煮。焙乾研末。每服三錢。用隔年青州棗十箇。去核。水一盞。煎半盞。發前服。以策下之。(適用方)

●治婦人乳癰。未成者卽散。已成者卽潰。痛極者不痛。神驗不可

言。用真橘皮湯浸去白。曬乾。麴炒微黃。爲末。每服一錢。麴香調酒下。初發一服見效。(張氏方)

●治嘔雜吐水。真橘皮去白。爲末。五更安五分於掌心。紙之。卽睡。三日必效。皮不真則不驗。(怪症奇方)

●治反胃吐食。真橘皮以日照西壁土炒香。爲末。每服二錢。生薑三片。棗肉一枚。水二盞。煎一盞。溫服。(直指方)

●治卒然食噎。橘皮一兩。湯浸去鹽。焙爲末。以水一大盞。煎半盞。熱服。(食醫心鏡方)

●治諸氣呃噎。橘皮二兩。去鹽。水一升。煎五合。頓服。或加枳殼尤良。(孫尚藥方)

●治痰膈氣脹。陳皮三錢。水煎熱服。(簡便方)

●治卒然失聲。橘皮半兩。水煎徐呷。(肘後方)

●治經年氣嗽。橘皮、神麴、生薑焙乾。等分。爲末。煮餅和丸。梧子大。每服三五十丸。食後。夜臥各一服。有人患此服之。兼舊患膀胱氣皆愈也。(衍義方)

經。健脾開胃。下氣消痰。消穀進食。定嘔止瀉。能補能消。能散能降。調中理氣。功在諸藥之上。辛宜於肺。香利於脾。肺爲攝氣之嚮。脾爲元氣之母。陳皮理氣。故爲二經要藥。同補藥。卽補同瀉藥。卽瀉。同升藥。卽升。同降藥。卽降。故利用最弘。去白者。理肺氣。留白者。和胃氣。筋膜及蒂並去之。芳香之品。不見火則力全也。【明】繆希雍本草經疏論橘皮曰。橘皮味辛苦。氣溫無毒。其主胸中痰熱逆氣。氣衝胸中嘔咳者。以肺主氣。氣常則順。氣逆則逆。逆則熱聚於胸中。而成痰。痰者假也。如痞滿鬱悶之類也。辛能散苦能泄。溫能通行。則逆氣下。嘔咳止。胸中痰熱消矣。脾爲運動磨物之臟。氣滯則不能消化。水穀爲吐逆霍亂泄瀉等證。苦溫能燥脾家之溼。使滯氣運行。諸證自移矣。肺爲水之上源。源竭則下流不利。熱結膀胱。肺得所養。而津液貫輸。氣化運動。故膀胱留熱。停水五淋皆通也。去臭及寸白者。辛能散邪。苦能殺蟲也。通神輕身。長年者。利脾肺之極功也。【清】黃宮繡本草求真

論橘皮曰。橘皮味辛而溫。治雖喘主脾肺。調中快膈。導痰消滯。利水破癥。宣五臟。理氣燥溼。然同補劑則補。同瀉劑則瀉。同升劑則升。同降劑則降。各隨所配。而得其宜。且同生薑則能止嘔。同半夏則舒痰。同杏仁則治大腸氣閉。同桃仁則治大腸血閉。至其利氣。雖有類於青皮。但此氣味辛溫。則入脾肺而宣壅。不如青皮帶入肝疎泄。而無入脾燥溼。入肺理氣之故也。然多服亦能損氣。用補留白。下氣消痰除白。卽書所名橘紅。然亦寓有發明之意。核治疝痛偏墜。葉散癰腫。取廣陳久者良。治火痰章便製寒痰薑汁製。治下焦鹽水製。核去皮炒用。【清】王士雄隨息居飲食譜論橘皮曰。橘皮解魚蟹毒。化痰下氣。治咳逆。嘔噦。噎噎。脹悶。霍亂。疳癰。瀉痢。便秘。脚氣諸病皆效。去白者名橘紅。陳久愈良。福橘皮爲勝。或論者時入一片。亦妙。惟化州無橘。俗尙化州橘紅。其色不紅。皆橘皮也。【清】賈九如辨藥指南論橘皮曰。陳皮留白。取其色白入肺氣。香入脾。因體大則緩緩則遲下。故

主二部而和中。味辛則散。散則分解。故泄逆氣而快膈。用治膈痰嘔逆。穀食酒毒。功在蘇梗枳殼之上。以其性溫能補脾。脾須藉監制之藥用之。助參苓煖胃。佐白朮健脾。和甘草益肺。同半夏滲溼。合青皮去滯。參竹茹治呃。且辛香泄氣。如目痛脇脹。盛怒動氣。俱忌用之。因主至高之分。故曰陳皮治高氣。青皮治低氣。此言大略。然亦通用。

凡用藥者宜知之。日本學說謂唐柑皮。爲中國所產。卽廣東蜜橘（*C. bigaradia*）*Duhau*, var, *Sinense*, *Gall*）之果皮。由婦孺拾聚曬乾。俗呼廣皮。又有青皮。亦稱青橘皮及童皮。卽剝取未熟蜜橘之果皮曬乾者。又柑皮。卽蜜柑（*C. nobilis*, *Lour*）皮。爲日本產。藥學雜誌第二百零四號。載有谷井專太郎氏所著「柑皮中之歌司裡里仁」一文。氏嘗研究日本產橘屬果皮中。是否亦如西洋橘含有一種名歌司裡里仁（*osipardin*）之中性無色無味結晶體之糖原質。由其試驗結果。確知日本橘亦含有此物。因以公表。詳細可參閱該雜誌。

辨僞 ●鄭省巖曰。蘇州宋公祠創製陳皮醬。爲理嗽化痰妙藥。馳名天下。近上海多有僞品。卽福州亦有僞製。假充味辛辣。雖甜不潤。其色粗淡。不堪入藥。誤服之。反見咳嗽。勿用爲是。●曹炳章曰。按百草鏡製膏鹽陳皮。卽蘇州宋公祠之遺法也。能消痰降氣生津。開鬱運脾。調胃解毒安神。方用陳皮

十六畫 榴 橐 榕 橘

【榴皮炭】卽石榴皮之處方用名。詳『石榴皮』條。

【橐吾】卽款冬花之古籍別名。典見本經。詳『款冬花』條。

【橐駝】卽駱駝之古籍別名典見漢書詳『駱駝』條。

【橐籥尊師】卽淫羊藿之古籍別名。典見和漢藥考。詳『淫羊藿』條。

【檜櫪果】卽弔搭果之別名。詳『弔搭果』條。

【橘子】
原名 橘實
古籍別名 沙橘。
(綱)

目 綿橘。(橘譜)

性質 甘酸溫無毒。

主治 甘者潤肺酸者聚痰

歷代記述攷證

【宋】大明諸

家本草論橘實曰止消渴開胃除胸中膈氣。宋王士雄隨息居飲食譜論橘實曰橘子甘平潤肺析醒解渴。閩產者名福橘。黃巖所產。

皮薄色黃者名蜜橘俱無酸味而少核皆爲佳品然多食生痰聚飲風寒咳嗽及有痰飲者勿食味酸者戀隔滯肺尤不益人並可糖醃作脯名曰橘餅以其連皮造成故甘辛而溫和中開膈溫肺散寒治

嗽化痰。醒酒消食。

參攷資料 橘皮下氣消痰 其肉生痰聚飲。表裏之異如此。凡物皆然。今人以蜜煎橘充果食。甚

佳亦可醬菹也。李時珍：多食
蠶膈生痰。滯肺氣。寧原：同蟻
蟹食。令人患軟癰。吳瑞：

【橘白】
者。基本 卽橘皮之去紅

性質 苦。辛。溫。無毒。
主治 和胃。化濁。膩。

橘皮

處方用名 陳廣皮 廣陳皮 新會皮 廣橘皮 福

橘皮。上廣皮。甜廣皮。上中廣皮。
陳皮。桔皮。廣皮。炭。青鹽。陳皮。參目。

陳皮。杭橘皮。

古籍別名 紅皮(湯液) 貴老
(和漢藥考)
外國名詞 Peel of sweet
orange(英)

稱最多最好者頭紅皮第二大紅皮。第三極紅皮。第四蘇紅皮。第五式紅皮。第六揀紅皮。第七旱水皮。第八青皮。

形態。橘樹屬。山果。木樹。高丈許。枝多生刺。刺出莖間。與枳無辨。其葉兩頭尖。色綠。面光。大寸餘。長

二寸許。四月開小白花。甚香。六七月間結實。至冬黃熟。大者如盃。包

中有瓣。瓣中有核。其皮紋細而薄。色紅。內多筋脈。味苦辛。

種植 園圃中恒有移植
採取 十月採皮曝乾。

製法 雷斅曰。凡使用桔皮。皺子皮。二件用不得。凡修事須去。

白膜一重。剉細以鯉魚皮裹一宿。

至明取用李時珍曰凡橘皮入和中理胃葉則留白入下氣消痰藥則去白其說出於聖濟經去白者以白湯入鹽先潤透刮去筋膜

主治。胸中痞熱。逆氣。利水。穀。

正嘔咳。治氣衝胸中吐逆霍亂療

張仲景之發明 橘皮一味經

橘皮枳實生薑湯證曰。胸痺。以

上方橘皮一斤。橘皮湯。以上一方橘皮四兩。

伏苓飲證曰。心胸中有停痰。上一方橘皮二兩半。歷觀上諸

方橘皮之主治呃逆也。明矣。胸痞者。停痰也。其有呃逆之證。則橘皮所能治也。

歷代記述攷證 【唐】甄權

氣咳嗽胃主氣病破癥瘕瘰癧
【明】李時珍本草綱目論橘皮曰
療嘔噦反胃嘈雜時吐清水痰痞
按瘕大腸閉塞婦人乳癰入食料
解魚腥毒【明】李士材本草圖經
論橘皮曰陳皮苦辛而溫入太陽

十六 檳

檳

一六八二

本草拾遺論檳木皮曰。麥汁冷飲。主傷寒時行熱毒瘡特良。即今豌豆瘡也。宋寇宗奭本草衍義論檳木皮曰。燒灰合他藥。治肺風毒。明字時珍本草綱目論檳木皮曰。治乳癰。

【檳木脂】 主治 燒之辟鬼邪。

【檳核】 即檳櫨之古籍別名。典見和漢藥考。詳「檳櫨」條。

【檳櫨】 處方用名 青果。檳櫨。古籍別名 青果。(梅

聖俞集)思果(記事珠)諫果(農書)青子次斯。忠臣。南威。栗果。味諫。檳核。回甘子。訶梨子。翠顙(和漢藥考)綠欖方檳(綱目)

外國名詞 Canarium al-

bum. (拉丁) Chinese Olive (英) 基本 屬檳櫨科檳櫨樹之果實。

產地 凡閩、廣等省及熱帶地方之山野平原間。恒有產焉。其產於西藏者。名西藏青果。尤為珍品。和漢藥考曰。產安南及中國南部。形體 檳櫨為落葉喬木。高丈餘。葉為奇數羽狀複葉。花攢簇成

穗狀。枝節間有脂如膠。子實為堅硬肉果。以帶白色者為上品。內有六稜紡錘狀核。頗堅硬。破之有三房。各有細長仁。謂之欖仁。

採取 八九月間採之。

製法 凡使須揀小者佳。並去尖。以火煨存性。研到用。亦有切斷煎入湯藥。

性質 酸。甘。溫。無毒。效能 生津。止渴。清咽解毒。用作緩和滋養藥。又解酒毒及魚鼈毒。

主治 生食煮飲。並消酒毒。解饑餓魚毒。

歷代記述攷證 【宋】寇宗奭本草衍義論檳櫨曰。嚼汁嚥之。治魚鼈。【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論檳櫨曰。生啖煮汁。能解諸毒。【宋】大明諸家本草論檳櫨曰。開胃下氣。止渴。【明】李時珍本草綱目論檳櫨曰。生津液。止煩渴。治咽喉痛。咀嚼嚥汁。能解一切魚鼈毒。【明】繆希雍本草經疏論檳櫨曰。檳櫨本經味酸甘。今嘗之先澀而後甘。得土中之陽氣。氣溫無毒。肺胃家果也。能生津液。酒後嚼之不渴。故

主消酒。甘能解毒。故療饑餓毒也。馬志云。饑餓即河豚也。人誤食此魚肝及子。必迷悶至死。惟檳櫨汁煮服之。必解。其木作櫟櫨者。魚皆浮出。故知物有相畏如此。不特味甘解毒之義也。【明】李士材本草圖解論檳櫨曰。檳櫨澀而甘。平生津止渴。清咽止咳。開胃下氣。止瀉固精。解一切魚毒及酒毒。【清】黃宮繡本草求真論檳櫨曰。檳櫨稟受土陽。其味先酸後甘。氣溫無毒。肺胃家藥也。性能生津止渴。酒後嚼之最宜。故書載能解酒毒也。人服河豚魚肝及子。迷悶至死。取此煮汁飲。即解。故書又載能解諸魚之毒。及治魚骨之鯁。至於痘瘡不起。並痘抓碎成瘡。腸風下血。耳足凍瘡。初生胎毒。唇裂生瘡。牙齒風疳。下部疳瘡。陰腎癰腫等症。用此無不皆效。以其具有溫行酸斂之性耳。但此性端搜滌胎毒。過服則有嘔吐泄瀉之虞。性端聚火。瀉氣寒嗽。用之得宜。熱嗽則不免有熱氣上薰之弊也。【清】王士雄隨息居飲食譜論檳櫨曰。檳櫨酸甘。平開胃生津。化痰滌濁。除煩止渴。涼

膽息。驚。清利咽喉。解魚酒野蠶毒。鹽藏藥製功用良多。點茶亦佳。以香輒多汁者勝。

國外學說 檳櫨為產於熱帶地方之喬木。有綠欖、白欖及青欖。鳥欖數種。葉作長橢圓形。披針狀。花為總狀花。果實為卵形。肉果長一寸許。未熟時呈黃綠色。成熟則呈黃白色(白欖)或紫黑(烏欖)。

辨偽 為清解之品。入於肺胃。以清香而小者為良。大而酸澀者不可食。其兩頭之尖端。食時宜切去。因其性熱也。又市上所售者大都用礬水浸過。以其能保護其常青之顏色也。但礬水性澀且燥烈。非徒無益。且又害之。而於喉痛等症。更有極大不利。故市上所售之物。宜細辨之。其色耐黃有黑點者。即其日期已久。已經礬水浸過。不可食。即青者亦宜用水洗淨。方免危險。

配合應用 治河豚魚鼈諸毒。諸魚骨鯁。用檳櫨汁或煎濃湯飲。無檳櫨以核研末或磨汁服。

(隨息居方) 治腸風下血。檳櫨燒存性。研

出氣。候有蠶數粒。去糞上一點黑者。只取一頭白者。唾津研成膏。塗眼睫周回。不得揩拭。來早溫藥水洗三次效。

【壁虱胡麻】即亞麻之古籍別名。典見綱目。詳「亞麻」條。

【壁宮】即壁虎之古籍別名。典見新修本草圖經。詳「壁虎」條。

【壁魚】即衣魚之古籍別名。典見圖經本草。詳「衣魚」條。

【壁蝨】學大辭典。臭蟲壁蝨。古籍別名。蚌。(動物)

(綱目) 焚蝨。焚蛋。扁蝨。(綱目拾遺) 薦蝨。(俗名)

外國名詞 Ixod & ricinus, L. Cathe tick 或 Tick Zoekke 或 Holzook (拉丁) ダニ (日本)

基本 係節肢動物。屬蜘蛛類。壁蝨類。壁蝨科。

產地 產南方穢澤之地。今江南北人家多有之。稍不潔即生此物。旅店驛舍中尤多。帶入衣被。歸家即生。多藏蘊薦中及壁內。或桌牀縫間。其身扁而易入。至冬則入壁多藏。壁隙。隙及泥沙山穴中。及古樹根下。交春皆啓蟄而出。

形體 壁蝨屬昆蟲類。體橢圓。色棕黑。皮爲革質。現條紋。間有毛。或刺口。適於吮吸。及刺螫。頸有鈎。觸角短小。腹大無環節。脚分七節。尖端具鈎爪。或有圓盤。無心臟。亦無脈管。脚四對。幼時三對。體長三分餘。細小如蟻。其生殖極速。頗易蕃育。白色卵生。雌雄異體。初生便嚙人生。一二日即能褪壳。愈褪愈大。漸漸而老。色由赭紅而轉棕黑。常隱伏牀褥隙中。晝伏夜出。吸血時注入毒汁。故被吸者痛痒赤腫。塊粒藥。搔則愈大。疼痒難禁。幼兒皮膚嬌嫩。其苦尤甚。捕得可供藥用。



蟲 壁

製法 凡入藥須置溫水中。令臭氣洩盡用。

性質 氣腥。味微鹹。性平。在土者有毒。

主治 治咽喉。小兒驚風。療眼生翳。疥瘡。癩瘡。

配合應用 治咽喉。用壁蝨十枚。滴花燒酒浸服。(集驗方)

治疥瘡。臭爛。用臭蝨同水龍骨搗。和麻油調敷。出盡黃水立愈。(西亭藥鏡方)

治眼生翳針。臭蝨血點之即散。又方。治小兒驚風。用壁蝨於淨水中。漂去臭氣。焙乾入藥。(海上方)

拔疔。臭蝨同米飯搗勻。搽疔上。能立拔疔根外出。(楊氏經驗方)

治鮮魚刺。凹谷茴香葉使鹽花燒酒。搗糊。瘡上如口久爛。用臭蝨剝去頭傳之。(醫宗彙編方)

參攷資料 壁蝨即臭蝨。狀如酸棗仁。啞人食血。與蛋皆爲牀榻之害。古人多於席下置麝香。雄黃。或菖蒲。或麝香末。或棟花末。或麥末。或燒木瓜烟。黃蘗烟。牛角烟。馬蹄烟。以熏之也。

【壁蝨胡麻】即壁虱胡麻。參見「亞麻」條。

【壁蝨】即壁蝨之古籍別名。典見綱目。詳「壁蝨」條。

網目。詳「壁蝨」條。

【壁錢】命名 本品窠形如錢。故名。

古籍別名 壁鏡。(綱目) 壁蝨。(俗名) 壁蝨。蟻子。

外國名詞 Tegenaria domestica L. (拉丁) ヒラタグモ 或ウチグモ (日本)

基本 屬節肢動物蜘蛛類。其窠幕詳見該條。

產地 牆壁屋角間多有之。

形體 壁錢爲卵生蟲類之一種。其體扁。色灰褐。頭背具單眼四。分爲二列。腹多小黑點。脚長而有四對。卵囊色白而圓。扁。固着於壁間。常守護之。夜間徘徊壁上覓食。捕得可供藥用。



錢 壁

性質 無毒。

古籍別名 狸豆。虎豆。(綱目)

葛豆。滇南名(八升豆)(日本)

外國名 Muenna cepi-

tata, W. et A. (拉) パッシ

ヨウマメ オシヤラクマメ

フチマメ テンチクマメ(日

本)

基本 係豆科黎豆屬。爲黎豆

之子實。

產地 生山野田間。

形態 黎豆爲穀類豆屬之一

年生蔓草。本莖條引蔓。葉如豇豆

但葉脈偏斜。夏秋間開花成簇。花

大呈紫色。如藕豆。花十餘莢同生

一處。長三四寸。大如拇指。有白茸

毛。老則黑而露筋。其種子大如刀

豆。淡紫色。有斑點。如狸文。可供食

藥用。

性質 甘。微苦。溫。有小毒。

主治 溫中益氣。

參攷資料 黎豆煮去黑汁。同

豬雞肉再煮。食之味乃佳。但多食

令人悶。(綱目)

【黎椒】

別名 抱娃子椒。(俗

名)

性質 辛熱。

十五畫 黎

齒

十六畫 凝

壁

主治 同川椒。

參攷資料 ①川椒故有名。產

自黎大所城隅者尤香冽。大小必

雙內。理細密。罅裂而子不墮。俗呼

抱娃子椒。(邊州聞見錄) ②四川

志各州縣多出椒。惟茂州出者最

佳。其殼一開一合者尤妙。按黎椒

近日亦罕有真者。外方所得俱屬

彼土人以他產僞充。其功效亦僅

與川椒相埒。據劉少府拙清云。真

者含一二粒口中。可辟瘴毒。解魚

蝦食毒。更可爲導淫具。彼土中有一

種生惡瘡。妓女不敢近。惟吞

黎椒三粒。與之接。則無害。次日便

出椒內。盡包其毒。不入人臟腑也。

故真者彼土亦珍貴之。罕有出售

於外者。(趙恕軒)

【黎藤子】即宜母果之古籍別名。

典見綱目拾遺。詳「宜母果」條。

【藟瑯】即人齒垢之原名。詳「人

齒垢」條。

十六畫

【凝水石】即寒水石之原名。詳「

寒水石」條。

【凝海菜】即石花菜之日本名。詳

「石花菜」條。

【壁虎】即無患子之古籍別名。典

見本草拾遺。詳「無患子」條。

原名 守宮。

命名 本品善捕蜴蝎。

棲止壁間。故名。

古籍別名 壁宮。蠍虎。(蘇恭)

蟪蛄。蟪蛄。(揚子方言)

外國名 Platydictylus

chinesis 或 Gecko chinensis

(Gecko)。

基本 係脊椎動物爬蟲類蜥

蜴類守宮科之守宮。

產地 牆壁及樹木間。處處有

之。

形態 壁虎爲爬蟲類之一種。

形似石龍子。而較扁。頭部扁口大。

舌肥厚。吻被方鱗。鱗在上唇者有

十一枚。下唇九枚。頭大有五角鱗。

頭下鱗一對。兩鼻孔相隔。離眼大

無。喉脊暗黑。有黑小點。多粟狀突

起。腹黃白。四肢短。各具五趾。除第

一趾外。多有鈎爪。趾有橫褶。藉

其排除空氣之作用。能爬行牆壁

等處。尾尖長。頗脆。易斷。而亦易復

生。體長三四寸。捕食蜘蛛蚊蠅等。

有益於人。亦可供藥用。

性質 鹹寒。有小毒。

主治 中風癱瘓。手足不舉。或

歷節風痛。及風淫驚癇。小兒疳痢

血積成瘡。瘡風癩癬。療蝎蟻

參攷資料 守宮。舊附見於石

龍下。云不入藥用。近時方術多用

之。楊仁齋言。驚癇皆心血不足。其

血與心血相類。故治驚癇。取其血

以補心。其說近似。而實不然。蓋守

宮食蝎蟻。蝎蟻乃治風要藥。故守

宮所治風淫驚癇諸病。亦猶蜈蚣

之性能透經絡也。且入血分。故又

治血病。驚癇。守宮祛風。石龍利水。

功用自別。不可不知。(李時珍)

【壁虎糞】

主治 聖濟總錄曰。

胎赤爛眼。昏暗。用活

者數枚。以蠟盛黃土。按實入蝎虎

在內。勿令損傷。以紙封口。穿數孔

一六七九



虎 壁

展。愈將患者二臂向前後屈伸。以助呼吸（人工呼吸法）或用電機以震動其身。日本學說謂鴉片之主成分爲莫兒比涅（即麼啡）其主治爲麻醉止瀉藥。於莫兒比涅之通症。間有用之者。鴉片之特效爲諸般下痢。如由感冒之下痢（於飲食不慎之下痢。當禁）虎列刺（霍亂）等。一日數回。〇、〇〇五至〇、二（自一毫三絲至二釐六毫）爲散丸與之。此外於腹膜炎。蜜尿病。三消病。鉛毒便秘。某種精神病。酒客諸妄等亦適用。極量一回〇、一五（三釐九毫）一日〇、五（一分三釐）又和漢藥考曰。罌粟爲一年生或二年生草本。多栽種於園圃。作藥及賞玩之用。莖高四五尺。葉爲長橢圓或長卵圓形。邊緣有缺裂。或生鋸齒。葉面平滑。包以莖。無葉柄。花梗生長茸毛。花四瓣。大朵。色有白、紅、赤、紫各種。皆鮮豔異常。有多數雄蕊與雌蕊之雄蕊。果實爲蒴果。形亦如蠶。頂端載雌蕊頭之圓片。房室少者七多者十五。中藏種子無數。種子色白或青黑。收採阿片之法。

十五 鴉片

各國雖不一致。要亦大同小異。日本收採之法。大抵在花謝後七日。至十日。蒴果未熟之際。於其縱凸處。自下向柱頭部割破果被。至不割斷爲度。則其內自有漿汁滲出。一受空氣。立即凝結。變黑如糊。乃以竹筴刮下。湊集煉合。盛以器置室中陰乾。照法令獻諸政府。收獲之量。視罌粟之種類及栽種法。收採法而不同。大約每地十畝。可得阿片三十至四十兩。最多六十兩。又曰。阿片製劑有數種。如阿片越幾斯。阿片酒。阿片安息香酒。阿片吐根散。阿片吐根錠。阿片坐藥。芳香阿片酒。以上皆爲日本藥局方（第四版改正本）所收載者。阿片水。阿片糖漿。番紅花阿片酒。阿片硬膏。阿片硬膏。齒痛丸。狄里亞加紙劑。以上皆日本藥局方所未收載。

者一分。老幼半分。空心米飲下。忌酸物。生冷油膩茶酒。無不止者。口渴略飲米湯。

③鴉片土十六兩切薄片。汽水一百二十兩。先用四十兩浸鴉片一天。過布絞渣。再用水四十兩製如前法。三次。亦如之。共將三水合。一過呢布。入燙鍋散氣。八兩爲度。每服八毫七絲半至一釐七毫半。此膏行氣之力。較鴉片土略小。惟用爲平火安心則最良。如人跌仆或被毆打痛劇。服此膏二三釐。能飲血止痛。不效則再服一二。次如發狂而不欲睡。每服此膏四五釐。服二三次。

④鴉片一分半粗末。淡酒二十分。浸七天。漉渣。用絞盤絞之。過淋紙。再加淡酒。仍足二十分爲度。能止痛寧睡。比鴉片略速。每服八釐七毫半至七分（鴉片酒方）。

⑤鴉片膏一兩。肉桂一錢半。搗爛。丁香一錢半。搗爛。白葡萄酒二十兩。共浸七天。間時搖動。過淋紙。再加酒淋渣。仍足二十兩爲度。與鴉片酒同用。第其力則較遜。每服一分七釐至七分。

⑥治新泄瀉新痢疾。鴉片八毫研末。樟腦三釐。辣椒八毫。共研勻。加蜂蜜作一丸。

用量 五釐至一分。

施用宜忌 凡外有風寒實邪者禁用。

參攷資料 ①俗人房中術用之。京師售一粒金丹云。通治百病。皆方技家之術耳。李時珍云。阿芙蓉前代罕聞。近方有用者。云是罌粟花之津液也。罌粟結青苞時。午後以大針刺其外面青皮。勿損裏面硬皮。或三五歲。次早津出。以竹刀刮收入甕器陰乾用之。故今市者。猶有苞片在內。王氏醫林集要言。是天方國種紅罌粟花。不令水淹頭。至七八月。花謝後。以大針刺其外面青皮而取之者。按此花五月實枯。安得七八月後尚有青皮在者。或方士不同乎。李時珍云。鴉片止痢功勝粟殼。但忌常服。久反無驗。且耗陰液。雖提助精神而損折人壽。切戒之。（本草述）②阿片之入藥用。太古時已知之。洎於中古。又知其爲麻醉藥。繼此而吸食鴉片之風。漸播及於土耳其。

十五畫 鴉

波斯國之鴉片。在英人幾不及知。其他如印度國所產之鴉片。多運至中國出售。第印度國所產之鴉片有二種。一作球形而大如楠。俗呼爲公。一作餅塊而無皮。俗呼爲白。中國之雲南所產者亦呼爲白。然功力之峻。則究以公爲最。藥品中必以乾者爲合用。否則濃淡不能一定。惟鴉片膏則不必用其乾品。且鴉片以產土耳其者爲上。其次爲印度中國。若將葉經取汁液之靈。熬水成膏。而用以攪入。其品最下。鴉片內含十八精二酸。內惟麼啡精爲最要之質。鴉片內所含之麼啡。最多者爲法國鴉片。與日耳曼國鴉片。每百分中計有麼啡十六分至二十分。評論其品之高下。卽以內含麼啡之多寡而定。麼啡多則力峻而價昂。且鴉片每百分則以內含麼啡六七分者。方可入藥。若過少便不足於用。其作用爲寧睡藥之首。初服則大感動腦。以後則減腦絲之知覺。又能特意感動腦髓令睡。如爲外科之用。初時能行血氣。令其覺痛。卽如用於眼睛。先覺痛。後覺平火安心。爲

內科之用。食一小服。則先行血氣。令脈加數。皮膚加熱。不久則知覺減少。心中安穩。則欲睡。而久則知覺輕。身體內失生津液之功用。惟皮膚仍如故。如食過大之服。則爲令人寧睡之毒藥。常用之爲止痛。令睡平火安心。或放出津液過限。然不免有頭痛煩渴便燥嘔吐等狀。如泄瀉病與霍亂吐瀉病。能令其停止。常服則使人胃弱不化。呼吸短少。致血內養氣不足。又可用爲發汗藥。治轉筋藥。治發熱藥。又酒狂病。食大服能得其益。處生炎病。可合於承(二)絲(甘承)或衣必格(吐根)服之。依尋常而論。生炎或發大熱。服鴉片爲相反之治法。以鴉片爲各種藥品中之最要。故較他種藥品用之更多。且如服各種瀉劑。而加鴉片少許。以鴉片能制其猛烈。如用承(二)絲承藍丸等作改血藥。變質劑。而必合鴉片同服。以鴉片能助其力。如用衣必格作表藥。而必借以鴉片。以鴉片能助其發汗。如用樟腦療痛。而亦加以鴉片者。以鴉片能助其止痛。又如平人略服。則益腦提神。服

快有力。遇體筋肉。皆覺收攢。惟腦則受功力最多。故至略醉。未幾則自覺心神舒暢。又劇痛之症。服之則可止痛。如臟腑發炎作痛。先用涼劑去炎。隨用鴉片止痛。其驗。惟身尙有大熱者。俟熱退方可服。如心痛肚疼。係由胃不消化者。須先服吐瀉等藥。後服鴉片。其痛可止。如膽淋及內腎淋等症作痛者。先以熱水浸身。次服鴉片。以止其痛。如小便痛及婦人經痛者。亦先以熱水浸下身。後亦加服鴉片。庶易全愈。如牙痛耳痛。服之亦佳。或用棉花蘸鴉片酒塞入患處。如初患風溼時。或作痛。服之可治。或用鴉片酒射入竅門。如有等毒瘡。雖不可療治。當劇痛時。服之亦可緩痛。又如如有等不能安寢之症。服之能治。如或發瀉。或發瘋。願竟夕喧嘩。服之亦可就寢。又如抽筋一症。有由羊癲而發者。有因產後而起者。實係腦力妄發。服之即可平腦。又如紅白痢。須先服大黃等藥。以去其積滯。後服鴉片丸。或鴉片酒。或麼啡均效。又如咳嗽。凡乾咳無痰者。服之方合。如痰多。用此。恐至

痰塞氣管。宜佐以祛痰藥爲妥。如鴉片表散(托布兒私散)是也。其他如誤服過多。或求自殺者。始則頭昏。繼則不醒人事。或五六點鐘或十一十二點鐘而氣絕。絕鴉片除內服外。或取以化水。用水節射入肛門。或用小水節刺入皮內。以藥水射之。均能獲效。如止痛寧睡及治各症。以一釐或二釐爲一服。有煙癮者。宜重服。然或多服而仍不驗。則以藥水由肛門射入。卽驗。如嘔吐不止及大腸痛。內腎痛。膀胱痛等症。亦宜以藥水射入。竅門至解藥之解此毒。須先用吐劑。如膽礬一分七釐半。或白礬半兩。或芥末半兩。用溫水一碗。化服。令吐。後再多飲溫水助嘔。至吐清水爲止。後再飲咖啡茶。或濃細茶。或服咖啡精。又扶助行走。勿乘倦患者。不能服藥。用抽水節以抽淨其毒。次將濃咖啡茶。或咖啡精送入胃內。若其狀仍昏迷。再用空針射了刀邊精水八釐七毫半。至一分七釐半。入皮內。以敗其毒。外用冷水洗面及前後心。或用手巾蘸水拍打亦可。行此數法。如氣息仍不舒

採取 七八月間。花謝後半月。

內罌粟結青苞時。午後以大針刺其外面青皮。勿損裏面硬皮三五處。次晨津出。以竹刀刮收取之。入罌器陰乾用。

用法 燒熱成泡。水化服。或剉和作丸散。

性質 酸。溫。微毒。

成分 阿片含有主成分之嗎啡。此外尚有植物鹽基約十餘種。并護酸。樹脂。脂肪。蠟。分。糖。分。黏液。素。蛋白。質。灰分等。

效能 止瀉痢。定諸痛。為麻醉藥。有鎮靜腸蠕動機之功用。常用於下利。赤痢。霍亂。腸出血。急性腸閉塞諸症。又治腸結核。胃。黏膜炎。

作用 入胃時。能刺激胃壁神經。令人發嘔。旋即被麻醉。疼痛等知覺。均行消失。胃分泌亦減少。至腸亦能刺激腸壁神經。使腸壁失去知覺。同時分泌減少。蠕動遲緩。及由腸壁次第吸入血中。已成爲

Oxymorphone $C_{18}H_{23}NO_6$ ，由末梢神經而達腦部。腦週先受其激。旋即被阻。蓋由 Oxymorphone 直接行於腦血中。非自腦

中之神經所致。其激腦工程所顯之狀。如令人感情隆重。志願暢達。幻想異常。敏銳過人。同時亦雜有紊亂之思想。性慾亦異常亢進。若服大量。或服時過久。竟能令大腦完全麻醉。全身知覺咸失。心跳緩慢。呼吸促迫而死。

主治 瀉痢脫肛不止。能瀝丈夫精氣。

歷代記述攷證 【清】黃元御玉樞藥解論鴉片曰。鴉片煙收瀉飲固。治泄痢脫肛。精滑夢遺。本草謂鴉片即罌粟未開。鐵刺青苞。津出。刮收。陰乾。而成。名阿芙蓉。今洋船至關。多帶此物。關中無賴之徒。以及不肖子弟。宮宦長隨。優伶娼妓。以為服之添筋力。長精神。御淫女。抱嬰童。十倍尋常。但壽命不永。難逃五年。此煙非延年養生之品。斷宜戒之。【清】王士雄隨息居飲食譜論鴉片曰。亞片入藥。亦始前明。李潑湖本草綱目收之。清乾隆間。始有吸其煙者。初則富貴人吸之。不過自速其敗亡。繼則貧賤皆吸之。因而失業破家者。案而盜賊滿天下。以口腹之欲。致毒流宇內。

塗炭生民。洵妖物也。智者遠之。亦有因衰病而誤墮其中者。以吸之入口。直行清道。頃刻而徧一身。墮者能宣。鬱者能舒。陷者能舉。脫者能收。凡他藥所不能治之病。間有一吸而暫效者。人不知其為劫劑。遂謬以為神丹。而日病吸此。尤易成引。迨引既成。臟氣已與相習。嗣後舊疾復作。必較前更劇。而烟亦不能奏效矣。欲罷不能。噬臍莫及。乃致速死。余見實多。敢告世人。毋蹈覆轍。徐松龔云。天然自六朝後。皆稱印度。今五印度為英吉利所轄。進口貨物。近以亞片為主。宇宙浮華之氣。乃獨鍾於佛國。何其怪也。戒法。斷癮之方。驗者甚少。且用烟或烟灰者。居多。似乎烟可少吸。一不服藥。癮即如故。惟此方日服。仍可吸烟。旬餘癮自漸減。又不傷身。蓋物性相制。此藥專制亞片之毒。故能斷癮。絕無他患也。方用鮮松毛數斤。略杵。井水熬稀膏。每晨開水化服一二錢。或每土一斤。用松樹皮半斤。煎湯熬烟。如常吸食。癮亦漸斷。或以一味甘草熬為膏。調入烟內。初且少入。漸以加多。如

常吸之。斷癮極效。【清】黃宮繡本草真論鴉片曰。阿芙蓉即罌粟花之津液也。一名鴉片。一名阿片。出於天方國。氣味與粟殼相似。而酸澀更甚。用阿芙蓉一分。糯米飯搗作丸。通治虛寒百病。凡瀉痢脫肛。久痢虛滑。用一二分米飲送下。其功勝於粟殼。又瘡疥行漿時。澀瀉不止。用四五釐至一分。末有不止。但不可多服。忌酸醋。犯之斷腸。及忌葱蒜漿水。奈今有以房術為用。無論病症虛實。輒為輕投。縱慾以致腎火愈熾。吁誤矣。

國外學說 英美學說謂鴉片產中國。波斯。埃及。印度。土耳其等國。即白罌粟未熟者。割製其殼後。流出汁液。所成之乾膏。阿刺伯國名曰阿非恩。印度名曰鴉片末。自古以來。即有人能知其形性與功用。酒。水。淡。強。水。類。均能提出功力。歐羅巴尋常出售之鴉片。即土耳其國所產者。謂之土耳其鴉片。大半從土麥拿之口岸運出。間有帶至土耳其京都。發至歐羅巴各處。故英國藥品中之所用。係土耳其國之鴉片。又用埃及國之鴉片。至

惟類似肝臟之硬腫。以此外敗。善能變軟而消散。(骨爲土質所成。酸物能溶化土質。故魚骨等浸以醋。即可變軟。燒酒則反之。能使纖維變硬。故軟肉可成肝臟。)醋中加苦味收澀之藥品。用以外敷。善能防止腐敗。如規那末。其效尤甚。各種潰瘍有腐壞之慮者。宜以此防之。(或云。夏月醃肉。加醋貯之。便不腐敗。其有防腐之效可知。)眞珠。珊瑚。石。珊瑚。蠣殼。卵殼等。浸以醋。亦即變軟。疫癘流行之時。燒石澆醋。以其蒸氣熏蒸居室。善能驅逐傳染之疫氣。(遠西醫方名物考)

【醋母】即酢漿草之古籍別名。詳『酢漿草』條。

【醋炒青皮】即青皮以醋拌炒成者之處方用名。詳『青皮』條。

【醋林子】命名。本品味酸如醋故名。

產地 生山野林箐中。

形態 醋林爲果類之一種。高丈餘。枝葉繁茂。三月開白花。四出。九月十月間其實成熟。纍纍數十枚。生青熟赤。類櫻桃而蒂短。其實

可供食與藥用。

採取 採得陰乾。連核用。

性質 酸。溫。無毒。

主治 久痢不瘥。及痔漏下血。蚊咬心痛。小兒疳疔。心痛。服酒。黃

瘦。下寸白蟲。單搗爲末。酒服。一錢。比其效。醋醃藏者。食之生津液。醒酒止渴。多食令人舌粗拆也。

【醋梨】即梨之以醋煮熟者。功用詳『梨』條。

【醋筒草】即虎杖之古籍別名。典見和漢藥考。詳『虎杖』條。

【醋漿】即酸漿之古籍別名。典見本經。詳『酸漿』條。

【銷恨客】即白桃花之古籍別名。典見和漢藥考。詳『白桃花』條。

【銷根花】即白桃花之古籍別名。典見和漢藥考。詳『白桃花』條。

【銓草】即木賊草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『木賊草』條。

【銓】即銀箔之古籍別名。典見綱目。詳『銀箔』條。

【銓】即白芍之古籍別名。典見別錄。詳『白芍』條。

【震龍根】即雷公藤之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『雷公藤』條。

【鞋底魚】即比目魚之古籍別名。典見綱目。詳『比目魚』條。

【駝】即駝之古籍別名。典見綱目。詳『駝』條。

【鴛】即鴛之古籍別名。典見綱目。詳『鴛』條。

【駝】即駝之原名。詳『駝』條。

【駝脂】即駝脂之原名。詳『駝脂』條。

【駝鳥】命名。本品形如駝。故名。

古籍別名 駝蹄雞。食火雞。骨托禽。(綱目)非洲駝。(動物學大辭典)

外國名詞 Struthio camelus L. (拉丁) Ostrich 或 Somali ostrich (英) Struthio myio-

bdophaene (德) タチヨ 或 タテウ 或 アフリカダテウ (日本)

基本 係脊椎動物鳥類走禽類駝鳥科。

產地 出沒非二洲。及沙漠諸地。

形態 駝鳥爲林禽類禽屬之最大者。嘴扁而短。似三角形。頭及頸裸出淡紅色之皮膚。頸長軀幹

短。翼短小而軟弱。即長。腰部半裸出。跗部表面粗糙。具二趾。一長者有爪。一短者無爪。尾短。全體羽毛柔順。羽枝皆分離。更有缺羽枝。爲捲髮狀者。體高七八尺。不能飛。而善走。馬不及之。產卵沙漠中。其羽獸人用以裝飾。尿可供藥用。



駝鳥

性質 無毒。

主治 人誤吞鑽石入腹。食之立消。

【駝鹿】即鹿之極大面而色蒼黃無斑者。詳『鹿角』條。

【駝蹄雞】即駝鳥之古籍別名。典見綱目。詳『駝鳥』條。

【駝鴛】即駝鴛之古籍別名。典見綱目。詳『駝鴛』條。

【髮晶】即水晶之雜有他石而成。髮紋者。功用與尋常水晶同。詳『水晶』條。

【闌羊花】即羊躑躅之古籍別名。

十五畫 醋

銷 銓 銓 銓 震 鞋

駝 駕 駝 髮 闌

駝 駕 駝 髮 闌

駝 駕 駝 髮 闌

駝 駕 駝 髮 闌

駝 駕 駝 髮 闌

駝 駕 駝 髮 闌

著名方劑

●苦酒湯治少陰

病。咽中生瘡。聲不出者。(金匱方)
 半夏(洗破)十四枚。鷄子(去黃
 納苦酒著殼中)一枚。上二味。納
 半夏著苦酒中。以鷄子殼置刀環
 中。安火上。令三沸。去滓。少少含嚥
 之。不差。更作三劑服之。●黃耆芍
 藥桂枝苦酒湯。治黃汗之爲病。身
 體腫。發熱。汗出而渴。狀如風水。汗
 沾衣色正黃。如漿汁。脈自沉。以汗
 出入水中。浴水從汗孔入。得之。此
 湯主之。(金匱方)黃耆五兩。芍藥
 三兩。桂枝三兩。上三味。以苦酒一
 升。水七升。相和。煮取三升。溫服一
 升。當心煩。服至六七日。乃解。若心
 煩不止者。以苦酒阻故也。一方以
 美生醴代苦酒。此病在表。不在裏。

參攷資料

●米醋比諸醋最

醱。入藥多用之。穀氣全也。故勝糟
 醋。產婦房中。常以火炭沃醋氣。爲
 佳。酸益血也。以麝雄黃塗蜂蠆毒
 亦取其收而不散之義。今人食酸
 則齒齲謂其水生木。水氣弱。木氣
 强。故如是。造靴皮者。須得醋而紋
 皺。故知其性收歛。不負酸收之意。
 (寇宗奭)●按孫光憲北夢瑣言
 云。一婢抱兒落炭火上。燒灼。以醋
 泥傅之。旋愈。無痕。又一少年眼中
 常見一鏡。趙卿謂之曰。來晨以魚
 鱸奉候。及期延至。從容久之。少年
 飢甚。見櫺上一甌。芥醋。旋旋啜之。
 遂覺胸中豁然。眼花不見。卿云。君
 喫魚鱸太多。魚畏芥醋。故極醜。而
 愈其疾也。觀此二事。可證別錄治
 癰腫殺邪毒之驗也。大抵醋治諸
 瘡。腫積塊。心腹疼痛。痰水血病。殺
 魚肉菜及諸蟲毒氣。無非取其酸
 收之意。而又有散瘀解毒之功。李
 廷飛云。醋能少飲。辟寒勝酒。王戩
 自幼不食醋。年踰八十。猶能傳神
 也。(李時珍)●醋酒爲用。無所不
 入。愈久愈良。亦謂之醴。以有苦味。
 俗呼苦酒。丹家又加餘物。謂爲華
 池左味。陶弘景。●劉熙釋名云。
 醋。清也。能措置食毒也。古方多用
 酢字也。李時珍。●凡患熱病者。
 虛罷煩渴。津液燥竭。以醋一匙。至
 二兩服之。頗佳。痘瘡。痲疹之帶腐
 敗者。以及爲狂大螻蛇等咬傷。用
 醋俱有速效。腐敗熱痘瘡等。血液
 腐壞。溶腐。穿蝕血脈。因而患下血
 吐血。衄血。尿血等症者。用此則能

阻遏腐敗。收歛血液。因血液運行
 怠慢而起之壞血病。(如航海之
 人身。體不運動。每發此病)醋能
 治之。醋之氣味。寬透。性清涼。收歛。
 有鎮瘻之效。以蒸餾醋與糖漿。並
 密涅刺爾鎮痛液。少許混和。用於
 諸瘻瘻症。及上衝頭痛。失眠。憂鬱
 病。狂癲殊驗。又有涼爽降鎮之效。
 凡用阿片難治之症。用此尤妙。醋
 橙汁及醋之製劑。並解酒醉。醋內
 加水服之。或塗鼻孔。皆良。服阿片
 瞑眩者。飲醋亦奏速效。他如因服
 亞兒加里性辛熱醋。腐能令人麻
 痺。昏睡。發狂。諸藥。或服雙鸞菊。矢
 鴉。答。顧。茄。莫。碧。諸藥。或誤食甲介
 等物。因中毒者。醋能解之。惟中
 毒甚者。須先服吐劑。令得大吐。後
 再用醋。又爲烟氣所熏。致呼吸窒
 塞者。飲醋少許。立效。醋雖溶解凝
 血。然遇乳汁或脂油質。則立即凝
 結。故服乳汁者。及乳養之兒。不可
 服醋。飲則乳汁必凝結。胃中而不
 消化。停滯而爲酸敗之液。致起病
 患。頭眩。眩暈。或昏冒。卒倒。速令嗅
 醋。或以醋塗擦鼻孔。或以醋嚥其
 面。便能醒解。此因醋性寬透故也。

醋中入銅青末少許。燃之以不至
 沸騰爲度。入磁製之格兒。弗薄。個
 之。則甚爲猛烈。以玻璃瓶收貯。密
 閉。備用。凡腐蝕諸金用之。則烈頭
 痛。以醋溫熱。使煩燥之。或醋內加
 水。研和硝石。礞砂。各少許。布片蘸
 貼。或周匝頭部。有奇效。蝕血。棉花
 蘸醋。深納鼻孔。中止。或以布片
 蘸醋。縛頭上。亦佳。口中出血。醋水
 含漱。亦止。外傷輕出血。以此貼之。
 良。婦人崩漏。孕婦及產後血崩。醋
 內加水沖淡。以水唧注入子宮。自
 愈。或產後子宮不收。縮。血崩不止。
 布片蘸冷醋。貼腹部。效。醋有溶解
 凝血之效。故跌打損傷。血絡破裂。
 其血汎溢皮中。發而爲青紫斑。及
 諸瘡腫者。用此自能消腫止痛。法
 於水中滴醋少許。微溫。布片溼透。
 貼。頻頻替換。或加燒酒。並研和硝
 石。礞砂。各少許。用之。亦妙。金瘡洗
 滌。醋中須多沖溫水。否則刺戟太
 甚。必發軟熱。醋能使骨變軟。硬骨
 變如軟骨。故骨傷者。外敷過久。骨
 遂失其堅剛之質。不能復元。患尙
 殘病之小兒。如給以酸味之飲食。
 物。諸骨倍形軟弱。而增加其疾病。

至不能堪爲度。隨移入桶中。加清

醋。以搾取量三分之一爲率。然後

密封其桶。靜置二十五日。換桶一

次。連換四桶。釀造告成。又曰。醋之

種類有梅醋。萬年醋等。梅醋卽梅

汁也。六月製梅乾時。取之用生梅

黃熟者一斗。漬水一日。苦汁出。便

取出。以鹽三升。摻梅。壓石一晝夜。

梅汁出。取梅曬乾。至再三則梅乾

成矣。取其梅汁。盛罈收用。便成梅

醋。經年不敗。病人食之亦良。惟不

入藥用。萬年醋。夏月取變味之酒

與米醋水三品等分。和合盛罈。投

堅炭燼於內。取出炭。急封口。經月

成醋。以後有變味酒。則加入其罈。

民間簡便之法也。

配合應用 ①衍義云。產婦房

中。常以火炭沃醋氣爲佳。酸氣能

飲血使下也。

②治卒心痛。青木香以醋磨汁

服。③孟詵食療方。

④治口瘡。醋浸黃蘗含之。

⑤治身體卒腫。醋和蚯蚓屎傳

之。千金方。

⑥治舌腫不消。以酢和釜底黑

厚傳舌之上下。脫則更傳須臾卽

消。千金方。

⑦湯火傷灼。卽以酸酢洗。并

以酢泥塗之。良。亦無癢痕。喉痺咽

痛。以醋醋探吐之。千金方。

⑧治風毒。以三年醃醋五升。煎

五沸。切葱白三升。煎一沸。漉出。以

布染乘熱裹之。痛止乃已。外臺

祕要方。

⑨治霍亂吐利。鹽醋煎服甚良。

如宜方。

⑩治霍亂煩脹。未得吐下。以好

苦酒三升。飲之。千金方。

⑪治足上轉筋。以故綿浸醋中。

煎蒸熱裹之。冷卽易。勿停取。達止

外臺祕要方。

⑫治出汗不滴。瘦却腰脚。并耳

聾者。米醋浸刺三稜。夏四日。冬六

日爲末。醋湯調下二錢。卽痊。經

驗後方。

⑬治腋下胡臭。三年醃酢和石

灰傳之。外臺祕要方。

⑭治癰瘍風病。酢和硫黃末傳

之。外臺祕要方。

⑮治癰疽不潰。苦酒和雀屎如

小豆大。傅瘡頭上。卽穿也。肘後

方。

⑯治木舌腫強。醋時時含漱。

普濟方。

⑰治牙齒疼痛。大醋煮枸杞白

皮一升。取半升。含漱卽瘳。肘後

方。

⑱治鼻中出血。酢和胡粉半棗

許。服。又法。用醋和土塗陰囊。乾卽

易之。千金方。

⑲治寒耳治壁。以醇醋微火炙

附子。削尖塞之。千金方。

⑳治面齕。雀卵。苦酒漬水。常常

拭之。肘後方。

㉑中砒石毒。飲醋醋得吐卽愈。

不可飲水。廣記方。

㉒治服硫發癰。酢和破研膏傳

之。燥卽易。千金方。

㉓治食鷄子毒。飲醋少許卽消。

廣記方。

㉔治毒殺傷。釐。清醋急飲一二

盞。令毒氣不散。然後用藥。濟急

方。

㉕治蠍刺螫人。酢磨附子汁傳

之。醫學心鏡方。

㉖治蜈蚣咬毒。醋磨生鐵傳之。

亦治蜘蛛咬毒。錢相公懷中方。

㉗治蠟蟻尿瘡。以醋和胡粉傳

之。千金方。

㉘治諸蟲入耳。凡百節。蛇蠅。蟻

入耳。以苦酒注入。起行卽出。錢

相公懷中方。

㉙治狼烟入口。以醋少許飲之。

祕方。

㉚治足上凍瘡。以醋洗足。研藕

傳之。

㉛治胎死不下。月未足者。大豆

黃醋服三升。立便分解。未下再服。

子母祕錄方。

㉜治胞衣不下。腹滿則殺人。以

水入醋少許。噴面神效。聖惠方。

㉝治鬼擊卒死。吹醋少許入鼻

中。千金方。

㉞治乳癰堅硬。以罐成醋。燒熱

石投之。二次溫漬之。冷則更燒石

投之。不過三次卽愈。千金方。

㉟治疔腫初起。用麵圍住。以針

亂刺瘡上。銅器煎醋沸。傾入圍中。

令容一盞。冷卽易。三度根卽出也。

用量 三錢至八錢。或一匙至

三匙。

施用宜忌 凡脾癰胃藥。及服

丹參。茯苓者。禁用。反蛤蠟。蠟甘石。

蠟煅石灰。

十五釐 醋

淘蒸用六月六日造成小麥大麴和勻用水二斗入甕封釀三七日成矣。①粟米醋用陳粟米一斗淘

浸七日再蒸淘熱入甕密封日夕攪之七日成矣。②小麥醋用小麥水浸三日蒸熟當黃入甕水淹七日成矣。③大麥醋用大麥米一斗水浸蒸飯當黃曬乾水淋過再以麥飯二斗和勻入水封閉三七日成矣。④錫醋用錫一斤水三升煎化入白麴末二兩瓶封釀成

用法 恒以外治塗傳內服祇用少許和飲

性質 酸苦溫無毒

成分 醋之主要成分為醋酸(C₂H₃O₂)餘則略含醋酸伊打糖分護謨色素灰分等

效能 散瘀血消癰腫用為消

散積塊藥及解魚肉蔬菜與諸蟲毒又治腸瘕扶斯結核性盜汗

作用 入胃時能刺激胃神經使胃分泌稍強然亦能制止

Fe⁺⁺之酸酵作用至腸內能刺激腸黏膜使腸之欬性增加同時又能凝固已消化之蛋白由腸壁吸收入血中又能令血管收縮汗液減

少體溫略降

主治 消癰腫散水氣殺邪毒理諸寒消毒

歷代記述攷證 【唐】陳藏器

本草拾遺論醋曰治產後血暈除癥塊墜積消食殺惡毒破結氣心中酸水痰飲【唐】孟詵食療本草論醋曰醋磨青木香止心痛血氣痛浸黃蘗含之治口瘡調大黃末塗腫毒煎生大黃服治痰癖甚良【宋】日華諸家本草論醋曰下

氣除煩治婦人心痛血氣并產後及傷損金瘡出血昏暈殺一切魚肉菜毒【元】王好古湯液本草論醋曰散瘀血治黃疸黃汗【明】繆希雍本草經疏論醋曰醋性米造者入藥得溫熱之氣故從木化其味酸氣溫無毒酸入肝肝主血血逆熱壅則生癰腫酸能飲壅熱溫能行逆血故主消癰腫其治產後血暈癥塊血積亦此意耳散水氣

者水性泛濫得收飲而寧謐也殺邪毒者酸苦湧洩能吐出一切邪氣毒物也日華子主下氣除煩婦人心痛血氣并產後及傷損金瘡出血迷悶殺一切魚肉菜毒取其

酸收而又有散瘀解毒之功也故

外科傳藥中多資用【清】黃宮繡

本草求真論醋曰米醋本溫熱之氣而成味則酸苦氣溫酸主欬故書多載散瘀解毒下氣消食且同木香磨服則治心腹血氣諸痛以火淬醋入鼻則治產後血暈且合外科藥散則治癥結痰癖瘡黃癰腫口瘡以治舌瘡麵塗以散損傷積血及殺魚肉菜毒諸毒至醋既酸又云能散癰腫以消則內散潰則外散收處即是散處故耳且多食傷筋軟齒以酸入筋過飲則於筋有傷過酸則木強水弱而於齒多輟米造陳久者良【清】王士雄隨息居飲食譜論醋曰醋酸溫開胃養肝強筋緩骨醒酒消食下氣辟邪解魚蟹鱗介諸毒陳久而味厚氣香者良性主收飲風寒咳嗽外感癰痢初病皆忌續文獻云獅子日食醋醋各一餅故俗謂獅吼為喫醋云

國外學說 英美學說謂釀醋又名乾醋製法有粟米或果實及別物之不同其濃淡則以醱精之多寡為定英國藥肆中所售之醱

釀每百分中計含醱精五分有奇如百分中計含醱精三分至六分者則為通行之品釀醋之功用能收欬解熱利小便主治熱症自汗盜汗乾渴外用能治跌打損傷因腰扭挫石灰迷目處方以釀醋一兩荊芥泡水一兩共和勻仰漱治咽喉病每服一錢至一兩加水用之及和漢藥考曰醋係酒變酸而成其原料用米麥馬鈴薯酒糟敗酒等物木醋亦可為原料日本用以調味及入藥者以用玄米作原料者為佳品茲述各種製法於下(一)用玄米製醋法蒸玄米加白麴三倍攪和入新製桶中以手壓緊厚紙覆令平徐徐注水如麴之半注水時勿令飯飯漂浮如是靜置七八日俟晴天以竹竿攪拌之依此每七日一次至二十八日桶加水蓋且縛以繩懸暖處置之忌近不潔之物經七十五日釀造告成然亦可隨氣候之寒暖而遲速之既熟之後去滓密封埋貯涼處地下經年香味俱烈(二)用酒糟製醋法酒糟水浸十五日擇器搾其液汁投釜中一沸試浸以手

形態 賣子木爲灌木類常綠

木本高五六尺。春生嫩枝。葉尖長約一二寸。青綠色。枝梢淡紫色。五六月間碎花百十枚。圍攢作大朵。深紅色。隨花結實。如椒目在花瓣中。黑色光澤。其木可供藥用。

製法 雷敦曰。凡採得粗搗。每一兩用酥五錢。同炒乾入藥。

性質 甘。微酸。平。無毒。

主治 折傷血內溜。續絕。補骨髓。止痛安胎。

命名 汗。音突。乃番語之譯音。

產地 出西番諸地。

製法 以檳乳松淚。甘草。地黃等藥同熱血煎成用。

性質 甘。溫。無毒。

主治 金瘡傷折。瘀血內損。補肌肉。消惡血。下血氣。婦人產後諸血結。腹痛內冷。不下食。並以酒酒服之。亦傳病處。

參攷資料 番人試藥。以小兒斷一足。以藥納口中。將足踢之。當時能走者良。爲傷折之要藥。(陳藏器)

【輪迴酒】即童便之古籍別名。典

十五畫 質

見綱目。詳「童便」條。

【鄭芥】即荊芥之古籍別名。典見和漢藥考。詳「荊芥」條。

基本 本品爲柿之用。法修藏者。

製法 吳瑞曰。水藏者性冷。鹽藏者有毒。李時珍曰。酥藏柿也。水收鹽浸之外。又有以熟柿用灰汁浸三四度。令汁盡。着器中。經十餘日即可食用。

主治 瀉下焦。健脾胃。消宿血。

【鮑魚】即鮑魚之以鹽漬成者。典見綱目。詳「鮑魚」條。

【醉仙桃】即曼陀羅之古籍別名。典見和漢藥考。詳「曼陀羅」條。

【醉草】即睡菜之古籍別名。典見綱目。詳「睡菜」條。

命名 本品花葉可

【醉魚草】以毒魚故名。

古籍別名 闊魚花。魚尾草。機木。(綱目)

外國名詞 *Baddies japonica*, *Honal* (拉丁) *フヂウツ* (日本)

基本 係馬錢科醉魚草屬。爲醉魚草之花葉。

產地 生山野間及河澤邊。

形態 醉魚草爲毒草類之落葉灌木。本莖高三四尺。其節間有縱行之翅。葉對生。廣披針形。有鋸齒。夏日莖梢抽穗着花。花冠筒狀。不整齊如唇形。帶紫紅色。雄蕊四。其莖葉可供藥用。

性質 辛。苦。溫。有小毒。

主治 痰飲成胸。遇寒便發。取花研末。和米粉作糰。炙熟食之。即效。又治誤食石斑魚子中毒。吐不止。及諸魚骨鯁者。搗汁和冷水少許。嚥之。吐即止。骨即化也。久搗成餅者。以花填鯽魚腹中。濕紙裹煨熟。空心食之。仍以花和海粉搗貼。便消。

製法 一。米醋三伏時用倉米一斗。淘淨煮飯。攤冷。會黃晒。鐵水淋淨。別以倉米二斗。蒸飯和勻。入甕。以水淹過。密封。暖處。三七日成矣。糯米醋。秋社日用糯米一斗。

產地 黃勞逸新中藥曰。醋產浙江杭紹二縣者爲最佳。實則以江蘇鎮江產爲最。

形態 醋爲澄明之液體。色淡黃或深黃。氣香味酸。比重一。〇五。至一。〇一二。水及酒精。不論多少。可溶解之。

製法 一。米醋三伏時用倉米一斗。淘淨煮飯。攤冷。會黃晒。鐵水淋淨。別以倉米二斗。蒸飯和勻。入甕。以水淹過。密封。暖處。三七日成矣。糯米醋。秋社日用糯米一斗。

基本 係用米麥或果實以澱粉類或酒類加醋母使發酵變酸而釀成者。入藥須用米醋二三年者良。

外國名詞 *Acetum*, (*Vinegar*)

古籍別名 酢。醴。苦酒。(綱目)

酢。花地左味。(和漢藥考) 醴醋。乾醋。(新本草)

處方用名 醴醋。

命名 醋者措也。能措置食毒。故名。米醋比諸醋最酸。又名醴醋。

古籍別名 酢。醴。苦酒。(綱目)

酢。花地左味。(和漢藥考) 醴醋。乾醋。(新本草)

外國名詞 *Acetum*, (*Vinegar*)

基本 係用米麥或果實以澱粉類或酒類加醋母使發酵變酸而釀成者。入藥須用米醋二三年者良。

產地 黃勞逸新中藥曰。醋產浙江杭紹二縣者爲最佳。實則以江蘇鎮江產爲最。

形態 醋爲澄明之液體。色淡黃或深黃。氣香味酸。比重一。〇五。至一。〇一二。水及酒精。不論多少。可溶解之。

製法 一。米醋三伏時用倉米一斗。淘淨煮飯。攤冷。會黃晒。鐵水淋淨。別以倉米二斗。蒸飯和勻。入甕。以水淹過。密封。暖處。三七日成矣。糯米醋。秋社日用糯米一斗。

基本 係用米麥或果實以澱粉類或酒類加醋母使發酵變酸而釀成者。入藥須用米醋二三年者良。

外國名詞 *Acetum*, (*Vinegar*)

古籍別名 酢。醴。苦酒。(綱目)

酢。花地左味。(和漢藥考) 醴醋。乾醋。(新本草)

十五畫 蝸

蝸 街 蛄 調 碗 隸 賜 賤 賣

一六六八

參攷資料 ①蝸牛所主諸病

大抵取其解熱消毒之功耳。(李

時珍) ②其頭偏長如喙其形盤

旋如渦故有蝸蛄二者不獨如瓜

字而已其行延引故曰蝸蟬爾雅

謂之蝸蠃孫炎註云以其負蠃微

而行故名蝸蠃(李時珍) ③蝸牛

生池澤草樹間形似小螺白色頭

有四黑角行則頭出驚則首尾俱

縮入殼中(韓保昇) ④凡用蝸牛

以形圓而大者為勝久雨乍晴竹

林池沼間多有之其城牆陰處一

種扁而小者無力不堪用(蘇頌)

⑤蝸身有涎能制蜈蚣夏熱則自

懸葉下往往升高涎枯則自死也

(李時珍)

【蝸牛殼】 主治 一切瘡疾。

歷代記述攷證

【明】李時珍本草綱目論蝸牛殼

曰牙蠃面上赤瘡鼻上酒瘻入利

下脫肛。

【蝸舍】即蝸牛之古籍別名。典見

和漢藥考。詳「蝸牛」條。

【蝸蟲】即蝸牛之古籍別名。典見

和漢藥考。詳「蝸牛」條。

【蝸蠃】即蝸蟬之原名。詳「蝸

蠃」條。②即蝸之古籍別名。典

見山海經。詳「蝸牛」條。

【蝸蟬】即蝸蟬之古籍別名。典見

別錄。詳「蝸蟬」條。

【總】即蝸蟬之古籍別名。典見本

草集註。詳「蝸蟬」條。

【蝸洞根】 產地 生嶺南諸地。

形態 衝洞為蔓草

類之一種。莖根一似土瓜其根可

供藥用。

採取 採根陰乾用。

性質 苦平無毒。

主治 熱毒蛇犬蟲毒。癰癤瘡。

水磨服。

參攷資料 衝洞根。功同陳家

白藥(陳藏器)

【補苴】即苦菜之古籍別名。典見

日用本草。詳「苦菜」條。

【調睡參軍】即酸棗仁之古籍別

名。典見和漢藥考。詳「酸棗仁」條。

【豌豆】 命名 本品莖苗柔弱

宛宛故名。

古籍別名 青豆斑。(別錄)胡

豆。水寒豆。拾遺。戎菽。爾雅。回

鶻豆。(遼志)回回豆。(飲膳正要)

小豆。(千金)麻累。淮豆。國豆。(綱

目)小寒豆。(俗名)

外國名詞 Pisum sativum,

「(拉丁) エンドウ エンド

ウ エンドウマメ(日本)

基本 係豆科豌豆屬。為豌豆

之子實。

產地 在原野園圃間。

形態 豌豆為穀類豆屬之越

年生蔓草本莖長五六尺。葉為羽

狀複葉。尖端有卷鬚。基部有托葉

三四月間葉腋抽出花軸着蝶形

花而色白或淡紫色。結實為莢果

莢長寸許。中有種子可供食與藥

用。



豌豆

性質 甘平無毒。

主治 消渴。淡煮食之良。

歷代記述攷證 【唐】孫思邈

千金翼論豌豆曰。治寒熱熱中除

吐逆止泄痢瀉下利小便腹脹滿

【明】吳瑞日用本草論豌豆曰。調

營衛。益中平氣。煮食下乳汁。可作

醬用。【明】李時珍本草綱目論豌豆

曰。煮食殺鬼毒心。病。解乳石毒

發。研末塗腫。癰。瘡。作溲豆。去黠

黠。令人面光澤。

參攷資料 ①豌豆多食養病。

(吳瑞) ②豌豆屬土。故其所主病

多係脾胃。元時飲膳每用此豆。搗

去皮同羊肉治食云。補中益氣。今

為日用之物。而唐宋本草見遺可

謂缺典矣。千金外臺洗而溲豆方

盛用。畢豆麵亦取其白膩耳。(李

時珍)

【錄】即貓狸子之古籍別名。典見

爾雅。詳「貓狸」條。

【賜紫櫻桃】即葡萄之古籍別名。

典見綱目。詳「葡萄」條。

【脫婆】即木綿之古籍別名。典見

梵書。詳「木綿」條。

【賣子木】 古籍別名 買子木。

(綱目)

外國名詞 Ixora chinensis,

Lam. (拉丁) サンダングワ

基本 係茜草科賣子木屬。

產地 生嶺南暖地山野中。

蝮 ①無殼者名蝮蝮。即鼻淵蟲。

性質 鹹寒。有小毒。

效能 用治小便不通。及作痔。

漏脫肛藥。

主治 賊風鳴僻。蹠跌。大腸脫。

肛筋急及驚癇。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥

性本草論蝮牛曰。生研汁飲止消

渴。【明】李時珍本草綱目論蝮牛

曰。治小兒臍風撮口。利小便。消喉

痺。止鼻衄。通耳聾。治諸腫毒。痔漏

制蝮蝮蝮毒。研爛塗之。【明】李

士材本草圖解論蝮牛曰。蝮牛。蝮

蝮蝮蝮無毒。主賊風鳴僻。及脫肛

瘡。癰癤。蝮牛。蝮蝮。皆裏陰溼之

氣。而生氣味相同。主療無別。惟形

稍異。蝮蝮無殼。蝮牛負殼耳。蝮蝮

總除諸熱。益陰潤燥。堅固。故治如

上諸證。蝮蝮性長二物。不敢過其

所行之路。觸其身即死。故人取以

治蝮蝮毒。其氣大寒。非真有風熱

者。不宜用小兒薄弱多泄者忌用。

【清】黃宮繡本草求真論蝮牛曰。

蝮牛。即帶殼大蝮蝮是也。生下溼

地。陰雨即出。臭性至陰。味鹹小毒。

故古方用此。以治真陰虧損。廢理

不密。致風中於絡。而見口眼喎

斜。筋脈掣拘。及風熱脫肛。痔瘡腫

痛。癰疽。瘰癧。背疔。腫等症。皆能見效。

總以取其鹹寒。解其諸熱之性耳。

并解蝮蝮毒。取形尖小。綠桑木佳。

配合應用 ①治小便不通。蝮

牛搗貼臍下。以手摩之。加麝香少

許。更妙。【簡易方】

②治大腸脫肛。治大腸久積虛

冷。每因大便脫肛。用蝮牛一兩。燒

灰。豬脂和傅。立縮。又治上證。及痢

後脫肛。用乾蝮牛一百枚。炒研。每

用一錢。以飛過赤汁。磁石末五錢。

水一盞。煎半盞。調服。日三。【聖惠

方】

③治痔瘡腫痛。用蝮牛浸油塗

之。或燒研傅之。【丹溪方】。又用蝮

牛一枚。入麝香少許。在內。碗盛。次

日取水塗之。【濟生方】

④治發背初起。活蝮牛二百箇。

以新汲水二盞。湯瓶中封一夜。取

涎水。入真蛤粉。旋調。搗傅。瘡上。日

十餘度。熱痛止。則瘡便愈。【集驗

方】

⑤治瘰癧未潰。連殼蝮牛七箇。

丁香七粒。同燒研。紙花貼之。【危

氏得效方】

⑥治瘰癧已潰。蝮牛燒研。輕粉

少許。用豬脊髓調傅。【危氏得效

方】

⑦治喉痺腫塞。用蝮牛綿裹。水

浸含嚥。須臾立通。又用蝮牛七枚。

白梅肉三枚。研爛。綿裹。含嚥立效。

⑧治喉風腫痛。端午日午時。取

蝮牛十餘條。同鹽三四箇。小瓶內

封固。俟化成水。收水點之。【唐氏

方】

⑨治喉塞口。蝮牛炙二七枚。

白梅肉炒二七枚。白礬半生。半燒。

二錢。研爲末。每水調半錢。服。得吐

立通。【聖惠方】

⑩治耳腫痒腫。及喉下諸腫。用

蝮牛同麵研傅之。

⑪治面上毒瘡初起者。急尋水

蛭蝮一二條。用醬少許。共搗塗紙

上貼之。即退。紙上留一小孔。出氣。

此乃漢章祕傳極效方也。【談

藝翁試驗方】

⑫治赤白腎膜。生蝮牛一枚。搗

丹砂末於內。火上炙沸。以綿染汁

傳管中。日二。【聖惠方】

⑬治鼻血不止。蝮牛爆乾一枚。

烏賊骨半錢。研末吹之。【聖濟總

錄方】

⑭治撮口臍風。乃胎熱也。用蝮

牛五枚。去殼研汁。塗口。取效乃止。

又方。用蝮牛十枚。去殼研爛。入薤

蘿末半。分研勻塗之。取效甚良。

⑮滴耳聾閉。蝮牛膏用蝮牛一

兩。石膽。鹽。乳粉各二錢。半爲末。瓷

盒盛之。火煨。亦研末。入片腦一字。

每以油調一字。滴入耳中。無不愈

者。【聖惠方】

⑯治蝮蝮入耳。蝮牛椎爛。置於

耳邊。即出也。【瑞竹堂方】

⑰染髮方。用蝮蝮四十條。以京

墨水養之。三日。埋馬屎中。一月。取

出。以白絲頭試之。如即黑。到尾。再

入馬屎中。埋七日。再取試之。性緩

乃以擦。庶不致黑皮膚也。【普

濟方】

⑱治消渴引飲不止。用蝮牛十

四枚。形圓而大者。以水三合。密器

浸一宿。取水飲之。不過一劑而愈。

【海上方】。又用蝮牛焙半兩。蛤粉

龍膽草。桑根白皮。炒各二錢。半。研

末。每服一錢。橘葉湯下。【聖惠方】

施用宜忌 畏鹽。

本經詳知母係

【蝮蛇】

屬方用名 蝮蛇肉。
古籍別名 反鼻蛇。(和漢本草綱目) 反鼻地扁蛇。(和漢藥考)

外國名詞

Viper (英、德)

基本 屬爬蟲類。爲蛇類管狀毒牙族蝮蛇之肉。

產地 凡南方之山野間恒有之。



蛇 蝮

形態 蝮蛇爲毒蛇之一種。夏月棲息於山野或樹中陰處。卵在胎內孵化。比無毒蛇小。體粗長達一尺五六寸。色灰褐背有黑色或紅褐色之斑紋。其狀如錢頭大口尖上顎之左右兩側各生毒牙一枚平時向內橫轉。一旦張口兩毒牙即突出噬嚼他物於時毒腺中之毒液即自牙前面之孔迸射而出。用以毒人。此蛇見人並不奔竄。

十五畫 蝮

若誤踐之。立躍起而噬人。其毒之猛烈世人盡知之。

採取 捕法。春夏入山。手製葛蔓。蝮蛇聞聲來集。則壓其頸捕之。

捕得剝去皮及內臟。風乾入藥。性質 甘溫有毒。

成分 勝呂清一嘗購市販剝皮風乾之蝮蛇三百條。一一試驗其成分於其脂肪中。發見拍爾迷。

其成分於其脂肪中。發見拍爾迷。及斯台亞林之混合物。又用酒精浸之。於其浸出液中。檢得結晶體兩種。其一種爲塔烏林 (Tartr. in. $CaH_2N_2SO_4$)。見藥學雜誌。

效能 療癩疾惡瘡。治頑痺惡風。用作驅除黴菌惡毒藥。又爲強壯藥。

主治 釀作酒。療癩疾。諸瘰。心腹痛。下結氣。除癰毒。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論蝮蛇曰。五痔腸風。瀉血。

【明】李時珍本草綱目論蝮蛇曰。大風諸惡風。惡瘡癰癤。皮膚頑痺。半身枯死。手足臟腑間重疾。

國外學說 日本和漢藥考曰。以蝮蛇焙枯名反鼻霜。亦名五八霜。其隱名曰五八草。又名十三草。

充藥用。能止血。治惡瘡。其以酒浸蝮蛇。爲蝮蛇酒。以油漬之。爲蝮蛇油。蝮蛇酒之製法。取蝮蛇活者一條。以醇酒一斗浸。封埋馬溺處。周年取開。蛇已消化。酒味猶存。不過飲一升。當覺身習習而病愈。最治癰病。此感天地肅殺之氣而成之。惡疾。蝮蛇稟天地陰陽毒烈之氣而生之。惡物。乃以毒物攻毒病也。又法。蝮蛇去其首尾。剝腹除腸。割浸油中。五十日後。微煎取用。外塗一般腫痛。善治創傷潰爛。雖久遠不治之外症。用此亦愈。

配合應用 治白癩。大蝮蛇一條。勿令傷。以酒一斗漬之。糠火溫令稍熱。取蛇一寸。和臘月豬脂搗傅。肘後方。

用量 五分至錢半。

施用宜忌 凡非惡風癰疾者。禁。

參攷資料 取活蛇一枚。着器中。投以醇酒一斗。封定埋馬溺處。周年取開。蛇已消化。酒味猶存。有患諸症者。不過服一升。以來當覺身習習而愈。然有小毒。不可頓服。他藥不復得力。又曰。生癰者。取

一枚。或他蛇亦可。燒熟。坐上。當有赤蟲如馬尾出。仍取蛇肉。塞鼻中。(陳藏器) 癰疾感天地肅殺之氣而成。惡疾也。蝮蛇稟天地陰陽毒烈之氣而生。惡物也。以毒物而攻毒病。蓋從其類也。(李時珍) 蝮蛇作地色。鼻反口長。身短。頭尾相似。山南漢沔間多有之。一名虺蛇。無二種也。(蘇恭) 蝮蛇形不長。頭扁口尖。頭斑身赤文斑。亦有青黑色者。人犯之。頭足貼着東間諸山甚多。草行不可不慎。(蘇頌)

蝮蛇錦文。亦有與地同色者。衆蛇之中。彼獨胎產着足。斷足着手。斷手不爾。全身糜爛。七八月毒盛時。醫樹以洩其毒。樹便死。又吐涎沫於草木上。着人成瘡。身腫。名曰蛇瘡。辛難治療。方與蛇螫同。(陳藏器)

蝮蛇皮 主治 機灰。療疔腫。惡瘡骨疽。

蝮蛇肉 即蝮蛇之處方用名。詳『蝮蛇』條。

蝮蛇屎 採取 以蝮蛇置器中。養取之。

主治 痔瘻。

一六六五

或乾、或燒入藥用之。非若世人煮羹入椒鹽而啜其湯也。此物本溼化火能發溼。久則溼化熱。此乃土氣厚。自然生火也。(朱丹溪)

【蝦蟆子】即蝌蚪之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「蝌蚪」條。

【蝦蟆肉蛆】 採取 端午日取金眼大腹。不

跳不鳴者之蝦蟆。搗死置溺器中。候生蛆食盡。取蛆水漂淨焙用。

主治 治小兒諸疳。

【蝦蟆衣】即車前草之古籍別名。典見別錄。詳「車前草」條。

【蝦蟆肝】 主治 蛇螫人牙入肉中痛不可堪。搗傅之立出。

【蝦蟆兒】即蝌蚪之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「蝌蚪」條。

【蝦蟆青龍】即蝌蚪之古籍別名。典見綱目詳「蝌蚪」條。

【蝦蟆草】 命名 本品葉面狀形如蝦蟆之背。故名。

基本 係蝦蟆草科蝦蟆草屬。為蝦蟆草之莖葉根。

產地 多生溼地。各處多有之。

形態 蝦蟆草為溼草類之二。

年生草本。秋日或春日生苗。根出葉平鋪地面。葉橢圓形。網脈。葉緣鋸齒。葉表凸凹不平。狀如蝦蟆之背。故名蝦蟆草。至夏由中心抽出方莖。高數寸。至尺許。其葉對生。由莖端及葉腋分枝。開小花。總狀花序。結實小。如車前子。成熟後即枯死。

採取 夏月採之。採得陰乾。固

藏勿洩氣。

性質 苦。無毒。

效能 利水消腫。治陰痒。療風

疹。

主治 楊亭華曰。溼熱。風疹。陰瘰。腎囊風。消腫。利水。服洗皆有功

效。女子如受溼熱在陰道外部。用此藥薰洗即愈。若癢於陰道內。於洗方內加枯礬約錢許。將藥汁煎

好。過以布淋乘熱薰於患處。待溫度適宜。用大水。節一端置於藥水

內。一端置於陰道射而洗之。如受孕後。患陰癢症。洗之尤效。幼女常

患於大陰唇。小兒常於陽莖頭忽腫。(俗謂對蟻穴小便所致)以上

幼女小兒。單用蝦蟆草數兩煎洗。

約二次即愈。

用量 三錢至一兩。

參攷資料 車前又名蝦蟆衣。又名精。又名蝦蟆藍。皆非蝦蟆草也。惟本草綱目有葉下紅者。植

物圖考。言其形態與綸圖。頗與蝦蟆草相似。但蝦蟆草葉背不紅。或

此物亦為蝦蟆草之一種。因產地不同。而形態稍異耶。則未敢肯定

今北方藥市。誤以本經之蓬藥為蝦蟆草。沿襲多年。竟無正之者。亦

醫藥界之遺憾也。考蓬藥係多年莖生草。莖生倒針。葉為羽狀複葉

自三小葉構成。每小葉如掌狀。葉緣缺刻及鋸齒。面青背白。密生絨

毛。夏日枝端分枝。開小紫花。花冠五瓣。近世入藥用葉。其葉味澹。內

含鞣酸。為收斂之劑。與蝦蟆草之利溼熱者迥異。故不得不詳細說

明。以悉二藥之性。大相悖謬。醫家不可不知。(楊亭華)

【蝦蟆腦】 主治 明目。治青盲。

【蝦蟆臺】即蝌蚪之古籍別名。典見綱目詳「蝌蚪」條。

【蝦蟆膽】 主治 小兒失音。不語。取汁點舌上立愈。

【蝦蟆藍】即天名精之古籍別名。典見本經。詳「天名精」條。

【蝦蟆】即蝦蟆之古籍別名。典見綱目。詳「蝦蟆」條。

【蝦醬】 產地 粵語云。蝦醬以番山所造為美。官遊筆

記云。遼東大凌河。出蝦醬。蝦醬皆甘美。平海又出一種小蝦名紅毛

小作蝦醬尤佳。今浙江寧波及蘇皆有味亦佳。

製法 製蝦醬法。初醃時。每蝦百斤用鹽三斤。封定缸口。候蝦身

潰爛。乃加至四十斤鹽。於是味大佳。可以久食。

主治 解毒樹癰。因廣東有毒樹。蠱其樹無花。結子如牛奶。食之

立死。以蝦醬解之。

【蝨建草】 形態 生山下溼地。高二二尺。葉似山丹而微赤。

性質 苦。無毒。

主治 搗汁服。治吞蟲致病。搽汁洗蟲瘡。殺蟻蟲。

【蠶胡麻】即胡麻之處方用名。詳「胡麻」條。

【蠶母】即知母之古籍別名。典見

主治 目眩。癢痛。明目。夜視有精光。久服令人喜樂。媚好無憂。(本經)療五淋。利水道。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新修本草論蝙蝠肉曰。主女人生子。餘疾。帶下病無子。【明】李時珍本草綱目論蝙蝠肉曰。治久咳。上氣。久瘧。癰癤。金瘡。內漏。小兒疳病。驚風。

參攷資料 ①五月五日。取倒懸者。曬乾。和桂心。薰陸。香。燒烟。辟蚊。子。夜。明。砂。鼈。甲。爲。末。燒。烟。亦。辟蚊。(陳藏器)②蝙蝠性。能。瀉。人。故陳子真等服之。皆致死。觀後治金瘡方。皆致下利。其毒可知。本經謂其無毒。久服喜樂無憂。日華云。久服解愁者。皆誤後世之言。適足以增憂益愁而已。治病可也。服食不可也。(李時珍)

蝙蝠血及膽 **主治** 滴目。令人不睡。夜能見物。

蝙蝠刺 卽牛蒡子之古籍別名。典見綱目。詳「牛蒡子」條。

蝙蝠腦 **主治** 癰疽內陷。服之令毒不攻心。入丸。

十五畫 蝠

劑用之。

參攷資料 塗面去女子面皰。服之令人不忘。(陳藏器)

蝙蝠藤 **命名** 本品葉形。絕似蝙蝠。故名。

產地 附生於巖屋峭壁及喬木間。多有之。

形態 蝙蝠藤爲蔓草類之一種。葉類葡萄。而小多歧。勁厚。青滑。其藤可供藥用。

主治 腰痛。癰癤。酒煎服。

參攷資料 蝙蝠藤療腰痛。痛止。不可再服。多服則腰反傾。倒不支。(濟察方)

蝟刺香 卽沈香之上有刺紋者。性質功用。詳「沈香」條。

蝟油火 **基本** 以刺蝟脂熬成。

效能 能縮人筋骨。燈照能籠毒使小。

蝟鼠皮 卽刺蝟皮之古籍別名。典見和漢藥考。詳「刺蝟皮」條。

蝟蚌 **古籍別名** 撥掉子。蝟(蘇頌)

形態 蝟蚌爲分類之一種。卽蟹之扁大而後足較闊者。可供藥

蝟 蝟 蝦

用。

性質 鹹寒。無毒。

主治 解熱氣。治小兒痞氣。養食之。

蝟蟬 卽木蠹蟲之古籍別名。典見綱目。詳「木蠹蟲」條。

蝦 卽蝦之俗名。詳「蝦」條。

原名 土蛙。

命名 蝦者退也。蟻者墓也。本品懷土。取置遠處。一夕復還。復其所離。或退之常墓而返。故名。

古籍別名 蠶蟻。蝦蟇。(綱目)

外國名詞 Tana rugosa

Soldag (拉丁) ユチガル (日本)

基本 係脊椎動物兩棲類無尾類蛙科之蝦蟇。

產地 出波澤間。

形態 蝦蟇爲蛙屬之一種。其體暗褐色。背有黑點。亦有疣如蟾蜍。善跳躍。鳴聲唧唧。捕得可供藥用。其肝。腦。詳見各該條。

製法 雷敷曰。凡使蝦蟇。先去皮并腸及爪子。陰乾。每箇用真牛

酥一分。塗炙乾。若使黑虎。卽連頭尾。皮爪。並陰乾。酒浸三日。漉出焙用。

性質 辛寒。有毒。

主治 邪氣。破癥。瘕。血癰。腫。陰瘡。服之不患熱病。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論蝦蟇曰。主百邪鬼魅。癰腫。及熱結腫。【宋】日華諸家本草論蝦蟇曰。治熱狂。貼惡瘡。解煩熱。治犬咬。

參攷資料 ①古方多用蝦蟇。近方多用蟾蜍。蓋古人通稱蟾蜍爲蝦蟇耳。今考二物功用。亦不甚遠。則古人所用。多是蟾蜍。且今人亦只用蟾蜍有效。而蝦蟇不復入藥矣。按張杲醫說載撫青雜說云。有人患脚瘡。冬月輒然無事。夏月臭爛。痛不可言。遇一道人云。爾因行草上。惹蛇交遭。瘡中有蛇兒。冬伏夏出。故也。以生蝦蟇搗傳之日。三即換。凡三日一小蛇自瘡中出。以鐵鉗取之。其病遂愈。李時珍

②蝦蟇屬土與水味甘性寒。南人喜食之。本草言。服之不患熱病。由是病人亦愛食之。本草之意。或炙

十五畫 蔓

熱。則齒自堅矣。去白蟲長蟲者。假其苦辛之味耳。益氣輕身耐老。必非風藥所能也。【明】李時珍本草綱目論蔓荊子曰。蔓荊氣輕味辛。體輕而浮。上行而散。故所主皆頭面風虛之症。【明】李士材本草圖解論蔓荊子曰。蔓荊子辛而微溫。足太陽經藥也。主太陽頭風頂痛。目痛翳淚。亦能固齒。去白膜。酒炒打碎。【清】黃宮繡本草求真論蔓荊子曰。蔓荊子辛苦微溫。書言主治太陽膀胱。兼理足陽明胃。足厥陰肝。緣太陽本屬寒水之經。因風邪內客。而致顛頂頭痛腦鳴。肝屬風臟。風既內犯。則風必挾肝木上侵。而致淚出不止。筋藉血養。則血亦被風犯。而致筋亦不榮。齒亦不堅矣。有風自必有溼。溼與風搏。則胃亦受溼。累而致肉痺筋攣。由是三氣交合。則九竅蔽塞。而病斯劇。蔓荊輕體而浮。故既可治筋骨間寒熱。而令溼痺拘急斯去。氣升而散。復能祛風除寒。而令頭面虛風之症悉治。且使九竅皆利。白蟲能殺。是亦風寒溼熱俱除之一驗耳。但氣虛血虛等症。用此禍必旋踵。

不可不知。

近人學說

●賈九如曰。蔓荊味苦兼辛。能疏風涼血利竅。凡太陽經頭痛。及頭風腦鳴。目淚目昏。皆血熱風淫所致。以此涼之散之。取其氣薄。主升佐神效。黃芪湯疏去障翳。使目復光。爲肝經勝藥。●張山雷曰。蔓荊枝條柔細。有似於蔓。故得此名。蘇恭唐本草。竟謂其苗蔓生。微有誤會。李瀕湖謂其枝小弱如蔓是也。本經稱其氣味苦而微寒。別錄則曰辛平。壽頤按。凡草木之子。多堅實沈重。性皆下行。蔓荊之實。雖不甚重。然其性必降。本經謂主治筋骨間寒熱。溼痺拘攣。明目堅齒。利九竅。固皆清泄降火之功用。別錄雖加以辛字。而主治風頭痛腦鳴。目淚出。仍是內風升騰之病。用以清降。斷非疏散外風之品。日華子謂治赤目。張潔古謂治頭沈昏悶。止目睛內痛。王海藏謂搜肝風。皆是息風降火。其義甚明。獨甄權謂治賊風。潔古又謂治太陽頭痛。散風邪。則誤作疏散之藥。絕非本經別錄真旨。蓋內風外風。治法含渾久爲漢魏以來通

病。甄權等此說。實屬誤認。奈何瀕湖綱目。亦謂其氣清味辛。體輕而浮。上行而散。竟以甄權等之誤說。反加附會。而爲之證實。適以疑誤後學。而近三百年。更無人能知蔓荊子之真實功用矣。然瀕湖亦謂所主者皆頭面風虛之證。則試問風而屬虛。豈有再用浮散主治之理。自矛盾。豈可謂不思之甚矣。

千金方以一味蔓荊子爲末。浸酒服。治頭風作痛。亦是內風。非祇散外風之法。其用酒者。乃借酒力引之上行。使藥力達於頭腦之意。學者不可誤會。茲因世俗之見。無不謂此藥專散風熱。姑錄於此。而糾正之。如右。輕用一錢。五分。重用可至三四錢。

配合應用

●同甘菊花、荊芥、酒炒黃芩、烏梅、芽茶、白蒺藜、川芎、羌活、黑豆、土茯苓。治偏頭痛。目將損者。

●令髮長黑。蔓荊子、熊脂等分。醋調塗之。【聖惠方】

●治頭風作痛。蔓荊子一升爲末。絹袋浸一斗酒中。七日溫服。日三次。【千金方】

●治乳癰初起。蔓荊子炒爲末。酒服方寸匕。渣敷之。【危氏得效方】

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 頭目痛。不因風邪。而由於血虛。有火者忌之。張元素云。胃虛人不可服。恐生痰疾。惡烏頭、石膏。

書名方劑 益氣聰明湯。治中氣不足。清陽不升。則耳聾目障者。

（李東垣）蔓荊子、葛根各三錢。人參、黃耆各五錢。黃柏、芍藥各二錢。絲升麻、錢半。炙草一錢。水煎服。

參攷資料

●蔓荊實諸家所解。蔓荊荊粉。紛不一。經既言蔓荊。明知是蔓生。即非高木也。既言荊。則自是木上生者。况漢書郊祀志所言。以荊荊莖爲幡竿。故知蔓荊。即子大者是。又何疑焉。後條有蔓荊。此即便是荊。也。子青色如茱萸。不合更立蔓荊條。故文中云。本草不載。亦無別名。但有蔓荊。功用又別。斷無疑焉。注中妄稱石荊當之。其說轉見穿鑿。【寇宗奭】●蔓荊生水濱。苗荊蔓延長丈餘。春因舊枝而生。小葉五月葉成。似

見和漢藥考。詳「決明子」條。

【菰蔞仁】即瓜蔞仁之原名。詳『瓜蔞仁』條。

【蔞菜】

命名 本品味辛辣如火。人故名。

古籍別名 蔞菜。辣米菜。（綱目）芥。日本）

外國名詞 Nasturtium

montanum, Wall. (拉丁) イ

ヌガラシ アセダイコン（日本）

基本 係十字花科蔞菜屬。葉用蔞菜之莖葉。

產地 野生田圃間。

形態 蔞菜爲菜類之多年生雜草。其根深入於地。葉除頗難

莖隨土地之肥瘠。大小不一。高二三寸至一二尺。葉長橢圓形。羽狀分裂。亦有不分裂者。葉緣有不齊之缺刻及鋸齒。春季開花。總狀花序。花小黃色。四花瓣。四強雄蕊。結實爲細角乾果。細而長。呈線形。約五六分。熟則裂。其莖葉可供食與藥用。

性質 辛。溫。無毒。

主治 去冷氣腹內久寒。飲食

不消。令人能食。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論蔞菜曰。利胸膈。豁冷痰。心腹痛。

參攷資料 蔞菜細切。以生蜜洗并。或略灼。食之。爽口消食。多食發癩疾。生熱。（李廷飛）

【蔞】即白蔞之古籍別名。典見綱目。詳「白蔞」條。

【蔞母】即貝母之古籍別名。典見和漢藥考。詳「貝母」條。

【蔞子】即蔞草之古籍別名。典見爾雅。詳「蔞草」條。

【蔓女蘿】即松蘿之古籍別名。典見和漢藥考。詳「松蘿」條。

【蔓延】即王孫之古籍別名。典見吳普本草。詳「王孫」條。

【蔓芋】即芋子之古籍別名。典見綱目。詳「芋子」條。

【蔓荔枝】即苦瓜之日本名。詳「苦瓜」條。

【蔓荊子】命名 蔓荊苗蔓生。故名。

古籍別名 黃荊。大荊子。僧法寶。陸續丸（和漢藥考）

外國名詞 Vitis trifolia,

L. var. unifoliolata, Schauer.

（拉丁）

基本 屬馬鞭草科。藥用蔓荊

之子實。

產地 陳仁山藥物生產辨云。產山東。奉平縣爲多。各省均有出

四月新。

形態 蔓荊屬灌木。高三四尺。枝皆蔓延地上。狀似葛藤。處處生有鬚根。葉形橢圓。大一二寸。面深綠。背灰白。夏月梢上開紫碧色之

唇形花。酷似荳花。後則結實。形圓若小球。似胡椒子。始綠終黑。有帶

五瓣子皮。頗厚。中係白色之仁。

採取 每年六七月採實。陰乾。

製法 雷斅曰。凡使去蒂。子下白膜。一重用酒浸一伏時。蒸之。從已至未。然乾用。李時珍曰。尋常只去膜打碎用之。

性質 苦。微寒。無毒。

效能 散風熱。治頭痛。用作清涼強壯藥。

主治 筋骨間寒熱。溼痺拘攣。明目堅齒。利九竅。去白蟲。久服輕身耐老。小荊實亦等（本經）風頭痛。腦鳴。目淚出。益氣。令人光澤。脂

敷。別錄）

歷代記述攷證 【唐】甄權藥

性本草論蔓荊子曰。治賊風。長髭髮。【宋】大明日華諸家本草論蔓荊子曰。利關節。治瘡疾。赤目。【金】張元素珍珠囊論蔓荊子曰。太陽頭痛。頭沈昏悶。除昏暗。散風邪。涼

諸經血。止目睛內痛。【元】王好古湯液本草論蔓荊子曰。搜肝風。【明】繆希雍本草經疏論蔓荊子曰。蔓荊實味苦微寒。無毒。別錄加辛平溫。察其功用。應是苦溫辛散之性。而寒則甚少也。氣清味薄。浮而升陽。也。入足太陽。足厥陰。兼入足陽明。經其主筋骨間寒熱。溼痺拘攣。風頭痛。腦鳴。目淚出者。蓋以六淫之邪。風則傷筋。寒則傷骨。而爲寒熱。其則或成溼痺。或爲拘攣。又足太陽之脈。夾脊循項。而絡於腦。目爲厥陰開竅之位。邪傷二經。則頭痛。腦鳴。目淚出。此藥味辛氣溫。入二臟。而散風寒溼之邪。則諸證悉除矣。邪去則九竅自通。痺故則光澤。脂敷。其主堅齒者。齒雖屬腎。而牀屬陽明。陽明客風熱。則上攻牙齒。爲動搖。搖痛。散陽明之風。

氣也。

近人學說 張山雷曰。葦荳亦

作葦撥。原出波斯。蓋亦彼中方言

故無正字。氣味辛溫。固亦脾腎虛

寒之主藥。藏器謂溫中下氣補腰

脚。消食。除胃冷。陰疝。則功用可

知。藏器別有葦勃沒一條。亦言

辛溫。治冷氣嘔逆。心腹脹滿。食不

消化。陰汗。寒疝。核腫。婦人內冷。無

子。除腰骨冷云云。藥名主治皆同

蓋本是復出之未及刪除者。而瀨

湖亦引之。附入葦荳之後。蓋亦失

檢。李珣謂治水瀉虛痢。嘔逆。醋

心。臟腑虛冷。腸鳴。大明謂治霍亂

冷氣心痛。其旨皆同。惟瀨湖謂是

頭痛。葦淵牙痛要藥。取其辛熱能

入陽明而散浮熱。頭按頭痛。固有

真寒一症之宜用大辛大溫者。但

鼻淵牙痛。本皆火症。古人偶用辛

散之藥。蓋亦反佐之義。用作嚮導

瀨湖竟以爲散浮熱。恐是誤會。石

瀨和之非也。

配合應用 治冷痰惡心。葦

荳一兩爲末。食前用米湯服半錢。

(聖惠方)

治暴泄身冷。自汗。甚則欲嘔。

小便清。脈微弱。宜已寒丸治之。葦

荳肉桂各二錢半。高良薑。乾薑各

三錢半。爲末。糊丸。梧子大。每服三

十九。薑湯下。(和劑局方)

治胃冷口酸。流清水。心下連

臍痛。用葦荳半兩。厚朴。薑汁浸炙

一兩。爲末。入熱鯽魚肉。研和。丸。綠

豆大。每米飲下二十丸。立效。(余

居士選奇方)

療氣成塊。在腹不散。用葦荳

一兩。大黃一兩。並生爲末。入麝香

少許。煉蜜丸。梧子大。每冷酒服三

十九。(永類鈴方)

治婦人血氣作痛。及下血無

時。月水不調。用葦荳鹽炒。蒲黃炒

等分。爲末。煉蜜丸。梧子大。每空心

溫酒服三十丸。兩服即止。名二神

丸。(陳氏方)

治偏頭風痛。葦荳爲末。令患

者口含溫水。隨左右痛。以左右鼻

吸一字有效。(經驗良方)

治鼻流清涕。葦荳末吹之有

效。(衛生易簡方)

治風蟲牙痛。葦荳末搗之。煎

蒼耳湯。漱去涎。本草權度。又用葦

荳末。木鼈子肉。研膏化開。噴鼻。又

用葦荳。胡椒等分。爲末。化蠟丸。每

子大。每以一九塞孔中。(聖濟總

錄方)

用量 八分至錢半。

施用宜忌 凡肺脾有實熱鬱

火者禁用。

參攷資料 葦荳走腸胃。冷

氣嘔吐。心腹滿痛者。宜之多服。走

泄真氣。令人腸虛下重。(寇宗奭)

按唐太宗實錄云。貞觀中。上以

氣病。久未痊。服名醫藥。不應。因詔

訪求其方。有術士進黃牛乳煎葦

荳方。御用有效。掌禹錫亦記其事

云。後累試於虛冷者。必效。(蘇頌)

葦撥當作葦荳。出南方草木狀

番語也。陳藏器本草。作葦勃。扶南

傳作逼撥。大明會典。作葦撥。又段

成式西陽雜俎云。摩伽陀國呼爲

葦撥。梨拂林國呼爲阿梨訶陀。(

李時珍)葦撥生波斯國。叢生

莖葉似蒟醬。其子緊細。味辛烈。於

蒟醬。胡人將來入食。味用也。(蘇

恭)其根名畢勃。澁。似柴胡。而

黑硬。(陳藏器)今嶺南特有之

多生竹林內。正月發苗。作叢。高三

四尺。其莖如筍。葉青圓。如莖菜。闕

二三寸。如桑。面光而厚。三月開花。

白色。在表。七月結子。如小指大。長

二寸。已來。青黑色。類梧子。而長。九

月收米。曬燥。乾。南人愛其辛香。或

取葉生茹之。復有船上來者。更辛

香。(蘇頌)段成式言。青州防風

子。可亂葦荳。蓋亦不然。葦荳氣味

正如胡椒。其形長一二寸。防風子

圓如胡荽子。大不相侔也。(李時

珍)

【葦撥根】 原名 葦勃沒。

性 質 辛溫。無毒。

主治 五勞七傷。冷氣嘔逆。心

腹脹滿。食不消化。陰汗。寒疝。核腫。

婦人內冷。無子。治腰腎冷。除血氣。

【葦澄茄】 卽畢澄茄之古籍別名。

典見綱目。詳【畢澄茄】條。

【葦】 卽葦之古籍別名。典見別錄。

詳【葦】條。

【葦花】 性質 濡。無毒。

主治 入髮鬚髮方。

【葦殼】 主治 入髮鬚髮方。

亦止泄痢。

【葦】 卽葦之古籍別名。典見綱目。

詳【葦】條。

【葦子】 卽決明子之古籍別名。典

④木蓼亦有大小二種。皆蔓生。陶氏以青蓼入藥。餘亦無用。三茅君傳有作白蓼醬方。藥譜無白蓼。疑即青蓼也。(蘇頌)⑤韓保昇所說甚明。古人種蓼為蔬。收子入藥。故禮記烹雞豚魚蟹。皆實蓼於其腹中。而和羹醢。亦須切蓼也。後世飲食不用人。亦不復裁。惟造酒麴者。用其汁耳。今但以平澤所生。香蓼。青蓼。紫蓼為良。(李時珍)⑥蓼實。即神農本草第十一卷中水蓼之子也。彼言蓼則用莖。此言實。即用子。故此復論子之功。故分為二條。春初以葫蘆盛水浸。高掛於火上。晝夜使燉。遂生紅芽。取以為蔬。以備五辛盤。又一種水紅。與此相類。但苗莖高及丈。取子微炒。碾為細末。薄酒調二三錢服。治瘰癧久則效。效則已。(寇宗奭)

【蓼薺】原名 山薺。產地 生平澤麥田間。形態 蓼薺為菜類之一種。苗如葱。非但葉比常薺為小。力較常薺為大。可供藥用。性質 辛溫無毒。主治 霍亂。腹冷脹滿。冷氣攻

擊。腹痛不調。婦人產後。血攻胸膈。刺痛。煮服之。

【蓼螺】命名 本品味辛辣如。蓼故名。古籍別名 蓼蠃。(本草拾遺)產地 生海中。形態 蓼螺為蟲類之一種。其色紫有錦紋。肉可食。與供藥用。性質 辛平無毒。主治 飛尸。遊蟲。生食之。或浸以薑醋食。癰住。

【蓼藍】即藍之古籍別名。典見嘉祐圖經本草。詳「藍實」條。

【蓼蠃】即蓼螺之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「蓼螺」條。

【華勃沒】即華撥根之原名。詳「華撥根」條。

【華菱】即華撥之原名。詳「華撥」條。

【華撥】原名 華菱。古籍別名 蛤菱。權聖。(和漢藥考)阿利訶陀。(西陽雜俎)華勃。藏器)逼撥。扶南傳)華發。(大明會典)

外國名詞 Piper longum。基本 屬胡椒科為華撥之實。

產地 陳仁山藥物生產辨云。華撥安南。石叻均有出。仍以石叻為上。九十月新。和漢藥考曰。日本無產。係產東印度及其餘熱帶地方。

形態 華撥為多年生草本。春發苗作叢。莖高三四尺。其莖如箸。葉青圓如莢葉。闊二三寸。如桑面光而厚。三月間開白花。七月結子。如小指長。色青黑。為無數細實密綴。而生類似赤楊之葉。莢花長一二寸。粗二三分。味辛。有胡椒之香氣。

採取 九十月間採之。

製法 雷斅曰。凡使華撥。須去莖用頭。以醋浸一宿。焙乾。以刀刮去皮。菓子令淨。乃用。免傷人肺。令人上氣。

性質 辛大溫。無毒。

成分 華醃林(Piperia, C₁₀H₁₆NO₃)為其主要之成分。

效能 溫中。止胃。暖寒。痛。下氣。治水。飲。嘔。逆。用作鎮痛藥。用於頭痛。牙痛。脫痛。諸症。又為鼻淵之要藥。

主治 溫中下氣。補腰脚。殺腥

氣。消食。除胃冷。陰疝癖。歷代記述攷證 【唐】李珣海藥本草。論華撥曰。水瀉虛痢。嘔逆。醋心。產後洩痢。與阿魏和合良。得阿子人參。桂心。乾薑。治臍腹冷。腸鳴神效。【宋】大明諸家本草。論華撥曰。霍亂冷氣。心痛血氣。【明】李時珍本草綱目。論華撥曰。治頭痛。鼻淵。牙痛。【明】李士材本草圖解。論華撥曰。華撥辛熱。入肺脾。經溫痺而除嘔逆。定瀉而理心痛。逆於胸膈。而見惡心。嘔吐。見於下部。而見腸鳴。冷痢。水瀉。發於頭面。而見齒牙頭痛。鼻淵。停於肚腹。而見中滿。痞塞。疼痛。俱可用此投治。以其氣味辛溫。則寒自爾見。除其曰鼻淵頭痛。亦是取其辛熱。能入陽明。以散浮熱之意。是以病患偏頭痛風。須先口含溫水。隨左右以此末吹鼻。最效。牙疼。必同乾薑細辛調治。亦取能除寒之意。總之氣味既辛。則凡病屬寒起。皆可以投然。亦泄人真氣。不可任意多服。以致喘咳目昏。腸虛下重。喪其真

典見爾雅。詳「益母草」條。

【麥根】 主治 血氣攻心。洗到
浸酒飲。

【麥酒】 基本 本品為麥汁和
麴米所釀之酒。

胃。 主治 久服。聰耳明目。健脾強

【麥莖葉】 性質 辛溫。無毒。
主治 歸舌。除大小

腸邪氣。利中。益志。

歷代記述攷證 【南北朝】陶

弘景本草集註論麥莖葉曰。乾之

釀酒。主治風冷。大良。【唐】陳藏器

本草拾遺論麥莖葉曰。作生菜。食

能入腰脚。黃湯浸脚。治霍亂轉筋

麥汁日飲。治疥癬。搗爛傳狐尿瘡

【宋】大明諸家本草論麥莖葉曰

脚暴腫。赤麥燒灰淋汁浸之。以桑

葉蒸罨立愈。【明】李時珍本草綱

目論麥莖葉曰。殺蟲伏蠱。

參攷資料 黃帝云。食麥過多。

有毒。發心痛。和生魚食。令人脫氣。

陰核痛求死。二月食麥傷人胃。扁

鵲云。久食令人寒熱。損體減氣。少

精。婦人月事來時。食麥蒜變為淋

【麥實】 命名 麥類皆高揚。故

字從麥。高飛貌也。古人

種麥為蔬。收入入藥故名。

基本 屬麥科藥用麥之子實。

產地 湖澤水濱間恒有生長。

形態 麥屬溼草類中為一年

之生草本。種類甚多。花色皆紅白

子大亦皆似胡麻。色黑而尖扁。採

供藥用。

採取 秋季採實。尤以青紫香

三者佳。採得陰乾用。

性質 辛溫。無毒。

效能 明眼目。消癰腫。用作眼

科藥。又為瘡毒藥。

主治 明目。溫中。耐風寒。下水

氣。面浮腫。癰瘍。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥

性本草論麥實曰。歸鼻。除腎氣。去

癰。源止霍亂。治小兒頭瘡。

近人學說 張山雷曰。麥之種

類不一。有宜於高燥之地。有產於

下濕之旁。高者枝葉扶疏。迷離靡

障。小者莖條柔細。掩映水濱。然莖

葉雖有巨細之分。而形式花穗約

其味皆辛。生長極易。故皆善於走

竅。為利水消腫之猛藥。又莖葉紫

赤。花穗殷紅。則又入血分。而破瘀

逐血。腫積消痞。本經止有麥實別

錄。乃增以莖草。至瀕湖網目。則羅

列四五種。其氣味。本經謂之辛溫。

所以後世有麥辣草之名。別錄以

紅草為味鹹微寒。似不可據。本經

麥實稱其下水氣。治面浮腫癰瘍。

甄權謂其治癰瘍。止霍亂。弘景謂

麥實乾之。釀酒。主風冷。藏器謂麥

葉治霍亂轉筋。麥汁日飲。治疫癘。

日華謂赤麥燒灰淋汁浸足。治暴

輭。唐本草謂水麥葉搗敷蛇傷絞

汁服之。解蛇毒入腹心悶。又治脚

氣腫痛。成瘡水煎漬之。瀕湖謂水

荳花散血消積止痛。凡此主治。皆

是通泄宣導。利水破血之用。石頑

謂婦人月事來時。不可食麥。及蒜

易為血淋帶下。亦以辛泄過度。破

氣傷血故也。又謂麥實水荳花子

破瘀消積。力量甚峻。最易墮胎。娠

婦必不可犯。亦有血氣素虛。而月

事濇少。非因於瘀滯者。亦不可誤

交後卵腫。或縮入腹痛。麥子一把

水探汁飲一升。【肘後方】

①治霍亂煩渴。麥子一兩。香薷

二兩。每服二錢。水煎服。【聖惠方】

①治小兒頭瘡。麥子為末。蠶和

雞子白同塗之。蟲出不作痕。【藥

性論方】

①治蝨牛咬毒。毒行偏身者。麥

子煎水浸之立愈。不可近陰令弱

也。【陳藏器方】

用量 錢半至三錢。

參攷資料 ①麥實多食。吐水

壅氣。損腸。【甄權】 ②此類多人

所食有三種。一是青麥。人家常用

其葉有國有尖。以圓者為勝。所用

即此也。一是紫麥。相似而紫色。一

是香麥。相似而香。並不甚辛。好食

【陶弘景】 ③麥類甚多。有青麥。香

麥。水麥。馬麥。紫麥。赤麥。木麥。七種

紫赤二麥。葉小狹而厚。青香二麥

葉亦相似而俱薄。馬水二麥。葉俱

闊大。上有黑點。水麥一名天葵。莖

生。葉似栢菜。六莖花皆紅。白子皆

大如胡麻。赤黑而尖扁。惟木麥花

黃白。子皮青滑。諸麥並冬死。惟香

麥宿根重生。可為生菜。【韓保昇】

形體 蓮鬚長僅寸餘。質軟如綿。生時色黃。乾則色白。

採取 夏季開花時。晨早採之。採得陰乾待用。

性質 甘。清。溫。無毒。

效能 固腎。清精。用作收瀉藥。

主治 清心通腎。固精氣。烏髮。悅顏色。益血止血。血崩吐血。

歷代記述攷證 【明】繆希雍

本草經疏論蓮鬚曰。蓮鬚鬚一名佛座鬚。味甘。澀。氣溫。本經不收。而古方固真補益方中。往往用之。詳其主治。乃是足少陰經藥。亦能通

手少陰經。能清心入腎。固精氣。烏髮。止吐血。療滑泄。同黃蘗。砂仁。

沙苑。葵。藜。魚。膠。五味子。覆盆子。生甘草。牡蠣。作丸。治夢遺。精滑。最良。

【明】李士材本草圖解論蓮鬚曰。

蓮鬚甘。澀。清心止血。通腎固精。男子腎泄。女子崩帶。【清】黃宮繡本

草求真論蓮鬚曰。蓮鬚甘。溫而澀。功與蓮子略同。但澀性居多。服之

能清心通腎。益血固精。烏髮黑髮。止崩住帶。如三因固真丸。巨勝子

丸。並皆用之。凡慾勤精薄。而見滑脫不禁。治當用此。祕瀉。但不似龍

骨寒瀉。有收陰定魂安魄之妙。牡蠣。鹹。澀。微寒。兼有化堅解熱之功。金櫻徒有阻瀉之力。而無清心通堅之理耳。

辨偽 陳仁山曰。蓮鬚有真有偽。偽者葵花也。蓮鬚身帶扁闊而

軟。葵花原來一球散開像蓮鬚。但條子幼而帶硬。若氣味則難分也。

配合應用 治久近痔漏三十年者。三服除根。用蓮鬚。黑牽牛頭末。各兩半。當歸。五錢。為末。每空心酒服二錢。忌熱物。五日見效。【孫氏集效方】

用量 八分至錢半。

施用宜忌 凡小便利者禁

用。忌地黃。葱蒜。

參攷資料 蓮鬚溫而不熱。

血家瀉家。尊為上品也。【孫思邈】

蓮鬚甘。澀。清心而諸竅之血出

可止。固腎而丹田之精氣無遺。可

止洩瀉。能黑髮。【陳默齋】

【從蓉】即肉蓯蓉之簡稱。詳【肉蓯蓉】條。

【專】 命名 蓯字本作蓯。純乃

絲名。其莖似之故名。

古籍別名 蓯菜（別錄）。莧水

莧菜。【詩疏】露葵。馬蹄草。錦帶。缺盆

草。嫩莖名。稚蓯。舒長者名。絲蓯。秋

老者名。葵蓯。蓯蓯。現蓯。龜蓯。【綱

目】

外國名聞 Braconia Purpurea, caesp. (拉丁) シンサイ ヌナハ (日本)

基本 係睡蓮科蓯屬。藥用蓯

菜之莖葉。

產地 生江浙湖澤中。

形態 蓯菜為水草類之多年

生草本。亦為蔬類植物之一種。其

嫩莖嫩葉。被以黏液。葉橢圓形如

楸狀。浮水面。有長葉柄。着生於葉

身下面之近中央處。夏月花生於

葉腋。萼三片。花冠三瓣。俱呈赤褐

色。雄蕊紫赤色。而數多。結實如棠

梨。中有細子。其莖葉可供食。與藥

用。

性質 甘。寒。無毒。

主治 消渴。熱痺。



蓯

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論蓯菜曰。和鯽魚作羹食。下氣止嘔。多食。壓丹石。補大小腸。虛氣。不宜過多。【宋】大明諸家本草論蓯菜曰。治熱。疸。厚。腸。胃。安。下。焦。逐。水。解。百。藥。毒。并。蠱。氣。

參攷資料 蓯性冷而補下

氣。雜。體。魚。作。羹。食。亦。逐。水。而。性。滑。

服。食。家。不。可。多。用。【陶弘景】蓯

久。食。大。宜。人。合。鮑。魚。作。羹。食。主。胃

弱。不。下。食。者。至。效。又。宜。老。人。應。入

上。品。故。張。綱。論。臨。秋。風。思。吳。中。之。鱸

蓯。菜。也。【蘇恭】蓯。體。滑。常。食。發

氣。令。關。節。急。嗜。睡。脚。氣。論。中。令。人

食。之。此。誤。極。深。也。溫。病。後。脾。弱。不

能。磨。化。食。者。多。死。子。所。居。近。湖。湖

中。有。蓯。菜。年。中。疫。甚。飢。人。取。蓯。食

之。雖。病。瘥。者。亦。死。至。秋。大。旱。人。多

血。痢。湖。中。水。竭。掘。蓯。食。之。闔。境。無

他。蓯。藕。之。功。於。斯。見。矣。【陳藏器】

蓯。雖。冷。補。熱。食。及。多。食。亦。擁。氣

不。下。甚。損。人。胃。及。齒。令。人。顏。色。惡

損。毛。髮。和。醋。食。令。人。骨。痿。【孟詵】

【蓯菜】即蓯之古籍別名。典見別

錄。詳【蓯】條。

【蓯】即白花益母草之古籍別名。

十五畫 蓮

配合應用 ①治經血不止。瑞

蓮散。用陳蓮、蓬殼、燒存性。研末。每服二錢。熱酒下。(婦人經驗方)

②治血崩不止。不拘冷熱。用蓮

蓬殼、荊芥穗各燒存性。等分。為末。每服二錢。米飲下。(聖惠方)

③治產後血崩。蓮蓬殼五箇。香附二兩。各燒存性。為末。每服二錢。米飲下。日二。(婦人良方)

④治漏胎下血。蓮房燒研。麴糊丸。梧子大。每服百丸。湯酒任下。日二。(朱氏集驗方)

⑤治小便血淋。蓮房燒存性。為末。入麝香少許。每服二錢。半。米飲調下。日二。(經驗方)

⑥治天泡瘡。蓮蓬殼燒存性。研末。并泥調塗神效。(海上方)

用量 錢半至三錢。

參攷資料 蓮房入厥陰血分。消癰散血。與荷葉同功。亦急則治標之意也。李時珍。

【蓮花】 處方用名 蓮花。蓮荷。荷。花。瓣。

古籍別名 芙蓉。芙蓉。(古今注) 水華。菡萏。綱目)

基本 屬睡蓮科。為蓮藕之花。

產地 凡栽蓮藕之池澤間恒有之。

採取 六七月間採之。陰乾。用。性質 苦。甘。溫。無毒。

效能 利溼。貼瘡。用作瘡癰藥。主治 鎮心。益色。駐顏。輕身。

配合應用 ①服食駐顏。七月七日。採蓮花七分。八月八日。採根八分。九月九日。採實九分。陰乾。搗篩。每服方寸匕。溫酒調服。(太清草木方)

②治天泡瘡。荷花貼之。(簡便方)

③難產催生。蓮花一瓣。書人字吞之。即易產。(肘後方)

④治墜損。嘔血。墜跌。積血。心胃。嘔血不止。用乾荷花為末。每酒服方寸匕。其效如神。(楊洪賢方摘要方)

用量 三分至八分。

施用宜忌 忌地黃。葱蒜。

【蓮花】 蓮花之處方用名。詳。

【蓮花】 蓮花之處方用名。詳。

【蓮花】 蓮花之處方用名。詳。

【蓮實】 即蓮肉之原名。詳「蓮肉」。

條。

【蓮蓬】 即蓮房之處方用名。詳「蓮房」條。

【蓮蓬殼】 即蓮房之處方用名。詳「蓮房」條。

【蓮蓬】 即蓮蓬之原名。詳「蓮蓬」條。

【蓮蓬】 即蓮蓬之原名。詳「蓮蓬」條。

【蓮蓬】 即蓮蓬之原名。詳「蓮蓬」條。

【蓮蓬】 即蓮蓬之原名。詳「蓮蓬」條。

【蓮蓬】 即蓮蓬之原名。詳「蓮蓬」條。

【蓮蓬】 即蓮蓬之原名。詳「蓮蓬」條。

【蓮蓬】 即蓮蓬之原名。詳「蓮蓬」條。

【蓮蓬】 即蓮蓬之原名。詳「蓮蓬」條。

【蓮蓬】 即蓮蓬之原名。詳「蓮蓬」條。

【蓮蓬】 即蓮蓬之原名。詳「蓮蓬」條。

一六五四

精君相火邪也。

配合應用 ①治勞心吐血。蓮子心七個。糯米二十一粒。為末。酒服。(臨安張上舍方)

②治小便遺精。蓮子心一撮。為末。入辰砂一分。每服一錢。白湯下。日二服。(醫林集要方)

用量 五分至八分。

參攷資料 ①食蓮子不去心。令人作吐。(陳藏器) ②蓮心。甘苦。鹹。倒生根。由心走腎。能使心火下通於腎。又回環上升。能使腎水上潮於心。(王秉衡)

【蓮藕】 即藕之處方用名。詳「藕」條。

【蓮藕】 即藕之處方用名。詳「藕」條。

【蓮藕】 即藕之處方用名。詳「藕」條。

【蓮藕】 即藕之處方用名。詳「藕」條。

【蓮藕】 即藕之處方用名。詳「藕」條。

【蓮藕】 即藕之處方用名。詳「藕」條。

【蓮藕】 即藕之處方用名。詳「藕」條。

【蓮藕】 即藕之處方用名。詳「藕」條。

【蓮藕】 即藕之處方用名。詳「藕」條。

末。一匙。梗米半升。以水煮粥常食。
(普濟方)

⑤治小兒熱渴。蓮實二十枚。炒。

浮萍二錢半。生薑少許。水煎分三

服。(聖濟總錄方)

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡大便燥結者禁

用。

著名方劑 清心蓮子飲。治心

虛有熱小便赤澀(局方)黃芩麥

冬(去心)地骨皮甘草(炙)車前

子各半兩。石蓮子(去心)茯苓

(去皮)黃耆(蜜炙)人參各七錢

半。上剉末爲散。每服三錢。另用麥

冬十粒。水煎八分。水中沉冷。空心

服。發熱加柴胡薄荷。(此以散作

湯飲)

參攷資料 ①蓮產於淤泥而

不爲泥染。居於水中而不爲水沒。

根莖花實凡品雖同。清淨濟用羣

美兼得。自藕薔而節節生莖生葉

生花。生藕由莖莖而生。生莖生葉

生花。生藕由莖莖而生。生莖生葉

生花。生藕由莖莖而生。生莖生葉

十五畫 蓮

釋氏用爲引譬。妙理具存。醫家取

爲服食。百病可却。蓋蓮之味甘氣

溫。而性齋稟清芳之氣。得稼穡之

味。乃脾之果也。脾者。黃宮所以交

媾水火。會合木金者也。土爲元氣

之母。母氣既和。津液相成。神乃自

生。久視耐老。此其權輿也。昔人治

心腎不交。勞傷白濁。有清心蓮子

飲。補心腎益精血。有瑞蓮丸。皆得

此理。(李時珍) ②陳蓮子雖久煮

不糜者。取蓮根新出嫩芽同煮。則

爛矣。(汪謝成) ③蓮子交心腎不

可去心。然能滯氣。單用心則大降

心火。(王秉衡) ④蓮子最補胃氣

而鎮虛逆。若反胃由於胃虛。而氣

衝不納者。但日以乾蓮子細嚼而

咽之。勝於他藥多矣。至痢症噤口

熱。即傷其胃中清和之氣。故以黃

連苦泄其邪。即仗蓮子甘鎮其胃。

今肆中石蓮皆僞味苦反能傷胃。

切不可用。惟鮮蓮子煎之清香不

渾。鎮胃之功。功勝於如無鮮蓮乾蓮

亦可。(王孟英) ⑤藕生水中。其葉

名荷。按爾雅云。荷。芙蕖。其莖茄其

葉蓮。其木蔞。其華菡萏。其實蓮。其

根藕。其中節。節中惡。即昂註云。芙

蕖。總名也。別名芙蓉。江東人呼爲

荷。菡萏。蓮花也。節。蓮實也。惡。節中

青心也。郭璞註云。蒂乃莖下白藕

在泥中者。蓮乃房也。節乃子也。惡

乃中心苦惡也。江東人呼荷花爲

芙蓉。北人以藕爲荷。亦以蓮爲荷。

蜀人以藕爲茹。此皆習俗傳誤也。

陸機詩疏云。其莖爲荷。其花未發

爲菡萏。已發爲芙蓉。其實蓮蓮之

皮青。裏白。其子節。節之殼青。肉白。

節內青心。二三分爲苦惡也。(韓

保昇) ⑥爾雅以荷爲根名。韓氏

以荷爲葉名。陸機以荷爲莖名。按

莖乃實葉者也。有負荷之義。當從

陸說。蓋乃嫩藕如竹之行鞭者。節

生二莖。一爲葉。一爲花。盡處乃生

藕。爲花葉根實之本。顯仁藏用。功

成不居。可謂退藏於密矣。故謂之

密。花葉當偶生。不偶不生。故根曰

藕。或云藕善耕泥。故字從耦。耦者

耕也。茹音加。加於藕上也。蓮音溫

遠於密也。菡萏。函合未發之意。芙

蓉。敷布容豔之意。蓮者連也。花實

相連而出也。節者。的也。子在房中

點點如的也。的乃凡物點註之名

惡猶意也。含苦在內也。古詩云。食

子心無葉。苦心生意存是矣。(李

時珍)

【蓮房】

處方用名 蓮蓬殼。蓮

殼。基本 屬睡蓮科。爲蓮實之果

產地 陳仁山藥物生產辨云。

蓮蓬中西各省各屬均有。

形態 蓮房形圓極似蜂房。蒂

部隆起。肉藏果實。生時色青熟則

色轉黃褐。

採取 七八月採之。

製法 凡使以陳久者良。人研

用或焙用。

性質 苦。澀。溫。無毒。

效能 化瘀止血。用作收瀉藥。

主治 治血脈腹痛。及產後胎

衣不下。酒煮服之。水煮服之。解野

菌毒。

歷代記述攷證 ①唐孟詵食

療本草論蓮房曰。破血。明。李時

珍本草綱目論蓮房曰。止血。崩下

血。潮。血。清。王士雄隨息居飲食

譜論蓮房曰。蓮房破血。亦能止血。

酒煮服。治胎衣不下。水煎飲解野

菌毒。

十五畫 蓮

亦有每一斤用額豬肚一個盛貯
煮熟搗焙用。

性質 甘平。瀟。無毒。

效能 補心益脾。治泄固精。用

作強壯滋養藥。

主治 補中養神。益氣力。除百

疾。久服輕身耐老不飢延年。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食

療本草論蓮肉曰主五臟不足傷

中益十二經脈血氣【宋】蘇頌

嘉祐圖經本草論蓮肉曰搗碎和

米作粥飯食輕身益氣令人強健

【宋】大明日華諸家本草論蓮肉

曰止渴去熱安心止痢治腰痛及

泄精多食令人歡喜【明】李時珍

本草綱目論蓮肉曰交心腎厚腸

胃固精氣強筋骨補虛損利耳目

除寒溼止脾泄久痢赤白濁女人

帶下崩中諸血病【明】陳嘉謨本

草蒙箋論蓮肉曰安靖上下君相

火邪【明】繆希雍本草經疏論蓮

肉曰藕實得天地清芳之氣稟土

中沖和之味故味甘氣平別錄寒

無毒入足太陰陽明兼入手少陰

經土爲萬物之母後天之元氣藉

此以生化者也母氣既和則血氣

生神得所養而疾病無由來矣藕

實正稟稼穡之化乃脾家之果故

主補中養神益氣力除百疾及久

服輕身耐老不飢延年也孟詵主

五臟不足傷中益十二經脈血氣

大明主止渴去熱安心止痢治腰

痛及洩精多食令人喜皆資其補

益心脾之功也【明】李士材本草

圖解論蓮肉曰蓮子甘平補中養

神清心固精定渴除崩帶止赤白

濁安靖上下君相火邪使心腎交

而成既濟之妙【清】黃宮繡本草

求真論蓮肉曰蓮子書載能入心

脾腎三經然稟氣清芳味得中和

甘溫而瀟究皆脾家藥耳中和則

上下安養君令臣恭而無不交之

患矣故書載能補心與腎及通十

二經絡血脈即是此意且其味瀟

則能使氣不走而夢遺崩帶失血

等症可理味瀟則腸胃亦固而無

五更洞泄之虞惟大便燥者勿服

去心皮蒸熟焙乾用得茯苓山藥

白朮枸杞良蓮心味苦性寒能治

心熱故產後血竭者最宜石蓮色

黑入水則沈入鹵則浮煎鹽用此

鹹味苦性寒能除喉口熱毒淋濁

果因熱成亦可以解然必本於蓮

實老於蓮房墜入汙泥經久堅黑

如石者方佳若使出自粵東產於

樹上大苦大寒不宜入藥【清】王

士雄隨息居飲食譜論蓮肉曰藕

實（即蓮子）鮮者甘平清心養胃

治噤口痢生熟皆宜乾者甘溫可

生可熟安神補氣鎮逆止嘔固下

焦已崩帶遺精厚腸胃愈二便不

禁可磨以和粉作糕或同米煮爲

粥飯健脾益腎頗著奇助以紅花

所結肉厚而輭者良但性澀滯氣

生食須細嚼熟食須開水泡剝衣

挑心煨極爛

近人學說 賈九如曰蓮肉生

於水澤長於夏令凝純陽而結得

天陽地陰澆淡之氣稟性和平成

清芳之質用之去衣主醒脾和胃

益肺厚腸養精神補元氣利耳目

長肌肉止脾瀉瀉痢後宜倍用之

若連衣色類於血味澀能飲諸失

血後佐參苓以補脾陰使統血歸

經妙甚

配合應用 ①蓮子得川黃連

白芍藥白朮乾葛升麻紅麴橘

紅甘草滑石烏梅爲丸治滯下如

神。

一六五二

②治下痢飲食不入俗名噤口

痢此證大危用鮮蓮肉一兩黃連

五錢人參五錢水煎濃細細與呷

服完思食便瘥

③治脾胃俱虛五更瀉瀉蓮子

菟絲子五味子山藥黃山藥車前

子肉豆蔻砂仁橘紅灰實人參補

骨脂巴戟天有肺熱者去人參肉

豆蔻

④治服食不饑石蓮肉蒸熟去

心爲末煉蜜丸梧子大日服三十

丸此仙家方也【孟詵食療方】

⑤補中強志耳目聰明用蓮實

半兩去皮心研末水煮熟以粳米

三合作粥入末攪勻食【聖惠方】

⑥補虛益損水芝丹用蓮實半

升酒浸二宿以牙豬肚一箇洗淨

入蓮在內縫定煮熟取出曬乾爲

末酒煮米糊丸梧子大每服五十

丸食前溫酒送下【醫學發明方】

⑦治小便頻數下焦真氣虛弱

者用上方醋糊丸服

⑧治白精遺精用蓮肉白茯苓

等分爲末白湯調服【普濟方】

⑨治眼赤作痛用蓮實去皮研

熟。豈得同哉。(汪機) 此類凡五種子嘗親採以爾雅所列者校之始得其的諸家所說皆未可信也。一種蔓藤繁衍莖有倒刺逐節生葉大如掌狀類小葵葉面青背白厚而有毛。六七月開小白花。就蒂結實三四十顆成簇。生則青黃熟則紫黯。微有黑毛。狀如熟棗而扁。冬月苗葉不凋者。俗名割田蕨。即本草所謂蓬蘽也。一種蔓小於蓬蘽亦有鈎刺。一枝五葉。葉小而面背皆青。光薄而無毛。開白花。四五月實成。子亦小於蓬蘽而疎稀。生則青黃熟則烏赤。冬月苗凋者。俗名割田蕨。即本草所謂蓬蘽子。爾雅所謂葢缺也。此二者俱可入藥。一種蔓小於蓬蘽一枝三葉。葉面青背淡白而微有毛。開小白花。四月實熟。其色紅如櫻桃者。俗名割田蕨。即爾雅所謂蓬蘽者也。故郭璞註云。藤即葢也。子似覆盆而大赤色。酢甜可食。此種不入藥用。一種樹生者。樹高四五尺。葉似櫻桃葉而狹長。四月開小白花。結實與覆盆子一樣。但色紅為異。俗亦名蕨。即爾雅所謂山葢。陳藏器本

十五畫 蓬

蓬

草所謂懸鈎子者也。詳見本條。一種就地生蔓。長數寸。開黃花。結實如覆盆而鮮紅。不可食者。本草所謂蛇母也。見本條。如此辨析。則蓬蘽覆盆自定矣。李當之。陳士良。陳藏器。寇宗奭。汪機五說近是。而欠明悉。陶弘景以蓬蘽為根。覆盆為子。馬志。蘇頌以蓬蘽為苗。覆盆為子。蘇恭以為一物。大明以樹生者為覆盆。皆臆說。不可據。(李時珍) 【蓬蘽子】即蓬蘽之處方用名。詳『蓬蘽』條。 【蓬蘽葉】即蓬蘽之處方用名。詳『蓬蘽』條。 【蓬蘽】即鹽之產於草上者。功用詳『食鹽』條。 【蓮子粉粥】 基本 本品即蓮實粉和米煮成之粥。 主治 健脾。止洩痢。 【蓮子草】即鱧腸之古籍別名。典見唐本草。詳『鱧腸』條。 【蓮中慈】即蓮慈之處方用名。詳『蓮慈』條。 【蓮慈】條。即雨前茶之古籍別

名。典見綱目拾遺。詳『雨前茶』條。 【蓮肉】 原名 蓮實。藕實。 命名 蓮者連也。花實相連而出。故名。其實俗稱曰蓮子。 處方用名 湘蓮肉。湘蓮。白蓮子。白蓮肉。建蓮。建蓮肉。 古籍別名 水芝。(本經) 葍葍。(爾雅) 玉擎。玉蛹。荇。荷。蚌。葍。數珠實。珠麗。湖自紫的。澤芝。藕子。(和漢藥考) 外國名 蘭 Nelumbo nucifera, Gaertn. (拉) 基本 屬睡蓮科。其所結之蓮蓬。中有子。供藥用。即蓮肉也。 產地 陳仁山藥物生產辨云。白蓮產江西玉山縣。原色者為最。其餘浙江金華府。安徽省。均有出。已上名曰建蓮。建蓮產福建。觀其外實似醃爛。皮色老紅。但實味之甘甜居首。湘蓮產湖南湘潭。肉質幼嫩。宜粉紅皮色。食譜喜用之。安南東京產者。名東京蓮。類似湘蓮。但粒細小。岳州洞庭湖所產者。為湖蓮。細粒皮嫩。且味越。湖北省宋河。木河。江西省都陽。饒州等。暹羅所產者。名暹蓮。與湘蓮同類。略

為大粒。

形態 蓮肉為類殼斗之實。外呈綠色。未熟者柔輭。而味甘。破之

中有苦味之青芽。有至秋季成熟者。作褐黑色。堅硬如石。質謂之石蓮子。



種植 以蓮子種者生遲。以藕芽種者。最易生長。其芽穿泥成白藕。即莖也。莖者乃莖下白藕在泥中者。

採取 紅花者蓮優藕劣。白花者蓮劣藕優。故採實宜紅花者。採藕宜白花者。各取其得氣之盛也。其子於六七月間採嫩者。生食之。味頗脆美。老者。八九月採取。曬乾。製法 陶弘景曰。凡使蓮子。須八九月採。黑堅如石者。乾擗破。蘇頌曰。其蒂至秋黑而沉水。為石蓮子。可磨為飯食。李時珍曰。劉其黑殼。謂之蓮肉。以水浸去赤皮。青心。入藥須熟去心。或曬或焙乾用。

於明和年間從琉球傳入。(和漢藥考)

【蓬莖茂】即蓬莖朮之古籍別名。典見開寶本草。詳『蓬莖朮』條。

【蓬莖蓬】即蓬莖朮之處方用名。詳『蓬莖朮』條。

【蓬萊】即木天蓼之古籍別名。典見和漢藥考。詳『木天蓼』條。

【蓬萊花】即瑞香之古籍別名。典見和漢藥考。詳『瑞香』條。

【蓬萊香】即沈香大如竺者之古籍別名。典見綱目。詳『沈香』條。

【蓬萊紫】即瑞香之古籍別名。典見和漢藥考。詳『瑞香』條。

【蓬蓬】即蓬莖朮之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蓬莖朮』條。

【蓬蒿】①即蒿蒿之古籍別名。典見綱目。詳『蒿蒿』條。②即沙米之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『沙米』條。

【蓬蘽】即蘆花之原名。詳『蘆花』條。

【蓬蘽】**命名** 本品藤葉繁衍。蓬蘽蘽蘽故名。

處方用名 蓬蘽子蓬蘽葉。
古籍別名 覆盆陵蔴陰蘽。

(別錄)寒莓。(會編)割田蔴。(綱目)草莓。(日名)

外國名詞 Rubus Thun-

bergii, S. et Z. (拉丁)クサイ

チゴ ヤブイチゴ ワセイチ

ゴ ナベイチゴ カンスイイ

チゴ(日本)

基本 係薔薇科。爲懸鉤子屬。

藥用蓬蘽之子實與莖葉。

產地 在山野川澤間。

形態 蓬蘽爲多年蔓生草本。

莖有倒刺。逐節生葉。葉有三小葉。

作橢圓形。大如掌。面青背白。有缺

刻。莖與葉俱生細長之軟毛。夏秋

間枝梢開五瓣之白花。花後就帶

結實成簇。與蛇莓相似。生則青黃

熟則紫黑。微有黑毛。其狀亦似熟

椹而扁。經冬不凋。

採取 八九月間採實。莖葉採

無時。採得陰乾。

性質 酸平。無毒。

效能 補陰氣。益精力。用爲強

壯藥。

主治 安五臟。益精氣。長陰。令

人堅強。志倍力有子。久服輕身不

老。(本經)療暴中風。身熱大驚。

(別錄)

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新

修本草論蓬蘽子曰。益顏色。長髮

耐寒溼。

配合應用 長髮不落。蓬蘽子

榨油日塗之。(聖惠方)

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡有溼熱者禁用。

參攷資料 ①蓬蘽與覆盆同

類。故別錄謂一名覆盆。此種生於

丘陵之間。藤葉繁衍。蓬蘽藥異

於覆盆。故曰蓬蘽。陵蔴即藤也。其

實八月始熟。但人名割田蔴。(李

時珍) ②蓬蘽是根名。方家不用

乃昌容所服。以易顏者也。覆盆是

實名。李當之云。是人所食莓子。以

津汁爲味。其核微細。今藥中用覆

盆小異。未詳孰是。(陶弘景) ③

覆盆蓬蘽。乃一物異名。本謂實非

根也。李云。莓子者。近之矣。然生處

不同。沃地則子大而甘。瘠地則子

細而酸。此乃子有酸味。根無酸味。

(蘇恭) ④蓬蘽乃覆盆之苗莖。覆

盆乃蓬蘽之子也。按切韻。莓音茂

其子覆盆也。蘽者。藤也。則蓬蘽明

是藤蘽矣。陶言蓬蘽是根。蘇言是

子。一物異名。皆非矣。(馬志) ⑤蓬

蘽是覆盆苗。處處有之。奉吳尤多。

苗短不過尺。莖葉皆有刺。花白子

赤黃。如牛彈丸。而下有蒂承之。

如柿蒂。小兒多食之。五月採實。其

苗葉採無時。江南謂之葑。然其地

所生差晚。三月始有苗。八九月花

開。十月實用。則同。(蘇頌) ⑥今

觀採取之家說。蓬蘽似葑。子紅

色。而大其味酸。甘葉似葑。葑有

刺。覆盆子小。其苗各別。諸家本草

不識。故皆說蓬蘽是覆盆子之根。

(陳士良) ⑦莓子是蓬蘽子也。樹

莓是覆盆子也。(大明) ⑧蓬蘽非

覆盆也。別是一種。雖枯敗而枝梗

不散。今人不見用此。(寇宗奭) ⑨

其類有三種。惟四月熟。狀如覆盆

而味甘美者。爲是覆盆子。餘不堪

入藥。陳藏器 ⑩蓬蘽撒人謂之

寒莓。沿甄作葑。蔓生莖小葉密多

刺。其實四五十顆作一朶。一朶大

如麤面。霜後始紅。蘇恭謂經以此

註覆盆誤矣。江南覆盆亦四五月

熟。何當差晚耶。覆盆莖粗葉疎。結

實大而疎散。不似寒莓。莖細葉密。

結實小而成朶。一則夏熟。一則秋

移電閃之能。去積聚癖塊。經閉血瘀。撲損疼痛。與三稜功用頗同。亦勿過服。⑤張山雷曰。蓬莪茂今作蓬莪。亦作蓬莪朮。茂字從艸從戊。而讀如朮。義不可曉。字書惟一見於字彙補。亦不詳其義。此藥生於根下。質極堅硬。味苦辛溫。故爲下氣除寒。消食逐飲。破積攻堅。通瘀行血。亦除癥瘕之藥。開寶本草謂治小腹痛。霍亂冷氣。吐酸水。解毒食飲不消。婦人血氣結積。丈夫奔豚。甄權謂破疰癖冷氣。海藏謂通肝經聚血。大明謂治一切氣閉胃消食。通月經。消瘀血。止撲損痛下血。及內損惡血。無非一溫通攻剋作用。惟實症爲宜。故石頑謂虛人得之。積不去而真已竭。殊爲可慮。須得參朮健運。補中寓瀉。乃爲得力。

配合應用 ①蓬莪朮得人參、橘皮、縮砂蜜、京三稜、肉豆蔻、青皮、麥蘖、穀蘖、木香。消一切飲食停滯積聚。及小兒癥癖甚良。

②治一切冷氣衝心切痛。發即欲死。久患心腹痛時發者。蓬莪茂醋煮二兩。木香煨一兩。爲末。淡醋

湯下半錢。(楊子建護命方) ③治婦人血氣遊走作痛。及腰痛。同乾漆等分。爲末。酒服二錢。腰痛核桃酒下。(普濟方)

④治小兒盤腸內約痛。以茂牛兩用。阿魏一錢。化水浸過時。焙研紫蘇湯下一字。(保幼大全方)

⑤治小兒氣痛。以及泡熱爲末。熱酒服一錢。(十全普救方)

⑥治初生吐乳不止。用茂少許。鹽二釐。乳一合。煎三五沸。去滓。入牛黃二釐。服之甚效。(保幼大全方)

⑦治渾身燎泡。每箇出水。有醫一片。如指甲大。其泡復生。抽盡肌肉。即不可治。用茂同三稜各五錢。爲末。分三服。酒調連進。愈。(危氏得效方)

⑧治小腸臟氣。非時痛不可忍。用蓬莪茂研末。空心葱酒服一錢。(楊子建護命方)

⑨治上氣喘急。蓬莪茂五錢。酒一盞。半煎八分服。(衛生方)

⑩正元散。治氣不接續。兼治滑泄。及小便熱。王丞相服之。有驗。用蓬莪茂一兩。金鈴子去核一兩。爲

末。入蓬砂一錢。煉過研細。每服二錢。溫酒或鹽湯空心服。(孫用和祕寶方)

用量 八分至錢半。
施用宜忌 凡體虛有積者。禁用。如欲用之。須與參朮同施。

著名方劑 易簡紅丸。破癥消癥。又治小兒脾胃之症。極有神效。(古方新解) 蓬莪、三稜、橘皮、青皮、胡椒、乾薑、阿魏、礬石。上水泛爲丸。每服六十九丸。鹽湯下。

參攷資料 ①蓬莪茂古方不見用者。今醫家治積聚諸氣。爲最要之藥。與三稜同用之。良婦人藥中亦多使。(蘇頌) ②蓬莪色黑。破氣中之血。入氣藥。發諸香。雖爲泄劑。亦能益氣。故孫尚藥用治氣短。不能接續。及大小七香丸。集香丸諸湯散。多用此也。又爲肝經血分藥。(王好古) ③鬱金入心。專治血分之病。薑黃入脾。兼治血中之氣。蓬入肝。治氣中之血。稍爲不同。按王執中實生經云。執中久患心脾疼。服薑黃、蓬莪反脹。用書域所載蓬莪、蓬莪、薑黃、熟研末。以水與酒醋煎服。立愈。蓋此藥能破氣中之

血也。(李時珍) ④蓬莪朮得酒醋良。(大明) ⑤今浙江或有之。三月生苗。在田野中。其莖如錢大。高三三尺。葉青白色。長一二尺。大五寸。以來頗類蘆薈。五月有花。作穗。黃色。頭微紫。根如生薑。而茂在根下。似雞卵。大小不常。九月採削去粗皮。蒸熟。曝乾用。(蘇頌) ⑥蓬莪茂生西戎及廣南諸州。葉似蘆薈。子似乾椹。(李時珍) ⑦蓬莪茂行氣破血。散結。是其功能之所長。若夫婦人小兒氣血兩虛。脾胃素弱。而無積滯者。用之反能損真氣。使食愈不消。而脾胃益弱。即有血氣凝結。飲食積滯。亦當與健脾胃補益元氣藥同用。乃無損耳。(繆希雍) ⑧日本藥局方曰。莪朮係採掘其球形之根莖。多從橫徑或縱徑切斷者。本品直徑二·五至四仙米。外面灰色。有多數根痕。切斷面亦爲灰色。皮厚約二至五密米。作圓板形者。概現有凹陷脈管束。簡其柔韌組織中。含有巨大扁平呈偏心性層紋之澱粉粒。本品氣味如樟腦而帶苦味。(和漢藥考) ⑨莪朮原爲東印度產。日本

鉅藥。有人以爲礪砂與腸胃之內

皮相遇。可以得益。小兒口內生白

點。可將礪砂一錢。蜜糖一兩。和勻

搽於患處。(儒門事親方)

【蓬活】即沙蟲之古籍別名。典見

萬華術。詳「蟲」條。

【蓬草子】 古籍別名 飛蓬草。

(本草拾遺) 產地 生田野間。

形態 蓬草爲穀類之一種。種

類甚多。莖高尺餘。葉如柳葉。有鋸

齒。花甚小。色白。秋枯根拔。風捲而

飛。其子可供藥用。

性質 酸。溫。平。無毒。

主治 療飢。作飯食。

【蓬莪朮】 處方用名 莪朮。蓬

莪。蓬莪別名 蓬莪莪。蓬莪莪。

茂。蓬莪莪。茂。波殺。青莪。蓬莪。蓬莪。

破關符。(和漢藥考)

外國名詞 Zedoarial (拉丁)

Zedoary (英) Zilver (德)

基本 屬薑荷科。藥用莪朮之

根。

產地 陳仁山藥物生產辨云。

莪朮產南寧、田州。大粒光滑者佳。安南東京亦有出。

形態 莪朮春季自宿根抽莖。

與葉俱類。莖葉稍狹。有紫色斑

點。夏季於莖旁開紅紅色花。與鬱金

花相似。藥用爲芋狀地下莖。曬乾

者。外部黃褐色。內部暗色。大一二

寸。中含澱粉頗多。其實亦作粉狀。

味緩和。如樟腦而微苦。

種類 一名蓬莪者。黑色。一名

莪者。黃色。一名波殺者。味甘。有大

毒。莪朮在根下並生一好一惡。

惡者有毒。西戎人取之。先飼羊食。

羊不食者。棄之。莪朮即雨中薑

黃根也。生海南者。名蓬莪莪。

採取 八九月間。採根削去粗

皮。蒸熟或曝乾。

製法 雷斅曰。凡使莪莪。於砂

盆中以醋磨令盡。然後於火畔燻

乾。重篩過用。蘇頌曰。此物極堅硬

難搗。治時熱灰火中煨令透。乘熱

搗之。即碎如粉。李時珍曰。今人多

以醋炒。或煮熟入藥。取其引入血

分也。

性質 苦。辛。溫。無毒。

成分 含有淡黃色濃稠揮發

油、樹脂、澱粉等。

效驗 破血瘀。散氣結。治癥瘕。

瘕瘕。瘕用。作芳香性之健胃藥。治

消化不良。症及作祛痰藥。亦有用

爲通經藥。

主治 心腹痛。中惡。疰。忤。鬼。氣。

霍亂。冷氣。吐酸。水。解毒。食飲不消。

酒。研服之。又療婦人血氣結積。丈

夫奔豚。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥

性本草論莪朮曰。破瘕瘕。冷氣。以

酒醋磨服。【宋】大明日華諸家本

草論莪朮曰。治一切氣。開胃消食。

通月經。消瘀血。止撲損痛。下血。及

內損惡血。【元】王好古湯液本草

論莪朮曰。通肝經聚血。【明】李士

材本草圖解論莪朮曰。蓬莪莪。莪

辛而溫。專走肝家。破積聚。惡血。疏

痰。食作痛。【明】繆希雍本草經疏

論莪朮曰。蓬莪莪。味苦辛。其氣溫

能破氣中之血。入氣藥。發諸香。主

積聚。諸氣。爲最要之藥。與京三稜

同用之。良。心腹痛者。非血氣不得

調和。即是邪客中焦所致。中惡。疰

忤。鬼。氣。皆由氣不調和。臟腑壅滯。

陰陽乖隔。則疫癘。疰。忤。鬼。氣。得以

惡之。茂氣香烈。能調氣通竅。破利

則邪無所容而散矣。解毒之良。亦

同乎是。其主霍亂。冷氣。吐酸。水。及

飲食不消。皆行氣之功也。故多用

酒磨。又療婦人血氣結積。丈夫奔

豚。入肝破血。行氣故也。多用醋磨

鬱金。入心亦入肝。專主血分。亦散

肝鬱。茂與三稜。專能行氣破積。壅

黃行氣破血。入脾爲多。【清】黃宮

繡本草求真論莪朮曰。莪朮辛苦

氣溫。大破肝經氣分之血。盡入血

氣。安和則氣與血通。血與氣附。一

有所歸。非氣盛而血凝。卽血壅而

氣滯。三稜氣味苦平。既於肝經血

分逐氣。莪朮氣味辛溫。復於氣分

逐血。故凡氣因血凝而見。積痛不

解。吐酸。奔豚。痞癥。癰疽。等症。須

當用此調治。俾氣自血而順。而不

致閉結不解矣。但蓬莪莪雖磨。積

之味。若虛人服之。最屬可危。須得

參朮補助爲妙。大者爲廣。灰火

煨透。乘熱搗之。或醋磨。酒磨。或煮

熟用。

近人學說 賈九如曰。蓬朮

色紫。入肝。屬血分。以其味辛。性烈。

專攻氣中之血。主破積。削堅。有星

砂二分細末。煉蜂蜜十六分。甘油一分。秤共研勻爲度。治口瘡。又研砂末及冰花糖或蜜糖各等分。研勻如小兒口爛。外用此塗之。又研砂一錢。蜂蜜二錢。水足五兩。共化勻爲度。治咽喉類病。又研砂一分。甘油一分。番薇花汽水十六分。共化勻爲度。婦人洗面用之。又研砂一分。豬油膏八分。研勻爲度。治凍瘡。外吹乳。又研砂一錢。白醋一兩六錢八分。和勻。搽金錢癬。又研砂八錢末。甘油四兩二錢。和勻。如療口瘡及皮膚癬症。即以此塗之。又研砂末調水。或以甘油相和。搽嬰兒吮乳而致乳頭爛。勻妙。如潰爛瘡。則宜塗以研砂水。又研砂二分末。清水二兩五錢二分。和化。如婦人白帶。則用水節射入。其用量大人每服一分至八分。至小兒則須量其大小用之。每服五釐至一分半。以沸水調服。又有一種名礪酸。係從礪砂與鹽強水製煉而成。更有生成在火山中。後經煉而成。西國所用之礪酸。大半爲地產。如多斯加納與里伯利海島等處。地面有開裂之處。常噴水汽。汽中有礪

酸。將開裂處四面挖深。以磚與灰作內面。引水入其中。則水汽噴入水內。令水漸沸。待水收礪酸飽足。隨取其水。熬至將乾。待冷。凝成顆粒。曬乾。則爲尋常出售之礪酸。其作用能去臭。殺除微細生物。止發霉腐變。擦爛瘡。止膿。與架波匿酸（石炭酸）略同。如打傷割毒痛傷。口用此藥水洗之。能解毒去微細生物。免其發膿。（西國割症後所用壓傷口之棉紗。可用礪酸沸水化至不能化。乃透漚其布。焙乾用之。）又如瘡。水蠟癩。沸水傷。皮膚作癢。肛門作癢。用以或搽或洗。均效。又如熱症中喉內生假皮。以新筆蘸藥水擦之。能殺假皮之細蟲。至小兒亦可用。照冷水二十五分。化藥一分用之。則於喉內便無損礙。其功用又能治胃內發酸。外用能治火眼及惡瘡潰瘡等。如用此藥一分。沸水三分。化合。將麻絨布加入浸透。提出曬乾。敷患處。治瘡症最妙。

配合應用 ①治鼻血不止。礪砂一錢。水服立止。（集簡方）

②治勞瘵有蟲。礪砂。礪砂。兔屎

等分爲末。蜜丸梧子大。每服七丸。生甘草一分。新水一鍾。抹汁送下。自朔至望。五更時令病人勿言服之。乾坤祕方）

③治木舌腫。礪砂末。生薑片。蘇耨少時即消。（普濟方）

④治咽喉殺賊。腫痛。蓬砂。牙消等分爲末。蜜和半錢。含嚥。（直指方）

⑤治咽喉腫痛。破棉丹。用蓬砂。白梅等分。搗丸。夾子大。每嚥化一丸。（經驗方）

⑥治喉痺牙疳。益砂末吹並擦之。（集簡方）

⑦治小兒陰潰。腫大。不消。礪砂一分。水研塗之。大有效。（集玄方）

⑧治飲酒不醉。先服礪砂二錢。妙。（相感志方）

⑨治飲食毒物。礪砂四兩。甘草四兩。真香油一斤。瓶內浸之。遇有毒者。服油一小盞。久浸尤佳。及一切惡瘡。（瑞竹堂經驗方）

⑩治唇肉瘵突。南礪砂黃色者一錢。片臘少許。研末。燈草蘸點之。（直指方）

用量 八分至錢半。

施用宜忌 凡非有餘實症者禁用。

參攷資料 ①今醫家用礪砂治咽喉。最爲要切。（蘇頌）

②礪砂味甘微鹹而氣涼。色白而質輕。故能去胸膈上焦之熱。素問云。熱淫於內。治以鹹寒。以甘緩之。是也。其性能柔五金。而去垢膩。故治噎膈積聚。骨哽結核。惡肉陰潰。用之者取其柔物也。治痰熱眼目障翳用之者。取其去垢也。洪邁夷堅志云。鄧陽汪友良。因食誤吞一骨。哽於咽中。百計不下。恍惚夢一朱衣人曰。惟南蓬砂最妙。遂取一塊。含化嚥汁。脫然而失。此礪堅之微也。日華言其苦辛暖誤矣。（李時珍）

③礪砂出南海。其狀甚光瑩。亦有極大塊者。諸方稀用。可鑄金銀。（蘇頌）

④南番者色重褐。其味和。入藥其效速。西戎者其色白。其味焦。西南番有黃白二種。西者白如明礪。南者黃如桃膠。皆是煉結成如礪砂之類。西者柔物去垢。殺五金與硝石同功。與砒石相得也。（李時珍）

⑤製造之工。用礪砂以作

十五畫 蕞 蓬

【膠飴】即飴糖之處方用名。詳『飴糖』條。

【蕞牆仁】即蕞夷之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蕞夷』條。

【蕞】即羊蹄之古籍別名。典見詩經小雅。詳『羊蹄』條。

【蕞葛】即商陸之原名。詳『商陸』條。

【蓬朮】即蓬朮之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蓬朮』條。

【蓬砂】處方用名。礪砂。古籍別名。鵬砂。日華（益砂）（綱目）南蠻砂。（和漢藥考）

外國名 Borax (Borax) 基本 爲礪礪無色透明稜柱狀之小晶塊。

產地 陳仁山藥物生產辨云。蓬砂原以四川產爲正。近日少到因洋礪砂多到價平。多由喇喇吉打來。產西藏。印度。南北亞。美利加等處。以石榴子紫紫色爲好。近日新到一種。色黃白。係化學製成。形如白礬。萬國藥方卷三十一。篇名爲礪朮。又名月石。和漢藥考曰。中國。印度。波斯。意大利。祕魯等產。此

形態 蓬砂即化學上之礪酸鈉 ($\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$)。爲無色透明稜柱狀結晶體。於空氣中風化能溶於水。味鹹微甘。熱之則失却結晶水。成爲白色海綿狀物質。再加熱則熔化成爲透明玻璃狀塊。

製法 凡使以白如明礬者。良研如飛塵用。

性質 苦。辛。暖。無毒。

效能 去痰熱。消癥核。有殺菌消毒之效。用於眼病。創傷。癰疹。又有收斂之效。用於口內炎。齒齦炎。咽喉炎。更爲黏滑保涎料。在胃中能激胃液之增加。至腸略有安撫作用。少量由大便排出。大半由胃中游離而達腎臟。能增進利尿之功。且可制止尿道及膀胱之炎症。外用有直接滅菌及寄生蟲之效。惟力頗緩弱。常用以治鼻炎與黏膜炎。及作防腐利尿通經等藥。

主治 消痰止咳。破癥結喉痺。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論蓬砂曰。上焦痰熱。生津液。去口氣。消障翳。除噎膈反胃。積塊。結瘕。肉陰。潰骨。哽。惡瘡。及口齒諸病。【明】繆希雍本草經疏論齒諸病。【明】繆希雍本草經疏論

蓬砂曰。蓬砂出於西南番。採取煎淋而結。亦如硝石礪砂之類。本經味苦。辛。氣煖無毒。然詳其用。味應有鹹。氣亦微煖。色白而體輕。能解上焦胸膈肺分之痰熱。辛能散。苦能洩。鹹能軟。故主消痰止咳。喉痺及破癥結也。寇宗奭云。含化噤津。治喉中腫痛。膈上痰熱。初覺便治。不能成喉痺也。兼能去口氣。消障翳。除噎膈反胃。積塊瘕肉。陰潰骨哽。惡瘡折傷。及口齒諸病。【清】黃宮繡本草求真論蓬砂曰。蓬砂又名鵬砂。辛甘微鹹。氣溫。色白。質輕。功專入上除熱。故云能除胸膈熱痰也。是以痰嗽喉痺。噎膈積聚。骨哽結核。眼目翳障。口齒諸病。凡在胸膈以上者。無不可以投治。況性能消金。豈有垢膩塊積。而不可以消導乎。第當審實而治。勿輕投也。出西番者。白如明礬。出南番者。黃如桃膠。甘草湯煮化。微火炒鬆用。

國外學說 英美學說謂礪砂產西藏。印度。及南北亞。美利加等處。內含一酸。即礪酸。其生成而經煉者。結冰無色。過光。露空則微化。外成白散。西藏有數湖。於湖邊產

此質。能凝結成塊。與麝香大黃等物並運至遠處出售。其運至印度國者。必過雪山。謂之丁乾祥。又謂之生礪砂。如加熱則放水發腫。成鑿定質。謂之礪礪砂。加熱至紅。則熔如玻璃。謂之玻璃礪砂。此質可作鐸藥之用。又有一種礪砂。於工藝中用之。此藥不常含有雜質。故其偽者亦甚少。其形與珠相類。或作八面球形。或作三角珠形。色白半過光。若夜間將兩珠互擦。則發生光。莫如用火烘去其所含之水。遂變爲枯礪砂。礪砂之味始則略甜。繼則略鹹。而苦。以冷水二十分能化一分。甘油則一分能化一分。沸水則一分能化二分。濃酒則不能化。如用礪砂五釐。而以樹膠水一兩浸之。即能令溶化。爲膏。其作用微有收斂性。能洗去皮屑上污穢。又能利小便。調經。如婦人臨盆。服此藥則能令子宮發力。又如小兒口爛。並生白點。宜以此藥外擦。內服。其功用又能解熱。令子宮收縮。外用能治皮類病。治白屑風及連環癩。宜將此藥入水內。至灑而不化。然後洗之。方效。處方以礪

一六四六

水鍋內煮一炷香。取出熱服。出汗即愈。(良朋彙集)

【練】即絹之古籍別名。典見綱目。

詳「絹」條。

【練石草】即馬光蒿之古籍別名。典見別錄。詳「馬光蒿」條。

【練鵲】**命名** 本品尾如鵲而長。毛白如練帶。故名。

古籍別名 帶鳥(禽經)三光

鳥(動物學大辭典)拖白練。(俗名)

外國名詞 Terpsiphone

princeps Temm. Japanese-paradise flycatcher (拉丁) 或 Longtailed flycatcher (英)

サンコチヨー或サンクワウ

テウ或サンジャク(日本)

基本 係脊椎動物鳥類鳴禽

類鵲科之練鵲。

產地 出山林間。

形態 練鵲爲林禽類之一種。

其體比雀稍大。雄者頭部喉部黑色。有紺靛色之光澤。嘴青色。口緣有粗毛如髭。頭頂有長冠毛。背面紫黑。翼尾皆黑。尾葉中央有二羽特長達尺餘。其雌者頭黑喉灰黑。

背黃赤。翼尾皆暗褐。尾羽不及雄者之長。巢居山林。春遊原野。覓食蟲類及苔蘚等物。其肉可供藥用。



練鵲

採取 冬春採之。以食槐子者良。

性質 甘。溫。平。無毒。

主治 益氣治風疾。細剉炒香。

袋盛浸酒中取酒飲之。

【羯羊肉】即羊肉之處方用名。詳「羊肉」條。

【羊肉】條。

【羯肉】即羊肉之古籍別名。典見綱目。詳「羊肉」條。

【羯婆羅香】即冰片之古籍別名。典見本草衍義。詳「冰片」條。

【羯角】即羚羊角之古籍別名。典見山海經。詳「羚羊角」條。

【剪刀草】即玉如意之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「玉如意」條。

【剪口參】即以東洋參之尾。蒸熟乾之。大尾中尾細尾夾尾等類。皆

從船廠參(即石渠子扁剛參)傍枝剪下。以枝條之粗細。分大。中。細。夾等尾名目。近今市售。僞名別條是也。又有別折一種。以扁剛參之形態不正者。剪去頭尾。名曰參頭。其中身名曰別折。皆爲側路。藉以混亂別直參也。若中虛者誤服之。立時胸腹脹滿。醫者不可不知也。其種類甚多。如參頭。東條。別折。大尾。中尾。細尾。夾尾之類。是已。所云剪口者。乃是閩地藥家之命名耳。

【剪春羅】古籍別名 剪紅羅(日本)

外國名詞 Lychnis fulgens, Eisech. var. Cognata, Maxim. (拉丁) マツモト マツモトセ

ンラウ(日本)

基本 係石竹科剪春羅屬。爲

剪春羅之花葉。

產地 在山野平原間。

形態 剪春羅爲溼草類之宿根草。根莖葉俱似剪秋羅。高二尺許。葉卵圓作披針狀。無柄。微有毛。

四月間莖梢開花。有紅白雜色。其莖葉可供藥用。

性質 甘。寒。無毒。

主治 火帶瘡。透腰生者。採花或葉搗爛。蜜調塗之。爲末亦可。

參考資料 剪春羅二月生苗。

高尺餘。柔莖綠葉。葉對生。抱莖入夏開花。深紅色。花大如錢。凡六出。

周迴如剪。成可愛。結實大如豆。內有細子。人家多種之爲玩。又有剪紅紗花。莖高三尺。葉旋覆。夏秋開花。狀如石竹花。稍大。四圍如剪。色紅。結穗似石竹。穗中有細子。方書不見用者。計其功。亦應利小便。主癰腫也。(李時珍)

【剪紅羅】即剪春羅之古籍別名。典見綱目。詳「剪春羅」條。

【剪草】即剪草之原名。詳「剪草」條。

【翫月砂】即兔屎之古籍別名。典見集驗方。詳「兔屎」條。

【膚如】即大黃之古籍別名。典見吳普本草。詳「大黃」條。

【膠棗】即大棗產於山東膠縣者之別名。典見和漢藥考。詳「大棗」條。

【膠菜】即黃矮菜之俗名。詳「黃矮菜」條。

古籍別名。典見雷公炮炙論。詳『綠砂』條。

【簞竹】即竹之大至數圍而肉厚可爲梁棟者。功用詳『竹』條。

【箱根山椒魚】即鮠魚之別名。典見和漢藥考。詳『鮠魚』條。

【節人參】即粉沙參之古籍別名。典見和漢藥考。詳『粉沙參』條。

【節分草】即菟葵之古籍別名。典見植物學大辭典。詳『菟葵』條。

【節瓜】命名 節瓜乃冬瓜中一種小者。白皮。蔓地生。

一節生一瓜故名。主治 止瀉生津。健腸。利大小腸。

【節華】古籍別名 山節。達節。通漆（別錄）

基本 節華爲雜草類之一種。可供藥用。其皮詳見該條。

性質 苦。無毒。主治 傷中痿痺。溢腫。

【節華】即菊花之古籍別名。典見本經詳『菊花』條。

【節華皮】主治 脾中客熱。

【筴】即百葉竹之性澀可以錯

甲者。功用詳『百葉竹』條。

【簞竹】即竹之一尺數節者。功用詳『竹』條。

【篆筴君】即蝸牛之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蝸牛』條。

【篆壁】即蝸牛之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蝸牛』條。

【機心草】即龍常草之古籍別名。典見植物學大辭典。詳『龍常草』條。

【糊椒】即胡椒之古籍別名。典見和漢藥考。詳『胡椒』條。

【細枝】即荔枝之古籍別名。典見和漢藥考。詳『荔枝』條。

【線香】網目 龍掛香。古籍別名

性質 辛溫。無毒。主治 熏諸瘡癰。

參攷資料 今人合香之法甚多。惟線香可入瘡科。用其料加減不等。大抵多用白芷。芎藭。獨活。甘松。三奈。丁香。麝香。薰本。高良薑。角茴香。連荷。大黃。黃芩。柏木。兜婁香。末之類爲末。以榆皮麵作糊和劑。以唧筒竿成線香。成條如線也。亦或盤成物。象字形。用鐵銅絲懸熱

者名龍掛香（李時珍）

【緣桑蠶】命名 本品於小雨後。好採桑葉。故名。古籍別名 桑牛。天蠶（綱目）

椎實螺（動物學大辭典）基本 係軟體動物腹足類有肺類椎實螺科之緣桑蠶。

形態 緣桑蠶爲溼生蟲類之一種。形似蝸牛。殼色黃而小。可供藥用。

採取 諸木上皆有之。入藥獨取桑上者用。

主治 大腸脫肛。燒研。和豬脂塗之。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論緣桑蠶曰。治小兒驚風。用七枚焙研。米飲服。

參攷資料 ①小兒驚風。每以蜜丸通聖散。服之間。以桑樹上牛兒。陰乾焙研爲末。服之。以平其風。

（朱丹溪）②桑牛。蝸牛。蛭。三物皆一類。而形略殊。故其性味功用。皆相彷彿。而桑牛治驚。又與鹽蠶。蟬蛻同功。皆食桑者。其氣能入肝平風也。（李時珍）

【編笠百合】即貝母之日本名。詳

【貝母】條。

【緬豆】產地 雲南。形態 蔓生如豆。子大如栗。斑文點點。

主治 咀之。傳惡瘡良。參攷資料 滇略云。緬豆性溫。惡誤服之。吐瀉致死。五雜俎云。滇中有神黃豆。似五倍子。能令兒童稀痘。然亦不其驗也。

古籍別名 沔茄。（高瀝珍異藥品）

產地 滇南及緬甸。

形態 枝葉皆似家茄。結實形大如栗。色紫。上有草帽如畫皮樣。蒂圓。堅如石。

主治 水磨。治牙痛。抹眼。腫去火毒。又能解百藥毒。疔瘡。走黃。

參攷資料 凡疔瘡走黃。毒攻入內。不知人事。但有氣者可救。用細茄一枚。以磁碗盛黃酒。將茄放碗內。磨得下。磨不下。只管於酒內磨一鍾。約熟茶時。將酒裝入長頸錫壺內。再入連鬚蔥二根。牙咬不令斷。白芷頭七粒。如蕎麥開花時。加蕎麥七粒。別時不用。又用小麥。令衆人口嚼成麵筋。封固壺口。放

專除目病障翳。

●治腦痛眉痛。穀精草二錢。地龍三錢。乳香一錢。爲末。每用半錢。燒煙筒中。隨左右熏鼻。(聖濟總錄方)

●治偏正頭痛。用穀精草一兩。爲末。以白麵糊調。攤紙花上。貼痛處。乾換。(集驗方)又用穀精草末。銅絲各一錢。硝石半分。隨左右噙鼻。(聖濟總錄方)

●治鼻衄不止。穀精草爲末。熟麵湯服二錢。(聖惠方)

●治目中翳膜。穀精草、防風等分。爲末。米飲服之。甚驗。(明目方)

●治痘後目翳。隱澀淚出。久而不退。用穀精草爲末。以柿或豬肝片蘸食。一方加蛤粉等分。同入豬肝內煮熟。日食之。(邵真人濟衆方)

●治小兒雀盲。至晚忽不見物。用羯羊肺一具。不用水洗。竹刀剖開。入穀精草一撮。瓦罐煮熟。日食之。屢效。忌鐵器。如不肯食。炙熟。搗作丸。如綠豆大。每服三十丸。茶下。(衛生家寶方)

●治小兒中暑。吐泄煩渴。穀精

草燒存性。用器覆之。放冷。爲末。每冷米飲服半錢。(保幼大全方)

用薑三錢至四錢。施用宜忌。凡無風熱者禁用。忌鐵。

參攷資料 ●穀精體輕性浮。能上行陽明分野。凡治目中諸病。加而用之。甚良。明目退翳之功。似在菊花之上也。(李時珍) ●處處有之。春生於穀田中。莖葉俱青。根花並白色。二月三月。採花用。花白小圓似星。可饒馬令肥。主蟲頭毛焦病。又有一種莖梗長有節。根微赤。出秦隴間。(蘇頌) ●此草收穀後。荒田中生之。江湖南北多有一科。莖生葉似嫩葎。秧抽細莖。高四五寸。莖頭有小白花。點點如亂星。九月採花。陰乾。云二三月採者誤也。(李時珍)

【穀穎】即糯穀芒之原名。詳『糯穀芒』條。

【筍竹】即筍葉之古籍別名。典見植物學大辭典。詳『筍葉』條。

【筍葉】古籍別名。筍葉。遂葉。綱目。筍竹。鬼筍。小筍。(植物學大辭典)

外國名記 Bambusa Votchi, Carr. (拉丁) ヤキバザサ クマザサ チマキザサ (日本)

基本 保禾本科山白竹屬。爲筍竹之葉。

產地 多在山野原澤間。形態 筍爲蘆草類之多年生常綠草本。根莖似小竹。其節擇與葉皆類蘆。葉面青背淡黃。柔而韌。新葉相代。四時常青。可供藥用。性質 甘寒無毒。

主治 男女吐血。衄血。嘔血。咯血。下血。並燒存性。溫湯服一錢。七又通小便。利肺氣。喉痺。消癰疽。

參攷資料 ●筍若竹而射。故名。其生疎遠。故又謂之遠。(李時珍) ●筍生南方。平澤。其根與莖皆似小竹。其節擇與葉皆似蘆。荻而葉之面青背淡黃。而新舊相代。四時常青。南人取葉作筍。及製茶。鹽包米糗。女人以觀簾底。(李時珍) ●筍爲山白竹類中之著名者。幹高五六尺。葉闊大。長七八寸。肥大者高及一丈。稱爲鬼筍。小者高尺餘。稱爲小筍。其幹細長。強

韌。需用甚多。有時結實。亦可食云。(植物學大辭典)

【筍葉魚】即比目魚之古籍別名。典見南方異物志。詳『比目魚』條。

【筍蘭】即白芨之古籍別名。典見羣芳譜。詳『白芨』條。

【箭幹】即白井之古籍別名。典見別錄。詳『白井』條。

【箭搭草】即慈姑之古籍別名。典見救荒本草。詳『慈姑』條。

【箭豬】即豪豬之別名。典見動物學大辭典。詳『豪豬』條。

【箭頭風】產地 出廣西舊南寧府境山中。

形態 箭頭風爲山草類之一種。花如箭鏃。可供藥用。

主治 風疾。四肢骨節痛。煎水薰洗之。愈。消痰定喘。同肉煨熟。去草。以肉淡食。忌鹽醬。

【箭頭草】即紫花地丁之古籍別名。典見綱目。詳『紫花地丁』條。

●即玉如意之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『玉如意』條。●即金不換之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『金不換』條。

【箭鏃砂】即硃砂狀如箭鏃者之

【穀芽】 原名 蘗米。 命名 本品爲稻穀初生之細芽故名。

處方用名 生穀芽。炒穀芽。綻穀芽。香穀芽。

古籍別名 稻蘗。(綱目) 性質 甘溫。無毒。 主治 快脾。開胃。下氣。和中。消食。化積。

參攷資料 阿開美氏 (Akemine) 試驗穀芽所得之結果如下。(一)稻芽發生以三十至三十五(攝氏度)之溫度爲適宜。倘高至四十度或低至十三度均無發生之望。(二)稻能芽生於水中或空氣中。水中含養氣與否或穀殼之脫除與否均無關係。(三)稻芽之發生於空氣中較於水中爲速。(四)穀粒能吸收之水量等於其重量之二十五倍至三十倍。苟其吸收之水量不及其重量之二十五倍。稻芽不能發生。

【穀芽】即茶之產於四川舊雅州府境者。功用詳「茶」條。

【穀芽露】 基本 本品即穀芽所蒸取之露。

性質 甘。淡。無毒。 主治 健脾。消食。開胃。和中。生津。液。益元氣。

參攷資料 凡病後脾胃不健。津液未復者。用以代茶頗宜。

【穀桑】即楮實子之古籍別名。典見陸璣詩疏。詳「楮實子」條。

【穀菜】即白英之古籍別名。典見別錄。詳「白英」條。

【穀實】即楮實子之原名。詳「楮實子」條。

【穀精珠】即穀精草之處方用名。詳「穀精草」條。

【穀精草】 命名 本品爲穀田之餘氣所生故名。

處方用名 穀精珠。

古籍別名 戴星草。(開寶)文星草。流星草。(綱目)戴精草。巴斯草。鼓槌草。(和漢藥考)。

外國名詞 Eriocaulon hexangulare, L. (Eriocaulon Steud.)

基本 屬穀精科。藥用其花。

產地 穀精產區甚廣。凡田野間恒有生長。

形態 穀精雜草也。自生於池沼。或水田之附近。雖爲小草。頗饒風韻。故多作盆栽。或養於水盤。葉叢生一株。歧分數條。頭端尖似蘭草。長三四寸。入秋。葉間抽出數莖。長五六寸。頂著小球。爲多數鱗片集合而成。每片之間。藏綠白色之小花。開則點點如星。花後結實。既熟。隨即墮落。此草在刈稻之後。生於水田。故有穀精草之名。

採取 九月採之。採得花似白星者良。陰乾用。

性質 辛溫。無毒。

效能 散風熱。明眼目。用作解除翳膜之眼科藥。

主治 喉痺。齒風痛。諸瘡疥。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論穀精草曰。頭風痛目盲。翳膜痘後生翳。止血。【明】李士材本草圖解論穀精草曰。穀精草甘平。陽明藥也。主頭風翳膜。痘後目翳。此草收穀後荒田中生之。得穀之餘氣。獨行陽明分野。明目退翳之功。似在菊花之上。【清】黃宮繡本草求真論穀精草曰。穀精草本穀餘氣而成。得天地中和之氣。味辛微苦氣溫。故能入足厥陰肝

及足陽明胃。按此辛能散結。溫能通達。凡一切風火齒痛。喉痺血熱。瘡瘍痛癢。肝虛目翳。遊淚雀盲。至晚不見。並疳病傷目。痘後星障。服之立能有效。且退翳明目。功力駕於白菊。而去星明目。尤爲專劑。試看望月砂。係兔所食此草而成。望月砂亦能治眼。則知此更爲眼家要藥矣。取嫩秧花如白星者良。

近人學說 張山雷曰。穀精草生於稻田中。刈稻之後。得穀之餘氣。故名穀精。其實輕清。故專行上焦。直達巔頂。能疏散頭部風熱。治目疾頭風。并療風氣痺痛者。亦以輕清之性。善於外達也。又生於秋季。禾苗秀實之後。能開花結實。不畏秋涼。是以性溫味辛。故能上升外散。非其他明目之藥。以涼降爲功之比。則散風火而無寒涼遏抑之虞。尤爲良劑。開寶本草。稱其辛溫。主喉痺。齒風痛。諸瘡疥。瀕湖謂主頭風痛目盲。翳膜。皆辛以散之之意。今人僅以治風熱目赤。尙未足盡其功用也。

配合應用 穀精草得決明子。木賊草。甘菊花。蜜蒙花。生地黃。

稷。形狀似粟。但聚聚則叢聚攢簇。

黍稷之粒。則疎散成枝。黍與黍稷分別。則黏者爲黍。而不黏者爲黍稷之稷。昔人於此。紛紛置辨。而不

畫。一是亦未分二稷之說矣。黍稷味甘性寒。作飯疎爽。香美可愛。服之可以清熱涼血。解暑止渴。故書

載治癰疽發背瘰癧之症。但多食則有冷氣。內發。燒黍稷則氣必死。

忌同附子死。〔清〕王士雄隨息居飲食譜論稷米曰。稷米甘涼清胃。

補氣養脾。稷者名稷。治陽盛陰虛。夜不得寢。及食鷄鴨成穢。凡黍稷

粟之稷者。皆可釀酒造餚。而南方稷米。但有不可黏者耳。

近人學說。丁福保曰。稷爲黍之無黏者性者。含有多量糖分與

水分。而爲無毒質之食品。其效力補胃涼血。有消暑之功。但能令腹

中發冷。故不可多食。尤忌爲小兒之食料云。

配合應用 ①補中益氣。羊肉一脚熬湯。入河西稷米。葱鹽煮粥

食之。〔飲膳正要方〕

②治卒嘔不止。黍米粉。并華水服之。良。〔肘後方〕

③治癰疽發背。黍米粉熬黑。以雞子白和塗練上。剪孔貼之。乾則神效。〔葛氏方〕

④辟除瘴疫。令不相染。以黍米爲末。頓服之。〔肘後方〕

用量 三錢至四錢。施用宜忌 凡有宿癆者禁用。

惡狐子。附子。參攷資料 ①作飯食。安中。利胃。宜脾。〔心鏡〕

②按孫真人云。稷脾之穀也。脾病宜食之。汜勝之云。

燒黍稷則氣死。此物性相制也。稷米黍稷能解苦氣之毒。淮南萬畢

術云。祠塚之黍。啖兒。令不思母。此亦有所厭耶。〔李時珍〕

③稷從禾從憂。憂音即諧聲也。又進力治稼也。詩云。憂憂良耜是矣。種稷者必

憂憂進力也。南人承北音呼稷爲穡。謂其米可供祭也。禮記祭宗廟

稷曰明粢。爾雅云。黍稷也。羅願云。稷稷黍皆一物。語音之輕重耳。赤

者名糜。白者名粳。黑者名秬。〔李時珍〕

④稷米人亦不識。書記多云黍與稷相似。又註黍米云。黍米與黍米相似。而粒殊大。食之不宜

人言發宿病。詩云。黍稷稻粱。不靡

菽麥。此八穀也。俗猶莫能辨證。况芝英乎。〔陶弘景〕

⑤呂氏春秋云。飯之美者。有陽山之稷。高誘註云。

關西謂之麴。音麴。冀州謂之麴音率。去聲。廣雅云。麴也。禮記云。稷

曰明粢。爾雅云。黍稷也。說文云。稷乃五穀。良田正也。此乃官名。非穀

號也。先儒以稷爲粟類。或言粟之上者。皆說其義。而不知其實也。按

汜勝之種植書。有黍不言稷。本草有稷不載糜。稷即稷也。楚人謂之

稷。關中謂之糜。呼其米爲黃米。其苗與黍同類。故呼黍爲秬。陶言

與黍相似者得之矣。〔蘇恭〕

⑥稷在八穀之中。最爲下。苗黍乃作酒。此乃作飯用之殊塗。〔孟詵〕

⑦稷米出粟處皆能種之。今人不甚珍此。惟祠事用之。農家惟以備他穀

之不熟。則爲糲耳。〔蘇頌〕

⑧稷與黍一類。二種也。黏者爲黍。不黏者爲稷。稷可作飯。黍可釀酒。猶稻之

有粳與糯也。陳藏器獨指黑黍爲稷。亦偏矣。稷黍之苗似粟而低小

有毛。結子成枝。而殊散。其粒如粟而光滑。三月下種。五六月可收。亦有七八月收者。其色有赤白黃黑

數種。黑者禾稍高。今俗通呼爲黍。子不復呼稷矣。北邊地寒。種之有

補。河西出者。顆粒尤硬。稷熟最早。作飯疎爽。香美。爲五穀之長。而屬

土。故祀穀神者。以稷配社。五穀不可通祭。祭其長以該之也。上古以

厲山氏之子爲稷。主至成湯。始易以後。稷皆有功於農事者云。〔李時珍〕

〔稷根〕 即稷稻根之簡稱。詳「稷稻根」條。

〔稷稻根〕 古鑑別名 爪龍。〔主治〕 心氣作疼。產難橫生。

〔稻米〕 即糯米之原名。詳「糯米」條。

〔稻尾〕 即黍之古籍別名。典見郭義恭廣志。詳「黍」條。

〔稻穗〕 即糯稻稈之原名。詳「糯稻稈」條。

〔稻穗〕 即穀芽之古籍別名。典見綱目。詳「穀芽」條。

〔穀〕 即椿實子之古籍別名。典見綱目。詳「椿實子」條。

〔穀玉〕 即青玉之古籍別名。典見綱目。詳「青玉」條。

十五畫 聲

【瘰牛酥】性質 甘平。無毒。主治 去諸風溼痺。除熱。利大便。去宿食。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器

本草拾遺論瘰牛酥曰。合諸膏摩風腫。跪跌血瘀。

參攷資料 酥本乳液。潤燥調

營。與血同功。按生編云。酥能除腹內塵垢。又追毒氣。發出毛孔間也。李時珍

【瘰牛黃】性質 苦平。無毒。主治 驚癇癲狂。

參攷資料 瘰牛黃可亂牛黃。但堅而不香。功用相近也。李時珍

【瘰瘡】即瘰癧之古籍別名。典見本草拾遺。詳「瘰癧」條。

【瘰茶】即茶之產於福建舊福寧府境者。以其治瘰癧最著。故名。

【瘰魚】即鱖魚之古籍別名。典見綱目。詳「鱖魚」條。

【瘰帶】即何首烏之古籍別名。典見綱目。詳「何首烏」條。

【瘰草】即王不留行之古籍別名。典見和漢藥考。詳「王不留行」條。

【瘰客】即月季花之古籍別名。典

瘰癧瘡瘰癧瘰癧

見綱目。詳「月季花」條。

【瘰香煙】即丁香之古籍別名。典見和漢藥考。詳「丁香」條。

【瘰香嬌】即丁香之古籍別名。典見和漢藥考。詳「丁香」條。

【瘰子花】即木槿之古籍別名。典見植物學大辭典。詳「木槿」條。

【瘰龜】形態 瘰龜爲介類龜之一種。扁頭大嘴。可供藥用。

性質 無毒。主治 老瘰癧作無時。名瘰癧。俚人呼爲妖瘰。用此燒灰。頓服二錢。當微利用頭爛佳。或發時煮湯坐於中。或懸於病人臥處。

【瘰玉天漿】即荔枝之古籍別名。典見和漢藥考。詳「荔枝」條。

【瘰皮葱】即荔枝草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「荔枝草」條。

【瘰面草】即天名精之古籍別名。典見綱目。詳「天名精」條。

【瘰面還丹】即人參之古籍別名。典見廣雅。詳「人參」條。

【瘰葉芥】即大芥之古籍別名。典

瘰癧瘰癧瘰癧

見綱目。詳「大芥」條。

【瘰梅條】即合歡皮之古籍別名。典見和漢藥考。詳「合歡皮」條。

【瘰菜】即睡菜之古籍別名。典見綱目。詳「睡菜」條。

【瘰蓮】即合玉石之古籍別名。典見綱目。詳「合玉石」條。

【瘰石】即滑石之古籍別名。典見和漢藥考。詳「滑石」條。

【稷米】命名 稷字從禾從畷。畷音卽。意卽稻禾之屬。故故名稷。

古籍別名 稷。亦者名。稷。白者名。芒。黑者名。秬。綱目。黃米。蘆稷。高粱。蘆粟。俗名。

外國名詞 Panicum miliaceum, I. (拉丁) キビ (日本)

基本 係禾本科稷屬。爲稷之子實。

產地 稷原產東印度。現各國均有出。

形態 稷爲穀類之一年生草。本高四五尺。葉細長而尖。有平行脈。生粗毛。花有三雄蕊。作小穗狀。

一六四〇

花序自一花成。復構成下垂之圓錐花序。果實爲穎果。其中米粒粗硬不黏。供食用。



採取 五六月或七八月採收之。

製法 採得。曝乾去殼用。

性質 甘寒。無毒。和胃健脾。用作緩和滋養藥。

主治 益氣補不足。歷代記述攷證 【宋】日華諸家本草論稷米曰。治熱。歷丹。有毒。發熱。解苦。甄彞。明。李時珍本草綱目論稷米曰。涼血解毒。清。黃宮繡本草求眞論稷米曰。稷有蘆稷。黍稷之分。蘆稷者。其形高如蘆。實既香美。性復中和。所以爲五穀之長。而先王以之名官也。味甘氣平。故食可以益氣和中。宜脾利胃。煎湯以治霍亂。吐瀉如神。用此燒酒可治腹中沉痾。啖啾若黍稷之

屬腎經。非熱地黃不能除。乃通腎之藥也。(張元素) ①按王碩易簡

方云。男子多陰虛。宜用熱地黃。女子多血熱。宜用地黃。又云。生地黃能生精血。天門冬引入所生之處。熱地黃能補精血。用麥門冬引入所補之處。虞搏醫學正傳云。生地黃生血而胃氣弱者服之。恐妨

食。熱地黃補血而痰飲多者服之。恐泥膈。或云。生地黃酒炒則不妨胃。熱地黃薑汁炒則不泥膈。此皆得用地黃之精微者也。(李時珍)

②甘微苦寒。假酒力酒蒸則微溫而大補。味厚氣薄。陰中之陽沉也。入手足少陰厥陰之經。治外治上須酒製。忌蘿蔔葱蒜諸血。得牡丹皮膏歸和血生血涼血。滋陰補髓。(張元素)

【熟艾】即以陳久艾葉揉搗如棉。焙乾似熟爲針科着火灸病之用。餘詳「艾葉」條。

【熟附子】即附子炮熟者之處方用名。詳「附子」條。

【熟南星】即天南星製熟者之處方用名。詳「天南星」條。

【熟結】即沈香及伽楠香之膏膩

凝結而自朽者。二者之功用各詳本條。

【熟鐵】即生鐵復經鍛鍊而再三銷拍可製器具者。功用詳「鐵」條。【熟蠶蛾】即原蠶蛾之古籍別名。典見綱目。詳「原蠶蛾」條。

【熱湯】命名。本品係煎煮多沸之水。故名。古籍別名。麻沸湯(仲景)百沸湯大和湯(綱目)滾水開水(俗名)

性質 甘平。無毒。主治 助陽氣行經絡。歷代記述攷證 【宋】嘉祐補註本草論熱湯水曰。熨霍亂轉筋入腹及客忤卒死。

參攷資料 ①熱湯能通經絡。患風冷氣痺之人。以湯淋脚至膝上。厚覆取汗周身然別有藥亦假陽氣而行爾。四時暴泄痢四肢冷臍腹疼。深湯中坐浸至腹上頻頻作之生陽諸藥。無速於此。虛寒人始坐湯中。必顛仍常令人伺守之。(寇平) ②按汪穎云。熱湯須百沸者佳。若半沸者飲之。反傷元氣作脹。或云熱湯漱口損齒。病人目人

勿以熱湯洗浴。凍僵人勿以熱湯濯之。能脫指甲。銅瓶煎湯服。損人之聲。(李時珍) ③張仲景治心下痞。按之濡。關上脈浮。大黃黃連瀉心湯。用麻沸湯煎之。取其氣薄而洩虛熱也。朱真人靈驗篇云。有人患風痰數年。掘坑令坐坑內。解衣以熱湯淋之。良久以草蓋之。汗出而愈。此亦通經絡之法也。時珍常推此意。治寒溼加艾煎湯治風虛加五枝或五加煎湯淋洗覺效更速也。(李時珍) ④凡傷寒傷風傷食傷酒。初起無藥。便飲大和湯。益許。或酸薑汁亦可以手揉肚覺恍惚。再飲再揉至無所容。探吐汗出則已。(張從正)

【燂耀】即登火之古籍別名。典見吳普本草。詳「登火」條。【摩牛】即摩牛之古籍別名。典見昨夢錄。詳「摩牛」條。【犏牛】即獨峯駝之古籍別名。典見綱目。詳「獨峯駝」條。

命名 犏者。旄也。其鬣可爲旄旄也。故名。古籍別名。毛犀(廣志)貓牛(漢書)摩牛。牦牛。竹牛(昨夢錄)

犏牛(綱目)

外國名詞 Bos grunniens 或 Poephagus grunniens L. (Yak 或 Grunting ox) (拉丁) ヤク或ヤク(日本)

基本 係脊椎動物哺乳類有胎盤類有蹄類反芻偶蹄類牛科之犏牛。

產地 野生於西南徼外諸深山。

形態 犏牛爲獸類野牛之一種。其體大如牛。角長。殆爲圓筒狀。角端尖。表面滑。亦有彎曲者。其有家養而無角者。肩隆起。頸至脊上密生鬣狀柔毛。面部耳部及四肢下部之毛雖短。而體旁及四肢外側之毛密而長。垂下以被短矮之四肢。毛有絲光。或白。或黑。或黑白相混。尾尾亦生長毛。狀與牦牛相同。但耗小而犏人有重至千餘觔者。其角可供藥用。

性質 酸鹹涼。無毒。主治 驚癇熱毒諸血病。參攷資料 犏牛角可亂犀角。但無栗紋耳。(李時珍)

參攷資料 犏牛角可亂犀角。但無栗紋耳。(李時珍)

參攷資料 犏牛角可亂犀角。但無栗紋耳。(李時珍)

爲咳嗽。爲喘氣。或脾胃腎寒。逆爲嘔吐。或虛火載血於口鼻。或水泛於皮膚。或陰虛而泄利。或陽浮而狂躁。或陰脫而仆地。陰虛而神散者。非熱地之守不足以聚之。陰虛而火升者。非熱地之重不足以降之。陰而躁動者。非熱地之靜不足以鎮之。陰虛而剛急者。非熱地之甘不足以緩之。陰虛而水邪泛濫者。舍熱地何以自制。陰虛而真氣散失者。非熱地何以歸源。陰虛而精血俱損。脂膏殘薄者。舍熱地何以厚腸胃。且猶有最玄最妙者。則熱地兼散劑。方能發汗。何也以汗化於血。而無陰不作汗也。熱地兼溫劑。始能回陽。何也以陽生於下。而無復不成乾也。然而陽性速。故人參少用。亦可成功。陰性緩。熱地非多。難以奏效。而今人有畏其滯膩者。則崔氏何以用腎氣丸。而治痰浮。有畏其滑澤者。則仲景何以用八味丸。而腎泄。有謂陽能生陰。陰不能生陽。則陰陽之理。原自互根。彼此相須。缺一不可。無陽則陰無以生。無陰則陽無以化。故內經曰。精化爲氣。得非陰亦生陽乎。孰

謂陽之能生。而陰之不能長也。近人學說 闕立陸曰。熱地黃氣味相同。畏惡忌使。亦不少異。但假酒力曬蒸。稍除寒氣。則微溫而大補。入少陰腎經。大補血衰。滋培腎水。本經主填骨髓。長肌肉。生精血。補五臟。內傷不足。通血脈。利耳目。黑鬚髮。男子五勞七傷。女子傷中。胞漏。經候不調。胎產百病。皆渾著於乾地黃之下。而時珍則別之於熱地黃。元素又云。熱地補血氣。滋腎水。益真陰。去脾胃急痛。病後腰股酸痛。王好古曰。坐而欲起。目瞋。視無所見。詳味厥旨。蓋皆以熱地黃能補腎水。益真陰。有養血填陰之義。血旺陰足。故悉如上功也。昔仲景製八味丸。專補腎中元氣。爲諸藥首。取天一所生之源也。東垣製四物湯。治藏血之臟。以此爲君。取癸水乙木同歸一治也。合而論之。生熱之劑。皆爲血家神藥。生者寒而涼血。血熱者須用。熱則溫而補腎。血衰者須用。故王易簡謂男子多陰虛。宜熱地黃。女子多血熱。宜生地黃。又云。生地黃能生精血。天門冬引入所生之處。熱地

黃能補精血。用麥門冬引入所補之處。生地黃生血。而性甘寒。氣弱者服之。恐以陰寒而妨食。熱地補血。而氣滯痰飲。氣結者服之。恐泥膈而滯痰。故不得已而必用者。生用酒炒。則妨胃。熟用姜製。則不泥膈。此皆得用之精微者也。賈九如曰。熱地產於中州。獨受中央土戊土之色。黃故名。地黃藉酒蒸熟。製黑而爲純陰。味苦化甘。性涼變溫。專入肝臟補血。因肝苦急。用甘緩之。兼主溫膽。又心爲肝之子。能益心血。取色黑走腎。更補腎水。凡內傷不足。苦志勞神。憂患傷血。縱慾耗精。調經胎產。皆宜用此。安五臟和血脈。潤肌膚。養心神。寧魂魄。滋補真陰。封填骨髓。爲聖藥也。取其氣味濃厚。爲濁中濁品。以補肝腎。故凡生熱地黃。天麥門冬。炙龜板。當歸身。山茱萸。枸杞。牛膝。皆黏膩濡潤之劑。用滋陰血。所謂陰不足者。補之以味也。張山雷曰。熱地黃。潔古補血氣。滋腎水。益真陰。去脾胃急痛。病後腰股痠痛。石頑謂臍下痛。屬腎臟精傷。腰股痠。係下元不足。頭按此臍腹急痛。及腰

腰痠痛。皆以肝腎真陰久傷。下元欲竭之症而言。故宜於滋填。頗有捷效。繆仲醇廣筆記之。集靈膏。魏柳洲之一貫煎。皆治此等之最。有驗者。非泛治諸般之腹痛。腰股痛。不可不知區別。寇宗奭謂血虛勞熱。產後虛熱。老人中虛燥熱。若與生地當慮其寒。故熟熱曝之。則其功自別。海藏治腎水不足。目瞋。視無所見。瀕湖謂填骨髓。長肌肉。益精血。補五臟。內傷不足。黑鬚髮。女子傷中。胞漏。經候不調。處搏謂熱地補血。而痰飲之人。恐其泥膈。宜用姜汁炒。治目瞋。視如無所見。謂水虧不能鑒物。是腎所主之病。非熱地不效。又謂地黃。本心家血藥。久經蒸曝。得水火既濟之功。變黃紫爲深黑。可直入腎臟。填補真陰。兼培中州脾土。則土厚載物。諸臟皆受其蔭。

用量 三錢至八錢。

施用宜忌 凡脾胃虛寒者禁

用。參攷資料 地黃生則大寒而涼。血熱者須用之。熱則微溫而補腎。血衰者須用之。又臍下痛

【熟石灰】即石灰之加水化合而成者。乃化學中所稱之輕養化鈣也。功用詳「石灰」條。

【熟地黄】
命名 本品係地黄
藥曬製熟者故名

處方用名 大熟地製熟地鹽水炒熟地砂仁炒熟地九製熟地
基本 屬玄參科為地黄之製熟者

形性 地黄九經蒸曬而成。熟地則較生乾者不同。質地愈重而柔軟。色亦烏黑而光澤。味轉甘性轉溫。

採取 二月八月採製之。

製法 蘇頌曰。作熟地黄法。取肥地黃三二十斤。淨洗。別以揀下瘦短者三二十斤。搗絞取汁。投石

器中浸漉令淡。飯上浸三四過時。時浸漉轉熟。訖又曝。使汁盡。其地黃當光黑如漆。味甘如飴。須臾器收之。以其脂柔喜潤也。雷斅曰。採生地黃去皮。蠶鍋上柳木飯蒸之。攤令氣歇。拌酒再蒸。又出令乾。勿犯銅鐵器。令人腎消。并髮白。男損腎女損衛也。李時珍曰。近時造法。揀取沉水肥大者。以好酒入縮砂

十五畫 熟

仁末在內。拌勻。柳木甑於瓦鍋內。蒸令氣透。頭乾。再以砂仁酒拌。蒸頭如此。九蒸九曬。乃止。蓋地黃性泥。得砂仁之香而實。合和五臟沖和之氣。歸宿丹田故也。今市中惟以酒煮熟售者。不可用。

性質 甘微苦。微溫。無毒。
效能 補精益髓。養肝腎。開耳目。烏鬚髮。用作滋養強壯藥。

主治 傷中逐血。填骨髓。長肌肉。作湯除寒熱。積聚。除痺療折。跌絕筋。久服輕身不老。〔本經〕主男子五勞七傷。女子傷中。胞漏。下血。破惡血。溺血。利大小腸。去胃中宿食。飽力斷絕。補五臟內傷不足。通血脈。益氣力。利耳目。〔別錄〕

歷代記述攷證 【金】張元素珍珠囊論熟地黃曰。補血氣。滋腎水。益真陰。去膈腹急痛。病後腰股酸痛。〔元〕王好古湯液本草論熟地黃曰。坐而欲起。目眩暈。無所見。〔明〕李時珍本草綱目論熟地黃曰。填骨髓。長肌肉。生精血。補五臟內傷不足。通血脈。利耳目。黑鬚髮。男子五勞七傷。女子傷中。胞漏。經候不調。胎產百病。〔清〕黃宮繡本

草求真論熟地黃曰。熟地黃甘而微溫。味厚氣薄。專補腎臟真水。兼培黃庭后土。土厚載物。諸臟皆受其陰。故又曰。能補五臟之真陰。熟地功力甚鉅。在景岳謂其真陰虧損。有為發熱。為頭痛。為焦渴。為喉痺。為咳嗽。為喘氣。或脾胃寒逆。為嘔吐。或虛火載血於口鼻。或水泛於皮膚。或陰虛而瀉利。陽浮而狂燥。或陰脫而仆地。陰虛而神散者。非熟地之守不足。以聚之。陰虛而火升者。非熟地之重不足。以降之。陰虛而燥動者。非熟地之靜不足。以鎮之。陰虛而剛急者。非熟地之甘。不足以緩之。陰虛而水邪上湧者。舍熟地何以自制。舍熟地何以歸元。陰虛而精血俱損。脂膏殘薄者。舍熟地何以厚腸胃。且猶有最玄最妙者。則熟地兼散劑。能發汗。以汗化於血。而無陰不作汗也。熟地兼潤劑。能回陽。以陽生於下。而無陰不回也。然而陽性速。故人參少用。亦可成功。陰性緩。熟地不多。難以收效。而今人有畏其滯膩者。則崔氏何以用於腎氣丸。而治痰浮。畏其滑瀉者。則仲景何以用於

八味丸。而醫腎泄。有謂陽能生陰。陰不能生陽者。則陰陽之理。原自互根。彼此相須。缺一不可。無陽則陰無以生。無陰則陽無以化。內經曰。精化為氣。得非陰亦生陽乎。景岳尚論熟地。最為明確。獨中所論脾胃寒逆。為嘔。可用地黃以治。是亦千慮一失者耳。夫脾胃虛寒。則脾與胃已受寒氣。正宜用以辛熱。以為掃除。如太陽既至。堅冰自解。乃復驟以霜雪。投以陰劑。不更使寒滋甚乎。讀景岳全書。見其所論語語透闕。字字箴規。可為法守。獨於所論地黃。有脾胃虛寒。尚有未及。雖曰熟地性溫。寒從溫散。然寒至上逆。為嘔。則寒已甚。豈有熱地之溫。而可令寒外散乎。但或陽盛陰微。陽藉陰化。偶有感冒。用此難於溫散之中。或有見效。若真純陰無火。厥氣上逆。則嘔。則此又為深忌。至於製用地黃。宜用好酒砂仁末同入。久蒸久曬。使其轉苦為甘。變紫為黑。方能直入腎經。耳。出懷慶肥大者佳。〔清〕張景岳景岳全書論熟地曰。凡諸真陰虧損者。有為發熱。為頭疼。為焦渴。為喉痺。

以退猪湯洗後探之(簡便方)

④治牙齒蟲痛用韶腦硃砂等分擦之神效(普濟方)又用樟腦

黃丹肥皂去皮核等分研勻蜜丸

塞孔中(余居士選奇方)

用量 八分至錢半

施用宜忌 凡非真寒及有溼

熱者禁用

參攷資料 樟腦純陽與硝

同性水中生火其焰益熾今丹

爐及烟火家多用之辛熱香氣稟

龍火之氣去溼殺蟲此其所長故

燒烟薰衣篋席簾能辟壁虱蟲蛙

李石續博物志云脚弱病人用杉

木爲桶濯足排樟腦於兩股間用

帛綳定月餘甚妙王璽醫林集要

方治脚氣腫痛用樟腦二兩烏頭

三兩爲末醋糊丸彈子大每置一

丸於足心踏之下以微火烘之衣

被圍覆汗出如涎爲效(李時珍)

樟腦出韶州漳州狀似龍腦白

色如雪樟樹脂膏也胡演升鍊方

云煎樟腦法用樟木新者切片以

井水浸三日三夜入鍋煎之柳木

類攪待汁減半柳上有白霜即濾

去滓傾汁入瓦盆內經宿自然結

成塊也他處雖有樟木不解取腦

又鍊樟腦法用銅盆以陳壁土爲

粉糝之後慘樟腦一重又慘壁土

如此四五重以薄荷安土上再用

一盆覆之黃泥封固於火上款款

炙之須以意度之不可太過不及

勿令走氣候冷取出則腦皆升於

上盆如此升兩三次可充片腦也

(李時珍)

樟腦精 製法 以樟腦溶於

酒精中加蒸水製之

即成無色澄明之液體可供藥用

主治 麻痺及諸寒痛塗擦之

甚本 本品係石之生

於樟樹內者

樟腦 主治 治心痛能通五經殺研

煎酒服

櫚皮 即土骨皮之古籍別名典

見和漢藥考詳土骨皮條

樟 即櫚之日本名詳櫚子條

櫟子 即食茱萸之古籍別名典

見圖經本草詳食茱萸條

漿水 命名 本品乃炊粟米

熟投冷水中浸五六日

味醇生白花色類漿者故名

古籍別名 酸漿(綱目)

性質 甘酸微溫無毒

主治 調中引氣宜和強力通

關開胃止渴霍亂洩利消宿食宜

作粥薄暮啜之解煩去睡調理腸

臟煎令酸止嘔噦白人膚體如綿

帛

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論漿水曰利小便

參攷資料 漿水性涼善走

故解煩渴而化滯物(朱丹溪)

漿水浸至敗者害人(陳嘉謨)

漿水不可同李食令人霍亂吐利

妊婦勿食令兒骨瘦水漿尤不可

飲令絕產醉後飲之失音(寇宗

奭)

漿水瑪瑙 即瑪瑙中之有淡水

色花者功用詳瑪瑙條

漿瓣草 即地錦草之古籍別名

典見庚辛玉冊詳地錦草條

潞黨參 即黨參之處方用名詳

黨參條

蕲筍 即冬筍之古籍別名典見

食纂詳冬筍條

潮煙 即煙草之產於廣東舊潮

州府境者功能消食下氣頗著神

效然性最猛烈不可多服體弱者

忌之餘詳煙草條

樟腦 即樟腦之處方用名詳

樟腦條

還 即醋之古籍別名典見綱目

詳醋條

通水通 即水通之處方用名詳

水通條

滄沙苑 即刺蒺藜之處方用名

詳刺蒺藜條

瀝藥 即刺蒺藜之處方用名

詳刺蒺藜條

瀝翁 即訶子之古籍別名典見

和漢藥考詳訶子條

澄水砂 即硃砂經水中飛過者

之別名典見雷公炮炙論詳硃

砂條

潁 即水銀之古籍別名典見別

錄詳水銀條

熟女貞 即女貞製熟者之處方

用名詳女貞條

熟女實 即女貞之處方用名詳

女貞條

熟半夏 即半夏煨熟者之處方

用名詳半夏條

熟皮硝 即朴硝之古籍別名典

見和漢藥考詳朴硝條

五百二十磅。間有從噶嚨巴運至英國。至今西國所用之樟腦。大半出於中國與日本。本品之形色與氣味。質脆。色白。臭烈。別具一種氣息。其味辛。用水九百分能化一分。濃酒則五百分能化四分。哥羅方則一分能化四分。伊打則七分能化十二分。洋橄油則四分能化一分。松香油則三分能化二分。冰醋酸則一分能化二分。反酸類不化。若樟腦酒而入以少許之水。旋即變白。恍如牛奶。其餘各淡強水均能化之。惟濃強水則能敗是物。其作用能行氣。又能治小便熱疼。或閉。白濁。瘡痛。泄瀉。霍亂。宜少服。過服則頭昏困倦。受毒狀如風癩。面發昏迷。小便不通等。急宜解救。其藥性大半從膠筋顯出。如服數不過大。能令人舒暢。而減腦筋之惹人。自得以及安靜。初服令腹之內皮發熱。後則能入腦而壯腦力。間或發表。惟不至令脈洪數。約服一二。次。即能平腦安身。如食更大之服。能令心之動法平和。後從皮膚與肺散出。不從溺中而出。蓋此藥能令脈動加力。令人出汗。如身多著

十五畫 樟

衣服。或用厚被擁護。則多出汗。而能減發熱之病。此後能平火安心。如食其大服。則有寧睡性。或有毒性。尋常用此藥。治腦筋病。作安肚。腹腦筋與止痛藥。如婦女妄言笑。病用之有益。或因腦筋病而發熱。與虛發熱用之最合宜。若過服則壞人。始則作嘔。吐。繼則譫語。神昏。至沉睡而死。務宜慎。用。凡熱症。炎症。忌服。如轉筋症。則服之最驗。第必須先服涼劑。後服此藥。方妙。又如身弱。四肢不安。及婦人月經不調。與酒醉過度。均宜服。又如以此藥久擦於皮膚細軟處。則為惹性藥。又如以此藥用酒調化。或用油亦可。外擦風溼頗效。若加鴉片酒少許。尤佳。又如神昏作悶。嗅樟腦。或樟腦酒。亦妙。至解藥之解此毒。須先服吐劑。或用抽水筒。後服行氣藥。如酒及咖啡精等。均可。處方以樟腦一分。濃酒九分。化勻。為度。加白糖或牛奶同服。每服一分。七釐半。至五分。二釐半。又方。樟腦三兩。二錢。火酒二十七兩。七錢二分。和化。每服五滴至三十滴。第此酒多用以外擦風溼跌打等症。內

服者甚少。又方。樟腦一分。濃酒十八分。沒藥酒二分。共和勻。為度。治新肚瀉。每服八釐七毫半。每一刻鐘服一次。又方。樟腦四分。濃酒五十分。化勻。為度。加白樹膠漿和服。或滴於白糖內服之。治新肚瀉。每服三釐半。至五釐二毫半。又方。樟腦二分。白蜂蠟三分。煉猪油四分。杏仁油三分。共入鍋鑪。調至冷。為度。止痛用之。又方。樟腦二兩。四錢。橄欖油十兩。零八分。攪和。擦之。療治風溼骨疼。又方。樟腦二分。辣椒半分。研末。火酒二十分。共入瓶。浸七天。過布去渣。為度。治風溼疼。頭痛。用薑。每服一釐七毫半。至一分七釐半。加白糖。白樹膠。作勻水服之。日本學說。謂樟腦者。為由樟樹製出之結晶物。夙輸出於泰西。為彼國藥局方所採用。西人稱之曰カンフル。又曰日本樟腦。其珍重之。其化學上及治療上之研究。已詳盡無遺矣。依日本藥局方云。樟腦與刺戟防腐之效。如為刺戟藥。而於侵腐質。斯神經痛。外用之。如為興奮藥。用於皮下注射。或為防腐性繃帶水。間有內用者。

每一回〇・五至二・〇。日本從前製造樟腦。須選八十年以上之老樹。因樟腦最多也。迨後原料遞少。價值步漲。即四十年未滿之樟樹。亦伐之。而充需用。泊乎近年。搜刮愈工。雖破葉亦收集而採取樟腦矣。

近人學說 張山雷曰。樟腦由樟木提鍊而成。味辛。氣烈。潮濕雖謂無毒。然古人從未以為內服之藥。惟西國醫家。謂能治泄瀉。霍亂。轉筋。蓋以氣用事。而性辛熱。觀其著火。即燃。猛烈可知。故善治真寒之霍亂。吐瀉。轉筋。西藥書謂受其毒者。狀如風癩。面紫。昏迷。則此藥峻厲。尤其可見。西書雖謂每服可用一林士至十林士。然十林士。合中稱已一分七釐半。頗覺太多。不如樟腦酒法。以樟腦一分。和濃酒二十分。每服五林士之合宜也。一方。樟腦一分。和淨沒藥二分。明乳香三分。研勻。茶調服。三釐。治痧穢腹痛。甚效。蓋藥自製霍亂藥酒。亦用之。皆惟真寒為宜。溼熱症。弗用。配合應用 治小兒疳積。臍臌。一錢。花椒二錢。脂麻二兩。為末。

十五畫 樟

形態 樟樹爲常綠喬木。高可十餘丈。周圍有四丈。外皮灰褐色。有罅裂。木質帶紅白色。紋理顯然。葉互生。形卵圓或如長披針。末端帶尖。其實似紙。又似皮革。有細長之葉柄。面作深綠色。無茸毛。背帶藍色。有似手之脈理。三層或五層花穗軸立。短於葉。其末枝有花一朵至五朵。花苞帶黃色。分六瓣有鈍端。面無茸毛。內則雄蕊與義毛密布其間。雄蕊多數叢生。具有腺體。粉囊分爲四房。雌蕊細而長。有圓板狀之柱頭。果實爲漿果。有薄皮。形圓如球。大若豌豆。色紅黑。有光澤。惟樟樹爲物。異於他樹。雖破葉亦有樟腦之香氣。全樹幾無有不合樟腦之處。惟含量之多。隨樹之種類而異。葉芽與葉柄帶紅色者。謂之赤樟。樟腦最多。葉芽與葉柄現綠色者。次之。此外尚有臭樟。黃樟各種。全樹所含之樟腦。初非各處均平。有此少彼多者。大抵樹之下部。所含最多。有五。七。四。中部略少。約四。二三。枝部三。七。枝梢二。二三。葉內三。至四。蓋愈下愈多。愈上愈少也。其精

製樟腦（精製樟腦一名片腦）
C₁₅H₁₀O 爲白色透映之塊片或粗末。有脂肪光澤。質柔韌。不易成粉。加酒精研和。易成白色之粉末。置空氣中。則發散而不留餘滓。比重〇・九八至〇・九九五。溶點約在百七十五度。沸騰點須二百零四度。試燃以火。則放明焰與煤煙而燃燒。水不能溶解。然浮於水面有回旋運動之性。酒精伊打哥羅仿誤。硫化炭素冰醋酸。亞攝登。脂肪油等俱能溶解之。有特異之芳香。味初如灼。後轉有清涼之氣。於分極光線具有旋之性。

製法 用樟樹之根。葉。枝。幹。截爲薄片。置器中。蒸之。蒸氣着於蓋上。冷之。即結爲晶。更加石灰與酒精製之。則成白色之粉末。香氣甚烈。易化氣而散失。遇火即燃。可製無煙火藥。與供藥用。

用法 恒以到末和入外治藥用。

性質 辛熱。無毒。
成分 含有一種凝固之揮發油。
效能 殺蟲辟蠱。通竅辟惡。祛

寒濕。治癰疥。用作與書回蘇藥。又治陰癰霍亂。初期疥癬。

作用 入口內能刺激唾液神經。使唾液及口腔黏液之分泌增加。入胃中。即誘起胃部之溫感。增加。令人噁氣。然不與胃液變化。至腸始次第吸入。而至血中。一部分仍不變化。而由肺臟排出。一部分變爲 Aund B-Camphoglyk-uonsure 及 Vranido-camphoglyk-kunsure 二種。使血液循環迅速。大腦神經被激。而興奮。全身體溫增高。精神活潑。尿汗之排泄亦同時增多。若服過量。則胃部被劇激。而麻痺。甚由昏睡而死。

主治 通關竅。利滯氣。治中惡邪氣。霍亂。心腹痛。寒溼脚氣。疥癬風瘙。癰疽。殺蟲辟蠱。着藥中去脚氣。

歷代記述攷證 【明】繆希雍本草經疏論樟腦曰。得純陽之氣。其味辛。其氣熱。初時以水煎成。後得火則談熾。不息。其裏龍火之性者乎。氣亦香。實能通利關竅。逐中惡邪氣。復能去溼殺蟲。凡一切疥癬風瘙。溼毒瘡癤等證。皆所須用。

【清】黃宮楠本草求真論樟腦曰。樟腦性稟龍火。辛熱香竅。能於水中發火。其熱益熾。治能通關利竅。凡中惡卒死者。可用樟木燒烟。薰之。并能除溼殺蟲。置鞋中。除脚氣。方書每和烏頭爲末。醋丸。彈子。大置於足心。火烘汗出爲效。且能薰衣。辟蛇蟲。出鄒郡諸山。以樟木蒸汗。煎煉結成樟腦。升打得法。能亂冰片。

國外學說 英美學說謂樟腦原產中國之廣東。而臺灣等處亦產之。乃始由樟木提出。後經升煉而成者。樟樹高而大。經冬不凋。其樹無論切碎何處。皆發樟腦香。其木白色。略香。中國多用以作箱櫃等物。樟腦樹之葉與皮。均有樟腦之質。以木作片。浸飯。即能成樟腦。然此猶未淨。必用法提淨之。樟腦一質。其產中國與日本者爲真。樟腦樹。西國古人所知之藥料。向東方所取者。以印度爲止。由印度而東南而南之各國。向不知其有樟腦。而阿刺伯人則能知此。質前荷蘭與日本常有往來之時。在七年内。運入歐羅巴之樟腦共三十一萬

柄長。互生。初夏葉腋抽出長軸。綴以小花。黃白色。結實黑色。球形。大如豌豆。其木材細密。灰白。老則堅硬。帶褐色。有香氣。可供雕刻與藥用。



樟

性質 辛。溫。無毒。

主治 惡氣中惡。心腹痛。鬼注。霍亂。腹脹。宿食不消。常吐酸臭水。酒。煮服。無藥處用之。煎湯浴脚氣。疥癬風癢作履除脚氣。

參攷資料 霍亂及乾霍亂須吐者以樟木屑煎濃汁吐之甚良。又中惡鬼氣卒死者以樟木燒烟熏之待甦乃用藥。此物辛烈香寬能去溼氣辟邪惡故也。(李時珍)

【樟木皮】 採取 以年久樹上者佳。採得去外面黑色。取內層用。

性質 辛。溫。無毒。
主治 天行痘疫。霍亂吐瀉。中

惡心痛。煎服之。溼毒流注。脚疥癬。浴洗之。

【樟木油】 基本 本品係用樟木榨取之油。

形體 樟木油。色淡紫中帶微黃。氣甚辛烈。作樟腦氣。能飽充丁香油。可供藥用。

性質 辛。
主治 辟汗。以洗衣或佩之。及為防臭藥。

【樟木葉】 主治 腳上生瘡。嚼爛敷之。

【樟木瘤】 原名 樟梨。
命名 本品為千年樟樹枝極間所結之物。以形如梨故名。

古籍別名 香樟子。(綱目拾遺)

產地 出浙江省舊處州府遂昌縣福羅塢仙人壩之周公園中。又廣東省清遠從化等處亦均有。

採取 八九月新。以大者為佳。
入藥良。
主治 磨塗腫毒。及心胃脘痛皆效。

【樟木瘰節】 主治 風疰。鬼邪。

【樟皮】 基本 本品即香樟樹之皮。

採取 以年久老樹者入藥良。
性質 辛。溫。無毒。
主治 天行痘疫。溼毒流注。浴疥癬洗脚氣。

配合應用 ①治心疼。香樟樹皮。取時去面上黑色者。用內第二層皮搗碎。煎湯服即止。永不再發。(玉局方)

②治刑杖傷。樟樹皮用老酒燉出味。調老公雞冠血食。止痛散血立效。(神錦方)

③治霍亂上吐下瀉。樟樹皮一把。水煎服。立止。(傳信方)

④治脚上生瘡。此瘡個個如小筆管。大者用樟樹葉牙咬熟。略搽拔毒。丹外貼樟樹葉。連換數次即愈。(家寶方)

參攷資料 樟木綱目言辛溫香寬性能除溼。故山居人患病多宜之。象山縣志。萬歷中邑大疫。有一道人教人取千年老樟樹皮煎飲可愈。并言樹老久飲霜雪。其性

轉清涼。可治疫氣。此即陳藏器所云樟木能治惡氣中惡鬼注之意。

(賴學敏)

【樟冰】 即樟腦之古籍別名。典見和漢藥考。詳「樟腦」條。

【樟柳根】 即商陸之古籍別名。典見和漢藥考。詳「商陸」條。

【樟梨】 即樟木瘤之原名。詳「樟木瘤」條。

【樟腦】 命名 本品色白如雪。狀似龍腦。乃樟樹脂膏所凝成。故名。

處方用名 潮腦。

古籍別名 韶腦。綱目「朝腦」。

樟冰 (和漢藥考)

外國名詞 Camphora. (拉丁) Camphor (英) Kampher. (德)

基本 屬樟科。為樟樹之脂膏。

產地 陳仁山藥物生產辨云。樟腦中國各省均有產。但以福州為最。係用樟樹蒸煉而成。粗砂力猛。東江增城惠州南江羅定廣西各屬均用樟樹葉蒸煉。幼砂力弱。日本各國均有出。每年出新兩次。四月十一日出新。

十五靈 樊 槿 樓 樗 櫨 檀 樟

本草綱目論楓榆皮曰治見解顛。

【樊楓皮】即秦皮之古籍別名。典見本草集註。詳「秦皮」條。

【槿】產地 出安南及熱帶諸地。

形態 槿爲夷果類之一種。二月開花。連着子結實如桃。五月熟黃色。鹽藏食之味酸如梅。可供食與藥用。

性質 酸。涼。平。無毒。

主治 清心潤肺生津。止渴。制亢極之陽光消炎蒸之暑氣。降三焦實火。療鼻衄牙宣齒齦出血。逐核仁燒存性。調水含咽即止。

【樓活仁】即瓜蒌仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳「瓜蒌仁」條。

【樓梯草】產地 生南安。

形態 獨莖。高不盈尺。長葉略似枇杷葉。齒尖稍粗。紋橫斜而青。背黃綠。可供藥用。



草 梯 樓

主治 酒煎服。治風痛。跌打損傷。

【樗】詳「椿樗白皮」條。

【樗蒲魚】即海蛇之古籍別名。典見本草拾遺。詳「海蛇」條。

【樗雞】古籍別名 紅娘子。灰花蠶（綱目）

產地 生川谷臭樗樹間。

形態 樗雞爲卵生蟲類之一種。補方而扁尖。喙向下。六足四翼。全體黑色。長則始飛。翼灰黃有斑。下面五色相間。居樹上。布置成行。秋深產卵於樗皮上。捕得可供藥用。

採取 七月間採之。

製法 凡使去翅足。以糯米或用麵炒黃色。去米麵用。

性質 苦。平。有小毒。

主治 心腹邪氣。陰痿益精。強志。生子好色。補中輕身（本經）。腰痛下氣。強陰多精（別錄）。

歷代記述攷證 【宋】寇宗奭

本草衍義論樗雞曰。通血閉行瘀。

血【明】李時珍本草綱目論樗雞曰。主癰癰散。中結鬚辟邪氣。療

瀉大瘕。

參攷資料 樗雞不可近目。

（別錄）樗雞方藥中稀用。惟大麝香丸用之（陶弘景）樗雞古

方辟瘟殺鬼丸中用之。近世方中多用。蓋厥陰經藥能行活血也。

普濟方。治目翳。撥雲膏中。與羌青斑蝥同用。亦是活血散結之義也。

（李時珍）

【櫨木】即醉魚草之古籍別名。典見綱目。詳「醉魚草」條。

【櫨子】命名 本品味酢澀而多渣。故名。

古籍別名 木桃（地雅）和圓子（綱目）

外國名詞 Cydonia japonica, Pers. var. pygmaea, Maxim. (拉丁) クサボケ ノボケ

シドミ チナシ（日本）

基本 係薔薇科梨屬。爲櫨之子實。

產地 生山野間。

形態 櫨爲灌木類之落葉木。本高一二尺。枝有刺。葉小倒卵形。

有托葉。早春隨葉開花。黃赤色。或白色。結實類似木瓜。圓形有凹凸。

較小而色微黃。蒂核皆粗。入鹽湯

煮食。香美過於木瓜。亦可供藥用。



子 櫨

性質 酸。涼。平。無毒。

主治 斷痢。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論櫨子曰。去惡心。咽酸止酒痰。黃水【唐】孟詵食療本草論櫨子曰。煎汁飲治霍亂轉筋。功與木瓜相近。

參攷資料 櫨子乃木瓜之酢澀者。多食傷氣。損齒及筋（綱目）。

命名 本品木理多文章。

故稱

外國名詞 Cinnamomum

camphora, Nees. (拉丁) クスノキ（日本）

基本 係樟科樟屬爲樟之木材。

產地 出黔蜀閩廣等處。

形態 樟爲香木類之常綠喬木。高五六丈。大者十圍。葉卵形。草

質有莢脈三條。甚顯著。葉端尖。藥

一種。莖高二尺餘。葉似穀葉。十二月萌芽。二月有花。不結實。其苗可供藥用。

性質 甘。無毒。

主治 療金瘡。

【撲落酥】即大棗之古籍別名。典見和漢藥考。詳「大棗」條。

【搗搗活】即七葉黃荊之俗名。詳「七葉黃荊」條。

【數常】即螳螂之古籍別名。典見綱目。詳「螳螂」條。

【數低】形體 數低爲菜類之一種。形如茴香。其子可供藥用。

性質 甘。溫。無毒。

主治 冷風。冷氣。下宿食。消脹滿。

【櫚】古籍別名 櫚櫚。櫚櫚。爾雅 大葉櫚。櫚櫚子金雞樹。枹。綱目 櫚枹。日本）

外國名詞 *Quecus dentata*, *Thunb* (拉丁) *カシハ* *ハハソ* *モチガシハ* *コガシハ* (日本)

基本 係殼斗科櫚屬。藥用櫚之實。

產地 生山野森林間。

十五畫 撲



(一) 櫚



(二) 櫚



(三) 櫚



(四) 櫚

葉開花。花單性。雌雄同株。其雄花所成之穗狀。花序常下垂。結實爲堅果圓形。大如拇指。有碗狀之殼。斗。其實仁可供藥用。

採取 採得剝取淨仁。入藥用。

性質 苦。澀。平。無毒。

主治 蒸煮作粉。瀉腸止痢。功同棗子。

【櫚木皮】別名 赤龍皮。(俗名)

性質 苦。澀。無毒。

主治 煎服除蟲及漏甚效。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論櫚木皮曰。煎湯洗惡瘡。

良【宋】大明諸家本草論櫚木皮曰。能吐痰癰。瀉五臟。

【明】李時珍本草綱目論櫚木皮曰。止赤白痢。腸風下血。

【櫚若】即櫚葉之原名。詳「櫚葉」條。

【櫚根】別名 獨龍鬚根。

主治 除瘰。止痛。

原名 櫚若。

製法 蘇頌曰。入藥須微炙令焦用。

性質 甘。苦。平。無毒。

【櫚葉】別名 獨龍鬚根。

主治 除瘰。止痛。

原名 櫚若。

製法 蘇頌曰。入藥須微炙令焦用。

性質 甘。苦。平。無毒。

主治 療痔。止血。及血痢。止渴。歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論櫚葉曰。活血。利小便。除面上黧赤。

【櫚櫚】即櫚之古籍別名。典見爾雅。詳「櫚」條。

【櫚頭肉】即櫚項肉之原名。詳「櫚項肉」條。

【樂山茶】產地 鄂州樂山。

主治 食之止頭痛。

參攷資料 鄂州東山出茶。黑色如韭。又云。出鄂州東山。名東山茶。色黑如韭。性與韭相反。

【櫚梅】形體 櫚梅爲梅之別種。結實如杏。鬆脆適口。

性質 甘。酸。平。無毒。

主治 生津止渴。清神下氣。消酒。

【櫚榆皮】產地 生山野中。

形體 櫚榆爲雜木之一種。狀如榆。秋八月生莢。如大榆。其皮有滑汁。可供藥用。

性質 甘。寒。無毒。

主治 下熱。淋利。水道。令人睡。

歷代記述攷證 【明】李時珍

十五畫 廣

德慶壺摩撒撒撥播撮

一六三〇

【廣皮】即橘皮之處方用名。詳「橘皮」條。

【廣皮炭】即橘皮焙炒成炭者之處方用名。詳「橘皮」條。

【廣石】即白石英之古籍別名。典見和漢藥考。詳「白石英」條。

【廣東萬年青】即吉祥草之原名。詳「吉祥草」條。

【廣茂】即藜莖之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蓬莖」條。

【廣參】即海參產於廣東省之別名。典見綱目拾遺。詳「海參」條。

【廣陳皮】即橘皮之處方用名。詳「橘皮」條。

【廣黃】即牛黃之出於廣南者。藥力較薄。詳「牛黃」條。

【廣福藤】即紅木香之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「紅木香」條。

【廣橘皮】即橘皮之處方用名。詳「橘皮」條。

【廣藿香】即藿香之處方用名。詳「藿香」條。

【廣香】即藿香之處方用名。詳「藿香」條。

【廣鬱金】即鬱金之處方用名。詳「鬱金」條。

【德兒】即杏仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳「杏仁」條。

【慶】基本 慶爲雜草類之一種。可供藥用。

性質 苦。無毒。
主治 咳嗽。

【威蕪】即并苦之古籍別名。典見別錄。詳「并苦」條。

【摩田避】即孔雀之古籍別名。典見綱目。詳「孔雀」條。

【摩婆石】即婆娑石之古籍別名。典見綱目。詳「婆娑石」條。

【摩勒香】即乳香之古籍別名。典見綱目。詳「乳香」條。

【摩廚子】產地 生西域。形態 摩廚子爲果類之一種。二月開花。四五月結實。如瓜狀。汁味香美。肥潤可茹。又供藥用。

性質 甘。平。無毒。
主治 益氣。潤五臟。久服令人肥健。

歷代記述攷證 【唐】李珣海藥本草論摩廚子曰：安神養血生肌。久服輕健。

【摩斯咤】即獼猴之古籍別名。典見梵書。詳「獼猴」條。

【摩澤樹】即無食子之古籍別名。典見西陽雜俎。詳「無食子」條。

【摩羅】即百合之古籍別名。典見別錄。詳「百合」條。

【摩羅迦錄】即瑪瑙之古籍別名。典見綱目。詳「瑪瑙」條。

【撒藍】即茄連之別名。典見綱目拾遺。詳「茄連」條。

【撒法郎】即番紅花之古籍別名。典見綱目。詳「番紅花」條。

【撥火杖】古籍別名 火柴頭。〔綱目〕火槽頭。〔綱目拾遺〕

基本 本品即撥火用之木杖。暨燒殘之柴頭。

主治 療金瘡。刮取黑炭敷之。

【撥掉子】即螞蟥之古籍別名。典見嘉祐圖經本草。詳「螞蟥」條。

【撫芎】命名 本品爲芎藭之出於江西撫州者。故名。

性質 辛溫。無毒。
主治 開鬱。寬胸。通行經脈。

配合應用 治失血湧吐。因餉食用力或因持重。努傷脈絡。用當歸二兩或三兩酒浸洗用。撫芎

一兩。散炒。水三碗。酒一碗半。煎至八分。作二次服之。取其引血歸經。並治跌撲損打而傷脈絡。令人大吐者。二症中如有瘀血。或加大黃下之。或加桃仁紅花破之。或加鬱金黃酒行之。審症酌加。其效更速。〔不藥良方〕

治一切熱癰時毒腫痛。撫芎煨研入輕粉麻油調塗。〔普濟方〕

用量 八分至二錢。
參攷資料 蜀產曰川芎。秦產曰西芎。江西爲撫芎。綱目取川芎列名。而西芎撫芎僅於註中一見。亦不分其功用。蓋芎藭以蜀產爲上。味辛而甘。他產氣味辛烈。遠不逮矣。殊不知西芎與川芎。性不甚遠。俱爲血中理氣之藥。第西產不及川產者力厚而功大。至撫芎則性專於開鬱。上升適然不同。故石頑於川芎下。另立撫芎一條。以明不可混。今從之。〔趙恕軒〕

【播羅子】即胡桃之古籍別名。典見梵書。詳「胡桃」條。

【撮石合草】產地 生原野。

形態 撮石合草爲雜草類之

墨磨汁。同藥服汁飲。或生地黃汁亦可。(集簡方)

⑤治衄血不止。眩冒欲死。盡墨汁滴入鼻中。(梅師方)

⑥治熱病衄血。出數升者。取好墨爲末。雞子白丸。梧子大。用生地黃汁下。二十丸。少頃再服。仍以蔥汁磨墨。滴入鼻內即止。(外臺祕要方)

⑦治大小便血。用好墨細末二錢。阿膠化湯調服。熱多者尤相宜。(寇氏本草衍義方)

⑧治卒淋不通。好墨燒一兩爲末。每服一字。溫水服之。(普濟方)

⑨治赤白下痢。薑墨丸。用乾薑好墨各五兩爲末。醋漿和丸。梧子大。每服三四丸。米飲下。日夜六七服。愈。(肘後方)

⑩治崩中漏下。青黃赤白。使人無子。好墨一錢。水服。日二服。(肘後方)

⑪治墮胎血溢不止。墨三兩。火燒醋淬三次。出火毒。沒藥一兩爲末。每服二錢。醋湯下。(普濟方)

⑫治婦人難產。墨一寸。末之。水服立寢。(肘後方)

⑬治胎死腹中。新汲水磨金墨服之。(普濟方)

⑭治胞衣不下。痛引腰脊。好墨溫酒服二錢。(肘後方)

⑮治癰腫發背。醋磨墨塗四圍。中以豬膽汁塗之。乾又上一夜即消。(趙氏方)

⑯治客忤中惡。多於道間門外得之。令人心腹絞痛。脹滿氣沖。胸不即治。殺人。搗墨水和服二錢。(肘後方)

⑰治飛絲入目。磨濃墨點之。即出。亦治塵物入目。(千金方)

⑱治產後血暈。心悶氣絕。以丈夫小便研濃墨一升服。(子母祕錄方)

⑲用量 錢半至三錢。
施用宜忌 凡溫疫熱病之吐衄初起者禁用。

參攷資料 ①古者以黑土爲墨。故字從黑土。許慎說文云。墨烟煤所成土之類也。故從黑土。劉熙釋名云。墨者晦也。(李時珍) ②墨松之烟也。世有以粟草灰僞爲者。不可用。須松烟墨方可入藥。年遠烟細者爲佳。粗者不可用。今高麗

國每貢墨於中國。不知何物。全不宜入藥。鄧延有石油。其烟甚濃。其煤可爲墨。黑光如漆。不可入藥也。(寇氏方) ③上墨以松烟用梓皮汁解膠和造。或加香藥等物。今人多以膏突中墨烟。再三以麻油入內。用火燒過造墨。謂之黑烟。黑光雖黑。而非松烟矣。用者詳之。(李時珍)

【墨水】即墨和水浸化者之處方用名。詳『墨』條。

【墨汁】即墨磨成汁者之處方用名。詳『墨』條。

【墨石子】即無食子之古籍別名。典見雷公炮炙論。詳『無食子』條。

【墨克蘭】即山穀根之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『山穀根』條。

【墨早蓮】即體腸含有黑汁者之處方用名。詳『體腸』條。

【墨荔】即荔枝實之產於廣西平樂縣之萬山中者。賀縣及荔浦修仁二縣山中亦均有之。其皮肉俱黑如墨。味臭而苦辣。不可喫。且有

大毒。誤食之。必致心腸腐爛而死。餘詳『荔枝』條。

【墨鳥骨】即烏鰂骨之古籍別名。

典見和漢藥考。詳『烏鰂骨』條。

【墨記草】即馬薊之古籍別名。典見綱目。詳『馬薊』條。

【墨魚骨】則烏鰂骨之古籍別名。典見綱目。詳『烏鰂骨』條。

【墨晶】即水晶之雜有植物質而成墨色者。功用與尋常水晶同。參看『水晶』條。

【墨菜】即體腸之古籍別名。典見綱目。詳『體腸』條。

【墨煙草】即體腸之古籍別名。典見綱目。詳『體腸』條。

【墨飯草】即南天燭之古籍別名。典見綱目。詳『南天燭』條。

【墨頭草】即體腸之古籍別名。典見綱目。詳『體腸』條。

【墨蘭】即迷蘭花之黑色者。風乾之可治瘡目。能生瞳神。而治青盲尤佳。餘詳『建蘭花』條。

【寬筋藤】從化、博羅等處。

性質 腥。甘。溫。平。

效驗 除風。消腫。舒筋活絡。散熱。

【廣木香】即木香之處方用名。詳『木香』條。

【木香】條。

十五畫 劉劍墟墨

飲。聖濟總錄方)

⑤ 治湯火傷灼。劉寄奴搗末。先以糯米漿雞翎掃上後乃搽末。並不痛亦無痕。大驗之方。凡湯火傷先以鹽末搽之。護肉不壞後乃搽之。藥妙(本事方)

⑥ 治風入瘡口腫痛。劉寄奴爲末。搽之即止。(聖惠方)

⑦ 治小兒夜啼。劉寄奴半兩。地龍炒一分。甘草一寸。水煎灌少許。(聖濟總錄方)

⑧ 治赤白下痢。陰陽交帶。不問赤白。劉寄奴。烏梅。白薑等分。水煎服。亦加梅。白加薑。(艾元英如宜方)

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡非實症及無瘀滯者禁用。

參攷資料 ①按李延壽南史

云宋高祖劉裕。小字寄奴。微時伐荻新州。遇一大蛇。射之。明日往。聞杵臼聲。尋之。見童子數人。皆青衣。於榛林中搗藥。問其故。答曰。我主爲劉寄奴所射。今令藥傳之。裕曰。神何不殺之。曰。寄奴王者。不可殺也。裕吐之。童子皆散。乃收藥而反。

劍墟墨

每遇金瘡。傳之即愈。人皆以此故。因稱此草爲劉寄奴草。鄭樵通志

云。江南人因漢時謂劉爲卯金刀。乃呼劉爲金。或又謂金寄奴。江東人又謂烏藤菜(李時珍) ①劉寄奴草。生江南。莖似艾。葉長三四尺。葉似山蘭草而尖長。一莖直上。有穗。葉互生。其子似稗而細。(蘇恭)

②今出越州。蒿之類也。高四五尺。葉似菊。其花白色。其實黃白色。作穗。夏月收苗乾之。(韓保昇) ③今河中府孟州。漢中。滁州亦有之。春生苗莖似艾蒿。上有四稜。高二三尺。以來。葉青似柳。四月開碎小黃白花。形如瓦松。七月結實似黍而細。根淡紫色。似蒿。莖。六月七月採苗及花子通用。(蘇頌) ④劉寄奴一莖直上。葉似蒼朮。尖長。糙澀而深。背淡。九月莖端分開數枝。一枝攢簇十朵小花。白瓣黃蕊。如小菊花狀。花罷有白絮。如苦蕒花之絮。其子細長。亦如苦蕒子。所云實如黍稷者。似與此不同。其葉亦非蒿類(李時珍)

【劉寄奴】即天名精之古籍別名。典見綱目。詳「天名精」條。

【劍脊金星】即辟瘟草大者之別名。典見綱目拾遺。詳「辟瘟草」條。

【劍脊烏梢蛇】即烏梢蛇。劍脊而尾細者之別名。典見綱目。詳「烏梢蛇」條。

【劍脊硝】即朴硝之古籍別名。典見和漢藥考。詳「朴硝」條。

【壘藥】即大壘之古籍別名。典見和漢藥考。詳「大壘」條。

【墨】命名 本品古以黑土爲之。故字從黑土而名。

處方用名 墨汁。墨水。陳墨。古藥別名 烏金。陳玄。玄香。烏玉瑛(綱目)

基本 係用松之煙炭和膠質凝成者。

產地 醫學大辭典曰。墨以安徽歙縣所產者最有名。京墨尤良。

形態 墨之原料。乃似輕細之壓木製成錠後。則質堅硬。其色烏黑。亦有光澤如漆者。

製法 凡使須用年遠松煙。墨餘皆不堪入藥。而光澤如漆且香者。更勿用。

用法 磨汁和服。入丸散火煨。細研。或水浸軟。紙包煨。到用。

一六二八

性質 辛。溫。無毒。

效能 止血化瘀。

主治 止血生肌。瘡。合金瘡。治產後血暈。崩中。卒下血。醋磨服之。又止血痢。及小兒客忤。渴。溫水服之。又明目。物芒入目。點磨。腫子。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論墨曰。利小便。通月經。治癰腫。【清】黃宮繡本草求真論墨曰。墨最能以止血。以其色黑。味辛。氣溫而止之也。蓋黑能勝紅。紅見黑而即止。以火不勝水者。故耳。辛能散血。血散則血歸經。而不外溢。是以過辛而即止也。溫能行血。血行則血周流。經絡而血不聚於所傷之處。是以得溫而即止也。故凡血熱過下。如瘟疫鼻衄。產後血暈。崩脫。金瘡。並絲經眼中。皆可以治。如止血。則以苦酒送。並汁投。消腫。則以豬膽汁。醋調。並眼有絲。經。則以墨磨雞血。迷點。客忤中腹。則磨地漿汁。吞。各隨病症所用。而治之。耳。但瘟疫熱病初起。連用此以止血。則非所宜。

配合應用 ①治吐血不止。金

烟或冒風寒。或受穢氣。以少許引之使噀。則邪穢疏散。積滯亦解。若刻不少間。反有致疾者。烟有多品。總以洋烟爲上。取其滋潤不烈。所以爲佳。(常中丞筆記)

【齊女】卽蠟之古籍別名。典見綱目。詳「蠟」條。

【齊蛤】卽馬刀之古籍別名。典見吳普本草。詳「馬刀」條。

【齊頭蒿】卽牡蒿之古籍別名。典見唐本草。詳「牡蒿」條。

十五畫

【劇草子】卽馬蘭子之古籍別名。典見本經。詳「馬蘭子」條。

【劈砂】卽碌砂之處方用名。詳「碌砂」條。

【劉寄奴草】 命名 本品爲宋高祖劉裕所發明。其小字寄奴。故名。

古籍別名 金寄奴。(大明)烏藤菜。綱目。鴨脚。九里光。六月雪。

六月變大葉蒿子(和漢藥考)

外國名詞 Senecio palmarum, Pail.

基本 屬菊科。爲劉寄奴草之

十四畫 齊

莖葉與花子。

產地 陳仁山藥物生產辨云。

劉寄奴生廣東。但各屬山野原澤間恒有生焉。

形態 劉寄奴草爲自生或人家栽種之宿根草。春季抽苗高四五尺。葉互生。作掌狀分裂。似艾葉而厚。粗糲。邊緣有細鋸齒。夏季莖端分歧。開大五六分之黃色單瓣花。類紫菀花。

採取 六七月間採之。

製法 雷斅曰。凡採得去莖葉。只用實。以布拭去薄殼。令淨。并酒蒸。從已至申。曝乾。用。李時珍曰。莖葉花子皆可用。

性質 苦。溫。無毒。

效能 破瘀活血。通月經。療金瘡。用治產後餘疾及金瘡藥。

主治 下血。止痛。治產後餘疾。止金瘡血極效。

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新修本草論劉寄奴曰。破血下脹。多服令人下痢。【宋】大明諸家本草論劉寄奴曰。心腹痛。下氣水脹。血氣通。婦人經脈凝結。止霍亂水瀉。

【明】李時珍本草綱目論劉寄奴

曰。小兒尿血。新者研末服。【明】經

希雍本草經疏論劉寄奴曰。劉寄

奴草。其味苦。其氣溫。採之有香氣。

故應兼辛。苦能降下。辛溫通行。血

十五畫 劇 劈 劉

得熱則行。故能主破血下脹。然善

走之性。又在血分。故多服則令人

痢矣。昔人謂爲金瘡要藥。又治產

後餘疾。下血止痛者。正以其行血

迅速故也。【明】李士材本草圖解

論劉寄奴曰。劉寄奴苦溫無毒。主

破血下脹。多服令人痢。下血止痛

同骨碎。補延胡索等分水煎入酒

及童便。頓溫服。治折傷瘀血在腹

通行。走散血分之性。凡病人氣血

虛脾胃弱。易作泄者。勿服。【清】黃

宮繡本草求真論劉寄奴曰。劉寄

奴因何而有是名。據書載是劉裕

小子寄奴。曾射一蛇。見童子搗

藥。問之。答爲寄奴所傷。裕罵而收

藥。故每遇金瘡。數之即愈。故以寄

奴爲名。但此雖非屬真。而藥味苦

微溫。多能破瘀通經。除瘀下脹。及

止金瘡血。出大小便。血湯火傷毒

綠血之在人。身本貴通活。滯而不

行。則血益滯。而不出。而癥瘕脹滿

愈甚。行而不止。則血亦滯而不收

而使血出益甚。寄奴總爲破血之

品。故能使滯者破。而即通。而通者

破。而即收。也。古書止言治功。而不

詳釋其義。殊覺疎漏。但性多走泄

不可過服。令人吐利不止。莖葉花

子皆可用。

近人學說 張山雷曰。此草以

劉裕小字得名。南史所謂搗藥治

傷者也。其性苦溫。善於破瘀宣通

專爲逐血攻脹之用。并以外敷。止

血定痛。治傷。亦治產後血瘀未淨

諸疾。及大小便血。心腹結痛。癥瘕

經閉。然專於攻破。非實證不可妄

用。

配合應用 ①治大小便血。劉

寄奴爲末。茶調。空心服二錢。卽止

(集簡方)

②治折傷瘀血。在腹內者。劉寄

奴。骨碎。補延胡索。各一兩。水二升

煎。七合。入酒及童子小便。各一合

頓溫服之。(千金方)

③治血氣脹滿。劉寄奴。穗實。爲

末。每服三錢。酒煎服。不可過多。令

人吐利。此破血之仙藥也。(衛生

易簡方)

④治霍亂成痢。劉寄奴。草煎汁

十四畫 鳳

鳴 鳶 鼻

●治遺精白濁。鳳眼草炒乾研末五錢。沖熱黃酒服。(醫學指南方)

參攷資料 按經驗廣集。治小便不通。有皂角湯熏法。方中用鳳眼草。乃臭椿葉別名。與此名同物。異又荔支草亦名鳳眼草。與此亦異。(趙學敏)

【鳳眼草】●即椿樗莢子之古籍別名。典見綱目。詳『椿樗莢子』條。●即荔枝草之古籍別名。典見草藥方。詳『荔枝草』條。

【鳳眼草花上粉】主治 殺蟲定癢。入藥用。

【鳳頭蓮】命名 本品狀似鳳頭故名。

產地 出臺灣島內山間。

形態 鳳頭蓮爲雜草類之一種。形如黃連。色紫而多細鬚。茸然分歧。如鳳頭。可供藥用。

性質 平。

主治 咽喉一切諸症。

【鳳頭草】即馬鞭草之古籍別名。典見綱目。詳『馬鞭草』條。

【鳳翼】即射干之古籍別名。典見

本草拾遺。詳『射干』條。

【鳴鳶】即蚯蚓之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蚯蚓』條。

【鳶】即鳴之古籍別名。典見陸璣詩疏。詳『鳴』條。

【鳶尾】古籍別名 烏園。(本經) 烏鳶。別錄 紫蝴蝶。(植物圖考) 紫羅欄。花鏡 扁竹。(俗名) 鵝尾草。(日本)

外國名詞 Iris toetorum, Maxim (拉丁) イチハツ (日本)

基本 係鳶尾科。藥用其根莖。

產地 山野川谷間。

形態 鳶尾爲毒草類之多年生草本。春月抽莖。高一二尺。葉劍狀。淡綠色。互生。各葉相擁抱。初夏花軸自葉間生。其上端常綴以三點。又有白色者。花蓋大小六片。外屬三片較大。在其上面下端之中

央有一雞冠狀突起。花柱之上部扁平。如花瓣。其與蝴蝶花相異者。因鳶尾之花軸單一。或分枝。花蓋之片上無毛狀之鏹齒。蝴蝶花之花軸恒分數枝。花蓋之片上有毛

狀之鏹齒也。其根如鳶頭。可供藥用。



鳶尾

性質 苦。平。有毒。

主治 蠱毒邪氣。鬼疰諸毒。破癥瘕積聚。去水下三蟲。本經殺鬼魅。療頭眩。(別錄)

參攷資料 ●此草所在有之。人家亦種。葉似射干。而闊短。不抽長莖。花紫碧色。根似高良薑。皮黃

肉白。嚼之戟人咽喉。與射干全別。射干花紅。抽莖長。根黃有白。(蘇恭) ●草名鳶尾。根名鳶頭。亦謂之鳶根。葉似射干。布地生。黑根。似高良薑。而節大。數個相連。九月十月採根。日乾。(韓保昇) ●此即射干之苗。非別一種也。肥地者莖長根粗。瘠地者莖短根瘦。其花自有數色。諸家皆是強分陳延之小品

方言東海鳶頭。即由跋者亦訛也。東海出之故耳。(李時珍)

【鳶頭】即鳶尾。詳『鳶尾』條。

一六二六

【鼻淵】即山查之古籍別名。典見百一選方。詳『山查』條。

【鼻淵蟲】即蛭蝨之俗名。詳『蛭蝨』條。

外國名詞 Pulvis Tabaci (Snuff)

製法 造鼻烟法。香白芷二分。北細辛八分。焙乾。豬牙皂二分。焙乾。薄荷二分。冰片三釐。乾烟絲爲君。乾絲一錢。必配福烟六七

分許。右藥各爲細末。酌量配合。不必拘分兩。以色如櫻色者佳。

種類 鼻烟鴨絲者最佳。玫瑰色者次之。醬色者爲下。陳久而枯者不堪用。

主治 通關竅。治驚風。明目。定頭痛。辟疫尤驗。

參攷資料 ●近京師有製鼻烟者。可明目。尤有辟疫之功。以玻璃爲瓶貯之。象牙爲匙。就鼻嗅之。皆內府製造。民間不及。張王叔云。近有廣東來者。較內府造者尤勝。有五色以蘋果色爲上。(香祖筆記) ●西洋出鼻烟。上品曰飛烟。稍次則鴨頭綠。色厥味微酸。謂之豆烟。紅者爲下。(澳門紀略) ●鼻

【鳳尾芳】即仙人掌之別名。詳「仙人掌」條。

【鳳尾金星】古籍別名 寶劍草。

形態 根類竹根黃色有鬚。葉類建蕙而短。長不滿尺。春月發苗。背有點子兩行。相對有數十粒。極密。秋霜後乃黃生石山下。其根蔓生。

性質 涼。主治 吐血。咽喉火毒。諸丹毒。發背癰瘡。

參攷資料 金星鳳尾。其葉細碎。形似鳳尾。三月發苗。葉背有星作細白點子。秋後乃黃生。古牆石壘中背日者佳。惟實熱症可用。又癰疽非陽毒。及非金石藥毒者。戒用。謝靈運云。性太涼。男女忌服。雖取效一時。但精血受寒。不能生育。爲虞耳。〔百草鏡〕治喉癰。金星鳳尾草。搗汁加米醋數匙。和勻用竹筍裹新棉花蘸汁點患處。稠痰隨筋而出。亦治喉風。〔家寶方〕。【鳳尾草】即金星草之古籍別名。典見綱目。詳「金星草」條。即翠羽草之古籍別名。典見綱目。拾

遺。詳「翠羽草」條。②即貫衆之原名。詳「貫衆」條。

【鳳尾蕉】命名 本品葉出細尖。瓣如鳳尾。故名。古籍別名 香蕉鐵樹。〔綱目拾遺〕。

產地 贛閩諸省。多生於鐵山間。

形態 鳳尾蕉爲蕉類之一種。本粗巨。高丈餘。莖有鱗片被之。葉生莖頂。長四五尺。色深青。入冬不凋。作羽狀分裂。密如魚刺。雌雄異株。雌花叢生。雄花如松球。長二尺。許。其葉可供藥用。

主治 平肝療一切肝氣難產。水煎服。

參攷資料 鳳尾蕉又名香蕉。亦名鐵樹。以鐵樹葉形如篋箕。其樹須塗以鐵屑乃盛實。則香蕉葉也。以其食鐵故亦名鐵樹。其性亦平肝。取其相制爲用。亦頗驗。謝肇浙五雜俎。香蕉能辟火患。將枯時以鐵屑簍之。或以鐵釘釘其根。則復活。蓋金能生水也。種盆中不甚長。一年纔落下一葉。計長不能以寸。亦不甚作花。三十年僅見兩度。

花耳。花亦似芭蕉。而色黃不實。羣芳譜。鳳尾蕉一名香蕉。產於鐵山。如少萎以鐵燒紅穿之。即活。平常以鐵屑和泥塗之。則茂而生子。分種易活。江西塗州有之花鏡鳳尾蕉。一名香蕉。產於鐵山。江西福建皆有。葉長二三尺。每葉出細尖。瓣如鳳尾之狀。色深青。冬亦不凋。如少萎黃。以鐵燒紅釘其本上。則依然生活。平常不澆壅。以生鐵屑和泥壅之。自安。且能生子。分種易活。極能辟火患。人多盆種庭中。以爲奇玩。友人唐振聲。在東臨見鳳尾蕉。土人皆呼爲鐵樹。則知今人所及洋舶帶來之藥。皆香蕉葉。而非真正鐵樹葉也。〔趙學敏〕。

【鳳尾蕉子】即海欖子之古籍別名。典見綱目。拾遺。詳「海欖子」條。

【鳳油刺】即伏牛花之古籍別名。典見和漢藥考。詳「伏牛花」條。

【鳳梨】即仙人掌之別名。詳「仙人掌」條。

【鳳凰衣】即雞卵殼中白皮之俗名。詳「雞卵殼中白皮」條。

【鳳凰退】即鳳凰蛻。詳該條。

【鳳凰椰子】即椰子之古籍別名。

典見植物學大辭典。詳「椰子」條。

【鳳凰蛻】即雞抱出卵殼之別名。典見綱目。詳「雞抱出卵殼」條。

【鳳眼草】命名 本品兩葉中心。秋後色白。儼如鳳眼。故名。

形態 鳳眼草爲澤草類之一種。數節後生苗。苗如薄荷。而葉微圓。長五六寸。立夏後枝極復生。二葉節皆生。芒種節後枝極間。二小葉中心各起蓋一枚。如人兩眼。細碎如石胡荽子。小暑後色轉紅黃。漸抽長。其花如鬚。長一二寸。紫黃色。自苗至老葉。皆有淡紅暈。可供藥用。其花上粉詳該條。

主治 活血祛風。療一切風痺。酒煎服。

配合應用 治室女乾血勞。用鳳眼草連根葉鮮者一兩。加紅花三錢。酒煎服。通經自愈。

治四日兩頭癰。用鳳眼草煮紅棗。飲汁。自愈。婦女經閉不通。發熱勞症。鳳眼草爲末。一兩。紅花炒二錢。水三鍾煎。一鍾入黑糖五錢。空心服。三五劑。見血方止。〔醫學指南方〕。

性質 微苦。溫。有小毒。

效能 消積塊。下骨哽。有通經之作用。用於月經不順。或月經困難。與閉止。

主治 產難積塊。噎膈。下骨哽。透骨通竅。

歷代記述攷證 【清】黃宮繡

本草求真論鳳仙子曰。鳳仙子又名急性。是俗所謂金鳳花。子是其性急。猛異常。味苦氣溫。小毒。凡人病患頑痰積塊。噎膈骨哽。服之立刻見效。以其氣味急迫。能於骨穴堅硬處。所極力搜治。是以勝金丹。用之以治狂癡。取其急領祇毒吐泄。同祇以點牙疼。即落同獨蒜搗汁以塗瘡塊。即消。加麝香。阿魏。尤捷。投子以煮硬肉。即爛。但此生不蟲。蜂蝶不近。且多食。則載人喉。似非無毒。用之當細審量可耳。

【清】黃元御玉楸葉解論鳳仙子曰。鳳仙子其性最急。能化骨。顛落牙齒。催生產。消瘰癧。與玉簪根性略同。而迅烈過之。作油。以少許滴蠶上。其殼立碎。崩落釜中。

近人學說 張山雷曰。金鳳花子成熟時。其壳一動。即自分裂。其

性最急。故有急性子之名。其氣味則瀕湖綱目謂微苦溫。有小毒。主治產難。催生。積塊。噎膈。下骨哽。透骨。取齒牙。皆取其迅速。直達為義。願治外瘍。堅塊。痠痛。麻木。陰發大症。研末。熬膏。貼患處。極能輭堅消腫如神。

配合應用 ①治產難。催生。鳳仙子二錢。研末。水服。勿近牙。外以莖麻子。隨年數搗。塗足心。【集簡方】

②治噎食不下。鳳仙花子酒浸三宿。曬乾。為末。酒丸。綠豆大。每服八粒。溫酒下。不可多用。即急性子也。【摘玄方】

③治咽中骨哽欲死者。用白鳳仙子研水一大呷。以竹筒灌入咽。其物即輒。不可經牙。或為末吹之。【普濟方】

④治牙齒欲取。金鳳花子研末。入砒少許。點疼牙根取之。【摘玄方】

⑤治小兒瘡積。急性子。水。薤花子。大黃各一兩。俱生研末。每味取五錢。外用皮消一兩。拌勻。將白鷄鷓一箇。或白鴨亦可。去毛。屎剖腹。

勿犯水。以布拭淨。將末裝入內。用線紮定。沙鍋內入水三碗。重紙封。以小火煮乾。將鷓鴣翻調。焙黃色。冷定。早晨食之。日西時疾輒。三日大便下血。病去矣。忌冷物百日。【孫天仁集效方】

用量 八分至錢半。

服用宜忌 凡無積滯者禁用。

參攷資料 ①鳳仙子其性急速。故能透骨。輭堅。瘡人煮魚肉。硬者投數粒。即易輭爛。是其驗也。緣其透骨。最能損齒。與玉簪根同。凡服者不可着齒也。多用亦載人咽。【李時珍】 ②其花頭翹尾足。具翹然如鳳狀。故以名之。女人採其花及葉。包染指甲。其實狀如小桃老則迸裂。故有指甲急性。小桃諸名。宋光宗李后諱鳳。宮中呼為好女兒花。張宛丘呼為菊菊。章居呼為羽客。【李時珍】 ③鳳仙人家多種之。極易生。二月下子。五月可再種。苗高二三尺。莖有紅白二色。其大如指。中空而脆。葉長如尖。似桃柳葉。而有鋸齒。極間開花。或黃或白。或紅或紫。或碧或雜色。亦自變易。狀如飛禽。自夏初至秋盡。開謝相

續。結實。纔然。大如櫻桃。其形微長。色如毛桃。生青熟黃。犯之。即自裂。皮卷如拳。苞中有子。似蘿蔔子。而小。褐色。人採其肥莖。沆配。以充蒿。笋。嫩華。酒浸一宿。亦可食。但此草不生蟲。蠶。蜂。蝶。亦不近。恐亦不能無毒也。【李時珍】

【鳳仙花】 古鑾別名 好女兒花。【綱目】



花 仙 鳳

性質 甘。滑。溫。無毒。

主治 蛇傷。搗酒服。即解。又治腰脇引痛。不可忍者。研餅。曬乾。為末。空心。每酒服三錢。活血消積。

【鳳仙根葉】

有小毒。

主治 雞魚骨哽。誤吞銅鐵。杖撲。腫痛。散血。通經。輭堅。透骨。

【鳳尾竹】 即竹之葉細。僅三分者。與見綱目。詳。竹。條。

【鳳尾松】 即無漏子之樹名。典見和漢藥考。詳。無漏子。條。

十四畫 飴

服。能下惡血。少用能利胃氣。解附子草烏毒。清黃宮繡本草求真論膠飴曰。飴糖氣味甘溫。據書言能補脾潤肺化痰止咳。並仲景建中湯用此以爲補中緩脾。蓋以米麥本屬脾胃之穀而飴糖屬穀麥所造。凡脾虛而肺不潤者用此氣味甘緩以補脾氣之不足。兼因甘潤以制肺燥之有餘。是以脾虛而痰不化。固可用此以除痰。脾虛而嗽不止。亦可用此以除嗽。即中虛而邪不解。亦得用此以發表。中虛而煩渴時見。亦得用此以除煩止渴。他如草烏毒中其性橫裂。固可用此以爲甘緩。芒刺誤吞。痛楚異常。更可用此以爲柔輭。然糖經煉成。溼而且熱。其在氣虛痰盛中虛火發。固可用此消除。若使中滿氣逆。實火實痰。非惟治痰且更動痰。非惟治火且更生火。至於小兒多食。尤易損齒生蟲。不可不懂。牽白者不入藥用。

國外學說 日本醫學士古川榮氏論用飴糖可製糖漿。(單舍利別)

載東京醫事新誌第三百六十四號。今錄其一段如左。據開

此次編纂日本藥局方。有提議用飴製糖漿者。終恐患者不以爲藥。因而否決。其果然耶否耶。若果如此。雖曰民智尚未盡開。而現有之良佳代用品。仍不能含糖漿而他求。誠爲憾事。倘告於衆曰。糖漿亦不過白糖之濃厚溶液耳。亦將即隨其信用耶。草野元養先生根據

醫士柏魯資氏處方。於飴中加二分之一至一百分之乳酸鐵或磷酸鐵(枸橼酸鐵及鐵金雞納霜價高益少)特名之爲含鐵麻魯資越幾斯(Extr. malti feratum)可謂妙矣。第一醫院所用。普通名稱雖爲含鐵麻魯資越幾斯。惟麻魯資並非飴。乃麥芽越幾斯。故毋寧名爲鐵飴煎似較適當。

配合應用

●治老人煩渴。寒食大麥一升水七升煎五升入赤飴二合湯即飲之。(奉親書方)

●治蚊龍癰病。凡人正二月食

芹菜。誤食蚊龍精者。爲蚊龍病。發則似癰。面色青黃。每服寒食飴五合。日三服。吐出蚊龍。有兩頭可驗。吐就者勿用。(金匱方)

●治魚臍疔瘡。寒食飴塗之。良

乾者燒灰(千金方)

●治瘰癧疔毒瘡。臘月飴糖晝夜塗之。數日則愈。(千金方)

●治誤吞稻芒。白錫類食。(簡便方)

●治魚骨梗咽。不能出。用飴糖丸雞子黃大吞之。不下再吞。(肘後方)

●治誤吞錢銀及竹木。取飴糖一斤。漸漸食盡便出。(外臺秘要方)

●治服藥過劑。悶亂者。飴糖食之。(千金方)

●治草烏頭毒。及天雄附子毒。並食飴糖即解。(聖濟總錄方)

●治手足癢瘡。炒臘月餅傳之。(千金方)

●治火燒成瘡。白糖燒灰粉之。即燥易瘥。(小品方)

●治火燒成瘡。白糖燒灰粉之。即燥易瘥。(小品方)

●治火燒成瘡。白糖燒灰粉之。即燥易瘥。(小品方)

●治火燒成瘡。白糖燒灰粉之。即燥易瘥。(小品方)

●治火燒成瘡。白糖燒灰粉之。即燥易瘥。(小品方)

一六二二

(金匱)桂枝三兩。(去皮)甘草三兩。炙。大棗十二枚。芍藥六兩。生薑三兩。膠飴一升。上六味以水七升。煮取三升。去渣。納膠飴。微火消解。溫服一升。日三服。●黃耆建中湯。虛勞裏急。諸不足者。主之。(金匱)即小建中湯內加黃耆一兩半。餘依前法。

參攷資料

●飴糖。即糖是也。多食動脾風。今醫家用以和藥。糯與粟米作者佳。餘不堪用。蜀黍米亦可造。不思食人。少食之。亦使脾胃氣和。唐白樂天詩。一棹較牙楊者是此。(本草衍義)●謂糖與酒皆用米麴。而糖以和酒爲釀。釀子由謂。藥米作餉。宛似水穀入胃。醱釀作汁。而出入未定之會。夫五穀分養五臟。如稻之甘。自是脾穀。而爲脾益。乃從蒸鍊後。氣之溫者。更爲大溫。暢中土生發之氣。即從氣取汁。變化精微。而和且潤。俾中土之生者能化。若痰之凝。血之凝。皆以化液。化血者對待之液。能化。則氣益生。此胃所以和而虛之所以能補也。(陶貞白)●內經曰。脾欲緩。急食甘以緩之。膠飴之甘。以緩

痰止血。解渴解毒。熬焦酒服。能下惡血。邢嘗進飛矢中目。拔矢而鏃留於中。痛困俟死。一僧教以寒食餠點之。至夜瘡癢。一餅而出。旬日瘳。明。穆希雍本草經疏論膠飴曰。飴糖用麥蘖或穀蘖同諸米漬熬煉而成。故其味甘。氣溫無毒。入足太陰。亦入手太陰經。甘入脾。而米麥皆養脾胃之物。故主補虛。仲景建中湯用之是也。脾胃有火。則發渴。火上炎迫血妄行。則吐血。甘能緩火之標。則火之下降。而渴自止。血自去也。孫思邈又謂其有消痰潤肺止咳。治咽痛吐血等功。【清】鄒澍本草疏證論膠飴曰。陶隱居云。酒與餠並米麥所爲。而品分中上。良緣餠以和潤而饒。酒以醲亂而劣。愚謂麴蘖雖皆麥所爲。然麴先屑粉而後盒造。爲拘折其生氣。蘖浸令生芽而後磨粉。爲引動其生機。然皆令消米質使成液也。酒釀久。方成餠。片時便就。久釀者。性反迅。速成者。性反緩。何歟。夫拘折者。鬱彌久而性愈猖生發者。萌旋達而氣已暢。故酒爲緩物之報使。饒實急劑之柔佐也。然虛煩

虛痞。虛腫。虛滿。俱有確證。可指其確証言之者。有虛勞。虛損。虛羸。虛弱。能知燄熱之爲勞。傳變之爲損。延癆之爲羸。疲癭之爲弱。則乏之爲乏。亦可擬議得之。夫行而無資。謂之乏。人身之行。非氣血而何。夫反正爲乏。非氣血之當行不行。而何。人身一天地也。噫。故納新環周不休。氣之道也。十二經脈。十五大絡。血之道也。其資皆稟於脾。則虛者。不可謂非脾氣不給矣。脾氣不給。滯茂尤草。皆能資助之。此獨何藉於飴餠。夫補虛乏已下。遂繼之以止渴去血。則茂尤者。皆與渴無干。且尤能去滯。不能滋燥。茂能充外。不能充內。蓋草能充內。且滋燥矣。又與血無干。以是見此虛此乏。斷非滯茂尤草所能補矣。雖然。虛乏而氣不能行。且渴者固多。又何以知有當去不去之血。夫仲景用飴餠多在建中湯。建中湯證多有腹痛。此血當行不行之驗也。是故飴餠非能去瘀血也。能治血當行不行爲腹痛者耳。故傷寒論金匱要略。用建中處甚多。然止云治腹痛。不云下瘀血。或謂本太陽

病。醫反下之。因爾腹滿時痛者。桂枝加芍藥湯主之。則治腹痛者。芍藥之功。非飴餠之力也。此誠有辨焉。何則。傷寒陽脈。陰脈。法當腹中急痛者。先與小建中湯。虛勞裏急。悸衄。腹中痛。夢失精。四肢痠疼。手足煩熱。咽乾口燥。小建中湯主之。虛勞裏急。諸不足。黃芪建中湯主之。婦人產後虛羸不足。腹中刺痛。吸吸少氣。或苦少腹中急。摩痛引腰背內補。當歸建中湯主之。婦人腹中痛。小建中湯主之。是知桂枝加芍藥湯所主是滿痛。小建中湯所主是急痛矣。桂枝加芍藥湯。卽小建中湯少飴餠耳。下後邪氣內傳。爲滿痛。是實虛勞產後腹痛。是虛虛飴餠一味之轉移。治證遂虛實不侔。猶不可見飴餠養補虛乏耶。桂枝湯在傷寒所治證多矣。茲則吸吸少氣也。咽乾口燥也。裏急腹痛也。腹中刺痛也。少腹急摩也。皆非桂枝湯所曾治。自是知卽飴餠之功矣。蓋土滯以木而疏。土虛以木而困。故少氣咽乾口燥。是脾之穀氣裏急腹痛。乃肝氣侮脾。飴餠之柔潤芳甘。正合脾家土

德。而卽以緩肝之急。以肝固罷極之本。虛乏之所從來也。是故桂枝加芍藥湯。無飴餠。卽不名建中。桂枝加黃芪湯。不加芍藥。不用飴餠。卽不名黃芪建中。而蜀椒。乾薑。人蘖。協以飴餠。卽名大建中。是知建中固以飴餠得名耳。然則其所謂大小者。究何義耶。夫以勢合勢。分大小。則小建中用芍藥桂枝。生薑得十五兩。又益大棗十二枚。大建中用人蘖乾薑僅五兩。止益以蜀椒二合。乃同用飴餠一升。則飴餠在大建中湯獨多。而勢合在小建中湯。體均而勢分。此一說也。若以力專力薄。分大小。則辛甘爲陽。酸苦爲陰。大建中純用甘辛。則力厚氣專。小建中兼用酸苦。則力微氣薄。此又一說也。總之兩建中。皆以飴餠爲君。君尊而臣從。命則爲大。君卑而臣援。命則爲小。此實大小得名之確指歟。而飴餠之所以尊於此。益可徹悟矣。【清】楊時泰本草述鈞元論膠飴曰。味甘。饒氣。大溫。脾經氣分藥。補虛冷。健脾胃。補中治脾弱。不思飲食。潤肺消痰。止瀉。療吐血。由打損成癆者。熬焦酒

十四畫 銚

詔 頗 領 飴

【銚芒】即羊桃之古籍別名。典見綱目。詳「羊桃」條。

古籍別名 山詔子。藤

【詔子】詔子(綱目)

形態 詔子爲果類之一種。葉如栗。色赤。其實夏日成熟。紅色。肉如荔枝。可供藥用。

性質 甘。溫。無毒。

主治 暴痢。心腹冷氣。

【詔腦】即樟腦之古籍別名。典見綱目。詳「樟腦」條。

【頗兒必】即羊脛骨之別名。詳「羊脛骨」條。

【頗黎】即玻璃之古籍別名。典見綱目。詳「玻璃」條。

【領石】即絡石之古籍別名。典見和漢藥考。詳「絡石」條。

【飴糖】即飴糖之處方用名。參見「飴糖」條。

【飴糖】 命名 糖之清者曰飴。稠者曰飴。如飴而濁者曰飴。

處方用名 膠飴。飴糖。

古籍別名 飴(綱目)飴。軟糖。

傳錄(和漢藥考)

基本 蒸粳米。糯米。大麥。小麥。

粟。黃小米。玉蜀黍。慈苳仁等澱粉質。加麥芽子(麥芽)使之糖化即成。

產地 中國各地均有出產。今日本各地產此。其著名者爲越後(高田水飴)肥後(朝鮮飴)讚岐(琴平飴)相模(浦賀水飴)等處所產。

形態 飴糖有硬軟之別。硬者爲淡黃色。富黏質之濃稠液體。硬者爲黃褐色。塊俱有甘味。將黏稠者牽引使混入空氣。則成爲多孔質。變成缺乏黏性之白色塊。但一帶溼氣。則再發黏性。其精製品經數年亦不變壞。

種類 將糖化黏汁煎熬。第一次所得之飴糖。日本謂之一號飴。將殘餘納入布袋。擠出黏汁。再行煎熬。此第二次所得之飴糖。謂之二號飴。更類別之有左列數種。一水飴。將糖化黏汁煎熬。使成濃稠者。二膠飴。一名地黃煎。或呼朝鮮飴。即將水飴再煎熬。使成膏藥狀者。三淡切飴。即膠飴之更熬硬者。概須用藥斷之。四錫一呼白玉飴。即將膠飴牽引數十次。使生孔成

爲白色者。

製法 ①飴化有種種製法。今述其一。先將糯米一斗搗之。蒸成硬飯。加麥芽之去糲粉末一升五合。善加攪拌。再注入溫湯一斗五升。保持約攝氏四十五度至五十五度之溫度二小時。則澱粉質受酵母之作用而糖化溶解。乃去其殘渣。將所得黏汁煎熬。使成適度之稠狀。②凡穀之黏者。皆可製飴。漬過蒸熟。每一石用大麥藥一斗八升和水磨汁。傾入其中。少假即生飴。如蜜而稀。色如膠。所謂膠飴是也。其稍乾者。謂之錫。其熬令乾。鞭牽而色白者。謂之餅。

用法 膠飴即可下嚥。或溶於溫湯中飲之。或沖入於湯藥中服之。

性質 甘。大溫。無毒。

成分 主成分爲麥芽糖。糊精。此外含有蛋白質。脂肪及少許鹽質。

效能 和中。潤腸。補虛。止痛。爲炭水化合物之可溶性物。易消化。向用作小孩產婦滋養物。又用以配合藥物製飴劑。

一六二〇

主治 補虛乏。止渴去血。

張仲景之發明 飴糖一味。經張仲景之實驗。認爲緩急之要藥。

茲考徵如下。①小建中湯證曰。腹中急痛。又曰。裏急。又曰。婦人腹中痛。②大建中湯證曰。上下痛。而不可觸近。③黃耆建中湯證曰。裏急。以上三方。膠飴各一升。能治裏急。夫腹中急痛。腹中痛。豈非裏急矣乎。故曰。膠飴之功。與甘草及蜜相似矣。

歷代記述攷證 【唐】孫思邈千金翼論。膠飴曰。補虛冷。益氣力。止腸鳴。咽痛。治唾血。消痰。潤肺。止嗽。【唐】孟詵食療本草。論膠飴曰。健脾胃。補中。治吐血。打損瘀血者。熬焦酒服。能下惡血。又傷寒大毒嗽。於薑薤汁中煮一沸。頓服之良。【宋】寇宗奭本草衍義。論膠飴曰。脾弱不思食。人少用能。和胃氣。亦用和藥。【元】王好古湯液本草。論膠飴曰。乃脾經氣分藥也。甘能補脾之不足。【明】李時珍本草綱目。論膠飴曰。解附子草烏頭等毒。【明】李士材本草圖解。論膠飴曰。飴糖甘溫。補中健胃。潤肺止嗽。消

等分爲末。擦之立愈。(邵真人經驗方)

⑤治口鼻疳瘡。銅青、枯礬等分研傳之。又方人中白一錢。銅綠三分研傳之。

⑥治楊梅毒瘡。銅綠醋煮研末。燒酒調擦。極痛出水。次日即乾。或加白堊等分研傳。(簡便方)

⑦治瘰癧頑癬。銅綠七分。研黃蠟一兩。化熬。以厚紙拖過。裏別以紙隔貼之。出水妙。亦治楊梅毒瘡及蟲咬。

⑧治諸蛇螫毒。銅青傳之。(千金方)

⑨治百蟲入耳。生油調銅綠滴入。(衛生家寶方)

⑩治頭上生虱。銅青、明礬末。搽之。摘玄方)

用量 五分至八分。

施用宜忌 凡無實邪者禁用。

參攷資料 ①銅青乃銅之液

氣所結。酸而有小毒。能入肝膽。故吐利風痰。明目殺疳。皆肝膽之病也。抱朴子云。銅青塗水入水不腐。(李時珍) ②生熟銅皆有青。即是銅之精華。大者即空綠。以次空青。

十四疊 銅

銑

銅青則是銅器上綠色者。淘洗用之。(陳藏器) ①近時人以醋制銅生綠。收取曬乾貨之。(李時珍) ②銅綠係酸水與銅相連而生。外用能殺毒。或用銅綠細末灑瘡上。殺浮肉良。(內科新說) ③銅綠不但有去腐之功。並有防腐之性也。(盧鵬飛)

【銅青末】即銅青之處方用名。詳『銅屑』條。

【銅砂】即銅屑之古籍別名。典見綱目。詳『銅屑』條。

【銅呢魚】即銅魚之古籍別名。典見臨海志。詳『鱗魚』條。

【銅屑】命名 銅與金同。故字从金而名銅。入藥用其屑。故名銅屑。

古鑄別名 銅落。銅末。銅花。銅粉。銅砂。(綱目)

形態 銅爲金類。金屬原質之一。其色橙紅。性能伸展延長。又能傳熱及電。近時常以製鍋及電線諸物。所謂銅屑者。即打赤銅時落下之細屑。也可供藥用。

製法 凡使或用打銅落下之屑。或以銅火煨淬水中。其屑亦自

落下。以水淘淨用。好酒入沙鍋內炒。見火星取出。研末用。

性質 苦。辛。微毒。

主治 賊風反折。熱使極熱。投酒中服五合。日三。或以五斤燒赤。納二斗酒中。百遍。如上服之。又治腋臭。以醋和如麥飯。袋盛。先刺腋下脈去血。封之神效。

歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草論銅屑曰。明目治風。眼接骨。鏗齒。療女人血氣及心痛。【明】李時珍本草綱目論銅屑曰。同五倍子能染鬚髮。

參攷資料 ①蒼朮能粉銅。巴豆牛脂能煨銅。慈姑乳香能啞銅。此物性然也。(李時珍) ②赤銅屑主傷寒。能鏗人骨。及六畜有損者。細研酒服。直入骨損處。六畜死後取骨視之。猶有鏗痕可驗。打熟銅不堪用。(陳藏器) ③朝野僉載云。定州崔務堅馬折足。醫者取銅末和酒服之。遂瘳。及亡後十年改葬。視其脛骨折處。猶有銅束之痕也。(唐慎微)

【銅粉】即銅屑之古籍別名。典見綱目。詳『銅屑』條。

【銅勒】即膽礬之古籍別名。典見吳普本草。詳『膽礬』條。

【銅黃】即礬黃之說。詳『礬黃』條。

【銅落】即銅屑之古籍別名。典見綱目。詳『銅屑』條。

【銅鼓草】形態 銅鼓草爲雜草類之一種。結實如瓜。可供藥用。

主治 癰毒。

【銅錄】即銅青之古籍別名。典見綱目。詳『銅青』條。

【銅錄粉】即銅青之處方用名。詳『銅青』條。

【銅錢草】即金錢草之別名。詳金錢草條。

【銅礦石】命名 礦粗惡也。五金皆有粗石銜之。即礦石之含有銅質者。故名。

形態 銅礦石爲鑛類之一種。乃銅之天然生者。多與硫黃神絲等混合。狀如礬石。而有銅星。鑛之可取純銅。其石可供藥用。

性質 酸寒。有小毒。

主治 丁腫脹。瘡爲未傳之。馬脊瘡。臍臍瘡。汁塗。

【銑代】即鬼桃。詳『羊桃』條。

十四畫 銀 銅

用銀黝子四兩。搥碎。黃丹八兩。飛淨。香油二十兩。用砂鍋盛油。待油溫熱。即入黝子。桃柳桑槐。棗五枝。攪之。候起珍珠花。撈去渣滓。濾淨後。將油下鍋。慢慢將黃丹。篩入油內。仍以五枝。不住攪之。以滴水成珠爲度。取出收貯。用時勿見火。於重湯。炖化。攤貼用之。【五雲膏方】

參攷資料 凡銀入罐。必多用硝及礬砂。黃砂。以去鉛銅雜質。沉於罐底。其上則爲十足之紋。銀罐底所餘之黑色滓渣。名謂鉛有毒。不可食。食則能墮人腸。急用黃泥水服二茶盞。可解。或每日用飴糖水服二茶盞。不時以芝麻油吞下。四兩。作小丸。不時以芝麻油吞下。俱可瀉其毒。須服至百日外。無患。或用烏梅湯灌之。即解。或用帶皮綠柿連吃數十枚。冬日吃柿餅。茨菇汁可解。【綱目拾遺】

【銀黝刀】即玉如意之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「玉如意」條。

【銀箔】即銀箔之處方用名。詳「銀箔」條。

【銀黝】即銀黝。詳「銀黝」條。

【銀黝匙】即老鴉蒜之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「老鴉蒜」條。

【銀黝】即老鴉蒜之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「老鴉蒜」條。

【銀黝匙】即老鴉蒜之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「老鴉蒜」條。

【銀黝】即老鴉蒜之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「老鴉蒜」條。

【銀黝匙】即老鴉蒜之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「老鴉蒜」條。

【銀黝】即老鴉蒜之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「老鴉蒜」條。

【銀黝匙】即老鴉蒜之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「老鴉蒜」條。

【銀黝】即老鴉蒜之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「老鴉蒜」條。

【銀鑿】即鑿之毛白色者之古籍別名。典見綱目。詳「鑿」條。

【銀鑿石】即鑿石之處方用名。詳「鑿石」條。

【銀鑿】即鑿魚之白色者。功用較尋常鑿魚爲良。

【銅末】即銅屑之古籍別名。典見綱目。詳「銅屑」條。

【銅皮鐵骨】即昭參外皮青黃。內肉青黑色。質堅重者之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「昭參」條。

【銅花】即銅屑之古籍別名。典見綱目。詳「銅屑」條。

【銅芸】即防風之古籍別名。典見本經。詳「防風」條。

【銅青】
命名 本品係銅鑄衣色青綠。故名。
處方用名 銅綠粉。銅青末。
古籍別名 銅綠（綱目）。

基本 係礦石屬。爲銅之鑄云。

產地 陳仁山藥物生產辨云。銅青係由腰銅久貯鹹溼地方。發霉而成。各處均有。銅青餅。由舊銅與酸醋製出之。顏料店均有沽。

形態 銅爲金屬化學原質之一色。紅棧。若在含炭氣之潮溼空氣中腐蝕之。則變生青綠色之鏽衣。成爲炭銅。其鏽衣即名銅青。

製法 或置銅於溼地。或塗醋於銅上。使生綠後刮取。或淘取晒乾。用但市肆以枯礬和青藍而成。不可用。

用法 恒以剉研和作丸散。性質 酸。平。微毒。效能 祛風痰。治惡瘡。明目。殺蟲。用作瘡毒藥。又作祛痰蝕腐藥。主治 婦人血氣心痛。合金瘡止血。明目。去腐。赤息肉。

歷代記述攷證 【南北朝】徐之才雷公藥對論銅青曰。主風爛眼淚出。【明】李時珍本草綱目論銅青曰。治惡瘡疥瘡。吐風痰。殺蟲。

【明】李士材本草圖解論銅青曰。銅青酸走厥陰。主吐利風痰。明目。祛瘡殺蟲。服之最能損血。宜酌之。

【清】黃宮繡本草求真論銅青曰。銅青即俗所云銅綠者是也。與空青所產不同。銅青氣臭。地陰。英華外見。藉醋結成。故味酸苦。瀟氣寒。能入肝膽二經。按酸入肝而斂。所以能合金瘡止血。苦寒能除風熱。

所以能去腐赤及鼻腐肉。皆能洩結。所以醋醃喉中。則吐風痰。而使血氣心痛皆止。爲散能療喉痺牙疳。醋調搗服下。治胡臭。薑汁調點爛弦風眼。去疥殺蟲。所治皆陰虛之病。

配合應用 治風痰卒中。碧林丹治痰涎潮盛。卒中不語。及一身風癱。用生綠二兩。乳細水化去。石慢火熬乾。再研入麝香一分。糯米粉糊和丸。彈子大。陰乾。卒中者。每丸作二服。薄荷酒研下。餘風痰砂酒化下。吐出青碧涎。瀉下惡物。大效。又治小兒用綠雲丹。銅綠不計多少。研粉。醋糊丸。葵子大。每薄荷酒化服一丸。須臾吐涎。（經驗方）

治爛弦風眼。銅青水調塗盤底。以艾熏乾。刮下塗爛處。（衛生易簡方）

治赤髮禿落。油磨銅錢末塗之。即生。（普濟方）

治面黧黑。以草剉破銅綠末。傳之三日。勿洗水。自落。厚者再上之。（聖濟總錄方）

治走馬牙疳。銅青。滑石。杏仁。

治走馬牙疳。銅青。滑石。杏仁。

治走馬牙疳。銅青。滑石。杏仁。

治走馬牙疳。銅青。滑石。杏仁。

治走馬牙疳。銅青。滑石。杏仁。

長黃連、甘草、飛廉、石亭脂、砒石、羊血、馬目毒公、慈石、惡錫、忌生血。

●參攷資料 ●銀屑病：洪村後

方。治瘰癧。五石湯中用之。(蘇頌)

●本草言銀屑有毒。生銀無毒。釋

者略漏不言。蓋生銀已發於外。無

蘊鬱之氣。是以無毒。錒銀蘊於石

中。鬱結之氣。全未散暢。故有毒也。

(寇宗奭) ●此說非矣。生銀初煎

出如綬理。乃其天真故無毒。鑄者

投以少銅。則成絲文金花。銅多則

反敗銀。去銅則復還銀。而初入少

銅。終不能出。作偽者又制以藥石

鉛錫。且古法用水銀煎消制銀薄

成泥入藥。所以銀屑有毒。銀本無

毒。其毒則諸物之毒也。今人用銀

器飲食。遇毒則變黑。中毒死者。亦

以銀物探試之。則銀之無毒可徵

矣。其入藥亦是平肝鎮怯之義。故

太清服銀書言銀製西方辛陰之

神。結精爲質。性剛。庚服之能傷肝

是也。抱朴子言銀化水服。可成地

僊者。亦方士謬言也。不足信。(李

時珍) ●爾雅白金謂之銀。其美

者曰鏤。說文云。鏤。白金也。梵書謂

之阿路巴。(李時珍) ●生銀出饒

十四畫 銀

州樂平諸坑。銀餅中狀如硬錫。文

理粗錯。自然者真。(馬志) ●銀在

餅中與銅相雜。土人採得。以鉛再

三煎煉。方成。故爲熟銀。生銀則生

銀餅中。狀如硬錫。其金坑中所得。

乃在土石中滲漏成條。若絲髮狀。

土人謂之老翁鬚。極難得。方書用

生銀。必得此乃真。(蘇頌) ●按南

越志。波斯國有天生藥銀。用爲試

藥指環。又燒朱粉。燒下多年沈積

有銀。號盃鉛銀。光軋甚好。與波斯

銀功力相似。祇是難得。今時鍊銀

家。每一斤生鉛。只得一二銖。山海

經云。東北樂平郡。望少山。出銀甚

多。黔中生銀。盤硬不堪入藥。(李

珣) ●閩浙荆湖。饒信。廣源。貴州

交趾諸處。山中皆產銀。有餅中鍊

出者。有沙土中鍊出者。其生銀俗

稱銀筭。銀牙者也。亦曰出山銀。獨

孤酒丹房鏡源。所謂鉛坑中出。褐

色。石形如笋。打破即白。名曰自然

牙。曰自然鉛。亦曰生鉛。此有變化

之道。不堪服食者是也。管子云。上

有鉛。下有銀。地鏡圖云。山有蔥。下

有銀。銀之氣入夜正白。流散在地。

十七種。又外國四種。天生牙。生銀坑內石縫中。狀如亂絲。色紅者。上入火。紫白如草根者。次之。銜黑石者。最奇。生樂平鄱陽。產鉛之山。一名龍牙。一名龍鬚。是正生銀。無毒。爲至藥根本也。生銀生石餅中。成片塊。大小不定。狀如硬錫。母砂銀生五溪丹砂穴中。色理紅光。黑鉛銀得子母之氣。此四種爲真。有水銀。銀草。砂銀。曾青。銀石。綠銀。雄黃。銀。雌黃。銀。硫黃。銀。膽礬。銀。鐵草。銀。皆是以藥制成者。丹陽銀。銅銀。鐵銀。白錫銀。皆以藥點化者。十三種。皆假銀也。外國四種。新羅銀。波斯銀。林邑銀。雲南銀。並精好。(李時珍) ●按方勺泊宅編云。黃銀出蜀中。色與金無異。但上石則白色。能大古。冀越集云。黃銀絕少。道家言鬼神畏之。六帖載唐太宗賜房元齡帶云。世傳黃銀。鬼神畏之。春秋運斗樞云。人君乘金德而生。則黃銀見。世人以鉛石爲黃銀。非也。銀石即藥成黃銅也。(李時珍) ●烏銀。今人用硫黃。蒸銀。再宿。瀉之。則色黑矣。工人用爲器。養生者以器煮藥。兼於一二丈處。夜承露。

醴飲之。長年辟惡。(陳藏器)

【銀膏】 命名 本品係白錫和銀薄與水銀合成之。光明如銀。凝硬如膏。故名。

性質 辛大寒。有毒。

主治 熱風心虛。驚悸恍惚。狂走。瞋上熱。頭面熱。衝衝心上下安神定志。鎮心明目。利水道。治人心風健忘。亦補牙齒。缺落。

【銀毒】 卽水仙之日本別名。詳「水仙」條。

古醫別名 銀粉。銀焰。

【銀鋪】 (綱目拾遺)

基本 本品卽銀鋪中銻銀罐底所餘之黑滓。

主治 療頑癬。取盛磁盤內安置。露天將盤微側。使銻沾露。有水。流下。抓破取塗之。

配合應用 ●治一切無名腫毒。癰瘡痔漏。發背疔瘡。用銀鋪一斤。黑芝麻油二斤。先將銻浸油內。浸十日。敲碎。同油煎至四五分熱。以絹袋濾去銻。入炒過飛東丹一斤。熬成膏。一貼卽愈。(內府萬應膏方)

●治馬刀瘰癧。及風瘡已潰者。

十四畫 銀

阿路巴。(說文)(梵書)銀牙。(綱目)山凝白衣。白物。白貴白銀。白選。丹精朱提。金妃。龍鬚。女石。下水。(和漢藥考)

外國名詞 Argentum (拉)

丁) Silver (英) Silber (德)

形態 銀為有光輝白色之金屬。置空氣中不變化。然置於含有硫化水素之氣中。則逐漸變黑。富有引伸延展兩性。入硝酸即液解。

種類 ①自然銀。在古層之石脈中。如毛。如線。如苔蘚。如樹枝。如板片。間有成結晶形者。為銀白色。或微帶他色。斷面作鑿齒狀。有引伸延展兩性。硬度二·五。比重一〇·四。其中常含有銅。鐵。金等質。

②輝銀鐵。一名光銀鐵。在火山岩及凝灰岩中。間有暗灰色之結晶。大半如毛。如線。如齒。如樹枝。條痕現灰黑色。延展性略減。硬度二·〇至二·五。比重七·〇至七·五。鑛中有銀及硫黃。Ag₂S 此採銀之佳鑛也。③脆銀鑛。一名輝銀安鑛。為六角之板狀結晶。色黑。有金剛光澤。斷面作鋸齒狀。或貝殼狀。條痕現黑色。硬度二·〇至二

·五。比重六·二。此鑛成於銀。安質母尼與硫黃 Ag₂S ④紅銀鑛。此鑛有明暗二種。明者名淡紅銀鑛。為朱紅色之鑛石。條痕現紅色或黃色。硬度二·五。比重五·五。成於銀。砒。硫黃 Ag₂As₂S₃ ⑤暗者名深紅銀鑛。有黑色稜角。透過赤色之鑛石。條痕現紫黑色。硬度二·〇至二·五。比重五·八。成於銀。安質母尼與硫黃 Ag₂S。

⑥二者皆謂之紅寶銀。⑦角銀。南美及墨西哥為其主產地。為似蠟之鑛石。色灰。或灰綠。質如角。無光澤。成於銀與鹽素 AgCl 乃硫化銀之變體也。

製法 陶弘景曰。醫方鑛心丸用之。不可正服。為屑。當以水銀研令消也。蘇恭曰。方家用銀屑。取現成銀薄。以水銀消之。為混合消石。及鹽研為粉。燒出水銀。淘去鹽石。為粉極細。用之乃佳。不得只磨取屑耳。李時珍曰。入藥只用銀薄。易細。若用水銀鹽消制者。反有毒矣。龍木論謂之銀液。又有錫薄可偽宜辨之。

效驗 鎮心神。定驚悸。祛風熱。治癰痢。明目。安胎。用作解熱解毒藥。

主治 安五臟。定心神。止驚悸。除邪氣。久服輕身。長年。

歷代記述攷證【唐】甄權藥性本草論銀屑曰。定志去驚。癰小兒癰疾。狂走【唐】李珣海藥本草論銀屑曰。銀薄堅骨。鎮心明目。去風熱。癰入丸散用。

國外學說 新藥百品考曰。生銀(第五十六品)銀鑛常含有銅或金。精鍊之法有種種。或將酸化銀鑛。紅提鍊。或以硫酸鐵分析。硫酸銀。其功用頗有可疑。有用之腹痛者。恐係混有銅質故也。專治癰毒用法。以〇·〇一二至〇·〇六。製為丸或錠服之外。用塗敷舌上。每次用〇·〇一五。製造輾膏。以銀〇·六至一·〇。和脂四錢。調製而成。又和漢藥考曰。精鍊銀質之法有數種。近時將方鉛鑛黃銅鑛。用電氣分解法。鍊得其。中所含之銀。而以鉛。銅為其副產物。於精鍊銀質之銀鑛中。和入鉛鑛。使在爐內一併熔化。製成含銀鉛。

再用灰吹法。將鉛酸化。復除去之。則得純銀。或將含銀鉛熔化。候冷。鉛之結晶較速。則反覆除去之。迨鉛所存無多。續用灰吹法。收採純銀。鍊角銀法。可和入鐵片。水銀。再用阿瑪爾加製法。收採純銀。

配合應用 ①治妊娠腰痛。如折者。銀一兩。水三升。煎二升。服之。(子母祕錄方)

②治胎動欲墮。痛不可忍。銀五兩。苧根二兩。清酒一盞。水一大盞。煎一盞。溫服。(婦人良方)

③治胎熱橫悶。生銀五兩。葱白三寸。阿膠炒半兩。水一盞。煎服。亦可入糯米作粥食。(聖惠方)

④治風牙疼痛。紋銀一兩。燒紅。淬燒酒一盞。熱漱飲之。立止。(集簡方)

⑤治口鼻疳疔。穿唇透頰。銀屑一兩。水三升。銅器煎一升。日洗三四次。(聖濟總錄方)

⑥治身面赤癰。常以銀指令熱。久久自消。(千金方)

用量 銀箔三分至八分。紋銀三錢至八錢。應用宜忌 凡非實熱者禁用。

味甘微寒無毒。蒿長尺餘。色微白。力弱於北柴胡。卽銀州之輭柴胡。專治骨蒸勞熱。不但清熱。兼能涼血。和劑方治上下諸血。龍腦雞蘇丸中用之。凡入虛勞方中。最爲相宜。用者須購真銀柴胡爲要。曹炳章曰。按銀柴胡陝西富夏府甘肅州及山西大同府皆產。選肥大堅實。色白。輭糯無沙心者爲佳。僞者尙無。又按經疏云。柴胡有二種。一種色白而大者。名銀柴胡。達原云。銀柴胡野州者良。今延安五原城所產者。長尺餘。肥白而輭。百草鏡云。出陝西富夏鎮。二月採葉。名芸蒿。長尺餘。根微白。卽銀柴胡。藥辨云。銀柴胡出富夏。形似黃耆。參合諸說。與近今市肆所備。亦相符合。據余實驗。凡治虛勞肌熱。骨蒸勞熱。熱從髓出。及小兒五疳羸熱。用之頗效。若用北柴胡。則升動虛陽。發熱喘嗽。愈無寧乎。周一士云。熱在骨髓者。非銀柴胡莫謬。前人有不識藥品之形態。往往妄評銀柴胡爲贗物。豈可不辨。以淆惑後人。而使無從遵循乎。

用量 八分至錢半

十四畫 銀

參攷資料 今關陝江湖間近道皆有之。以銀州者爲勝。二月生苗。甚香。莖青。葉堅硬。微有細線。葉似竹葉。而稍緊小。亦有似斜蒿者。亦有似麥門冬葉而短者。七月開黃花。根淡赤。色似前胡。而強生丹州者。結青子。與他處者不類。其根似蘆頭。有赤毛如鼠尾。獨竄長者好。(蘇頌)翁有良云。銀柴胡產銀州者佳。有二種。但辨形如鼠尾。與前胡相等。查前胡與柴胡相類。皆以西北出產者爲勝。形既相同。當以湖廣古城柴胡爲準。今銀柴胡粗細不等。大如拇指。長數尺。形不類鼠尾。又不似前胡。較本草不對。治病難分。兩用究非的確。用者詳之。銀州柴胡。輭而白。北產亦有白色者。今人以充白頭翁。此種亦可謂銀柴胡。蓋銀指色言。不指地言。猶金銀花白色者曰銀花是也。銀柴胡原有西產北產之分。不必定以銀夏者爲銀柴胡也。然入藥以西產者勝。(金御乘)廟元英談藪云。張知閑久病瘧。熱時如火。年餘骨立。醫用茸附諸藥。熱益甚。召醫官孫琳診之。琳投柴胡

- 湯一帖。熱減十之九。三服脫然。琳曰。此名勞瘧。熱從髓出。加以剛劑。氣血愈虧。安得不瘳。蓋熱有在皮膚在臟腑在骨髓。非柴胡不可。若得銀柴胡。只須一服。南方者力減。服故三服乃效也。(李時珍)
- 【銀紅】卽硃砂之別名。詳「硃砂」條。
- 【銀芋】卽野芋麻之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「野芋麻」條。
- 【銀茄】卽茄子之古籍別名。典見圖經本草。詳「茄子」條。
- 【銀屑】卽銀箔之原名。詳「銀箔」條。
- 【銀桂】卽木犀白花者之別名。詳「木犀」條。
- 【銀桃】卽桃之古籍別名。典見綱目。詳「桃」條。
- 【銀箔】卽銀箔之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「銀箔」條。
- 【銀筍】卽銀牙。詳「銀箔」條。
- 【銀粉】卽輕粉之古籍別名。典見和漢藥考。詳「輕粉」條。
- 【銀茶匙】卽兔耳一枝箭之古籍別名。典見百草鏡。詳「兔耳一枝箭」條。
- 【銀條德里】卽山藥之古籍別名。典見和漢藥考。詳「山藥」條。
- 【銀硃】卽銀朱之處方用名。詳「銀朱」條。
- 【銀蛇】卽金蛇之古籍別名。典見綱目。詳「金蛇」條。
- 【銀魚】卽鱸殘魚之古籍別名。典見綱目。詳「鱸殘魚」條。
- 【銀貂】卽貂鼠皮毛白色者之古籍別名。典見綱目。詳「貂鼠」條。
- 【銀華】卽白石英之古籍別名。典見和漢藥考。詳「白石英」條。
- 【銀釧】卽銀釧之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「銀釧」條。
- 【銀鸞鷲】卽望江青之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「望江青」條。
- 【銀鼠】卽鼯鼠作白色者之古籍別名。典見綱目。詳「黃鼠」條。
- 【銀箔】原名 銀屑。命名 本品生石鍾中。狀如硬錫者曰生銀。採得生銀。以鉛再三煎煉而成者曰熟銀。其以銀屑而製成箔。可以入藥者曰銀箔。
- 處方用名 紋銀。銀薄。
- 古鑑別名 白金。鑲。(爾雅)鑒。

毒成風也。黃蠟一兩。鎔化。入銀朱一兩。攪攤紙上。刺孔貼之。(簡便方)

⑤治黃水溼瘡。銀朱鹽梅和搗傳之。(集玄方)

⑥治癰瘡有蟲。銀朱牛骨髓桐油調搽。(醫方摘要方)

⑦治頭上生虱。銀朱浸醋。日日梳頭。包銀朱紙以盥。覆燒之。茶清洗下。煙干。揉之。包頭一夜。至旦虱盡死。(積德堂方)

用量 八分至錢半。

施用宜忌 凡無蟲積實結者

禁用。

參攷資料 銀朱乃硫黃同汞

升鍊而成。其性燥烈。亦能爛銀擊筋。其功過與輕粉同也。今廚人往往以之染色。供饌宜去之。(李時珍)

珍)

【銀池】即蜜陀僧之古籍別名。典見藥物生產詳。【蜜陀僧】條。

【銀耳】即白木耳之處方用名。詳

【白木耳】條。

【銀杏】即白果之原名。詳。【白果】條。

【銀花】即金銀花之簡稱。詳。【金

銀花】條。

【銀花炭】即金銀花焙炒成者之處方用名。詳。【金銀花】條。

【銀花藤】即忍冬藤之處方用名。詳。【忍冬藤】條。

【銀花露】即金銀露之處方用名。詳。【金銀露】條。

【銀星石】即金星石上有銀花斑點者之古籍別名。典見本草衍義。詳。【金星石】條。

【銀星礬石】即礬石上有銀星者之古籍別名。典見綱目。詳。【礬石】條。

【銀柴胡】命名 本品係出於銀州而色白。故名。

外國名詞 Bupleurum

產地 陝西富夏鎮。山西大同府皆產之。

性質 甘。微寒。無毒。

主治 勞熱骨蒸。勞瘵。熱從髓出。小兒五疳。羸熱。

歷代記述攷證 【明】繆希雍

本草經疏論銀柴胡曰。柴胡有二

種。一種色白黃而大者。名銀柴胡。

專用治勞熱骨蒸。色微黑而細者

用以解表發散。本經並無二種之

說。功用亦無分別。但云銀州者爲

最。則知其優於發散。而非治虛熱

之藥明矣。本草匯編柴胡產銀夏者

色微白而曠。爲銀柴胡。用以治勞

弱骨蒸。以黃牯牛溺浸一宿。曬乾治勞熱。誠驗。【清】黃宮繡本草求真論銀柴胡曰。銀柴胡味甘微寒無毒。功用等於石斛。皆能入胃而除虛熱。但石斛則兼入腎。瀉氣固筋骨。此則入腎。瀉血之爲異耳。故和劑局方用此治上下諸血及於虛勞方中。參入同治。如肝癆之必用此爲主。且不類於北胡。蓋北胡能升少陽清氣上行。此則氣味下達。與彼迥不相符。若用北胡以治虛癆。則咳嗽發熱。愈無寧日。可不辨而混用乎。出銀州者良。故以銀胡號之。

近人學說 張山雷曰。銀柴胡。古以銀州產者爲勝。宋之蘇頌已有是說。陳承亦謂銀夏者最良。然雖有其說。而尚未分用。故瀕湖綱目仍未顯爲區別。仲醇經疏則已稱俗有二種。色白黃而大者。爲銀柴胡。以治勞熱骨蒸。色微黑而細

輕者。爲北柴胡。以解表發散。然經

氏又謂其優於升散。而非治虛熱之藥。至張石頑達原乃特出銀柴胡一種。稱其甘而微寒。清熱而能涼血。謂和劑局方治上下諸血。龍腦雞蘇丸中用之。凡入虛勞方中。惟銀州者爲宜。北柴胡則升動虛陽。發熱喘嗽。愈無寧乎。不可混用。且又謂本經推陳致新。明目益精。皆指銀夏產者而言。其推崇銀柴胡可謂極至今之二種分用者。蓋即石頑提倡之力。而以今之功用言之。治虛熱骨蒸。自有實效。斷非北柴胡之升陽泄汗可比。然則古人謂柴胡爲虛勞之藥者。亦指銀柴胡言之也。趙恕軒綱目拾遺謂熱在骨髓。非銀柴胡莫療。用以治虛勞。肌熱骨蒸。勞瘵熱從髓出。及小兒五疳羸熱。蓋退熱而不苦泄。理陰而不升騰。固虛熱之良藥。苟勞怯而未至血液枯絕。以此清理虛火之爆灼。再合之育陰補脾。尙可徐圖挽救。非北柴胡之發泄者。所可同日語也。

辨僞 鄭育慶曰。銀柴胡味淡。蘆頭又大。不知何物僞充。按銀柴胡以銀州及富夏出者爲勝。氣

典見圖經本草。詳『酢漿草』條。
【酸醋】即醋之處方用名。詳『醋』條。

【酸榴皮】即石榴皮之原名。詳『石榴皮』條。

【酸榴東行根】即石榴根之原名。詳『石榴根』條。

【酸栳】即地榆之古籍別名。典見別錄。詳『地榆』條。

【酸頭草】即石蒜之古籍別名。典見和漢藥考。詳『石蒜』條。

【酸醬】即酸漿。詳『酸漿』條。
【銀牙】即銀之未經煉者之古籍別名。典見綱目。詳『銀箔』條。

【銀朱】命名 本品係用水銀煉成紅色。故名。

處方用名 銀珠。
古籍別名 猩紅。紫粉霜。（綱目）

外國名詞 Hydrargyri Sulphidum Rubrum Levigatum（拉丁）（Vermilion）（英）

基本 係礦石類爲水銀鍊成之粉末。

形態 銀朱爲體重實細色赤之粉末。

粉末。

十四 酸

銀

製法 胡演丹藥秘訣云。升銀朱。用石亭脂二斤。新鍋內鎔化。次下水銀一斤。炒作青砂頭炒不見星。研末。罐盛。石版蓋住。鐵線縛定。鹽泥固濟。大火煨之。待冷取出。貼罐者爲銀朱。貼口者爲丹砂。今人多以黃丹及礬紅雜之。其色黃黯。宜辨之。眞者謂之水華朱。每水銀一斤。燒朱一十四兩八分。次朱三兩五錢。

性質 辛。溫。有毒。

效能 劫痰。破積。殺蟲。治瘡。用作疥癬藥。又爲攻積藥。

主治 破積滯。劫痰涎。散結胸。療疥癬惡瘡。殺蟲及風功同粉霜。

歷代記述攷證 【明】穆希雍本草經疏論銀朱曰。銀朱乃硫黃同汞升鍊而成。其性燥烈。過服能使人醜爛筋攣。其味辛。氣溫。有毒。亦能破積滯。散結。療癰疥惡瘡。殺蟲。不宜服食。今人多以黃丹礬紅雜之。不堪用。【清】黃宮繡本草求真論銀朱曰。銀朱與水銀同煨煉成珠。性燥味辛。方書用以殺蟲治瘡。亦是以毒解毒而已。用以食服。古人切戒。謂其性悍烈。良非所宜。

且同蠶殼燒之。則臭蟲絕跡。和棗肉蒸之。則瘡疥枯頓。於此可徵其概矣。

配合應用 ①治小兒內約多啼。銀朱半錢。乳香。煨蒜。各一錢。爲末。研丸。黍米大。牛歲五丸。薄荷湯下。（全幼心鑑方）

②治男女陰毒。銀朱。輕粉。各一錢。用五日獨蒜一枚。搗和作餅。貼手心。男左女右。兩手合定。放陰下。頃間氣回。汗出即愈。但口中微有氣即活。（唐瑤經驗方）

③治痰氣結胸。鶴頂丹。不問陰陽虛實。服炒過陷胸瀉心等藥。用銀朱半兩。明礬一兩。同礬以熨斗盛火。瓦蓋盛藥。鎔化。急括搗丸。每服一錢。眞茶入薑汁少許服之。心上隱隱有聲。結胸自散。不動臟腑。不傷眞氣。明礬化痰。銀朱破積。故也。（治幼全書方）

④治正水腫病。大便利者。銀朱半兩。硫黃煨四兩。爲末。麵糊丸。梧子大。每飲下三十九丸。（普濟方）

⑤治咽喉疼痛。銀朱。海螵蛸末。等分。吹之取涎。（急救良方）

⑥治火解丹毒。銀朱調雞子清塗之。（李樓怪症方）

⑦治湯火灼傷。銀朱研細。菜油調傳二次愈。（多能鄙事方）

⑧治疳瘡發背。銀朱。白礬等分。煎湯溫洗。却用桑柴火遠遠炙之。日三次。甚效。（救急方）

⑨治魚臍丁瘡。四面赤。中央黑。銀朱水和丸。每服一丸。溫酒下。名走馬丹。（普濟方）

⑩治楊梅瘡毒。銀朱。官香。等分爲末。以紙卷作撚。點燈。置桶中以鼻吸煙。一日一作。七日愈。又方。銀朱二錢。孩兒茶一錢。龍掛香一錢。皂角子一錢。爲末。如上法用。又方。銀朱。輕粉。各一錢。黃蠟清油。各一兩。化開和收。以油紙攤貼瘡。自脫也。

⑪治筋骨疼痛。用猩紅三錢。枯礬四錢。爲末。作三紙撚。每旦以一撚蘸油。點火。熏臍。被覆臥之。取汗。（藥要奇方）

⑫治日久頑瘡不收者。銀朱一錢。千年地下石灰五分。松香五錢。香油一兩。爲末。化攤紙上貼之。亦治癰瘡不斂。（慈惠良方）

⑬治血風腫痛。生脚股上。乃瀝

一六一三

材本草圖解論酸漿曰。酸漿味酸。平寒無毒。主熱除煩。通淋止崩。產難胎衣不下者。若吞其實即出。

近人學說 張山雷曰。酸漿之

苗葉形色。頗與老鴉眼睛草近似。李瀕湖謂本是一類二種。但龍葵莖光無毛。五月以後開小白花。五出黃蕊。結子無壳。累累然數顆同枝。子有蒂蓋。生青熟紫黑。而酸漿則同時開小花。黃白色。紫心白蕊。其花如盃。無瓣。而有五尖。結一五稜之鈴壳。一枝一顆。懸如燈籠。壳中一子。生青熟赤。庚辛玉册謂燈

籠草產於川陝者最大。葉似龍葵。結實有四葉盛之如燈籠。河北呼爲酸漿。陶弘景謂酸漿之子作房。房中有子大如梅李。黃赤色者。蓋土宜不同。所產微異。嘉祐本草作苦耽。以其苗之味也。本經言其味酸。辛平。主熱煩滿。定志益氣。利水道。產難吞其實立產。則亦寒涼泄熱滑利之功用。弘景謂搗汁服。治黃病。唐本草謂燈籠草。治上氣咳嗽。風熱明目。根莖花實並宜。嘉祐本草謂苦耽苗子。治鬼疰邪氣。熱結目黃。大小便澀。骨熱勞乏。嘔逆

痰壅。痲癖痞滿。小兒無辜疳。癰瘰。大腹殺蟲。落胎去蟲毒。並煮汁飲。并生搗汁服。丹溪謂苦耽除淫熱。輕能治上焦。主熱咳咽痛。故此草治熱痰之咳嗽。佛耳草治寒痰之咳嗽。瀕湖謂寒能除熱。故清肺除咳。滑能利溼。故降氣化痰。蘇頌謂其子除熱治黃。嘉祐謂其治骨蒸勞熱。尸疰疔瘡。痲熱結。與莖苗同功。然寒降滑泄。皆實熱者爲宜。中氣虛寒。弗用。丹灶家以伏丹砂汞毒。亦清涼以制其剛烈也。

參攷資料 燈籠草苦能除

溼熱。輕能治上焦。故主熱咳咽痛。此草治熱痰咳嗽。佛耳草治寒痰咳嗽也。與片苓清金丸同用更效。(朱震亨) 酸漿利溼除熱。故清肺治咳。利溼。故能化痰治疳。一人病虛乏咳嗽有痰。愚以此加入湯中用之。效如神。(李時珍) 方士取汁煮丹砂。伏白礬。煮三黃。煉消硫。(李時珍) 爾雅苦耽寒漿也。郭璞注云。卽今酸漿。江東人呼爲苦耽。小者爲苦耽。亦呼爲小苦耽。崔豹古今注云。礬一名礬子。實形如皮弁。其子圓如珠。(陳藏器)

酸漿以子之味名也。苦耽。苦耽。以苗之味名也。燈籠。皮弁。以角之形名也。王母。洛神珠。以子之形名也。按楊慎屢言云。本草燈籠草。苦耽。酸漿。皆一物也。修本草者。非一時一人。故重複耳。燕京野果名紅姑。娘。外垂繹繹。中含赤子如珠。酸甘可食。盈盈遶砌。與翠草同芳。亦自可愛。蓋姑娘乃瓜瓞之詛。古者瓜姑同音。瓞之音亦相近耳。此說得之。故今以本經酸漿。唐本草燈籠草。宋嘉祐本草苦耽。俱并爲一焉。(李時珍) 酸漿處處多有。苗似水茄而小。葉亦可食。子作房。房中有子如梅李大。皆黃赤色。小兒食之。(陶弘景) 苦耽生故墟垣墾間。高二三尺。子作角如撮口袋。中有子如珠。熟則赤色。關中人謂之洛神珠。一名王母珠。一名皮弁草。一種小者名苦耽。爾雅謂之黃蔞。(掌禹錫) 龍葵。酸漿。一類二種也。酸漿。苦耽。一種二物也。但大者爲酸漿。小者爲苦耽。以此爲別。敗醬亦名苦耽。與此不同。其龍葵。酸漿。苗葉一樣。但龍葵莖光無毛。五月入秋開小白花。五出黃蕊。結

子無殼。藥數顆。同枝子有蒂。蓋生青熟紫黑。其酸漿同時開小花。黃白色。紫心白蕊。其花如盃狀。無瓣。但有五尖。結一鈴殼。凡五稜。一枝一顆。下懸如燈籠之狀。燈中一子。狀如龍葵子。生青熟赤。以此分別。便自明白。按庚辛玉册云。燈籠草四方皆有。惟川陝者最大。葉似龍葵。嫩時可食。四五月開花結實。有四葉盛之如燈籠。河北呼爲酸漿。據此及楊慎之說。則燈籠酸漿之爲一物。尤可證矣。唐慎微以三葉酸草附於酸漿之後。蓋不知其名同物異也。(李時珍)

【酸漿】卽漿水之古籍別名。典見綱目。詳「漿水」條。

【酸漿子】性質 酸平。無毒。主治 熱煩。定志益氣。利水道。產難吞之立產。

歷代記述攷證 【宋】掌禹錫嘉祐補註本草論酸漿子曰。治骨蒸勞熱。尸疰疔瘡。痲熱結。與苗莖同功。【宋】蘇頌綱經本草論酸漿子曰。食之除熱。治黃病。尤益小兒。

【酸漿草】卽酢漿草之古籍別名。

異株。色淡綠帶紅。小朵六瓣。叢簇而生。莖葉俱帶赤色。有酸味。嫩莖燒食。小兒採而生食之。山民燒莖葉去其酸味。亦供食用。每株簇生細長之根。視羊蹄根爲輕。色紅黃。乾則現黑褐色。



(二) 酸模

種類 羊蹄葉大而味苦。酸模葉小而味酸。

採取 葉茂時採葉。枯時採根。

性質 酸寒。無毒。

成分 含有蓆酸鹽類、偏利素

芬酸、單寧酸等。

效能 殺蟲。治瘡。用治疥癬諸

惡瘡藥。

主治 暴熱腹脹。生搗汁服。當

下利。殺皮膚小蟲。

歷代記述攷證 【南北朝】陶

弘景本草集註論酸模曰。治疥癬

【唐】韓保昇蜀本草論酸模曰。療

痢乃佳。【明】李時珍本草綱目論

酸模曰。去汗斑。同紫萍搗擦數日

即沒。

國外學說 荷蘭藥鏡曰。須用

生葉根及其絞汁。乾則失其酸味。

便無效。根葉均有酸味。宜擇而採

之。清涼收斂。止血液之沸騰。解壯

熱。潤燥渴。止煩渴。制惡毒。收縮脈

管。治血液腐敗諸病。故以之用於

壯熱。微衝諸症。及膽液熱。腐敗熱

良驗。此藥有酸涼。疏解清血之效

蕩滌血中之惡液。故以治惡液實

諸病。及疥癬惡瘡等。俱稱妙藥。當

以生根葉水煎服。或作蔬菜食之。

吐血。下血。痔血。赤痢。俱能止之。以

其有涼解血熱之功也。絞生葉根

汁。濾取上澄清者。或和入糖漿。白

糖等。作熱病之清涼飲料。可以涼

解壯熱。防護腐敗。

配合應用 癰疽毒瘡。肉中忽

生黴子如粟豆。大者如梅李。或赤

或黑。或青。或白。其中有核。核有深

根。應心腫。泡紫黑色。能爛筋骨。毒

人臍腹殺人。宜灸黴上。百壯。以酸

模葉薄其四面。防其長也。內服葵

根汁。其毒自愈。(千金方)

用量 八分至錢半。

參攷資料 ●蕪蕪乃酸模之

音轉。酸模又酸母之轉。皆以味而名。與三葉酸母草同名。掌禹錫以蕪蕪爲蔓菁菜誤矣。(李時珍) ●即是山大黃。一名當藥。其葉酸美。人亦採食其莢。爾雅食蕪蕪。郭璞注云。似羊蹄而稍細。味酸可食。一名蕪也。(陳藏器) ●所在有之。生山岡上。狀似羊蹄。葉而小。黃莖葉俱細。節間生子。若莢。薔子(大明) ●食魚介鳥獸肉中毒。絞酸模葉汁飲之立愈。(和漢藥考)

古醫別名 醋漿。(本草)

【酸漿】 經)燈籠草。(唐本草)

苦葳。苦耽。王母珠。洛神珠。(圖經)

皮弁草。食療本草)天泡草。小者

名苦蕪。(綱目)姑嫲菜。(救荒)黃

蔴。(爾雅)金燈籠草。(俗名)蕪子

(古今注)

外國名詞 Physalis Alko-

Kengi, L. (拉丁) ホトツキ

(日本)

基本 係茄科酸漿屬。藥用其

苗莖莖根。

產地 在原野川澤間。

形態 酸漿爲蔓草類之多年

生草本。春自宿根生苗。高至二三

尺。葉卵形。葉端尖。夏月開花。合瓣花冠。白色。微帶綠。雄蕊五枚。與花冠裂片之數同。葉呈淡黃色。雌蕊一枚。結實爲漿果。赤色。包被於萼內。此萼帶赤色。在花後。生長如囊狀。最爲美觀。



酸漿

性質 苦寒。無毒。

主治 酸漿治熱煩。煩。定志益

氣。利水道。

歷代記述攷證 【南北朝】陶

弘景本草集註論酸漿曰。搗汁服。

治黃病多效。【唐】蘇恭新修本草

論酸漿曰。燈籠草。治上氣咳嗽風

熱。明目。根莖花實並宜。【宋】蘇頌

喜祐圖經本草論酸漿曰。苦耽苗

子。治傳尸。伏連鬼氣。疰忤邪氣。腹

內熱。熱。目黃。不下食。大小便澀。骨

熱咳嗽。多睡勞乏。嘔逆痰壅。痲癬

瘡滿。小兒無辜。癰子。寒熱大腹殺

蟲。落胎。去蟲毒。並煮汁飲。亦生搗

汁服。研膏傳小兒因癖。【明】李士

十四畫 酸

湯。用酸棗仁二升。蟬母、乾薑、茯苓、芎藭各二兩。甘草炙一兩。以水一斗。先煮棗仁。減三升。乃同煮。取三分。分服。(圖經本草方)

⑤治骨蒸不眠。心煩。用酸棗仁一兩。水二盞。研絞取汁。下粳米二合。煮粥候熟。下地黃汁一合。再煮勻食。(聖惠方)

⑥治睡中汗出。用酸棗仁、人參、茯苓等分。為末。每服一錢。米飲下。(簡便方)

⑦治刺入肉中。酸棗核燒末。水服立出。(外臺秘要方)

用量 三錢至四錢。
施用宜忌 凡有實邪鬱火者禁用。惡防己。
參攷資料 ⑧本經用實。療不得眠。不用言仁。今方皆用仁。補中益肝。堅筋骨。助陰氣。皆酸棗仁之功也。(蘇恭) ⑨按五代史。後唐刊石藥驗云。酸棗仁睡多生使。不得睡。炒熟。陶云。食之醒睡。而經云。療不得眠。蓋其子肉味酸。食之使不思睡。核中仁服之。療不得眠。正如麻黃發汗。根節止汗也。(馬志) ⑩酸棗實味酸性收。故主肝病。寒熱

結氣。酸痺久泄。臍下滿痛之症。其仁甘而潤。故熟用。療虛不得眠。煩渴虛汗之證。生用。療膽熱好眠。皆足厥陰少陽藥也。今人專以為心家藥。殊昧此理。(李時珍) ⑪嵩陽子云。余家於滑臺。今酸棗縣。即滑之屬邑也。其樹高數丈。徑圍一二尺。木理極細堅。而且重。可為車軸及匙筭等。其樹皮亦細而硬。文似蛇鱗。其棗圓小而味酸。其核微圓而仁稍長。色赤如丹。此醫之所重。居人不易得。今市人賣者皆棘子也。又云。山棗樹如棘。其子如生棗。其核如骨。其肉酸滑。好食。山人以當果。(陳藏器) ⑫今近汴洛及西北州郡皆有之。野生。多在坡坂及城壘間。似棗木而皮細。其木心赤色。莖葉俱青。花似棗花。八片。結實紫紅。似棗而圓。小味酸。當月採實。取核中仁。孟子曰。養其毓。棘是也。嵩陽子言酸棗縣所出為真。今之貨者皆是棘實。用者尤宜詳辨。(蘇頌) ⑬天下皆有之。但以土產宜與不宜爾。嵩陽子言酸棗木高大。今貨者皆棘子。此說未盡。蓋不知小則為棘。大則為酸棗。平地則

易長。居屋壘則難生。故棘多生屋壘上。久不樵則成棘。人方呼為酸棗。更不言棘。其實一本也。此物纔及三尺。便開花結子。但科小者氣味薄。木大者氣味厚。今陝西臨潼山野所出者亦好。乃土地所宜也。(寇宗奭) ⑭日本之有酸棗。始於享保中。係得自中國。以其仁入藥。用其後日本亦種之。(和漢藥考) ⑮凡平地則易長。大居屋壘則難生。而其不長大者名曰棘。白棘多生於屋壘上。及至成長。其刺亦多。(和漢藥考) ⑯酸棗樹高二三丈。枝葉頗似棗。而美國如龍眼大。其核亦似棗核。而圓。中國產之酸棗。仁形似棗仁。而扁圓者。真。日本所產。乃棗仁也。氣味形狀甚相近。無時間以代用。(和漢藥考)

【酸棗仁粥】

基本 本品係以酸棗仁和米煮成之粥。

主治 治煩熱。益膽氣。

【酸筍】

性質 酸涼無毒。

主治 作湯食。止渴解

羶。利腸。
參攷資料 酸筍出粵南。顧玠

1410

海槎錄云。筍大如臂。摘生。用沸湯泡去苦水。投冷井水中。浸二三日。取出。線如絲。細醋煮。可食。好事者攜入中州。成罕物云。(李時珍) ①【酸筍】即酢漿草之古籍別名。典見李氏藥錄。詳「酢漿草」條。

【酸模】

命名 本品味酸。以味而名也。

古鑿別名 山。大黃。拾遺。蕨。蕨。(爾雅) 蕨。酸母。山。羊蹄。當藥。(綱目) 蕨。蕨。古。牛舌。質。杜。雞。脚。黃。連。(和漢藥考)

外國名詞

Rumex acetosa, (拉丁)

基本 屬蓼科為酸模之根。產地 凡山野平原間恒有



(一) 模 酸

形態 酸模為山野自生之多。年。生。草。本。莖。高。二。三。尺。似。草。狀。羊。蹄。而。小。葉。為。長。卵。圓。形。末。端。尖。銳。脚。部。稍。作。箭。形。抱。莖。而。生。花。雌。雄。

仁。可見別錄主治。乃酸棗仁之主治。即其味甘而不酸可證也。杏爲心果。其仁入肺而宣氣。桃爲肺果。其仁入肝而宣血。則棗爲脾果。其仁入腎而宣水決矣。雖然棗仁用酸棗之仁。不用大棗之仁何也。蓋大棗補而仁則洩。酸棗洩而仁則補。別錄云。陳韋核中仁。味苦。燻之主腹痛。邪氣。酸棗仁則甘。以是酸棗仁之用。廣於大棗仁矣。煩心不得睡。水不上濟於心也。膺上下痛。水不宜而停於所治也。血轉久洩者。肝無所藉而不藏。虛汗煩渴者。心無所資而不潤。水氣能涵木。木得涵而筋骨遂堅。筋骨堅而陰氣有所守。陰氣有所守則陽亦充於外。而肌肉豐氣力優矣。心中煩不得臥。黃連阿膠湯主之。虛煩不得眠。酸棗仁湯主之。同是心煩。同是不寐。兩方無一味之同。豈不得臥不得眠有異耶。抑心中煩與虛煩固不同耶。大寐謔也。靜謔無聲也。眠猶眠也。淚也。淚淚無知也。臥猶息也。僵也是寐者能臥而未必安靜眠者且能熟寐而無知不得臥則或起或寢。并不能安於牀席矣。

十四畫 酸

於此見虛煩不得眠。雖亦靜謔。但時多擾亂也。心中煩不得臥。則常多擾亂。且不得靜謔矣。夫寐係心與腎相交。能靜謔而時多擾亂。乃腎之陰不繼。不能常濟於心。常多擾亂而不得靜謔。乃邪火熾盛。縱有腎陰相濟。不給其燄。况一爲傷寒。本係急疾之病。且少陰病僅在二三日。已上其急疾。抑又可想。一爲虛勞。則本緩病。虛證。故其治法。瀉火滋陰。相去霄壤。一以阿膠雞子黃安心定血而外。并主以苦燥之芩連。開陰之芍藥。一以酸棗仁茯苓。啓水上滋而外。更益以甘潤之知母。開陽之葶藶。豈可同日語哉。故後世用酸棗仁諸方。始終只治不睡。并無他歧相攪。乃立異者。或以爲生用能醒睡。是牽合陶隱居之說。以簡要濟衆。一方爲據。不知其方用酸棗仁止一兩。用蠟茶至二兩。且以生薑汁塗炙。是以茶醒睡。用酸棗仁爲反佐。若據此爲醒睡之典。則麻黃湯中有治中風自汗之桂枝。亦可謂爲止汗耶。或以爲酸棗仁治不寐。乃治邪結氣聚之不寐。是牽合本經之文。且謂

未有散邪結氣聚之物。能使衛氣入臟。而就安寢者。不思仲景用酸棗仁湯。明明著虛勞虛煩不得眠之語。虛煩不得眠。猶可目爲邪結氣聚耶。虛勞亦豈邪結氣聚可成者耶。縱邪結氣聚。亦可成虛勞。則此不得眠。且將與梔子豉湯證相比矣。若謂衛氣不得歸臟。又與半夏秫米湯相比矣。仲景又何別用酸棗仁湯爲哉。

近人學說 賈九如曰。棗仁仁

主補皮赤。類心。用益心血。其氣炒香。化爲微溫。藉香以透心氣。得溫以助心神。凡志苦傷血。用智損。致心虛不足。精神失守。驚悸怔忡。恍惚多忘。虛汗煩渴。所當必用。又取香溫。以溫肝膽。若膽虛血少。心煩不寐。用此使肝膽血足。則五臟安和。睡臥自寧。如膽有實熱。則多睡。宜生用以平膽氣。因其味甘炒香。香氣入脾。能醒脾陰。用治思慮傷脾。及久瀉者。皆能奏效。

配合應用 治驚悸。并一切

膽虛易驚。酸棗仁。茯神。遠志。麥門冬。石斛。五味子。龍眼人參。

治病後膽虛不眠。用酸棗仁。

加入溫脾湯。

治脾家氣血虛。自汗不眠。驚悸不嗜食。酸棗仁。加入歸脾湯。

治骨蒸不眠。心煩。用酸棗仁一兩。炒研。水二盞。研絞。取汁。煮粥。熱。下地黃汁一合。再煮。食。食。太平聖惠方。

凡服固表藥而汗不止者。用棗仁一兩。炒研。同地黃白芍藥。麥冬。五味子。龍眼肉。竹葉煎服。多服。取效。乃心液故爾。

治膽風沉。睡。膽風毒氣。虛實不調。昏沉多睡。用酸棗仁一兩。生用。全挺蠟茶二兩。以生薑汁塗炙。微焦。爲散。每服二錢。水七分。煎六分。溫服。簡要濟衆方。

治膽虛不眠。心多驚悸。用酸棗仁一兩。炒香。搗爲散。每服二錢。竹葉湯調下。加人參一兩。辰砂半兩。乳香二錢。半。煉蜜丸服。和劑局方。

治振悸不眠。胡治方。酸棗仁湯。用酸棗仁二升。白茯苓。生白朮。人參。甘草。各二兩。生薑六兩。水八升。煮三升。圖經本草方。

治虛煩不眠。深師方。酸棗仁

十四畫 酸

味。供食用。然不及棗遠甚。種子堅硬。碎之中藏稍扁圓形之仁。採之供藥用。

採取 八月採實。陰乾四十日成。

製法 雷斅曰。凡使酸棗仁。以藥拌蒸。半日去皮尖。後人有炒用者。

性質 酸。平。無毒。

效能 補肝膽寧心神。斂汗。醒脾。用爲健胃鎮靜滋養安眠藥。

主治 心腹寒熱邪結氣聚。四肢酸痛。痺痺。久服安五臟。輕身延年。〔本經〕煩心不得眠。臍上下痛。血轉久洩。虛汗煩渴。補中益肝氣。堅筋骨。助陰氣。能令人肥健。〔別錄〕

張仲景之發明 酸棗仁一味。經張仲景之實驗。認爲主治『胸膈煩燥不能眠也。』茲考徵如下。酸棗仁湯證曰。虛煩不得眠。〔爲則按虛煩當作煩燥。〕以上一方。酸棗仁用二升。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論酸棗仁曰。筋骨風。炒仁研湯服。【明】繆希雍本草經疏論

酸棗仁曰。酸棗仁其實酸平。仁則兼甘。氣味勻齊。其性無毒。爲陽中之陰。入足少陽手少陰足厥陰太陰之經。專補肝膽。亦復醒脾。從其類也。熟則芳香。香氣入脾。故能歸脾。能補膽氣。故可溫膽。母子之氣相通。故亦主虛煩。煩心不得眠。其主心腹寒熱邪結氣聚。及四肢酸疼。酸痺者。皆脾虛受邪之病。脾主四肢。故也。膽爲諸臟之首。十一臟皆取決於膽。五臟之精氣皆稟於脾。故久服之功能安五臟。輕身延年也。別錄主煩心不得眠。臍上下痛。血轉久洩。虛汗煩渴。補中益肝氣。堅筋骨。助陰氣。能令人肥健者。緣諸證悉由肝膽脾三臟虛而發。膽主升。肝藏血。脾統血。三臟得補。久而氣增。氣增則滿足。故主如上功能也。【明】李士材本草圖解論酸棗仁曰。酸棗仁味酸性收。故其主治多在肝膽二經。肝虛則陰傷而煩心不眠。肝藏魂。臥則魂歸於肝。肝不能藏魂。故目不得眠。棗仁酸味歸肝。肝受養。故熱寐也。其寒熱結氣。痠痛痺痿。臍下痛。煩渴虛汗。何一非東方之症。而有不療者。

乎。世俗不知其用。誤以爲心家之藥。非其性矣。【清】黃宮繡本草求真論酸棗仁曰。酸棗仁甘酸而潤。仍有生熱之分。生則能導虛熱。故療肝熱。好眠神昏燥倦之症。熟則收斂津液。故療膽虛不眠。煩渴虛汗之症。本肝膽二經要藥。因其氣香味甘。故又能舒太陰之脾。按肝虛則陰傷而心煩。而魂不能藏。是以不得眠也。故凡傷寒虛煩多汗及虛人盜汗。皆炒熟用之。取其收斂肝脾之津液也。歸脾湯用以滋營氣。亦以營氣得養。則肝自藏魂而瀾安。血自歸脾而臥見矣。其曰膽熱好眠可療。因其膽被熱淫。神志昏冒。故似好眠。其症仍兼煩躁。用此以療熱。熱退則神清氣爽。又安有好眠之弊乎。但仁性多潤。滑泄最忌。縱使香能舒脾。難免潤不受滑。爰炒研用。【清】鄒澍本經疏證論酸棗仁曰。古來於大棗酸棗。棘刺棗仁。紛紛聚訟。或以爲酸棗即大棗之酸者。或以爲酸棗亦大木。或以爲酸棗能醒睡。或以爲服棗仁治不眠。殊不知皆是也。而皆非也。夫喬生曰。棗。叢生曰棘。是

一類二種。設使叢叢生。亦不得不爲棘。棘即養而大之。終不得爲棗。如橘年久則葉生剝而變爲枳。不聞枳得培植亦可變爲橘。物類之性固如是耳。試以本經大棗主治與酸棗主治較之。惟其喬生則氣力厚。惟其叢生遂氣力薄。厚則甘。薄則酸。陰陽應象大論云。辛甘爲陽。酸苦爲陰。又曰。味薄則陰。厚則通氣。薄則發洩。厚則發熱。故大棗主心腹邪氣。是振其中而使之外。達酸棗主心腹寒熱邪結氣聚。是疏其中而導之外洩。大棗主四肢重。是助其經氣。使其轉接之間。留著解。凝不生。酸棗主四肢痿痺。淫寒。是鼓其經氣。使其轉接之間。留著解散。惟其力厚。則既助十二經之行。仍能使全氣內暢。故復補少氣。少津液。身中不足。力薄則鼓蕩經氣。使外達。遂不能復歸。故衛氣行於陽。不得入於陰。此陶隱居謂酸之能醒睡。不爲無故矣。由此觀之。本經酸棗主治是酸棗之功能。非酸棗仁之功能。酸棗自醒睡。酸棗仁自治不眠。故本經於酸棗氣味上并不著仁字。而隱居亦不言嗽其

桑者是矣。筆衡云。五代吳越王錢鏐。改榴爲金疊。西陽雜俎言榴甜者名天漿。道家書謂榴爲三尸酒。言三尸蟲得此果則醉也。故范成大詩云。玉池咽清肥。三彭迹如掃。(李時珍)石榴花亦可愛。故人多種之。尤爲外國所重。有甘酢二種。醫家惟用酢者之根壳。榴子乃服食者所忌。(陶弘景)榴五月開花。有紅黃白三色。單葉者結實千葉者不結實。或結亦無子也。實有甜酸苦三種。抱朴子言苦者出積石山。或云卽山石榴也。西陽雜俎言南詔石榴皮薄如紙。瑣碎錄言河陰石榴名三十八者。其中只有三十八子也。又南中有四季榴。四時開花。秋月結實。實方綻。隨復開花。有火石榴。赤色如火。海石榴高一二尺。卽結實。皆異種也。按事類合璧云。榴大如盃。赤色有黑斑。點皮中如蜂窠。有黃膜隔之子形。如人齒。淡紅色。亦有潔白如雪者。潘岳賦云。榴者天下之奇樹。九州之名果。千房同膜。千子如一。黎飢療渴。解醒止醉。(李時珍)按諸花忌澆熱水。惟此花可以烈日中

灌漑。併宜以葷濁熱湯澆之。則益茂。但勿著鹹味耳。正月二十日分枝。則當年卽花。物性之難測如此。余幼時見業師王煥中先生善養此花。而人罕知其法。故附識以傳於世。(王士雄)

【酸石榴皮】 命名 本品卽酸石榴之皮。故名。

性質 酸。溫。濕。無毒。
效能 瀉腸。染髮。

主治 淚下。(取汁點目)筋骨風。腰脚不遂。步行艱急。疼痛。脫肛。瀉痢。漏精。下血。婦女崩中。帶下。

【酸石榴根】 命名 本品卽酸石榴之根。故名。

性質 酸。溫。濕。無毒。
主治 口齒病。瀉痢。婦女帶下。染髮。

【酸白芍】 卽白芍之處方用名。詳『白芍』條。

【酸杖】 卽虎杖之古籍別名。典見綱目。詳『虎杖』條。

【酸草】 原名 醜草。產地 生名山醜泉之

陰崖間。

形態 酸草爲雜草類之一種。莖有五葉。色青澤。根赤黃。可供藥用。

主治 輕身。延年。並可消玉。

【酸迷迷草】 形態 酸迷迷一種。有赤白兩種。可供藥用。

主治 婦女赤白帶下。(赤帶用赤者。白帶用白者。搗汁和紹酒煮服)。

【酸桶】 卽鹽鉄子之古籍別名。典見本草拾遺。詳『鹽鉄子』條。

【酸桶草】 卽虎杖之古籍別名。典見和漢藥考。詳『虎杖』條。

【酸梅草】 形態 酸梅草多生田隴間。春生莖。葉小色碧。可供藥用。

性質 酸。

主治 痰飲。(擦舌上取吐)。

【酸惡】 產地 生水旁。形態 酸惡爲水草類之一種。狀如澤瀉。可供藥用。

主治 惡瘡。去白蟲。

【酸棗仁】 命名 本品形似棗仁。故名。而味酸。藥用核中之仁。故名。

處方用名 炒棗仁。生棗仁。古籍別名 小者名棘實。(新修本草圖經) 棘仁。(爾雅) 山棗仁。綱目。調睡參軍。(和漢藥考) 羊棗仁。(新本草)

外國名詞 Rhamnus Sope-rifernus. (Zizyphus Vulgaris) (Buckhorn.)

基本 屬鼠李科爲酸棗之子。

產地 陳仁山藥物生產辨云。棗仁產直隸順德府。山東濟寧府。冬季出新。

形態 酸棗爲落葉灌木。生於山中。高四五尺。間達丈餘。處處有銳利之短刺。葉互生。爲卵圓形。或倒卵圓形。邊緣有鋸齒。葉柄短。葉脈現三大縱線。花作淡綠黃色。開五瓣。似棗之小花。果實爲球圓形之核果。大於棗實。生綠熟紅。有酸

十四畫 遠

中。詳遠志性溫助火。非咳逆所宜。

當是嘔逆之誤。別錄云。去心下膈氣。非嘔逆之類乎。按張氏之說。尙未完足。夫形寒飲冷則傷肺。人豈無寒咳。而須性溫助火之藥者乎。

遠志於嘔逆固宜。而於咳逆亦合。且外國學說。遠志功用能化痰。可代西藥辛衣格。然則本經云主治咳逆。更可無疑矣。(張路玉)

【遠志肉】即遠志之處方用名。詳

【遠志】條。

主治 益精。補陰氣。止虛損夢洩。

【遠近子】即蓖麻子之古籍別名。

典見和漢藥考。詳『蓖麻子』條。

【遠客】即茉莉花之古籍別名。典見綱目。詳『茉莉花』條。

【酸母】即酢漿草之古籍別名。典見綱目。詳『酢漿草』條。

【酸模】即酸模之古籍別名。典見綱目。詳『酸模』條。

【酸石榴】原名 安石榴。原名 榴者。榴也。丹

實垂垂如贅瘤也。故名。

古籍別名 若榴(廣雅)丹若(古今注)金罍(綱目)三尸酒

酸

(道書)

基本 屬安石榴科。爲酸榴之

果實。

形態 石榴爲落葉灌木。多自

生暖地。或植於庭園。作賞玩之品。

樹高七八尺至九尺餘。矮小者多

作盆景。葉作長橢圓形。全緣平滑

有光澤。皆對生。梅雨之時。梢端著

花色。朱紅。其形如筒。末端五裂至

七裂。萼亦鮮紅。其數多於花瓣。每

枝開花一朵至三朵。果實爲蒴果。

惟上端有萼緣。其大如橙。熟則果

皮若革質。爲不規則之縱裂。種子

充滿果實內。但有膜隔。分又略帶

三角形。種子透明。色如石竹。有肉

質多汁之外皮。味甘酸。供食用。此

物變種頗多。花瓣有單瓣。重瓣之

別。花色有紅白黃諸種。



酸石榴

採取 秋季採之。

用法 生搗取汁。或火煨存性。

研末和藥。

性質 酸。溫。瀉。無毒。

成分 石榴根皮。及其枝幹皮

中含有配來推林。Pallietarin。Ce

Itano 一名普尼欽。Punicin

爲一種植物鹽基。無色。或微黃。狀

如油。有麻醉性臭氣。

效能 止瀉痢。療崩帶。專作收

斂藥。

主治 赤白痢腹痛。連子搗汁。

頓服一枚。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論石榴曰。止瀉痢。崩中

帶下。【清】王士雄隨息居飲食譜

論石榴曰。石榴甘酸溫。解渴析

醒。多食損肺傷齒。助火生痰。最

益人。但供觀美而已。皮可染皂。

配合應用 ①治腸滑久痢。黑

神散。用酸石榴一個。煨煙盡。出火

毒。一夜研末。仍以酸榴一塊。煎湯

服。神效無比。亦治久瀉不止。(普

濟方)

②治痢血五色。或膿或水。冷熱

不調。酸石榴五枚。連子搗汁二升。

每服五合。神妙。(聖濟總錄方)

③治小便不禁。酸石榴燒存性。

無則用枝燒灰代之。每服二錢。用

柏白皮切焙四錢。煎湯一盞。入榴

灰再煎至八分。空心溫服。晚再服

(聖惠方)

④治瘰癧令黑。酸石榴結成時。

就東南枝上揀大者一個。頂上開

一孔。內水銀半兩於中。原皮封之。

麻扎定。牛屎封護。待經霜摘下。傾

出壳內水。以魚鱗龍指蘸水擦瘰。

久久自黑也。(普濟方)

用量 一枚至二枚。

施用宜忌 凡瀉痢初起而有

實邪者禁用。

參攷資料 ①榴受少陽之氣。

而榮於四月。盛於五月。實於盛夏。

熱於深秋。丹花赤實。其味甘酸。其

氣溫濡。多食損肺齒。而生痰涎。酸

者則兼收斂之氣。故入斷下崩中

之藥。或云白榴皮治白痢。紅榴皮

治紅痢。亦通。(李時珍) ②博物志

云。漢張騫出使西域。得塗林安石

國榴種。以歸。故名安石榴。又按齊

民要術云。凡種石榴者。須安礬石

枯骨於根下。即花實繁茂。則安石

之名義。或取此也。若木乃扶桑之

名。榴花丹相似之。故亦有丹若之

稱。傳玄榴賦所謂灼若旭日。栖扶

者以遠志之溫升舉其下陷而引
起腎陽本是正治然俗人不察每
遇腎陽不藏淫夢失精等證亦曰
此屬坎離之交須以遠志引之
使其水火交接則相火愈浮腎愈
不攝利九竅者適以滑精數益精
者將反以失精矣此不辨寒溫虛
實而徒讀古書之咎也豈古人之
欺吾哉

配合應用 ①遠志茯神人參
地黃酸棗仁丹砂爲鎮心定驚要
藥

②治小兒心虛易驚遠志人參
白芍藥酸棗仁茯神炙甘草天竺
黃鈎藤鈎加白檀香治一切驚及
慢驚

③治小兒急驚遠志茯神天竺
黃鈎藤鈎丹砂金箔真珠琥珀膽
星犀角

④治心氣弱心血少餒怯易驚
夢寐多驚神不守舍怔忡健忘失
志陽痿遠志人參柏子仁酸棗仁
麥門冬五味子當歸身茯神茯苓
益智仁生地黃甘草洗香

⑤遠志茯神人參白朮龍眼酸
棗仁木香炙甘草能歸脾益智

⑥入當歸六黃湯能止陰虛盜
汗

⑦加甘草治婦人血暈失音小
兒客忤

⑧遠志一味煎酒治一切癰疽
發背病從七情憂鬱惱怒而得者
服之皆愈

⑨遠志酒治一切癰疽發背惡
候浸大有死血陰毒在中則不痛
傳之即痛有憂怒等氣積怒攻則
痛不可忍傳之即不痛或蘊熱在
內熱逼人手不可近得之即清涼
或氣虛冷潰而不斂傳之即斂此
本韓大夫宅用以救人方極驗若
七情內鬱不問虛實寒熱治之皆
愈用遠志不拘多寡米泔浸洗槌
去心爲末每服三錢溫酒一盞調
澄少頃飲其清以滓敷患處（陳
言三因方）

⑩治心孔惛塞多忘善誤丁酉
日密自至市買遠志着巾角中還
爲末服之勿令人知（肘後方）

⑪治喉痺作痛遠志肉爲末吹
之涎出爲度（直指方）

⑫治腦風頭痛不可忍遠志末
嚼鼻（宣明方）

⑬治吹乳腫痛遠志焙研酒服
二錢以滓傳之（袖珍方）

⑭治小便赤澀遠志甘草水發
半斤茯神益智仁各二兩爲末酒
糊丸梧子大每空心棗湯下五十
丸（普濟方）

用量 一錢至錢半
施用宜忌 凡虛而無滯及有
實火者禁用長珍珠藜蘆蜚蠊齊
蛤忌鐵得茯苓冬葵子龍骨良
薯名方綱 定志丸治目不能
遠視但能近視（千金方）遠志薑
蒲各二兩人參茯苓各一兩蜜丸
硃砂爲衣

參証資料 ①遠志生大山及
寬甸川谷四月採根葉陰乾（別
錄）②寬甸屬寬甸州齊陰縣今此
藥猶從彭城北關陵來用之去心
取皮一斤止得三兩爾亦入仙方
用小草狀似麻黃而青（陶弘景）

③今河陝洛西州郡亦有之根形
如蒿根黃色苗似麻黃而青又如
畢豆葉亦有似大青而小者三月
開白花根長及一尺泗州出者花
紅根葉俱大於他處商州出者根
又黑色俗傳虎門出者最佳四員

採根曬乾古方通用遠志小草今
醫但用遠志稀用小草（蘇頌）
按爾雅云蒹藁棘苑郭璞注云今
遠志也似麻黃赤華葉銳而黃其
上謂之小草（掌禹錫）④遠志入
足少陰腎經非心經藥也其功專
於強志益精治善忘蓋精與志皆
腎經之所藏也腎精不足則志氣
衰不能上通於心故迷惑善忘靈
樞經云腎藏精精合志腎盛怒而
不止則傷志志傷則喜忘其前言
腰脊不可以俛仰屈伸毛悴色天
又云人之善忘者上氣不足下氣
有餘腸胃實而心肺虛虛則營衛
留於下久之不以時上故善忘也
陳言三因方遠志酒治癰疽云有
奇功蓋亦補腎之力爾葛洪抱朴
子云陵陽子仲服遠志二十年有
子三十七人能坐在立亡也（李
時珍）⑤遠志有大葉小葉二種
陶弘景所說者小葉也馬志所說
者大葉也大葉者花紅（李時珍）
⑥此草服之能益智強志故有遠
志之稱世說載謝安云處則爲遠
志出則爲小草記事珠謂之醒心
杖（李時珍）⑦本經言治咳逆傷

十四畫 遠

數數稱用。就此生藥。始喚起世人之注意者。蘇格蘭之醫師テンチット也。セチカ之印度人種。屬爲「クラッペル」蛇所咀時。用之此爲其起因。千七百三十四年及千七百三十五年。攝涅瓦於胸膜炎及肺炎。爲必需之藥品。可由試驗證明之本根之成分。依從前散見於書籍者。列如左。(一)脂肪油及樹脂。(二)痕跡之揮發油。(三)糖分七。(四)セギン(即ザボニン)二至五。(五)黃色素(六)林檎酸鹽。澱粉全缺乏。而依某藥物學云。貼本品於黏膜。則麻痺局處之神經及筋質。內服大量。則一時甚與奮後至麻痺而死。適量則刺戟氣道。而發咳嗽。更增加黏液之分泌。醫治作用爲祛痰藥。用於炎性不烈之氣管枝炎及肺炎。用量自三・〇至八・〇。水一〇〇・〇煎出。英美學說謂遠志產中國之山西。河南及亞美利加等處。其根可入藥。此根爲英國醫士於雍正十三年。得之於亞美利加。以其能治蛇毒。即亞美利加之響尾蛇。故此草爲亞美利加

之本草。其大半得之於西南方。每年用此根之數甚多。尋常出售之遠志根。束縛成捆。每捆五十磅至四百磅不定。其形色與氣味。遠志根塊之小者。細如鷄毛管。大者則粗如小指。色棕黃。其臭頗奇。在新鮮之根則臭更甚。味初覺淡。後則變爲苦。與梓惹喉。令口內多生津液。其作用爲化痰藥。有行血氣之性。蓋梓味之物。大率如此。能令大牛津液多生。又能生津。化痰發汗。利小便。調經。食其大服。則爲吐藥。與瀉藥。藥品中多用以治咳嗽。處方以遠志一分。細末。淡酒八分。先用酒六分。浸二天。間時搖動。裝淋。淋乾。加餘酒漂淋。用絞盤絞渣。過淋紙。再加淡酒。仍足八分。爲度。每服一錢至二錢(遠志酒方)。用量遠志末。每服三分。至五分。二釐半。又和漢藥考曰。販賣品有數種。日用藥品考云。日藥舖呼肉遠志。或姬遠志者。柔潤爲上品。呼鬼遠志者。硬而不潤。爲下品。呼朝鮮遠志者。大而硬。亦爲下品。間有售本國產者。其根細小。氣味極薄。實不堪用云。

近人學說 賈九如曰。遠志味辛。重大雄。入心。開竅。宣散之藥。凡痰涎沃心。壅塞心竅。致心氣實熱。爲昏憤神呆。語言蹇澀。爲睡臥不寧。爲恍惚驚怖。爲健忘。爲夢覺爲小兒客忤。暫以此豁痰利竅。使心氣開通。則神魂自寧也。又取其辛。能醒發脾氣。治脾虛久困。思慮鬱結。故歸脾湯中用之。及精神短少。竟有虛痰作孽。亦須量用。若心血不足。以致神氣虛怯。無痰涎可祛。即芎歸味辛。尚宜忌用。況此大辛者乎。諸本草謂味辛。潤腎用之。益精強志。不知辛重。暴悍。戟喉。刺舌。與南星。半夏。相類。經曰。腎惡燥。烏可入腎耶。特爲訂誤。幸同志者辨之。張山雷曰。遠志味苦。入心。氣溫。行血。而芳香。清冽。又能通行氣分。其專主心經者。心本血之總匯。辛溫以通利之。宜其振作心陽。而益人智慧矣。古今主治。無一非補助心陽之功效。而李瀾湖謂其專入腎家。未免故爲矯異。張石頑和之。非篤論也。本經主欬逆。則苦泄溫通。辛散斯寒。飲之。咳逆自平。此遠志又有消痰飲止咳嗽之

功。別錄去心下膈氣。亦即此意。今東瀛醫者。專用以化痰止咳。頗有奇功。而中醫多未知之。可謂數典忘祖。能不令人齒冷。惟外臺載古今錄驗。胸痺心痛。一方中有遠志。頗合此旨。而張石頑反疑本經欬逆爲誤字。蓋亦未達其苦能泄化。溫能滌飲之旨。三因方治一切癰疽。最合溫通行血之義。而今之醫科。亦皆不知。幸真好方。大是可惜。頃恒用於寒凝氣滯。痰溼入絡。發爲癰腫等證。其效最捷。惟血熱滯熱之毒。亦不必一例亂投。無分彼此耳。又曰。遠志辛溫。能利血之運行。而以爲心家補益之品者。振動而流利之。斯心陽敷布而不壅滯。此補心之真旨也。然溫升之品。必不宜於實熱。如誤用於熱痰蒙蔽心包之證。得毋益張其熱。又所謂安魂魄。定驚悸者。亦謂補助心陽。則心氣充而魂夢自寧。驚悸自定。非養液寧神以安宅之者可比。如因熱生驚。及相火擾攘。而亦與以溫升。其弊亦與痰熱相等。又有遠志能交通心腎之說。則心陽不振。清氣下陷。及腎氣虛寒。不能上升。

製法 雷敷日。凡使遠志。須去心。否則令人煩悶。仍用甘草湯浸一宿。曬乾。或炒乾用。

性質 苦。溫。無毒。

效能 交通心腎而安神。散鬱化痰而消癆。治老年氣枝管炎。因其入胃後即與胃液起作用而將Zeneger析出。此質能刺激胃黏膜。使胃部覺煖感。至腸微能制腸之蠕動。使積糞不易排出。由腸壁吸入血中能激血液之流動。令心跳強盛。血壓增高。氣管之四周黏膜亦均被激。從反應而起咳嗽。之傳入系被激。從反應而起咳嗽。使痰沫混分泌液而咳出。故用為祛痰利尿藥。凡氣管枝炎喘息及其他痰咳皆用之。但古書則作強壯藥。

主治 咳逆傷中。補不足。除邪氣。利九竅。益智慧。耳目聰明。不忘強志。倍力。久服輕身不老。(本經)利丈夫。定心氣。止驚悸。益精去心下膈氣。皮膚中熱。面目黃。(別錄)

歷代記述攷證 【南北朝】徐之才雷公藥對論遠志曰。殺天雄附子烏頭等煎汁飲之。唐甄權

藥性本草論遠志曰。治健忘。安魂。魄。令人不迷。堅壯陽道。宋日華諸家本草論遠志曰。長肌肉。助筋骨。婦人血嘔失音。小兒客忤。元王好古湯液本草論遠志曰。治腎積奔豚。明李時珍本草綱目論遠志曰。治一切癰疽。明釋希雅本草經疏論遠志曰。遠志感天之陽氣。得地之芳烈而生。故無毒。亦陽草也。其富蒲之流乎。其味苦溫。兼微辛。為手少陰經君藥。兼入足太陰經。苦能洩熱。溫能壯氣。辛能散鬱。故主欬逆傷中。補不足。養性全神明。故除邪氣。陽主發散。故利九竅。心氣開通。則智慧自益。經曰。心為君主之官。神明出焉。天君既定。五官自明。故耳目聰明。不忘強志。陽氣盛。則力增長。男子屬陽。故利丈夫。定心氣。止驚悸者。心臟得補而實。故心氣定而驚悸止也。心火不妄動。則陽不妄舉。精不搖矣。故益精。心下膈氣。是心氣鬱而不舒也。皮膚中熱。面目黃者。溼熱在上部也。苦以洩之。溫以暢之。辛以散之。則二證自去矣。久服輕身不老。好顏色延年者。心主血。心氣足

則血色華於面。君主強明。則十一官皆得職。故延年不老。陽氣日積。故身輕也。人之心腎。晝夜必交。心家氣血旺盛。則腎亦因之而實。腎藏精。與志。腎實。故志強也。明李士材本草圖解論遠志曰。遠志散溫味苦。腎經氣分藥也。強志益精。治善忘。蓋精與志。皆腎所藏者。精不足。則志衰。不能上交於心。故善忘。精足。志強。而善忘愈矣。壯陽固精。明目聰耳。長肌肉。助筋骨。理一切癰疽。破腎積奔豚。主治雖多。總不出補腎之功。或以為心經藥。則未也。甘草湯浸一宿。去心焙。清黃宮繡本草求真論遠志曰。遠志辛甘而溫。入足少陰腎經氣分。強志益精。凡夢遺善忘。喉痺失音。小便赤澀。因腎水衰薄而致者。宜用是藥以補之。蓋精與志。皆藏於腎。腎氣充。則九竅利。智慧生。耳目聰明。邪氣不能為害。腎氣不足。則志氣衰。不能上通於心。故迷惑善忘。不能盡閉封藏。故精氣不固也。昔人治喉痺失音作痛。遠志末吹之。涎出為度。非取其通腎氣而開竅乎。一切癰疽發背。從七情憂鬱而

得。單煎酒服。其渣外敷。投之皆效。非苦以泄之。辛以散之之意乎。小便赤濁。用遠志。甘草。茯神。益智。為丸。棗湯服。效。非取遠志歸陰。以為嚮導之藥乎。但一切陰虛火旺。便濁遺精。喉痺癰腫。慎勿妄用。去心。用甘草水浸一宿。曬乾焙用。

國外學說 日本學說謂遠志為類於攝涅瓦之生藥。日本藥局方採用外國之攝涅瓦者。蓋因遠志之成分未詳。故也。漢醫於祛痰利尿藥用之。遠志之成分。依藥學雜誌云。下山平野兩氏之研究。成續為血色結晶樣之粉末。而稱之為Onaidin $C_{14}H_{14}O_6$ 與攝涅瓦之成分 $C_{14}H_{14}O_6$ 稍異。猪子氏以コーベルト教授之所謂錯法試驗遠志。得檢明Senggenin云。又攝涅瓦根。據藥學雜誌第九十一號所記云。凡二世紀以來。出現於藥物學上之生藥。今日尙占樞要之位置。雖蒙新藥之侵襲。亦不失其位置者。甚不多。攝涅瓦根者。蓋藥物學上可敬愛之忠臣之一也。何則。今日尙有多數之局方採用之。可證其為有效。其為健胃劑。尤

十四畫 輕

辣 遠

糊。飯上煮熟食。

②治下疳陰瘡。輕粉末乾搽之。即結癰而愈。(萬表積善堂方)

③治瘰癧不合。以蠶汁溫洗拭乾。用蠶汁調輕粉傳之一方。輕粉五分。黃蠟一兩。以粉摻紙上。以蠶鋪之。縛在瘡上。黃水出即愈。(永類鈴方)

④治癰疽惡瘡。楊梅諸瘡。水銀一兩。朱砂雄黃各二錢。牛白礬。綠礬各二兩。研勻。罐盛。燈蓋蓋定。鹽泥固濟。文武火鍊升。罐口掃收。每以三錢。入乳香沒藥各五分。酒太乙膏上貼之。絕效。名曰五寶霜。用蠟八分至錢半。

施用宜忌 凡非氣壯邪實者。禁用。畏葱石石黃忌一切血。

參攷資料 ①輕言其實。峭言

其狀。賦言其性。昔蕭史與秦穆公。鍊飛雲丹第一轉。乃輕粉。即此也。

(李時珍) ②溫燥有毒。升也。浮也。

黃連。土茯苓。陳醫。黑鉛。鐵漿。可制其毒。(李時珍)

③水銀粉下。隔涎。并小兒涎。潮癰藥多用。然不可常服。及過多。多則損人。若兼驚則危。須審之。蓋驚為心氣不足。不可

下。下之裏虛。驚氣入心。不可治。其

人本虛。更須禁此。慎之至也。(寇

宗奭) ④水銀乃至陰毒物。因火

煨丹砂而出。加以鹽礬鍊而為輕

粉。加以硫黃升而為銀朱。輕飛靈

變化純陰。為燥烈。其性走而不守。

善劫痰涎。消積滯。故水腫風痰。溼

熱毒瘡。被劫涎從齒齦而出。邪鬱

為之暫開。而疾因之亦愈。若服之

過劑。或不得法。則毒氣被熱。竄入

經絡筋骨。莫之能出。痰涎既去。血

液耗亡。筋失所養。營衛不從。變為

筋攣骨痛。發為癰腫疳漏。或手足

戰。製蟲蠱頑瘰。經年累月。遂成廢

痼。其害無窮。觀丹容升鍊水銀輕

粉。脂器稍失。固濟鐵石。透透。况人

之筋骨皮肉乎。陳文中言。輕粉下

痰。而損心氣。小兒不可輕用。傷脾

敗陽。必變他證。初生尤宜慎之。而

演山氏謂。小兒在胎。受母飲食熱

毒之氣。蓄在胸膈。故生下。個個發

驚。宜三日之內。與黃連去熱。賦粉

散毒。又與人參朱砂蜜湯。解清心

肺積毒。既化。見可免此患。二說不

同。各有所見。一謂無胎毒者。不可

者宜審。(李時珍)

【輕馬勃】即馬勃之處方用名。詳

『馬勃』條。

【辣子】即食茱萸楚地之俗名。詳

『食茱萸』條。

【辣米菜】即蔞菜之古籍別名。典

見綱目。詳『蔞菜』條。

【辣米粥】

基本 本品係用辣

主治 治心腹疼痛

【辣芥子】即芥子之處方用名。詳

『芥子』條。

【辣虎】即蕃椒之古籍別名。典見

龍柏藥性考。詳『蕃椒』條。

【辣茄】即蕃椒之原名。詳『蕃椒』

條。

【辣椒】即辣茄之俗名。詳『蕃椒』

條。

【辣蓼】即水蓼之古籍別名。典見

綱目。詳『水蓼』條。

【辣薤】即薤之日本名。詳『薤』條。

【辣醬】即蕃椒製成醬者之處方

用名。詳『蕃椒』條。

【遠志】 命名 本品功能益智

處方用名 遠志肉 炙遠志

16011

古醫別名 辣菰。菰繞。(本經)

蕒。苦蕒。餘糧。阿只草。(和漢藥考)

醒心杖。(記事珠)

外國名詞 Polygala, tenuifolia, Willd.

基本 屬遠志科遠志之根與

葉。

產地 陳仁山藥物生產辨云。

遠志產山西曲沃縣。河南禹州府。

形體 遠志為山野自生之常

綠草。一根抽數莖。高達七八寸。葉

互生。作卵圓形或橢圓形。夏月於

葉腋開花。有不整齊之紫色花冠。

酷似萩花。後結大二三分扁圓形

之實。中有小黑子。市上出售者。其

根有許多殘莖。且彎曲而有多數

歧根。長約七八寸。粗約三四分。外

面呈灰褐色。處處有副根之切痕。

及不正之皺縮。皮部粗糙。易剝去。

稍有苦味。



遠志

採取 三四月間採根葉陰乾。

起消化不良。齒齦微腫。但不流涎。遂即停服。約數旬後。前症又連發三次。仍服輕粉。微毒果愈。惟兩目已瞽。不能重明耳。

配合應用 ①小兒初生。浴湯中入鹽少許。拭乾。以膩粉少許摩其身。既不畏風。又散諸氣。(全幼心鑑方)

②治初生鎖肚。證由胎中熱毒。結於肛門。兒生之後。閉而不通。三日者。急令婦人啞兒前後心。手足心并臍七處四五次。以輕粉半錢。蜜少許。溫水化開。時與少許。以通為度。(全幼心鑑方)

③治小兒涎喘。服藥不退者。用無雄雞子一個。取清。入輕粉抄十錢。拌和。銀器盛。置湯瓶上。蒸熟。三歲兒盡食。當吐痰或瀉而愈。氣實者。乃可用。(活幼口議方)

④治幼兒乳乳不止。服此立效。膩粉一錢。鹽鼓七粒。去皮研。勻丸麻子大。每服三丸。藿香湯下。(活幼口議方)

⑤治小兒嘔泥及腹肚。用膩粉一分。沙糖和丸。麻子大。空心米飲下。一丸良久。泄出泥土。瘥。(經驗

方)

⑥治大小便閉。脹悶欲死。二三日則殺人。膩粉一錢。生麻油一合。相和空心服。(聖惠方)

⑦治大便壅結。膩粉半錢。沙糖一彈丸。研丸。梧子大。每服五丸。臨臥溫水下。又方。膩粉二錢。黃丹一錢。為末。每米飲服一錢。(普濟方)

⑧治血痢腹痛。膩粉五錢。定粉三錢。同研。水浸蒸餅。心少許。和丸。綠豆大。每服七丸。或十丸。艾一枝。水一盞煎湯下。(孫用和祕寶方)

⑨治消中嗜食。多因外傷脾熱。內積憂思。嗜食鹹物。及麪致脾胃乾燥。飲食倍常。不生肌肉。大便反堅。小便無度。輕粉一錢。為末。薑汁拌勻。長流水下。齒浮是效。後服豬肚丸補之。(危氏得效方)

⑩治一切虛風。不二散。用膩粉一兩。湯煎五度。如麻。細。慢火焙乾。麝香半兩。細研。每服一字。溫水調下。(孫用和祕寶方)

⑪治水氣腫滿。衣粉一錢。烏雞子去黃。盛粉。蒸餅包。蒸熟。取出。苦寧。煎炒一錢。同蒸餅。杵丸。綠豆大。每車前湯下。三五丸。日三服。神效。

(醫聖元戎方)

⑫治瘡瘡生。輕粉。黃丹等分。為末。左目患吹右耳。右目吹左耳。即退。(王氏痘疹方)

⑬治女人面脂。太真紅玉膏。輕粉。滑石。杏仁。去皮等分。為末。蒸過。入腦麝少許。以雞子清調勻。洗面畢。傳之。旬日後。色如紅玉。(閻開事宜方)

⑭治抓破面皮。生瘰。自然汗。調輕粉。末。擦之。更無痕迹。(救急方)

⑮治牙齒疼痛。輕粉一錢。大蒜一瓣。杵碎。安臍骨前陷中。先以銅錢隔之用。蛻殼蓋定。扎住。一宿愈。左疼安右。右疼安左。(摘玄方)

⑯治風蟲牙疳。膿血有蟲。輕粉一錢。黃連一兩。為末。擦之。(尊濟方)

⑰治小兒耳爛。輕粉。粟子灰等分。研。油調。傳。(摘玄方)

⑱治底耳腫痛。汁水不絕。輕粉一錢。麝香一分。為末。搽之。(簡便方)

之。又方。雞子黃炒出油。入麻油及膩粉。未傳之。集簡方)

⑳治小兒生癰。豬脂和輕粉抹之。(直指方)

㉑治牛皮惡癰。五更食炙牛肉。一片。少刻。以輕粉半錢。溫酒調下。(直指方)

㉒治楊梅瘡癰。用米粉。大風子肉等分。為末。塗之。即愈。(嶺南衛生方)

㉓用輕粉二錢。杏仁四十二個。去皮洗。搗。拭乾。擦之。不過三次。即愈。乾則以鵝膽汁調。(醫方摘玄方)

㉔治楊梅毒瘡。用輕粉一錢。雄黃。丹砂。各二錢。牛。槐花。炒。龜。板。炙。各一兩。為末。糊丸。梧子大。每服一錢。冷茶下。日二服。七日愈。(醫學統旨方)

又用輕粉。胡桃仁。槐花。炒。研。紅。棗。肉。各二錢。搗丸。分作三服。初日雞湯下。二日酒下。三日茶下。三日服。盡五日。瘡乾。七日。瘡落。(楊誠經驗方)

一方。用續豬腎一對。去膜。批開。各搽輕粉一錢。扎定。麻油二兩。燒。焦。噴。食。不。破。口。腫。牙。仍服金銀花藥。一方。用大雞卵一個。去黃。留白。入輕粉一錢。搗。勻。紙

十四 輕

度。又以輕粉和水。加食鹽。綠化加里。綠化安母。組誤煮沸之。亦析出水銀。若與有機質之砂糖相接。觸以溫度為媒介。則水銀逐漸還元。加沸騰之鹽酸。則析出水銀之一分。而化生昇汞。加硝酸煮沸之。則發生次硝酸。加濃厚之硫酸。冷時無變化。煮沸之則發生亞硫酸。而溶解。國分平次郎之製造輕粉。說明書云。據內務省試驗輕粉之成績。其(一)以射和所出之輕粉。實行化學試驗。毫無可溶解之水銀化合物。又可完全昇華。絕不混雜安母。尼亞鹽與其他諸鹽。更試其醫治作用。則驅蝨及瀉利之功。堪與第一綠化汞相匹。所異者。輕粉結晶如鱗屑。耐光而不變色。查歐洲製造之第一綠化汞結晶。頗大。受光較遲。故大率隨用研末。其尋常者。恐不免含有可溶性之水銀化合物。故不如以大結晶之第一綠化汞。和水研末。洗淨夾雜物。用之較為穩妥。惟射和所製之輕粉。質地純潔。無異本國製之第一綠化汞。用於醫藥。特許發賣。(其二)此藥為鱗屑狀。無色。有光澤。

遇水不溶解。遇硝酸。鹽酸始溶解。起第一鹽化水銀之諸反應。不含他質。故合用於醫藥。和漢藥考曰。輕粉之用量。與甘汞相同。內用為驅蝨藥。一日用〇・〇二至〇・〇五為緩下劑。一日用〇・一至一・〇。丹波藥學博士曾託橋田醫學士。用輕粉為下劑。送次試驗。其用量。據橋田報告如左。第一次用量為〇・五瓦。服後小腹痛。經四時半。下瀉一次。第二次用量仍係〇・五瓦。服後稍覺腹痛。四時中瀉兩次。第三次用量如前。服後仍覺腹痛。經十時始瀉一次。第四次用量如前。服後不覺腹痛。經七時瀉一次。和漢藥考曰。國分平次郎製造輕粉。並著有說明書。詳述射和輕粉之歷史。摘錄如左。射和輕粉之製造。為自古異人傳授之奇法。緣我鄉之長位有山名朱中山。天然產一種朱色土。俗呼實土。和以水銀。即可製成輕粉。相傳此土能解水銀峻烈之毒。他處竟不能做造此藥。因此射和輕粉。名聞遐邇。蓋他處無此實土也。當時發明之早。尚在持統天皇御極之

際。距今已千二百餘年。若歐洲之綠化汞。發明在西曆千七百七十四年。距今幾百有餘年。誠我國特有之良劑也。當四百五十餘年前。即文安永祿年間。此藥最為盛行。時製造者有八十三家之多。國家恐有濫造之弊。嚴行限制。遂減至十六家。復嚴訂章程。以防之。故醫學博士櫻村清德。嘗試輕粉之醫治功用。詳見明治十二年十一月東京醫事新誌第八十四號。又藥學博士丹波敬三。製造射和輕粉之意見書。詳見明治二十七年三月藥學雜誌第四百十五號。錄之如左。櫻村醫學博士。檢查輕粉效用之成績。和漢醫之應用輕粉。於蝨毒症也。亦已久矣。前人謂其成分中。不免攪雜猛汞。實不盡然。茲者日本大學醫學部教授柴田承桂。精密檢查。始知其成分為亞綠化汞。與甘汞相同。至是嚮日之疑團。乃一旦冰釋。今也余之檢查。則在輕粉之效力。是否與甘汞相同。抑有差異之處。故第一試其驅蝨之功效。第二試其瀉瀉之作用。爰臚舉其成績如左。輕粉治愈蝨

毒之醫案。(一)某男子年二十七。營養本不佳。良。二年前患微毒。至今不治。頭部有潰瘍數處。陰莖生疳。瘡侵蝕極深。龜頭腐脫。咽喉亦有潰瘍數處。嚥下困難。聲音嘶啞。某醫連用沃陳劑。外部潰瘍。塗布五十倍石炭酸油。經已數月。毫無寸效。試以輕粉〇・〇三。和白糖〇・三。投之。與灰白水銀軟膏塗擦法。替換外部潰瘍。則以輕粉一分。胭脂八分。調和攤貼。約三星期。諸症頓減。潰瘍幾於全愈。其間兼用綠酸加里液。含漱。頗進滋養物。該病者自來食慾缺乏。消化不良。衰弱頗甚。齒齦微有紅腫。現惡液質之徵。後更投以規那。煎服。然強健。異於常人。(二)某男子年二十二。體格中等。親屬向有神經系病。四年前始患微毒。一年前發腦微毒。由是諸症叢起。如神思不甯。頭痛耳鳴。眩暈健忘等。續續而至。又卒然昏倒。搐搦狀。若發癲。且兩眼失明。亦令服輕粉。一日三次。每次服〇・〇三。與灰白水銀軟膏塗擦法。替換頭部及發癲症狀。俄而遽退。神思爽適。連服約十餘日。漸

盆覆之。篩簾灰。鹽水。和封固盆口。以炭打二炷香。取開。則粉升於盆上矣。其白如雪。輕盈可愛。一兩汞可升粉八錢。又法水銀一兩。皂礬七錢。白鹽五錢。同研如上升鍊。又法先以皂礬四兩。鹽一兩。煨硝五錢。共炒黃爲麴。水銀一兩。又麴二兩。白礬一錢。研勻如上升鍊。

用法 剉研和入內服外敷之。
性質 辛。冷。無毒。
成分 輕粉爲質地疎鬆之甘汞 Hg_2Cl_2 。

效能 殺蟲治疥瘡。刮痰消積。脹。用作驅微藥。又作下劑能治疥瘡。蛔蟲便祕。外用有直接撲滅細菌及寄生蟲之功。且於局部無刺激性。內服能激腸之蠕動。增進及分泌加多。故有通便之功。且在腹內與纖蟲蓋片蟲纖蟲相遇。略有撲滅而驅出之功。若佐以殺蟲劑。則功效尤顯。

主治 通大腸。輕小兒疳瘕。瘰癧。殺瘡疥癬蟲。及鼻上酒皰。風瘡瘰癧。

歷代記載攷證 【明】李時珍

十四鹽 輕

本草綱目論輕粉曰。治痰涎積滯。水腫鼓脹。毒瘡。【明】繆希雍本草經疏論輕粉曰。水銀粉升鍊水銀而成。其味本辛。氣冷無毒。療體與水銀相似。第其性稍輕浮。爾大腸熱燥。則不通。小兒疳瘕。因多食甘肥腸胃結滯所致。辛涼總除腸胃積滯熱結。故主之也。其主瘰癧瘡疥。癬蟲。及鼻上酒皰。風瘡瘰癧者。皆從外治。無非取其除熱殺蟲之功耳。【明】李士材本草圖解論輕粉曰。輕粉辛溫有毒。治痰涎積滯。鼓脹。毒瘡。殺蟲搜風。輕粉乃鹽礬煉水銀而成。其氣燥烈。其性走竄。善刮痰涎。消積滯。故水腫風痰。溼熱。楊梅毒瘡。服之。則涎從齒齦而出。邪鬱漸開。而愈。若服之過劑。及用之失宜。則毒氣被逼竄入經絡。筋骨。莫之能出。變爲筋攣骨痛。發爲癰腫。疳漏。經年累月。遂成廢疾。因而天枉。用者慎之。【清】黃宮繡本草求真論輕粉曰。輕粉係水銀加礬礬昇煉而成。雖是化純陰而爲辛燥。然陰毒之性猶存。故能殺蟲治瘡。刮痰消積。殺蟲之性走而不守。今人用治楊梅瘡毒。雖能擬

風邪淫熱。從牙齦而出。暫得寬解。然毒氣竄入筋骨。血液耗散。久久發爲結毒。遂成廢人。仍須用水銀升煉入三白丹引拔毒之藥。同氣搜逐癰風。醉仙丹通天再造散。用以搜剔毒邪。仍從齒縫而出。再以錢氏利驚丸白餅子並用。取痰積從大便而出矣。【清】黃元御玉楸藥解論輕粉曰。輕粉辛冷毒烈。服之筋骨拘攣。齒牙脫落。庸工用治楊梅惡瘡。多被其毒。不可入湯丸也。本草謂其治痰涎積滯。氣腫水脹。良藥自多。何爲用此。

國外學說 日本三重縣射和村爲輕粉特產區。因該村朱中山產有一種土質。名朱色土。爲製造輕粉不可少之原料。故輕粉之生產祇限於該處。和漢藥考曰。精製水銀之法。以食鹽與朱色土。煉水銀使固入鐵鍋中。烈火熱之。使之昇華。黏附於蓋。乃採取之。製造輕粉之原料有三。一水銀。二鹽之渣。汁。三赤土。拌和入鐵鍋內。並列竈上。共六十個。鍋內空隙處。以赤土滿填之。各鐵鍋均蓋以黏土製之。兜令勿洩氣。兜面以水濯透。安置

既妥。徐徐加熱。候溫度逐漸上昇。水銀與渣汁中之酸性鹽。及空氣中之酸。乘渣汁中之食鹽。先後起化學反應。輕粉則成美麗之結晶。黏附兜之內面。約一二時。提煉即可告竣。乃以羽毛掃拂輕粉於紙上。隨即裝罐發售。其鐵鍋內餘剩之赤土。尚含有粗製之輕粉不少。於此再加水銀渣汁。便爲二次製造輕粉之原料。依此所得之輕粉。係細小色白之鱗片。且有光輝。毫無猛汞之質。又甚輕。故其粉末易與他藥混和。以製散劑。或丸藥。均極相宜也。又輕粉雖係結晶性之白粉。然用放大三百二十五倍之顯微鏡照之。則見爲大小不同之板狀結晶。其實輕。有光輝。起脂肪狀之感覺。無臭無味。其反應呈中性。水及酒精伊打。俱不溶解。如安母尼亞水。則變黑色。若與苛性亞爾加里土類。亞爾加里土炭酸亞爾加里土。煨製苦土。同以水爲媒介。冷則變成黑色之亞酸化汞。加沃度加里液少許。立即化生黃綠色之亞沃度汞。再加多量。即析出水銀之一分。溶解而爲沃度加里與沃

十四畫 豪 狸 寶 趕 趙 輕

括筆談云。世人妄認地菴爲火杖。有單服火杖法者。乃是地菴。不當用火杖。乃本草名豬膏母者。後人不識。重複出條也。按此數說各異。而今人風痺多用豬莖丸。將何適從耶。時珍常聚諸草訂視。則豬膏草莖莖有直稜。兼有斑點。葉似蒼耳而微長。似地菴而稍薄。對節而生。莖葉皆有細毛。肥壤一株。分枝數十八九。月開小花。深黃色。中有長子。如同蒿子。外萼有細刺。黏人地菴則青莖。圓而無稜。無斑無毛。葉皺似慈芥。亦不對節。觀此則似與成張二氏所說相合。今河南陳州採豬莖充方物。其狀亦似豬膏草。則沈氏謂豬莖即豬膏母者。其說無疑矣。蘇恭所謂似酸漿者。乃龍葵。非豬莖。蓋誤認爾。但沈氏言卅間單服火杖。乃是地菴。不當用豬膏母。似與成張之說相反。今按豬莖豬膏母條。並無治風之說。惟本經地菴條。有去痺除熱。久服輕身。耐老之語。則治風似當用地菴。然成張進御之方。必無虛謬之理。或者二草皆有治風之功乎。而今服豬膏母之豬莖者。復往往有效。

【豪豬】

其地菴不見有服之者。則豬莖之爲豬膏丸。尤不必疑矣。(李時珍) 命名 說文云。豪豕豕鬣如筆管者。能激毒射人。故名。

古籍別名 蒿豬。唐本草(山豬)(通志)獾。獾豬。獾豬(綱目)箭豬(動物學大辭典)

外國名詞 Hystrix cristata L. 或 H. suberistata Swinhoei (拉丁) (Common porcupine 或 Porcupine) (英) ヤンプラシ(日本)

基本 係脊椎動物哺乳類有胎盤類齧齧類豪豬科。

產地 出廣西及印度諸地之山中。美洲亦有出。

形態 豪豬爲獸類之一種。頭大眼小耳短。口吻圓鈍。上顎具堅強之門牙。骨上有硬強之長鬚。四肢短。前肢四趾。後肢五趾。趾具短爪。背臀腿密生硬刺。毛色黑。或蒼褐。長刺毛尖端。更有倒鈎。體長二三尺。穴居土中。晝伏夜出。覓樹皮木根及果實爲食。其肉可供藥用。



豬 豪

【豪豬肚及屎】

性實 寒。無毒。

主治 水病。熱風。鼓脹。同燒存性。空心溫酒服二錢。匕用一具。卽消。

歷代記述攷證

【唐】蘇恭新修本草論豪豬肚及屎曰。治黃疸。

乾燒研服。【明】李時珍本草綱目論豪豬肚及屎曰。連屎燒研。酒服。治水腫。脚氣。奔豚。

參攷資料 此豬多食苦參。故能治熱風水腫。而不能治冷脹也。

【孟說】

【狸豆】卽黎豆之古籍別名。典見綱目詳「黎豆」條。

一五九八

【寶門】卽檳榔之古籍別名。典見李氏藥錄。詳「檳榔」條。

【寶雀】卽雀之古籍別名。典見綱目詳「雀」條。

【趙麥黃】卽粟米之古籍別名。典見綱目詳「粟米」條。

【趙李】卽鼠李子之古籍別名。典見新修本草圖經。詳「鼠李子」條。

【輕粉】 命名 本品由水銀升鍊而成。質輕如粉。故又名之曰水銀粉。

古籍別名 水銀粉(嘉祐)汞粉。暗粉(日華本草)膩粉(本草綱目)水粉。銀粉。水銀脂。伊勢白粉(和漢藥考)不重(生產辨)

外國名詞 Calomel

基本 係汞礦。爲水銀結晶性之疏鬆粉末。

形態 輕粉爲水銀升鍊。係結晶性之粉末。作板狀針狀。或錐狀之白色固體。而有光澤。其不其純潔者。僅供外用。內服者須以純潔色白之細粉末。

製法 李時珍曰。升鍊輕粉法。用水銀一兩。白礬二兩。食鹽一兩。同研。不見星。鋪於鐵器內。以小烏

治熱煩癰毒。而吐痰瘡。及其九次。蜜酒蒸曬。和蜜爲丸。則氣味已。而通利機關。和調血脈。尤爲純粹。凡風寒溼熱諸痺。多服均獲其效。洵是微賤藥中之良品也。

配合應用 治風寒泄瀉。火

枕丸。治風氣行於腸胃泄瀉。火枕草爲末。醋糊丸。梧子大。每服三十丸。白湯下。(聖濟總錄方)

治癰疽腫毒。一切惡瘡。綿葦草端午採者。一兩乳香一兩白礬。燒半兩爲末。每服二錢。熱酒調下。毒重者連進三服得汗妙。(乾坤祕鑑方)

治發背丁瘡。綿葦草五葉草(卽五爪龍)野紅花(卽小蘇)大蒜等分。搗爛入熱酒一壺。絞汁服得汗立效。(乾坤生意方)

治丁瘡腫毒。端午採綿葦草日乾爲末。每服半兩。熱酒調下。汗出卽愈。極有效驗。(集簡方)

治反胃吐食。用火枝草焙爲末。蜜丸梧子大。每沸湯下五十丸。(百一選方)

用量 三錢至四錢。

施用宜忌 凡無風溼而屬陰

十四畫 豨

虛者禁用。忌鐵。著名方劑 豨薟丸。治口眼喎斜。偏風失音。不語。時時吐涎。久服眼目清明。髮髮烏黑。筋骨強健。(本事方) 豨薟草五月中取葉及嫩枝洗。九蒸九曬。微焙爲末。煉蜜丸。桐子大。溫酒或米湯下。三四十丸。

參攷資料 蜀人單服豨薟

法。五月五日。六月六日。九月九日。採葉去根莖花實。淨洗曬乾。入甕中。層層灑酒。與蜜蒸之。又曝。如此九過。則氣味極香美。熬搗篩末。蜜丸服之。云甚益元氣。治肝腎風氣。四肢麻痺。骨間冷。腰膝無力者。亦能行大腸氣。諸州所說皆云。性寒有小毒。與唐本同。惟文州及高郵州云。性熱無毒。服之補益。安五臟。生毛髮。兼主風溼癢。肌肉頑痺。婦人久冷。尤宜。用須去粗莖。留枝葉。花實。蒸曝兩說不同。豈單用葉則寒而有毒。并枝花實則熱而無毒乎。抑土地所產不同而然歟。(蘇頌) 生搗汁服。則令人吐。故云有小毒。九蒸九曬。則補人去痺。故云無毒。生則性寒。熟則性溫。云熱

者非也。(李時珍) 按江陵府節度成誦述豨薟丸方表略云。臣有弟許年二十一。中風。伏枕五年。百醫不瘳。有道人鍾針。因視此患。曰。可餌豨薟丸。必愈。其草多生沃壤。高三尺許。節葉相對。當夏五月以來。收之。每去地五寸。剉。以溫水洗去泥土。摘葉及枝頭。凡九蒸九曬。不必太燥。但以取足爲度。仍熬搗爲末。煉蜜丸。如梧子大。空心酒溫或米飲下。二三十丸。服至二千丸。所患愈。加不得憂慮。是藥攻之力。服至四千丸。必得復。至五千丸。當復丁壯。臣依法修合。令併服之。果如其言。服後。須喫飯三五匙。歷之五月五日。採者佳。奉勅宣付醫院詳錄。又知益州張詠。述豨薟丸表略云。竊以養石飲水。可作充腸之饌。餌松含柏。亦成救病之功。是以療飢者。不在於差珍。愈病者。何煩於異術。倘獲濟時之藥。輒陳鄙物之形。不恥管窺。輒十天聽。臣因換龍輿觀。掘得一碑。內說修養氣術并藥方二件。依方差人訪問。採覓其草。頗有異。金稜銀線。素莖紫莖。對節而生。蜀號火杖。莖葉頗同

蒼耳。不費登高歷險。每常求少獲多。急採非難。廣收甚易。倘勤久服。旋見神功。誰知至賤之中。乃有殊常之效。臣自服至百服。眼目清明。卽至千服。髭鬚烏黑。筋力輕健。效驗多端。臣本州有都押衙羅守一。曾因中風。墜馬。失音不語。臣與十服。其病立瘳。又和尚智嚴年七十。忽患偏風。口眼喎斜。時時吐涎。臣與十服。亦便得痊。今合一百劑。差職貢史元泰進。(唐慎微) 豨薟田野皆食之。一名火杖。葉似酸漿而狹長。花黃白色。三月四月採苗。葉曝乾。又曰。豨薟母。生平澤下。溼地所在皆有。一名虎膏。一名狗膏。葉似蒼耳。莖圓有毛。(蘇恭) 豨薟處處有之。春生苗葉。似芥葉而狹長。文粗。莖高二三尺。秋初有花。如菊。結實頗似鵲巢。夏採葉曬乾。用(蘇頌) 按蘇恭唐本草謂豨薟似酸漿。諸膏母似蒼耳。列爲二種。而成訛。述豨薟丸表言。此藥與本草所述相異。多生沃壤。高三尺。計節葉相對。張詠豨薟丸表言。此草金稜銀線。素莖紫莖。對節而生。蜀號火杖。莖葉頗同蒼耳。又按沈

綱目詳豨薺條

【豨首】即天名精之古籍別名。典

見綱目詳「天名精」條

【豨薺】即蔓薺之古籍別名。典見

本草集註詳「蔓薺」條

命名 楚人呼豨爲

【豨薺草】豨呼草之氣味辛毒

者爲豨。本品氣臭如豨而味薺。螫故名。

古籍別名 火棘草。豬背母。虎

膏。狗脊（唐本草）黏糊菜（救荒

本草）希仙（本草綱目）火獸。希

賢虎。類鼻。白花菜。羊屎菜。蟾薺

（和漢藥考）

外國名詞 Siegesbeckia

orientalis, L. (拉一)

基本 屬菊科爲豨薺之苗葉。

產地 在山野田澤間。

形態 豨薺爲一年生草本。山

野多有之。春日生苗。至夏莖高二

三尺。大者達五六尺。莖方有茸毛。

葉爲卵形。前端尖。邊緣有粗鋸齒。

自其底部出三大葉。脈色淺綠。質

柔軟而薄。有茸毛如草。皆對生。入

秋。枝梢開小黃花。排列爲頭狀花

序。在花序之周圍者爲舌狀花冠。

在莖中央者爲筒狀花冠。花下有

苞五瓣。皆狹長如匙。亦生有茸毛。

花後結瘦果。果有黏液。具一種

臭氣。善附著他物。以傳播其種子。

採取 三四月間採苗莖。曬乾。

製法 蘇頌云。凡使豨薺。須用

蜀人單服豨薺法。五月五日。六月

六日。九月九日。採葉去根。莖花實

淨洗。曝乾。入甕中。層層酒與蜜

蒸之。又曝如此。九過。則氣味香美。

熬搗篩末。蜜丸服之。甚益元氣。治

肝腎風氣。四肢麻痺。骨間冷。腰膝

無力者。又能行大腸氣。

性質 苦寒。有小毒。

效能 祛風溼。治麻痺。用治散

風燥溼藥。及作瘡瘍藥。

主治 治熱鬱煩滿不能食。生

搗汁三合服。多則令人吐。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器

本草拾遺論豨薺草曰。主久癰痰

癰。搗汁服。取吐。搗傳虎傷。狗咬。蜘蛛

咬。蠶咬。蠅咬。溺瘡。【明】李時珍

本草綱目論豨薺草曰。治肝腎風

氣。四肢麻痺。骨痛。膝弱。風溼諸瘡。

【明】李士材本草圖解論豨薺草

曰。豨薺苦寒。入肝主風氣。麻痺。骨

痛。膝弱。風溼諸瘡。按豨薺苦寒之

品。且有毒。令人吐。以爲生寒。熱溫

理。或有之。以爲生溫。熱補。未敢盡

信。豈有苦寒。撲風之劑。藥資便有

補益之功耶。世俗見微。微本草。譽

之太過。遂誤認爲風家至寶。余少

時。亦信之。及格誠修事。久用無效。

始知方書未可盡憑也。古人所謂

補者。亦以邪風去。則正氣昌。非謂

其本性能補耳。酒蜜潤蒸。【清】黃

宮燭本草求真論豨薺草曰。豨薺

草味苦而辛。性寒不溫。故書載須

蒸曬至九。加以酒蜜同製。則濁陰

之氣可除。而清香之氣始見。是以

主治。亦止宜於肝腎風溼。而見四

肢麻。木筋骨冷痛。腰膝無力。風溼

瘡瘍等症。以其苦能燥溼。寒能除

熱。辛能散風。故也。若使非爲風溼

而見腰膝無力等症。則又屬於血

虛。而不可用辛散之味矣。然熟用

猶可。其性不甚傷正。若生用不製

則又令人作泄。不可不知。以五月

五六月。六七月。七八月。九月。九

探者尤佳。至云服能益氣。止是風

溼既除之驗。宋張詠表進輕身之

說。亦是渾同庸腐之語。非實證也。

去粗莖。留枝葉花實。酒拌蒸曬九

次。蜜丸。搗汁熬膏。煉蜜三味收之。

加以酒治始可投服。

近人學說 張山雷曰。豨薺之

草。微有臭味。故得豨名。豨者豕也。

言此草之氣。其臭如豕。古人又有

豬背母之名。其義一也。唐本草始

載之。言其氣味苦寒。治熱濕。煩滿

不能食。生搗汁飲三合。多則令人

吐。又謂豬背母氣味辛苦。平。主金

瘡止痛。除諸惡瘡。消浮腫。搗封之

湯漬散敷。並良。藏器謂主久瘡。疥

癩。搗汁服。取吐。又搗敷虎傷。狗咬

蜘蛛咬。蠶咬。蠅咬。溺瘡。蘇頌謂蜀

人單服豨薺。以五月五日。六月六

日。九月九日。採葉淨洗。入甕中。層

層酒與蜜蒸之。又曝。凡九次。氣

味極香。搗末。蜜丸服之。云甚益元

氣。治肝腎風氣。四肢麻痺。骨間冷

腰膝無力者。亦能行大腸氣。安五

臟。生毛髮。兼主風溼。瘡肌肉頑痺

婦人久冷。尤宜。又江陵節度成。前

及知益州張詠。皆有進豨薺丸表

極言其治中風大效。願按此物。生

時氣臭味濃。多服引吐。盡性本寒

涼。而氣猛烈。長於走竄。開泄。故能

宜。正以其病在陽而不結根於陰故也。

國外學說

古方藥品考曰。蜚蠊有數種。長四五分。形似金龜子。光黑者名胡蜚蠊。其間有長寸許。在牛屎上者亦可。用其小甲。無光者下品也。又曰。蜚蠊味鹹寒。主治小兒驚癇。癰瘡。腹脹寒熱。大人癰疾。狂陽。按蜚蠊。晝伏。糞土間。夜乃飛行。其性陰寒有毒。故能解熱毒也。大和本草曰。蜚蠊為化生類。乃糞中黑蟲也。一名蝓蜚。莊子云。蝓蜚之智。在於轉丸。轉丸者。乃以土包糞而成丸也。

配合應用 ①治小兒驚風。不拘急慢。用蜚蠊一枚。杵爛。以水一小盞。於百沸湯中。澄熱。去滓。飲之。

②治小兒疳疾。土裏蜚蠊。煨熟與食之。韓氏醫通方。

③治小兒重舌。蜚蠊燒末。唾和傳舌上。子母秘錄方。

④治隔氣吐食。用地牛兒二箇。推屎蟲一公一母。同入罐中。待蟲食盡牛兒。以泥裹煨存性。用去白陳皮二錢。以巴豆同炒過。去豆。將陳皮及蟲為末。每用一二分。吹入

咽中。吐痰三四次。即愈。孫氏集效方。

⑤治赤白下痢。黑牛散。治赤白痢。噤口痢。及泄瀉。用黑牛兒。即蜚蠊一名錢甲。將軍燒研。每服半錢。或一錢。燒酒調服。小兒以黃酒服立效。李延壽方。

⑥治大腸脫肛。蜚蠊燒存性。為末。入冰片研勻。搽肛上。托之。即入。醫學集成方。

⑦治大小便閉。經月欲死者。本事推車散。用推車客七個。男用頭。女用身。土狗七箇。男用身。女用頭。新瓦焙研末。用虎目樹南向皮。煎汁調服。只一服。即通。又治大小便不通。六七月。尋牛糞中大蜚蠊十餘枚。線穿陰乾。收之。臨時取一箇。全者放淨磚上。四面以灰火烘乾。當腰切斷。如大便不通。用上載。小便不通。用下截。各為細末。取井華水服之。二便不通。全用即解。楊氏經驗方。

⑧治大腸秘塞。蜚蠊炒去翅足。為末。熱酒服一錢。聖惠方。

⑨治小兒轉胞不通。用死蜚蠊二枚。燒末。井華水一盞。調服。干

金方

①治小便血淋。蜚蠊研末水服。鮑氏方。

②治痔漏出水。用蜚蠊一枚。陰乾。入冰片少許。為細末。紙擦。藥末入孔內。漸漸生肉。藥自退出。即愈。唐氏方。又用蜚蠊焙乾研末。先以礬湯洗過。貼之。補珍方。

③治一切漏瘡。不拘蜂蟻風癢。蜚蠊燒末。醋和傅。千金方。

④治附骨疽漏。蜚蠊七枚。同大麥搗傅。劉涓子方。

⑤治一切惡瘡。及沙虱水弩惡疽。五月五日。取蜚蠊蒸過。陰乾。為末。油和傅之。聖惠方。

⑥治丁腫惡瘡。楊柳上大烏殼硬蟲。或地上新糞內。及泥堆中。者生取。以蜜湯浸死。新瓦焙焦。為末。先以燒過針撥開。用好醋調傅之。普濟方。

⑦治無名惡瘡。忽得不識者。用死蜚蠊。杵汁塗之。廣利方。

⑧治灸瘡血出不止。用死蜚蠊燒研。豬脂和塗。千金方。

⑨治大赫瘡疾。急防毒氣入心。先灸。後用乾蜚蠊為末。和鹽水傅。

四圍。如韭菜。隔日一上之。肘後方。

⑩治癰瘍風病。取塗中死蜚蠊。杵爛。摺瘡。令熱。封之一宿。瘡。外臺秘要方。

⑪治鼻中息肉。蜚蠊十枚。納青竹筒中。油紙密封。置廁坑內。四十九日。取出。晒乾。入麝香少許。為末。塗之。當化為水也。聖惠方。

⑫治沙塵入目。取生蜚蠊一枚。以其背於眼上影之。自出。肘後方。

⑬治下部蠱蟲痛痒。膿血。旁生乳竅。蜚蠊七枚。五月五日。收者。新牛糞半兩。肥羊肉一兩。炒黃。同搗成膏。丸蓮子大。炙熱。綿裹。納肛中。半日。即在大便中。蟲出。四度。水送。輩炳集驗方。

用量 三分至八分。

施用宜忌 凡非氣壯邪實者。禁用。畏羊角。羊肉。石膏。

參攷資料 ①簡錄入骨。不可移者。楊氏家藏方。用巴豆微炒。同蜚蠊搗塗。斯須痛定。必微痒。忍之。待極痒。不可忍。乃撼動。拔之。立出。此方傳於夏侯卿。鄭初為閬州有

十四畫 蜜 蛭

子以酒漬傳而令人悅目。(陶弘景)

【蜜蜂草】即香薷之古籍別名。典見綱目。詳『香薷』條。

【蜜銀花】即金銀花之處方用名。詳『金銀花』條。

【蜜糖】即蜂蜜之處方用名。詳『蜂蜜』條。

【蜜鮓】即蜜姑魚之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『蜜姑魚』條。

【蜜蘭】即建蘭之別名。詳『建蘭』條。

【蜜蠟】即黃蠟之原名。詳『黃蠟』條。

【蠟】即白蠟之原名。詳『白蠟』條。

【蛭】即貝子之古籍別名。典見綱目。詳『貝子』條。

【蛭娘】 命名 本品深目高鼻。狀如羌胡。故名。

處方用名 蛭娘蟲。胡蛭娘。

古鑑別名 蛭蛭推丸(弘景)。

推車客渠(本草綱目)黑牛兒。鐵甲將軍。夜遊將軍。推車蟲(綱目)。

推屎蟲(孫氏集效方)矢甲弄丸。

天仙子。天社蟲。俠客。蟬馬。叱同仇。

火乃(和漢藥考)烏殼硬蟲。

外國名詞 Geotrupes laev-
istriatus, Motsch.

基本 屬化生類為甲蟲中之蛭娘。

產地 凡池澤間恒多生焉。

形態 蛭娘形似金龜子。長四

五分。全身黑如漆。有光澤。背有剛

甲。晝伏土中。夜見燈火則飛出。猝

然受驚。則縮脚伏頭。作如死狀。徐

徐仍飛去。

採取 五六月間採捕之。

製法 別錄曰。凡使蛭娘須是

五月五日採取。蒸藏之。臨用去足

火炙。勿置水中令人吐。

用法 恒以焙剉研末。和作丸

散。

性質 鹹寒。有毒。

效能 破癥結。治癰癤。用治驚

癇藥。

主治 小兒驚癇癰癥。腹脹寒

熱。大人癰疾狂陽(本經)手足端

寒。肢滿黃豚。搗丸塞下部。引痔蟲

出。盡水瘰(別錄)。

歷代記述疏證 【唐】甄權
藥性本草論蛭娘曰。治小兒疳蝕。
【唐】陳藏器本草拾遺論蛭娘曰。

燒末和醋傳蜂漏。【宋】日華諸家
本草論蛭娘曰。能墮胎。治疰忤。和
乾薑傳惡瘡。出箭頭。【明】李時珍
本草綱目論蛭娘曰。治大小便不
通。下痢赤白。脫肛。一切痔瘻。丁腫。
附骨疽。瘡癰。癰風。灸瘡。出血不止。
鼻中息肉。小兒軍舌。【明】李士材
本草圖解論蛭娘曰。蛭娘鹹寒。有
毒。主小兒驚癇癰癥。腹脹寒熱。大
人癰疾狂陽。手足端寒。支滿黃豚。
蛭娘稟陰溼之氣。鹹寒。除肝胃大
腸三經邪熱。則諸證自移。古今方
書以之治一切痔瘻。及疔腫疳瘡。
出箭鐵之用。外用易臻厥功。內服
非虛人所宜。非不得已。慎勿輕試。
【清】鄒澍本經疏證論蛭娘曰。蛭
娘喜撲火。且善取蠶為丸。包以土。
推曳而埋之。坎中得母。以是二者
遂謂能息腸胃之火。去其宿滯。而
已。大人癰疾狂易耶。則於小兒驚
癇癰癥。腹脹寒熱。又當作何解。諸
說者謂瘰與癰不甚相遠。瘰之胸
滿口噤。臥不著席。脚攣急。齡齒者。
可大承氣湯。與驚癇癰癥。腹脹寒
熱。亦不甚相遠也。以病患久。暫
之殊。正氣有盛衰之異。故有承氣

與見圖經本草。詳「土常山」條。

【蜜栗子】產地 產金坑中。形態 蜜栗子爲石

類之一種。狀如蛇黃而有刺。有金線縷之色。紫褐亦無名異之類。可供藥用。

主治 金瘡折傷有效。

參攷資料 蜜栗子。丹爐家採作五金匱藥。制三黃(李時珍)

【蜜草】即甘草之古籍別名。典見別錄。詳「甘草」條。

【蜜酒】製法 用沙蜜一斤。糯飯一升。麪麴五兩。熱水五升。同入瓶內。封七日。成酒。尋常以蜜入酒代之。亦良。

主治 風疹風癬。

【蜜暖花】即忍冬藤之古籍別名。典見和藥漢考。詳「忍冬藤」條。

【蜜望】命名 本品蜜蜂望之而喜故名。

古籍別名 天桃(綱目)子名一莽果。望果(綱目拾遺)莽果。

(摩慶志)產地 出粵中。

形態 蜜望爲喬木類之一種。高數丈。二月開花。極繁。夏秋子實

成熟。黃色。其果實可供藥用。性質 甘酸。無毒。

參攷資料 船車北人謂之苦船多嘔吐不食。登岸則已。胃弱人多有之。蜜望果甘酸。益胃。能止之。故飄洋渡海者多購之。其類有

天桃與相類。六七月熟。大如木瓜。味甜。醉以羹魚尤善。凡渡海者食之不嘔。滯。年歲荒。則結實愈多。粵語云。米價高。食天桃。故廣人貴望果而賤天桃。貴之故望之。蜂望其花人望其果也。(趙學敏)

【蜜桶藤】即忍冬藤之古籍別名。典見土宿本草。詳「忍冬藤」條。

【蜜棗】即棗之一種。以蜜糖拌蒸者。詳「大棗」條。

【蜜梧楸】即梧楸子之古籍別名。典見廣記。詳「梧楸子」條。

【蜜結】即伽楠香之味辛辣。嗅之香甜。柔嫩而體質輕者。爲伽楠香之上品。詳「伽楠香」條。

【蜜脾】即龍眼之古籍別名。典見和漢藥考。詳「龍眼」條。

【蜜簡】即柚之古籍別名。典見綱目。詳「柚」條。

【蜜蜂】命名 本品尾有垂絲。因謂之蜂。其能採花釀蜜。故曰蜜蜂。

古籍別名 蠅蜂。西(綱目)外國名詞 Apis chinensis (拉丁)(Bees)(英)ミツバチ(日本)

基本 係節肢動物。昆蟲類膜翅類爲蜜蜂之子。

形態 蜜蜂爲蜂類之一種。有雌蜂。雄蜂。職蜂三種。聚羣而居。雌蜂皆黑色。翅灰色而透明。雌者尾有毒針。以產卵管而兼禦敵之用。職蜂暗褐色。全體皆密生長毛。雌者每羣一頭。體長五分許。通稱蜂王。雄者亦少數。體較雌者爲短。而翅大。但營生殖作用。不事工作。亦稱遊蜂。職蜂最多。爲不完全之

雌蜂。專事營築巢窠。採蜜育兒等。並保護其羣。亦稱工蜂。雌者所產之子。可供藥用。其蜂。蜜。蜜。蠅。詳見各條。

採取 以頭足未成時。狀如白蠅者用。

性質 甘。平。微寒。無毒。

主治 治頭瘋。除蟲毒。補虛羸。傷中。久服令人光澤。好顏色。不老(本經)輕身益氣。治心腹痛。面目黃。大人小兒。腹中五蟲。從口吐者(別錄)

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論蜜蜂子曰。主丹毒。風癰。腹內留熱。利大小便。澀去浮血。下乳汁。婦人帶下病。【明】李時珍本草綱目論蜜蜂子曰。治大風癰疾。

施用宜忌 長黃芩。芍藥。牡蠣。白前。

參攷資料 蜂子涼有毒。須以冬瓜苦黃生姜紫蘇制其毒。食之(大明)蜂子古人以充饌品。故本經別錄著其功效。而聖濟總錄治大風疾。兼用諸蜂子。蓋亦足陽明大陰之藥也(李時珍)蜂

蜂 蜂 蜂

蜂 蜂 蜂

蜂 蜂 蜂

十四畫 蜜

于一撮。共炒爲末。好酒吞十日全愈。**家寶方**

●治一切兒疳。凡小兒患疳疾。不拘何等疳。垂死者。皆效。取龜上焙。蟬乾與之。食患者。但聞其香。不知有腥臭之氣。猶中蠱者。食豆無半。含饀不苦也。有患此症。治之無不效。只須食一二次。即愈。愈後體更肥白。且屢試屢驗。**集聽方**

兒疳初起。用蟬去頭足翅。新瓦焙乾。常與食之。百個病愈。**百草鏡方**

參攷資料 蜚蠊吳普本草載神農云。主婦人癢。堅寒熱。尤爲有理。此物乃血藥。故宜於婦人。**李時珍**

【蜜丁】即瓦楞子之古籍別名。典見綱目。詳「瓦楞子」條。

【蜜父】即梨之古籍別名。典見綱目。詳「梨」條。

【蜜甘】即甘草之古籍別名。典見別錄。詳「甘草」條。

【蜜姑魚】**命名** 本品性喜食蜜。故名。

古籍別名 蜜姑。**綱目拾遺**

產地 出浙江鄞縣山溪間。

形態 蜜姑魚爲鱗類魚屬之一種。其鱗光閃爍。如千片碎金。雜珠顆中。狀隨風散灑。觀之莫不目眩。其肉可供食。與藥用。

性質 甘溫無毒。

主治 生胃津。益肺氣。補血脈。增精髓。去熱除虛。羸壯筋骨。止咳嗽。定喘逆。功同燕窩。蛤蚧。

參攷資料 宜遊筆記。自光溪入四明二十餘里。有蜜巖。峭壁千尋。下臨深溪。穴洞無底。巖巒舊有蜂巢。聚蜂數百萬。其蜜滴下。溪魚食之。故魚味甘絕。曰蜜姑魚。性極喜苔。須縋懸崖下。有水衣。演漾深碧。而細者。剗以爲餌。魚性暴。遇鉤則跳。若卒不可制。而蜜巖下溪水清甚。用粗綆。則恐魚之瞥見。而驚遊也。用細絲。則又恐不足以勝魚。跳宕之力。釣者乃取絲長十餘丈。盤於竿上。遙望見深波中。魚翻翻鼓鬣而至。則取絲徐徐放之。如小兒之送紙鳶者。使得縱其所往。魚入鉤。果一躍數尺。翻波跋浪。橫激溪面。久乃力倦。取之。按此魚最潔。惟食苔。苔寒而蜜溫。得水火既濟之力。大能補土生金。燕窩性清。

【蜜魚律】即枳椇子之古籍別名。典見廣記。詳「枳椇子」條。

【蜜房】即露蜂房之古籍別名。典見和漢藥考。詳「露蜂房」條。

【蜜林檎】即林檎實之味。如蜜者。功用詳「林檎」條。

【蜜果】即無花果之古籍別名。典見和漢藥考。詳「無花果」條。

【蜜炙白前】即白前之處方用名。詳「白前」條。

【蜜炙桂枝】即桂枝用蜜焙炒成者之處方用名。詳「桂枝」條。

【蜜炙桔梗】即桔梗之處方用名。詳「桔梗」條。

【蜜炙耆】即黃耆之用蜜炙者之處方用名。詳「黃耆」條。

一五九〇

【蜜炙馬兜鈴】即馬兜鈴之處方用名。詳「馬兜鈴」條。

【蜜炙款冬】即款冬花之處方用名。詳「款冬花」條。

【蜜炙葶】即生薑用蜜炙成者之處方用名。詳「生薑」條。

【蜜虎】即蜂虎之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「蜂虎」條。

【蜜香】**古籍別名** 木蜜。**內典** 沒香。多香木。阿羅。

產地 出南方諸省。

形態 蜜香爲香木類之一種。樹高丈餘。皮青色。白葉似槐。而長花似橘。而大。子黑色。大如山茱萸。甜酸可食。其木堅韌。而香。乃沉香之類。可供藥用。

性質 辛溫無毒。

主治 去臭。除鬼氣。

歷代記述攷證 **唐** 李珣海藥本草論蜜香曰。辟惡。去鬼邪。尸注心氣。

【蜜香】即沉香之古籍別名。典見南越志。詳「沉香」條。即木香之原名。詳「木香」條。

【蜜香草】即土常山之古籍別名。

腹中之黃。故名。

製法 捕蜘蛛之小者。飼之大。久之復以砂飼大者。數十日後。漸至滿腹通赤。其腹中便有黃。可供藥用。

主治 去翳開聲。

【蜘蛛蛻殼】

主治 蟲牙。綿裹塞之。牙疳。研末傳之。

主治 喜忘。

【蜘蛛網】

歷代記述攻蠱

【唐】蘇恭新修本草論蜘蛛網曰。以經梳貨。七日消落。有驗。【明】李時珍本草綱目論蜘蛛網曰。療瘡毒。止金瘡血出。炒黃研末。酒服。治吐血。

參攷資料

按侯延賞退齋閑錄云。凡人卒暴吐血者。用大蜘蛛網。搓成小團。米飲吞之。一服立止。此乃孫紹先所傳方也。又酉陽雜俎云。裴旻山行。見蜘蛛結網。如正布。引弓射殺。斷其絲數尺。收之。部下有金瘡者。剪方寸貼之。血立止。觀此則蜘蛛網。蓋止血之物也。(李時珍)

【蜘蛛膜】功用與網同。詳該條。

十四畫 蜘蛛

【蜘蛛】即蟬之俗名。詳「蟬」條。

【蜘蛛】即蜘蛛之古籍別名。典見綱目。詳「蜘蛛」條。

【蜚蠊】即蜚蠊之原名。詳「蜚蠊」條。

【蜚蠊】即土蜂之古籍別名。典見本經。詳「土蜂」條。

【蜚蠊】基本 蜚蠊為溼生蟲類之一種。可供藥用。

主治 婦人寒熱。

【蜚蠊】即蜚蠊。詳「蜚蠊」條。

【蜚蠊】命名 本品以有廉蠶氣者為真。故名。

古籍別名 石蠶。盧蠶。負蠶。滑蟲。唐本草。蠶(爾雅)萊螻。蟲香。娘子(綱目)蟬(綱目拾遺)。

外國名詞 Stylopys conu-cina, Hagh, 或 Periplaneta americana L. (拉丁) ニキアリ或アラムシ(日本)

基本 係節肢動物昆蟲類直翅類蜚蠊科。

產地 多生於人家庖廚炊竈間。

形態 蜚蠊為化生蟲類之一種。體形橢圓。色黑褐。有油光。頭小。

隱於前胸下。觸角長如絲。為鞭狀。前後翅皆為膜質。但前翅小而形長。後翅大而為扇狀。尾端有二長二短之小突起。腳側扁。有附節五。大者體長一寸。晝伏夜出。盜食棲於庖廚陰暗諸處。觸之有一種惡臭。其尿尤臭。可供藥用。

採取 二月八月間採之。

性質 鹹寒。有毒。

主治 療血癥。堅寒熱。破積聚。喉咽閉。內寒無子(本經)通利血脈(別錄)。

歷代記述攻蠱

【唐】蘇恭新修本草論蜚蠊曰。食之下氣。

配合應用 ①拔疔。竈上蟬。不拘多少。搗爛敷之。其疔根自出(集驗方)蟬蟲其黃紫色甚臭者。取數個。用患者自吐唾沫。澆口研爛。敷疔。四圍頂上。露孔。使毒氣從孔出一日愈(卿子妙方)治疔瘡。取蟬大者七個。去頭足。澆將砂糖少許。同搗爛。敷疔。四圍。露出頭。晝夜即愈(邵仲達方)又藥性考。搗馬拔刺。搗塗有效。

②解諸疔毒。竈上紅蟬五個。研爛。熱酒沖服。取汗為度(傳信方)

③治紅絲疔。蟬一個。去頭和青糖搗爛。搽上即效(傳信方)

④白火丹。用蟬瓦上焙乾。為末。白滾湯服一二個。立效。兼治疔瘡(葉氏方)

⑤治對口。桂州荔枝肉二三枚。蟬二三個。同搗。如泥。敷露頭。數次即散(活人書方)

⑥治無名腫毒。蟬十個。鹽一撮。同搗爛。敷之。留頭(慈航活人書方)

一五八九

方)

⑦治諸毒惡瘡。蟬搗石灰敷之(嚴氏家藏方)

⑧治痧症。活蟬五個。止去翅。淨在火盆淨瓦上焙乾。為末。紙包安土上。存性。用溼腐皮包一個。滾湯吞下。每日如此。吞五日不可間斷(徐雲生方)

⑨治氣虛中滿。以蟬七個。為末。用地飴饅煎湯。送數服。愈(醫宗彙編方)

⑩治腫脹。蟬一個。焙乾。蘿蔔

十四畫 蜘蛛

蠶蟄人。取置咬處。吸其毒。唐蘇恭新修本草論蜘蛛曰。主蛇毒溫。癰止嘔逆霍亂。宋蘇頌圖經本草論蜘蛛曰。取汁塗蛇傷。燒啖治小兒腹疳。宋日華諸家本草論蜘蛛曰。斑者治瘧疾。疔腫。明李時珍本草綱目論蜘蛛曰。主口喝。脫肛。瘡腫。胡臭。齒齲。

施用宜忌 畏蔓青。雄黃。

參攷資料 別錄言蜘蛛治

癰。張仲景治陰狐疝氣。偏有大小。時時上下者。蜘蛛散主之。蜘蛛十枚。炒焦。桂半兩。爲散。每服八分。日再。或以蜜丸亦通。蘇頌。蜘蛛能制蛇。故治蛇毒。而本條無此。蘇恭。鶴林玉露載蜘蛛能制蜈蚣。以溺射之。節節斷爛。則陶氏言蜘蛛治蜈蚣傷。亦相伏爾。沈括筆談載蛛爲蜂螫。能嚼半梗。磨創而愈。今蛛又能治蜂螫。螫何哉。又劉義慶幽明錄云。張甲與司徒蔡。有親。誤畫寢夢。甲曰。忽暴病心。腹痛脹滿。不得吐下。名乾霍亂。惟用蜘蛛生斷脚。吞之則愈。但人不知。甲某時死矣。誤覺使人驗之。甲果死矣。後用此治乾霍亂。輒驗也。

按此說雖怪。正合唐註。治嘔逆霍亂之文。當亦不謬。蓋蜘蛛服之。能令人利也。李時珍。凡五色者。及大身有刺。毛生者。并薄小者。並不入藥。雷斅。蜘蛛布網。其絲有繞。其類甚多。大小顏色不一。爾雅但分蜘蛛。草土及蟪蛄四種而已。蜘蛛嚼人甚毒。往往見於典籍。按劇禹錫傳信方云。判官張延賞爲斑蜘蛛咬。頭上一宿有二赤脈。繞項下。至心前頭面腫如數斗。幾至不救。一人以大藍汁入麝香。雄黃。取一蛛投入。隨化爲水。遂以點咬處。兩日悉愈。又云。貞元十年。崔從質員外。言有人被蜘蛛咬腹。大如孕婦。有僧教飲羊乳數日而平。又李絳兵部手集云。蜘蛛咬人。遍身成瘡者。飲好酒至醉。則蟲於肉中。似小米自出也。劉郁西域記云。赤水兒城。有蟲如蜘蛛。毒中人。則煩渴。飲水立死。惟飲葡萄酒至醉。吐則解。此與李絳所言蜘蛛毒人。飲酒至醉則愈之意同。蓋亦蜘蛛也。鄭曉吾學編云。西域賽蓋地方。夏秋間。草生小黑蜘蛛。甚毒。嚼爲痛聲。徹地。土人誦咒。以薄荷枝拂之。

或以羊肝遍擦其體。經一日夜。痛方止。愈後皮脫如蛇。牛馬被傷。輒死也。元履長慶集云。巴中蜘蛛大。而毒甚。身連數寸。踣長數倍。竹木被網皆死。中人瘡。痛痒倍常。惟以苦酒調雄黃塗之。仍用鼠耳蟲食其絲。則愈。不急救之。毒及心能死人也。段成式酉陽雜俎云。深山蜘蛛。有大如車輪者。能食人物。若此數說。皆不可不知。淮南萬畢術言。赤斑蜘蛛。食以猪肪。百日。殺以塗布。雨不能濡。殺以塗足。可覆水上。抱朴子言。蜘蛛水馬。合馮夷水仙丸服。可居水中。皆方士幻誕之談。不足信也。李時珍。蜘蛛抱蛋。即蜘蛛香之古籍別名。典見植物學大辭典詳。蜘蛛香。條。

【蜘蛛香】 命名 本品根鬚狀如蜘蛛。而氣極芳香。故名。又其根鬚團結似卵狀。遂有蜘蛛抱蛋之稱。

古籍別名 蜘蛛抱蛋。飛天蜈蚣。哈薩喇。一靑。一葉。植物學大辭典。葉蘭。日本。

外國名詞 Aspidistra elatior, Bl. (拉丁) ハラン パラ (日本)

基本 係百合科蜘蛛抱蛋屬。藥用其根。

產地 四川茂縣。及江西新建。昌贛州等處。均有出。

形態 蜘蛛抱蛋香爲香草類。之多年生常綠草本。葉扁大。長橢圓形。兩端尖。葉脈平行。葉柄長。其葉分狹葉與闊葉二種。狹葉直立。闊葉尖。頭傾斜。斜月開花。花被暗紫色。單生於短花莖之頂上。花後結實。青色。如拇指大。其根色青黑。如卵狀。周圍密根。纏結。

性質 辛溫。無毒。

主治 辟瘴。疫中惡。邪精鬼氣。尸疰。

參攷資料 蜘蛛香。出蜀西茂州松潘山中。草根也。黑色。有粗鬚。狀如蜘蛛。及薺本。草。氣味芳香。彼人亦重之。或云。貓喜食之。李時珍。

【蜘蛛絲】 即蜘蛛網。詳。蜘蛛網。條。

【蜘蛛黃】 原名 蟻蜇黃。命名 本品即蜘蛛

十四畫 蒼 蒿 蓄 蓋 蒼

蒼耳根三兩半。烏梅肉五箇。連鬚葱三根。酒二鍾。煎一鍾。熱服取汗。
(邵真人方)

治齒風動痛。蒼耳一握。以漿水煮入鹽含漱。(外臺祕要方)

治經喉風病。蒼耳根一把。老薑一塊。研汁入酒服。(聖濟總錄方)

治赤目生痛作痛。道人頭末二兩。乳香一錢。每用一錢。燒烟噓鼻。(聖濟總錄方)

治鼻衄不止。蒼耳莖葉搗汁一小盞服。(聖惠方)

治五痔下血。五月五日。採蒼耳莖葉搗爲末。水服方寸匕。甚效。
(千金方)

治赤白下痢。用蒼耳草不拘多少。洗淨。以水煮爛。去滓。入蜜。用武火熬成膏。每服一二匙。白湯下。
(醫方摘玄方)

治產後諸病。蒼耳葉搗絞汁。溫服半中盞。日三四服。(聖惠方)

治誤吞銅錢。用蒼耳頭一把。以水一升。浸水中十餘度。飲水愈。
(肘後方)

治花蜘蛛毒咬人。與毒蛇無

異。用野繖絲。即道人頭搗汁一盞。服仍以渣傳之。(摘玄方)
施用宜忌 忌豬肉、馬肉、米泔、伏磁砂。

【蒼耳蠹蟲】 本品即蒼耳草梗中狀如小蠶之蠹蟲。

古籍別名 麻蟲。(本草綱目)

採取 見梗上有大蛀眼者。以刀截去兩端。不蛀梗多。取之線縛掛簷下。其蟲在內。經年不死。用時取出三條。同用之。

主治 疔腫、惡毒、燒存性。研末油調塗之。即效。或以麻油浸死。收貯。每用一二枚。搗傳。即時毒散。大有神效。

參攷資料 蒼耳治疔腫、腫毒。故蟲亦與之同功。古方不見用。近時方法每用之。(李時珍)

古籍別名 冰片。

【蒼龍腦】 (本草綱目)

基本 爲龍腦之一種。

主治 風瘡野鷄入膏煎良。不可點眼。傷人。

基本 本品爲鴿之黑羽者之糞便。

主治 傳蛇蟲咬毒。
【蒼礬石】即特生礬石之古籍別名。典見別錄。詳「特生礬石」條。

【蒼蠅翅】即小青草之別名。詳「金鎖銀關」條。

【蒼鷹】即鷹之原名。詳「鷹」條。

【蒼雀】 命名 本品常在蒿間故名。

古籍別名 草雀。

外國名詞 Embetia pers-onata T. (拉丁) (Terninck's Japanese bunting) (英) アオジ或アラジ或ラシトド (日本)

基本 係脊椎動物鳥類鳴禽類雀科。

產地 出山林原野間。

形態 蒼雀爲原禽類之一種。其體小於黃雀。頭部橄欖綠色。頭黑色。嘴亦黑。背部赤褐有黑條紋。翼赤褐有暗綠條紋。體下概黃色。散布多數之暗色點。夏棲山林。遊原野。營巢於地。或草叢中。其肉可供藥用。

性質 甘。溫。無毒。

主治 食之益陽道。補精髓。

一五八六

【蒿雀腦】 主治 塗凍瘡。手足不皸。

【蒿豬】即蒿豬之古籍別名。典見唐本草。詳「蒿豬」條。

【蒿】即羊蹄之古籍別名。典見本經。詳「羊蹄」條。

【蓋棗王】即枸杞子之處方用名。詳「枸杞子」條。

【蓋農果】即防葵之古籍別名。典見吳普本草。詳「防葵」條。

古籍別名 鷄草。羽衣草。

外國名詞 Achillea sibirica, Ledeb. (拉丁) ノユギリサウハ、トロモサウ (日本)

基本 係菊科。薔屬之質。

產地 多在山野間。

形態 著爲溼草類之多年生草本。體二三尺。葉互生。細長。作羽狀分裂。其形與鋸相類。秋月莖頭着花。白色。或淡紅色。作頭狀花序。甚小。周圍之花舌狀。花冠中部之花筒狀。花冠其莖生處如諸作叢。莖多者一株有五十餘莖。莖形皆直立。古人用爲占筮。其葉可供藥用。

採取 八九月採實。日乾。

腐。雖不受病。惟蒼耳子皆能治之。
(盧鵬飛) 蒼耳子。治鼻淵鼻痔。
斷不可缺。能使清陽之氣上行。巔
頂也。(沈金整)

【蒼耳子油】

基本 本品係
用蒼耳子榨取

之油。

主治 瘋疾。

【蒼耳花】

主治 白痢。頑癢。

【蒼耳莖葉】

製法 雷斅曰。

凡採得去心。取
黃精以竹刀細切拌之。蒸從已至
亥時出去。黃精陰乾用。

性質 苦。辛。微寒。有小毒。

主治 中風傷寒。頭痛。大風癰

癰。頭風。濕痺。毒在骨髓。腰膝風毒。

夏月採曝爲末。水服一二七。冬月

酒服。或爲丸。每服二三十丸。日三

服。滿百病出。如癰疥。成汁出。或斑

駁。駁甲錯。皮起皮落。則肌如凝脂。

令人省睡。除諸毒。殺蟲疔。溼腫。

久服益耳目聰明。輕身強志。

配合應用 萬應膏。治一切

癰疽發背。無頭惡瘡。腫毒疔。癰一

切風痒。腫瘡。杖瘡。牙疼。喉痺。五月

五日。採蒼耳根莖。數擔。洗淨曬萎。
細到。以大鍋五口。入水煮爛。以篩
濾去粗滓。布絹再濾。復入淨鍋。武
火煎滾。文火熬稠。攪成膏。以新罐
貯封。每以數貼。即愈。牙疼。即敷牙
上。喉痺。敷舌上。或噙化二三次。即
效。每日用酒服一匙。極有效。(集
簡方)

①治一切風毒。并殺三蟲。腸痔。
能進食。若病胃脹滿。心悶發熱。即
宜服之。五月五日午時。附地刈取
蒼耳葉。洗曝。搗下篩。每服方寸匕。
酒或漿水下。日二夜三。若覺吐逆。
則以蜜丸服。準計方寸匕數也。風
輕者。日二服。若身體作粟。或麻豆
出。此爲風毒出也。可以針刺潰。去
黃汁乃止。七月七月九。亦可採
用。

②治一切風氣。蒼耳嫩葉一石。
切。和麥麩五升。作塊於蒿艾中。罨
二十日。成麩。取米一斗。炊作飯。看
冷。暖入麩三升。釀之。封二七日。成
熟。後每日空心暖服。神驗。封此酒
可兩重布。不得令密。密則溢。出忌
馬肉猪肉。(孟詵食療方)

③治諸風頭暈。蒼耳葉曬乾爲

末。每服一錢。酒調下。日三服。若吐
則以蜜丸。梧子大。每服二十丸。十
日全好矣。(楊氏經驗方)

④治毒攻手足。腫痛欲斷。蒼耳
搗汁漬之。并以澤傳之。立效。春用
心冬用子。(千金方)

⑤治卒中水毒。初覺頭目微痛。
惡寒。骨節強急。日暮暴劇。手足逆
冷。三日則蠱蝕下部。六七日膿潰。
食至五臟殺人。也。搗常思草。絞汁
服一二升。并以綿染導其下部也。
(肘後方)

⑥治毒蛇溪毒。沙虱射工等所
傷。口噴眼黑。手足強直。毒攻腹內
成塊。遠巡不救。用蒼耳嫩苗一握。
取汁和酒溫灌之。以澤厚傳傷處。
(勝金方)

⑦疫病不染。五月五日午時。多
採蒼耳嫩葉。陰乾。收之。臨時爲末。
冷水服二錢。或水煎。舉家皆服。能
辟邪惡。(千金方)

⑧治風瘙癢疹。身痒不止。用蒼
耳莖葉子等分。爲末。每服二錢。豆
淋酒調下。(聖惠方)

⑨治面上黑斑。蒼耳葉。梧子末。
食後米飲調服。一錢。一月愈。(摘

女方)

①治赤白汗斑。蒼耳嫩葉尖和
青鹽。搗爛。五六月間。擦之。五七次
效。(摘玄方)

②治大風癰疾。用嫩蒼耳。荷葉
等分。爲末。每服二錢。溫酒下。日二
服。(袖珍方)

③又用蒼耳葉。爲末。以
大楓子油和丸。梧子大。每服三四
十丸。以茶湯下。日二服。(乾坤生
意方)

④又方。五月五日。或六月六
日。五更帶露。蒼耳草。搗取汁。熬作
錠子。服半斤。鯉魚一尾。剖開。不去
肚腸。入藥一錠。線縫。以酒二盞。慢
火煮熱。令喫。不過三五箇魚。即愈
也。忌鹽一百日。

⑤治卒得惡瘡。蒼耳。桃皮。作屑
納瘡中。

⑥治反花惡瘡。有肉如飯粒。破
之。血出。隨生反出。用蒼耳葉。搗汁
服三合。并塗之。日二上。(聖濟總
錄方)

⑦治一切丁腫。危困者。用蒼耳
根葉。搗和小兒尿。絞汁。冷服一升。
日三服。拔根甚驗。(孟詵方)

⑧又用
蒼耳根苗。燒灰。和醋。塗之。乾再
上。不十次。即拔根出。(養生方)

腦戶之風寒。爲頭風病之要藥。而無辛香走竄升泄過度耗散正氣之慮。以視細辛羌活等味。功用近似。而儒將風流。迴與鬚髻翕張。戟手怒目者。異其態度。卽例以川芎白芷等物。之以氣爲勝者。猶難同日而語。但和緩有餘。恐未易尅日奏功耳。斗門方謂婦人血風攻腦。頭旋猝倒。不省人事者。用蒼耳草嫩心。陰乾爲末。酒服其效。此味善通頂門達腦。能走督脈也。頭案頭旋猝倒。不省人事。確是氣血上升。激動腦經之病。斗門方能知是血風攻腦。其善悟誠不可及。但此是內動之風。正惟風陽陡動。所以猝然眩暈。便能傾仆。治法止有潛陽息風。抑之下降。則氣火平而風自息。腦神經不受震憾。而其病可愈。斷不可雜以一味動風之藥。助其升騰。爲虎傅翼。蒼耳治風。亦是疏泄外風。非安靜鎮定之質。對於此病。亦在禁例。况又助之以酒。爲害後當如何。則論病是用藥。非仍是古人續命湯之謬見。須知所謂通頂門達腦善走督脈。皆升騰以泄外來寒風之法。真是毫釐千里。

其誤甚大。雖然。二千年來治內風病者。幾於無一不誤。於斗門何尤。頭極佩其血風攻腦四字。頗似識得內風上攻爲病。乃數百年醫家未知之奧義。故備論之。亦春秋責備賢者之意也。

配合應用 ①治久癩不瘥。蒼耳子或根莖亦可。焙研末。酒糊丸。梧子大。每酒服三十九丸。日二服。生者搗汁服亦可。(朱氏集驗方)

②治大腹水腫。小便不利。蒼耳子灰。葶藶末等分。每服二錢。水下。日二服。(千金良方)

③治風溼癱痺。一切風氣。蒼耳子三兩。炒爲末。以水一升。半煎取七合。去滓啖之。(食醫心鏡方)

④治牙齦痛腫。蒼耳子五升。水一斗。煮取五升。熱含之。冷卽吐去。吐後復含。不過一劑。癰莖葉亦可。或入鹽少許。(千金翼方)

⑤治鼻淵流涕。蒼耳子卽繖絲草子。炒研爲末。每白湯點服一二錢。(證治要訣方)

⑥治眼目昏暗。蒼耳實一升。爲末。白米半升。作粥。日食之。(普濟方)

⑦治嗜酒不已。枳中蒼耳子七枚。燒灰。投酒中飲之。卽不嗜。(陳藏器方)

用量 錢半至二錢。
施用宜忌 凡無風熱之邪者。禁用。忌豬肉。馬肉。米泔。

著名方劑 蒼耳散。治鼻流濁涕不止。名曰鼻淵。(陳無擇方) 蒼耳子(炒)二錢半。辛夷(仁牛兩)白芷一兩。薄荷五分。右爲末。每服二錢。用葱茶清。食後調服。

參攷資料 ①蒼耳藥久服去風熱有效。最忌豬肉及風邪。犯之則遍身發出赤丹也。按蘇沈良方云。蒼耳根苗葉實。皆洗濯陰乾。燒灰。湯淋取濃汁。泥連兩竈煉之。灰汁耗。卽旋取傍釜中熱灰湯。益之一日夜不絕火。乃旋得霜乾。甕瓶收之。每日早晚酒服二錢。補煖去風。駐顏尤治皮膚風。令人膚革清淨。每澡沐入少許尤佳。宜州學昌從諫服此十餘年。至七八十。紅潤輕健。皆此藥力。斗門方云。婦人血風攻腦。頭旋。悶絕忽死。倒地不知人事者。用喝起草嫩心。陰乾爲末。以酒服一大錢。其功甚效。此物善

遷項門連腦。蓋卽蒼耳也。(李時珍) ②詩人謂之卷耳。爾雅謂之蒼耳。廣雅謂之葇耳。皆以實得名也。陸機詩疏云。其實正如婦人耳。瑞今或謂之耳瑞草。鄭康成謂是白胡荽。幽州人呼爲爵耳。博物志云。洛中有人驅羊入蜀。胡荽子多刺。黏緩羊毛。遂至中國。故名羊負來。俗呼爲道人頭。(蘇頌) ③其葉形如葇麻。又如茄。故有葇耳及野茄諸名。其味滑如葵。故名地葵。輿地廣記。詩人思夫賦。卷耳之草。故名常思菜。張揖廣雅作常葇。亦通。(李時珍) ④今處處有之。陸氏詩疏云。其葉青白。似胡荽。白華細莖。莖生可煮爲茹滑而少味。四月中生子。正如婦人耳。瑞郭璞云。形如風耳。叢生如盤。今之所有皆類此。但不作莖生。(蘇頌) ⑤按此周憲王救荒本草云。蒼耳葉青白。類黏糊菜葉。秋間結實。比葉橫短小。而多刺。嫩苗煉熟。水浸淘拌。食可救飢。其子炒去皮。研爲麵。可作燒餅食。亦可熬油點燈。(李時珍) ⑥凡人風溼內淫。氣血阻滯。則上而頭腦下而足膝內而骨髓外而皮

朮。文化年間。有種出中國。稱嫩根者。下品也。所謂老根者。根形不一。切之則生白脂。嫩根則無白脂。並不潤澤。中國種嫩根雖生。宿根不朽。日本產莖是。日本種之老根。尤多山中自生。其根至二年。旁生嫩根。此時宿根漸變細長。莖葉俱抽。自嫩根。經三年後。宿根遂次第枯。此皆老根也。採之者往往以嫩根宿根並採混售。冀圖厚利。不論老嫩。均以甲州郡內所產為勝。白朮之大者。名雲頭朮。川州產也。別有一種。雖係川州之種。而實出自三好。名三好朮。此則無老根嫩根之別。(手板發蒙)

【蒼朮莖苗】

主治 去水止

自汗作飲甚香

【蒼石】即特生磐石之古籍別名

典見別錄詳特生磐石之條

【蒼耳子】

原名 蒼耳子

命名 本品葉形如

蒼耳。故有蒼耳之稱。即爾雅所謂

蒼耳入藥有用其實者。故曰蒼耳

子。

古籍別名 地葵子。胡葇子。(本經)

常思。菜子。蕤子。羊真來子。

十四畫 蒼

(弘景)卷耳子。(詩經)爵耳子。耳瑤。(詩疏)緒耳子。喝起草子。野茄。繖絲草子。(綱目)道人頭。(圖經)進賢菜子。(記事珠)瑤草子。隻刺。胡葇子。野落蘇。繖絲菜子。吐叱古个里。(和漢藥考)

基本 屬菊科。為雄蒼耳之子

實。

產地 各處多產之。陳仁山藥

物生產詳云。蒼耳子廣東各屬均

有出。但以北江石潭。清遠。為多出

西江亦有出

形陸 蒼耳為一年生草本。溫

帶地方多有之。自生原野間。莖高

四五尺。葉互生。為卵圓形。末端帶

尖。邊緣有缺刻及鋸齒。具葉柄頗

似茄莖。葉莖生有短毛。夏日梢頭

及莖端俱開小花。白而帶綠色。雌

雄單性。雌花隱於綠苞之底。雄花

則密生末端。花後結莢長四分許。

外面黃白色。兩端稍尖。被以無數

之刺。熟則刺愈堅。剛能鉤著人之

衣服。

採取 秋季實熟時採之。

製法 大明曰。入藥炒熟。搗去

刺用。或酒拌蒸過用。

性質 甘溫。有小毒。

效能 輕清發散。祛風化熱。用

作發汗藥。及為鎮痙藥。

主治 風寒頭痛。風溼周痺。四

肢拘攣痛。惡肉死肌。(本經)膝痛

深毒。久服益氣。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥

性本草論蒼耳子曰。治肝熱明目。

【宋】大明諸家本草論蒼耳子曰。

治一切風氣。填髓。暖腰脚。治癰

瘡。疥。及瘰癧。【明】李時珍本草綱

目論蒼耳子曰。炒香浸酒服。去風

補益。【明】經希雅本草經疏論蒼

耳子曰。蒼耳。蒼耳也。味甘溫。而別

錄益之以苦。當是無毒。葉味苦辛。

微寒。有小毒。苦以燥溼。甘以和血。

溫則通暢。春氣發生而升。故主風

寒頭痛。風溼周痺。四肢拘攣。惡肉

死肌。膝痛。溪毒也。祛風療溼之藥。

食療聖惠千金外臺祕要諸方咸

堪選用。【唐】黃宮繡本草求真論

蒼耳子曰。蒼耳子味苦而甘。氣溫

無毒。凡人風溼內浮。氣血阻滯。則

上而腦頂下而足膝。內而骨髓。外

而皮膚。靡不病症悉形。而致症見

疥癬。通身周痺。四肢拘攣。骨節癱

痺。項嶺風痛。疔蟲溼。惡肉死肌。

疔腫疔漏。腰重膝屈。按此苦能燥

溼。溫能通活。為祛風療溼之聖藥。

或作膏。或作湯浴。自然風除溼祛。

血活氣行。而症即愈。但此通頂連

腦下達督脈。服此最忌豬肉及風

邪觸犯。則遍身發出赤丹。而致病

亦增甚耳。【清】張隱菴本草崇原

論蒼耳子曰。蒼耳本經名蒼耳。賅

莖葉而言也。今時用實名蒼耳子。

子內仁。氣味甘溫。外多毛刺。故

有小毒。花白實黃。裏陽明燥金之

氣。金能制風。故主治風寒頭痛。謂

頭受風邪。為寒為痛也。燥能勝溼。

故主風溼周痺。四肢拘攣。痛謂

風溼之邪。傷周身血脈。而為痺。淫

於四肢。而為拘攣疼痛也。大周痺

則周身血脈不和。周痺可治。則惡

肉死肌亦可治也。四肢拘攣痛可

治。則膝痛亦可治也。久服則風溼

外散。經脈流通。故益氣。

近人學說 張山雷曰。蒼耳

子溫而疏達。流利關節。宜通脈絡。

偏及孔竅肌膚。而不偏於燥烈。乃

主治風寒溼三氣痺著之最有力

而馴良者。又獨能上達顛頂。疏通

而馴良者。又獨能上達顛頂。疏通

而馴良者。又獨能上達顛頂。疏通

而馴良者。又獨能上達顛頂。疏通

而馴良者。又獨能上達顛頂。疏通

而馴良者。又獨能上達顛頂。疏通

而馴良者。又獨能上達顛頂。疏通

而馴良者。又獨能上達顛頂。疏通

而馴良者。又獨能上達顛頂。疏通

而馴良者。又獨能上達顛頂。疏通

而馴良者。又獨能上達顛頂。疏通

本經止言朮。未分言蒼朮。只緣陶隱居言朮有兩種。自此人多貴白者。往往將蒼朮置而不用。如古方平胃散之類。蒼朮爲最要藥。功效尤速。殊不詳本草原無白朮之名。嵇康曰。聞道人遺言。餌朮黃精。令人久壽。亦無白字。用宜兩審。(寇宗奭)①脾精不禁。小便漏濁淋不止。腰背酸疼。宜用蒼朮以斂脾精。精生於穀。故也。弘景曰。白朮少膏。可作丸散。赤朮多膏。可作煎用。昔劉涓子採取其精丸之名。守中金丸。可作長生。(楊士瀛)②服食多單餌朮。或合白茯苓。或合石菖蒲。並搗末。但日水服。晚再進。久久如飴糖。酒調飲之。更善。今茅山所造朮煎。是此法也。陶隱居言取其精而丸之。今乃是膏煎。恐非真也。(蘇頌)③梁虞肩吾答陶隱居。資朮煎啓云。綠葉抽條。紫花標色。百邪外禦。六腑內充。山精見書。華神在錄。木焚火謝。盡採擷之難。啓日移申。窮淋漓之劑。又謝朮蒸啓云。味重金漿。芳馨玉液。足使坐致延生。伏深銘感。又葛洪抱朴子內篇

云。南陽文氏。漢末逃難。壺山中。饑困欲死。有人教之食朮。遂不饑。數十年乃還鄉里。顏色更少。氣力轉勝。故朮一名山精。神農本草經所謂必欲長生。常服山精是也。(唐慎微)④按吐納經云。紫微夫人朮序云。吾察草木之勝。速益於己者。並不及朮之多驗也。可以長生。久視遠。而更靈。山林隱逸。得服朮者。五嶽比肩。又神仙傳云。陳子皇得餌朮要方。其妻姜氏得痼疾。服之自愈。顏色氣力。如二十時也。李時珍謹按。已上諸說。皆似蒼朮。不獨白朮。今服食家亦呼蒼朮爲仙朮。故皆列於蒼朮之後。李時珍⑤按中國二朮。顯然兩種。日本以二朮爲一物。宿根如老薑。蒼色者爲蒼朮。嫩根白色者爲白朮。然藥肆皆誤以宿根爲白朮。以嫩根爲蒼朮。或蒼白相混。不可不擇。其苗高二二尺。一朵三葉。末作鋸齒。而有毛。四五月開花。青色。結子大如小豆。蓋生山中者。葉硬有微刺。人家栽種者。葉軟無刺。其葉及根形香氣。中日相似。獨花色爲異。且白朮根形。不似鼓槌。唯似雲頭朮耳。出

備後。三原者良。伊豫。今治次之。武州。江戶。藝州。廣島。與仙臺。又次之。(和漢藥考)⑥蒼朮春生苗。莖多白毛。體二三尺。葉似匕頭。而莖青綠色。有細鋸齒。秋莖端開白花。似小菊花。或有紫赤色者。根如老薑。晚秋苗葉枯。冬日採根。(古方藥品考)⑦中日所產之蒼朮。其形狀微有不同。然亦僅根莖有大小耳。其上部皆留有餘莖。外面爲黃褐色。有皺紋。被以白色之塵粉。內作黃白色。略似生薑。質頗堅。氣芳香。味甘苦。(和漢藥考)⑧蒼朮藏貯日久。則外面生白色之塵粉。試以顯微鏡檢視之。則見爲結晶體。已故下山博士嘗將蒼朮蒸餾。得白色之結晶體。水不能溶解。酒精伊打始溶解之。與樟腦或第二酒精 $C_{10}H_{16}O$ 相類似。惟樟腦之熔點點須百九十五度。沸騰點爲二百十度。相差祇十五度。該結晶則不然。六十二度已熔解。必二百七十一二度始沸騰。(藥學雜誌)⑨中國運來之朮。有蒼白二種。而蒼朮爲勝。形似老薑。皮茶褐色。肉黃赤色。味苦辛。氣芳烈。而多膏。割貯

則生白衣。是爲上品。其輕虛少膏者。下品也。白朮形如蒼朮。而脊小。作極皮褐色。味甘微苦。氣芳香。所謂雲頭朮是也。日本亦有數種。一種爲佐渡蒼朮。形似中國產。而體重。多膏。割貯便生白衣。味苦辛微。甘氣芳烈。此爲佳品。出佐州。一種爲唐種蒼朮。亦似中國產。而氣味不厚。是爲中品。一種爲和根白朮。亦呼計豆里白朮。是採蒼朮嫩根。刮去粗皮。製之。非白朮也。出和州。丹州。信州。奧州。又有唐種白朮。形味皆與中國產相似。乃享保中。攜漢種栽成者。出和州。本經云。朮一名山薺。卽蒼朮也。詳見圖經。李時珍曰。張仲景辟一切惡氣。用赤朮。亦卽蒼朮也。由是觀之。張仲景用蒼朮明矣。(古方藥品考)⑩中國產之蒼朮。氣味俱厚。爲上品。日本產次之。蘇頌曰。古方所用之朮。皆白朮也。李時珍曰。古方二朮通用。後人始有蒼白之分。今日本藥舖所稱日本白朮。實皆蒼朮。非白朮也。(日用藥品考)⑪朮有蒼白之別。今藥舖以老根爲蒼朮。嫩根爲白朮。其實不論老嫩。皆是蒼

●治面黃食少。男婦面無血色。

食少嗜臥。蒼朮一斤。熟地黃半斤。

乾薑炮。冬一兩。春秋七錢。夏五錢。

爲末。糊丸。梧子大。每溫水下五十丸。(濟生拔萃方)

●治小兒癖疾。蒼朮四兩爲末。

羊肝一具。竹刀批開。散朮末線縛入砂鍋。煮熟。搗作丸服。(生生編方)

●治男子婦人。因食生熟諸物。

留滯腸胃。遂至生蟲。久則好食生米。否則終日不樂。至憔悴癯黃。不

思飲食。以害其生。用蒼朮米泔水。

浸一夜。剉焙爲末。蒸餅丸。梧子大。

每服五十丸。食前來飲下。日三服。(經驗方)

●治腹中虛冷。不能飲食。食輒

不消。羸弱生病。朮二斤。麴一斤。炒

爲末。蜜丸。梧子大。每服三十丸。米

湯下。日三服。大冷加乾薑三兩。腹

痛加當歸三兩。羸弱加甘草二兩。(肘後方)

●治脾濕水瀉注下。困弱無力。

水穀不化。腹脹甚者。用蒼朮二兩。

白芍藥一兩。黃芩半兩。淡桂二錢。

每服一兩水一盞半。煎一盞溫服。

脈頭微痛。去芍藥。加防風二兩。

(保命集方)

●治暑月暴瀉。壯脾溫胃。飲食

所傷。麴朮丸。用神麴炒蒼朮。米泔

浸一夜。焙等分爲末。糊丸。梧子大。

每服三五丸。米飲下。(和劑局方)

●治發瀉久痢。椒朮丹。用蒼朮

二兩。川椒一兩爲末。醋糊丸。梧子

大。每服二十丸。食前溫水下。惡痢

久者加桂。(保命集方)

●治脾溼下血。蒼朮二兩。地榆

一兩。分作二服。水二盞煎一盞。食

前溫服。久痢虛滑。以此下桃花丸

(保命集方)

●治腸風下血。蒼朮不拘多少。

以皂角按濁汁。浸一宿。麴乾焙研

爲末。麴糊丸。如梧子大。每服五十

丸。空心米飲下。日三服。(婦人良方)

三服。(普濟方)

●治青盲雀目。用蒼朮四兩。泔

浸一夜。切焙研末。每服三錢。豬肝

三兩。批開。搽藥在內。扎定入粟米

一合水。一碗。砂鍋煮熟。熏眼。臨臥

食肝飲汁。不拘大人小兒皆治。又

方。不計時。月久近。用蒼朮二兩。泔

浸焙。搗爲末。每服一錢。以好羊子

肝一斤。竹刀切破。搽藥在內。麻扎

以粟米泔煮熟。待冷食之。以愈爲

度。(聖惠方)

●治眼目昏濇。蒼朮半斤。泔浸

七日。去皮切焙。木賊各二兩。爲末。

每服一錢。茶酒任下。(聖惠方)

●治嬰兒目濇不開。或出血。蒼

朮二錢。入豬膽中。扎裹。將藥氣熏

眼後。更嚼取汁與服妙。(幼幼新書方)

●治風牙腫痛。蒼朮鹽水浸過。

燒存性。研末。揩牙去風熱。(普濟方)

●治臍蟲怪病。腹中如鐵石。臍

中水出。旋變作蟲。行遶身。痒難

忍。撥掃不盡。用蒼朮濃煎湯浴之。

仍以蒼朮末入麝香少許。水調服。

(夏子益奇疾方)

●治臍蟲怪病。腹中如鐵石。臍

中水出。旋變作蟲。行遶身。痒難

忍。撥掃不盡。用蒼朮濃煎湯浴之。

仍以蒼朮末入麝香少許。水調服。

(夏子益奇疾方)

●治臍蟲怪病。腹中如鐵石。臍

中水出。旋變作蟲。行遶身。痒難

忍。撥掃不盡。用蒼朮濃煎湯浴之。

仍以蒼朮末入麝香少許。水調服。

(夏子益奇疾方)

●治臍蟲怪病。腹中如鐵石。臍

中水出。旋變作蟲。行遶身。痒難

忍。撥掃不盡。用蒼朮濃煎湯浴之。

仍以蒼朮末入麝香少許。水調服。

(夏子益奇疾方)

●治臍蟲怪病。腹中如鐵石。臍

中水出。旋變作蟲。行遶身。痒難

忍。撥掃不盡。用蒼朮濃煎湯浴之。

仍以蒼朮末入麝香少許。水調服。

(夏子益奇疾方)

●治臍蟲怪病。腹中如鐵石。臍

中水出。旋變作蟲。行遶身。痒難

忍。撥掃不盡。用蒼朮濃煎湯浴之。

仍以蒼朮末入麝香少許。水調服。

(夏子益奇疾方)

●治臍蟲怪病。腹中如鐵石。臍

中水出。旋變作蟲。行遶身。痒難

忍。撥掃不盡。用蒼朮濃煎湯浴之。

仍以蒼朮末入麝香少許。水調服。

(夏子益奇疾方)

●治臍蟲怪病。腹中如鐵石。臍

中水出。旋變作蟲。行遶身。痒難

忍。撥掃不盡。用蒼朮濃煎湯浴之。

仍以蒼朮末入麝香少許。水調服。

(夏子益奇疾方)

●治臍蟲怪病。腹中如鐵石。臍

中水出。旋變作蟲。行遶身。痒難

忍。撥掃不盡。用蒼朮濃煎湯浴之。

仍以蒼朮末入麝香少許。水調服。

(夏子益奇疾方)

●治臍蟲怪病。腹中如鐵石。臍

中水出。旋變作蟲。行遶身。痒難

忍。撥掃不盡。用蒼朮濃煎湯浴之。

仍以蒼朮末入麝香少許。水調服。

(夏子益奇疾方)

●治臍蟲怪病。腹中如鐵石。臍

中水出。旋變作蟲。行遶身。痒難

忍。撥掃不盡。用蒼朮濃煎湯浴之。

仍以蒼朮末入麝香少許。水調服。

(夏子益奇疾方)

●治臍蟲怪病。腹中如鐵石。臍

中水出。旋變作蟲。行遶身。痒難

忍。撥掃不盡。用蒼朮濃煎湯浴之。

仍以蒼朮末入麝香少許。水調服。

(夏子益奇疾方)

●治臍蟲怪病。腹中如鐵石。臍

中水出。旋變作蟲。行遶身。痒難

忍。撥掃不盡。用蒼朮濃煎湯浴之。

仍以蒼朮末入麝香少許。水調服。

(夏子益奇疾方)

●治臍蟲怪病。腹中如鐵石。臍

中水出。旋變作蟲。行遶身。痒難

忍。撥掃不盡。用蒼朮濃煎湯浴之。

仍以蒼朮末入麝香少許。水調服。

(夏子益奇疾方)

●治臍蟲怪病。腹中如鐵石。臍

中水出。旋變作蟲。行遶身。痒難

忍。撥掃不盡。用蒼朮濃煎湯浴之。

仍以蒼朮末入麝香少許。水調服。

(夏子益奇疾方)

●治臍蟲怪病。腹中如鐵石。臍

中水出。旋變作蟲。行遶身。痒難

忍。撥掃不盡。用蒼朮濃煎湯浴之。

仍以蒼朮末入麝香少許。水調服。

(夏子益奇疾方)

●治臍蟲怪病。腹中如鐵石。臍

中水出。旋變作蟲。行遶身。痒難

忍。撥掃不盡。用蒼朮濃煎湯浴之。

仍以蒼朮末入麝香少許。水調服。

(夏子益奇疾方)

●治臍蟲怪病。腹中如鐵石。臍

中水出。旋變作蟲。行遶身。痒難

忍。撥掃不盡。用蒼朮濃煎湯浴之。

仍以蒼朮末入麝香少許。水調服。

(夏子益奇疾方)

●治臍蟲怪病。腹中如鐵石。臍

中水出。旋變作蟲。行遶身。痒難

忍。撥掃不盡。用蒼朮濃煎湯浴之。

仍以蒼朮末入麝香少許。水調服。

(夏子益奇疾方)

●治臍蟲怪病。腹中如鐵石。臍

中水出。旋變作蟲。行遶身。痒難

忍。撥掃不盡。用蒼朮濃煎湯浴之。

仍以蒼朮末入麝香少許。水調服。

(夏子益奇疾方)

●治臍蟲怪病。腹中如鐵石。臍

中水出。旋變作蟲。行遶身。痒難

忍。撥掃不盡。用蒼朮濃煎湯浴之。

仍以蒼朮末入麝香少許。水調服。

(夏子益奇疾方)

●治臍蟲怪病。腹中如鐵石。臍

中水出。旋變作蟲。行遶身。痒難

忍。撥掃不盡。用蒼朮濃煎湯浴之。

仍以蒼朮末入麝香少許。水調服。

(夏子益奇疾方)

●治臍蟲怪病。腹中如鐵石。臍

中水出。旋變作蟲。行遶身。痒難

忍。撥掃不盡。用蒼朮濃煎湯浴之。

仍以蒼朮末入麝香少許。水調服。

(夏子益奇疾方)

●治臍蟲怪病。腹中如鐵石。臍

中水出。旋變作蟲。行遶身。痒難

忍。撥掃不盡。用蒼朮濃煎湯浴之。

仍以蒼朮末入麝香少許。水調服。

(夏子益奇疾方)

●治臍蟲怪病。腹中如鐵石。臍

中水出。旋變作蟲。行遶身。痒難

忍。撥掃不盡。用蒼朮濃煎湯浴之。

仍以蒼朮末入麝香少許。水調服。

(夏子益奇疾方)

●治臍蟲怪病。腹中如鐵石。臍

中水出。旋變作蟲。行遶身。痒難

忍。撥掃不盡。用蒼朮濃煎湯浴之。

仍以蒼朮末入麝香少許。水調服。

(夏子益奇疾方)

●治臍蟲怪病。腹中如鐵石。臍

中水出。旋變作蟲。行遶身。痒難

忍。撥掃不盡。用蒼朮濃煎湯浴之。

仍以蒼朮末入麝香少許。水調服。

(夏子益奇疾方)

●治臍蟲怪病。腹中如鐵石。臍

中水出。旋變作蟲。行遶身。痒難

忍。撥掃不盡。用蒼朮濃煎湯浴之。

仍以蒼朮末入麝香少許。水調服。

(夏子益奇疾方)

●治臍蟲怪病。腹中如鐵石。臍

中水出。旋變作蟲。行遶身。痒難

忍。撥掃不盡。用蒼朮濃煎湯浴之。

仍以蒼朮末入麝香少許。水調服。

(夏子益奇疾方)

●治臍蟲怪病。腹中如鐵石。臍

中水出。旋變作蟲。行遶身。痒難

忍。撥掃不盡。用蒼朮濃煎湯浴之。

仍以蒼朮末入麝香少許。水調服。

(夏子益奇疾方)

●治臍蟲怪病。腹中如鐵石。臍

中水出。旋變作蟲。行遶身。痒難

忍。撥掃不盡。用蒼朮濃煎湯浴之。

仍以蒼朮末入麝香少許。水調服。

(夏子益奇疾方)

●治臍蟲怪病。腹中如鐵石。臍

中水出。旋變作蟲。行遶身。痒難

忍。撥掃不盡。用蒼朮濃煎湯浴之。

仍以蒼朮末入麝香少許。水調服。

(夏子益奇疾方)

●治臍蟲怪病。腹中如鐵石。臍

中水出。旋變作蟲。行遶身。痒難

忍。撥掃不盡。用蒼朮濃煎湯浴之。

仍以蒼朮末入麝香少許。水調服。

(夏子益奇疾方)

●治臍蟲怪病。腹中如鐵石。臍

中水出。旋變作蟲。行遶身。痒難

忍。撥掃不盡。用蒼朮濃煎湯浴之。

仍以蒼朮末入麝香少許。水調服。

(夏子益奇疾方)

●治臍蟲怪病。腹中如鐵石。臍

中水出。旋變作蟲。行遶身。痒難

忍。撥掃不盡。用蒼朮濃煎湯浴之。

仍以蒼朮末入麝香少許。水調服。

(夏子益奇疾方)

●治臍蟲怪病。腹中如鐵石。臍

中水出。旋變作蟲。行遶身。痒難

忍。撥掃不盡。用蒼朮濃煎湯浴之。

仍以蒼朮末入麝香少許。水調服。

(夏子益奇疾方)

●治臍蟲怪病。腹中如鐵石。臍

中水出。旋變作蟲。行遶身。痒難

忍。撥掃不盡。用蒼朮濃煎湯浴之。

仍以蒼朮末入麝香少許。水調服。

(夏子益奇疾方)

●治臍蟲怪病。腹中如鐵石。臍

中水出。旋變作蟲。行遶身。痒難

忍。撥掃不盡。用蒼朮濃煎湯浴之。

仍以蒼朮末入麝香少許。水調服。

(夏子益奇疾方)

●治臍蟲怪病。腹中如鐵石。臍

中水出。旋變作蟲。行遶身。痒難

忍。撥掃不盡。用蒼朮濃煎湯浴之。

仍以蒼朮末入麝香少許。水調服。

(夏子益奇疾方)

●治臍蟲怪病。腹中如鐵石。臍

中水出。旋變作蟲。行遶身。痒難

忍。撥掃不盡。用蒼朮濃煎湯浴之。

仍以蒼朮末入麝香少許。水調服。

(夏子益奇疾方)

●治臍蟲怪病。腹中如鐵石。臍

中水出。旋變作蟲。行遶身。痒難

忍。撥掃不盡。用蒼朮濃煎湯浴之。

仍以蒼朮末入麝香少許。水調服。

(夏子益奇疾方)

●治臍蟲怪病。腹中如鐵石。臍

中水出。旋變作蟲。行遶身。痒難

忍。撥掃不盡。用蒼朮濃煎湯浴之。

丸。別用朮末六兩。甘草末一兩。并和作湯點之。吞丸尤妙。忌桃李雀蛤及三白諸血。(經驗方)

●蒼朮膏。除風溼。健脾胃。變白駐顏。補虛損。大有功效。蒼朮新者。刮去皮。薄切。米泔水浸二日。一日一換。取出。以井華水浸過二寸。春秋五日。夏三日。冬七日。漉出。以生絹袋盛之。放在一半原水中。揉洗津液出。扭乾。將渣又搗爛。袋盛於一半原水中。揉至汁盡為度。將汁入大砂鍋中。慢火熬成膏。每一斤入白蜜四兩。熬二炷香。每膏一斤入水澄白茯苓末半斤。攪勻。瓶收。每服三匙。侵早臨臥各一服。以溫酒送下。忌醋及酸物。桃李雀蛤。菴菜青魚等物。(鄧才筆雜興方)

●蒼朮膏。治脾經溼氣。少食足腫。無力。傷食。酒色過度。勞逸有傷。骨熱。用鮮白蒼朮二十斤。浸刮去粗皮。曬切。以米泔浸一宿。取出。同溪水一石。大砂鍋慢火煎半乾。去渣。再入石南葉三斤。刷去紅衣。枳實子一斤。川當歸半斤。甘草四兩。切同煎黃色。漉去渣。再煎如稀粥。乃入白蜜三斤。熬成膏。每服三五

錢。空心好酒調服。(吳球活人心統方)

●蒼朮丸。清上實下。兼治內外障眼。茅山蒼朮洗刮淨一斤。分作四分。用酒醋糯米童尿各浸三日。一日一換。取出洗搗。曬焙。以黑脂麻同炒。香共為研末。酒煮麵糊丸。梧子大。每空心白湯下五十丸。(瑞竹堂方)

●八制蒼朮丸。疎風順氣。養腎治腰脚。溼氣痺痛。用蒼朮一斤。洗刮淨。分作四分。用酒醋米泔鹽水各浸三日。曬乾。又分作四分。用川椒紅茴香補骨脂黑牽牛各一兩同炒。香揀去不用。只取朮研末。醋糊丸。梧子大。每服五十丸。空心鹽酒送下。五十歲後加沉香末一兩。(永類鈴方)

●蒼朮散。治風溼。常服壯筋骨。明目。蒼朮一斤。粟米泔浸過。竹刀刮去皮。半斤以無灰酒浸。半斤以童子小便浸。春五夏三秋七冬十日。取出淨地上。搗一坑。炭火煉赤。去炭。將浸藥酒傾入坑內。却放朮在中。以瓦器蓋定。泥封一宿。取出為末。每服一錢。空心溫酒或鹽湯

下。

●六制蒼朮散。治下元虛損。偏墜。羣痛。茅山蒼朮洗刮六斤。分作六分。一斤倉米泔浸二日。炒。一斤酒浸二日。炒。一斤青鹽半斤。炒。黃去鹽。一斤小茴香四兩。炒。黃去茴。一斤大茴香四兩。炒。黃去茴。一斤用桑椹子汁浸二日。炒。取朮為末。每服三錢。空心溫酒下。(萬表積善堂方)

●固真丹。燥溼養脾。助胃固真。茅山蒼朮洗刮淨一斤。分作四分。一分青鹽一兩。炒。一分川椒一兩。炒。一分川棟子一兩。炒。一分小茴香。破故紙各一兩。炒。並揀朮研末。酒煮麵糊丸。梧子大。每空心米飲下五十丸。又乾坤生意平補固真丹。治元臟久虛。遺精白濁。婦人赤白帶下。崩漏。金州蒼朮洗刮淨一斤。分作四分。一分川椒一兩。炒。一分破故紙一兩。炒。一分茴香。食鹽各一兩。炒。一分川棟肉一兩。炒。取淨朮為末。入白茯苓末二兩。酒洗當歸末二兩。酒煮麵糊丸。梧子大。每空心鹽酒下五十丸。(瑞竹堂方)

●固元丹。治元臟久虛。遺精白濁。五淋。及小腸膀胱疝氣。婦人赤白帶下。血崩。便血等病。以小便頻數為效。好蒼朮洗刮淨一斤。分作四分。一分小茴香。食鹽各一兩。同炒。一分川椒。補骨脂各一兩。同炒。一分川烏頭。川棟子肉各一兩。同炒。一分用醇醋老酒各半斤。同煮乾。焙。連同炒藥。通為末。用酒煮麵糊丸。梧子大。每服五十丸。男以溫酒。女以醋湯。空心下。此高司法祕方也。(百一選方)

●少陽丹。蒼朮米泔浸半日。刮皮。曬乾。為末。一斤地骨皮溫水洗淨。去心。曬研一斤熟棗。搗二十斤入盆。盆揉爛。細袋壓汁。和末如糊。傾入盤內。日曬夜露。採日精月華。待乾研末。煉蜜和丸。赤小豆大。每服二十丸。無灰酒下。日三服。一年變髮。返黑。三年面如童子。(劉松石保壽堂方)

●補脾滋腎。生精強骨。真仙方也。蒼朮去皮五斤。為末。米泔水漂澄。取底。用脂麻二升半。去殼研爛。絹袋濾去渣。澄漿并。曬乾。每服三錢。米湯或酒。空心調服。(孫氏集效方)

治脾虛脹妙絕。稱爲仙朮。張山雷曰。本經別錄。皆無蒼朮白朮之分。而所言朮之主治。風寒溼痺云云。多屬蒼朮之功。陶隱居等。且明言求以茅山爲勝。是古人所用。卽蒼朮也。但今既以蒼白二者分用。則蒼朮芳香。尤爲雄厚。祛風逐溼。固以氣味見長。不比白朮沖和。尙在多守少走之例。專以補土爲功。也。輕用七八分。至一錢五分。如其溼濁壅塞。舌苔垢厚者。可用至三錢。茅山朮味苦氣雄。芳香辟穢。徹上徹下。除溼發汗最良。滋飲開痰。胸痞滿悶。奇驗。舉脾家之清氣。助消化。則可加餐。開蒙蔽之陰霾。振精神而醒倦。勝四時不正之氣。解山嵐瘴癘之疴。清頭目之昏蒙。健腰膝之重墜。脹重滿。瀉利腸辟。辟穢爲襲積也。如屬溼濁。皆是專司。霍亂時行。夏秋痧閉。垢膩舌苔。無非主將。脚腫軟弱。痿痺胛流注。瘡瘍疥癬。同治。又曰。蒼朮氣味雄厚。較白朮愈猛。能徹上徹下。燥溼而宣化。痰飲芳香辟穢。勝四時不正之氣。故時疫之病。多用之。最能驅除穢濁。惡心氣。陰霾

十四畫 蒼

之域。久曠之屋。宜焚此物。而後居人。亦此意也。凡溼困脾陽。倦怠嗜臥。肢體痿軟。胸膈滿悶。甚至頭脹而舌濁厚膩者。非茅朮芳香猛烈。不能開泄。而痰飲瀾漫。亦非此不化。夏秋之交。暑溼交蒸。溫病寒熱頭脹如裹。或胸痞嘔噦。皆須茅朮。藿香佩蘭葉等。香燥醒脾。其應如響。而脾鬱熱溼。或爲臌脹。或爲腫滿。或爲瀉泄。癰痢。或下流而足重。跗腫。或積滯而一便不利。及溼熱鬱蒸。發爲瘡瘍流注。或寒溼互結。發爲陰疽痲痛。但有舌濁不渴。見證。茅朮一味。最爲必需之品。是合內外各病。皆有大用者。而庸俗每畏其燥烈。而不敢用。亦祇見其識證不清耳。蒼朮求以產茅山者爲佳。故有茅朮之名。氣濃厚。其力尤弘。今所通用。皆茅朮也。

- 配合應用** ① 朮爲陽草。氣勝黃精。除溼祛寒。疎風辟惡。其功能也。單餌則延年輕身。不飢兼濟。則觀所從何道。故同人參茯苓白芍藥甘草橘皮蓮肉縮砂則健脾開胃。消飲食。爲壯脾胃之要劑。調中之正法。
- ② 同藿香。橘皮。茯苓。人參。木瓜。豬苓。澤瀉。縮砂。則治霍亂吐瀉轉筋。
- ③ 同乾葛。防風。茯苓。炙甘草。車前子。豬苓。澤瀉。則治溼勝作泄。若雷奔。
- ④ 同秦朮。草薢。木瓜。薏苡仁。桑寄生。石斛。黃耆。地黃。石膏。蒲枝。甘草。晚蠶沙。則治一切痛痺。及關節不利。熱者去桂枝。加黃芩。
- ⑤ 得黃藥。牛膝。木瓜。石斛。能健步潛行。
- ⑥ 得苦參。牡蠣。治小兒胃家溼熱。飲食不生。肌肉。
- ⑦ 若人參。芍藥。木瓜。薏苡。茯苓。桑白皮。赤小豆。車前。橘皮。佐以豬苓。澤瀉。能治一切水腫。日重則倍。人參。夜重則加地黃。芍藥。俱與朮倍。
- ⑧ 若枳實。橘皮。砂仁。半夏。人參。則除心腹脹痛。消宿食。開胃去痰。涎除傷食。寒熱及泄瀉。
- ⑨ 同人參。橘紅。白茯苓。木瓜。薏香。治反胃吐逆。因於寒。則加生薑。因於熱。則加竹茹。枇杷葉。逆水蘆根。
- ⑩ 若黃耆。生地黃。佐以黃藥。治一切腫瘡溼毒。或注足脛成瘡。久不愈。作丸餌良。
- ⑪ 倍茯苓。修事。如經驗方。能烏鬚駐顏。
- ⑫ 同麥門冬。石斛。黃藥。白芍藥。木瓜。薏苡仁。五味子。爲治癰要藥。
- ⑬ 同生薑。藿香。檳榔。能治山嵐瘴氣。
- ⑭ 同四物湯。麥門冬。荊芥。防風。地榆。能治腸風下血。
- ⑮ 同雄羊肝。治雀盲。
- ⑯ 同補骨脂。川椒。茴香。青鹽。川棟子。黃藥。治疝。
- ⑰ 同熟地。桑椹。修事。採日精月華。乾則蜜丸。日三服。可變白。
- ⑱ 爲末。和芝麻研爛。入水攪勻。絞汁。濾淨。曝乾。每三錢。空心酒服。能滋脾胃。
- ⑲ 服朮法。烏髮。駐顏色。壯筋骨。明耳目。除風氣。潤肌膚。久服令人輕健。若朮不計多少。採泔水浸三日。逐日換水。取出刮去黑皮。切片。曝乾。慢火炒黃。細搗爲末。每一斤。用燕過白茯苓末半斤。煉蜜和丸。梧子大。空心臥時熱水下十五。

alcohol。放置數日後。則化為柔
 輭之白色針狀結晶。依青井氏言
 其含量之多寡。與蒼朮品質之良
 否。有重大之關係。最上品約含七
 乃至五%。下品之含量則極微。復
 以此白色針狀結晶溶之於酒精
 後。更加水至生白濁乃止。如是靜
 置時。則生白色長針狀有光輝之
 結晶。因其原植物為 *Atractylis*。
 遂命名為「*Atractylol*」。後經
 Ueno 氏之化學的試驗。定其化
 學式為 $C_{14}H_{20}O$ 。至 1903 年
 Gadamer u. T. Ame-nomiya
 二氏以精細的化學的實驗。改其
 化學式為 $C_{15}H_{22}O$ 。並因其不
 能成 Ether 及 Urethan。謂其
 屬於第三級之 Alcohol。又因
 其如合蟻酸加熱時。則易分解其
 水分化為屬於有二個二重結合
 Sequeiverpen γ 「*Atractylon*」
 故推想為其屬於雙環性之化合
 物。至 1924 年 S. Takegi u. G.
 Hongo 二氏在割溫蒸餾蒼朮
 揮發油中。又得一種性質甚合安
 定之成分。命名為「*Atractylon*」
 用水精精製時。得白色矩形版狀

之結晶。易溶於溫水精。難溶於冷
 水精。具蒼朮特有之香氣。熔點
 42。沸騰點 131—132。如接觸
 其少量於用濃鹽酸浸潤過之松
 木片時。則呈極新鮮之紫色。又加
Atractylon 之少量於其加過
 Vanilin, Heriotropin, An-
 isaldehyd 之濃鹽中時。則呈極
 美麗之櫻實紅色。而此等反應恰
 如顯草中之 *Keisyalcohol*
 之呈色反應。氏又定其化學式為
 $C_{14}H_{20}O$ 。由是觀之。蒼朮中
 有效成分為 *Atractylol* ($C_{14}H_{20}O$)
 及 *Atractylon* ($C_{14}H_{20}O$) 二者明矣。

近人學說 ●胡九功曰。蒼朮

朮功能相仿。皆能健脾燥溼。惟強
 胃燥溼之功。則蒼朮為勝。補脾甘
 潤之力。則白朮較優。蒼朮能升陽
 解鬱。白朮能補氣生血。蒼朮辛燥
 無滯滯之患。白朮無汗能發有汗
 能止。總之。蒼朮辛烈燥溼力足。白
 朮甘潤。補益功多。●虞公曰。舊俗
 於端午日。除例置蒲酒艾虎外。並
 購蒼朮白芷焚燒室內。謂可辟疫
 驅邪。殺滅蛇蟲。無論貧富。靡不舉

行。相沿成習。牢不可破。其意殆與
 西醫之免疫法相仿。雖然蛇蟲疾
 病之來。甯有定時。對於平日之清
 潔衛生。漫不講求。而欲於平安無
 事之一日。為此迂遠之預防。不亦
 愚哉。入夏以後。天氣酷熱。蟲類繁
 生。病毒流布。霍亂瘧痢諸傳染症
 繼起疊出。故預防之道。應以夏初
 為始。深秋為終。庶或近是。焚燒藥
 品。為滌蕩空氣之一法。與西醫之
 蒸氣消毒藥。品消毒。其義略同。蓋
 空氣初本純潔。自動植礦物發生
 之氣。與人工造出之氣。混和於空
 中。而空氣始不潔。空氣不潔。始影
 響於接觸物者。其害甚大。如風瘴
 之氣。病房臥室之氣。動植物腐敗
 之氣。廢井廢坑之氣。花木之氣。均
 足以敗壞生理。而發生當然之疾
 病。惟藥品之氣。能補救之。綠藥品
 之氣。之影響於接觸物者。其效亦
 偉。故焚燒蒼朮白芷之氣。能辟除
 空氣之穢惡。確有功效也。竊考蒼
 朮之性味。本草註云。為除邪氣之
 上品。又曰。辟一切風。瘴邪惡鬼氣。
 陰溼之處。焚之更佳。白芷芳香辛
 燥。祛風氣。除穢溼。能解砒毒。蛇傷。

通竅辟惡。夫所謂邪惡鬼氣者。非
 真有邪惡鬼氣之一物。實即空氣
 中劇烈之病毒也。陰溼穢溼者。即
 陽光不到之處。水分太濃。微生物
 之出產地也。蒼朮白芷。具此特性。
 且價廉易得。不妨預為購置。設遇
 時疫流行之際。藉此以消弭病毒。
 詎不美善。並可摻入大黃。降香。雄
 黃。砒石等。定以限制。將室內門戶
 緊閉。煨燒若干時。俟煙消焰滅。方
 可入內居住。則實省事簡。未始不
 可於消毒法上。別創一格。願醫藥
 界其研究之。●賈九如曰。蒼朮味
 辛。主散性溫。而燥。燥可去溼。專入
 脾胃。主治風寒溼痺。山嵐瘴氣。皮
 膚水腫。皆辛烈逐邪之功也。統治
 三部之溼。若溼在上焦。易生溼痰。
 以此燥溼行痰。溼在中焦。滯氣作
 瀉。以此寬中健脾。溼在下部。足膝
 痠軟。以此同黃柏治痿。能令足膝
 有力。取其辛散氣雄用之。散邪發
 汗。極其暢快。合六神散。通解春夏
 溫熱病。佐紫葛解肌湯。表散癰疾
 初起。若熱病汗下後。虛熱不解。以
 此加入白虎湯。再解之一服。如神。
 汗止身涼。經仲淳用此一味為末。

寒少陰篇附子湯。治身體疼。手足寒。骨節痛。不煩。不重。亦用白朮。蓋澤流關節云。骨節痛。則末有不氣。渥者。矧風溼二者。必挾寒始成痺。不然。則否。素問之旨。可驗也。或問理中丸。以吐多去朮。乃五苓散。諸苓散。茯苓澤瀉湯。偏有吐而用朮。以下多而還用朮。乃桂枝附子去桂枝。加白朮湯。偏以大便硬而用朮。其義何居。夫亦當察其所因也。金匱要略。嘔吐篇云。先嘔卻渴者。此爲欲解。先渴卻嘔者。爲水停心下。此屬飲家。今云中風發熱六七日不解而煩。有表裏證。渴欲飲水。入水則吐者。名曰水逆。五苓散主之。曰嘔吐而病在膈上。後思水者。解急與之思水者。豬苓散主之。曰胃反吐而渴欲飲水者。茯苓澤瀉湯主之。三證皆有渴。皆欲飲水。而理中丸條。則曰霍亂頭痛發熱。身疼痛。熱多欲飲水者。五苓散主之。寒多不欲水者。理中丸主之。夫熱多欲水而用五苓中。仍有朮。寒多不欲水而用理中。亦不離乎朮。惟因吐多而去之。可見嘔吐之於朮。渴是一大關鍵。必持是定其用舍。

不然。同爲霍亂證。何以五苓散下不曰吐多去朮耶。卽理中丸下。亦云渴欲得水者。加朮可驗也。雖然。用朮治渴。爲嘔吐者言之耳。朮究非治渴之物也。如桂枝附子去桂。加白朮湯。曰傷寒八九日。風溼相搏。身體疼痛。不能自轉側。不嘔不渴。脈浮虛而濡者。桂枝附子湯主之。若其人大便鞭。小便自利者。去桂。加白朮湯主之。獨提不嘔不渴二者。與嘔而渴者。恰相對照。柯韻伯曰。風寒溼三氣雜至。合而成痺。故身體煩疼。不能轉側。病只在表者。用桂枝附子湯。驅風散寒。三氣自平。營衛自和。若其人又兼裏氣不和。大便反鞭。小便反利。此非胃家實。乃脾家虛也。蓋脾家實腐穢。當自去。此溼流肌肉。因脾土失職。不能制水。故大便反見燥化。不嘔不渴。是上焦之化源清。故小便便利。耳病本在脾。法當培土以勝溼。故以白朮代桂枝。夫脾虛則溼勝而不運。溼流於內。能使大便不實。溼流於表。更能使大便不濡。脾健則能制水。水在內。能使下輪勝。而大便實。水在外。能使還入胃中。

而大便濡。此理中丸所以下多選用朮。而桂枝附子湯。以大便鞭。小便自利。而將朮易桂也。白朮治眩。非治眩也。治痰與水耳。有痰與水。何以能使人眩。蓋眩者神之動。神依於心。心惡水。水盛則心神搖曳。爲眩。譬如人在舟中。能發眩也。雖然。人在舟中。未必盡眩。不在舟中。未必不眩。所以眩證。不必盡用朮。用朮之飲證。水證。亦未必盡眩。夫亦各因乎其人耳。飲證水證之兼眩者。在傷寒論有心下逆滿。氣上沖胸。起則頭眩之苓桂朮甘湯證。有汗出不解。仍發熱。心下悸。頭眩身瞤動。振振欲擗地之真武湯證。在金匱要略。有胸脇支滿目眩之苓桂朮甘湯證。有支飲眩冒之澤瀉湯證。有瘦人臍下悸。吐涎沫而顛眩之五苓散證。其有飲有水。不眩而用朮者。則指不勝屈。其有飲眩而不用朮者。亦多。則係證與朮有忌耳。卽如卒嘔吐。心下痞。膈間有水。眩悸者。小半夏加茯苓湯主之。則以心下痞。故正與理中丸下註云。腹滿者去朮。同一理也。

pectilis 之根莖。大小不一。往往分歧如球根狀。上端多有殘莖。有副根或癭痕等處。皆隆凸不平。外面呈黃暗褐色。有皺紋。其破碎面不平坦。有橙黃色巨大之斑點。其質甚脆。以顯微鏡檢查時。其外部有褐色之袍層。其皮部則甚厚。約等於木部之半徑。在此皮部之外方。則有少數之圓形大油室 (Oil Inaume) 含有黃色之油點。依須田氏之檢查。謂此油室白朮多於蒼朮。故氏主張曰。如果此油室內含有之揮發油爲朮之有效成分。則白朮之效力當勝於蒼朮也。朮有一種特異之芳香性臭氣。並且如細切蒼朮。放置後。常在其表面上。發生一種微細之白色粉末狀物質。從來中醫常以蒼朮發。生此種物質之多寡。判斷其良否。而細檢此物質。則爲多數之細而柔軟之結晶。且具有特異之香氣。故 Shinoyama u. Shirano 氏遂得蒼朮搗碎。盛入瓶中。付以冷卻器。通以水蒸氣。蒸餾氣之得。有同樣臭氣之淡褐黃色之揮發油。謂其係一種 Sesquiterpen。

疸者脾胃虛而滯熱滯也。如上諸病莫不由風寒滯而成。尤有除此三邪之功。故能祛其所致之疾也。止汗除熱消食者。滯熱盛則自汗。滯邪客則發熱。滯去而脾胃燥。燥則食自消。汗自止。熱自除也。又主大風在面者。尤氣芳烈而悍。純陽之物也。風為陽邪。發於陽部。故主之也。風眩頭痛目淚出者。陽虛則風客之而眩。痰厥則頭痛。風熱壅則目淚出也。消痰水逐皮間風水結腫。除心下急痛及霍亂吐下不止者。滯客於胃則滯而生痰。客於脾則生水。脾虛滯勝則為水腫。滯客中焦則心下急滿。脾胃俱虛則中焦不治而滯邪客之。則為霍亂吐下不止也。利腰膝間血者。血屬陰。滯為陰邪。下流客之。使腰膝血滯而不得通利。滯去則諸證無不愈矣。益津液。緩胃消穀。嗜食者。滯去則胃強。而津液自生。寒滯散則胃自緩。邪去而脾胃健。則消穀而嗜食矣。煎餌久服。輕身延年。不飢者。尤為陽藥。故善除陰滯。滯去則脾胃之氣旺。陽主氣。氣盛則身輕。脾主四肢。滯去則脾健。健則

四肢利。故能涉險負重也。仙經云。氣滿不思食。是以延年而不飢也。【清】黃宮繡本草求真論蒼朮曰。蒼朮甘苦辛烈。氣溫無毒。雖有升陽散鬱發汗除滯燥痰辟惡治腫之功。然甘味少而辛苦重。不似白朮性稟中和。直固清陽中氣之為妙耳。故同香附則為散鬱而氣平。同黃柏則能治下部滯熱。同大棗則能治脇下飲滯。同二陳加白朮升柴。則可以治脾滯下流。腸風帶濁。然必稟體肥盛多滯者始宜。若形瘦多火切忌。至云服能輕身長生。不過因其滯去之謂。豈真能入仙境之地哉。出茅山堅小。有硃砂點者良。糯米泔浸焙乾。同芝麻炒。以制其燥。防風地榆為使。【清】張隱菴本草原論蒼朮曰。白朮性優。蒼朮性劣。凡欲補脾。則用白朮。凡欲運脾。則用蒼朮。欲補運相兼。則相兼而用。如補多運少。則白朮多而蒼朮少。運多補少。則蒼朮多而白朮少。品雖有二。實則一也。本經未分蒼白。而仲祖傷寒方中。皆用白朮。金匱方中。又用赤朮。至陶宏景別錄。則分而為二。須知赤白

之分。始於仲祖。非宏景始分之也。赤朮即是蒼朮。其功用與白朮略同。故仍以本經朮之主治為本。但白朮味甘。蒼朮兼苦。白朮止汗。蒼朮發汗。故止汗二字。節去不錄。後人謂蒼朮之味苦。其實蒼朮之味甘而微苦。【清】楊時泰本草述鈞元論朮曰。朮之用。補中益氣。力優在白。除滯快氣。能專於蒼。所謂祛邪之功。勝而益陰之效。虧者當以坐著。不得概蔽之白。至於燥腎閉氣。又宜坐白。不能混及於蒼。凡病脾土虛者。無論滯邪之有無。白朮皆所急需。但不宜於胃有實熱者耳。【清】鄒澍本經疏證論蒼朮曰。朮氣溫味甘苦。而辛甘能補中。苦能降泄。辛能升散。於人身脾與胃。皆嘗稼穡作甘之德。脾主升舉清陽。胃主通降濁陰。皆屬土而畏滯。朮之為物。開花於初夏。結實於伏時。偏於溼氣潮漫之際。顯其有猷。有為。確可知其入脾胃。能內固中氣。外禦溼侮矣。風寒溼痺死肌癰疽。不得盡謂脾病。而以朮為主劑者。則以滯為脾所主。滯能為患。固屬脾氣不治一也。脾主肌肉。介在

皮毛筋骨中。痹與癰病。在肌肉內死肌及疽病。在肌肉外。旁病則當取中二也。筋骨皮毛。均非駐滯之所。惟肌肉間為可駐滯三也。知此。則凡痺死肌癰疽之係乎風寒溼痺者。皆朮主之矣。仲景治風寒溼痺方。多有不用朮者。則用朮者。當必有故矣。痺論風寒溼三氣雜至。合而成痺。其風氣勝者為行痺。寒氣勝者為痛痺。溼氣勝者為著痺。曰朮之效。於風勝溼勝者為最宜。寒勝者為差。減何以知之。蓋風勝必煩。溼勝必重。檢金匱要略中治痺諸方。其用朮者。非兼煩必兼重。如麻黃加朮湯下云。身煩疼。防己黃芪湯下云。身重。桂枝附子湯去桂加白朮湯下云。身體疼煩。甘草附子湯下云。骨節煩疼。掣痛。或身微腫。甘乾朮朮湯下云。腹重如帶。五千錢。桂枝芍藥知母湯下云。肢節疼痛。脚腫如脫。附近效方。朮附湯下云。頭重。其他若麻黃杏仁薏苡甘草湯。烏頭湯。抵當烏頭桂枝湯。大烏頭煎等方。何嘗不治痛治痺。絕不用朮。雖然謂朮功擅於風與溼。則可謂於寒有所忌。則不可傷

州、福建是也。品質以廣西產者爲最佳。貴州、福建產者次之。至於四川所產者，又其次也。故四川地方栽培蒼朮之人，日見其少。廣西其產出之品質良好，得利豐厚，故栽培蒼朮者，日增一日。將來吾國蒼朮中之利益，必爲所掌握矣。種類無可區別，惟依栽培之早晚而分之。爲早植種晚植種之二種。早植種較晚植種爲劣，故栽培蒼朮，宜取廣西之晚植種爲佳。⑤治地擇定砂質之壤土，而後耕起土塊使之細碎，乃作高畦，畦間二尺五寸至三尺，長短不拘，畦面耙平，均待其栽種可也。⑥期節，分早晚二種。早植種於春季二三月之交，從事栽種。晚植種於夏秋七八月之交，栽植之可也。⑦栽種，取蒼朮之根劈破之，而後插植於畦上。插植之後，上覆以細土少許，並輕壓之爲要。⑧施肥，肥料以人糞尿爲主。他若堆肥等，則不宜也。若施與之，反妨其生長。施肥次數，約可四次。第一次在栽種後十餘日時施之。第二次在除草後施之。第三次在中耕後施之。第四次在未次除草

後施之。如是則於其生長大有利益也。⑨除草，除草可不限定次數，又不宜過期而行。蓋或時期未至，雜草蔓生，若不刈除，其生長已過於蒼朮，而蒼朮爲之枯死矣。故不可過期而行。其次數亦不可拘定也。⑩中耕，栽種後五六十日時行之，自種至收施行一次可也。當行中耕之際，不可失度。若耕失其度，則有害於蒼朮。⑪收穫，早種自二三月栽種至十一月間採取。晚種自七八月栽種至翌年三四月收穫。收穫之法，用短柄之小耙，於其株之周圍漸漸掬起，而後用手拔起之。乃去其莖葉，留其根，置於日光中曬乾之。再用水製之方箱或桶，藏於其內，並密閉其蓋，置於乾燥處。如是貯藏，不論何時取用，則與初無異也。⑫計算，每畝收量，佳者可達七八百斤，次者四五百斤，最下者一二百斤。價格之高下，隨品質之良否而定。其市價又無定總之，每畝之利約可得數十元。採取，每年二三月八月九月採根曝乾。

製法 大明曰：凡使蒼朮，以米

泔浸一宿入藥。寇宗奭曰：蒼朮性烈，須米泔浸洗二日，去上粗皮，用李時珍曰：蒼朮性燥，故以糯米泔浸去其油，切片焙乾用。亦有用脂麻同炒以制其燥者。

性質 苦溫無毒。

效能 發汗燥濕，升陽解鬱，用作健胃藥，及利水與解熱藥。

主治 風寒溼痺，死肌痲疽，作煎餅久服，輕身延年（本經）主頭痛，消痰水，逐皮間風水，結腫，除心下急滿，及霍亂吐下不止，暖胃消穀，嗜食（別錄）。

張仲景之發明 朮之一味，經張仲景之實驗，認爲「主利水也，故能治小便不利，旁治身煩，疼，痰飲，失精眩冒，下利，喜睡」等症。

歷代記述攷證 【南北朝】陶弘景本草集註論蒼朮曰：除惡氣，弭災沴。【唐】甄權藥性本草論蒼朮曰：蒼朮主大風癰痺，心腹脹痛，水腫脹滿，除寒熱，止嘔逆，下泄冷痢。【宋】大明曰：華諸家本草論蒼朮曰：治筋骨軟弱，痲痺氣塊，婦人冷氣，經凝，山嵐瘴氣，溫瘧。【金】張

元素珍珠囊論蒼朮曰：明目，暖水臟。【元】李東垣用藥法象論蒼朮曰：除溼發汗，健胃安脾，治痿要藥。【元】朱震亨本草衍義補遺論蒼朮曰：散風益氣，總解諸鬱。【明】李時珍本草綱目論蒼朮曰：治溼痰，留飲，或挾瘀血成窠囊，及脾溼下流，濁瀝帶下，清瀉腸風。【明】李士材本草圖解論蒼朮曰：蒼朮甘而辛，烈性溫而燥，入脾胃二經，發汗而去風寒，溼下氣而消痰，食水開鬱，有補功，腫脹爲要藥，化一切積塊，除諸病吐瀉，善逐鬼邪，能弭災沴，寬中發汗，其功勝於白朮，補中除溼，其力不及白朮，大抵卑監之士，宜與白朮以培之，敦阜之土，宜與蒼朮以平之。【明】繆希雍本草經疏論蒼朮曰：蒼朮稟初夏之氣，以生，其味苦，其氣溫，無毒，其氣芳烈，其味甘，其性純陽，爲除風痺之上藥。安脾胃之神品。本經主風寒溼痺，死肌痲疽者，正以風寒溼三者合而成痺，痺者拘攣而痛者是也。經曰：地之溼氣，感則害人，皮肉筋骨死，肌者，溼氣侵肌肉也。痲者，風寒乘虛客於肝脾腎所致也。

其作用爲輕瀉藥。瀉力速而平和。老幼均可服。治肚腸生炎。積滯。凡應用瀉藥而不可惹其腸者。用此油最合宜。故此油爲輕性穩妥。微利藥。又如痢症初起。因腸內有不消化之雜質及結糞在內。阻塞。疼痛。欲下不下。服此油以滑利之。則自然輕鬆。大人每服四錢至六錢。小兒每服一二錢至三四錢。或加檸檬糖。或白糖同服。服後歷三四點鐘時。必輕瀉。況常服此油。可由漸減輕。與別藥之當由漸加多者相反。凡腹中有火。皆宜服此。處方以蓖麻油二錢。薄荷油一滴。鴉片酒二十滴。和勻。治肚疼。如疼甚者服之可止。〔蓖麻油鴉片酒方〕。又蓖麻油一兩或二兩。水糖一兩。或雞蛋黃一個攪勻。共調和。再加溫水足十兩。作一次射之。治大便秘燥。欲藥力速。則加洋肥皂少許。助之更妙。〔蓖麻油射水方〕。如服承。〔二〕絲。〔即甘承〕之後而猶未瀉。宜服蓖麻油四錢以助之。緣滑利之劑。惟此油最爲上品。而亦惟此油最爲通行。若中國所製之蓖麻油。則不純淨。故不入服劑。日本

和漢藥考曰。蓖麻子榨去油後。其餘下之渣。不惟瀉下之作用較蓖麻子油爲劇。甚有發胃腸炎。陷於虛脫之狀態者。即此可知。蓖麻子中除脂肪油外。必尚存有瀉下作用之物質。一說係含有偏利克歌特之里企嫩 Ricinon, 亞爾加羅伊特之里企寧 Ricinina, 或有毒性蛋白質之里欽 Ricin。故有上述之作用云。又荷蘭藥鏡曰。蓖麻子有斑紋之殼皮與薄膜。其瀉下之作用。殊爲猛烈。去皮膜用仁。則瀉下之效減弱。故連皮膜者。則用爲峻瀉藥。或以之吐瀉。從前用以滌除腐敗膽液黏穢。留飲等。然在易感觸之人。則胃腸必發劇甚之衝。及腹痛。搖擺等症。因是晚近已廢而不用。間有壯實之症。可以峻瀉者。亦每用巴豆油代之矣。

【蓖麻子葉】 性質 有毒。
主治 腳氣風腫。不仁。熬搗裹之。日二三易。即消。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論蓖麻子葉曰。治痰喘咳嗽。

【莧麻仁】即蓖麻子之處方用名。詳「蓖麻子」條。

【蒼朮】

命名 朮者山之精。服之辟穀。長生。故有山精仙朮之名號。又朮字。按六書本意。係篆文。象其根幹枝葉之形也。故名。

處方用名 泔製蒼朮。製茅朮。

古籍別名 赤朮。〔別錄〕山精。〔抱朴子〕仙朮。〔綱目〕山芥。山薊。天精。天薊。地葵。抱薊。馬薊。茅君寶。〔和漢藥考〕

外國名詞 Arctostaphylos ovata, Thunb. (拉丁)

基本 屬菊花科。爲蒼朮之根。

產地 ①陳仁山藥物生產辨云。蒼朮產湖北襄陽。鄖陽馬山口。紫荊關。京山縣。米河等處。俱由漢口運來。名內行雙朮。身細味香辛。

有產河南。直隸。東西北山。身懸浮。大皮黃。名爲海船津雙朮。味淡不。

如清明後出新。②凡山林原野。往往自生。以茅山蒿山生者爲佳。

形態 朮爲多年生草本。春日自宿根伸出嫩芽。多被以白色之

輭毛。其莖愈長愈堅。下部變如木質。高可二三尺。葉橢圓。末端尖。邊緣有細鋸齒。皆互生。又分製爲三爲五成複葉狀。缺刻極深。至秋梢頭開似薊之花。色白或淡紅。花作筒狀。不分瓣。連綴爲頭狀花序。總苞爲葉狀。排列若覆瓦。而圍以似魚骨之刺。其嫩芽與葉根。山民嘗採而燻食之。入伏後結子。至秋苗枯。根似老薑。旁有細根。作蒼黑色。肉黃白色。有油膏。



朮

種植 移種栽植於田圃者頗多。但其栽培要點。約分數項如下。①氣候及土地。蒼朮喜溫暖氣候。而忌寒冷。故栽培蒼朮。氣候須擇溫熱者。土地則以砂質之壤土爲最佳。純砂質土次之。黏質壤土亦可栽培。惟品質較劣。是其短也。若栽於上三者土質之外。則不能生長也。②產地及種類。吾國栽培蒼朮地方。約有四省。如四川。廣西。貴

之。覺中熱爲度。每一日一易。大約二十日可痊。(千金方)

●治髮黃不黑。蓖麻子仁香油煎焦。去滓。三日後類刷之。(摘玄方)

●治湯火灼傷。蓖麻子仁。蛤粉等分研膏。湯傷以油調。火灼以水調塗之。(古今錄驗方)

●治鐵刺入肉。蓖麻子去殼一個。先以帛蓋傷處。傳之類看。若見刺出。卽拔去。恐藥緊。弩出好肉。或加白梅肉同研尤好。(衛生易簡方)

●治竹木骨哽。蓖麻子仁一兩。凝水石二兩。研勻。每以一捻置舌根嚙嚙之。自然不見。又方。蓖麻油紅麴等分。研細。沙糖丸。皂子大。綿裹含。噉痰出大良。

●治雞魚骨哽。蓖麻子仁研爛。入百藥煎丸。彈子大。井花水化下。半丸卽下。

●治惡犬咬傷。蓖麻子五十粒。去殼。以井花研膏。先以鹽水洗咬痛處。乃貼此膏。(袖珍方)

●治齶喘痰嗽。用九尖蓖麻葉三錢。入飛過白礬二錢。以猪肉四

兩。薄批。搗藥在內。荷葉裹之。文武火煨熟。細嚼。以白湯送下。名九仙散。(儒門事親方) 又治咳嗽喘喘。不問年深日淺。用經霜蓖麻葉。經霜桑葉。御米殼。蜜炒各一兩。爲末。蜜丸。彈子大。每服一丸。白湯化下。日一服。名無憂丸。(普濟方)

用量 八分至錢半

施用宜忌 凡非氣壯邪實者禁用忌鐵

參攷資料 ●苗葉。似荇草而

大厚。莖赤有節。如甘蔗。高丈餘。秋生細花。隨便結實。殼上有刺。狀類巴豆。青黃斑褐。夏採莖葉。秋採實。冬採根。日乾用。(韓保昇) ●蓖麻莖有赤有白。中空。其葉大如瓠葉。每葉凡五尖。夏秋間極裏抽出花穗。藥黃色。每枝結實數十顆。上有刺。攢簇如蠅毛。而軟。凡三四子合成一顆。枯時劈開。狀如巴豆。殼內有子。大如豆。殼有斑點。狀如牛蠅。再去斑殼。中有仁。嬌白如蠟。隨子仁。有油可作印色。及油紙子。無刺者。良。子有刺者。毒。(李時珍) ●蓖麻產於亞細亞中國甚多。取其子榨取油。每十四兩。可得油三兩。

其色金黃。其臭濃者有功力。能潤瀉男女小兒皆可服。瀉後無關係。身虛弱欲令瀉者。用此尤宜。初生嬰兒尿不出者。可服。婦人產後大便難。可服。痢證欲先瀉去宿物者。可服。腹痛欲去燥屎者。可服。大人每服五錢至一兩。小兒每服一錢至四錢。若嫌氣味。用雞蛋黃攪和同服。或八角油一二滴同服。(內科新說)

【蓖麻子油】 外國名詞 Oil of Castor (Caster Oil) (英) カシ油リチ子油 (日本)

性質 有毒

主治 炎熱癰塗腫上。止鼻衄大驗。

國外學說 英美學說謂蓖麻子油從蓖麻子榨出。(蓖麻俗名大麻)產中國印度美國及亞非利加等處。而蓖麻葉亦可入藥。此油在印度埃及希臘阿刺伯各國古時卽多用之。蓖麻樹原產於印度。故蓖麻樹在印度爲最多。生田邊等處。高約一丈六尺至二丈。樹餘頗大。其油爲上等藥品。又能作

點燈之用。蓖麻子有大小二種。其小者含油更多。而成色亦最佳。西國常用之。蓖麻油。大半爲印度所產。俗名冷取蓖麻油。英國亦有用蓖麻子榨油之處。間有從北亞美利加與西印度運至英國出售者。色如淡稻紫色。臭淡味輕。如尋常之油。間有少穉者。此油雖較尋常定性油更重。而較水則輕。並有黏性。第蓖麻油之由榨取者。其性略純。以火製成者。其性頗烈。藥肆中所出售之品。必判爲兩等。製法去盡蓖麻子之皮衣。以淨核入鐵鍋用微火炒之。此鐵鍋須按以手。覺不甚炙痛。炒畢。以螺絲柱攪。絞榨而取其汁。再將油加入水和煎。其渣滓雜物。卽由浮沫滾去。而成淨油。時油中有一層白物。隔在油水交界間。恍如衣沫。一層提油時。務須將衣撤去。勿令混於油中。由是再將油隔淨。稍和以水。同熬。其水熬至化汽散盡。方爲純淨。(其所以必數次和水煎熬者。以熬時可以由水食去油內雜質)油既純淨。雖將油入小瓶而搖動之。亦不起白衣。其色味清而稠。無臭味。顯

十四畫 蓖

之未退再煎。以愈爲度。有人舌腫出口外。一村人用此法而愈。(經驗良方)

⑤治急喉痺。牙關緊急不通。用此即破。以蓖麻子仁研爛。紙卷作筒。燒煙熏吸即通。或只取油作擦。尤妙名聖煙筒。

⑥治催生下胎。用蓖麻子七粒。去殼研膏。塗脚心。若胎及衣下。便速洗去。不爾。則子腸出。即以此膏塗頂。腸自入也。(崔元亮海上集驗方)

⑦治產難。取蓖麻子十四枚。每手各把七枚。須臾立下也。(肘後方)

⑧治子宮脫下。用蓖麻仁。桔礬等分爲末。安紙上托入。仍以蓖麻仁十四枚研膏塗頂心即入。(摘玄方)

⑨又治盤腸生產。塗頂。方同上。(摘玄方)

⑩治一切腫毒。痛不可忍。用蓖麻子搗敷即止也。(肘後方)

⑪治半身不遂。失音不語。取蓖麻子油一升。陳酒一斗。銅鍋盛油。著酒中。一日煮之。令熟。細細服之。

(外臺祕要方)

⑫治八種頭風。蓖麻子。剛子各四十九粒。去殼。雀腦膏一大塊。搗如泥。糊丸梧子大。線穿掛風處陰乾。用時先將好末茶調成膏。子塗盃內。後將灰火燒前藥烟起。以盃覆之。待烟盡。以百沸葱湯點盃內茶藥服之。後以綿被裹頭臥。汗出避風。(袖珍方)

⑬治天柱骨倒。小兒疳疾。及諸病後。天柱骨倒。乃體虛所致。宜生筋散貼之。木鼈子六箇。去殼。蓖麻子六十粒。去殼。研勻。先包頭擦頂上。令熱。以津調藥貼之。(鄭氏小兒方)

⑭治五種風癰。不問年月遠近。用蓖麻子仁二兩。黃連一兩。石膏水一碗。文武火煮之。乾即添水。三日兩夜。取出黃連。只用蓖麻。風乾勿令見日。以竹刀每個切作四段。每服二十段。食後荊芥湯下。日二服。終身忌食豆。犯之必腹脹而死。(衛生寶鑑方)

⑮治喉中瘡腫。用蓖麻子仁一枚。朴硝一錢。同研。新汲水服之。連進二三服效。(杜任方) 又用蓖麻

仁。荊芥穗等分爲末。蜜丸綿包嚥之。(三因方)

⑯治水氣脹滿。蓖麻子仁研水解得三合。清旦一頓服盡。日中當下青黃水也。或云壯人止可服五粒。(外臺祕要方)

⑰治脚氣作痛。蓖麻子七粒。去殼研爛。同蘇合香丸貼足心。痛即止也。(外臺祕要方)

⑱治小便不通。蓖麻仁三粒。研細入紙捻內。插入莖中即通。(摘玄方)

⑲齕喘咳嗽。蓖麻子去殼。炒熟。揀甜者食之。須多服見效。終身不可食炒豆。(衛生易簡方)

⑳治催生下胎。不拘生胎死胎。蓖麻二個。巴豆二個。麝香一分。研貼臍中。并足心。又下生胎。一月一粒。溫酒吞下。(集簡方)

㉑治癰風鼻塌。手指攣曲。節間痛不可忍。漸至斷落。用蓖麻子一兩。去皮。黃連一兩。剉豆大。以小瓶子入水一升。同浸。春夏二日。秋冬五日。後取蓖麻子一枚。劈破。面東以浸藥水吞之。漸加至四五枚。若有微利。不妨。瓶中水盡更添。兩月

後。喫大蒜豬肉試之。如不發是效也。若發動再服。直候至不發乃止。(杜任方)

㉒治小兒丹瘤。用蓖麻子五個。去皮。研入麝一匙。水調塗之。甚效。(修真祕旨方)

㉓治瘰癧瘰核。蓖麻炒去皮。每睡時服二三枚。取效。一生不可喫炒豆。(經驗方)

㉔治瘰癧瘰瘡及軟癰。用白膠香一兩。瓦器溶化。去滓。以蓖麻子六十四個。去殼研膏。溶膠投之。攪勻。入油半匙。頭至點水中。試軟硬。添減膠油得所以。緋帛量瘡大小攤貼。一膏可治三五癰也。(儒門事親方)

㉕肺風面瘡。起白屑。或微有赤瘡。用蓖麻子仁四十九粒。白果膠東各三粒。瓦松三錢。肥皂一個。搗爲丸。洗面用之。良。(扶壽方)

㉖治面上雀斑。蓖麻子仁。蜜陀僧。硫黃各一錢。爲末。用羊髓和勻。夜夜傳之。(摘玄方)

㉗耳聾壅閉。蓖麻子一百個。去殼。與大棗十五枚。搗爛入乳。小兒乳汁和丸作錠。每以綿裹一枚塞

卽有紅赤嫩高勢且醜膿者亦可十消八九則明是消散之功何可誤認提毒外出瀕湖以治偏風不舉口日渴斜蓋亦用其走竄入絡可以通痺非能拔出血絡經脈之風邪且偏風喝斜等證本是腦經爲病何嘗有外風入絡認症本錯而用藥又是隔膜一誤再誤。頤謂此法亦必無效。據綱目所載一人偏風手足不舉瀕湖以此油同麝香鯁鯉甲等作膏摩之而愈則真是風寒溫三氣雜至之痺着關節者所以有驗此辨症之不可模糊隱約者也丹溪又以爲能出有形之滯物故取胎產胞衣刺骨膿血者用之則亦因其善走而速之使動耳瀕湖又謂一人病手臂一塊腫痛以此搗膏貼之一夜而愈則卽走竄消散之功耳又謂一婦產後子腸不收搗仁貼其丹田一夜而上頤謂此藥性情止能流動而使之行之不能收攝而使之斂古書謂產後腸出于宮不上用蓖麻仁搗塗頂心百會穴立刻收上云云卽已陳陳相因數見不一見均是空中樓閣瀕湖此說亦是依託古

書欺人之語蓋蓖麻散腫之功極驗如果子宮子腸不收而亦用之豈不使其正氣愈散理當益復下墜萬無可愈之道此微之實驗而鑿鑿有據者何得比附古人之空談而陷害病家於實禍吾國醫籍最多此等荒唐之說苟非確有至理已覺不可輕信况似此走散之品而反謂之能收正是大相矛盾者耶石頑謂研塗癰癰瘰癧腫卽消則是實驗此散之力而非收之功也且瀕湖綱目於主治正文中連綴治女人胎衣不下子腸挺出開通關竅經絡三句則不下者必使之下挺出者必使之收此物既能下胎衣而開通關竅經絡又何以能收子腸一行之中出爾反爾更是可駭似此信手拈來實是誤人不小又主治中以消腫追膿拔毒六字并作一氣則消者欲其內消追者拔者欲其外出凡能內消之藥必不能拔毒而拔毒之藥以數未潰之瘍適以提之成膿必不能消腫亦是兩相矛盾萬不可通蓋瀕湖本不諳治瘍之原理以致措辭乖謬如是究竟蓖麻治瘍

內消最有奇功拔毒實無能力此頤所以謂內外分科之不足恃也又古書皆謂蓖麻有毒不可內服瀕湖且謂服蓖麻者一生不得食炒豆犯之必服死一似此物必是大毒之品所以綱目列於毒草門中然頤幼時家園中種此數年當時并不知其卽是蓖麻子但見人家炒熟食之如落花生者然頤全家亦炒食屢矣約計其數實是不少而全家未蒙其害至今已將四十年亦未嘗不食炒豆乃知宋元以後醫書苟非親驗多是空談噫呼妄傳更有神農氏作而再一一親嘗之耶

配合應用

●蓖麻子去殼同紫背天葵等分清水入砂器中煮半日空腹時與病人嚼下自十五枚至廿一枚癰癧久自消

●李氏云一人病偏風手足不舉用此油同羊脂膠香鯁鯉甲等藥煎作膠膏日摩數次一月餘漸復兼搜搜風養血化痰之劑三月而愈又一人病手臂一塊腫痛亦用蓖麻搗膏貼之一夜而愈又一人病氣鬱偏頭痛用此同乳香食

鹽搗爲太陽穴一夜痛止又一婦產後子腸不收搗仁貼其丹田一夜而上此藥外用異奏奇功但內服不可輕率耳或言搗膏以筋點於鷄鴨六畜舌根下卽不能食或點肚內卽下血死其毒可知矣

●治口眼喝斜蓖麻子仁搗膏左貼右右貼左卽止

●又用蓖麻子仁七七粒研作餅右喝安在左手心左喝安在右手心卽以銅盂盛熱水坐藥上冷卽換五六次卽正也(婦人良方)

●治風氣頭痛不可忍者乳香蓖麻仁等分搗餅隨左右貼太陽穴解髮出氣甚驗

●又方蓖麻仁半兩聚肉十五枚搗塗紙上捲筒插入鼻中下清水涕頭痛卽止

●治鼻塞不通用蓖麻仁三十粒大棗去皮一枚搗勻綿裹塞之一日一易三十日聞香臭也(聖濟總錄方)

●治舌上出血用蓖麻子油紙擦燒煙熏鼻中自止(摘玄方)

●治舌腹寒口用蓖麻仁四十粒去殼研油塗紙上作擦燒煙熏

之。有沫撒起。俟沫盡乃止。去水以沫煎至點燈不炸。滴水不散方美。

性質 甘辛。平。有小毒。

成分 主要之成分爲脂肪油。

即謂之蓖麻子油。

效能 通竅道。瀉積滯。用作瀉下藥。又爲外傳藥。治老年及虛人便秘。

作用 在胃不起作用。至小腸首段。被腺液化合而成蓖麻油酸。能激腸之黏膜。使腸液分泌增加。能將胃內未消化之食物。及腸中之積糞瀉下。既少刺激性。而性又和平。誠極安全之緩下劑也。若服不純潔者。或服量過多。則亦能惹起胃黏膜炎。

主治 水瀉。以水研二十枚服之。吐惡沫。加至三十枚。三日一服。瘰則止。又主風虛寒熱。身體瘡痒。浮腫。尸疰惡氣。擦取油塗之。

歷代記述攷證 【宋】大明日

華諸家本草論蓖麻子曰。研傳瘡癰疥。癰瘡。手足心催生。【宋】寇宗奭本草衍義論蓖麻子曰。治瘰癧。取子炒熟去皮。每臥時嚼服二三枚。漸加至十數枚。有效。【明】李時

珍本草綱目論蓖麻子曰。主偏風不遂。口眼喎斜。失音口噤。頭風耳聾。舌脹喉痺。胸喘。腳氣。毒腫。丹瘤。湯火傷。鍼刺入肉。女人胎衣不下。子腸挺出。開通竅。經絡。能止諸痛。消腫。追膿拔毒。【明】繆希雍本草經疏論蓖麻子曰。蓖麻甘辛。而其氣則平。性有小毒。其力長於收吸。故能拔病氣出外。其性善收。故能追膿取毒。能出有形之滯物。又能通利關竅。故主水瘰。又主風虛寒熱。身體瘡痒。浮腫。尸疰惡氣。榨取油塗之。研塗手足心催生。寇氏主瘰癧。李氏主偏風。半身不遂。口眼喎斜。頭風。腳氣。毒腫。丹瘤。火傷。鍼刺入肉。女人胞衣不下。及子腸挺出。皆從外治。不經內服。良有見也。子無刺者。良子有刺者。毒。【明】李士材本草圖解論蓖麻子曰。蓖麻子辛熱有毒。服者一生勿食炒豆。犯即脹死。且有毒損人。故不可輕服。但取外治。其用甚多。研傳瘡癰癰瘰。塗足心催生。口眼歪邪。右歪貼左。左歪貼右。塞鼻治瘰癧。耳治聾。小便不通。三粒研細。入紙擦。插莖。即通。子宮脫下。塗頂。即收。丹

溪曰。追膿拔毒。爲外科要藥。鵝鵝油能引藥氣入內。蓖麻油能拔病氣出外。偏風手足不舉。同羊脂。麝香。穿山甲。煎作膏。日摩數次。手臂腫痛。蓖麻搗膏貼之一日。愈。偏頭風。同乳香。搗塗。即止。取油法。研爛入水。煮之。有沫撒起。沫盡乃止。取沫煎至滴水不散爲度。善收善走。氣味頗類巴豆。外用頗奏奇功。內服不可輕率。【清】黃宮繡本草求真論蓖麻子曰。蓖麻子甘辛有熱性。味頗類巴豆。既有收引拔毒之能。復有開竅通利之力。觀書所言。搗膏以貼手臂腫痛。一夜即效。子宮脫下。用此研膏以塗頂心。即入胞衣不出。用此研膏以塗腳心。即下。中風口眼喎斜。偏左貼右。手心偏右貼左。手心即止。至於口噤鼻塞。耳聾喉痺。舌脹。用油烟薰。即開水瘰。浮腫。用仁研服一枚。即消。針刺好肉。用仁搗敷患處。即拔瘰癧。惡瘡。用仁外敷。立愈。凡此皆屬外用。以奏奇功。但不宜於服耳。昔人有以汁點舌。舌根下。即不能食。點番肛門內。即下血死。并云服蓖麻者。一生不得服豆。犯即脹死。其毒

可知。鹽水煮取皮。研取油用。忌鐵。國外學說 日本猪子氏之和漢藥論云。蓖麻子者。原產於印度。有下泄之效。其有效成分。爲蓖麻子油。及一種醱酵素。即「コーベルト氏所謂「リチン」是也。」「リチン」有劇毒。亦與他醱酵素同。加百度之溫。則全無毒。漢醫輩之處本藥也。先以鹽湯煮半日。而葉皮用之。和語本草卷之九。故「リチン」已化爲無毒。經驗與理論相符合。可謂奇矣。而蓖麻子之成分。爲一種有機酸。所謂「リチール」酸是也。

近人學說 張山雷曰。蓖麻子氣味甘平。瀕湖以爲甘辛平。其實全無辛味。石頑以爲溫。頗且恒用以消散外疔。紅腫。熱各症。則可證其性必曾清涼。石頑之說亦非。是其性善走善散。丹溪以爲能追膿取毒。拔邪外出。甚是不確。審顧業師朱氏。世以兼治外瘍名。凡拔毒提膿藥中。從不用此。惟退消陽毒。紅腫及發頰。癰癧。乳癰等症。有家製千組膏一方。專用蓖麻子仁。杵細。和乳香。膠香。銀珠。麝香。成膏。

研碎。酒醋共三分。根下合蒸熟。封裹腰上。一二日即消。並治肌膚不仁。(千金方)

③治渾身水腫。坐臥不得。取薊根。去皮搗汁一合。和酒一合。燉服。當微吐利以後即愈。(梅師方)

④治頭風旋暈。起倒無定。薊獨活。白石膏各一兩。枳實炒七錢。牛。每服三錢。酒一盞。煎六分。溫服。(聖惠方)

⑤治產後血暈。心悶煩熱。用薊破。如算子一握。水一升。煎半升。分二服。或小便出血者。服之亦瘥。(衛生易簡方)

⑥治寒熱往來。瘧疾不止。取薊一大握。炙令赤色。以水煎濃汁一盞。欲發前服。服後即愈。(斗門方)

⑦治卒暴癰塊。堅硬如石。作痛欲死者。取薊根一小束。洗淨細擊。以酒二升。漬三宿。溫服五合。至一升。日三服。若欲連用於熱灰中。溫出藥味服之。此方無毒。已愈多人矣。(古今驗方)

⑧癰腫惡肉。頑固不消者。取薊灰。石灰各淋取汁。合煎如膏。傳

之能蝕惡肉。亦去瘡痂。此藥過十日即無效也。(千金方)

【蒸龍草】即雷公藤之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「雷公藤」條。

餅故名。 命名 本品係用小麥麴加醇糟蒸成食品之餅。故名。

探取 以臘月及寒食日。蒸之至皮裂。去皮懸之風乾。臨時以水浸脹。搗爛過用。其以果菜油膩諸物爲餡者。不填入藥。

性質 甘平。無毒。

主治 消食養脾胃。溫中化滯。益氣和血。止汗。和三焦。通水道。

參攷資料 ①蒸餅和脾胃及三焦藥。甚易消化。且麴已過性。不助濕熱。李時珍。②按愛竹談藪云。宋寧宗爲郡王時。病淋。日夜凡三百起。國醫罔措。或舉孫琳治之。琳用蒸餅大蒜淡豆豉三物。搗丸。令以溫水下三十丸。日今進三服。病當減三之一。明日亦然。三日病除。已而果然。賜以千緡。或問其說。琳曰。小兒何緣有淋。只是水道不利。三物皆能通利。故爾。若琳者。其可與語醫矣。(李時珍)

蒸 疾 蕒 薊

【蕒蕒】即刺蕒蕒之原名。詳「刺蕒蕒」條。

【蕒蕒】即刺蕒蕒之簡稱。詳「刺蕒蕒」條。②即蜈蚣之古籍別名。典見爾雅。詳「蜈蚣」條。

【蕒頭】即蕒蕒之古籍別名。典見開寶本草。詳「蕒蕒」條。

命名 本品葉似大

【蕒麻子】麻形如牛。轉故名。又蕒麻亦作蠅。蠅牛虱也。子有麻點。曰蕒麻子。

處方用名 蕒麻仁。蕒麻子。古籍別名 遠近子。脾麻子。草麻子。(和漢藥考)

學名 Ricinus communis, L.

外國名詞 Semen Ricini (拉丁) Ricinus Leaves (英) Ricini Folia (德)

基本 屬大戟科。爲蕒麻之種子。

產地 陳仁山藥物生產辨云。草麻子產區甚廣。以安南東京內。卑爲多。廣東北江清遠下四府各省均有出。

形態 蕒麻爲一年生草本。莖

高六七尺。甚者長丈餘。莖圓而中空。如竹。葉巨大。其狀如橘。而深裂似掌。邊緣有粗鋸齒。具長葉柄。皆互生。葉與莖俱帶白粉。傷之則滲出白汁。梢端或葉腋。抽出花梗。長五六寸至尺許。於此開單性之花。相綴而爲總狀花序。雌花之花柱在上。色淡紅。雄花在下。色淡黃。果實爲有刺之蒴果。中分三房。房藏三子。子形扁平。橢圓。色黑褐。而雜以白。有光澤。長三分至五六分。上半有灰白色之小嘴。底部有臍。胚乳色白。如油。味辛烈。

子 麻 蕒



探取 夏採莖葉。秋採實。冬採根。日乾。

製法 雷敩曰。凡使蕒麻子。勿用黑天赤利子。緣在地裏上。是頭兩頭尖有毒。其蕒麻子節節有黃黑斑。凡使以鹽湯煮半日。去皮取子。研用。李時珍曰。取蕒麻油法。用蕒麻子仁五升。搗爛。以水一斗。煮

十四畫 蒲 菡 蒨

蒲黃苗也。處處有之。以秦州者爲良。春初生嫩葉。出水時紅白色。茸茸然。取其中心。入地白藕大如匕柄者。生啖之。甘脆。又以醋浸。如食筍大羹。周禮謂之蒲蒹。今人罕有食之者。至夏抽梗於叢葉中。花抱梗端。如武士捧杵。故俚俗謂之蒲槌。亦曰蒲萼花。其蒲黃即花中蕊屑也。細若金粉。當欲開時。便取之。市廛以蜜搜作果食貨賣。(蘇頌)

蒲黃生。水際似莞而偏有脊而柔。二三月苗探其嫩根。淪過作鮓。一宿可食。亦可燻食。蒸食。及曬乾磨粉作飲食。詩云。其蔌伊何。惟筍及蒲是矣。八九月收。葉以爲席。亦可作扇。軟滑而溫。(李時珍)

蒲黃。本品乃蒲黃中篩出之赤滓。故名。

古鑿別名 蒲萼(綱目)

主治 炒用。瀉腸。止瀉血。血痢。

蒲黃炒阿膠。即阿膠用蒲黃拌炒成者之處方用名。詳「阿膠」條。

蒲黃炭。即蒲黃炒成炭者之處方用名。詳「蒲黃」條。

蒲楊。即水楊之古籍別名。典見古今注。詳「水楊」條。

蒲葇。即蒲葇之古籍別名。典見綱目。詳「蒲葇」條。

蒲葇。即蒲葇之古籍別名。典見綱目。詳「蒲葇」條。

蒲葇。即蒲葇之古籍別名。典見綱目。詳「蒲葇」條。

蒲葇。即蒲葇之古籍別名。典見綱目。詳「蒲葇」條。

蒲葇。即蒲葇之古籍別名。典見綱目。詳「蒲葇」條。

蒲葇。即蒲葇之古籍別名。典見綱目。詳「蒲葇」條。

蒲葇。即蒲葇之古籍別名。典見綱目。詳「蒲葇」條。

蒲葇。即蒲葇之古籍別名。典見綱目。詳「蒲葇」條。

蒲葇。即蒲葇之古籍別名。典見綱目。詳「蒲葇」條。

蒲葇。即蒲葇之古籍別名。典見綱目。詳「蒲葇」條。

蒲葇。即蒲葇之古籍別名。典見綱目。詳「蒲葇」條。

蒲葇。即蒲葇之古籍別名。典見綱目。詳「蒲葇」條。

蒲葇。即蒲葇之古籍別名。典見綱目。詳「蒲葇」條。

蒲葇。即蒲葇之古籍別名。典見綱目。詳「蒲葇」條。

蒲葇。即蒲葇之古籍別名。典見綱目。詳「蒲葇」條。

蒲葇。即蒲葇之古籍別名。典見綱目。詳「蒲葇」條。

蒲葇。即蒲葇之古籍別名。典見綱目。詳「蒲葇」條。

蒲葇。即蒲葇之古籍別名。典見綱目。詳「蒲葇」條。

蒲葇。即蒲葇之古籍別名。典見綱目。詳「蒲葇」條。

蒲葇。即蒲葇之古籍別名。典見綱目。詳「蒲葇」條。

蒲葇。即蒲葇之古籍別名。典見綱目。詳「蒲葇」條。

蒲葇。即蒲葇之古籍別名。典見綱目。詳「蒲葇」條。



性 質 酸。溫。有毒。

主 治 風癰。癰癤。身瘡。瘰癧。可作浴湯。

歷代配述攷證 【宋】大明諸家本草論蒲葇曰。浴癰癰瘰癧風痺。

【清】黃元御長沙藥解論蒲葇曰。味酸微涼。入足厥陰肝經。行血通經。消痰化凝。金匱王不留行散。用之治病。金瘡。以其行血而消瘀也。

配合應用 治手足偏風。風濕冷痺。寒濕腰痛。取蒲葇葉火燉厚鋪床上。熱眠於中。冷復易之。冬月取根。舂碎熟熱用。(外臺祕要方)

治脚氣。腰腫骨痛。取蒲葇根。

治脚氣。腰腫骨痛。取蒲葇根。

治脚氣。腰腫骨痛。取蒲葇根。

治脚氣。腰腫骨痛。取蒲葇根。

面之害。乃通告各藥舖。禁其沿用。今仍用草蒲黃。鄭君所云屑細若金粉。或亦是此物。不識以何物爲作。亦非松花粉。蓋松花粉色淡黃質輕。蒲黃面質重色老黃。然總是害人實品。應當革除之。

配合應用 ①治產後諸血病

蒲黃炒黑乾薑炒黑豆澤蘭當歸川芎牛膝生地黃

②治弱血 蒲黃車前子牛膝生地黃麥門冬

③治血崩血淋 蒲黃阿膠白膠人參麥門冬赤茯苓車前子杜仲川續斷

④生蒲黃納舌下。數數易之。能消重舌。

⑤治一切跌撲傷損。瘀血停滯腹中。生蒲黃煮濃和重便飲之。良

⑥蒲黃能破血。故治癥結。五勞七傷。停積瘀血。胸前痛。卽發吐衄。悉和涼血行血藥主之。

⑦治肺熱衄血。蒲黃青黛各一錢。新汲水服之。或去青黛。入油髮灰等分。生地黃汁調下。(簡便單方)

⑧治吐血唾血。蒲黃末二兩。每

日溫酒或冷水服三錢妙。(簡要濟衆方)

⑨治老幼吐血。蒲黃末每服半錢。生地黃汁調下。量人加減。或入髮灰等分。亦治小便出血。(聖濟總錄方)

⑩治小便轉胞。以布包蒲黃。裹腰腎。令頭致地。數次取通。(肘後方)

⑪治金瘡出血。悶絕。蒲黃半兩。熱酒灌下。(危氏得效方)

⑫治瘀血內漏。蒲黃末二兩。每服方寸匕。水調下。服盡止。(肘後方)

⑬治腸痔出血。蒲黃末方寸匕。水服之。日三服。(肘后方)

⑭治脫肛不收。蒲黃和豬脂傅。日三五度。(子母祕錄方)

⑮治胎動欲產。日月未足者。蒲黃二錢。并華水服。(集一方)

⑯治產婦催生。蒲黃地龍洗焙。陳橘皮等分。爲末。另收。臨時各炒一錢。新汲水調服。立產。此常親用甚妙。(唐慎微方)

⑰治胞衣不下。蒲黃二錢。并水服之。(集驗方)

⑱治產後下血。羸瘦迫死。蒲黃二兩。水二升。煎八合。頓服。(產寶方)

⑲治產後血瘀。蒲黃三兩。水三升。煎一升。頓服。(梅師方)

⑳治兒枕血瘀。蒲黃三錢。米飲服。(產寶方)

㉑治產後煩悶。蒲黃方寸匕。東流水服。極良。(產寶方)

㉒治喉傷撲損。瘀血在內。煩悶者。蒲黃末。空心溫酒服三錢。(塞上方)

㉓治關節疼痛。蒲黃八兩。熟附子一兩。爲末。每服一錢。涼水下。日一。(肘後方)

㉔治陰下濕癢。蒲黃末。傳三四度。燒(千金方)

㉕治聾耳出膿。用蒲黃末。搽之。(聖惠方)

㉖治口耳大衄。蒲黃阿膠炙各半兩。每用二錢。水一盞。生地黃汁一合。煎至六分。溫服。急以帛繫兩乳。止乃已。(聖惠方)

㉗治耳中出血。蒲黃炒黑。研末。搽入。(簡便方)

用量 八分至錢半。

施用宜忌 凡陰虛及無瘀者禁用。

參攷資料 ①香蒲生南海池澤。蒲黃生河東池澤。四五月採之。

(別錄) ②蒲黃卽蒲葦花上黃粉也。甚療血。仙經亦用之。(陶弘景)

③汴人初得羅去滓。以水調爲膏。擘爲塊。人多食之。以解心膈虛熱。小兒尤嗜之。過月則燥。色味皆淡。須蜜水和。不可多食。令人自利。極能虛人。(寇宗奭)

④蒲黃手足厥陰血分藥也。故能治血治痛。生則能行。熟則能止。與五癰脂同用。能治一切心腹諸痛。按許叔微本事方云。有士人妻舌忽脹滿口。不能出聲。一老叟教以蒲黃類。搽比曉乃愈。又芝隱方云。宋度宗欲賞花。一夜忽舌腫滿口。蔡御醫用蒲黃乾薑末等分。乾擦而愈。據此二說。則蒲黃之涼血活血。可證矣。蓋舌乃心之外候。而手厥陰相火乃心之臣使。得乾薑是陰陽能相濟也。

(李時珍) ⑤香蒲卽甘蒲。可作薦者。春初生。取白爲茹。亦堪熟食。山人謂之香蒲。以昌蒲爲臭蒲也。蒲黃卽此蒲之花也。(蘇恭)

⑥香

主治 心腹膀胱寒熱。利小便。止血。消瘀血。久服輕身益氣力。延年神仙。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥

性本草論蒲黃曰。治痢血。鼻衄。吐血。尿血。瀉血。利水道。通經絡。止女子崩中。【宋】大明日華諸家本草論蒲黃曰。婦人帶下。月候不勻。血氣心腹痛。妊婦下血。墜胎。血暈。血。微兒枕氣痛。顛撲血。悶。排膿。瘡癰。遊風腫毒。下乳。止瀉。精。【明】李時珍本草綱目論蒲黃曰。涼血活血。止心腹諸痛。【清】鄒澍本經疏證論蒲黃曰。金匱要略用蒲灰散。利小便。治厥而皮水。解者。或以爲香蒲。或以爲蒲席。燒灰。香蒲但能清上熱。不云能利水。敗蒲席則錄主筋澁惡瘡。亦非利水之物。蒲黃本經主利小便。且本事方芝隱方。皆述其治舌腫神驗。予亦曾治多人。黍銖無爽。正有合治水之腫於皮乎。夫皮水爲膚腠間病。不應有厥。厥者下焦病也。膀胱與腎爲表裏。膀胱以水氣歸皮。致小便不利。氣阻而成寒熱。則腎亦承其弊。爲之陰壅而陽不得達。遂成厥焉。

病本在外。非可用溫。又屬皮水。無從發散。計惟解心腹膀胱之寒熱。使小便得利。又何厥逆之有。以是知其爲蒲黃無疑也。曰蒲灰者。蒲黃之質。固有似於灰也。趙以德金匱衍義亦云。

近人學說

●賈九如曰。蒲黃色黃。氣香。專入脾經。若諸失血久者。炒用之。可以助補脾之藥。攝血歸源。使不妄行。又取體輕行滯味甘和血上治吐衄咯血下治腸紅崩漏。但爲收功之藥。在失血之初。用之無益。若生用亦能涼血消腫。●陳中權曰。中醫學術之退步。在因循苟且。不求真理。其於藥物亦然。不究其所以能治病之理。反穿鑿附會。從色形上着想。卒至病愈而不不知所以愈。不愈亦不知所以不愈。此可爲嘆息痛恨者也。如蒲黃各本草言其生用行血。炒用止血。考蒲黃性味甘涼。帶滑。生用涼血散血。固矣。失笑散是也。然炒黑能止血。以紅見黑則止。爲水勝火。此真荒謬之談。須知失血之症。在上多由肺胃之傷。下則多由脾胃之傷。血管綻裂。血不行其經。遂致

失血。止血之藥。但當取其有膠黏之質。或乾澀之性。能收斂血液者。則血自凝聚而可止。於色之紅黑固無有也。如阿膠補血。亦能治一切失血。濃墨亦止血。簪葉灰研服亦止血。甚至外症出血。以灰塵膏粉塗之。亦能止。且亦不限黑色。如明礬和白糖同服。止血亦效。此數物者。色黑白不齊。而紅見之亦止者。何也。亦惟各有其膠黏之質性。故主治亦同耳。如必謂紅見黑止。則諸失血症。皆可以煤炭屑或黑水止之矣。此又不通之論也。吾謂

凡膠黏乾澀之品。均可止血。按之事理。自有可通者。炒蒲黃止血。確有特效。曾見有人外症出血不止。以蒲黃炭研細傳之。即止者。然局方黑神散。主治行血下胎。〔見醫方集解〕方中用炒蒲黃。不知何故。疑是生蒲黃之誤。●張山雷曰。蒲黃事入血分。以清香之氣。兼行氣分。故能導瘀結而治氣血凝滯之痛。東壁李氏雖謂其涼血活血。亦以水產之品。因謂之涼。頗謂蒲本清香。亦有辛味。以本經菖蒲辛溫例之。必不可以爲寒涼。蒲黃又

爲蒲之精華所聚。既能逐瘀。則辛散之力可知。況心腹結滯之痛。新產瘀露之凝。失笑一投。捷於影響。雖曰靈脂導濁。是其專職。然使蒲黃有瘀可用。若舌瘡口瘡皮膚瘡。瘡諸病。傳以生蒲黃細粉可愈。則以細膩黏凝。自有生肌之力。非僅涼也。取其清涼也。

辨偽

●鄭青巖曰。蒲水草也。蒲黃乃香蒲花中之蕊。屑細若金粉。始出河東澤中。今處處有之。以秦州出者爲良。近今藥肆中。或以松花僞充。按松花氣味辛溫。蒲黃氣味甘平。松花能除風。蒲黃能消痰。性既不同。功亦各異。胡得僞充以害人乎。況失笑散中有用蒲黃爲治產後瘀血攻心之妙方。若用松花僞充。則貽誤不少矣。●曹炳章曰。按蒲黃乃蒲草之花蕊。色淡黃。是花茸花蕊相合。名草蒲黃。爲佳。又有一種蘇州來者。曰蒲黃面。色老黃。屑細滑若粉。入罐煎之。如糊膠一般。服之令人作嘔。且不能入喉。吾初到時。人人以此爲道地。各大藥舖爭先置備。後因病人不能服。向醫生責問。始識受蒲黃

典見綱目。詳「蒲公英」條。

【蒲包草】 古籍別名 水蠟燭
草（綱目拾遺）實名
鬼蠟燭。蒲莖。枝。（汪蓮仕採藥
書）

產地 多生野塘間及蘆葦叢
中。

形態 蒲包草爲水草類之一
種。秋抄結實。紅色宛如蠟燭。其根
可供藥用。子詳見該條。

主治 療癰癰。洗淨寸段。砂鍋
煎湯飲。

參攷資料 蒲包草根。婦人服
之終不受孕。須服北京眞益母丸
四五兩可解之。（趙學敏）

【蒲包草實】 主治 療金瘡。
刃傷止血用。

【蒲州豆豉】 命名 本品爲
豆豉之出於山

西舊蒲州府境者故名。
製法 先以酒醋浸透。蒸之曝
乾。入麻油再蒸晒如是三次。再加
薑椒末。拌貯藏之用。

性質 鹹。寒。無毒。
主治 解煩熱。熱毒。寒熱。虛勞。
調中。發汗。通關節。殺腥氣。傷寒。鼻

塞。

寒。

【蒲兒根】 卽蒲葦之古籍別名。典
見野榮譜。詳「蒲葦」條。

【蒲柳】 卽水楊之古籍別名。典見
爾雅。詳「水楊」條。

【蒲英】 卽蒲公英之古籍別名。典
見和漢藥考。詳「蒲公英」條。

【蒲莖】 卽青秧之古籍別名。典見
綱目。詳「青秧」條。

【蒲席】 命名 本品係用菖蒲
所編之席故名。

古籍別名 薦（綱目）
採取 以年久陳敗者用之良。
性質 平。無毒。

主治 筋溢。惡瘡。
歷代記述攷證 【唐】甄權藥

性本草論蒲席曰。單用破血。治墜
損瘀血在腹刺痛。取久臥者。燒灰
酒服。【唐】陳藏器本草拾遺論蒲
席曰。治霍亂轉筋入腹。取編席之
索。燒研酒服。

參攷資料 蒲席惟船家用
之。狀如蒲帆。人家所用席皆是菅
草（陶弘景）席皆以蒲及稻藁
爲之。有精粗之異。吳人有以龍鬚
草爲席（李時珍）

【蒲扇】 命名 上古以羽爲扇。
故扇字從羽。後世有以
菖蒲所編者故名。

古籍別名 筵（綱目）

採取 以年久而陳敗者用之
良。

主治 止汗。燒灰和粉撲身。
歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論蒲扇曰。止盜汗及婦
人血崩經水不斷。燒灰酒服。
【蒲移】 卽水楊之古籍別名。典見
古今注。詳「水楊」條。

【蒲根白】 卽水楊之古籍別名。典
見和漢藥考。詳「水楊」條。

【蒲桃】 卽蒲萄之古籍別名。典見
綱目。詳「蒲萄」條。

【蒲桃殼】 主治 止嘔。或如神。

【蒲草】 卽蒲包草之簡稱。詳「蒲
包草」條。

【蒲陶】 卽蒲萄之古籍別名。典見
綱目。詳「蒲萄」條。

【蒲筍】 卽蒲筍之古籍別名。典見
食物本草。詳「蒲筍」條。

【蒲黃】 命名 本品係香蒲花
蕊之粉。色淡黃。故名。

處方用名 生蒲黃。炒蒲黃。蒲
黃炭。

外國名詞 Typha
基本 屬香蒲科。爲蒲草之花
粉。

產地 凡池澤間恒多生焉。陳
仁山藥物生產辨云。蒲黃產湖北
山東兩省。

形態 蒲爲生於池沼之宿根
草。葉叢生。長四尺至五尺。闊九分
許。厚而柔軟。有平行脈。秋季取之
爲蒲席。夏季抽圓莖於頂上開花
成長穗狀。如蠟燭。謂之蒲槌。花粉
作黃褐色。

採取 四月採日乾。

製法 雷斅曰。凡使勿用松黃
并黃蘗。其二件全似。只是味踴及
吐人鼻。蒲黃須隔三重紙焙令色
黃。燕半日。却再焙乾。用之妙。大明
曰。破血消腫者。生用之。補血止血
者。須炒用。

性質 甘。平。無毒。
效能 行血祛瘀。止血和營。用
作止血藥。

一五六五

諸證。可服可敷。頗有應驗。而治乳癰乳癰。紅腫堅塊。尤爲捷效。鮮者鳩汁溫服。乾者煎服。一味亦可治之。而煎藥方中必不可缺此。蘇恭唐本草謂甘平無毒。治婦人乳癰。水腫。煮汁飲。及封之。立消。洵不誣也。丹溪亦謂解食毒。散滯氣。化熱毒。消惡腫。結核。丁腫。石頑。請治乳癰。必鮮者取汁和酒服。服後欲睡。是其功驗。微汗而愈。願按乳癰乳核單方。古法多用酒服。蓋欲其迅行。及於患處。然此惟堅塊初起。其形未大。未變色。時間或可施。而乳症多兼肝胆湯多。酒能助火。未可概投。若形勢漸巨。本欲釀膿者。適以速成其潰耶。自來著內科書者。多不習瘍科。所以不知其弊。實則內外二科。理本相同。且內外病之聯屬者。尤非少數。不知內科固萬不能治瘍。卽不知瘍科。則治內亦時有養癰貽害之弊。無如長於治內者。輒謂吾是大方專家。彼汚穢齷齪之瘡瘍。又豈肯降格從事。然遇一內外相兼之症。勢必束手無措。敷衍了事。捫心清夜。能無遺憾。須知治瘍雖似小伎。要知非精於

治內者。亦不可與語此中神化也。

配合應用

①治一切乳癰毒腫痛及乳癰。用蒲公英。夏枯草。貝母。連翹。白芷。桔梗。根。橘葉。甘草。頭垢。牡鼠。蕪山豆。根。山慈。孤。等。

②治惡刺及狐尿刺。摘取根莖白汁塗之。惟多塗立差。此方出孫思邈千金方。其序云。余以貞觀五年七月十五日。夜。以左手手中指背觸着庭木。至曉遂惡痛不可忍。經十日。痛日深。瘡日高大。色如熟小豆。嘗聞長者之論。有此方。遂依治之。手下卽愈。痛亦除。瘡亦卽瘳。未十日而平復。如故。楊炎。南行方亦著其效云。(圖經方)

③治產後不自乳兒。蓄積乳汁。結作癰。取蒲公英搗傅腫上。日三四度易之。(梅師方)

④還少丹。昔日越王曾遇異人。得此方。極能固齒牙。壯筋骨。生腎水。凡年未及八十者。服之。鬚髮返黑。齒落更生。年少服之。至老不衰。得遇此者。宿有仙緣。當珍重之。不可輕泄。用蒲公英一斤。一名構梲。草。又名蒲公罌。生平澤中。三四月甚有之。秋後亦有放花者。連根帶

葉取一斤。洗淨。勿令見天日。曬乾。入斗子解。曬一兩。香附子五錢。二味爲細末。入蒲公英內。淹一宿。分爲二十團。用皮紙三四層裹扎定。用六一泥卽蚯蚓糞。如法固濟。入甕內焙乾。乃以武火煨通紅。爲度。冷定取出。去泥爲末。早晚擦牙漱之。吐膿任便。久久方效。(瑞竹堂方)

⑤治乳癰紅腫。蒲公英一兩。忍冬藤二兩。搗爛。水二鍾煎一鍾。食前服。睡覺病卽去矣。(積德堂方)

⑥治疳疔瘡疔毒。蒲公英搗爛。覆之。卽黃花地丁也。別更搗汁和酒煎服。取汗。(唐氏方)

⑦治多年惡瘡。蒲公英搗爛貼。亦治蛇螫腫痛。(救急方)

附量 錢半至三錢

施用宜忌 凡無溼熱癰毒者禁用

參攷資料 ①此草開黃花。味甘。解毒。散滯氣。可入陽明太陰經。化熱毒。治腫核。有奇功。同忍冬藤煎湯。入少酒佐服。治乳癰。服罷欲睡。是其功也。睡覺微汗。病卽安矣。(朱震亨) ②孫思邈千金方作

堯公。蘇頌。圖經。作僕公罌。度辛玉册作鴉鵲。俗呼蒲公丁。又呼黃花地丁。淮人謂之白頭何。蜀人謂之耳癰草。圖中謂之狗乳草。案土宿本草云。金簪草一名地丁花。如金簪頭獨脚如丁。故以丁名之。(李時珍) ③蒲公英草生平澤田園中。莖葉似苦苣。斷之有白汁。堪生嫩花。如單菊而大。四五月採之。(韓保昇) ④蒲公英春初生苗。葉如苦苣。有細刺。中心抽一莖。莖端出一花。色黃如金錢。俗訛爲僕公罌。是也。(蘇頌) ⑤地丁江之南北頗多。他處亦有之。嶺南絕無。小科布地四散而生。莖葉花絮。並似苦苣。但小耳嫩苗可食。庚辛玉册云。地丁葉似小蒿。花似大旋。苗一莖。聳上三四寸。斷之有白汁。二月採花。三月採根。可制采伏三黃。有紫花者名大丁草。出太行。王屋諸山。陳州亦有。名燒金草。能殺硃砂。一種相類。而無花者。名地膽草。亦可伏三黃。砒霜。(李時珍) ⑥蒲公英。卽蒲公英之處方用名。詳『蒲公英』條

【蒲公英】卽蒲公英之古籍別名。

惡刺狐尿刺瘡。即愈。【元】朱丹溪

本草衍義補遺論蒲公英曰。解食毒。散滯氣。化熱毒。消惡腫。結核。疔腫。【明】李時珍本草綱目論蒲公英曰。搽牙烏鬚髮。壯筋骨。【明】

希雍本草經疏論蒲公英曰。蒲公英味甘平。其性無毒。當是入肝入

胃解熱涼血之要藥。乳癰屬肝經婦人經行後肝經主事。故主婦人

乳癰腫乳毒。並宜生啖之良。【清】

黃宮繡本草求真論蒲公英曰。蒲公英即黃花地丁草也。味甘性平。

能入陽明胃厥陰肝。涼血解熱。故

乳癰乳巖爲首重焉。且能通淋。擦

牙染髮。塗刺。及解食毒疔毒。緣乳

頭屬肝。乳房屬胃。乳癰乳巖。多因

熱盛血滯。用此直入二經。外敷散

腫。發效。內消須同夏枯。貝母。連翹

白芷等藥同治。況此屬土。花黃。故

於食滯可解。毒氣可散。又能入腎

涼血。故於鬚髮可染。獨莖一花者

是有極者非。【清】王士雄隨息居

飲食譜論蒲公英曰。蒲公英甘平

清肺利膈化痰散結消癰養陰涼

血舒筋。固齒通乳益精。煬可爲蔬

老則入藥。洵爲上品。今人但以治

乳患。抑何陋耶。別有紫花地丁一名如意草。甘涼清熱補虛消癰涼血耐飢益氣。爲救荒仙草。以生嚼無草氣。故可同諸草木葉咀食充飢也。

國外學說 日本學說謂漢醫

於黃疸皮膚消化不良。用蒲公英根。而西醫亦有用者。日本藥局方

之主效。爲苦味健胃緩下等。即爲

苦味健胃藥。於消化不良。與他藥

配用。自五。〇至一。〇。〇。又製

爲越幾斯。每一回自。〇。五至一

。五。亦爲苦味健胃藥。又日本藥

局方曰。蒲公英係將蒲公英草全

部。於春季開花前採取曬乾者。此

草之葉。作大鋸齒狀。缺裂。根長一

至二特西米突粗。〇。五至二。

五仙米呈褐色。帶縱溝。其橫截面

現非放線狀之黃色木心。皮部厚

有同心性並列之多數乳脈管。英

美學說謂蒲公英英國名獅牙草。

產中國歐羅巴美國等處。其根無

論鮮乾。均可入藥。酒水均能提出

功力。根長約六寸至一尺餘。橫約

四分至八分。內汁甚多。宜在中秋

節後取之。此草於歐羅巴爲野生

之草。其用爲藥物。亦已多年。有植物學家曾查常出售之蒲公英根。內含有人參根。龍膽草根。苦菜根等質。用此根最合宜之法。將其汁熬成膏。有人將其根炒之。代咖啡之用。又有人將其乾粉與咖啡相雜。其作用爲輕瀉藥。改血藥。散炎化癰藥。又爲利小便藥。如肝與內腎之病。並皮膚久病等。均可用之。然性最輕。其平和之性。略與土茯苓相同。其功用又能動膽汁。作養水膏等服之。均效。治胃不消化。大便結。肝積血。肝寒生酸症。〔須佐瀉藥同服〕癰疾。〔須發過後服之〕。處方蒲公英乾根八錢切片搗爛。清水十六兩八錢煮沸至一刻鐘之久。隔淨。隔時再加沸水。收足十六兩八錢爲度。每服一兩二錢六分至二兩五錢二分。治胃不消化等患極效。〔蒲公英煮水方〕又蒲公英鮮根四斤。搗爛。扭汁候澄清。將上面淨者。搾出。入鍋。熬十分鐘。熱不過二百一十二度。濾渣。再入燒鍋。散氣。熱不過一百六十度。成膏爲度。每服八釐至二六釐。〔蒲公英膏方〕又蒲公英乾

根四十分粗末。淡酒八十分。汽水酌用。先用酒浸蒲公英二天。扭出二十分。另存。再用水四十分。浸二天。用絞盤絞渣。過布入燒鍋。散氣。餘十八分爲止。加前留之二十分調勻。再加汽水。仍足四十分爲度。每服五分至二錢。〔蒲公英流膏方〕按本草綱目謂其甘平無毒。主治婦人乳癰。煮汁飲及封之。立消。解毒散滯氣。消惡腫。結核。疔腫。蛇蟹腫痛。恐未必能有此功力。

近人學說 顧子靜曰。蒲公英爲菊科植物。蒲公英之宿根草。於春季開花前。採其根及全草。乾燥而用之。含苦味質及鉀鹽鈣鹽。其新鮮植物中流出之乳汁。則含樹脂質。春季含鹽類多。苦味質少。秋季則反之。蒲公英之作用。苦味質可健胃。鹽類有緩下之效。製爲稠厚之膏用之。膏之用量。每服一分三釐至四分。一日服三次。〔張山雷曰。蒲公英莖葉皆似薑黃。吾鄉甚多。折其莖葉。有白汁溢出。如乳汁。故俗呼爲羊奶奶草。潮湖謂關中謂之狗乳草。亦此意也。其性清涼。治一切疔瘡。癰瘍。紅腫熱毒。

(綱目)

外國名詞 Hydrosme Riv
ieri, Engl. (拉丁) n n a n y a k
モイ(日本)

基本 係天南星科。藥用蒟蒻
之根。

產地 在原野川澤間。

形態 蒟蒻爲毒草類之多年
生草本。高至二尺餘。葉爲掌狀複
葉。由羽狀之裂片而成。葉脈呈網
狀。葉柄長。夏日開單性花。穗狀花
序。肉質甚長。有苞頗大。其地下肥
大之球狀部。味最毒。製爲褐腐。可
供食用。或用球狀部所採之粉末。
供輕氣球及空氣枕之塗料。以防
氣體之漏泄。其根圓如珠。亦可供
藥用。



蒟蒻

性質 辛。寒。有毒。
主治 癰腫。風毒。摩傳腫上。搗
碎。以灰汁煮成餅。五味調食。主消
渴。

十四 靈 蒟

參攷資料 ①按三元延壽書

云。有人患瘰。食物不忌。見隣家修
蒟蒻求食之。遂多食而瘰愈。又
有病癰癰者。數人多食之。亦皆愈。

(汪機) ②性冷。其不益人。冷氣人
少食之。生則戟入喉。出血。(李廷

飛) ③蒟蒻頭出吳蜀。葉似由駝牛

夏。根大如碗。生陰地。雨滴葉下生

子。又有斑杖。苗相似。至秋有花直

出生。赤子根。如蒟蒻。毒猛不堪食。

虎杖亦名斑杖。與此不同。(馬志)

④江南吳中。出白蒟蒻。亦曰鬼芋。

生平澤極多。人採以爲天南星。了

不可辨。市中所收。往往是此。但南

星肌細膩。而蒟蒻莖斑花紫。南星

莖無斑。花黃爲異爾。(蘇頌) ⑤蒟

蒻出蜀中。施州亦有之。呼爲鬼頭

。閩中人亦種之。宜樹陰下。掘坑積

糞。春時生苗。至五月移之。長一二

尺。與南星苗相似。但多斑點。宿根

亦自生苗。其滴露之說。蓋不然。經

二年者。根大如碗。及芋魁。其外理

白。味亦麻。人秋後採根。頭淨。擦或

搗。或片段。以鹽灰汁煮十餘沸。以

水淘洗。換水更煮五六遍。即成凍

子。切片。以苦酒五味淹食。不以灰

汁。則不成也。切作細絲。沸湯汆過。

五味調食。狀如水母。絲馬志言。其

苗似半夏。楊慎丹鉛錄言。蒟蒻即

此者。皆誤也。王楙農書云。救荒之

法。山有粉葛。蒟蒻。橡栗之利。則此

物。亦有益於民者也。其斑杖。即天

南星之類。有斑者。(李時珍)

【蒟蒻】 命名 本品可以調味。

故謂之醬。

處方用名 蒟醬子。蒟醬葉。蒟

醬根。

古籍別名 蒟子。(廣志) 土蕒

菱。扶留藤。扶留。浮留。(孟詵) 其苗

名惡土蕒。藤葉。(綱目) 浮留藤

(植物學大辭典)

外國名詞 Piper Bete, L.

(拉丁) キンパ(日本)

基本 係胡椒科土蕒藤屬。藥

用蒟醬之根。葉與子

產地 凡兩廣滇南及川南等

處。恒多有出。

形態 蒟醬爲芳草類之蔓生

草本。葉似玉瓜。而厚大。有光澤。實

似桑椹。皮黑。肉白。其根葉子。採得

可供藥用。

製法 雷斅曰。凡採得後。以刀

刮上粗皮。搗細。每五錢。用生薑自

然汁五兩。拌之。蒸一日。曝乾。用

性質 辛。溫。無毒。

主治 下氣。溫中。破痰。

歷代記述攷證 【唐】李珣海

藥本草論蒟醬曰。咳逆上氣。心腹

蟲痛。胃弱。虛瀉。霍亂吐逆。解酒食

味。唐孟詵食療本草論蒟醬曰。

散結氣。心腹冷痛。消穀。明。李時

珍本草綱目論蒟醬曰。解瘴癘。去

胸中惡邪。邪氣。溫脾燥熱。

參攷資料 ①按拾含云。蒟子

可以調食。故謂之醬。乃蕒菱之類

也。故孟詵食療謂之土蕒菱。其蔓

葉名扶留藤。一作扶櫬。一作浮留

莫解其義。蓋則留字之訛也。(李

時珍) ②今藥川嶺南皆有之。昔

漢武帝使唐蒙曉諭南越。越王食

蒙以蒟醬曰。此出番禺城下。武帝

感之。遂開牂牁越嶲也。劉涓子注

蜀都賦云。蒟醬綠木而生。其子如

桑椹。熟時正青。長二三寸。以蜜及

鹽藏而食之。辛香。與蘇恭所說大

同。小異。蓋涓子所云乃蜀產。蘇恭

者。長七八寸至尺餘。有名百尋鞭。一名筋鞭 (Sijikhen) 者。俱非眞品。又有以鹽醃者亦然。又日本山海名產圖繪曰。書鰩鮓獸作鰩鮓。係指外腎。即舉丸也。藥用頗少。用肉。其以陰莖售賣者。當係此外腎之誤。由津輕南部出產。種類頗多。眞偽難辨。或云海獺海豹。即其總稱。其曰海豹者。皮有黑斑點。似鰩鮓。當係羣鹿同種。海獺形狀全與鰩鮓相似。其前齒二重者。爲眞鰩鮓。一說祇上齒爲二重齒。頭上有吹水之孔。隱毛間不易見肉。或百尋鞭投水中而水溫不凍者。爲眞品。陰莖亦有僞者。以百尋製成。故無毛。號百尋鞭。眞者長三寸許。赤色。根有毛。全身灰黑。似水獺而微長。形似貓而小。口之吻鬚甚大。腮次左右有足。似大鰭。後足在尾前。俱長一尺。其端有五爪。尾頗細。居海底最深處。或於海邊石上結伴。野睡。惟其中必有一隻不睡。見有船來。立發聲醒睡者。匿入水中。性善游泳。越潮甚疾。此種爲眞鰩鮓。但海獺亦一切與之相同。故

十四畫 鰩

今所謂鰩鮓者。多爲海獺。眞者甚難得。本草集解言。此出東海水中。可見中華亦甚少此物。係運自日本者也。蝦夷呼其大者爲涅資夫 (Nesaku) 中者爲招基 (Chaki) 小者爲烏涅烏 (Uen) 是爲眞鰩鮓。呼鰩爲鐵資照 (Teshi) 呼一隻爲一羽。津輕取此鐵資照爲肴。呼其中之大者爲托 (To) 今女孩呼爲托托 (Toto) 或本於此。亦未可知。中華亦有此語云。又夫木集雜十八夢。有建長八年百首歌合衣笠內大臣所詠詩云。我之戀愛。有若海鰩 (托托) 睡流未醒之夢云云。此所謂海鰩者。爲海馬之一種。非鰩鮓之類也。又海鰩。日本紀神代卷龍宮章下。訓作三千皮。蝦夷人之捕此。乘用繩經絡之。船見有羣睡漂流者。則揮狐尾以嚇不睡之一隻。使不敢聲而遁去。乃用矢或魚叉射捕睡者。其技至精。頗不易及。船概不用棹。而於前後搖之。或曰。鰩鮓當係指鰩。何爲指外腎。某書載有欲得其鰩者。托松前部之兩人。覓之終難得。詢之土人。乃云。鰩與陰莖甚

瀾。取陰莖必損鰩。故無有全者云。或云。此當是雄者。若雌必有鰩。辨僞。鰩鮓。以臍置於臘月。衝風處。水中浸之不凍者眞也。蓋本品多僞者。因海中有獸。號曰水鳥龍。土人取其腎以充鰩鮓。臍也。然眞僞有別。不難分辨。眞者有一對。則兩重薄皮裹丸核。其皮上自有肉。黃毛。一穴三莖。收之器中。年年溼潤如新。或置睡犬頭上。其犬忽驚跳若狂者眞也。

配合應用 ①同陽起石。肉蓯蓉。巴戟天。菟絲子。山茱萸。鹿茸。能壯陽道益精。

②有鰩鮓丸。治諸虛勞損。鬼疰邪惡。夢與鬼交。精氣之絕等證。(和劑局方)

用量 每服八釐七毫半至一分七釐半。

施用宜忌 凡陽事易舉。以及骨蒸勞嗽者忌服。

參攷資料 ①鰩鮓。臍。鹹熱之品。本入命門補火。脾家所快者。臍熱也。故亦入之。助陽之功。獨甲鰩。今出登萊州。即海狗腎也。其狀頭似豕。尾似魚。止生兩足。價殊貴。

類多僞者。須細辨之。(李士材) ②鰩鮓。或謂連臍取下故名。臍。或謂鰩鮓獸之臍也。按兩名不類。恐一是海魚之腎。一是山獸之臍也。綱目以此條入獸部。(汪詒庵) ③鰩鮓。今出登萊州。藥性論以謂是海內狗外腎。日華子又謂之獸。今觀其狀。非狗非獸。亦非魚也。但前即似獸。尾即魚。其身有短密淡青白毛。腹脇下全白。仍相間於淡青白毛。上有深青黑點。久則色復淡。皮厚且韌。如牛皮。邊將多取以飾鞍轡。其臍治臍腹積冷精衰。脾腎勞極有功。不待別試也。似狐長尾之說。蓋今人多不識鹿獐之屬。又小於獐。但口兩邊有長牙好鬚。則用其牙皮爲第一。無出其右者。然多牙傷痕。四方皆有。山深處則頗多。其聲如擊破錢。(寇宗奭) ④骨鮑獸。生西番突厥國。胡人呼爲阿慈勃他。你。其狀似狐而大。長尾。臍似麝香。黃赤色。有如爛香。(陳藏器) ⑤按臨海志云。出東海水中。狀若鹿形。頭似狗。長尾。每日出。即浮在水面。昆嵎家以弓矢射之。取其外腎。陰乾百日。味甘香美也。

十四畫 腦

清水臟。積寒停飲。塗皮膚皴癢。

參攷資料 ①蓬萊李金什言

其地登州海口。出海狗。皮可作裘帽。俗美其稱曰海龍。即此其腎乃

藥中腦。腦。土人取海狗名曰打狗。此物晝夜潛海底。惟孕乳時登島。產子稍大。即相率入水。人不可得。須冬月極凍時。海中水口結冰。天晴海狗羣出。處冰上曝日。必候其入水時。驟入水以木棍擊其腰。方可得之。若冰裂或步履有聲。非其睡時。皆不可得。然每年打狗。墮水溺死。亦多。因利重。人亦不惜驅命以往。(趙學敏) ②觀近海人取鰵魚海參者。用其油滴海面。海水即清見底。砂石畢見。可知其性之

分利也。(趙學敏)

【腦。腦。腦】 命名 本品乃腦。腦。之。腦。故名。實則與腎

同用者。

處方用名 海狗腎。

古籍別名 骨納。海狗腎。(綱目) 阿慈勃他(陳藏器) 骨蝕。骨

訥。蝕。和漢藥考)

外國名 鰵。Castoreum。(拉丁)(Castor)。(英)カストレウ

△(日本)

基本 係將鰵脚類腦。腦。之

陰莖。丸。及。睪。連。同。切。取。者。

產地 ①甄權謂腦。腦。是新

羅國海內狗。臨海志謂腦。腦。出東海中。寇宗奭謂腦。腦。今出登萊州。李時珍謂腦。腦。出遼西營州。及結骨國與三佛國等處。陳仁山藥物生。產。辨。云。腦。腦。產美國大呂宋。為最。中國北邊。近俄國等處。亦有出。

形態 腦。腦。為棲息海上之

獸。類。形。如。狗。有。吻。鬚。四。肢。悉。作。鰵狀。尾。短。小。適。於。游。泳。壯。者。體。長。五。六。尺。牝。者。祇。及。其。半。幼。時。毛。色。黑。漸。長。則。變。茶。褐。色。有。青。黑。色。斑。點。腹。部。生。白。毛。動。作。活。潑。感。覺。銳。敏。

製法 海狗之陰莖。與。丸。用

酒。浸。一。日。紙。裹。炙。香。剉。搗。或。置。銀

器。中。以。酒。煎。熟。炙。脆。李。時。珍。曰。以

漢。椒。樟。腦。同。收。則。不。壞。

用法 細。剉。搗。用。合。藥。為。丸。服。

性質 鹹。大。熱。無。毒。

效能 固。精。強。陽。煖。腎。補。肝。有。溫。補。滋。養。之。效。而。功。近。菴。鎖。陽。主。治 治。男。子。宿。癥。氣。塊。積。冷。

勞。氣。腎。精。衰。損。多。色。成。勞。瘦。悴。

歷代述記攷證 【唐】陳藏器

本草拾遺論海狗腎曰。治。鬼。氣。尸。疰。夢。與。鬼。交。鬼。魅。狐。魅。心。腹。痛。中。惡。邪。氣。宿。血。結。塊。痼。癖。癰。瘰。【唐】李。珣。海。藥。本。草。論。海。狗。腎。曰。治。五。勞。七。傷。陰。痿。少。力。腎。虛。背。膊。勞。悶。面。黑。精。冷。【宋】食。華。子。諸。家。本。草。論。海。狗。腎。曰。補。中。益。腎。氣。暖。腰。膝。助。陽。氣。破。癥。結。療。狂。驚。癰。疾。【清】黃。宮。繡。本。草。求。真。論。腦。腦。曰。海。狗。腎。即。腦。腦。係。西。番。獸。物。足。似。狗。而。魚。尾。今。東。海。亦。有。味。甘。而。鹹。其。腎。即。獸。之。腎。投。於。睡。熟。犬。邊。犬。即。驚。跳。腦。月。浸。置。水。內。不。凍。其。性。之。熱。殆。可。見。矣。故。書。載。治。宿。血。疝。癖。疝。疝。症。者。取。其。鹹。能。入。血。軟。堅。溫。能。通。行。消。散。也。用。其。佐。房。術。者。取。鹹。溫。入。腎。補。虛。固。精。壯。陽。道。也。此。藥。雖。置。器。中。長。年。溫。潤。然。能。入。水。不。凍。大。不。同。於。他。藥。若。云。功。近。菴。蓉。鎖。陽。調。離。相。若。氣。質。不。同。不。無。重。視。菴。蓉。鎖。陽。而。輕。視。此。物。也。但。脾。胃。挾。有。寒。溼。者。亦。忌。以。淫。過。溼。故。耳。恐。相。礙。也。酒。浸。紙。裹。炙。香。剉。搗。或。於。銀。器。中。以。酒。煎。熟。合。藥。

用。

一五五八

國外學說 英美學說謂腦。腦。

腦。產。中。國。之。北。方。北。亞。美。利。加。俄。羅。斯。國。等。係。海。狗。腎。眼。前。之。小。囊。與。其。內。所。結。成。之。質。海。狗。之。腎。與。麝。香。有。相。似。處。古。時。即。以。此。入。藥。品。其。產。北。亞。美。利。加。者。能。以。泥。與。木。成。窩。便。於。居。住。最。靈。巧。其。產。歐。羅。巴。之。北。者。則。不。以。泥。木。造。窩。而。惟。挖。地。作。洞。西。國。尋。常。出。售。之。海。狗。腎。有。二。種。一。為。北。亞。美。利。加。運。來。一。為。俄。羅。斯。國。所。產。如。欲。分。辨。之。可。將。其。一。分。在。純。酒。十。六。分。內。浸。之。如。變。黃。色。者。即。知。為。俄。羅。斯。所。產。如。係。深。棕。色。者。即。知。為。北。亞。美。利。加。所。產。腦。腦。頗。有。行。氣。治。轉。筋。之。性。能。治。數。種。腦。筋。病。與。肉。筋。跳。痛。等。病。過。服。令。人。脈。數。發。熱。少。服。能。平。脈。治。鬱。病。羊。癰。風。熱。症。類。瘧。疾。可。配。酒。用。日。本。日。用。藥。品。老。曰。此。由。蝦。夷。松。前。津。輕。等。出。產。惟。真。品。甚。少。多。用。海。狗。腎。為。充。凡。用。腦。腦。係。用。宰。九。綱。目。諸。說。皆。然。獨。日。本。則。向。來。沿。用。陰。莖。謂。之。腦。腦。腦。(Takari) 真。者。赤。色。長。二。三。寸。根。有。毛。今。藥。舖。所。售。

典見綱目拾遺。詳「紅木香」條。

【緋帛】 命名 本品係用染絲造成之帛即紅色之絹也故名。

主治 燒研傳初生兒臍未落時腫痛。又療惡瘡疔腫諸瘡。有根者入膏用爲上。仍以掌大一片。用露蜂房。蝦刺。刺爛草節。亂髮等分燒研。空腹服方寸匕。

歷代記述攷證 【元】王好古湯液本草論緋帛曰。主墜馬。及一切筋骨損。【明】李時珍本草綱目論緋帛曰。燒研。療血崩。金瘡出血。白駁風。

【緋桃】 卽桃之古籍別名。典見綱目。詳「桃」條。

【緋絹】 基本 本品爲絹之赤色者。主治 燒灰服。療瘧疾。

【翠羽草】 命名 本品葉細。攢簇如羽狀而有翠斑故名。

古鑑別名 翠雲草。孔雀花。神錦花。鸛翎草。鳳尾草。矮脚鳳尾。翠錦草。金雞獨立草。【綱目拾遺】開屏鳳尾。【綱目拾遺】

產地 生山野陰溼諸地。

形態 翠羽草爲溼草類之多。年生隱花植物。獨莖成叢。無直梗。其莖細長。倒懸或不鋪於地。其根遇土卽生。見日卽萎。故生陰溼之地。採得可供藥用。

主治 止吐血。散喉風。辟暑邪。解毒。同胡桃葉煎洗痔漏。

參攷資料 ①翠羽草爲散喉癰之聖藥。【採藥志】 ②嘉慶癸亥。予寓西溪。吳氏家次子。年十五。忽腹背患起紅瘰。蔓延及腰如帶。或云蛇經瘡。或云丹毒。乃風火所結。血凝滯而成。予疑其入山樵採。染蟲毒。乃以蟾酥。犀黃。鎔塗之。不效。二三日瘰愈大。作膿。復典以如意金黃散敷之。亦不效。次日瘡旁復起紅暈。更爲闊大。有老嫗教以用開屏鳳毛。卽翠雲草也。搗汁塗上。一夕立消。此草解火毒如此。又不特治血神效也。【綱目拾遺】

【翠梅草】 卽毛葉仙橋之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「毛葉仙橋」條。

【翠翎草】 卽金鳳毛之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「金鳳毛」條。

③卽翠羽草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「翠羽草」條。

【翠蛇】 形態 翠蛇爲爬蟲類。蛇屬之一種。長達五六寸。形如曲蟠。蟠旋作團。可供藥用。主治 癰疽。癰毒。

【翠鳥舌】 卽魚狗舌之原名。詳「魚狗舌」條。

【翠雲草】 卽翠羽草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「翠羽草」條。

【翠碧鳥】 卽魚狗之古籍別名。典見綱目。詳「魚狗」條。

【翠鰐】 卽橄欖之古籍別名。典見和漢藥考。詳「橄欖」條。

【水藻】 條。

【腐】 卽豆腐之簡稱。詳「豆腐」條。

【腐巴】 卽腐杞。

【腐皮】 卽豆腐皮之簡稱。詳「豆腐皮」條。

【腐乳】 卽豆腐乳之簡稱。詳「豆腐乳」條。

【腐沫】 卽豆腐沫之簡稱。詳「豆腐沫」條。

【腐泔】 卽豆腐泔水之簡稱。詳「豆腐泔水」條。

【腐把】 卽豆腐把之簡稱。詳「豆腐把」條。

【腐婢】 卽赤豆花之原名。詳「赤豆花」條。

【腐渣】 卽豆腐渣之簡稱。詳「豆腐渣」條。

【腐腸】 卽黃芩之古籍別名。典見本經。詳「黃芩」條。

【腐漿】 卽豆腐漿之簡稱。詳「豆腐漿」條。

【腐脂】 條。

【臘脂】 原名 海狗油。形態 臘脂。脂。色綠。狀如乾糊。可供藥用。性質 熱。無毒。主治 善降三焦濁逆之氣。能

燥溼解毒。化涎之功。與白礬同而力差緩。按張三丰仙傳方載伐木丸云。此方乃上清金蓬頭祖師所傳。治脾土衰弱。肝木氣盛。木來剋土。病心腹中滿。或黃腫如土色。服此能助土益元。用蒼朮二斤。米泔水浸二宿。同黃酒麴麴四兩炒赤色。皂礬一斤。醋拌晒乾。入瓶火煨爲末。醋糊丸。梧子大。每服三四十丸。好酒米湯任下。日二三服。李時珍常以此方加平胃散。治一賤役中滿腹脹。果有效驗。蓋此礬色綠。味酸。燒之則赤。既能入血分。伐木又能燥溼。化涎。利小便。消食積。故脹滿黃腫。癰痢疳疾。往往用之。其源則自張仲景用礬石消石。治女勞黃。疔方中變化而來。頌曰。劉禹錫傳信方治喉痺。用皂莢礬入好米醋同研。含之。嚥汁立瘥。此方出於李壽。甚奇妙。皂莢礬卽綠礬也。李時珍云。綠礬可以染皂色。故謂之皂礬。又黑礬亦名皂礬。不堪服食。惟瘡家用之。赤者俗名礬紅。以別朱紅。李時珍云。綠礬出隰州溫泉縣。池州銅陵縣。並煎礬。燒生。爲初生皆石也。煎煉乃成。其

形似朴硝而綠色。取置鐵板上聚炭燒之。鑾沸流出。出色。赤如金汁者。是真也。沸定時。汁盡。則色如黃丹。又有是莢鑾。或云卽綠鑾也。(蘇頌) ①綠鑾新出。窟未見風者。正如琉璃色。人以爲石膽燒之。赤色。故名綠鑾。出瓜州者良。(蘇恭) ②綠鑾雪地。河內、西安、沙州皆出之。狀如煨消。其中揀出深青。瑩淨者。卽爲青鑾。煨過變赤。則爲綠鑾。入圪塹及漆匠家多用之。然貨者亦雜以沙土爲塊。昔人往往以青鑾爲石膽誤矣。(李時珍)

【綠鬢膏】卽細辛之古籍別名。典見和漢藥考。詳「細辛」條。

【綠鹽】 命名 本品爲鹽之綠色者。故名。

古醫別名 鹽綠。石綠。(綱目)

產地 出波斯。或謂出新疆。

採取 以久藏而色不變。陰雨時。仍乾燥而不溼者爲眞。入藥用。

性質 鹹。苦。辛。平。無毒。

主治 目赤。淚出。膚腎眇暗。

歷代記述攷證 【唐】李珣海藥本草論綠鹽曰。點眼。明目消聲。療小兒疳氣。

【綠欖】卽橄欖綠色者之古籍別名。典見綱目。詳「橄欖」條。
 【綱草】卽秦艽之古籍別名。典見和漢藥考。詳「秦艽」條。
 【綸】卽昆布之古籍別名。典見爾雅。詳「昆布」條。
 【綸布】卽昆布之古籍別名。典見吳普本草。詳「昆布」條。
 【綻穀芽】卽穀芽之處方用名。詳「穀芽」條。
 【棗菜】卽睡菜之古籍別名。典見綱目。詳「睡菜」條。
 【綿】卽絲棉之原名。詳「絲綿」條。
 【綿大戰】卽大戰之處方用名。詳「大戰」條。

【綿灰】 至治 吐血衄血下血
崩中赤白帶下疳瘡臍
瘻瘰耳。

【綿羊】 卽羊之一種。肉之功用。詳

『羊肉』條。

【綿杜仲】 卽杜仲之處方用名。詳

『杜仲』條。

【綿書】 卽黃書之古籍別名。典見

綱目。詳『黃書』條。

【綿桃】 卽桃之古籍別名。典見綱

目。詳『桃』條。

【綿茵陳】卽茵陳蒿之處方用名。詳「茵陳蒿」條。

【綿梨】卽梨之古籍別名。典見綱目。詳「梨」條。

【綿絮頭草】
古籍別名 金
沸草。地蓮。黃花
子草。（綱目拾遺）
產地 生山野間。

形態 綿絮頭草爲山草類之一種。立春後發苗。布地生。葉似槲火而薄。有白毛。並有白綠色。青白質堅韌。氣清香。立夏後開黃花成簇。一莖直上。本小如剪刀草。其莖葉可供藥用。

性質 酸寒。有小毒。

主治 囊風溼痹。梅瘡下疳。同甘草煎洗。並療小兒疳疾。抹粉作饑食。

參考資料 綿絮頭草多食損目。（趙學敏）

【綿黃耆】卽黃耆之處方用名。詳「黃耆」條。

【黃耆】條。

【綿橘】卽橘子微小而軟美可愛者之古籍別名。典見橘譜。詳「橘」條。

【馨骨香】卽紅木香之古籍別名。

內。新瓦蓋定。鹽泥固濟。煨赤。取出。入青鹽、生硫黃各一兩。研勻。再入鍋中。固濟煨赤。取出。去火毒。研入熟附子末一兩。粟米粥糊丸。梧子大。每空心米飲溫酒任下三十丸。
(永類鈴方)

①治婦人血崩。青礬二兩。輕粉一錢。爲末。水丸。梧子大。每服二三十丸。新汲水下。(摘玄方)

①治血證黃腫。綠礬四兩。百草霜一升。炒麵半升。爲末。沙糖和丸。梧子大。每服三四十丸。食後薑湯下。鄉時舉所傳。又方。小麥淘淨一升。皂礬半斤。同炒黃爲末。黑棗肉半斤。搗勻。米醋打糊丸。梧子大。每薑湯下。八九十丸。日三服。(簡便方)

①治脾病黃腫。青礬四兩。煨成赤珠子。當歸四兩。酒醪浸七日。焙。百草霜三兩。爲末。以浸藥酒打糊丸。梧子大。每服五丸至七丸。溫水下。一月後黃去正效。又方。綠礬四兩。百草霜五倍子各一兩。木香一錢。爲末。酒煎飛麩丸。梧子大。每空心酒下五丸。又方。平胃散。青礬二兩。爲末。醋糊丸。米飲下。或加烏沉

湯四兩。酒糊丸亦可。(澤古方)

①治酒黃水腫。黃腫積痛。用青礬半斤。醋一大盞。和勻。瓦盆內煨乾。爲度。平胃散。烏藥。順氣散。各半兩。爲末。醋煮糊丸。梧子大。每酒或薑湯下。二三十丸。不忌口。加錫灰。
(趙原楊真人濟急方)

①治食勞黃病。身目俱黃。青礬鍋內安炭煨赤。米醋拌爲末。棗肉和丸。梧子大。每服二三十丸。食後薑湯下。(救急方)

①治腹中食積。綠礬二兩。研末。醋一大盞。瓷器煎之。柳條攪成膏。入赤脚烏一兩。研丸。綠豆大。每空心溫酒下五丸。(聖惠方)

①治疳蟲食土及生物。研綠礬末。豬膽汁丸。綠豆大。每米飲下五七丸。(保幼大全方)

①治小兒疳氣。不可療者。綠礬煨赤。醋淬三次。爲末。棗肉和丸。綠豆大。每服十九丸。溫水下。日三。(集驗方)

①治走馬疳瘡。綠礬放入鍋內。炭火煨紅。以醋拌勻。如此三次。爲末。入麝香少許。溫漿水漱淨。搽之。
(談野翁試效方)

①治白禿頭瘡。皂礬、棟樹子燒研。搽之。(普濟方)

①治小兒頭瘡。綠礬一兩。淡豉一兩。炒黑。膩粉二錢。研勻。以桑灰湯洗淨。搽之良。

①治小兒甜瘡。大棗去核。填入綠礬。燒存性。研貼之。(拔萃方)

①治耳生爛瘡。棗子去核。包青礬。煨研香油調傳之。(摘玄方)

①治癰蝕入耳。水調綠礬灌之。(普濟方)

①治蛆入耳中。綠礬搽之。卽化爲水。(摘玄方)

①治瘡中生蛆。綠礬末。搽貼卽化爲水。(摘玄方)

①治湯火傷灼。皂礬和涼水澆之。其疼卽止。腫亦消。(楊誠經驗方)

①治癰瘡作瘻。螺螄十四個。植樹皮末一兩。入盆內。蒸熟。入礬紅三錢。搗勻。搽之。(孫氏集效方)

①治甲疽疔延爛。崔氏方。治甲疽或因割甲傷肌。或因甲長侵肉。遂成瘡腫。黃水浸淫。相染。五指俱爛。漸上脚。跌。藥四邊起。如火燒。瘡日夜怪。醫不能療。綠礬石五兩。

燒至汁盡。研末。色如黃丹。收之。每以鹽湯洗拭。用末厚傅之。以軟帛煨裹。當日卽計斷瘻。乾。每日一溫鹽湯洗。濯。有膿。使淨。俾其痂乾。處不須近。但有急痛。處。塗酥少許。令潤。五日卽覺上痂起。依前洗。傅。十日痂漸剝。軟。處。或更生白膿。卽擦破。傳之。自然瘻也。張侍郎病此。臥經六十日。京醫並處方無效。得此法。如神。(外臺祕要方)

①治婦人甲疽。婦人趾甲內生瘡。惡肉突出。久不愈。名臭田螺。用皂礬。日晒夜露。每以一兩。煎湯洗。仍以礬末一兩。加雄黃二錢。硫黃一錢。乳香。沒藥。各一錢。研勻。搽之。醫方摘要方)

①治塗染白髮。綠礬、薄荷、烏頭等分。爲末。以鐵漿水浸。日。日染之。(相感志方)

①治腋下胡氣。綠礬半生。半煨。爲末。入少輕粉。以半錢。浴後薑汁調。搽。候十分熱痛。乃止。(直指方)

用量 五分至錢半
施用宜忌 凡脾胃虛寒及無積滯者禁用。
參攷資料 ①綠礬酸涌滴收。

十四畫 綠

通常用爲收斂藥。治慢性腸加答兒腸出血尿遺出血肺出血等用量以五・〇一〇・〇溶於一〇〇・〇水內可爲藥法料以〇・五一二・〇溶於一〇〇・〇水內可作注射料以一・〇與五・〇獸脂相和可作軟膏以三・〇一五〇・〇可爲全身浴料內服每次〇・〇五一〇・二五又英美學說謂青礬有從鐵質與磷強水製成更有從黑礬煉成露空氣則略化印度國人俱用此質造墨水古時羅馬人亦言此質能造墨其天生者亦有之俗名皂礬其作用爲惹胃而兼收斂之鐵劑又可爲行經藥其補斂於鐵劑中爲上品如血弱身虛者宜服第不宜過服多服以過服則肚疼作嘔或至壞身又如血少面白者宜合龍膽草膏及蘆薈硫磺等藥作丸服之甚驗或以青礬水化並加礬強水少許同服均妙此藥雖與他類鐵劑功用相同然能惹腸胃單服者甚少處方以青礬一分二釐嘔嘔一分二釐肉桂末三分二釐以水和勻作丸八粒每日飯後服二

粒。治身弱血少心跳及婦人月經不行等症(青礬丸方)又青礬五釐二毫半水一兩化勻爲度洗火眼或作射水亦可并治白帶白濁(青礬洗水方)又青礬一分黃油膏三十分以調勻爲度治金錢癬(青礬油膏方)每服一釐七毫半至八釐七毫半

近人學說 鄒爾凱曰綠礬產天然之礦物或溶鐵於硫酸之中或燒黃鐵礦後使爆於空中製之呈綠色之結晶故名綠礬又名皂礬或稱青礬化學記號爲 $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ 故又名硫酸鐵味酸鹹而帶澀古書謂能收痰除溼殺蟲破血分積垢近代西醫則多用爲補血劑工業上常用爲製墨水之顏料易溶於水不溶於酒精其主要成分既爲鐵質則爲補血劑無疑惟含鐵質之藥品甚多綠礬乃其劣等故藥學上不見常用(市上

售者不良西藥房有精製者)又綠礬之用量不能過多通常以二釐至五釐爲止如服過量則起嘔吐與腹痛等及古人所謂除痰破血者也凡服鐵質之藥入胃後

一五五四

礬在內火煨熟以河水并水各一盞桃柳心各七個煎糊每點少許入背上(摘玄方)

④治爛弦風眼青礬火煨出毒細研泡湯澄清點洗亦治倒睫拳毛(永類鈴方)

⑤治瘧疾寒熱礬紅獨蒜頭煨等分搗丸炙子大每白湯嚼下一丸端午日合之(普濟方)

⑥治少陰瘧疾嘔吐綠礬一錢乾薑炮半夏薑製半兩爲末每服半錢發日早以醋湯下(聖濟總錄方)

⑦治翻胃吐食白麵二斤半蒸作大饅頭一個頭上開口剗孔將皂礬填滿以新瓦圍注鹽泥封固密土密安放文武火燒一日夜取出研末棗肉爲丸梧子大每服二十九粒空心酒湯任下忌酒色(醫方摘要方)

⑧治大便秘不通皂礬一錢巴霜二個同研入雞子內攪勻封頭溼紙裹煨熟食之酒下即通(集玄方)

⑨治腸風下血積年不止瘡弱甚者一服取效綠礬四兩入砂鍋

即共胃酸發生變化然後破入血中惟患熱病者消化不良者則不宜用之又綠礬與五倍子混和可得良好之顏料綠礬之配合和適應症(一)綠礬二釐大黃末一分肉桂五釐作一次服日服三次凡身弱血少心跳及因血虛而致月經不調者宜之(二)綠礬三分金雞納霜三分黃連末五分研和合成丸藥十五粒每日早晚午各服一粒爲血虛之補劑(三)綠礬五釐冷開水一兩化勻患火眼者每日用此水洗滌二次因綠礬有收斂及防腐之功也(四)綠礬石灰木炭末各一斤混和之夏秋之間隨意撒於便所痰孟陰溝等處能使臭氣消滅可爲臭藥水之代替品

配合應用 ①治重舌木舌皂礬二錢鐵上燒紅研搽之(陸氏積德堂方)

②治喉風腫閉皂礬一斤米醋三斤拌曬乾末吹之痰涎出盡用良薑末少許入茶內漱口嘔之即愈(孫氏集效方)

③治眼暴赤爛紅斑五箇入綠

【綠鳩】即青鸛之古籍別名。典見動物學大辭典。詳「青鸛」條。

【綠劍真人】即菖蒲之古籍別名。典見和漢藥考。詳「菖蒲」條。

【綠膚青】

古籍別名 推青推石(別錄)

基本 綠膚青爲雜草類之一種。可供藥用。

產地 生山谷間。

性質 辛。鹹。平。無毒。

主治 蟲毒惡瘡及解蛇菜肉諸毒。

參攷資料 綠膚青不可久服。

令人痿(別錄)

【綠萼梅】即梅花之處方用名。詳「梅花」條。

【綠礬】

命名 本品可以染皂色。故又謂之皂礬。

古籍別名 青礬綠礬(唐本)

礬紅皂礬(綱目)青明礬皂莢礬(和漢藥考)

外國名詞 Green Vitriol

(英) Eisen-vitriol (德)

基本 係鐵鹽類結晶。爲鐘乳形或纖維形之塊。

產地 陳仁山藥物生產辨云。

十四畫 綠

青礬又名綠礬。西藥名硫酸鐵。化學名鐵礦。輕養。鐵養。硫酸。產廣東各屬。均有此礬。用鐵質與黃蠟水製成者。又有用黑礬煉出者。結冰色。淡綠。而遇光露空氣略化。和漢藥考曰。日本備中及長門都產此。

形態 綠礬爲淡綠色柱狀結晶體。放置空氣中則養化。於表面生黃褐色銹。入水善溶。入酒精不溶。熱之則分解。生鐵丹。味酸。澀。微甘。刺戟舌。

製法 注水於天產黃鐵礦。放置空氣中。使之養化。將所化生者。再溶於水中。濾過。將濾液蒸發。使成結晶。卽爲本品。現時乃金銀精練處之副產物。將其精製。卽可。

性質 酸涼。無毒。

成分 綠礬爲粗製硫酸鐵($\text{FeSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$)。其黃褐色銹。爲第二硫酸鐵($\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$)。綠礬中時含有硫酸銅($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$)。作青綠色結晶體。

效能 燥溼。化痰。功適白礬。用作蝕腐及止血藥。又爲強壯藥。但易起消化障礙。又治貧血。創口出血。

血。

作用 入胃後與胃內之鹽酸化合。而成氯化鐵。或與蛋白質化合。而成蛋白質鐵。至小腸首段。鐵卽化成爲酸鐵。而次第被腸壁吸收。同時又能阻止腸黏膜之分泌。故久服有釀成大便燥結之弊。在血中能增進赤血球之數。使全身熱量增高。精神健康。體力強壯。若服量過多。則反惹起腸胃炎。與血液相遇。有直接凝固血液之功效。亦甚迅速。

主治 疳及諸瘡。

歷代配製攷證 【宋】大明諸家本草論綠礬曰。喉痺。蟲牙。口瘡。惡瘡。疥癬。癰疽。魚鱗。灰服。療腸風瀉血。【明】李時珍本草綱目論綠礬曰。消積滯。燥脾溼。化痰涎。除脹滿。黃腫。腫利。風眼。口齒諸病。【明】繆希雍本草經疏論綠礬曰。綠礬氣味所秉。與白礬同。其酸涌瀝收。燥溼解毒。化痰涎之功。亦與白礬相似。而力差緩。本經主喉痺者。酸涌化痰涎之功也。蚰牙口瘡。惡瘡疥癬者。燥溼除熱解毒之功也。腸風瀉血者。消散溼熱之後。復有收瀝之功也。然而諸治之外。又善消積滯。凡腹中堅肉積。諸藥不能化者。以礬紅同健脾胃消食藥爲丸投之。輒消。【清】黃宮繡本草求真論綠礬曰。皂礬等於白礬。味亦酸鹹而瀉。有收痰除溼去蟲殺蟲之功。但力差於白礬。而稍緩耳。且此色綠。味酸。燒之則赤。以破血分之積垢。其效甚速。如金匱之治女勞瘵。硝石礬石丸。專取皂礬以破積滯之血。且治喉痺。用此以取酸涌化痰之功。腸風瀉血。並用此以收消散溼熱之功。又有收瀝之功也。然而諸治之外。又善消積滯。凡腹中堅積。諸藥不能化者。以紅礬同健脾胃消食藥爲丸投之。輒消。胃弱人不宜多用。服此者終身忌食蕎麥。犯之立斃。

國外學說 日本學說謂綠礬爲消毒作用極強之鐵劑。亦可爲腐蝕藥。止血藥。其稀薄液用爲收斂藥。作軟膏用於丹毒癰疽。膿泡疹。梅毒潰瘍。作注射料用於淋病。白帶。又可用爲浴料。若內服過久。則害消化。若用大量則發腸胃炎。

功也。然而諸治之外。又善消積滯。凡腹中堅肉積。諸藥不能化者。以礬紅同健脾胃消食藥爲丸投之。輒消。【清】黃宮繡本草求真論綠礬曰。皂礬等於白礬。味亦酸鹹而瀉。有收痰除溼去蟲殺蟲之功。但力差於白礬。而稍緩耳。且此色綠。味酸。燒之則赤。以破血分之積垢。其效甚速。如金匱之治女勞瘵。硝石礬石丸。專取皂礬以破積滯之血。且治喉痺。用此以取酸涌化痰之功。腸風瀉血。並用此以收消散溼熱之功。又有收瀝之功也。然而諸治之外。又善消積滯。凡腹中堅積。諸藥不能化者。以紅礬同健脾胃消食藥爲丸投之。輒消。胃弱人不宜多用。服此者終身忌食蕎麥。犯之立斃。

十四畫 綠

性質 苦。酸。有小毒。

成分 主要成分爲鹽基性醋酸銅及亞砒酸之毒物等。

效能 吐風痰。治疥癬。專作皮膚病之殺蟲藥。又治黃癬。

作用 能使微血管收縮。減少黏膜之分泌。遇疥癬等菌皆能殺死之。

主治 益氣。止洩痢。療航鼻。

歷代記述攷證 【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論綠青曰。吐風痰甚效。

配合應用 ●治急驚昏迷。不省人事。石綠四兩。輕粉一錢爲末。薄荷汁入酒調一字服。取吐。(全嬰方)

●治風痰迷悶。碧霞丹。用石綠十兩。烏頭尖。附子尖。蠟梢各七十箇。爲末。糊丸。芡子大。每服一丸。薄荷汁入酒半合化下。吐出痰涎甚效驗。(和劑方)

●治小兒疳瘡。腎疳。鼻疳。頭瘡。耳瘡。久不差者。石綠。白芷等分爲末。先以甘草水洗瘡拭淨。傅之一日愈。(集玄方)

●治腋下胡臭。石綠三錢。輕粉

一錢。濃醋調塗五次。斷根。(集玄方)

用量 三分至八分。

施用宜忌 凡非氣壯邪實者禁用。

參攷資料 ●今醫家多用吐

風痰。其法揀上色精好者。研篩水飛。再研。如風痰眩悶。取二三錢。同生龍腦三四豆許。研勻。以生薄荷汁。合酒溫調服之。偃臥須臾。涎自口角流出。乃愈。不嘔吐。其功速於他藥。今人用之。比比皆效。故著之。

(蘇頌)痰在上。宜吐之。在下。宜利之。亦須觀人之虛實。強弱而察其脈。乃可投之。初虞世有金虎碧霞之戒。正此意也。金虎丹治風痰。用天雄。膩粉諸藥者。(李時珍)

●按此味善吐風痰。以其爲銅之祖氣。取金氣之精。能使水平者。莫是過也。合龍腦名碧霞散。不可以治淫痰。惟同附子尖。烏頭尖。蠟梢用者。名碧霞丹。乃可治之。中風之痰。風溼有異。此陽中陰中之分也。世人慣慣者多。(楊時泰)

●舊不著所出州土。但云生山之陰穴。中空青條上云。生益州山谷及越嶲

山有銅處。此物當是生其山之陰爾。今出韶州信州。其色青白。畫工用爲綠色者。極有大塊。其中青白。花文可愛。信州人琢爲腰帶器物。及婦人服飾。其入藥當用顆塊如乳香者最佳。(蘇頌)

●石綠。陰石也。生銅坑中。乃銅之祖氣也。銅得紫陽之氣而生綠。綠久則成石。謂之石綠。而銅生於中。與空青青同。一根源也。今人呼爲大綠。范成大桂海志云。石綠。銅之苗也。出廣西古江有銅處。生石中。質如石者。名石綠。一種脆爛如碎土者。名泥綠。品最下。大明會典云。青綠石鑲。淘淨綠一十一兩四錢。暗色綠。每礦一斤。淘淨綠一十兩八錢。礪砂一斤。燒造礪砂綠一十五兩五錢。(李時珍)

●(綠柿)即掉柿之古籍別名。典見日用本草。詳「掉柿」條。

●(綠奈)即蘋果色青者之古籍別名。典見綱目。詳「蘋果」條。

●(綠益子)產地 出遼東諸地。形態 綠益爲喬木類之一種。樹高丈餘。其葉兩兩相對。開花大如盞。色黃。花落結實。亦

一五五二

兩兩相對。大如木瓜。綠色。春生夏熟。其子實可供藥用。

性質 大毒。

主治 腐骨碎齒。外科方術家用之。

參攷資料 綠益子人不可食。誤食之入口。即齒落如屑。舌黑如漆。滿口裂碎。血出如水流。終日不能食。經旬方止。又能碎骨如泥。彼處豪駝初生。取以淘其蹄。則千里可行。否則不能行。其性剛利如鉅。舉而刺之。利如刀鐮。凡作角器必用此。(趙學敏)

●(綠茶)即茶葉之一種。詳「茶葉」條。

●(綠袍草)即龍鬚草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「龍鬚草」條。

●(綠梅花)即梅花之處方用名。詳「梅花」條。

●(綠結)即伽楠香。色如鴨頭綠者之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「伽楠香」條。

●(綠葉綠花草)即澤漆之古籍別名。典見綱目。詳「澤漆」條。

●(綠葡萄)即葡萄之實。綠色者之別名。詳「葡萄」條。

參攷資料 ●綠豆肉平。皮寒。

解金石砒霜草木一切諸毒。宜連皮生研。水服。按夷堅志云。有人服附子酒多。頭腫如斗。唇裂血流。急求綠豆黑豆各數合。嚼食并煎湯飲之。乃解也。〔李時珍〕●綠豆處虛種之。三四月下種。苗高尺許。葉小而有毛。至秋開小花。莢如赤豆。莢粒粗而色鮮者為官綠。皮薄而粉多。粒小而色深者為油綠。皮厚而粉少。早種者呼為摘綠。可頻摘也。遲種呼為拔綠。一拔而已。北人用之甚廣。可作豆粥。豆飯。豆酒。燻食。麩食。磨而為麩。澄濾取粉。可以作餌。頓饌。盪皮。搓索。為食中要物。以水浸溼。生白芽。又為菜中佳品。牛馬之食。亦多賴之。真濟世之良穀也。〔李時珍〕

【綠豆皮】

性質 甘。寒。無毒。
主治 解熱毒。退目。

醫。

【綠豆花】

主治 解酒毒。

【綠豆芽】

性質 甘。平。無毒。
主治 解酒毒。熱毒。

利三焦。

參攷資料 諸豆生芽。皆腥靱

不堪。惟此豆之芽。白美獨異。今人視為尋常。而古人未知者也。但受溼熱鬱遏之氣。故頗發瘡動氣。與綠豆之性。稍有不同。〔李時珍〕

【綠豆青】

性質 甘。涼。平。無毒。
主治 解諸熱。益氣。

解酒食諸毒。治發背。癰疽。瘡腫。及湯火灼傷。

歷代記述攷證

【明】寧原食鑑本草論綠豆粉曰。痘瘡溼爛。不結痂疔者。乾撲之良。【明】汪穎食物本草論綠豆粉曰。解蕪菌。砒毒。【明】李時珍本草綱目論綠豆粉曰。新水調服。治霍亂轉筋。解諸藥毒。死心頭尚溫者。【明】繆希雍本草經疏論綠豆粉曰。菉豆粉所聚氣味。與菉豆同。故能解諸熱及酒食毒。湯火傷灼也。發背。癰疽。瘡腫。皆熱毒所致。甘寒解陽明之熱。則毒氣不至犯胃。而嘔惡。腸胃清涼。而諸腫散矣。熱傷氣。除熱故能益氣也。

施用宜忌 菉豆粉性涼。脾胃

虛寒易泄者。勿多食。

參攷資料

●勿近杏仁。則爛

不能作束。〔吳瑞〕●綠豆色綠。小豆之屬。木者也。通於厥陰。陽明。其性稍平。消腫治痘之功。雖同赤豆。而壓熱解毒之力過之。且益氣。厚腸胃。通經脈。無久服枯人。之冠。但以作涼粉。造豆酒。或偏於冷。或偏於熱。能致人病。皆人所為。非豆之咎也。豆粉須以綠色黏膩者為真。外科治癰疽。有內托護心散。極言其神效。丹溪朱氏。有論發揮。〔李時珍〕●外科精要謂內托散。一日至三日。進十數服。可免毒氣內攻臟腑。切詳綠豆解毒丹。治石毒。味甘入陽明。性寒。能補為君。以乳香。去惡腫。入少陰。性溫。善質為佐。甘草性緩。解五金八石百藥毒。為使。想北方專為服丹石發疽者。設也。若夫年老。病深者。證備者。體虛者。綠豆雖補。將有不勝其任之患。五香連翹湯。亦非必用之劑。必當助氣壯胃。使根本堅固。而行經活血。為佐。參以經絡時令。使毒氣外發。此則內托之本意。治施之早。可以內消也。〔朱震亨〕

【綠豆莢】

主治 赤痢。經年不愈。蒸熱隨意食之。

【綠豆粥】

基本 本品係綠豆和米煮成之粥。

主治 解熱毒。止煩渴。

【綠豆葉】

主治 霍亂吐下。絞汁和醋少許溫服。

【綠青】

命名 本品乃山之陰石生銅坑中。其色綠青。或黑綠。故名。

處方用名 石綠。

古鑑別名 大綠。泥綠。〔綱目〕

國外學說 Verdigris (英)

基本 係金屬礦石類。為銅礦中綠色之塊粒或粉末。

產地 凡山谷之銅礦中恒有。

生焉。

形態 綠青為淡綠色之塊粒或粉末。不溶於水。溶於酸液中。則成青綠色之溶液。

種類 ●質堅硬如石塊者。名石綠。為上品。●質脆爛如碎土者。名泥綠。為下品。

製法 採得淘取淨綠用。

用法 研細為末。和作丸散。或入水或化。和作外傳藥。

採取 夏秋兩季採之。

製法 馬志曰。凡使綠豆。以圓

小者佳。粉作餌。炙食之。良。大者名

植豆。苗子相似。亦能下氣。治霍亂。

陳藏器曰。用之宜連皮。去皮則令

人少壅氣。蓋皮寒而肉平也。

用法 水煮或搗剉用。

性質 甘寒。無毒。

效能 消積熱解百毒。

主治 養食消腫。下氣壓。解熱

毒。生研絞汁服。治丹毒。煩熱。風疹。

藥石發動。熱氣奔豚。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食

療本草論綠豆曰。補益元氣。和調

五臟。安精神。行十二經脈。去浮風。

潤皮膚。宜常食之。煮汁能止消渴。

【唐】孫思邈千金翼論綠豆曰。治

寒熱。熱中。止泄痢。卒瀉。利。小便。脹

滿。【宋】日華諸家本草論綠豆曰。

厚腸胃。作枕能明目。治頭風。頭痛。

除吐逆。【明】寧原食鑑本草論綠

豆曰。解一切藥草。牛馬金石諸毒。

【明】李時珍本草綱目論綠豆曰。

治痘毒。利腫脹。【明】繆希雍本草

經疏論綠豆曰。菉豆味甘。氣寒。無

毒。入足陽明經。夫丹石之藥。氣悍

而性熱。多服則火動。上升為煩熱。

甚則口鼻出血。狂悶躁擾。甘寒能

除熱。下氣解毒。故主服丹石藥人

毒發煩熱也。陽明客熱則發出風

痧。以胃主肌肉。熱極生風故也。解

陽明之熱。則風痧自除。脹滿者。濕

熱侵於脾胃也。熱氣奔豚者。淫熱

客於胃經也。除溼則腫消。壓熱則

氣下。益脾胃而腎邪亦自平也。孫

思邈主寒熱熱中。止泄痢。卒瀉。利

小便。脹滿。日華子主厚腸胃。作枕

明目。治頭風。頭痛。益氣除熱毒。風

孟詵主去浮風。益氣力。治消渴。和

五臟。安精神。可常食之。功效不可

備述。【清】黃宮繡本草求真論綠

豆曰。菉豆味甘性寒。據書備極稱

善。有言能厚腸胃。潤皮膚。和五臟

及資脾胃。按此雖用參芪歸朮。不

是過也。第書所言。能厚能潤。能和

能資者。緣因毒邪內熾。凡臟腑經

絡皮膚脾胃。無一不受毒擾。服此

性善解毒。故凡一切癰腫等症。無

不用此奏效。煮汁則止消渴。磨粉

合以乳香丹砂。則能護心使毒不

入藥枕夜臥。則能明目疎風。杖瘡

疼痛。則用雞子白調敷。即愈。皮尤

涼於菉豆。退翳明目如神。粉撲痘

潰尤妙。有除熱解毒之功。而無補

益資助之力。且與樗子相反。同食

則殺人。【清】王士雄隨息居飲食

譜論綠豆曰。綠豆甘涼。養食清膽

養胃。解暑止渴。潤皮膚。消浮腫。利

小便。已瀉痢。析醒耳疫。浸罌發芽

摘根為蔬。味極清美。生研絞汁服

解一切草木金石諸藥牛馬肉毒

或急火煎湯冷飲亦可。

配合應用 ①扁鵲三豆飲。治

天行痘瘡。預服此飲。疎解熱毒。縱

出亦少。用綠豆赤小豆黑大豆一

升。甘草節二兩。以水八升。煮極熟。

任意食。豆飲汁七日乃止。一方加

黃大豆白大豆名五豆飲。

②治痘後癰毒。初起以三豆膏

治之。神效。綠豆赤小豆黑大豆等

分為末。醋調。時時搽塗。即消。〔醫

學正傳方〕

③治防痘入眼。用綠豆七粒。令

兒自投井中。頻視七遍乃還。〔全

幼心鑑方〕

④治小兒丹腫。綠豆五錢。大黃

二錢。為末。用生薄荷汁入蜜調塗。

〔全幼心鑑方〕

⑤治赤痢不止。以大麻子水研

濾汁。煮綠豆食之。極效。粥食亦可

〔必效方〕

⑥治老人淋痛。青豆二升。橘皮

二兩。煮豆粥下麻子汁一升。空心

漸食之。併飲其汁甚驗。〔養老書

方〕

⑦治消渴飲水。綠豆煮汁。並作

粥食。〔普濟方〕

⑧治心氣疼痛。綠豆廿一粒。胡

椒十四粒。同研。白湯調服。即止。

⑨治多食易饑。綠豆黃麥糯米

各一升。炒熟磨粉。每以白湯服一

盃。三五日見效。

⑩十種水氣。用綠豆二合半。大

附子一袋。去皮臍。切作兩片。水三

碗。煮熟。空心臥時食豆。次日將附

子兩片作四片。再以綠豆二合半

如前煮食。第三日別以綠豆附子

如前煮食。第四日如第二日法煮

食。水從小便下。腫自消。未消再服

忌生冷毒物鹽酒六十日。無不效

者。〔朱氏集驗方〕

用量 三錢至五錢。

施用宜忌 凡無熱毒者禁用。

反樗子忌鯉魚。

名。典見綱目。詳「耳環草」條。

【碧輝花】即鴨跖草之古籍別名。典見綱目。詳「鴨跖草」條。

【碩鼠】即鼯鼠之古籍別名。典見周易。詳「鼯鼠」條。

【福果】即荔枝之古籍別名。典見和漢藥考。詳「荔枝」條。

【福桑花】即佛桑花之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「佛桑花」條。

【福參】即建參之別名。典見綱目拾遺。詳「建參」條。

【福橘皮】即橘皮之處方用名。詳「橘皮」條。

【福澤瀉】即澤瀉之處方用名。詳「澤瀉」條。

【種黨參】即黨參之古籍別名。典見黨參新研究。詳「黨參」條。

【端】即玄參之古籍別名。典見別錄。詳「玄參」條。

【簾】即蒲扇之古籍別名。典見綱目。詳「蒲扇」條。

【箇桂皮】性實 辛溫無毒。效能 養精神和顏色。輕身延年。

參攷資料 箇桂皮辛而不熱。薄而能宣。善走胸脇。不能直達下

焦。爲諸藥之先導。故能治百病。

【割耳草】基本 割耳草爲雜草類之一種。可供藥用。

主治 氣壅。

【管仲】即貫衆之處方用名。詳「貫衆」條。

【管貝齒】即貝子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「貝子」條。

【管松】即天門冬之古籍別名。典見嘉祐本草。詳「天門冬」條。

【精理黃石】即理石之別名。詳「理石」條。

【緬木】命名 本品木文側戾。故名。基本 緬木爲喬木類之一種。可供藥用。

產地 生山野林澤間。性質 甘溫無毒。

主治 風血羸瘦。補腰脚。益陽道。宜浸酒飲。

【緣子】即鼠李子之別名。詳「鼠李子」條。

【綠升麻】命名 本品即升麻之綠色者。故名。

主治 痢疾下傷。

參攷資料 本草從新謂綠升麻乃升麻之別一種。拾遺則云升麻色綠者佳。非另一種也。櫻仲醇用治下痢。每有有驗。(趙學敏)

古籍別名 綠衣使

【綠毛龜】者(綱目)

產地 出南海。

形態 綠毛龜爲介類龜之一種。大者如五銖錢。背生綠色絲狀之海藻。以中有金線者爲真。背骨有三稜。底甲如象牙。小者經寸。雜以金色。璀璨可玩。可供藥用。

製法 李時珍曰。劉氏先天丸用龜九枚。以活鯉二尾。安釜中。入水覆以米篩。安龜在篩上。煮熟。取肉曬乾。其甲仍以酥炙黃。入藥用。

又有連甲肉。頭俱用者。

性質 甘鹹平無毒。

主治 通任脈。助陽道。補陰血。益精氣。治痿弱。

歷代配述攷證 【明】陳嘉謨本草蒙筌論綠毛龜曰。縛置額端。能禁邪。瘧收。藏書。可辟蟲。蟲。

【綠白】即苦參之古籍別名。典見和漢藥考。詳「苦參」條。

【綠衣使者】即綠毛龜之古籍別

名。典見綱目。詳「綠毛龜」條。

【綠李】即李之古籍別名。典見唐本草。詳「李子」條。

【綠豆】命名 本品爲豆類而色綠。故名。俗作菹豆。

處方用名 菹豆。

古籍別名 文豆。拔絲。摘絲。植豆。青小豆。(和漢藥考)

外國名詞 Green Bean (英)

基本 屬豆科。爲綠豆之種子。產地 凡原野間處處生焉。

形態 綠豆莖高尺餘。莖葉花淡俱類赤小豆。自夏季至冬季不絕結實。將其早熟者再種之。至秋季已復結實。故日本有八重生之別名。八重即重疊意。其實爲外面綠色或褐綠色之種子。似赤小豆而小。

種類 莢粒粗而色鮮綠者爲官綠。其皮薄而粉多。莢粒小而色褐綠者爲油綠。其皮厚而粉少。早種者爲摘絲。蓋謂可頻摘也。遲種者爲拔絲。蓋謂一拔而巳也。

種植 三四月下種。田圃間恒多栽植。

一五四九

【薑粉】參須。齊東野語方。

●治初生目閉。由胎中受熱也。以熊膽少許。蒸水洗之一日七八次。如三日不開。服四物加甘草。天花粉（全幼心鑑方）

●治小兒鼻蝕。熊膽半分。湯化抹之（聖惠方）

●治十年痔瘡。熊膽塗之。神效。一切方不及也（外臺祕要方）

●治腸風痔瘡。熊膽半兩。入片腦少許。研和豬膽汁塗之（壽域方）

●治蟲心痛。熊膽一大豆。和水服之。大效（外臺祕要方）

●治風蟲牙痛。熊膽三錢。片腦四分。每以豬膽汁和調少許。搽之（攝生方）

●治水弩射人。熊膽塗之。更以雄黃同酒磨服即愈（斗門方）

●治諸疳羸瘦。熊膽使君子末等分。研勻。瓷器蒸溶。蒸餅丸。麻子大。每米飲下二十丸（保幼大全方）

●用薑 三分至八分。

●施用宜忌 凡無實熱鬱火者。禁用。惡防己忌地黃。

十四畫 熊

【薰黃】

基本 本品係雄黃之青黑色而堅者。

性質 苦平寒。有毒。主治 惡瘡疥癬。殺蟲虱。和諸藥熏嗽。

【薰黃】即雄黃之古籍別名。典見綱目。詳「雄黃」條。

【葵】即玉竹之古籍別名。典見爾雅。詳「玉竹」條。

【榛牛】即牛生於北方者之別名。體頗大。有黃黑赤白駁雜數色。肉之性質功用。與尋常牛肉同。詳「牛肉」條。

【犍牛】即牛最小者之別名。產廣南。肉之性質功用。與尋常牛肉同。詳「牛肉」條。

【攪子薑】即杜若之古籍別名。典見藥性。詳「杜若」條。

【犍耳草】即竹葉細辛之別名。典見綱目。拾遺。詳「竹葉細辛」條。

【犍耳細辛】即及己之古籍別名。典見綱目。詳「及己」條。

【犍頭】即土菌之古籍別名。典見綱目。詳「土菌」條。

【博耳】即藟荷之古籍別名。典見說文。詳「藟荷」條。

【瓊瑤葡萄】

古籍別名 公領孫（拾遺）

形體 回疆志葡萄一根數本。藤蔓牽長。花極細而黃白色。其實有紫白青黑數種。形有圓長大小。味有酸甜不同。一種色綠而無核。較黃豆微大。味甘美。一種色紫而小。如胡椒。即瓊瑤葡萄。一種色黑。形長寸許。一種色白而大。皆七八月熟。涼乾可致遠。

性質 甘酸溫平。無毒。

主治 筋骨痠痛。能利小便。

配合應用 ①強腎。瓊瑤葡萄。人參各一錢。火酒浸一宿。侵晨塗手心。摩擦腰脊。能助腎力。強壯若臥時。磨擦腰脊。力助陽事。堅強尤為得力。

●稀痘。瓊瑤葡萄一歲一錢。神黃豆一歲一粒。杵為細末。蜜水調服。并擦心窩腰眼。能助腎祛邪。以北方地方。物產助東南生氣之不足也。然惟稟質素弱者。用之有益。若氣壯偏陽者。勿服。恐其助長淫火之毒也。

●參攷資料 ①本經逢原云。瓊瑤葡萄似葡萄而細。故名。生漠

北。南方間亦有之。其幹類木而係藤。本其子生青熟赤。乾則紫黑。能攝精氣。歸宿腎臟。與五味功用相近。凡藤蔓之類。皆屬於筋。草木之實。皆達於臟。不獨此味為然。此物向供食品。不入湯藥。故本草不載。近時北人以之強腎。南人以之稀痘。各有攸宜。②五雜俎西域白葡萄生者不可見。其乾者味殊奇。甘有兔眼葡萄。無核。又有瓊瑤葡萄。形似茱萸。小兒食之。能解痘毒。于文定筆塵云。瓊瑤即駁娶之訛。③黎魏曾仁恕堂筆記。瓊瑤葡萄。于文定引西京羽獵賦。謂瓊瑤當為駁娶。固屬附會。而以爲別有一種。亦非河西葡萄。雖引根牽蔓。不異中土。而結實大長。如馬乳。色深紫。味亦殊甘。一校千百顆大者在。上細者下垂。取而乾之。大者爲白葡萄。細者名瓊瑤。非兩種也。故俗呼爲公領孫。惟綠葡萄則來自西域。非中土所有。④按紫桃軒雜綴。瓊瑤葡萄。神農九草之一。中土久有不俟博望從西域帶來也。吾里東塔朱買臣墓有之。戊子余曾歷平潮。墓畧有一枝。蔓延滿架。夏開瓊

一五四七

十四畫 熊

熊脂涼。其脂燃燈。烟損人眼。令失光明(日華)

【熊骨】

主治 煎湯浴歷節風。及小兒客忤。

【熊掌】

製法 以酒醋水同煮。即大如皮球取用。

主治 禦風寒。益氣力。作肴食之。

【熊腦髓】

主治 諸耳聾。

【宋】日華諸家本草論熊腦髓曰。療頭旋摩頂。去白禿。風屑。生髮。

【熊膽】

外國名詞 Bear-gall. (英) Baren-gall. (德)

基本 係食肉類獸熊之膽囊。產地 陳仁山藥物生產辨云。熊膽產雲南為正地道。近日本來者。以印度西藏為多。

形態 其形如茄。外面作淡赭色。如皮革。膽口附着纖維質。內部附有金黃之細粒。若松香之粉末。蓋即膽液風乾後。留剩之膽質也。

採取 冬夏兩季間採之。

製法 採得以細竹片挾持膽囊。文火炙五六日。懸高處十日許。風乾候膽汁漸凝。乃以小板微壓。

令扁。然後出售。

用法 恒以剉研。和作丸散用。性質 苦寒。無毒。

效能 去翳明目。殺蟲治疳。用作健胃殺蟲。鎮痙。興奮藥。又為膽汁補償藥。

主治 時氣熱盛。變為黃疸。暑月久痢。疳積。心痛。疳疔。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論熊膽曰。小兒驚癇。痙瘓。以竹瀝化兩豆許服之。去心中涎甚良。【宋】大明日華諸家本草論熊膽曰。治諸疳。耳鼻瘡。惡瘡。殺蟲。

【明】李時珍本草綱目論熊膽曰。退熱清心。平肝明目。去翳殺蝨。螻蝻。【清】黃宮繡本草求真論熊膽曰。熊膽味苦性寒無毒。功尚涼心平肝。惟其涼心。故能治心。總注忤熱邪等症。惟其平肝。所以能治目赤。驚障。惡瘡。痔漏等症。且能入脾而治黃疸。溼邪入大腸。而治久痢。疳。瘰癧。熱。并治小兒風痰壅塞。發作驚癇。要皆除熱涼血。而病自愈耳。凡此只可作丸。勿煎湯。通明者。佳。性善辟瘴。撲水上投。膽少許。則塵豁然而開。又取少許。研滴水中。

掛如銀。直至水底而不散者真。

國外學說 日本產之熊膽。有岡膽。島膽二種。岡膽為產於深山之熊膽。上品也。島膽為北海道海濱所產。熊膽有一種腥臭。品不佳。又因採製時期而有夏膽。冬膽之別。夏膽作紅黃色。能透映。蘆皮厚。膽汁少。謂之琥珀手。推為佳品。冬膽黑色。有光澤。蘆皮薄。膽汁滿。謂之黑膽。此非佳品。又有現綠褐色者。謂之青葉手。大抵琥珀手多採於秋間。黑膽多採於春間。又夏採之琥珀手。至秋每變為茶褐色。秋採之琥珀手。至春每變為黑色。又一本堂藥選曰。熊膽療癰瘡。疔瘡。疥癬。心。胸。痛。腹痛。傷食。腹痛。不吐不瀉。諸癰。癰。狂。癰。疾。痢。疾。殺蟲。止嘔。發痘。瘡。治疳。疾。驚癇。疳。瘰癧。痛。產後腹痛。催生。點眼。去翳。塗痔。止痛。一切卒患。急病。用以鼓舞元氣。開通蔽塞。前人以熊膽為小兒藥。並救急藥。出產無多。價值殊昂。從而偽藥亦夥。往往以豬膽。猴膽。牛膽等混充。甚者竟有以植物性苦味藥。煉製越幾斯。為魚目混珠之計。茲將偽製法並試驗法摘錄如

一五四六

下。以資辨別。山海名產圖會曰。熊膽偽製法以黃柏。山梔。子。毛黃連。三味同研粉末。先炙山梔。子。去其香。再與兩味混和。入水盪煎。則成黑色。有光澤之物質。乾後與熊膽無二。洋皮紙兩層包之。此紙先用水仙花根汁拖過。令變色。然後用包妥之後。挾入榨板。陰乾。紙便發皺。且藥汁滲入。宛如真膽皮。冬日製者。交暑輒爛。因此必夏間製之。日本偽製熊膽出於備後。他國之贗品。大率如此。又世事百談曰。孕婦月數多。身重。猝然氣絕。墮仆。目定。齒嚙。舌。人事不知。若發癰。癰。然是名子。癰。急以真熊膽溫水化開。灌入口中。頻頻用之。旋見蘇醒。效驗確實。如此。誠婦人救命丹也。凡有家室者。不可不備。然必真者乃效。世稱琥珀手。為斯中上品。試驗之法。以熊膽粟粒大許。入水碗。中如一線引散者真。其入水即旋轉如飛者尤佳。若引散旋轉俱遲緩者。皆他獸膽也。

配合應用 熊膽丸。治赤目。障翳。每以膽少許化開入冰片一二片。銅器點之。絕命。或淚痒加生

計。茲將偽製法並試驗法摘錄如

下。以資辨別。山海名產圖會曰。熊膽偽製法以黃柏。山梔。子。毛黃連。三味同研粉末。先炙山梔。子。去其香。再與兩味混和。入水盪煎。則成黑色。有光澤之物質。乾後與熊膽無二。洋皮紙兩層包之。此紙先用水仙花根汁拖過。令變色。然後用包妥之後。挾入榨板。陰乾。紙便發皺。且藥汁滲入。宛如真膽皮。冬日製者。交暑輒爛。因此必夏間製之。日本偽製熊膽出於備後。他國之贗品。大率如此。又世事百談曰。孕婦月數多。身重。猝然氣絕。墮仆。目定。齒嚙。舌。人事不知。若發癰。癰。然是名子。癰。急以真熊膽溫水化開。灌入口中。頻頻用之。旋見蘇醒。效驗確實。如此。誠婦人救命丹也。凡有家室者。不可不備。然必真者乃效。世稱琥珀手。為斯中上品。試驗之法。以熊膽粟粒大許。入水碗。中如一線引散者真。其入水即旋轉如飛者尤佳。若引散旋轉俱遲緩者。皆他獸膽也。

配合應用 熊膽丸。治赤目。障翳。每以膽少許化開入冰片一二片。銅器點之。絕命。或淚痒加生

計。茲將偽製法並試驗法摘錄如

下。以資辨別。山海名產圖會曰。熊膽偽製法以黃柏。山梔。子。毛黃連。三味同研粉末。先炙山梔。子。去其香。再與兩味混和。入水盪煎。則成黑色。有光澤之物質。乾後與熊膽無二。洋皮紙兩層包之。此紙先用水仙花根汁拖過。令變色。然後用包妥之後。挾入榨板。陰乾。紙便發皺。且藥汁滲入。宛如真膽皮。冬日製者。交暑輒爛。因此必夏間製之。日本偽製熊膽出於備後。他國之贗品。大率如此。又世事百談曰。孕婦月數多。身重。猝然氣絕。墮仆。目定。齒嚙。舌。人事不知。若發癰。癰。然是名子。癰。急以真熊膽溫水化開。灌入口中。頻頻用之。旋見蘇醒。效驗確實。如此。誠婦人救命丹也。凡有家室者。不可不備。然必真者乃效。世稱琥珀手。為斯中上品。試驗之法。以熊膽粟粒大許。入水碗。中如一線引散者真。其入水即旋轉如飛者尤佳。若引散旋轉俱遲緩者。皆他獸膽也。

配合應用 熊膽丸。治赤目。障翳。每以膽少許化開入冰片一二片。銅器點之。絕命。或淚痒加生

計。茲將偽製法並試驗法摘錄如

下。以資辨別。山海名產圖會曰。熊膽偽製法以黃柏。山梔。子。毛黃連。三味同研粉末。先炙山梔。子。去其香。再與兩味混和。入水盪煎。則成黑色。有光澤之物質。乾後與熊膽無二。洋皮紙兩層包之。此紙先用水仙花根汁拖過。令變色。然後用包妥之後。挾入榨板。陰乾。紙便發皺。且藥汁滲入。宛如真膽皮。冬日製者。交暑輒爛。因此必夏間製之。日本偽製熊膽出於備後。他國之贗品。大率如此。又世事百談曰。孕婦月數多。身重。猝然氣絕。墮仆。目定。齒嚙。舌。人事不知。若發癰。癰。然是名子。癰。急以真熊膽溫水化開。灌入口中。頻頻用之。旋見蘇醒。效驗確實。如此。誠婦人救命丹也。凡有家室者。不可不備。然必真者乃效。世稱琥珀手。為斯中上品。試驗之法。以熊膽粟粒大許。入水碗。中如一線引散者真。其入水即旋轉如飛者尤佳。若引散旋轉俱遲緩者。皆他獸膽也。

配合應用 熊膽丸。治赤目。障翳。每以膽少許化開入冰片一二片。銅器點之。絕命。或淚痒加生

計。茲將偽製法並試驗法摘錄如

下。以資辨別。山海名產圖會曰。熊膽偽製法以黃柏。山梔。子。毛黃連。三味同研粉末。先炙山梔。子。去其香。再與兩味混和。入水盪煎。則成黑色。有光澤之物質。乾後與熊膽無二。洋皮紙兩層包之。此紙先用水仙花根汁拖過。令變色。然後用包妥之後。挾入榨板。陰乾。紙便發皺。且藥汁滲入。宛如真膽皮。冬日製者。交暑輒爛。因此必夏間製之。日本偽製熊膽出於備後。他國之贗品。大率如此。又世事百談曰。孕婦月數多。身重。猝然氣絕。墮仆。目定。齒嚙。舌。人事不知。若發癰。癰。然是名子。癰。急以真熊膽溫水化開。灌入口中。頻頻用之。旋見蘇醒。效驗確實。如此。誠婦人救命丹也。凡有家室者。不可不備。然必真者乃效。世稱琥珀手。為斯中上品。試驗之法。以熊膽粟粒大許。入水碗。中如一線引散者真。其入水即旋轉如飛者尤佳。若引散旋轉俱遲緩者。皆他獸膽也。

糊丸。梧子大。每一歲一丸。米飲下。

〔羅天益衛生寶鑑方〕

用量 三分至八分。

施用宜忌 凡非實症者禁用。

參攷資料 ①南星之最小者

名虎掌。此物類之。故亦同名。大明

會典載四川成都府歲貢天雄二

十對。附子五十對。烏頭五十對。漏

蘆二十斤。不知何用。〔李時珍〕

服之令人喪目。〔雷斅〕

②按楊士

瀛直指方云。凡漏蘆年久者。復其

元陽。當用漏蘆子。羣加減用之。如

不當用而輕用之。又恐熱氣乘虛

變移結核。而爲害尤甚也。又按類

編云。一人兩足生瘡。臭潰難近。夜

宿五夫人祠下。夢神授方。用漏蘆

子一枚。生研爲末。入膩粉少許。井

水調塗。依法治之。果愈。蓋此物不

堪服餌。止宜入瘡科也。〔李時珍〕

〔漏蘆子〕即木鼈子之古籍別名。

典見和漢藥考詳。〔木鼈子〕條。

〔漏蘆〕即漏蘆之處方用名。詳

〔漏蘆〕條。

〔漏蘆苗〕即漏蘆之苗。性質功用

與根同。詳。〔漏蘆〕條。

〔漏蘆根〕即漏蘆之根。詳。〔漏蘆〕

條。

〔瀝麻汁〕 基本 本品即久瀝

主治 止消渴。治瘰癧。血。

〔漢防己〕即防己之處方用名。詳

〔防己〕條。

〔漢麻仁〕即大麻仁之古籍別名。

典見爾雅。詳。〔大麻仁〕條。

〔漢椒〕即川椒之古籍別名。典見

日華諸家本草。詳。〔川椒〕條。

〔漫黎〕即銀蠟之古籍別名。典見

綱目。詳。〔銀蠟〕條。

〔榮〕係陸英不榮而實者之別名。

典見爾雅。詳。〔陸英〕條。

〔漬菜〕即白菜之日本名。詳。〔白

菜〕條。

〔滑鐵石〕即煅鐵石。詳。〔鐵石〕條。

〔熊〕 命名 熊字篆文象形。故

外國名詞 Ursus torquus-

tus Schinz. (拉丁) Bear 或

Black bear (英) クマ 或 クロ

クマ (日本)

基本 脊椎動物哺乳類有胎

盤類食肉類。腳類熊科。

產地 生深山巖谷間。

形體 熊爲獸類之一種。其體

肥滿頭大。額闊耳殼短圓。鼻端略

鈍。眼露凶光。嘴突出上唇中央有

分裂。四肢短後比前長。能直立以

蹠踏地。各五趾。具鈎爪。爪不能伸

縮。尾短小。毛深密而剛硬。色黑光

澤。咽喉部有白色月形紋。體長四

五尺。穴居樹洞土窖中。冬蟄春出。

晝隱夜出。覓食果實。半糖等物。其

肉可供食與藥用。



熊

性質 甘。平。無毒。

主治 風痺。筋骨不仁。功與脂

同。

歷代記述攷證 〔唐〕孟詵食

療本草論熊肉曰。補虛羸。

參攷資料 ①有痼疾。不可食

熊肉。令終身不除。〔陶弘景〕

②若腹中有積聚寒熱者。食之永不除

也。十月勿食之。傷神。〔張鼎〕

③按劉河間云。熊肉振羸。兔目明。因

其氣有餘。以補不足也。〔李時珍〕

〔熊白〕即熊脂之古籍別名。典見

綱目。詳。〔熊脂〕條。

主治 小兒客忤。

〔熊脂〕 古鑿別名 熊白。〔綱

目〕

製法 凡取得每一斤。入生椒

十四粒。同煉。器盛收之用。

性質 甘。微寒。無毒。

主治 風痺不仁。筋急五臟。腹

中積聚。寒熱羸瘦。頭傷白禿。面上

疥癬。久服強志。不飢。輕身延年。〔

本經〕飲食嘔吐。〔別錄〕

歷代記述攷證 〔唐〕甄權藥

性本草論熊脂曰。治面上黚。及

疥。〔唐〕蘇恭新修本草論熊脂曰。

長髮令黑。悅澤人面。〔宋〕日華諸

家本草論熊脂曰。治風補虛損。殺

勞蟲。酒釀服之。

參攷資料 ①熊白乃背上肪。

色白如玉。味甚美。寒月則有夏月

則無。其腹其肪及身中脂。煎煉過

亦可作藥。而不中噉。〔陶弘景〕

十四畫 漏

每溫水下三十丸。亦治產後帶下。
(聖濟總錄方)

①治乳汁不下。乃氣脈壅塞也。

又治經絡凝滯。乳內脹痛。邪蓄成癰。服之自然內消。漏蘆二兩半。蛇退十條。炙焦。瓜蒌十個。燒灰存性。爲細末。每服二錢。用溫酒調下。良久再以熱羹湯投之。總之以通爲度。(和劑局方)

②治歷節風痛。筋脈拘攣。古聖散。用漏蘆麩炒半兩。地龍去土炒半兩。爲末。生薑二兩。取汁入蜜三兩。同煎三五沸。入好酒五合。盛之。每以二盃調水一錢。溫服。(聖濟總錄方)

③治一切癰疽。發背初發二日。但有熱證。便宜服漏蘆湯。退毒下膿。乃是宣熱拔毒之劑。熱退卽住。服漏蘆用有白茸者。連翹生黃芪沉香各一兩。生粉草半兩。大黃微炒一兩。爲細末。每服二錢。用薑棗湯調飲下。(集驗方)

④治白禿頭瘡。五月收漏蘆草燒灰。豬骨和塗之。(聖濟總錄方)

用薑錢半至三錢。
施用宜忌 凡瘡瘍之屬於陰

症而氣虛不起及孕婦禁用。連翹爲之使。

參攷資料 ①此藥久服甚益人。而服食方罕見用之。近道出者。惟療癰疥耳。市人皆取苗用。(陶弘景)

②漏蘆下乳汁。消熱毒。排膿止血。生肌殺蟲。故東垣以爲手足陽明藥。而古方治癰疽發背。以漏蘆湯爲首稱也。應安常傷寒論治癰疽及預解時行痘疹熱。用漏蘆葉云。無則以山梔子代之。亦取其寒能解熱。蓋不知其能入陽明之故也。(李時珍)

③漏蘆生喬山山谷。八月採根陰乾。(別錄)④喬山應是黃帝所葬處。乃在上郡。及出近道。市人取苗用之。俗中取根名鹿驪。苦酒摩以療瘡疥。(陶弘景)

⑤此藥俗名莢蒿。莖葉似白蒿。花黃。生莢。長似細麻之莢。大如筋許。有四五瓣。七八月後皆黑。異於衆草蒿之類也。常用其莖葉及子。未見用根。其鹿驪山南謂之本黎蘆。有毒。非漏蘆也。今人以馬薊似苦笑者爲漏蘆。亦非也。(蘇恭)

⑥別本言漏蘆莖大如筋。高四五尺。子房似油麻房而小。江東

人取其苗用。勝於根。江寧及上黨者佳。陶云鹿驪。蘇云本黎蘆。亦非也。漏蘆自別。(馬志)

⑦南人用苗北土用根。乃樹生如茱萸樹。高二三尺。有毒。殺蟲。山人用以洗瘡疥。(陳藏器)

⑧葉似蒿。今曹兌州下溼處最多。六月七月採莖日乾。黑於衆草。(韓保昇)

⑨今汴東州郡及奉海州皆有之。舊說莖葉似白蒿。花黃。白莢。莖若筋。大房類油麻而小。今諸郡所圖上。惟單州者差相類。沂州者花葉頗似牡丹。秦州者花似單葉寒菊。紫色。五七枝同。一幹。海州者花紫碧。如單葉蓮花。花萼下及根旁有白茸。莖之根如蔓青而細。又類葱本。黑色。淮南人呼爲老翁花。三州所生花雖別而葉頗相類。但秦海州者葉更作鉅齒狀。一物而殊類。如此醫家何所適從。當依舊說。似單州出者爲勝。又本草飛廉名漏蘆。云與苦笑相類。其根生則肉白皮黑。乾則黑如玄參。七八月採花陰乾用。所說與秦州海州所圖漏蘆花葉及根頗相近。然彼人但名漏蘆。不曰飛廉也。(蘇頌)

⑩按沈存中筆談云

一五四四

今方家所用漏蘆。乃真飛廉也。飛廉一名漏蘆。苗似苦笑。根如牛蒡。綿頭者是也。採時用根。今閩中所謂漏蘆莖如油麻。高六七尺。秋深枯黑如漆。採時用苗。乃真漏蘆者也。(李時珍)

【漏蘆】卽飛廉之古籍別名。典見別錄。詳「飛廉」條。

【漏蘆子】命名 本品乃附子之瓊細末。成者。小而漏蘆故名。

古籍別名 木鼈子(炮炙論)

基本 屬毛茛科。爲附子之未成者。

採取 八月間採。

用法 恒以剉研和入外治藥用。

性質 苦。辛。有毒。

效能 祛風。療瘡。用作麻酔性之瘡瘍藥。

主治 惡痢。冷漏瘡。惡瘡。瘋風。

配合應用 百歲丸。治一切惡痢。難下及休息痢。用漏蘆子一個。大者。阿膠。木香。黃連。罌粟殼各半兩。俱炒焦存性。入乳香少許。爲末。

明猶能持鍼治病。此近代之實事。良史所記注者也。洪說猶近於理。前育可年五百歲者誤也。或云青黏即嚴義（李時珍）

【漆樹斗】即乾漆。詳該條。

【漆頭】即蘭茹之古籍別名。典見本草集註詳蘭茹條。

【漏天機】即龜版之古籍別名。典見圖經本草詳龜版條。

【漏薏】即草豆蔻之古籍別名。典見草物志詳草豆蔻條。

【漏蘆】命名屋之西北黑處謂之漏。凡物之色黑者謂之漏。本品秋後即黑而異於衆草故有漏蘆之稱。

處方用名 漏蘆。

古籍別名 野蘭（本經）茺蒿（蘇恭）鬼油麻（日華）北漏老翁花（伐曲）鹿驪根（和漢藥考）

基本 屬玄參科漏蘆之根。

產地 凡山谷間恒多生焉。陳仁山藥物生產辨云漏蘆產江蘇鎮江。

形態 漏蘆生於向陽之地。爲草本植物。高二三尺。葉似艾葉。惟小且薄。夏秋間。梢葉間開黃色似

赤小豆之唇形花。花後結實。子較墨粟子爲小。此草秋後則枯而變黑。異乎他草。

採取 八月採根陰乾。

製法 雷斅曰。凡採得漏蘆細剉。以生甘草相對拌蒸之。從已至申。揀出晒乾用。

性質 鹹寒。無毒。

效能 解熱毒。通乳汁。有去溼痺之功效。用治諸惡瘡痔漏。

主治 皮膚熱毒。惡瘡瘡痔。溼痺。下乳汁。久服輕身益氣。耳目聰明。不老延年。本經止遺溺。熱氣瘡痒如麻豆。可作浴湯（別錄）

歷代記述攷證 【宋】大明日華諸家本草論漏蘆曰。通小腸。泄精尿。血腸風。風赤眼。小兒壯熱。撲損續筋骨。乳癰瘰癧。金瘡止血。排膿補血。長肉。通經脈。【明】穆希雍本草經疏論漏蘆曰。漏蘆苦鹹無毒。苦能下洩。鹹能軟堅。寒能除熱。入足陽明。少陽。太陽。手太陰。陽明。寒而通利之藥也。故主皮膚熱。惡瘡瘡痔。溼痺。下乳汁。別錄又主止遺溺。熱氣瘡痒如麻豆。可作浴湯。又本經久服輕身益氣。耳目聰明。

不老延年者。蓋亦通指熱散病除。則臟腑自安。精神自倍。而臻乎壽考也。【清】黃宮繡本草求真論漏蘆曰。漏蘆味苦而鹹。氣寒有毒。凡苦則下泄。鹹則軟堅。寒則勝熱。漏蘆氣味俱備。其性專入陽明胃經。故凡癰疽發背。乳汁不通。及預解時行痘毒者。咸須服此以解毒邪。俾邪盡從便出而解矣。然書又云。遺精尿血能止。亦因毒解熱除自止之意。非因漏蘆有收瀉之功也。但氣虛瘡瘍不起。及孕婦有病者。切忌出閭。中莖如油麻。枯黑如漆者。眞甘草并連翹爲使。

近人學說 張山雷曰。漏蘆滑利泄熱。與王不留行功用最近。而寒苦直泄。尤其過之。有非實熱。不可輕用。不獨耗陰。尤損正氣。日華謂通小腸。治泄精溺。血腸風。乳癰。排膿止痛。通經脈。皆惟實熱之症。可以暫用。石頑謂苦寒解毒。利殺蟲。排膿消腫。古治癰瘍。以漏蘆湯爲主藥。蓋鹹能軟堅。苦寒清熱解毒之功。然服之必瀉。則熱從下出。故氣虛者非其所宜。而妊婦尤爲切禁。附漏蘆湯方。漏蘆連翹生草。大黃。生芪。治癰疽熱證。頗按此湯惟實熱癰結者宜之。其用黃芪。蓋欲以監制其迅利。然補氣之藥。以治癰腫。究屬非宜。若曰彼此率制。欲其虛實二家。無投不利。則模稜兩可。必無桴應之理。此成方之所以不可混用也。惟在臨證時審其虛實寒熱。而知所損益。然後可以恰當病機耳。

配合應用 ①治乳癰乳癰。漏蘆。貝母。連翹。甘草。金銀花。橘葉。鼠黃。白芷。山豆根。山茨菇。夏枯草。

②治發背癰癰。排膿止痛。漏蘆。連翹。生甘草。紫花地丁。貝母。金銀花。甘草。夏枯草。

③漏蘆同黃耆。人參。排膿長肉。加狗蹄。豬蹄汁。能下乳。

④治腹中蛇蟲。漏蘆爲末。以餅腫和方寸匕服之。（外臺祕要方）

⑤治小兒無辜。疳疔肚脹。或時泄痢。冷熱不調。以漏蘆一兩。杵爲散。每服一錢。以豬肝一兩。入鹽少許。日煮熱。空心頓食之。（聖惠方）

⑥治冷勞泄痢。漏蘆一兩。艾葉炒四兩。爲末。米醋三升。入藥末。一半。同熬成膏。入後末和丸。梧子大。

十四畫 槐 榔 歌 滴 滾 滿 漂 漆

一五四二

或破傷風口眼偏斜腰背強硬任作湯散丸煎雜諸藥用之亦可水煮和藥爲丸

歷代記述攷證【明】李時珍本草綱目論槐膠曰煨熱綿裹塞耳治風熱聾閉

【槐欄】即槐耳之古籍別名典見唐本草詳「槐耳」條

【槐雞】即槐耳之古籍別名典見蜀本草詳「槐耳」條

【槐藤】即決明子之古籍別名典見和漢藥考詳「決明子」條

【榔桐】產地 多生山谷間。形態 狀似青桐葉有極皮可供藥用其葉亦可療疾詳該條

性質 甘溫無毒。主治 療蠶咬毒氣入腹研末服。

【榔桐葉】性質 甘溫無毒。主治 療蛇蟲蜘蛛咬毒搗敷。

【歌女】即蚯蚓之古籍別名典見綱目詳「蚯蚓」條

【滴乳石】即鐘乳石之別名詳「鐘乳石」條

【鐘乳石】條

【滴乳香】即乳香之處方用名。詳「乳香」條

【滴金卵】即延胡索之古籍別名典見和漢藥考詳「延胡索」條

【滴滴金】即旋覆花之古籍別名典見綱目詳「旋覆花」條

【滴漏】即旋覆花之古籍別名典見和漢藥考詳「旋覆花」條

【滴騰芝】即黃連之古籍別名典見和漢藥考詳「黃連」條

【滴露】即草石蠶之古籍別名典見綱目詳「草石蠶」條

【滾水】即熱湯之俗名詳「熱湯」條

【滿山香】產地 西江爲最多。性質 辛溫。



滿山香

效能 止痛消腫毒通竅止瘡癢去風殺癢疥。

主治 跌打傷。【滿地金錢】即蒲公英之古籍別名典見和漢藥考詳「蒲公英」條

【滿江紅】基本 滿江紅爲雜草類之一種可供藥用。

主治 療癰疽入膏用。

【滿條紅】即紫荊花之古籍別名典見羣芳譜詳「紫荊花」條

【滿陰實】產地 生山野或園中。

形態 滿陰實爲雜草類之一種莖如芥或如瓜藤葉小七月結實如櫻桃可供藥用。

性質 酸平無毒。主治 益氣延年除熱止渴利小便。

【漂搖草】即翹搖之古籍別名典見陸放翁詩序詳「翹搖」條

【漂青黛】即青黛之處方用名詳「青黛」條

【漆子】主治 下血。

【漆姑草】即蜀羊泉之古籍別名典見綱目詳「蜀羊泉」條

【漆花】主治 小兒解顛腹脹交脛不行。

【漆柿】即梓柿之古籍別名典見日華諸家本草詳「梓柿」條

【漆莖】即澤漆之古籍別名典見本經詳「澤漆」條

【漆葉】基本 係漆樹科漆樹屬爲漆樹之葉其花子詳各該條



漆

主治 五尸勞疾殺蟲曝乾研末日用酒服一錢匕

參攷資料 ●華佗傳載彭城樊阿少師事佗佗授以漆葉青黏散方云服之去三蟲利五臟輕身益氣使人頭不白阿從其言年五百餘歲漆葉所在有之青黏生豐沛彭城及朝歌一名地節一名黃芝主理五臟益精氣本出於迷入山見仙人服之以告佗佗以爲佳語阿祕之近者人見阿之壽而氣力強盛問之因醉誤說人服多驗後無復人識青黏或云即黃精之正葉者也(蘇頌)按葛洪抱朴子云漆葉青黏凡蔽之草也樊阿服之得壽二百歲而耳目聰

也。傷絕之病。其血必熱。五痔由於大腸火熱。火瘡乃血爲火傷。婦人乳癰。肝家氣結。血熱所成。子臍急痛。由於血熱。燥火。槐爲苦寒。純陰之藥。爲涼血要品。故能除一切熱。散一切結。清一切火。如上諸病。莫不由斯三者而成。故悉主之。久服明目益氣。頭不白。延年者。血分無熱。則自自明矣。熱能傷氣。除火熱。則氣自益矣。涼血則髮不白。熱去則陰精不損。故延年也。其花味以苦勝。故除手足陽明足厥陰諸熱。證尤長耳。【清】黃宮繡本草求真

更甚。凡大小便血。及目赤腫痛。舌衄。並皆用之。

配合應用 ①治大腸脫肛。槐角。槐花各等分。炒爲末。用羊血蘸藥。炙熟食之。以酒送下。豬腰子去皮。蘸亦可。(百一選方)

②治內痔外痔。許仁則方。用槐角子一斗。搗汁酒稠。取地膽爲末。同煎丸。梧子大。每飲服十丸。兼作挺子。納下部。或以苦參末代地膽亦可。(外臺祕要方)

③治目熱昏暗。槐子。黃連二兩。爲末。蜜丸。梧子大。每漿水下二十丸。日二服。(聖濟總錄方)

④治大熱心悶。槐子。燒末。酒服方寸匕。(千金方)

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡脾胃虛寒及無溼熱者。禁用。忌鐵。景天爲之使。

著名方劑 槐角丸。治五極腸風。瀉血。糞前下血。名外痔。糞後有血。名內痔。大腸不收。名脫肛。穀道四面。瘻肉如爛。名舉痔。痔頭有孔。名瘻瘡。內有蟲。爲蟲痔。並皆治之。(和劑局方)槐角去梗炒。(一兩)

地榆。當歸。(酒焙)防風。黃芩。枳殼。

(蘇炒)上藥各半兩。爲末。酒糊丸。梧子大。每服五十丸。米飲下。

參攷資料 ①槐子。以十月已日採。相連多者。新盆盛。合泥。百日皮爛。爲水核。如大豆。服之。令腦滿。髮不白。而長生。(陶弘景)②折嫩房角。作湯代茗。主頭風。明目。補腦。水吞。黑子。以變白髮。扁鵲明目使髮不落法。十月上巳日。取槐子。去皮。納新瓶中。封口。二七。日初服一枚。再服二枚。日加一枚。至十日。又從一枚起。週而復始。令人可夜讀。書。延年益氣。力大良。(蘇頌)③按

太清草木方云。槐者。虛星之精。十月上巳日。採子服之。去百病。長生通神。梁書言。庾肩吾常服槐實。年七十餘。髮變皆黑。目看細字。此其驗也。古方以子入冬牛膽中。漬之。陰乾。百日。每食後吞一枚。云久服。明目通神。白髮還黑。有痔及下血者。尤宜服之。(李時珍)④按周禮外朝之法。面三槐。三公位焉。吳澄注云。槐之言懷也。懷來人於此也。王安石釋云。槐黃中懷其美。故三公位之。春秋元命苞云。槐之言歸也。古者樹槐聽訟。其下使情歸。

實也。(李時珍)⑤槐實生河南平澤。可作神燭。(別錄)⑥今處處有之。其木有極高大者。按爾雅。槐有數種。葉大而黑者。名懷槐。晝合夜開者。名守宮槐。葉細而青綠者。但謂之槐。其功用不言有別。四月五月開黃花。六月七月結實。七月七日採嫩實。搗汁作煎。十月採老實。入藥。皮根採無時。醫家用之最多。(蘇頌)⑦槐之生也。季春五日而免。十日而耳耳。更旬而始規。二旬而葉成。初生嫩芽。可煉熟。水淘過食。亦可作飲。代茶。或採槐子。種畦中。採苗食之。亦良。其木材堅重。有青黃白黑色。其花未開時。狀如米粒。炒過煎水。染黃甚鮮。其實作英連珠。中有黑子。以子連多者爲好。周禮秋取槐棹之火。淮南子。老槐生火。天玄主物簿云。老槐生丹槐之神異如此。(李時珍)

【槐槐生】即續斷之古籍別名。典見和漢藥考詳「續斷」條。

性實 苦寒。無毒。

【槐膠】 主治 一切風化。凝肝臟風。筋脈抽掣。及急風口噤。或四肢不收。頑痺。或毒風周身如蟲行。

一五四一

無不愈。彭辛菴云。此方三十年屢效者。劉松石保壽堂方。

①治楊梅毒瘡。乃陽明積熱所生。槐花四兩。略炒。入酒二盞。煎十餘沸。熱服。胃虛寒者勿用。(集簡方)

②治外痔長寸。用槐花煎湯類洗。并服之。數日自縮。(集簡方)

③治疔瘡腫毒。一切癰疽。發背。不論已成未成。但微痛者皆治。槐花微炒。核桃仁二兩。無灰酒一鍾。煎十餘沸。熱服。未成者二三服。已成者一二服見效。(醫方摘要方)

④治發背散血。槐花。秦豆粉。各一升。同炒。象牙色。研末。用細茶一兩。煎一盤。露一夜。調末三錢。傳之留頭。攝生妙用方)

⑤治下血血崩。用槐花一兩。槐灰二錢。鹽一錢。水三鍾。煎減半服。(摘玄方)

⑥治白帶不止。槐花炒。牡蠣煨。等分。爲末。每酒服三錢。取效。(摘玄方)

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡無實火實熱者。藥用忌鐵。

著名方劑 槐花散。治腸風。膿毒。下血。(古方) 槐花(炒)。側柏葉(杵。枳殼。炒)各等分。爲末。米飲下。

參攷資料 槐花今染家亦用。收時折其未開花。煮一沸。出之。釜中有所澄下稠黃滓。滲濾爲餅。染色更鮮明。治腸風熱瀉血甚佳。不可過劑。(寇宗奭)

【槐花米】即槐花之古籍別名。典見和漢藥考。詳【槐花】條。

【槐花炭】即槐花炒黑者之處方用名。詳【槐花】條。

【槐菌】即槐耳之古籍別名。典見唐本草。詳【槐耳】條。

性實 苦。平。無毒。

主治 邪氣產難。絕傷。及癰疹牙齦諸風。採嫩葉食。

歷代記述攷證 【宋】大明日華諸家本草論槐葉曰。煎湯治小兒驚癇壯熱疥癬及丁腫皮莖同用。

【槐蛾】即槐耳之古籍別名。典見綱目。詳【槐耳】條。

【槐塵米】即槐花之古籍別名。典見和漢藥考。詳【槐花】條。

【槐實】 處方用名 槐角。槐子。槐角子。

古籍別名 槐子。(羣芳譜) 外國名詞 Sophora japonica L. (拉丁) ハンジロ ハン

基本 屬豆科。爲槐之子實。

產地 陳仁山藥物生產辨云。槐角產廣東北江樂昌。八步等處。

植物學大辭典曰。產於東部亞細亞。

形態 槐爲落葉喬木。高二三丈。葉爲羽狀複葉。而互生。小葉數奇。而作長尖卵圓形。下面帶白色。

夏季於葉腋開黃白色蝶形花。作圓錐花序。排列雄蕊十枚。各自離生。雌蕊一枚。秋結類角豆之莢果。長二三寸。作連珠狀。莢內有扁平種子。

採取 七月採嫩實。十月採老實。

製法 雷斅曰。凡採得去單子。并五子者。只取兩子。三子者。以銅槌破。用烏牛乳浸一宿。蒸過。用

用法 與他藥水煎。或剉末。和作丸散。其嫩實可生搗用。

性質 苦寒。無毒。

效能 治腸風。便血。療內外五痔。用作祛風解熱藥。

主治 療五內邪氣熱。止涎唾。補絕傷火瘡。婦人乳癰。子臍急痛。

(本經) 久服明目益氣。頭不白。延年。治五痔瘡。癢。以七月七日取之。

搗汁。銅器盛之。日煎令可丸。如鼠屎。大納竅。中日三易。乃愈。又墮胎。

(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論槐實曰。治大熱及難產。

【唐】陳藏器本草拾遺論槐實曰。殺蟲去風。合房陰乾煮飲。明目。除熱。淚。頭腦心胸間熱。風。煩悶。風眩。

欲倒心顛吐涎如醉。淺漬如缸車上者。【宋】大明諸家本草論槐實曰。治丈夫女人陰瘡。淫痒。催生吞七粒。【宋】寇宗奭本草衍義論槐實曰。疎導風熱。【元】李東垣用藥法象論槐實曰。治口齒風。涼大腸。

潤肝燥。【明】繆希雍本草經疏論槐實曰。槐實味苦氣寒而無毒。別錄益以酸鹹宜矣。入手足陽明。兼入足厥陰經。其主五內邪氣熱者。乃熱邪實也。涎睡多者。脾胃有熱。

胡瓜所在。登羅而馳矣。(蘇頌)

【槐枝酒】 命名 本品係用槐樹枝煎汁和麴如常釀成之酒。故名。

主治 大麻癢痺。

【槐花】 處方用名 槐花炭。槐米炭。

古籍別名 槐米。槐花米。槐塵米。(和漢藥考)

外國名詞 Cassiae Pulpa. (Cassia, Sophora or Tora.) (Cassia Pulpa.)

基本 屬荳科槐樹之花蕾。

產地 陳仁山藥物生產辨云。槐花以廣西桂林產者為最。廣東連州東陂樂昌出者為佳。染料必須用之。山東青州更多出產。但其質色不及兩廣之好。九月新



(一) 花槐

形體 槐為落葉喬木。高二三丈。葉作羽狀複葉。小葉作長尖卵圓形。夏季於葉腋間開黃白色蝶

形花。作圓錐花序排列。後結類豆之莢果。長二三寸。作連珠狀。莢內有扁平種子。即是槐實。



(二) 花槐

採取 四五月採花曝乾。製法 寇宗奭曰。凡使槐花。須未開時採。取陳久者良。入藥炒用。染家以水煮一沸出之。其稠滓為餅。染色更鮮。

性質 苦平。無毒。效能 瀉熱。涼血。用治五痔及作一切下血藥。

主治 五痔。心痛。眼赤。殺腹臟蟲。及皮膚風熱。腸風瀉血。赤白痢。並炒研服。

歷代記述攷證 【金】張元素珍珠囊論槐花曰。涼大腸。【明】李時珍本草綱目論槐花曰。炒香頻嚼。治失音及喉痺。又療吐血。衄。中漏下。【清】賈九如辨藥指南論槐花曰。槐花體輕。色淡黃。氣和。味苦。性寒。能沈力涼。血性氣薄。而味

厚。入肺大腸二經。二三月萌莢。四五月開放。從木令生。而成於火月。火性味苦。苦能直下。且味厚。能沈。主清腸。紅下血。痔瘡。腫痛。膿毒淋瀝。此涼血之功。獨在大腸也。大腸與肺為表裏。能疏皮膚風熱。是灌肺金之氣也。

配合應用 ①治衄血不止。槐花。烏賊魚骨等分。牛生半炒為末。吹之。(普濟方)

②治舌衄不止。槐花末。傅之。即止。(朱氏集驗方)

③治吐血不止。用槐花燒存性。入麝香少許。研勻。糯米飲下三錢。(普濟方)

④治咯血唾血。用槐花炒研。每服三錢。糯米飲下。仰臥一時取效。(朱氏方)

⑤治小便尿血。槐花炒。鹽金煨。各一兩。為末。每服二錢。淡豉湯下。立效。(饒中祕密方)

⑥治大腸下血。用槐花。荊芥穗。等分。為末。酒服一錢匕。(經驗方)

用柏葉三錢。槐花六錢。煎湯日服。(集簡方) 又槐花。枳殼。等分。炒存性。為末。新汲水服二錢。(袖珍方)

⑦治暴熱下血。用生豬臟一條。洗淨。控乾。以炒槐花末。填滿。扎定。米醋沙鍋內。煮爛。搗丸。彈子大。日乾。每服一丸。空心。當歸煎酒化下。(永類鈴方)

⑧治酒毒下血。槐花。牛生半炒。一兩。山梔子五錢。為末。新汲水服二服。(經驗良方)

⑨治臟毒下血。新槐花炒研。酒服三錢。日三服。或用槐白皮煎湯服。(普濟方)

⑩治婦人漏血不止。用槐花燒存性。研。每服二三錢。食前溫酒下。(聖惠方)

⑪治血崩不止。槐花三兩。黃芩二兩。為末。每服半兩。酒一盞。銅秤。鍾一枚。桑柴火燒紅。浸入酒內。調服。忌口。(乾坤祕鑑方)

⑫治中風失音。炒槐花三更後。仰臥嚼咽。(危氏得效方)

⑬治癰疽發背。凡人中熱毒。眼花頭暈。口乾舌苦。心驚背熱。四肢麻木。覺有紅暈在背後者。即取槐花子一大抄。鐵杓炒褐色。以好酒一盞。漬之。乘熱飲酒。一汗即愈。如未退。再炒。一服極效。縱成膿者。亦

解燥除熱之功。非書所云能除溼熱之意乎。又其燥熱內擾。則蟲自爾見蝕。而五痔腹脹等症。自爾悉形。服此燥氣悉除。腸胃頓清。其氣自爾不結。非書所謂溫能散氣之意乎。又書所載有毒無毒。在人食既無病。又能以此療病。毒何由見。非書所云無毒之說乎。又其苦清兼備。既能清燥潤肺。復於蟲蝕性味不合。令其即水化水。非書所云有毒之說乎。究之止屬潤肺解心殺蟲之品。其言有毒。止是毒蟲之毒。而非毒人之毒也。其言無毒。因非毒人之毒。而為毒蟲之毒也。故

凡一切肺燥而見咳嗽不寧。腹中不和。五痔惡毒。並小兒黃瘦。便閉不解等症。服之無不奏效。昔東坡詩云。驅除三彭蟲。愈我心腹疾。義正是矣。但多食則有滑腸之慮。炒食味即香酥甘美。更有引火入肺。大腸受傷之慮。不可不細察耳。

配合應用 ①治寸白蟲。日食榧子七顆。滿七日。蟲皆化為水也。(孟詵方) ②又用榧子一百枚。去皮火燃燄之。經宿蟲消下也。胃弱者啖五十枚。(外臺祕要方)

③治好食茶葉。面黃者。每日食榧子七枚。以愈為度。(楊起簡便方)

④令髮不落。榧子三箇。胡桃二箇。側柏葉一兩。搗浸雪水。梳頭髮永不落且潤也。(聖惠方)

⑤治卒吐血。出先食蒸餅兩三箇。以榧子為末。白湯服三錢。日三服。(聖濟總錄方)

⑥治尸咽痛。瘡語言不出。榧實半兩。蕪荑一兩。杏仁。桂各半兩。為末。蜜丸。彈子大。含嚥。(聖濟總錄方)

用量 一錢半至三錢。

參攷資料 ①榧實治咳嗽白濁。助陽道。(生生編) ②榧子肺家果也。火炒食之。香酥甘美。但多食則引火入肺。大腸受傷爾。(朱震亨) ③榧子殺腹間大小蟲。小兒黃瘦有蟲積者宜食之。(寧原) ④榧實被子治療相同。當為一物無疑。但本經被子有毒。似有不同。亦因其能殺蟲蝕爾。汪穎以粗榧為被子。終是一類。不甚相遠也。(李時珍) ⑤性熱。同鵝肉。食生斷節風。又上壅人忌火氣。(吳瑞) ⑥

按物類相感志云。榧煮素羹。味更甜美。豬脂炒榧黑皮自脫。同甘蔗食。其渣自軟。又云。榧子皮反葷豆。能殺人。(李時珍) ⑦被子亦作排。其木名文木。斐然章采。故謂之榧。信州玉山縣者為佳。故蘇東坡詩云。彼美玉山果。榮為金盤實。(李時珍) ⑧榧實大如橄欖。殼色紫褐而脆。其中子有一重黑粗衣。其仁黃白色。嚼久漸甘美也。(寇宗奭) ⑨榧有一種粗榧。其木與榧相似。但理粗色赤耳。其子稍肥大。僅圓不尖。神農本草被子即粗榧也。(汪穎) ⑩榧生深山中。人呼為野杉。按羅願爾雅翼云。被似杉而異於杉。彼有美實。而木有文采。其木似桐而葉似杉。絕難長。木有牝牡。牡者華而牝者實。冬月開黃圓花。結實大小如棗。其核長如橄欖。核有尖者不尖者。無稜而殼薄。黃白色。其仁可生啖。亦可焙收。以小而心實者為佳。一樹不下數十斛。陶氏不識被子。惟蘇恭能辨為一物也。(李時珍)

【榮目】即新實之古籍別名。典見吳普本草。詳「蕪荑」條。

【榮花樹皮】即合歡皮之古籍別名。典見和漢藥考。詳「合歡皮」條。

【榮桐】即桐之古籍別名。典見綱目。詳「桐」條。

【榮莫】即土茯苓之古籍別名。典見和漢藥考。詳「土茯苓」條。

【榧梓】 命名 本品性溫而氣味。辭香。故名。

形體 榧梓為喬木類之一種。樹如林檎。花白綠色。結實如榧子。而小氣甚香。肉鬆而多毛。可供藥用。其木皮詳該條。

性質 酸甘微寒。無毒。

主治 主水瀉。腸虛。煩熱。散酒氣。並宜生食。

歷代記述攷證 【宋】蘇頌論經本草論榧梓實。曰。去胸膈積食。止渴除煩。將臥時啖一兩枚。生熟皆宜。【宋】開寶重定新本草論榧梓實。曰。溫中下氣。消食。除心間酸水。去臭辟衣魚。

參攷資料 ①榧梓實臥時啖之太多。亦痞塞胃脘也。(寇宗奭) ②榧梓實發熱。祕大小腸聚胸中痰。壅澀血脈。不宜多食。(陳士良) ③榧梓實同車螯食。發疝氣。

十四畫 櫻 櫻

【櫻櫛】

古醫別名 櫻櫛。(通志) 櫻櫛。綱目拾遺) 木李。(詩經) 木梨(埤雅) 唐梨。紅林櫛。(日本)

外國名詞 Cydonia sinensis, Thoun. (拉丁) クワリン

カラナシ ペニリンゴ (日本)

基本 係薔薇科棠梨屬。爲櫻櫛之實。

形態 櫻櫛爲喬木類之落葉

木本。高二三丈樹皮。每年常自剝落。痕如雲紋。又如鱗狀。葉卵形而尖。互生。春末隨葉開花。生於枝之頂端。萼之外面平滑。花冠五瓣。紅花。結實橢圓。頭尖。色黃。狀如木瓜。而大。蒂平滑。可供藥用。



櫻 櫛

性質 酸。平。無毒。

主治 解酒去痰。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論櫻櫛實曰。食之去惡

櫻 櫻

心。止心中酸水。【宋】大明諸家本草論櫻櫛實曰。煨食止痢。浸油梳頭。治髮白髮赤。【明】吳瑞日用本草論櫻櫛實曰。煮汁。服治霍亂轉筋。

參攷資料 ①櫻櫛氣辛香。致衣箱中殺蠹蟲。(孟詵) ②櫻櫛乃木瓜之大而黃色無重蒂者也。櫻子乃木瓜之短小而味酢澆者也。三物與木瓜皆是一類各種。故其形狀功用不甚相遠。但木瓜得木之正氣。爲可貴耳。(李時珍)

【櫻木】

古籍別名 水松。水杉。產地 出粵中潮州。多植於水旁。平堤曲岸間。

形態 櫻爲喬木類之一種。其幹得杉十之六。枝葉得松十之四。故以幹名。爲水杉。枝葉爲水松。其皮質頗堅韌。可製履與藥用。

主治 溼脚氣。辟邪風。作履著之。

【榧子】即榧實之處方用名。詳『榧實』條。
【榧花】即榧華。詳該條。

【榧華】

基本 本品即榧子之華也。採取 春月採之。性質 苦。

主治 療水氣。去赤蟲。令人好色。不可久服。

【榧實】

處方用名 榧子。古籍別名 被子。(本經) 赤果。玉榧。(日用) 玉山果。野杉。(綱目)

外國名詞 Torreya nucife-lia, S. et N. (拉丁) カヤカ

基本 係松柏科榧屬。爲榧之果實。

產地 凡山野平原恒有生長。



榧 實

形態 榧爲果類之常綠喬木。高數丈。葉濃綠色。作線形而扁平。前端甚尖銳。硬如針。互生。成二縱列。春夏間開花。花單性。雄花與雌花異株。種子如核果狀。秋末成熟。

花異株。種子如核果狀。秋末成熟。

一五三六

作橢圓形。長八九分。淡褐色。外部有多脂之肉。內有尖長之核。亦有橢圓之核。供食外亦可充藥用。

採取 秋冬間採之。

用法 生食炒食或和藥水煎服。

性質 甘。平。瀉。無毒。

效能 殺蟲。療痔。

主治 常食治五痔。去三蟲。蟲毒。鬼疰惡毒。

歷代記述攷證 【南北朝】陶弘景本草集註論榧實曰。食之療寸白蟲。【唐】孟詵食療本草論榧實曰。消穀。助筋骨。行營衛。明目。輕身。令人能食。多食一二升。亦不發病。【宋】寇宗奭本草衍義論榧實曰。多食滑腸。五痔人宜之。【明】李士材本草圖解論榧實曰。榧子消穀進食。殺蟲化積。止嗽助陽。療痔止瀉。【清】黃宮繡本草求真論榧實曰。榧實甘瀉微苦。體潤而滑。性平無毒。按據諸書有言氣味苦寒。能瀉溼熱爲肺家之果。又云性溫散氣。能去腹中邪氣及殺諸蟲。皆無定論。余按榧實甘潤。是其本質。凡肺不潤而燥者。得此則宜。故有

條。

【摘花】即紅花之古籍別名。典見和漢藥考。詳「紅花」條。

【摘綠】即綠豆皮厚而粉少者之古籍別名。典見和漢藥考。詳「綠豆」條。

【斲木鳥】即斲木鳥。詳該條。

【旗鎗】即雨前茶之別名。典見綱目拾遺。詳「雨前茶」條。

【竭伽角】即犀角之古籍別名。典見番書。詳「犀角」條。

【榕】古籍別名。倒生樹。不死樹。綱目拾遺。赤榕。（泉州志）

產地 出閩廣熱帶諸地。



榕

形態 榕爲喬木類之常綠木。其色有紅白及葉有大小諸種。高四五丈。葉橢圓。平滑。狀似大麻。葉頗繁茂。木本稜凹。枝幹拳曲。大者廣達十餘畝。枝條節節如藤。垂下枝上生根連綿。拂地根又生枝。

枝幹互相連屬。上下皆成連理。可以倒插。能生枝根。開花淡紅色。結實細圓。狀似無花果。子如冬青子。其根鬚可供藥用。

主治 固齒。止牙痛。摘取入竹筒。將鹽塞滿。泥封火煨存性。去竹筒研末。擦之。

參攷資料 ①榕葉似大麻。子如冬青。枝幹拳曲。木本稜凹。不成材。器而結奇香。其脂與漆相似。可以貼金。膠物。勝於楮脂。（藥性考）

②榕樹閩廣最多。他省則無。故紅梅驛以北無榕。大者陸十餘畝。離奇古怪。備木之異。然體曲不中梁柱。理斜不中材用。質虛不中薪爨。莊子所謂以不材而壽者也。漳浦黃石齋先生有榕頌。其木年久者。常結伽南香。焚之致鶴植於水際。其子可以肥魚。細枝曝乾束爲炬。風雨不滅。其脂乳可以貼金。接物與漆同。其鬚可入藥用。（嶺南雜記）

③說文以專爲古松字。六書故以古松字爲榕。而專爲南方之榕。通雅云。榕當別出。狀木始於稽含。分字始於戴侗。柳宗元詩。榕葉滿庭鶯亂啼。後山叢謔言。蔡州靈

公觀。有大木四垂傍出。人莫能識。張幾間人嘗至蔡。爲余言乃榕木。此木無用。惟枝上垂根。曝之可作火繩。以發炮。又可染黑。贊寧志所云。倒生木不死樹。橫枝生根下地如柱。即榕無疑。粵志榕之怪在根。自上生下。語曰榕木倒生根。（趙學敏）

④榕樹可以倒插。以枝爲根。復以根爲枝。故一名倒生樹。幹中空不堅。無所用。離之木也。其象如離之大腹。其中空處常產香木。炎精所結。往往有伽南。粵人以其香可來鷄子。可肥魚。多植於水際。其樹脂可以貼金。接物與漆相似。性畏寒。陰梅嶺則不生。故紅梅嶺有數榕。爲炎寒之界。有紅白大葉小葉數種。（粵志）

⑤按泉州府志。榕有二種。一種矮而盤桓。其鬚著地。復生爲樹。一種名赤榕。上徑廣大。二種蔭最寬。廣入藥用。有鬚者。（趙學敏）

命名 本品產閩中。秦地。故名。

古籍別名 萊。（綱目）萊。（植物學大辭典）
外國名圖 Corylus hetero-

phylla, Fisch. (拉丁) ハシバシ キンチャク ハシバミ (日本)

基本 係樺木科樺屬。爲榛之實中仁。

產地 生山野間。

形態 榛爲灌木類之落葉木。本高七八尺至二三丈。葉互生。葉身甚闊。呈圓心臟形。有尖端。邊緣有重鋸齒。早春開花。花小。單性。雌雄同株。雄花長穗狀。花序。雌花少數相聚。常構成頭狀花叢。結實爲堅果。至秋成熟。大五六分。外殼厚。形圓而狹。下有殼斗。包被其果。實中仁可供藥用。



榛

性質 甘。平。無毒。

主治 益氣力。實腸胃。令人不飢。健行。

歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草論榛實仁曰。止飢。調中。開胃。

玄石即慈石之黑色者。慈磨鐵鋒則能指南。然常偏東不全南也。其法取新鑽中獨縷以半芥子許。蠟綴於鐵腰無風處垂之。則針常指南。以針橫貫燈心浮水上亦指南。然常偏兩位。土宿真君曰。鐵受太陽之氣始生之初石產焉。一百五十年而成慈石。又二百年孕而成鐵（寇宗奭）

【慈石毛】

性質 鹹溫無毒。
主治 補絕傷益陽道。止小便白數。治腰脚去瘡癰。長肌膚。令人有子。宜入酒。

【慈石酒】

製法 用慈石木通菖蒲等分袋盛。浸酒飲。

毛石功狀殊也。（陳藏器）

【慈竹瀝】

主治 腎虛耳聾。

【慈竹瀝】

主治 療熱風和粥飲服。

【慈竹瀝】

主治 小兒頭身惡瘡。燒散和油塗之。或入輕粉少許。

【慈姑】

命名 本品一根。歲生十二子。如慈姑之乳諸

子故名。

古籍別名 藉姑。水萍（別錄）
樣了草（蘇恭）燕尾草（大明）河
鳧茈。白地栗（圖經）箭搭草（救
荒）

外國名詞 Sagittaria Sag-
ittaria, L. (拉丁)

產地 生水田間。

形態 慈姑為水草類之一種。高三四尺。青莖中空。葉如燕尾。前尖後歧。秋開白花。為圓錐花序。霜後葉枯。根乃練結作橢圓形。色白而瑩滑。可供藥用。花葉詳各該條。



慈姑

採取 冬春採之。

性質 苦甘微寒無毒。

主治 百毒。產後血悶。攻心欲死。產難胞衣不出。搗汁服一升。又下石淋。

參攷資料 慈姑冷有毒。多食發虛熱。及腸風痔漏。腸中帶下。瘡癰。以生薑同煮佳。懷孕人不可

食。大明）○吳人常食之。令人發

脚氣癰。緩風。損齒。失顏色。皮肉乾燥。卒食之。使人乾嘔也。（孟詵）

【慈姑花】

主治 明目去滯。治一切疔腫痔漏。

【慈姑葉】

主治 諸惡瘡腫小兒避癘丹毒。搗爛塗之。即便消退。甚佳。

歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草論慈姑葉曰。治蛇蟲咬。搗爛封之。【明】李時珍本草綱目論慈姑葉曰。調蚌粉塗瘰癧。

【慈鳥】

命名 鳥字篆文象其形也。而其初生母哺。長則反哺。不忘慈母。故名。

古籍別名 慈鴉（嘉祐）孝鳥（說文）寒鴉（綱目）

外國名詞 Corvus neglectus Sol. (拉丁) タウガラ

基本 係脊椎動物鳥類鳴禽類鳥鵒科。藥用慈鳥之肉。

產地 北方山林中尤多。

形態 慈鳥為林禽類之一種。乃鳥之別稱。似鴉而稍小。嘴之尖

端。較細。體黑色。而有紫綠色之光澤。多鳴於早晨。好食田圃農作物害鳥之屬。肉可供藥用。

性質 酸鹹平無毒。

主治 補勞治瘵。助氣止咳。嗽。骨蒸羸弱者。和五味菹炙食之。良

【慈鳥膽汁】

採取 伺慈鳥夜睡時。以利刃斷其頭。急剖其腹。則膽汁全飽。並無漏溢。然後以線穿陰乾。入藥用。若取之不得法。或被驚覺。縱殺得其膽。亦空皮無汁矣。

主治 明目開瞽。治青盲。翳障。眼弦風爛。並點之。解藤黃毒。

【慈姑】即慈姑。詳該條。

【慈菇花】即兩韭之原名。詳『兩韭』條。

【慈鴉】即慈鳥之古籍別名。典見嘉祐補註本草。詳『慈鳥』條。

【慈謀勒】即小茴香之古籍別名。典見開寶本草。詳『小茴香』條。

【慈鰾鱧】即海鰾鱧之古籍別名。典見日華諸家本草。詳『海鰾鱧』條。

【截子瑪瑙】即瑪瑙黑白相間者之古籍別名。典見綱目。詳『瑪瑙』

配合應用

●治耳卒聾閉。吸鐵石半錢。入病耳內。鐵砂末入不病耳內。自然通透。(直指方)

●治陽事不起。磁石五斤。研清酒漬。二七日。每服三合。日二夜一。(千金方)

(千金方)

●磁珠丸。治眼昏內障。神光寬大漸散。昏如霧。霧中行。漸睹空花。物成二體。久則光不收。及內障。真磁石火煨醋淬七次。二兩。磁砂一兩。神麴生用三兩。爲末。更以神麴末一兩。煮糊加蜜丸。梧子大。每服二十九。空心飯湯下。(倪微德原機啓微集方)

●治金瘡血出。磁石末傳之。止痛斷血。(千金方)

●治腎虛耳聾。眞慈石一豆大。穿山甲燒存性。研一字。新棉塞耳內。口含生鐵一塊。覺耳中如風雨聲。卽通。(濟生方)

●治老人耳聾。慈石一斤。搗末。水淘去赤汁。綿裹之。豬腎一具。於露地。每日取水作粥食。經年氣力強盛。顏如童子。(養老書方)

●治小兒驚癇。用慈石鍊水飲。(聖惠方)

●慈石丸。治子宮不收。名痼疾。痛不可忍。用慈石酒浸。研末。米糊丸。梧子大。每臥時滑石湯下。四十丸。次早用慈石散。米湯服二錢。散用慈石酒浸半兩。鐵粉二錢。牛當歸五錢。爲末。

●治大腸脫肛。慈石半兩。火煨醋淬七次。爲末。每空心米飲服一錢。(直指方) 又用慈石末。麵糊調塗。臍上入後洗去。(簡便方)

●治金瘡腸出。納入。以慈石滑石各三兩。爲末。米飲服方寸匕。日再。(劉涓子鬼遺方)

●治誤吞針鐵。眞慈石棗核大。鑽孔線穿吞。拽之立出。(錢相公篋中方)

●治疔腫熱毒。慈石末。酥和封之。拔根立出。(外臺祕要方)

●治諸般腫毒。吸鐵石三錢。金銀藤四兩。黃丹八兩。香油一斤。如常熬膏貼之。(乾坤祕蘊方)

●用蠟三錢。至一兩。

●施用宜忌 重鎮之品。類多傷氣。故可暫用。而不可久服。慈丹皮。莽草。畏黃石。脂。殺鐵毒。消金。柴胡。爲之使。

著名方劑

●磁石豬腎羹。治老人久患耳聾。養腎臟。強骨氣。(養老書方) 磁石一斤。(杵碎水淘去赤汁綿裹) 豬腎一對。(去脂膜細切) 上以水五升。煮磁石取二升。去磁石。投腎調和。以葱。姜。椒。作羹。空腹食之。或作粥。及入酒並佳。●磁珠丸。治神水寬大。漸散。昏如霧。霧中行。漸覩空中有黑花。視物成二。及內障。神光淡綠。淡白色。及治耳鳴耳聾。(倪微德原機啓微集方) 磁石二兩。辰砂一兩。神麴三兩。(生) 上三味。更以一兩水和。作餅。煮浮入前藥。煉蜜丸。每服十九。加至三十九。空心米飲下。

●參攷資料 ●慈石養腎氣。填精。腎虛耳聾目昏者。皆用之。(寇宗奭) ●慈石重可去怯。與鐵粉之類是也。(陳藏器) ●慈石法水色黑。而入腎。故治腎家諸病。而通耳明目。一士于類病目。漸覺昏暗。生翳。時珍用東垣羌活勝風湯。加減法。與服。而以磁珠丸佐之。兩月遂如故。蓋磁石入腎。鎮養真精。使神光不外移。磁砂入心。鎮養心

血。使邪火不上侵。而佐以神麴。消化滯氣。生熟並用。溫養脾胃。發生之氣。乃道家黃婆媒。合嬰姁之理。制方者。宜窺造化之奧。乎方見孫真人千金石神麴丸。但云明目。百歲可讀細書。而未發出藥義。義也。執謂古方不可治。今病耶。獨孤酒云。慈石乃堅頑之物。無融化之氣。止可假其氣服食。不可久服。渣滓必有。大患。夫藥以治病。中病則止。此猶猶可。何獨慈石不可服。耶。慈石既煉末。亦非堅頑之物。惟在用者。能得病情。而中的爾。淮南萬畢術云。慈石懸井。亡人自歸。注云。以亡人衣。裹慈石。懸於井中。逃人自反也。(李時珍) ●今慈州徐州及南海。傍山中。皆有之。慈州者。歲貢最佳。能吸鐵。連數十鐵。或一二斤刀器。回轉不落者。尤良。採無時。其石中有孔。孔中有黃赤色。其上有細毛。功用更勝。按南川異物志云。漲海崎頭水淺。而多慈石。微外大舟。以鐵索固之者。至此皆不得過。以此言之。海南所出尤多也。蘇頌云。慈石其毛輕。紫石上。頗濇。可吸連鐵。俗謂之吸鐵石。其

除熱。故主大熱煩滿。及消癰腫。鼠瘻頸核。喉痛者。足少陽少陰虛火上攻所致。鐵以入腎。其性鎮墜而下吸。則火歸元。而痛自止也。夫腎為水臟。磁石色黑而法水。故能入腎。養腎臟。腎主骨。故能強骨。腎藏精。故能益精。腎開竅於耳。故能療耳聾。腎主施泄。久秘固而精氣盈益。故能令人有子。小兒驚癇。心氣怯。痰熱盛也。鐵能潤下。重可去怯。是以主之。甄權云。補男子腎虛風虛。身強腰中不利。加而用之。【明】李士材本草圖解論磁石曰。慈石辛。鹹。色黑。入腎。養腎益精。明目。聰耳。諸藥石皆有。毒。且不宜久服。獨磁石性稟冲和。無猛悍之氣。有補腎益精之功。大都漬酒優於丸散。石性體重。故附【清】黃宮繡本草求真論磁石曰。磁石即俗煒石。磁為鐵母。故見鐵即能以引。是以有磁之說也。磁石味辛而鹹。微寒。無毒。得中和之氣。能入腎鎮陰。使陰氣龍火不得上升。故千金磁石丸。用此以治耳鳴。嘈嘈。腎虛。瞳神散。大謂有磁以鎮養精神。使真水不得外移。磁砂入心。鎮養心血。使邪

火不得上升。侵耳目。腎受陰矣。且磁入腎。腎主骨。磁味辛。辛主散。磁味鹹。鹹鎮堅。磁質重。重鎮怯。故凡周痺風溼。而見肢體酸痛。驚癇腫核。誤吞針鐵。金瘡血出者。何一不用。此以為調治。昔徐之才十劑篇云。重可去怯。磁石鐵粉之屬是也。故怯則氣浮。宜重劑以鎮之。然亦不可與鐵同用。色黑能吸鐵者。真火煨醋并碾末水飛用。【清】楊時泰本草述鈎元論磁石曰。慈石孕二百年而成鐵。則其生化之氣所畢萃者。金也。腎水之母。氣所獨鍾。而感召特異。故能益腎之氣。以療虛。即其上通耳目之竅。而益聰明。固可思矣。夫腎氣虛。中之陽也。腎氣足。是以更療風虛。蓋腎乃肝之化原。腎氣虛。而肝亦因之風屬陽也。肝之氣虛。故曰風虛。張難峯有云。臂細無力。不能任重者。此乃肝腎氣虛。風邪客於營衛之間。使氣血不能周養。故也。肝主項背與臂膊。腎主腰膝與腳膝。此證乃肝氣偏虛。宜專補肝。補腎雖峯此說。不正。與本經所指周痺風溼。肢節中痛。不可持物。洗洗酸消者。相發明歟。

別錄消癰腫。鼠瘻頸核。此皆通關節之所及。而其本由於補腎虛風。虛如止。補腎虛而不補風虛。則亦不能通關節。以療諸證矣。蓋肝以腎為體。腎又以肝為用也。總之慈石主治。所以於腎氣為切者。由其腎中母氣。確有感召之精。能通於氣血之中耳。如止云。重可去怯。不泛然而同諸石之用哉。又按獨孤酒云。慈石乃堅頑之物。無融化之氣。止可假其氣。不可服食。是以經氏云。用之漬酒。優於丸散。觀慈石丸。治精氣虛極。乃以酒煮碎。磁良久。嘗之。酒有石味。將石并諸藥。曬乾。再拌再曬。如此數次。務令石味入諸藥中。和透。更以此酒攪和。諸藥為丸。庶幾得之。

辨偽 湖南祁陽呂雲和曰。查磁石祁陽亦產。並無若何真偽分別。但有頑與活者之辨。活者確有吸鐵引針能力。試盛鐵砂於銅質薄盤內。盤下以磁石引之。則盤內之砂。可豎直如毛。或用瓷碗盛水。水面浮一小薄紙。再置針於紙上。外以磁石隔誘。而碗內之針。即隨其順逆轉動。然初探之於山中。未能全活。須用鐵砂養著。若藏之於枕畔。使其得沾人體熱度。尤為更佳。

近人學說 張銘德曰。磁石一味有死活之分。根尖之別。活磁石試驗之法。取磁石一塊。再用銅盤秤之。銅盤上面攪以針砂。銅盤下面再用磁石靠盤底亂動。磁石到何處。則上面針砂即豎立。但磁石年深日久。亦就不靈。即為死磁石。因在藥店內。年久不能吸受天地之精氣。故無吸鐵之能。但磁石根。無論新取。年久之貨。均無吸鐵之能。體質本堅結。與諸石不同。諸石體鬆。打碎有層層凸頂色。赤。磁石如用火煨醋製。亦乏吸鐵之能。但磁石研粉。又非用醋製不可。張山雷曰。西人謂磁石琥珀內有電氣。其能吸引者。皆是電氣發力。能吸引之也。琥珀能拾芥。而不能吸鐵。磁石能吸鐵。而不能拾芥。以所含之電氣不同也。然單以氣論。不如兼以質論。磁石之質類鐵。故以類相從而吸鐵。琥珀之質能黏。故以質為用而拾芥。辨藥性者。所貴體用兼論也。

美好者。同其肥細切到濃。將象牙末。及人所退爪甲爲末。共爲研細末。拌入所剖肉內。再爲勻割。令其合。一厚數籊。籊周圍約一飯頃。其籊卽自迸脫。竟有迸至二三尺遠者。(趙恕軒)

【嘉草】①卽藟荷之古籍別名。典見綱目。詳「藟荷」條。②卽西草之別名。詳「西草」條。

【嘉魚】命名 嘉者美也。言魚味美故名。

古籍別名 鉢魚。拙魚。丙穴魚。

(綱目)

外國名詞 Salvelinus plur-

ius或S. kundscha pallas. (拉丁)イワナ或アメマス(日本)

基本 係脊椎動物魚類喉鰓類鮭科。爲嘉魚之肉。

產地 出四川雅安縣及廣西蒼梧縣江湖間。

形態 嘉魚爲鱗類魚屬之一種。形如鱖。頭鈍圓。鱗細小而圓滑。

皮面富有黏液。體長一尺三寸。脊鰭有十四五刺。後方又有一脂鰭。

鰭亦有十二刺。背及體旁灰青。多淡黑斑。惟背面略帶煤黑色。腹

部灰白。微帶橙色。春則隨水出穴。秋則逆水入穴。其肉白如玉。脂多味美。可供食與藥用。



嘉 魚

部灰白。微帶橙色。春則隨水出穴。秋則逆水入穴。其肉白如玉。脂多味美。可供食與藥用。

性質 甘。溫。無毒。

主治 煮食療腎虛消渴。勞瘦虛損。

歷代記述攷證 【宋】開寶重定新本草論嘉魚肉曰。食之令人肥健悅澤。

參攷資料 ①嘉魚食乳水。功用同乳。能久食之力強於乳。(馬志) ②嘉魚常於崖下孔中食乳石沫。故補益也。(孟詵)

【嘉實】卽雀之古籍別名。典見綱目。詳「雀」條。

【嘉慶子】卽李子之別名。詳「李子」條。

【嘉樹】卽黃葛樹之古籍別名。典見綱目。詳「黃葛樹」條。

【嘉樹】卽黃葛樹之古籍別名。典見綱目。詳「黃葛樹」條。

見綱目拾遺。詳「黃葛樹」條。【園嚙哥】卽蜂虎之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「蜂虎」條。

【園魚】卽鼈甲之俗名。詳「鼈甲」條。

【園慈姑】卽山慈姑之古籍別名。典見和漢藥考。詳「山慈姑」條。

【墓頭回】基本 墓頭回爲雜草類之一種。可供藥用。

主治 婦人崩中赤白帶下。同紅花入酒水童便煎服。

【壽星桃】卽桃之古籍別名。典見綱目。詳「桃」條。

【壽星草】①卽刺虎之古籍別名。典見綱目。詳「刺虎」條。②卽伏牛之別名。詳「伏牛花」條。

【壽祖】卽威靈仙之古籍別名。典見和漢藥考。詳「威靈仙」條。

【奪命丹】卽接骨仙桃之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「接骨仙桃」條。

【奪香花】卽瑞香花之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「瑞香花」條。

【奪皮香】卽瑞香之古籍別名。典見和漢藥考。詳「瑞香」條。

【奪皮香】卽瑞香之古籍別名。典見和漢藥考。詳「瑞香」條。

【嫩柴胡】卽柴胡之處方用名。詳「柴胡」條。

【嫩桑枝】卽桑枝之處方用名。詳「桑枝」條。

【嫩前胡】卽前胡之處方用名。詳「前胡」條。

【嫩鹿茸】卽鹿茸之古籍別名。典見和漢藥考。詳「鹿茸」條。

【嫩鈎藤】卽鈎藤之處方用名。詳「鈎藤」條。

【夢神】卽胡麻之苗。典見別錄。詳「胡麻」條。

【實東兒樹】卽山茱萸之古籍別名。典見和漢藥考。詳「山茱萸」條。

【實除雙牙】卽玳瑁之古籍別名。典見和漢藥考。詳「玳瑁」條。

【對蛤蚧】卽蛤蚧之處方用名。詳「蛤蚧」條。

【對節菜】卽牛膝之古籍別名。典見綱目。詳「牛膝」條。

【對廬】基本 對廬爲溼草類之一種。形如菴蘭。可供藥用。

採取 八月採之。

性質 苦寒。無毒。

主治 除大熱療疥瘡。煮汁洗。

主治 鼠耳。主痺寒。寒熱止欬。

歷代記述攷證 【宋】大明諸

家本草論鼠麴草曰。鼠麴調中益

氣。止洩除痰。歷時氣。去熱嗽。雞米

粉作糗食。甜美。【元】李東垣用藥

法象論佛耳草曰。佛耳治寒嗽及

痰。除肺中寒。大升肺氣。

用量 八分至錢半。

施用宜忌 款冬花爲之使。

參攷資料 ①治寒痰嗽。宜用

佛耳草。熱痰嗽。宜用燈籠草。【朱

震亨】②別錄云。治寒熱止欬。東

垣云。治寒嗽。言其標也。日華云。治

熱嗽。言其本也。大抵重嗽多是火

鬱於內。而寒覆於外也。按陳氏經

驗方云。三奇散治一切款嗽。不問

久近晝夜無時。用佛耳草五十文。

款冬花二百文。熟地黃二兩。焙研

末。每用二錢。於爐中燒之。以筒吸

烟嗽下。有涎吐去。予家一獲久病

此。醫治不效。偶在沅州得一婢。用

此法兩服而愈也。【李時珍】③麴

言其花黃如麴色。又可和米粉食

也。鼠耳言其葉形如鼠耳。又有白

毛。蒙茸似之。故北人呼爲茸。母佛

耳則鼠耳之訛也。今淮人呼爲毛

耳朵。則香茅之芽。似當作毛。按段

成式雜俎云。蚰蜥酒草。鼠耳也。一

名無心草。豈蚰蜥食此。故有是名

者耶。【李時珍】④鼠麴草生平岡

熱地。高尺餘。葉有白毛。黃花。荆楚

歲時記云。三月三日。取鼠麴汁。蜜

和爲粉。謂之龍古料。以歷時氣。醉

音板米餅也。山南人呼爲香茅。取

花雜澤。染褐。至破猶鮮。江西人

呼爲鼠耳草也。【陳藏器】⑤佛耳

草。嶺人謂之黃蒿。二三月苗長尺

許。葉似馬齒莧。而細有微白毛。花

黃。土人採莖葉和米粉。搗作粬果

食。【汪機】⑥日華本草鼠麴。卽別

錄鼠耳也。唐宋諸家不知。乃退鼠

耳入有名未用中。李杲藥類法象

用佛耳草。亦不知其卽鼠耳也。原

野間甚多。二月生苗。莖葉柔輭。葉

長寸許。白茸如鼠耳之毛。開小黃

花。成穗結細子。楚人呼爲米麴。北

人呼爲茸。母故邵桂子。鹽天語云。

北方寒食採茸。母草和粉食。宋徽

宗詩云。茸母初生認禁煙者是也。

【李時珍】

【鼠壤土】 基本 本品爲土之

柔鬆而無塊者

主治 中風。筋骨不隨。冷痺。骨

節疼。手足拘急。風掣痛。偏枯。死肌

多收曝乾。蒸熱袋盛。更互熨之。

歷代記述攷證 【唐】孫思邈

千金翼論鼠壤土曰。小兒尿和塗

疔腫。

十四畫

【僕公墨】卽蒲公英之古籍別名。

典見圖經本草。詳「蒲公英」條。

【僕壘】卽麥門冬之古籍別名。典

見吳普本草。詳「麥門冬」條。

【僕法實】卽蔓荊子之古籍別名。

典見和漢藥考。詳「蔓荊子」條。

【僕婆】卽雁之古籍別名。典見梵

書。詳「雁」條。

【僕庵草】卽當歸之古籍別名。典

見和漢藥考。詳「當歸」條。

【僕荊藿】卽浙烏頭之古籍別

名。典見綱目拾遺。詳「浙烏頭」條。

【卽草烏頭之吳俗名。詳「草烏

頭」條。

【嗽神】卽五味子之古籍別名。典

見和漢藥考。詳「五味子」條。

【嗽藥】卽白前之古籍別名。典

見唐本草。詳「白前」條。卽百部

之古籍別名。典見和漢藥考。詳「

百部」條。

【嘉香肉】 古籍別名 家鄉肉。

性質 味鹹。甘。性平。

主治 補虛開胃。

參攷資料 ①家鄉肉。金華屬

邑。俱有之。秋卽醃。給客販入省城

市。賣其肉皮白。肉紅。鮮氣香。美。不

似他處醃豬肉。色少鮮澤也。但一

入杭城店。便加硝磺。投缸中浸透。

然後出售。蓋不爾則肉味淡。反不

美。而秋時尙暖。不漬透硝磺。又易

腐臭也。肉爲硝磺。食之恐乏補益。

不似火腿。醃陳久者爲佳。然今

店中所售火腿。均以家鄉肉腿風

乾。至次年度上起線衣。充陳火腿

賣。人多不察。若療病作食。餌眞

金華腿方有效也。藥鑑②未經

杭肆漬漬之肉。故能補虛。若經漬

漬。透便能燥肺。凡肺痿陰虛咳嗽

者。恐非所宜。產婦虛勞須補者。亦

忌。其肥肉得硝磺入腹。卽成痰。體

肥作痰者。亦不宜多食。倘食之作

痰。杏仁研食可解。附治箭鏃不出

方如下。用陳年醃肉。去皮取紅活

十三畫 鼠

十四畫 僕 僧 嗽 嘉

十三臺鼠

水一盞。葱白二寸。豉三十粒。煎一盞分三服。(活人書方)

⑤男子陰易及勞復。蝦鼠屎湯。用蝦鼠屎兩頭尖者十四枚。韭根一大把。水二盞。煎一盞。溫服得汗。爲效。未汗再服。(南陽活人方)

⑥治大小便秘。雄鼠屎末。傳臍中立效。(普濟方)

⑦治室女經閉。牡鼠屎一兩。炒研。空心溫酒服二錢。(千金方)

⑧治子死腹中。雄鼠屎二七枚。水三升。煮一升。取汁作粥食。胎即下。

⑨治產後陰脫。以溫水洗。輾。用雄鼠屎燒烟熏之。即入。(熊氏方)

⑩治婦人吹奶。鼠屎七粒。紅棗七枚。去核。包鼠屎存性。入麝香少許。溫酒調服。(集要方)

⑪治乳癰初起。雄鼠屎七枚。研末。溫酒服。取汗即散。(壽域方)

⑫治乳癰已成。用新漚鼠屎。黃連。大黃。各等分。爲末。以黍米粥清和塗四邊。即散。(姚僧垣方)

⑬治鼠瘻潰壞。新鼠屎一百粒。收密器中。五六十日。粹碎。即傳之。效。(千金方)

⑭治疔瘡惡腫。鼠屎。亂髮等分。燒灰。針瘡頭。納入大良。(普濟方)

⑮治兒驚吐血。胸腹刺痛。用鼠屎。燒末。水服方寸匕。不省者。灌之。(肘後方)

⑯治折傷瘀血。傷損筋骨疼痛。鼠屎。燒末。豬脂和。傅急裏。不過半日。痛止。(梅師方)

⑰治中馬肝毒。雄鼠屎三七枚。和水研飲之。(梅師方)

⑱治馬咬踏瘡。腫痛作熱。鼠屎二七枚。故馬韁五寸。和燒研末。豬脂調敷之。(梅師方)

⑲治狂犬咬傷。鼠屎二升。燒末。傅之。(梅師方)

⑳治貓咬成瘡。雄鼠屎。燒灰。油和傅之。曾經效驗。(壽域方)

㉑治兒齒不生。雌鼠屎兩頭圓者三七枚。一日一枚。拭其齒。勿食鹹酸。或入麝香少許。尤妙。(小品方)

㉒治小兒白禿。鼠屎。瓦煨存性。同輕粉。麻油塗之。(百一選方)

㉓治小兒鹽胸。鼠屎。燒研。水酒空心服之一錢。

㉔治小兒燕窩生瘡。鼠屎。研末。

香油調搽。

㉕治毒蛇傷。野鼠屎。水調塗之。(邵真人經驗方)

㉖治鼠瘻。鼠屎。水調塗之。用鼠錢半至二錢。

㉗治鼠瘻。鼠屎。水調塗之。參攷資料。①有小毒。食中誤食。令人目黃成疸。(李時珍)②此即人家常鼠也。以其尖喙善穴。故南陽人謂之鼯鼠。其壽最長。故俗稱老鼠。其性疑而不果。故曰首鼠。嶺南人食而諱之。謂爲家鹿。鼠字篆文象其頭齒腹尾之形。(李時珍)

【鼠藤】 命名 本品鼠喜食之。故名。產地 生山野間。形態 鼠藤爲蔓草類之一種。其莖繞他木莖。葉滑淨似枸杞。花白有節。苗頭有毛。其藤莖可供藥用。

採取 以鼠所咬處之莖。採入藥用。性質 甘。溫。無毒。主治 丈夫五勞七傷。陰痿。益陽道。小便數白。腰脚痛冷。除風氣。壯筋骨。補衰老。好顏色。濃煎服之。取微汗。亦浸酒服。性溫。稍令人悶。

無苦也。

一五二八

【鼠麴草】 命名 本品葉形似鼠色。且可和米粉食之。故名。

古別名 鼠耳。無心草。(別錄)香茅。(拾遺)佛耳草。(法象)黃蒿。(會編)米麴。毛耳。朵。茸母。(綱目)鼠直。茸母草。黍麴草。毛女兒菜。和漢藥考。毗蜉酒草。(酉陽雜俎)

基本 屬菊科爲鼠麴草之葉。產地 凡山野間及陰溼地恒多生焉。

形態 鼠麴草莖高尺餘。莖葉俱柔。輾葉稍作倒披針形。長寸餘。有毛。茸花爲麴黃色。小筒狀。花冠作頭狀。花序排列。

採取 二三月間。採取莖葉。性質 甘平。無毒。效能 用作祛痰藥。



鼠麴草

瘡。取此蟲食其絲。卽愈。(李時珍)

●按陸佃埤雅云。鼠負食之令人善淫。故有婦名。又名鼠姑。猶鼠婦也。鼠黏猶鼠負也。然則婦負二義俱通矣。因淫化生。故俗名淫生蟲。

曰地雞。地鼠者。象形。(李時珍) ●今處處有之。多在下溼處。蟻器底及土坎中。詩云。蟬蟻在室。鄭玄言家無人則生。故也。(蘇頌) ●淫生蟲多足。大者長三四分。其色如蚓。背有橫紋。蹙起。用處絕少。(寇宗奭) ●形似衣魚。稍大。灰色。(李時珍)

【鼠黏】卽鼠婦之古籍別名。典見蜀本草。詳「鼠婦」條。

【鼠黏子】卽牛蒡子之處方用名。詳「牛蒡子」條。

【鼠負】卽夜明砂之古籍別名。典見和漢藥考。詳「夜明砂」條。

【鼠梓】卽鼠李子之古籍別名。典見別錄。詳「鼠李子」條。

【鼠梓木】卽女貞之古籍別名。典見和漢藥考。詳「女貞」條。

【鼠菊】卽鼠尾草之古籍別名。典見救荒本草。詳「鼠尾草」條。

【鼠鄉】卽礬石之古籍別名。典見

吳普本草。詳「礬石」條。

【鼠薺】卽荊芥之古籍別名。典見本經。詳「荊芥」條。

【鼠櫛】卽山查之古籍別名。典見唐本草。詳「山查」條。

【鼠齒莧】卽馬齒莧之古籍別名。典見和漢藥考。詳「馬齒莧」條。

【鼠梨】卽鹿梨之古籍別名。典見陸璣詩疏。詳「鹿梨」條。

【鼠莧】卽龍常草之古籍別名。典見爾雅。詳「龍常草」條。

【鼠莽】卽莽草之古籍別名。典見綱目。詳「莽草」條。

【鼠莎】卽香附子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「香附子」條。

【鼠莖】●卽參果根之古籍別名。典見別錄。詳「參果根」條。●卽藜蘆之古籍別名。典見和漢藥考。詳「藜蘆」條。

【鼠頭】 主治 瘰癧鼻瘻。湯火傷。瘡根末。豬脂調傳。

主治 針棘竹木諸刺。在內中不出。搗爛厚塗之。卽出。箭鏃針刃在咽喉胸膈諸隱處者。同肝搗塗之。又塗小兒解顛。以綿裹塞耳。治聾。

【鼠腦】 主治 瘰癧鼻瘻。湯火傷。瘡根末。豬脂調傳。

主治 針棘竹木諸刺。在內中不出。搗爛厚塗之。卽出。箭鏃針刃在咽喉胸膈諸隱處者。同肝搗塗之。又塗小兒解顛。以綿裹塞耳。治聾。

【鼠膽】 採取 捕得活鼠。縛住。以熱湯泡死。破喉取之。其色真紅者是也。

主治 目暗。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論鼠膽曰。點目。治青盲。雀目。不見物。滴耳治聾。

參攷資料 諸家本草不言鼠膽治聾。而葛洪肘後方甚稱其妙。云能治三十年老聾。若卒聾者。不過三度也。有人側臥。澀膽入耳。盡膽一個。須臾汁從下耳出。初時更聾。十日乃瘳矣。後世輩方祖此。亦多用之。(李時珍)

【鼠糞】 處方用名 兩頭尖。殿古籍別名 定心草。

基本 係獸類齧齒動物鼠屬殿鼠之屎。

產地 陳仁山藥物生產辨云。兩頭尖產自陝西省。各省各屬咸有出。

形態 作橢圓形。兩頭較尖。故有兩頭尖之名。較米粒稍大。色黑。

製法 採得陰乾。用。性質 甘微寒。無毒。

效能 治傷寒勞復。消乳癰瘡。瘍。用作解熱解毒藥。

主治 小兒疳疾。大腹。葱豉同煎服。治時行勞復。

歷代記述攷證 【宋】日華諸家本草論鼠糞曰。治痢疾。明目。

【明】李時珍本草綱目論鼠糞曰。煮服治傷寒勞復發熱。男子陰易腹痛。通女子月經。下死胎。研末服。治吹奶。乳癰。解馬肝毒。塗鼠糞瘡。燒存性。傳折傷。打腫。諸瘡。貓犬傷。【明】繆希雍本草經疏論鼠糞曰。牡鼠糞。本經諸家不言味。但云微寒。無毒。然詳其所自。應是苦鹹之物。蓋鼠屬水。而凡糞必苦者也。入足陽明。足厥陰經。其主小兒痢疾。大腹。及時行勞復者。皆熱邪在陽明也。苦寒能除是經之熱。所以主之。古方治男子陰易腹痛。婦人吹乳。乳癰。皆取其除熱軟堅。泄結。走肝入胃之功耳。

配合應用 ●治傷寒勞復。用雄鼠屎二十枚。豉五合。水二升。煮一升。頓服。(外臺秘要方) 又鼠屎豉湯。治勞復發熱。用雄鼠屎二十七枚。梔子十四枚。枳殼三枚。爲粗末。

【鼠肝】 主治 箭鏃不出。搗塗之。聾耳出汗。每用棗核大。乘熱塞之。能引蟲也。

【鼠肝】 即灌草之古籍別名。典見別錄。詳「灌草」條。

【鼠豆】 即黎豆之滇南別名。詳「黎豆」條。

【鼠姑】 (別錄) 古籍別名。麝生丹水。鼠姑爲芳草類之一種。可供藥用。

性質 苦。平。無毒。

主治 欬逆上氣。寒熱邪氣。鼠瘻惡瘡。

【鼠姑】 即鼠婦之古籍別名。典見本草集註。詳「鼠婦」條。

【鼠姑皮】 即牡丹皮之古籍別名。典見本經。詳「牡丹皮」條。

【鼠怕草】 即十大功勞之別名。詳「狗骨」條。

【鼠毒】 即特生礬石之古籍別名。典見綱目。詳「特生礬石」條。

【鼠法】 即夜明砂之古籍別名。典見本經。詳「夜明砂」條。

【鼠直】 即鼠麴草之古籍別名。典見和漢藥考。詳「鼠麴草」條。

【鼠負】 即鼠婦之古籍別名。典見本草集註。詳「鼠婦」條。

【鼠韭】 即垣衣之古籍別名。典見別錄。詳「垣衣」條。

【鼠脂】 主治 湯火傷。

歷代記述攷證 【明】李時珍 本草綱目論鼠脂曰。治耳聾。

命名 本品一作鼠負。蓋言鼠多在坎中背黏負之故名。

古籍別名 蜘蛛。(本經) 蟪蛄。(別錄) 鼠負。鼠姑。(弘景) 鼠黏。(蜀本) 負蟠。(爾雅) 淫生蟲。(圖經) 地雞。地鼠。(綱目)

外國名詞 Sawbug wood-louse. (英)

基本 係將彈尾類之鼠婦焙殺者。

產地 凡卑溼地。蟻器下。及土坎中恒多生焉。

形態 鼠婦爲棲息溼地土窖中。或蟻底等之昆蟲。全體呈灰綠色。長二三分。卷縮作球圓形。下腹扁平。多足。尾端有棒狀具。能彈地跳行。

採取 五月間採之。製法 凡採得焙乾。用法 恒以到末用。性質 酸溫。無毒。

成分 或云含有蟻酸。效能 破血瘀。消癥瘕。用作引赤發泡藥。

主治 氣滯不得小便。婦人月閉。血瘀痛。瘕。寒熱。利水道。墮胎。

歷代記述攷證 【明】李時珍 本草綱目論鼠婦曰。治久瘧寒熱。風蟲牙齒疼痛。小兒撮口驚風。鵝口瘡。痘瘡倒靨。解射工毒。蜘蛛毒。蛇蝮入耳。【明】李士材本草圖解論鼠婦曰。鼠婦酸溫。無毒。生人家地上。通月閉。利便。經。仲景用以醫久瘧。【清】黃元御長沙藥解論鼠婦曰。善通經脈。能化癥瘕。金匱蠲甲煎丸用之。治病瘕日久。結爲癥瘕。以其破血而消堅也。炒枯存性。研細用。

配合應用 ①治產婦尿祕。鼠婦七枚。熬研末酒服。(千金方)

②治撮口。臍風。用鼠負蟲杵絞汁。少許灌之。陳氏生杵鼠負及雀糞汁服之。(聖惠方)

③治口白瘡。地雞研水塗之。即愈。(壽域方)

④治風蟲牙痛。溼生蟲一枚。綿裹咬之。勿令人知。(聖惠方)

⑤治風牙疼痛。溼生蟲。巴豆仁。胡椒各一枚。研勻。飯丸。綠豆。大。綿裹。一丸。咬之。良久。涎出。吐去。效不可言。(經效濟世方)

⑥治痘瘡倒靨。溼生蟲爲末。酒服一字。即起。(痘疹論方)

⑦治蠅蚋入耳。溼生蟲研爛。塞耳邊。自出。或攤紙上。作捻。安入耳中。亦出。(衛生寶鑑方)

⑧治射工溪毒。鼠婦。豆豉。巴豆。各三枚。脂和塗之。(肘後方)

用量 三分至八分。

施用宜忌 凡無瘀滯者禁用。參攷資料 ①古方治驚癇。血病多用之。蓋厥陰經藥也。太平御覽載葛洪瘡方。用鼠負蟲十四枚。各以糟釀之。九十四丸。發時水吞下。便愈。而葛洪肘後方治瘧疾。寒熱。用鼠負四枚。饅裹爲丸。水下。便斷。又用鼠負。豆豉。各十四枚。搗丸。茨子。大。未發前日。湯服二丸。將發時。再服二丸。便止。又蜘蛛人。或

在下濕地有之。惟黔中人採爲藥。葉如蒿。莖端夏生四五穗。穗若車前花有赤白種(韓保昇)鼠尾草根主治反花惡瘡(總錄)

【鼠李子】

古籍別名 鼠梓。牛菓子(別錄)山李子。烏菓子(圖經)皂李。趙李(蘇恭)牛菓子。烏棗子(綱目)椿李(錢氏)梓。牛筋子。牛詣子。烏岡子。無實子。錄子。燕子(和漢藥考)綠子。烏絳子。

外國名 鼠李子 *Rhamnus japonicus*, Maxim. var. *genuina*, Maxim (拉丁) Black-thorn.

(英)

基本 係屬鼠李科。爲鼠李之果實。

產地 別錄曰。鼠李生田野間。蘇頌曰。今蜀川多有之。寇宗奭曰。今關陝湖南甚多。

形態

鼠李爲山野自生之落葉樹。高六尺至一丈。枝有刺。葉作橢圓形或卵圓形。前端尖。頂端之葉對生。花爲淡黃綠色。小花生於葉腋。果實黑色。如小豆大。其子爲有光澤之褐黑色漿果。作球圓形。

有皺紋。往往留有圓形萼。果肉由二房而成。房各有直立之種子。一作褐色。果肉質鬆粗。味辛苦。



鼠李子

採取 八九月間採其熟實。日乾。其皮採無時。

用法 嫩者取汁。用以染色。熟者或生杵用。或剉末。或水煎服。

性質 苦。涼。微毒。

成分 含有拉姆諾加答里澀

(*Rhamno catharine*.)

效能 用作瀉劑。爲慢性便秘藥。

作用 在胃中僅能略助胃液之作用。至腸內能激腸之黏膜。使分泌增多。蠕動加速。其功尤顯著於大腸。

主治 寒熱。痼癰瘡。

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新修本草論鼠李子曰。下血及碎肉。除疔瘕積冷。九蒸酒漬。服三合。日再服。又搗傅牛馬六畜瘡中生蟲。

【宋】大明日華諸家本草論鼠李子曰。水腫腹脹滿。【明】李時珍本草綱目論鼠李子曰。痘瘡黑陷。及疥癬有蟲。

配合應用 治諸瘡寒熱。毒瘰及六畜蟲瘡。用鼠李生搗傅之。

(聖惠方)

一盞。仍類含漱。(聖濟總錄方)

用量 五分至一錢。

施用宜忌 忌鐵。

參攷資料 牛李治痘瘡黑陷及出不快。或觸穢氣黑陷。古昔無知之者。惟錢乙小兒直訣必勝膏用之云。牛李子即鼠李子。九月後採黑熟者。入砂盆槌爛。生絹振汁。用銀石器熬成膏。瓷瓶收貯。常令透風。每服一皂子大。煎桃膠湯化下。如人行二十里。再進一服。其瘡自然紅活。入麝香少許尤妙。如無生者。以乾者爲末。水熬成膏。又九衛衛生方云。痘瘡黑陷者。用牛李子一兩。炒研。挑膠半兩。每服一錢。水七分。煎四分溫服。(李時珍)即烏菓子也。今蜀川多有之。枝葉如李。其實若五味子。色黧黑。其汁紫色。熟時採。日乾用。皮採無時。(蘇頌)即牛李也。木高七八尺。葉如李。但狹而不澤。子於條上四邊生。生時青。熟則紫黑色。至秋葉落。子尚在枝。隨處皆有。今關陝及湖南江南北甚多。(寇宗奭)

【鼠李皮】

性質 苦。微寒。無毒。身皮熱毒。

主治 治諸瘡寒熱。【宋】大明諸家本草論鼠李皮曰。祛風痺。

參攷資料 劉禹錫傳信方。治大人口中疳瘡發背。萬不失一。用山李子根一名牛李子。薤薇根野

外者。各細切。五升。水五大斗。煎半日。汁濃。即於銀銅器中盛之。重湯煎至一二升。待稠。瓷瓶收貯。每少少含嚥。必瘳。忌醬醋油膩熱麵及肉。如發背以帛塗貼之。神效。襄州軍事柳妻婁氏。患口疳十五年。齒盡落。斷不可近。用此而愈。(蘇頌)

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論鼠李皮曰。口疳。齩齒及疳蟲蝕人脊骨者。煮濃汁。灌之神良。【唐】蘇恭新修本草論鼠李皮曰。治諸瘡寒熱。【宋】大明諸家本草論鼠李皮曰。祛風痺。

十三畫 鼠

滅痕極良。【宋】日華諸家本草論鼠曰煎油治小兒驚癇。【明】李時珍本草綱目論鼠曰五月五日同石灰搗收傳金瘡神效。

【鼠王】即隱鼠之古籍別名。典見本草集註詳「隱鼠」條。

【鼠矢】即山茱萸之古籍別名。典見吳普本草詳「山茱萸」條。

【鼠母】即隱鼠之古籍別名。典見綱目詳「隱鼠」條。

【鼠印】即鼠外腎之原名。詳「鼠外腎」條。

【鼠外腎】原名 鼠印。鼠卵之舉丸。故名。本品乃雄鼠之舉丸。故名。

採取 以雄鼠外腎之上。有文似印兩腎相對有符篆朱文九通者尤佳。以十一二月或五月五日七月七日正朔旦子時。面北向子位。刮取陰乾。如篆刻下佩於青囊中。男左女右繫臂上。人見之無不歡悅。所求如心也。

主治 令人媚悅。

【鼠牙半支】產地 多生高山石壁間。

形態 鼠牙半支爲半支類之

一種。立夏後發苗莖葉細如米粒。三瓣一聚。蔓延石間。根入石罅中。色白如鼠牙。四月開花黃色。如瓦松。花後即枯。可供藥用。

性質 寒。無毒。

主治 消癰腫。溼鬱水腫。解諸毒。及湯烙傷。蟲蛇螫咬。並一切發背。對口。冬瓜。騎馬等症。搗汁酒服。渣傳之。

參攷資料 鼠牙半支能治一切癰毒蛇傷。故有稱蛇傷之仙草。【綱目拾遺】

【鼠肉】採取 以杜鼠者良。

性質 甘熱。無毒。

主治 小兒疳積。大腹。炎食之。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論鼠肉曰小兒疳疾腹大。食食者黃泥裹燒熟去骨取肉和五味鼓汁作羹食之勿食骨。甚瘦人。【宋】蘇頌圖經本草論鼠肉曰主骨蒸勞極。四肢勞瘦。殺蟲。及小兒疳瘦。酒熬入藥。【明】李時珍本草綱目論鼠肉曰炙食治小兒寒熱諸疳。

採取 以杜鼠者良。

主治 療牙宣。齩青鹽。

擦之。

【鼠耳】即鼠麴草之古籍別名。典見別錄。詳「鼠麴草」條。

【鼠卵】即鼠外腎之原名。詳「鼠外腎」條。

【鼠尾芽】即黃芩之古籍別名。典見唐本草。詳「黃芩」條。

【鼠尾草】命名 本品穗狀如鼠尾。故名。

古籍別名 蜀山陵翹。吳普烏草。水香。水青。拾遺鼠菊。救荒。

外國名詞 *Salvia japonica*, Thunb. var. *bipinnata*, Fr. et Sav. (拉丁) *アキノタムラサウ* (日本)

基本 保腎形科鼠尾草屬。藥用其花葉。

產地 山野田澤恒多有出。



鼠尾草

形態 鼠尾草爲溼草類之多。年生草本。高二三尺。莖方形。葉爲

羽狀複葉。對生。小葉五片或七片。初秋開花。繖狀花序。花小。唇形花冠呈淡紫色。雄蕊二枚。雌蕊一枚。其莖可作藥料。花葉與根俱可供藥用。

種類 鼠尾草種類頗多。春季開花者謂之春鼠尾草。夏季開花者謂之夏鼠尾草。和方書以千屈菜 (*Lythrum salicaria*, L.) 作鼠尾草。現時藥用者仍不少。

性質 苦。微寒。無毒。

主治 鼠瘻。寒熱。下痢。膿血不止。白花者主白下。赤花者主赤下。歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論鼠尾草曰主癰疾水腫。

用量 八分至錢半。

參攷資料 ①古方療痢多用之。當濃煎令可丸服之。或煎如飴服之。今人亦用作飲。或末服。亦得。日三服。【陶弘景】②鼠尾以穗形命名。爾雅云。動鼠尾。也可以染皂。故名烏草。又曰水青。蘇頌圖經謂鼠尾一名陸時者。乃陸翹之誤也。【李時珍】③鼠尾生平澤中。四月採葉。七月採花陰乾。【別錄】④所

採葉。七月採花陰乾。【別錄】④所

主治 補中益氣。平胃消食。除十二種蟲。身上有諸小熱瘡。年久不愈者。但多食之即瘥。

歷代記述攷證 【宋】日華諸

家本草論麋肉曰。治熱毒風。及惡瘡。癰。殺腹臟一切蟲。治水腫。

參攷資料 ① 麋於九月以後。立春以前。即中食。大益病人。全勝家者。② 孟詵 ③ 麋肉不可合胡桃木耳。豆豉同食。〔日華〕

【麋公英】即蒲公英之古籍別名。典見千金食治。詳「蒲公英」條。

【麋血】 主治 解挑生蟲毒。熱飲探吐。

【麋苳】即葶藶之古籍別名。典見本草衍義。詳「葶藶」條。

【麋莢】即葶藶之古籍別名。典見本草衍義。詳「葶藶」條。

【麋葵】即葶藶之古籍別名。典見唐本草。詳「葶藶」條。① 即葶藶草之古籍別名。典見和漢藥考。詳「葶藶草」條。

【葶藶草】即葶藶之古籍別名。典見和漢藥考。詳「葶藶草」條。

【葶藶頭】即葶藶之古籍別名。典見和漢藥考。詳「葶藶頭」條。

【葶藶酸】即葶藶之古籍別名。典見蘇恭新修本草。詳「葶藶草」條。

十三畫 麋

鳩 鹿 鼓 鼠

【麋】 命名 山中有虎。則麋必鳴。以告。其聲凡九。然故名。鳴以告。其聲凡九。然故名。鳴以告。其聲凡九。然故名。

古籍別名 麋（爾雅）大者名。麋（山海經）

外國名詞 Moschus chinensis（拉丁）

基本 係脊椎動物哺乳類有胎盤類。有蹄類。反偶獨蹄類。麋科之麋。

產地 生山野林間。

形態 麋爲獸類之一種。其形略似麝。頭似鹿。又似狗。口有長牙。壯者有短角。腳細而力勁。善跳越。性好鬥。毛黃黑色。皮極細。其肉可供藥用。

性質 甘。平。無毒。

主治 五痔病。燻熱。以薑醋進之。大有效。

【麋皮】 主治 除溼氣。脚痺。作靴。織著之。

【麋目】 命名 本品狀如麋之目。故名。

古籍別名 兔目。〔綱目〕

產地 出嶺南諸地。

形態 麋目爲果類之一種。樹幹高大如棠梨。葉似楮而皮白。春

開花。結實大如木瓜。小者如梅。李而不圓。正七八月成熟。色黃味酸。以蜜浸之。可供食用。

性質 酸。甘。小。冷。無毒。

參攷資料 麋目多食。發冷痰。〔陳藏器〕

【麋頭骨】 性質 辛。平。無毒。

主治 飛尸。燒灰。服。

【鼓子花】即旋花之古籍別名。典見圖經本草。詳「旋花」條。

【鼓釘】即蒲公英之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蒲公英」條。

【鼓槿草】即鼓槿草之古籍別名。典見和漢藥考。詳「鼓槿草」條。

【鼠】 外國名詞 Mus (Apo-demus) decumanus

Hall. 或 Mus norvegicus Erd Brown. 或 Grey rat (拉丁) 子スミ。或シチラウチズミ (日本)

基本 係脊椎動物哺乳類有胎盤類。齧齒類。爲鼠科之一種。

形態 鼠爲獸類鼠屬之一種。其體小。頭圓。口吻突出。軀幹圓長。四肢短。尾長。臂有鬚。眼圓耳殼小。門牙上下各二枚。其前面被黃色。瑤瑤質。犬牙缺失。但留空隙。白齒


之腦面有橫紋。前肢比後肢短。有五趾。各趾具鈎爪。其毛輭。背暗褐。腹灰白。腹旁略帶黃。尾間被鱗狀。物環生粗毛。日匿穴中。夜出竊食。生殖力甚大。生百。日。即能產子。每年可四產。一產有五頭至十頭。其肉。骨。血。糞等。均可供藥用。

採取 凡入煎須取雄者用。

性質 甘。微溫。無毒。

主治 療痿折。續筋骨。生搗傳之。三日一易。

歷代記述攷證 【南北朝】陶弘景本草集註論鼠曰。煎膏治諸瘡。癰。臘月燒之。辟惡氣。唐孟詵食療本草論鼠曰。豬脂煎膏。治打撲折傷。凍瘡。湯火傷。臘月以油煎枯。去滓。熬膏收用。〔宋〕蘇頌圖經本草論鼠曰。油煎入蠟。傳湯火傷。



鼠

別錄。詳『雷丸』條。

【雷芝】即荔枝之古籍別名。典見和漢藥考。詳『荔枝』條。

【雷河督子】即滑石之古籍別名。典見和漢藥考。詳『滑石』條。

【雷礮】即霹靂礮之古籍別名。典見綱目。詳『霹靂礮』條。

【雷菌】係雞縱之一種。遇雷過即生。須疾採之。稍遲則腐。以之作羹。味甚美。性質效能與雞縱同。參見『雞縱』條。

【雷實】即雷丸之古籍別名。典見別錄。詳『雷丸』條。

【雷墨】
（綱目）
古籍別名 雷公墨。

產地 出廣東海康縣境。

形態 雷墨爲石類之一種。每當雷雨大作之際。飛下如沙石大者如塊。小者如指。堅硬如石。黑色光艷。體重叩之鏗然。可供藥用。
主治 小兒驚癇邪覺諸病。磨服即安。

【雷燒松】即松化石之古籍別名。典見輿地紀詳。『松化石』條。

【雹】
形態 雹爲冰類之一種。當雷雨時。雲氣爲電所衝。

激。而入高空。凝爲冰點雪片。復旋轉團結而成冰塊。與雨雜下。小者如豆。大者如拳。

性質 鹹冷有毒。
主治 解溫熱狂甚。

【雹突】即萊菔之古籍別名。典見爾雅。詳『萊菔』條。

【靴筒朴】即厚朴捲作靴筒形者之處方用名。詳『厚朴』條。

【新刺】即石刺木之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『石刺木』條。

【預知子】
命名 本品相傳取子二枚。或雙仁者。綴衣領上。遇有蟲毒。則聞其發聲。當預知之。故名。

古籍別名 聖知子。聖先子。盍合子。仙沼子（日華）八月扎（俗名）。

形態 預知爲蔓草類之野生草本。引蔓木上。葉爲三角形。色綠面深。背淡。七八月結實。作房。生青熟深紅。每房有子五六枚。如皂莢。子色斑褐而光潤。可供藥用。其根詳見該條。

性質 苦寒。無毒。
主治 殺蟲療癰。治諸毒。去皮。

研服有效。

歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草論預知子曰。治一切風。補五勞七傷。其功不可備述。治痲痺氣塊。消宿食。止煩悶。利小便。催生中惡。失音。髮落。天行溫疾。塗一切蛇蟲蠶咬。治一切病。每日吞二十七粒。不過三十粒。永痊。

【預知子根】
採取 冬月採之。

性質 苦冷。無毒。

主治 解蠱毒。搗細。溫水服。

【預荊】即藥荊之古籍別名。典見圖經本草。詳『藥荊』條。

【飯豆】即白豆之古籍別名。典見綱目。詳『白豆』條。

【飯匙倩草】即望江南之古籍別名。典見和漢藥考。詳『望江南』條。

【飯頭】即草薺之古籍別名。典見和漢藥考。詳『草薺』條。

【飯鍋粃】即鍋焦之古籍別名。典見不藥良方。詳『鍋焦』條。

【飯鍋焦】即鍋焦之原名。詳『鍋焦』條。
【駝駝】係牡驢交牛而生者之別名。典見綱目。性質效能與驢同。參見該條。

見『驢』條。

【魷魚】即鱗魚之古籍別名。典見綱目。詳『鱗魚』條。

【鳧】
（詩疏）鵞沉鳧。綱目）
古籍別名 野鴨。野鶩。

外國名詞 Anas boschas L. (拉丁) Duck 或 wild duck Mallard (英) Ente (德) カモ 或 マカモ 或 アラクビ (日本)

基本 係脊椎動物鳥類游禽類鴨科之鳧。

產地 江海湖泊中皆有之。

形態 鳧爲水禽類之一種。狀如鴨而小。在夏季雄之頭頸皆紫綠。黑。肩胸皆赤。腹淡白。略帶紫。有黑點。背灰白。亦有黑斑。翼甚黑。雜以綠。黑白等色。嘴黃而扁。腳短。位於後端。趾有蹼。雌者多淡黑色。有黑斑。至冬雄之頭部似雌。肩胸赤色。亦消滅。常數百爲羣。飛翔蔽天。亦如雁之排列成行。又爲候鳥之一。但後雁而來。亦後雁而去。棲水邊。食小魚。體肥多脂。其肉可供食與藥用。

採取 冬月採之。
性質 甘涼。無毒。

曰雷丸。味苦氣寒。別錄加鹹。有小毒。黃帝岐伯桐君扁鵲云甘。詳其所主。應是苦鹹爲勝。氣薄味厚。入手足陽明經。其主殺三蟲。白蟲。寸白。自出者。腸胃溼熱甚也。逐毒氣。胃中熱邪氣。惡風汗出。皮中熱結積者。腸胃邪熱盛也。苦寒能除二經溼熱邪氣。則上來諸證自除。作摩膏治小兒百病者。以小兒好食甘肥。腸胃類多溼熱蟲積。苦能殺蟲。除溼。鹹寒能清熱消積。故主之也。凡蟲毒必熱必辛。苦寒能除辛熱。故又主解蟲毒也。別錄又云。久服令人陰痿。正見其過於苦寒。偏至之氣。能令陽道痿也。〔清〕黃宮繡本草求真論雷丸曰。雷丸味苦而鹹。性寒小毒。本竹餘氣所結。得霹靂而生。故有雷丸之號。功端入胃。除熱消積。化蟲。故凡溼熱內鬱。癰癩狂走。汗出惡風。蟲積殆甚。腹大氣脹。蟲作人聲者。服之即能有效。以其秉性純陰。兼味至苦。感其霹靂。故能去其邪魅也。所云惟利男子。不利婦人。亦以婦人屬陰。故於陰物不宜耳。究之果屬腎熱。亦又何礙。但無蟲積。不得妄用。皮黑

十三畫 雷

肉白者良。若肉紫黑者殺人。甘草水浸一宿。酒拌蒸或炮用。

配合應用 ①治小兒疳蚘。雷丸。蕪荑。使君子。蘆薈。五穀蟲。胡黃連。青黛。

②殺腸胃一切蟲。雷丸。檳榔。雞蘊。棟根。貫衆。牽牛。錫灰。慈苳根。

③小兒出汗有熱。雷丸四兩。粉半斤。爲末。撲之。〔千金方〕

④下寸白蟲。雷丸水浸。去皮切焙爲末。五更初食。炙肉少許。以稀粥飲服。一錢匕。須上半月服。蟲乃下。〔經驗良方〕

用量 八分至錢半。

施用宜忌 凡無蟲積者禁用。惡葛根。忌火。荔實。厚朴。蓄根。芫花爲之使。

參攷資料 ①按陳正敏遜齋閑寬云。楊勛中年得異疾。每發語腹中有小聲。應之久漸聲大。有道士見之曰。此應聲蟲也。但讀本草。取不應者治之。讀至雷丸。不應遂頓服數粒而愈。〔李時珍〕 ②雷丸氣味鹹微寒。有小毒。赤者殺人。白者善。〔別錄〕 ③雷丸生石城山谷。及漢中土中。八月採根曝乾。〔別錄〕

錄 ④雷丸。竹之苔也。無有苗蔓。皆零而無相連者。今出房州金州。〔蘇恭〕 ⑤雷丸大小如栗。狀如豬苔。而圓。皮黑。肉白。堅實。〔李時珍〕

⑥大楓子油亦名雷丸油。但以雷丸充大楓子則不可。〔和漢藥考〕

〔雷丸草〕 即菟葵之古籍別名。典見外丹本草。詳「菟葵」條。

〔雷公墨〕 即雷墨之古籍別名。典見綱目。詳「雷墨」條。

〔雷公頭〕 即香附子之古籍別名。典見綱目。詳「香附子」條。

【雷公藤】 古籍別名 板扛歸。蕪龍草。震龍根。霹靂木。方勝板。倒金鉤。烙鐵草。倒挂紫金鉤。河白草。擎尖草。括把草。龍仙草。魚尾花。三木棉。〔綱目拾遺〕 擎頭刺藤。物理小識。

產地 多生山麓陰處及離落間。

形態 雷公藤爲蔓草類之一種。獨莖蔓生。莖穿葉心。上又發葉。葉上圓下尖。三尖形。如擎把。又似三角風色。青枝梗有刺。每年四五個月間生苗。至九月經霜而枯。結實圓如珠。生時青色。熟則黑而味酸。

其莖葉可供藥用。

主治 腫脹水腫。痞積。黃白疸。瘡疾。魚口。便毒。癰疽。跌打。除壁蟲。瘰癧。疥癩。一切毒蛇傷。翻胃。噎膈。吐血。便血。喉痺。食積。心疼。虛飽。腹脹。陰囊腫大。發背。疔瘡。乳癰。產後遍身浮腫。

配合應用 ①白火丹。用雷公藤五錢。平地木三錢。車前四錢。天青地白葉。三白草各三錢。煎服。又洗方。雷公藤。河白草。煎浴。〔救生苦海方〕

②治水腫脹。平地木三錢。雷公藤五錢。車前草四錢。天青地白草三錢。路路通五個。打碎煎服。重者十服愈。〔救生苦海方〕

③治坐板瘡。烏賊骨五錢。雷公藤三錢。共爲細末。搽之。乾則以菜油調敷。〔秋泉家秘方〕

參攷資料 雷公藤出江西者。力大。土人採之毒魚。凡蚌蠟之屬亦死。其性最烈。以其草烟熏蠶子。則不生。養蠶家忌之。用酒蒸服。治風氣。合巴山虎爲龍虎丹。入水藥。魚人多服即昏。〔綱目拾遺〕

〔雷矢〕 即雷丸之古籍別名。典見

十三畫 雌

零 雷

子一個。令乾。盛藥。水調赤石脂封口。更以泥封待乾。架在地。上炭火十斤。燐煨候火消三分之一。去火。候冷取出。當如鏡面。光明紅色。鉢內細研。蒸餅丸。粟米大。每服三丸。五丸。甘草水服。服後睡良久。(勝金方)

①治腎消尿數。乾薑半兩。以鹽四錢。炒黃成顆。雌黃一兩半。爲末。蒸餅和丸。綠豆大。每服十丸至三十丸。空心鹽湯下。(聖濟總錄方)

②治小便不禁。用穎塊雌黃一兩半。研乾薑半兩。鹽四錢。同炒。薑色黃爲末。水和蒸餅丸。綠豆大。每服十丸至二十丸。空心鹽湯下之。(經驗方)

③治烏癩蟲瘡。雌黃粉醋和。雞子黃調塗之。(聖惠方)

④治牛皮頑癬。雌黃末入輕粉和猪膏傅之。(直指方)

用量 八分至錢半。

施用宜忌 凡血虛者禁用。

參攷資料 ①雌黃氣味大寒。不入湯用。(別錄) ②芎藭地黃獨

芎藭益母。羊不食草。地榆。五加皮。瓦松。冬瓜汁。皆可制伏。又雌見鉛及

胡粉則黑。(土宿真君) ③今雌黃出武都仇池者。謂之武都仇池黃。色小赤。出扶南林邑者。謂之昆侖黃。色如金。而似雲母。甲錯。畫家所重。既有雌雄之名。又同山之陰陽合藥。便當以武都爲勝。仙經無單服法。惟以合丹砂雄黃。鍊爲丹。爾金精是雌黃。銅精是空青。而服空青反勝於雌黃。其義難了。(陶弘景)

④雌黃一塊重四兩。拆開得千重。軟如爛金者佳。其夾石及黑如鐵色者不可用。(雷斅)

【雌橫榔】即大腹子之別名。詳「大腹子」條。

【零烏豆】即稽豆之細而扁者。典見綱目拾遺。詳「稽豆」條。

【零陵】即代赭石之古籍別名。典見和漢藥考。詳「代赭石」條。

【零陵香】即佩蘭之古籍別名。典見開寶本草。詳「佩蘭」條。

【零榆皮】即榆白皮之古籍別名。典見本經。詳「榆白皮」條。

【零餘子】基本 本品係結於薯蕷葉腋之小球。

性質 甘。溫。無毒。

主治 補虛損。強腰脚。益腎。食

之不饑。

參攷資料 ①零餘子大者如雞子。小者如彈丸。在葉下。生曬乾。功用強於薯蕷。薯蕷有數種。此其一也。(陳藏器) ②此即山藥藤上所結子也。長圓。不一。皮黃。肉白。煮熱。去皮食之。勝於山藥。美於芋子。霜後收之。墜落在地者。亦易生根。

(李時珍) ③按獨孤酒丹房鑑源云。背陰者雌黃也。溜成者即黑色。輕乾如焦錫塊。臭黃作者。硬而無衣。試法。但於甲上磨之。上色者好。又燒髮斗底。以雌劃之。如赤黃線一道者好。船上來如喋血者。上湖南者次之。青者尤佳。葉子者爲上。造化黃金。非此不成。亦能柔五金。乾。承轉硫黃。伏粉霜。又云。雄黃變鐵。雌黃變錫。(李時珍)

【雷丸】命名 本品乃竹之餘氣所結。由雷震而成。無葉無蔓。形圓。色黑。猶雷之丸也。故名。狀如諸苓。又名之曰竹苓。

處方用名 白雷丸。

古籍別名 雷實。雷矢。(別錄)

竹苓。(綱目)

外國名詞 Myrice Lapidea

cells

基本 係菌蕈類。爲槲生於竹林土中之一種菌蕈。

產地 陳仁山藥物生產辨云。雷丸產四川。湖南。貴州等處。秋季新。

形體 雷丸似諸苓而小。其大者如栗。小者如零餘子。外皮黑褐色。或赤褐色。內部白色。質堅硬。

採取 八月採根。曝乾。

製法 雷斅曰。凡使用甘草水浸一夜。銅刀刮去黑皮。破作四五片。以甘草水再浸一宿。蒸之。從已至未。日乾。酒拌。再蒸。日乾。用大明曰。入藥炮用。

性質 苦寒。有小毒。致能 殺蟲。消積。用作小兒解熱療疳藥。又治癰癤狂走等。

主治 殺三蟲。逐毒氣。胃中熱。利丈夫不利女子。(本經) 作壓膏除小兒百病。逐邪氣。惡風汗出。除皮中熱結。積蟲毒。白蟲。寸白。白出不止。久服令人陰痿。(別錄)

歷代記述攷證 〔唐〕甄權藥性本草論雷丸曰。逐風。主癰癤。狂走。〔明〕繆希雍本草經疏論雷丸

製法 雷斅曰。凡使雌黃。勿令婦人鷄犬犯之。一切穢惡之處。亦不宜近。否則雌黃即變如黑鐵色。不堪用也。反以損人。或以四兩用天碧枝和陽草粟。遂子草各五兩入甕中。細煮三伏時。其色如金汁。一堞在鍋底下。用東流水猛投於中。如此淘三度。去水拭乾。白中春碎。篩研如塵。用方好。又曰。雌得芹花立刻便成庚芹花。一名立起草。形如芍藥。妻能住火也。

用法 恒以剉末和作丸散。或以和入外治藥中。

性質 辛平無毒。

成分 百分中含砒素六十一分。硫黃三十九分。化學上謂之三硫化砒素(As₂S₃)。三硫化砒素爲人工品。以亞砒酸溶液。亞砒酸鹽溶液。砒酸溶液。通硫化水素而製之。爲鮮豔之枸橼黃色粉末。水不溶解。亞兒加里能溶解之。畫工用爲黃色顏料。然有毒。一名王黃。又名中國黃。

效能 殺蟲。解毒。燥溼。療瘡。用爲殺蟲藥。又治惡瘡。

主治 蝨鼻內息肉。下部惡瘡。

身面白駁。散皮膚死肌。及恍惚邪氣。殺蜂蛇毒。惡瘡頭禿。疥癬。殺毒蟲。風身痒。邪氣諸毒。鍊之久服。令人腦滿。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論雌黃曰。治冷痰勞嗽。血氣虛。心腹痛。癰疽。解毒。

國外學說 日本和漢藥考曰。雄黃雌黃。俱天產硫化砒素化合物之名稱。近今學者皆以 Orpiment 爲雄黃。以 Realgar 爲雌黃。或以 Orpiment 爲雌黃。而以 Realgar 爲雄黃。或以 Orpiment 爲石黃。以 Realgar 爲雞冠石。畫工所用之黃色顏料有兩種。一爲雌黃。二爲藤黃。販賣者遂呼藤黃爲雌黃。而呼雌黃爲石黃。言海云。石黃即生雌黃之意。又按古書。雄黃雌黃。爲同種類之物。唯硫化砒素化合物之種類相異。故名稱各別耳。本草綱目云。雄黃生武都山谷者良。凡山山之陽者。其形如丹砂塊。明徹不夾石。色如雞冠石。此爲上品。其青黑色而堅者名熏黃。形色似真而氣臭者名臭黃。以上二品。均不堪服食。只可

療瘡疥。其臭。以醋洗之便去。足以亂真。尤宜辨。一云。驗之可以燭蟲死者爲真。雌黃生武都山。與雄黃同。生山之陰。又云。陽石氣未定者爲雌。已足者爲雄。相距五百年而結爲石。造化有夫婦之道。故曰雌雄。其雌黃試法。但於甲上磨之。土色者好。又燒熨斗底。以雌蠟之。如赤黃線一道者好。和漢三才圖會云。雄黃今絕不出。從前以東京產者爲佳。外色黯。帶黃。破之內如鐵釘。折口微黑。有光。雌黃以金色而薄片者良。凡水解盡物。入鹽少許。則水不散。染又與青黛合。則成綠青色。物類品隨云。雄黃雌黃一類二種。日俗以用作顏料之藤黃。呼爲雌黃。非真雌黃也。此編參考諸書。以 Orpiment 爲雌黃。以 Realgar 爲雄黃。以上品之雌黃爲雞冠石。辨析既明。庶免謬誤。

配合應用 治反胃吐食。雌黃一分。甘草生半。分爲末。飯丸。梧子大。以五葉草糯米煎湯。每服四丸。(聖濟總錄方)

治停痰在胃。喘息不逆。呼吸欲絕。雌黃一兩。雄黃一錢。爲末。化

蠟丸。彈子大。每服一丸。半夜時投熱糯米粥中食之。(濟生方)

治心痛吐水。不下飲食。發止不定。雌黃二兩。醋二斤。慢火煎成膏。用乾蒸餅和丸。梧子大。每服七丸。薑湯下。(聖惠方)

治婦人久冷。血氣攻心。痛不止。以葉子雌黃二兩。細研。醋一升。煎濃。和丸。小豆大。每服十五丸。醋湯下。(聖惠方)

治小腹痛滿。天行病。小腹滿。不得小便。雌黃末。蜜丸。納尿孔中。入半寸。(肘後方)

治癰癤瘰癧。眼暗。嚼舌。雌黃。黃丹炒各一兩。爲末。入麝香少許。以牛乳汁半升。熬成膏。和杵子下丸。麻子大。每溫水服三五丸。(直指方)

治肺勞咳嗽。用雌黃一兩。入瓦合內。不固濟。坐地上。以火焙之。厚二寸。以炭一斤。簾定。頂火煨三分去一。退火出。爲末。糖酥和丸。粟米大。每日空心杏仁湯下三丸。(斗門方)

治久嗽暴嗽。金粟丸。用葉子雌黃一兩。研以紙篩泥固濟。小合

十三畫 隔 雉 雌

【隔刺虎】即伏牛花之古籍別名。典見綱目。詳『伏牛花』條。

【隔虎刺花】即伏牛花之古籍別名。典見和漢藥考。詳『伏牛花』條。

【雉】 命名 雉飛若矢。一往而墮。故字從矢。而名曰雉。

古鑑別名 野雞。疏趾。華蟲。

綱目

外國名詞 Phasianus torquatus Gm (拉丁) Chinese ring-necked pheasant Pheasant (英) Fasan (德) カウラ

一ギシ(日本)

基本 係脊椎動物鳥類鶉類雉科。為雉之肉。其腦。嘴。尾。尿。黃。詳見各該條。

產地 山林原野間。

形態 雉為原禽類之一種。雌雄異色。雄者羽美。頭頸黑紺。色有綠光。面部赤色。頭頂青綠色。眉斑白頸之一部周圍有白色頸輪。嘴黃白色。胸腹銅赤色。有光澤。腹部中央黑色。肩黃色。混有黑斑。背之上部銅赤色。有白斑。彩色頗複雜。翼長約八寸。尾長約一尺六。雌之羽毛地色淡黃褐。胸腹部有黑色

之大斑。或有微細之暗色小斑。棲山野。食穀類及昆蟲。其肉可供食與藥用。



雉

性質 酸。微寒。無毒。

主治 補中益氣。力止洩痢。除

蟻瘻。

參攷資料

●雉肉諸家言其發痔下痢人不可食。而別錄用治痢瘻何邪。蓋雉在禽上。應胃土。故能補中。而又食蟲蟻。故能治蟻瘻。取其制伏耳。若久食及食非其時。則生蟲有毒。故不宜也。(李時珍)

●周禮庖人供六禽。雉是其一。亦食品之貴。然有小毒。不可常食。損多益少。(蘇頌)

●雉肉久服令人瘦。九月至十一月稍有補。他月則發五痔諸瘡。疥。不與胡桃同食。發頭風眩運。及心痛。與菌蕈木耳同

食。發五痔。立下血。同蕎麥食生肥蟲卵。同葱食生寸白蟲。自死爪甲不伸者殺之。(孟詵)

【雉毛奴邑】即半夏之古籍別名。典見和漢藥考。詳『半夏』條。

【雉毛邑】即半夏之古籍別名。典見和漢藥考。詳『半夏』條。

【見和漢藥考。詳『半夏』條。

【雉骨木】即麥門冬之古籍別名。典見和漢藥考。詳『麥門冬』條。

【雉鳥老草】即麥門冬之古籍別名。典見和漢藥考。詳『麥門冬』條。

【維麻】即升麻之古籍別名。典見和漢藥考。詳『升麻』條。

【維脚】即升麻之古籍別名。典見和漢藥考。詳『升麻』條。

【維黃】本品為雉窠中所生之黃。猶鶴窠中之

粍也。

採取 採掘時。先以溺繞窠三匝。從而掘之。尤以明透而質重一兩者佳。

主治 療一切毒蛇咬傷。辟邪魅。解產厄。

主治 天火丹毒。燒灰和麻油調傅。

【雉雞尾】

【雉雞屎】 主治 久瘰。

【雉雞腦】 主治 塗凍瘡。

【雉雞嘴】 主治 療蟻瘻。

【雌黃】 命名 本品生山之陰。故曰雌黃。

古鑑別名 崑嵒黃。(綱目)

石黃。王雄。黃安。黃砒。砒黃。帝女血。(和漢藥考)

外國名詞 Auripigmentum (拉丁) Orpiment (英) Auripigment, Opment (德)

基本 係神礦之斜方系屬。為紅黃色之不透明固體。

產地 同雄黃。但以黃亮者為好。各國俱有出。

形態 雌黃為黏土質。或產於噴火口之近旁。狀似銀乳。或如葡萄。或如粒。或者板片。色鮮黃。或橙黃。有真珠光澤。質半透明。或透明。硬度一。五至二。〇。比重三。四至三。五。水不溶解。亞見加里及硝酸。俱善溶解。又熱於炭火上。則分解為亞硫酸與砒酸而蒸昇。

基本 屬茜草科。爲鉤藤之鉤棘。

產地 陳仁山藥物生產辨云。鉤藤以產廣西桂林者爲最好。廣東北江、星子亦佳。其次則連州、清遠、三坑、西江、廣西賀縣等亦有出。

形態 鉤藤爲自生之蔓性草。木莖腋生兩鉤棘。以攀緣於他物。高達丈許。葉對生。作卵圓形。頭端尖。夏間開淡黃褐色之小花。相綴若珠。其嫩莖略方。老則變圓。而成本質。鉤棘對生於葉腋之間。向下彎曲。初時色綠。至秋則變紅褐色。質堅強。狀似魚鉤。味爲收斂性。



鉤藤

採取 三月採之。
用法 凡入煎劑。須俟他藥煎就。投入一二沸。頗得效力。否則無力。去梗。純用嫩鉤。其功十倍。

性質 甘微寒。無毒。
效能 熄風。滌熱。定驚。癇。止眩暈。專作鎮痙藥。

十三畫 鉤

隔

主治 小兒寒熱。十二驚風。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論鉤藤曰。小兒驚啼癇癇。

熱癇。客忤胎風。【明】李時珍本草綱目論鉤藤曰。大人頭旋目眩。平肝風。除心熱。小兒約腹痛。發斑疹。

【清】黃宮繡本草求真論鉤藤曰。鉤藤味甘微苦。氣平微寒。爲手少陰心厥陰肝經要藥。緣肝主風。心主火。風火相煽。則風因火而愈盛。火亦因風而益熾。其在小兒則病必在驚癇癇癇。眼翻抽搐。大人則病必見頭旋目眩。婦人則病必見赤白帶下。故必用此輕平宣泄。以爲下降。則風靜火熄。而驚風熱自爾克除矣。此爲小兒風熱初熱。病未見甚者。用之得宜。若使風火至極。勢難驟遏。則此輕平疎泄。效難克奏。又當細審所因。用以重劑。以爲投服。則藥始與病當。而無病重藥輕之弊矣。取取細細多鉤者良。但久煎則無力。

近人學說 張山雷曰。鉤藤其質甚輕。氣味俱薄。自別錄即以爲專治小兒寒熱。弘景且謂療小兒不入餘方。蓋氣本輕清。而性甘寒。

最合於幼兒稚陰未充。稚陽易旺之體質。能治驚癇者。癇病皆肝動生風。氣火上煽。沖激腦神經之病。此物輕清而涼。能泄火而能定風。甄權謂主小兒驚啼。癇癇熱癇。客忤胎風。潮潮謂治大人頭旋目眩。平肝風。除心熱。皆一以貫之。惟潮又謂其發斑疹。則本於錢仲陽之藥草散。方用鉤藤鉤子。紫草茸等分。爲末。溫酒調服。壽頤按仲陽之所謂斑疹。卽是痘瘡及瘡子。非今人時病中之所謂發斑。鉤藤輕能透發。清能解熱。而佐以紫草涼血活血。助其流動。又以酒輔之。能發亦能清火。洵是不亢不卑。穩妥之法。

配合應用 ●治小兒驚癇癇癇。用鉤藤。遠志。茯神。琥珀。棗仁。丹砂。牛黃。天竺黃。犀角屑。生地黃。龍齒。麥門冬。金箔。有痰加竹瀝。南星。橘紅。

●治小兒驚熱。鉤藤一兩。治石半兩。炙甘草二錢。五分爲散。每服半錢。溫水服。日三服。【聖濟錄方】

●治卒得癇疾。鉤藤。炙甘草各二錢。水五合。煎二合。每服棗許。日

五夜三。【聖惠方】

●治斑疹不快。鉤藤鉤子。紫草茸等分。爲末。每服一字。或半錢。溫酒服。【錢氏方】

用量 三錢至四錢。
施用宜忌 凡無風熱及實火者禁用。

參攷資料 ●鉤藤出梁州。葉細長。其莖間有刺。若釣鉤。【蘇恭】

●湖南湖北。江南北。山中皆有之。藤長八九尺。或一二丈。大如拇指。其中空。小人用致酒。藥中盜取酒。以氣吸之。涓涓不斷。【寇宗奭】

●狀如葡萄藤。而有鉤。紫色。古方多用皮。後世多用鉤。蓋取其力銳。【李時珍】 ●祛肝風而不燥。幼科珍之用。治寒熱驚啼癇癇諸疾。【顧松園】

【隔山消】 產地 生山地。基本 隔山消爲雜草類之一種。白色。可供藥用。

主治 腹脹積聚。氣膈噎食。【隔冬青】 卽荔枝草之古籍別名。典見草藥方。詳「荔枝草」條。

【隔河仙】 卽海芋之古籍別名。典見綱目。詳「海芋」條。

治吐逆。鎮驚去怯。黑髮髮。

參攷資料 ①鉛霜性極冷。治風痰及嬰孺驚滯藥。今醫家用之尤多。(蘇頌) ②鉛霜乃鉛汞之氣交感英華所結。道家謂之神符白雪。其墜痰去熱。定驚止瀉。蓋有奇效。但非久服常用之物。病在上焦者。宜此清鎮。(李時珍)

【鉛精】即水銀之古籍別名。典見和漢藥考。詳「水銀」條。
【鉛養】即白粉之化學別名。詳「白粉」條。
【鉛礬】即黑礬之古籍別名。典見嘉祐圖經本草。詳「礬石」條。
【鉢恒羅香】即薑香之古籍別名。典見金光明經。詳「薑香」條。
【鉢擺婆福羅】即珊瑚之古籍別名。典見梵書。詳「珊瑚」條。

【鉤吻】 命名 本品入口則鉤人喉吻。故名。

古籍別名 野葛(本經)毒根。除辛。本草吳普。胡蔓草。(圖經本草)斷腸草。黃藤。火把花。治葛折之有青烟出者名固活。(綱目)爛腸草。水莽草。(俗名)

外國名詞 Ihus toxicoden-

dron, L. var. radicans, Miq. (拉丁) ッタウルシ(日本)

基本 係漆樹科漆樹屬。爲鉤吻之根。

產地 生山野中。

形態 鉤吻爲毒草類之一種。有草本木本兩種。草本者蔓生。葉爲長卵形。端尖。花黃而小。木本者高四五尺。葉似黃精。但有毛。鉤于二個。初夏開單性花。黃綠色。雌雄異株。結實紅色。其根可供藥用。



鉤 吻

採取 二月八月採之。

性質 辛溫。有大毒。

主治 金瘡乳痼。中惡風。咳逆。上氣水腫。殺鬼注蟲毒。(本經)破癥積。除脚膝痺痛。四肢拘攣。惡瘡疥蟲。殺鳥獸。搗汁入膏中。不入湯飲。(別錄)

歷代記述攷證 【魏】吳普本草論鉤吻曰。主喉痺咽塞。聲音變。

應用宜忌 惡黃芩。半夏爲之使。

參攷資料 ①鉤吻食藥。飲冷水即死。冷水發其毒也。彼土毒死人懸尸樹上。汁滴地上。生菌子。收之。名菌藥。烈於野葛也。薑菜搗汁。解野葛毒。取汁滴野葛苗。即萎死。南人先食薑菜。後食野葛。二物相伏。自然無苦。魏武帝敵野葛至尺。先食此菜也。(陳藏器) ②按李石續博物志云。胡蔓草出二廣。廣人負債急。每食此草而死。以誣人。以急水吞即死。急。慢水吞死稍緩。或取毒蛇殺之。覆以此草。澆水生菌。爲毒藥害人。葛洪肘後方云。凡中野葛毒。口不可開者。取大竹筒洞節。以頭柱其兩脇及臍中。灌冷水入筒中。數易水。須臾口開。乃可下藥解之。惟多飲甘草汁。人尿汁。白鴨。或白鵝斷頭。瀝血入口中。或羊血灌之。嶺南衛生方云。即時取雞卵抱未成雛者。研爛和麻油灌之。吐出毒物乃生。稍遲即死也。(李時珍)

【鉤笑】即苦英之古籍別名。典見爾雅。詳「苦英」條。

【鉤栗】 古籍別名 菓鉤子。(拾遺)甜櫟子。(吳瑞)

產地 生山野間。

形態 鉤栗爲喬木類之一種。木大數圍。凌冬不凋。實如栗而圓小。亦有如雀子圓卵者。其實中仁可供藥用。

性質 甘平。無毒。

主治 食之不飢。厚腸胃。令人肥健。

【鉤鉤】即鉤藤之處方用名。詳「鉤藤」條。

【鉤櫟】即鉤栗之別名。詳「鉤栗」條。

【鉤藤】即王瓜之古籍別名。典見郭璞賦。詳「王瓜」條。

【鉤鵲】即鵲鴝之古籍別名。典見綱目。詳「鵲鴝」條。

【鉤藤】 命名 本品剝曲如鉤。鉤故名。

處方用名 鉤鉤。純鉤。嫩鉤。藤。淨雙鉤。雙鉤。鉤。古籍別名 釣藤。釣。吊藤。鉤。(和漢藥考)

外國名詞 Uncaria rhy-nophylla, Miq. (拉丁)

爲水而愈。(劉禹錫傳信方)

③治癰疽發背。黑鉛一斤。甘草三兩。微炙。瓶盛。酒一斗。浸甘草。乃鑄鉛投酒中。如此九度。去滓。飲酒醉臥即愈。(經驗方)

④治金石藥毒。黑鉛一斤。鑄化。投酒一升。如此十餘次。待酒至半升頓飲。(勝金方)

⑤取輕粉毒。出山黑鉛五斤。打壺一把。盛燒酒十五斤。納土茯苓半斤。乳香三錢。封固。重湯煮一日。夜埋土中。出火毒。每日早晚任性飲數杯。後用瓦盆接小便。自有粉出。爲驗。服至筋骨不痛乃止。(醫方摘要)

⑥解砒霜毒。煩燥如狂。心腹疼痛。四肢厥冷。命在須臾。黑鉛四兩。磨水一盞。灌之。(華陀危病方)

⑦解硫黃毒。黑鉛煎湯服即解。(集簡方)

⑧用鹽三錢至四錢。施用宜忌。凡無實邪者禁用。參攷資料。⑨鉛變化爲胡粉。黃丹。密陀僧。鉛白霜。其功皆與鉛同。但胡粉入氣分。黃丹入血分。密陀僧鎮墜下行。鉛白霜專治上焦

胸膈。此爲異耳。方士又鑄爲梳。梳鬚髮可令光黑。或用藥煮之尤佳。(李時珍)

⑩鉛生山穴石間。人挾油燈尋至數里。隨礦脈上下曲折。斫取之。其氣毒人。若連月不出。則皮膚癢黃。腹脹不能食。多致疾而死。地鏡圖云。草青莖赤。其下多鉛。鉛錫之精爲老婦。(李時珍)

⑪嘉州利州出草節鉛。生鉛未煨者也。打破燒之。氣如硫黃。紫青鉛即熟鉛。鉛之精華也有變化。能碎金剛鑽。雅州出釣脚鉛。形如皂子。大又如蝌斗。黑色。生山澗沙中。可乾汞。盧氏鉛粗。靈力劣。信州鉛雜銅氣。陰平鉛出劍州。是銅鐵之苗。並不可用。寶藏論云。鉛有數種。波斯鉛堅白。爲天下第一。草節鉛出犍爲。銀之精也。銜銀鉛銀坑中之鉛也。內含五色並妙。上饒樂平鉛。次於波斯草節。眞版鉛。鐵苗也。不可用。倭鉛。可勾金。土宿眞言本草云。鉛乃五金之祖。故有五金性。狂追魂使者之稱。言其能伏五金而死入石也。雌黃乃金之苗。而中有鉛氣。是黃金之祖矣。銀坑有鉛。是白金之祖矣。信鉛雜銅。是赤金之

祖矣。與錫同氣。是青金之祖矣。硃砂伏於鉛而死於硫。硫戀於鉛而伏於硫。鐵戀於磁而死於鉛。雄戀於鉛而死於五知。故金公變化最多。一變而成胡粉。再變而成黃丹。三變而成密陀僧。四變而爲白霜。雷氏炮炙論云。令鉛住火。須仗脩天。如要形堅。豈忘紫背。註云。脩天。補天石也。紫葵。天葵也。(獨孤酒)

⑫鉛丹。即黃丹之原名。詳「黃丹」條。

⑬鉛白。即鉛粉之別名。詳「白粉」條。

⑭鉛白霜。即鉛霜之古籍別名。典見綱目。詳「鉛霜」條。

⑮鉛光石。基本。鉛光石爲石類之一種。可供藥用。

⑯鉛灰。原名。黑鉛灰。製法。用未經煨治之新鉛。淨去渣。再鎔成液。同硫黃煨。微起。以醋洒之。候成黑灰。研之。以不黏滯爲度用。

⑰性質。甘寒。無毒。

⑱主治。積聚殺蟲。同檳榔末等分。五更米飲服。

⑲鉛粉。即白粉之原名。詳「白粉」條。

⑳鉛條。即鉛之處方用名。詳「鉛」條。

㉑鉛華。①即鉛粉之古籍別名。典見綱目。詳「白粉」條。②即鉛霜之古籍別名。典見綱目。詳「鉛霜」條。

㉒鉛黃華。即黃丹之古籍別名。典見和漢藥考。詳「黃丹」條。

㉓鉛霜。命名。本品係以鉛雜水銀合煉而成之粉末故名。古籍別名。鉛白霜。神符白雲。(綱目)

㉔製法。蘇頌曰。鉛霜用鉛雜水銀十五分之一。合鍊作片。置醋壺中。密封經久成霜。李時珍曰。以鉛打成錢穿成串。瓦盆盛生醋。以串橫盆中。離醋三寸。仍以瓦盆覆之。置陰處。候生霜。刮下。仍合住。

㉕性質。甘。酸。冷。無毒。

㉖主治。消痰。止驚。解酒毒。去胸膈煩悶。中風痰實。止渴。

㉗歷代記述攷證。【宋】寇宗奭本草衍義論鉛霜曰。去臘熱涎壅。

【明】李時珍本草綱目論鉛霜曰。

一五一五

十三畫 鉛 鉛 鉛

乳酪。合酢食。成上癢。(孟詵)

【酪酥】即茄子之古籍別名。典見五代貽子錄。詳『茄子』條。

【鈴兒草】即沙參之古籍別名。典見別錄。詳『沙參』條。

【鈴柴胡】即徐長卿之日本名。詳『徐長卿』條。

【鉞兒草】即杜衡之古籍別名。典見和漢藥考。詳『杜衡』條。

【鉛】 命 名 鉛易沿流。故名。

【鉛】 處 方 用 名 黑錫。青鉛。鉛條。

古籍別名 青金。(說文)金公。

水中金。黑鉛。(新集藥錄)灰名黑。

錫灰。(綱目)五金毘狂。追魂使者。

土宿真言本草。草節鉛。

基本 係金屬。化學原質之一。

產地 在山礦中。

形態 鉛色灰白。質柔軟。抓

之有痕。置空氣中即生薄鏽。而多

延展性。可爲細絲薄片。用途至廣

不僅藥用而已。

製法 李時珍曰。凡用以鐵銹

溶化。瀉瓦上。濾去渣脚。如此數次

收用。其黑錫灰則以鉛沙取黑灰。

白錫灰不入藥。

用法 恒以焙制和藥。亦有水煎。

性質 甘寒。無毒。

效能 降氣逆。墜痰涎。用作鎮靜藥。

主治 鎮心安神。治傷寒毒氣反胃嘔噦。蛇蝎所咬。灸熨之。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器

本草拾遺論鉛曰。療癰瘤。鬼氣疰

忤。錯爲未和青木香傳瘡。腫惡毒

【明】李時珍本草綱目論鉛曰。消

癰癰腫。明目固牙。烏鬚髮。治寶

女殺蟲墜痰。治噎膈。消渴。風癰。解

金石藥毒。

配合應用 ①烏鬚明目。黑鉛

半斤。鍋內銹汁。旋入桑條灰。柳木

攪成沙。篩末。每早搽牙。以水漱口

洗目。能固牙明目。黑鬚髮。(勝金

方)

②指牙烏髭。黑鉛消化。以不蛀

皂莢寸切。投入炒成炭。入鹽少許

研勻。日用指牙。摘去白髭。黑者更

不白也。又方。黑錫一斤。炒灰埋地

中五日。入升麻。細辛。訶子同炒。黑

日用指牙。百日效。亦治牙齒動搖

(普濟方)

③烏鬚鉛梳。鉛十兩。錫三兩。婆

羅得三箇。針砂。熟地黃半兩。茜根

胡桃皮一兩。沒石子。調黎勒皮。硫

黃石。榴皮。慈石。皂礬。烏麻油。各二

錢半。爲末。先化鉛錫。入末一半。柳

木攪勻。傾入梳模子。印成脩齒。餘

末同水煮。梳三日。三夜。水耗加之

取出。故帛重包五日。每以熱皮襯

手梳一百下。須先以皂水洗淨

拭乾。(普濟方)

④治腎臟氣發攻心。面黑欲死

及諸氣奔豚喘急。鉛二兩。石亭脂

二兩。水香一兩。麝香一錢。先化鉛

炒乾。入亭脂急炒。焰起。以醋噴之

傾入地坑內。覆住待冷。取研粟飯

丸。炙子大。每用二丸。熱酒化服。取

汗。或下。或通氣。自愈。如大便不通

再用一丸。入元明粉五分。服。亦治

婦人血氣。冷痛攻心。(聖濟總錄

方)

⑤治風癰吐沫。反目抽掣。久患

者。黑鉛水。銀結砂。南星。炮各一兩

爲末。糯飯丸。菉豆大一歲一丸。乳

汁下。(普濟方)

⑥反胃噦逆。黑鉛化汁。以柳木

槌研成粉。一兩。入米醋一升。砂鍋

熬膏。入蒸餅末少許。搗丸。小豆大

每服一丸。薑湯下。(聖濟方)

⑦治多年反胃不止。紫背鉛二

兩。石亭脂二兩。鹽鹵汁五兩。燒鉛

以鹵汁淬盡。與辛脂同炒。焰起。挑

於水上。焰止。研勻。蒸餅和丸。梧子

大。每服二十丸。煎石蓮乾柿湯下

(聖濟方)

⑧治消渴煩悶。黑鉛。水銀等分

結如泥。常含豆許。許津。(聖惠方)

⑨治寸白蟲病。先食豬肉一斤

乃以沙餵水調黑鉛灰四錢。五更

服之。蟲盡下。食白粥一日。(本事

方)

⑩治水腫浮滿。烏錫五兩。皂莢

一挺。炙酒二斗。煮大沸。頻服。至小

便出。二三升即消。(千金方)

⑪治小便不通。黑鉛末一兩

生薑半兩。燈心一握。井水煎服。先

以炒葱貼臍。(聖惠方)

⑫治卒然咳嗽。爐中鉛屑。桂心

皂莢等分。爲末。蜜丸。如梧子大。每

【遂石】基本 遂石爲石類之一種可供藥用。

產地 生太山。

性質 甘無毒。

主治 消渴傷中。益氣。

【遂陽木】產地 生山中。

形態 遂陽木爲雜木類之一種。葉如白楊葉。三月結實。十月成熟。色赤。可食與供藥用。

性質 甘無毒。

主治 益氣。

【遂葛】即商陸之原名。詳「商陸」條。

【這撥】即華撥之古籍別名。典見扶南傳。詳「華撥」條。

【遊蟲珠】基本 係昆蟲類夜行蟲之屎也。

產地 粵西福建諸省境內。均有產之。

效能 解宿滯。滯垢積。

主治 上焦血滯。腹內脹滿。瘰結等症。

【遊龍】即葑草之古籍別名。典見毛詩。詳「葑草」條。

【運日】即雄鳩之古籍別名。典見綱目。詳「鳩」條。

【運屎蟲】即蜚蠊之古籍別名。典見綱目。詳「蜚蠊」條。

【遍地金】基本 本品即乳藤之細莖者。

古籍別名 雞盲草。（綱目拾遺）

性質 寒。涼。無毒。

主治 小兒一切疳眼。

【遍地金錢】即金錢草之俗名。詳「金錢草」條。

【遍地香】即金錢草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「金錢草」條。

【過山紅】即茜草根之古籍別名。典見和漢藥考。詳「茜草根」條。

【過山龍】即茜草之古籍別名。典見本草衍義補遺。詳「茜草根」條。

【過冬青】即荔枝草之古籍別名。典見經驗廣集。詳「荔枝草」條。

【過冬藤】即忍冬藤之古籍別名。典見和漢藥考。詳「忍冬藤」條。

【過冬草】即忍冬之古籍別名。典見和漢藥考。詳「忍冬」條。

【過冬草】即忍冬之古籍別名。典見和漢藥考。詳「忍冬」條。

【過冬草】即忍冬之古籍別名。典見和漢藥考。詳「忍冬」條。

【過冬草】即忍冬之古籍別名。典見和漢藥考。詳「忍冬」條。

【過冬草】即忍冬之古籍別名。典見和漢藥考。詳「忍冬」條。

【過岡龍】即土茯苓之古籍別名。典見和漢藥考。詳「土茯苓」條。

【過崗龍】產地 粵東珠江兩岸。沼澤田野間常有出之。

性質 甘。辛。微溫。

效能 理氣活血。祛風散濕。解鬱積。壯筋骨。

主治 除疳疔。理跌打。內傷痰火。痔漏管瘡。

【過街】即蟻蟲之古籍別名。典見綱目。詳「蟻蟲」條。

【過路蜈蚣】即地蜈蚣之古籍別名。典見綱目。詳「地蜈蚣」條。

【過羅】即旱蘆之古籍別名。典見綱目。詳「旱蘆」條。

【道乙阿叱】即桔梗之古籍別名。典見和漢藥考。詳「桔梗」條。

【道人頭】即蒼耳子之古籍別名。典見圖經本草。詳「蒼耳子」條。

【道人頭】即蒼耳子之古籍別名。典見圖經本草。詳「蒼耳子」條。

【道人頭】即蒼耳子之古籍別名。典見圖經本草。詳「蒼耳子」條。

【道人頭】即蒼耳子之古籍別名。典見圖經本草。詳「蒼耳子」條。

【道人頭】即蒼耳子之古籍別名。典見圖經本草。詳「蒼耳子」條。

【道人頭】即蒼耳子之古籍別名。典見圖經本草。詳「蒼耳子」條。

【達節】即節華之古籍別名。典見別錄。詳「節華」條。

【酪】古籍別名 漚。（綱目）

製法 先以牛馬羊駝之乳汁半杓鍋內炒過。再入餘乳。熬數十沸。熬時常以杓縱橫攪之。乃傾出罐盛。待冷。掠取浮皮。以爲酥。入舊酪少許。紙封放之。是謂澤酪。再以酪晒結。掠取浮皮。再晒至皮盡。置釜中。炒少時。以器盛之。曝令作塊。是謂乾酪。俱可供藥用。其酥詳見該條。

性質 甘。酸。寒。無毒。

主治 熱毒。止渴。解散發利。除胸中虛熱。身面上熱瘡。肌膚瘡。

歷代記述攷證 【宋】日華諸家本草論酪曰。止煩渴。熱悶。心膈熱痛。【明】李時珍本草綱目論酪曰。潤燥利腸。摩腫生精。血補虛損。壯顏色。

參攷資料 按藏原禮云。乳酪血液之屬。血燥所宜也。酪瀝北人多造之。水牛。犛牛。羴牛。羊。馬。駝之乳。皆可作之。入藥以牛酪爲勝。水牛。馬。駝之酪。冷。犛牛。羊。乳酪溫。（李時珍）

患冷患痢人勿食羊

狸。頭銳鼻尖。有斑色。而毛黃褐。又似小狐。日伏夜出。捕食蟲物。出則攏隨之。其性好睡。毛深厚溫滑。可爲裘服。肉可食。與藥用。

性質 甘溫無毒。

主治 元臟虛勞及女子虛癰。

【賊參】即齊芑之古籍別名。典見和漢藥考。詳「齊芑」條。

【路石】
錄 古籍別名 陵石。(別)

產地 寄生石間。

形態 路石爲雜草類之一種。天雨獨乾。日出獨濡。花黃莖赤。三歲一實。亦如麻子。其莖葉可供藥用。

採取 五月十月間採之。

性質 甘酸。無毒。

主治 心腹病。實骨髓。止汗生肌。益氣耐寒。

【路路通】即楓果之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「楓果」條。

【路頭花】即露花之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「露花」條。

【跳蝦蟲】即淮東子之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「淮東子」條。

【跳蟲】即淮東子之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「淮東子」條。

見綱目拾遺。詳「淮東子」條。

【跳鐵】即鋼鐵之原名。詳「鋼鐵」條。

【載】
基本 載爲雜草類之一種。可供藥用。

性質 酸。無毒。

主治 辟諸惡氣。

【載丹】即丹雄雞之古籍別名。典見吳普本草。詳「丹雄雞」條。

【載君行】即防己之古籍別名。典見和漢藥考。詳「防己」條。

【辟火】即景天之古籍別名。典見綱目。詳「景天」條。

【辟邪】即安息香之古籍別名。典見和漢藥考。詳「安息香」條。

【辟邪翁】即吳茱萸之古籍別名。典見和漢藥考。詳「吳茱萸」條。

【辟虱胡麻】即牛蒡子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「牛蒡子」條。

【辟虺雷】
命名 本品辟蛇虺有威。故以雷名。

古籍別名 辟蛇雷。(綱目)

基本 係山草類。爲辟虺雷之根。

性質 苦。大寒。無毒。

主治 解百毒。消痰。祛大熱。頭

痛。辟瘟疫。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論辟虺雷曰。治咽喉痛。痺解蛇虺毒。

參攷資料 ①辟虺雷狀如粗塊。蒼朮節中有眼。(蘇恭) ②今川中峨眉鶴鳴諸山皆有之。根狀如蒼朮。大者若拳。(李時珍)

【辟蛇雷】即辟虺雷之古籍別名。典見綱目。詳「辟虺雷」條。

【辟毒】即斑鳩之古籍別名。典見綱目。詳「斑鳩」條。

【辟瘟草】
古籍別名 獨脚金星。七星草。骨脾草。(綱目拾遺)

性質 性平。味苦。氣香。

主治 傷寒瘧痢。風氣腫毒。時氣惡氣。散邪風。乳癰熱瘡。小兒痘眼。疳喉閉生蛾。同金鎖匙汁醋漱。痧脹。香竇疎經絡。治疳。

參攷資料 ①百草鏡治痧脹。用鴨脚金星草曬乾爲末。取少許。噉鼻中。或煎服亦可。小泉驗方。疔腫用鴨脚金星草煎酒一服。即消。

②一名獨脚金雞。又名鴨脚金星。佩帶之可辟疫氣。近見市者有小

葉而短狹。大葉而長狹者。皆非辟瘟草也。小者名七星草。俗呼骨脾草。惟無五六蓋五六乃天地之中不易結。寄生石樹間。大者名劍脊金星。長一二尺。生山溪澗旁。老則葉背皆起星。此二種東璧綱目已收載。辟瘟草葉如鴨脚。有三歧。一莖一葉。氣味清香。老則有星。香氣亦減。(趙恕軒) ③鴨脚金星即辟瘟草。葉如鴨脚。大而薄。背生星點。至八九月間。星老乃黃乾之。其氣香冽不變。若葉太老及經水者。便不香。端午採嫩者。陰乾用。勿見火。(百草鏡)

【辟驚石】
古籍別名 避驚風石。(綱目拾遺)

產地 西巴尼亞國。

主治 治急慢驚風。一切天釣尸疰。

參攷資料 西巴尼亞國有一處土中產石。色黑而光。嫩取而琢之。或大或小。佩孩童胸前。遇邪風而起。慢驚急驚。此石代受。其患邪氣盡收於石。自然裂破。孩童無恙。必須常佩永遠。方可無虞。真可寶之物也。(本草補)

餘無所忌。此物本自外番隨海舶而來。非中華所有。番人呼爲補骨脂。語譌傳爲破故紙也。王紹顏續傳信方載其事。頗詳。故錄之。

●治妊娠腰痛。通氣散。用破故紙二兩。炒香爲末。先嚼胡桃肉半箇。空心溫酒調下二錢。此藥神效。

(婦人良方)

●養血返精丸。定心補腎。破故紙炒二兩。白茯苓一兩。爲末。沒藥五錢。以無灰酒浸。高一指。煮化。和末。丸梧子大。每服三十九。白湯下。昔有人服此。至老不衰。蓋故紙補腎。茯苓補心。沒藥養血。三者既壯。自然身安。(朱氏集驗方)

●治水瀉久痢。破故紙炒一兩。粟殼炙四兩。爲末。煉蜜丸。彈子大。每服一丸。薑棗同水煎服。(百一選方)

●牙痛日久。腎虛也。補骨脂二兩。青鹽半兩。炒研擦之。(御藥院方)

●風蟲牙痛。上連頭。腦。補骨脂炒半兩。乳香二錢半。爲末。擦之。或爲丸塞孔。內日用有效。(傳信適用方)

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡病陰虛火動。陽道妄舉。夢遺尿血。小便短瀼。及目赤口苦。舌乾大便燥結。內熱作渴。火升目赤。易飢嘈雜。溼熱成痰。以致骨之無力者。禁用。忌雲臺及羊血諸血。得胡桃。麻良。

參攷資料 ●補骨脂生嶺南諸州及波斯國。(馬志) 今嶺外山坂間多有之。四川合州亦有。皆不及番舶者佳。莖高三四尺。葉小似薄荷。花微紫色。實如麻子。圓扁而黑。九月採。(蘇頌)

●補骨脂 ●即補骨脂之古籍別名。典見和漢藥考。詳「補骨脂」條。

●解毒 ●即鬼臼之古籍別名。典見別錄。詳「鬼臼」條。●即山豆根之古籍別名。典見綱目。詳「山豆根」條。

【解毒子】 古籍別名 地不容。(唐本)苦藥子。(圖經)

產地 出川蜀山野間。
形態 解毒子爲蔓草類之野生草。本葉背似杏葉而厚硬。作卵形而尖。凌冬不凋。無花實。其根黃

白色。外皮微粗褐。累累相連而圓大。可供藥用。

性質 苦。大寒。無毒。
主治 解毒。止煩熱。辟瘴瘡。利喉閉及痰毒。

歷代記述攷證 【宋】蘇頌圖經本草論解毒子根曰。治五臟邪氣。清肺熱。明。李時珍本草綱目論解毒子根曰。消痰降火。利咽喉。退目赤。

【解草】 即吉祥草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「吉祥草」條。

【解錫】 即白粉之古籍別名。典見本經。詳「白粉」條。

【解離】 即防己之古籍別名。典見本經。詳「防己」條。

【解蠶】 即苡仁之古籍別名。典見本經。詳「苡仁」條。

【詹香】 即必栗香之古籍別名。典見綱目。詳「必栗香」條。
【詹諸】 即蟾蜍之古籍別名。典見說文。詳「蟾蜍」條。

形態 詹糖爲香木類之一種。花香如茉莉樹幹如橘。其枝葉熬之成香。似沙糖而黑色。可供藥用。採取 以淳而軟者良。
性質 苦。微溫。無毒。
主治 風水毒腫。去惡氣。伏尸。
歷代記述攷證 【南北朝】陶弘景本草集註論詹糖香曰。治惡核惡瘡。明。李時珍本草綱目論詹糖香曰。和胡桃青皮搗塗髮。令黑如漆。
參攷資料 詹糖香眞淳者難得。多以其皮及蠶屎雜之。爲合香家要用。(陶弘景)

【疎蘆】 即紅豆之古籍別名。典見綱目。詳「紅豆」條。●即白扁豆之古籍別名。典見和漢藥考。詳「白扁豆」條。

【狽】 即狽之古籍別名。典見綱目。詳「狽」條。
【狽諸】 即豪豬之古籍別名。典見綱目。詳「豪豬」條。

產地 生山野中。
形態 狽爲獸類之一種。狀如

精流腎主骨而藏精髓乃精之本
 實陽之氣不固即前證見矣固其
 本而陽氣生則前證自除男子以
 精為主婦人以血為主婦人血氣
 者亦猶男子陽衰腎冷而為血脫
 氣陷之病同乎男子之腎冷精流
 也大溫而辛火能消物故能暖胎
 【明】李時珍本草綱目論補骨脂
 曰治腎泄通命門煖丹田斂精神
 【清】黃元御玉楸藥解論補骨脂
 曰補骨脂味辛苦氣溫入足太陰
 脾足少陰腎手陽明大腸經溫脾
 暖腎消水化食治膝冷腰疼療腸
 滑腎泄能安胎墜善止遺精收小
 兒遺溺與丈夫痿陽除陰囊之溼
 愈關節之涼溫暖水土消化飲食
 升達肝脾收斂滑泄遺精帶下溺
 多便滑諸證甚有功效方書稱其
 延年益壽雖未必信然要亦佳善
 之品也【清】黃宮繡本草求真論
 補骨脂曰補骨脂辛苦大溫色黑
 何書皆載能斂神明使心胞之火
 與命門之火相通因而元陽堅固
 骨髓充實以其氣味溫苦澆以止
 脫故也凡五勞七傷因於火衰而
 見腰膝冷痛腎冷流精腎虛泄瀉

及婦人腎虛胎滑用此最為得宜
 若認症不真或因氣陷氣短而見
 胎墮水衰火勝而見精流泄瀉妄
 用補骨脂止脫則殺人慘於利器
 矣

配合應用 ①治精氣不固用
 破故紙青鹽等分同炒為末每服
 二錢米飲下(三因方)

②治小便無度腎氣虛寒用破
 故紙十兩酒蒸茴香十兩鹽炒為
 末酒糊丸梧子大每服百丸鹽酒
 下或以末搽齋腎熨食之(普濟
 方)

③治小兒遺尿膀胱冷也夜屬
 陰故嬰便不禁用破故紙炒為末
 每夜熱湯服五分(聖童百問方)

④補骨脂丸治下元虛敗脚手
 沈重夜多盜汗縱慾所致此藥壯
 筋骨益元氣補骨脂四兩炒香菟
 絲子四兩酒蒸胡桃肉一兩去皮
 沈香研細一錢半煉蜜丸如梧子
 大每服二三十丸空心鹽湯溫酒
 任下自夏至起冬至止日一服此
 乃唐宣宗時張壽太尉知廣州得
 方於南番人有詩云三年時節向
 邊隅人信方知藥力殊奪得春光

來在手青娥休笑白髭鬚(和劑
 局方)

⑤治虛勞男子女人五勞七傷
 下元虛冷一切風病四肢疼痛駐
 顏壯氣烏鬚髮用補骨脂一斤酒
 浸一宿曬乾卻用烏油麻一升和
 炒令麻子聲絕飯去只用補骨脂
 為末醋煮麪糊丸如梧子大每服
 二三十丸空心溫酒鹽湯任下又
 方治腎虛腰痛用破故紙一兩炒
 為末溫酒服三錢神效或加木香
 一錢(經驗方)

⑥青娥丸治腎氣虛弱風冷乘
 之或血氣相搏腰痛如折俛仰不
 利或因勞役傷腎或溼痺傷腰或
 墮跌損傷或風寒客搏或氣滯不
 散皆令腰痛或腰間如物重墜用
 破故紙酒浸炒一斤杜仲去皮切
 片薑汁炒一斤胡桃肉去皮二十
 箇為末以蒜搗膏一兩和丸梧子
 大每空心溫酒服二十丸婦人淡
 醋湯下常服壯筋骨活血脈烏鬚
 髮益顏色(和劑局方)

⑦治玉莖不痿精滑無歇時時
 如鍼刺捏之則脆此名腎漏用破
 故紙韭子各一兩為末每用三錢

水二盞煎六分服日三次愈則止
 (夏子益奇疾方)

⑧二神丸治脾胃虛瀉用破故
 紙炒半斤肉豆蔻生用四兩為末
 肥棗研膏和丸梧子大每服五七
 十九丸空心米飲下如木香二兩名
 三神丸(本事方)

⑨治打墮腰痛瘀血凝滯用破
 故紙炒茴香炒辣桂等分為末每
 熱酒服二錢(直指方)

⑩唐鄭相國自敘云予為南海
 節度年七十五粵地卑溼傷於內
 外衆疾俱作陽氣衰絕服乳石補
 藥百端不應元和七年有詞陵國
 舶主李摩訶知予病狀遂傳此方
 并藥予初疑而未服歷詞稽首固
 請遂服之經七八日而覺腰膝自
 爾常服其功效神效十年二月罷郡
 歸京錄方傳之用破故紙十兩淨
 去皮洗過曬乾酒浸蒸再曬搗篩
 令細胡桃瓢二十兩湯浸去皮細
 研如泥更以好蜜和令如餡糖瓷
 器盛之旦日以燉酒二合調下十
 匙服之便以飯壓如不飲酒人以
 燉熱水調之俚久則延年益氣悅
 心明目補添筋骨但禁蠶蠶羊肉

專消剋酷腐酸敗液之良藥。其質多含黏液。而夾石灰質土。鹼性不烈。不刺戟胃。故較他土質制酸藥爲佳。亦如他土質藥能閉大便。故宜兼用大黃或適宜瀉劑使之通利。是爲至要。此藥含黏液。有軟化性。故用於兼有疼痛諸症。尤有效。其功效不下於鎂。退爾拔。故一切酸敗液所起之症。即吞酸嘔噎。胸脇心腹刺痛。或小兒癰疽諸症。諸骨軟弱。拘攣病等。用之皆有奇效。利小便。發汗。止下痢。稀釋黏稠。疏解凝結。服量爲末。用至一錢。日服數次。加瓦老別里鹽。用之能驅諸病毒惡液。從汗與小便泄出。加入橙汁或蒸餾醋。待其沸動。已止用之。善能發汗。江馬天江輯譯青囊珍珠（日本安政四年刊行）所載配合蛎站石之處方如下。治小兒瘰癧喘急。金硫黃（自半克冷至一克冷）非沃斯越幾斯（自一克冷至二克冷）蛎站石砂糖各半克冷。上研和分十二包。每四分鐘或半小時服一包。肺勞有熱者。宜此方。硝石等劑。以促衰弱。有害蛎站石。二打蘭。枸橼汁加蛎站石。

飽和爲度。菩提樹花水六盎斯。甘草各別利一盎斯。上調和。每一時服二食匕。

用量 一分至四分。

參攷資料 ①蛎站石爲荷蘭藥。拉丁語謂之Oculus Cancer

②遠西名物考曰。日本長門之赤間關及豐前中津附近河中所產之蟹。有小石狀如慈苳仁。上凸下凹。此種蟹於七八月間脫舊殼。生新殼於其已脫殼時捕之。其兩眼之間必有二白石。惟須窺其脫殼而體仍軟未能行走時速取之。否則其石頃刻溶化如米泔汁。使殼硬固。此爲蛎站石之一種。其性質功效亦同云。③捕得蛎站石時。剥去甲殼。取出之石。帶青色。爲上品。煮過後取出者。色白。爲下品云。

【峻】即鹿精之古籍別名。典見韓悉醫通詳。鹿精條。

【裏朽草】即黃芩之古籍別名。典見和漢藥考詳。黃芩條。

【裏朽草】即黃芩之古籍別名。典見和漢藥考詳。黃芩條。

【裏朽草】即黃芩之古籍別名。典見和漢藥考詳。黃芩條。

【裏朽草】即黃芩之古籍別名。典見和漢藥考詳。黃芩條。

【裏朽草】即黃芩之古籍別名。典見和漢藥考詳。黃芩條。

【裏朽草】即黃芩之古籍別名。典見和漢藥考詳。黃芩條。

【裏朽草】即黃芩之古籍別名。典見和漢藥考詳。黃芩條。

【裏朽草】即黃芩之古籍別名。典見和漢藥考詳。黃芩條。

【裏朽草】即黃芩之古籍別名。典見和漢藥考詳。黃芩條。

【裏朽草】即黃芩之古籍別名。典見和漢藥考詳。黃芩條。

【裏朽草】即黃芩之古籍別名。典見和漢藥考詳。黃芩條。

【裏朽草】即黃芩之古籍別名。典見和漢藥考詳。黃芩條。

【裏朽草】即黃芩之古籍別名。典見和漢藥考詳。黃芩條。

【裏朽草】即黃芩之古籍別名。典見和漢藥考詳。黃芩條。

【裏朽草】即黃芩之古籍別名。典見和漢藥考詳。黃芩條。

【裏朽草】即黃芩之古籍別名。典見和漢藥考詳。黃芩條。

【裏朽草】即黃芩之古籍別名。典見和漢藥考詳。黃芩條。

【裏朽草】即黃芩之古籍別名。典見和漢藥考詳。黃芩條。

【裏朽草】即黃芩之古籍別名。典見和漢藥考詳。黃芩條。

【裙帶魚】即帶魚之古籍別名。典見綱目拾遺詳。帶魚條。

【補骨脂】原名 胡人呼爲婆命名 補骨脂。言其功也。胡韭子。因其子之狀相似。非胡地之韭子也。

處方用名 破故紙。

古醫別名 破故紙（開寶）婆固脂（藥性）胡韭子（日華）天豆反古紙。破故芷。婆固紙。補骨鳴（和漢藥考）

基本 係屬荳科。爲補骨脂之種子。

產地 補骨脂生嶺南諸州及波斯國陳仁山藥物生產辨云。產四川爲最。河南安徽次之。架喇吉打來者。又次名洋故紙。五月新。

形態 補骨脂爲高達三四尺之草本植物。葉作橢圓形。夏秋間於葉間生穗一寸許。開淡紫色花。後結球圓形。大一分許之實。成熟則外皮變爲黑色。中有黑褐色扁圓形。類似麻子之種子。香氣而腥。

採取 每年九月間採。

製法 雷斅曰。凡使補骨脂。此

性燥毒。須用酒浸一宿。漉出。以東流水浸三日。夜蒸之。從巳至申。日乾。用一法以鹽同炒過曝用。

性質 辛。大溫。無毒。

效能 補命門。納腎氣。用作強壯藥。

主治 五勞七傷。風虛冷。骨體傷敗。腎冷精流。及婦人血氣墮胎。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論補骨脂曰。男子腰膝膝冷。囊溼。逐諸冷瘧。頑止。小便腹中冷。【宋】大明日華諸家本草論補骨脂曰。興陽事。明耳目。【明】繆希雍本草經疏論補骨脂曰。補骨脂味辛。其氣大溫。性則無毒。陽中微陰。降多升少。入手厥陰心包絡命門。足太陽脾經。能暖水臟。陰中生陽。壯火益土之要藥也。其主五勞七傷者。蓋緣勞傷之病。多起於脾腎兩虛。以其能暖水臟。補火以生土。則腎中真陽之氣得補而上升。則能腐熟水穀。蒸精粕而化精微。脾氣散精上歸於肺。以榮養乎五臟。故主五臟之勞。七情之傷所生病。風虛冷。因陽氣衰敗。則風冷乘虛而客之。以致骨髓傷敗。腎冷

十三畫 蜈 蜉 娘 蜚 蜒 蚋

錢。餅收密封。如遇痛不可忍。點上油。即時痛止。大效。(孫氏集效方)

③治腹大如箕。用蜈蚣三五條。酒炙。研末。每服一錢。以雞子二箇。打開。入末在內。攪勻。紙糊沸湯煮。熱食之日。一服。連進三服。瘰。(活人心統方)

●治脚肚轉筋。蜈蚣燒猪脂和傳。(肘後方)

●治女人趾瘡。甲內惡肉突出。不愈。蜈蚣一條。焙研。傅之。外以南星末醋和。傅四圍。(醫方摘要方)

用蠟 一條至三條。或五分至一錢半。

●施用宜忌 凡無風癢。實邪及孕婦。病者禁用。畏蛇蟪蜘蛛。雞屎桑皮白蠟。

●製法 以活蜈蚣浸胡麻油中。二十日後。收用。通稱蜈蚣油。相傳有治愈創傷之效。故凡一切毒蟲。毒獸咬傷。作痛者。取塗之。立能止痛。消腫。火傷亦可。用之。

●參攷資料 蜈蚣背光黑綠色。足赤腹黃。有被毒者。以烏雞屎或大蒜塗之。性畏蛇蟪。不敢過所行之路。觸其身即死。故蛇蟪能

治蜈蚣毒。(寇宗奭) 蜈蚣西南處處有之。春出冬蛰。節節有足。雙鬚。尾性長。蜘蛛。以溺射之。即斷爛也。南方有極大者。而本草失載。按段成式西陽雜俎云。綬定縣蜈蚣大者。能以氣吸蜥蜴。相去三四尺。骨肉自消。沈懷遠南越志云。南方晉安有山。出蜈蚣大者。長丈餘。能啖牛。俚人燃炬。遂得以皮鞭鼓肉。曝為脯。美於牛肉。葛洪遐觀賦云。南方蜈蚣大者。長百步。頭如車箱。肉白如瓠。越人爭買為羹炙。張采明道雜志云。黃州岐亭有拘羅山。出大蜈蚣。長丈尺。土人捕得。薰乾。商人販入北方。貨之。有致富者。蔡條叢話云。嶠南蜈蚣大者。二三尺。蠶人至死。惟見託胎蟲。則局縮不敢行。蟲乃登首。啗其腦而食之。故被蜈蚣傷者。搗蟲塗之。痛立止也。珍按。託胎蟲。即蛭蟪也。蜈蚣能制龍蛇。蜥蜴。而畏蝦蟇。蛭蟪蜘蛛。亦莊子所謂物畏其天。陰符經所謂禽之制在氣也。(李時珍)

【蜈蚣草】即神仙對坐草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『神仙對坐草』條。

【蜈蚣萍】 命名 本品葉狀。似蜈蚣。故名。

古籍別名 邊箕萍。麻蕩萍。(綱目拾遺)

產地 多生溪澗田港止水間。

形態 蜈蚣萍為水草類。萍屬之一種。形如蕨。一莖細葉。兩房對而生。葉頗粗澀。不似萍之光滑。點點輕清。採得可供藥用。

主治 辟一切跳蚤蟲。曬乾。燒烟熏之。

【蜚蟪】係蜚娘之一種。惟略似蜚娘而小。大如指頭。身狹而長。有角黃黑色。甲下有翅。能飛。夏月雨後叢生。黃土中。朝生暮死。性質效能詳『蜚娘』條。

【蜚蟪】係蟪之具五色者。性質效能與尋常蟪同。詳『蟪』條。

【蜚】即馬刀之古籍別名。典見爾雅。詳『馬刀』條。

【蜚蟪】即蛭蟪之古籍別名。典見綱目。詳『蛭蟪』條。

【蛭蟪】即蝸牛之俗名。詳『蝸牛』條。

des canerorum (拉丁) Craba-stone (英)

基本 屬胸甲類之蛭。胃之兩側。每歲新生二粒石灰質。即取以入藥。

產地 和漢藥考曰。蛭。日本東北地方溪流中產之。北海道尤多。

形態 蛭。蛭為蟹類之一種。大一寸至三寸許。體形似蝦。八足兩。整向後退。其味似蝦。或呼蝦蟹。胃之內面。兩側有用以咀嚼之。炭酸石灰質之突起物。謂之蛭。蛭石。

(一說此石灰質。係每歲新生皮殼之原料云) 捕時。或用手。或用鐵穿。哇捕之。剥去其甲。而取其體中小石。為白色。淡青色。或微赤色之扁圓形物。大三四分。一面稍扁。平粗糙。一面突起。作輪層狀。硬而滑澤。無氣味。不溶於水。逢酸類則沸騰溶化。遺留軟膏狀物質。

成分 為磷酸鈣。磷酸銨。碳酸鈣。鈉鹽類。膠質等。

效能 專作利水劑。

國外學說 遠西名物考曰。性收瀉。乾燥土質。而含有鹼性鹽。為

外國名詞 Oenit canerorum, Lapi-

故凡瘀血墮胎。心腹寒熱結聚。得此則祛。至於瘰癧便毒等症。書載能治。調治亦是以毒攻毒之意耳。赤足黑頭者佳。火煨用。長蛇蝮蛇。

辨偽

●鄭有巖曰。蜈蚣以蘇州產者爲良。聞蘇人採取生草堆。積腐爛。日久便生。燥乾外黃。背光脊綠。足赤腹黃。此易辨物也。舍蘇均不可用。市肆有以本地所產。混售。開有一種千足蟲。一名馬陸。形最相似。若誤用之。并把着腥臭。氣入頂。皆能毒發致死。不可不慎。

●曹炳章曰。按蜈蚣江蘇蘇州洞庭山出者多。頭紅身黑有光。大者最佳。常州吳江縣鍋山出者少。頭紅身黃色。略次。四川出者。頭黃褐色。身黑褐色。小多力薄。亦次。浙江餘姚縣出者。頭亦紅。身黑褐色。略次。大抵用者。須擇長大頭尾全。全身黑而有光者爲道地。項元麟曰。近時有一種千足蟲。其形相似。惟頭上有白肉。嘴尖者最毒。不宜作蜈蚣用。

●近人學說 張山雷曰。蜈蚣亦是毒蟲。而能治幼科驚風。疳風。抽

搐者。瀾湖謂善行而迅疾者。惟風與蛇。而蜈蚣乃能制蛇。則亦能定風。足厥陰經藥也。入煎藥。不過一二分而止。究是毒物。不可率用。亦作外治末藥。則炒炙研之。皆無頭足。即其毒之所在處也。

配合應用

●金頭蜈蚣。得牛角。鱉象牙。未。猪懸蹄。刺。蝟。蛇。竹屑。能去通腸漏管。

●治瘰癧。一名蛇瘡。瘰癧瘰癧雨之鄉。多毒蛇。氣人有不伏水土。風氣而感觸之者。數月以還。必發蛇瘡。惟赤足蜈蚣最能伏蛇。爲上藥。白芷次之。(直指方)

●治嶺南外蛇瘡。一名瘰癧瘰癧。項大腫痛。連喉。用赤足蜈蚣一二節。研細水下。即愈。(聖濟總錄方)

●治初生小兒口。不閉。不能乳者。用赤足蜈蚣。去足。炙研末。以猪乳二合。調半錢。分三四服。溫灌之。效。(圖經方)

●治小兒。口。但看舌上有瘡。如粟米大。是也。以蜈蚣汁。刮破。指甲。研傳兩頭。肉。即愈。如無生者。乾者亦可。(子母秘錄方)

●萬金散。治小兒急驚。蜈蚣一

條。全者去足。炙爲末。丹砂。輕粉等分。研勻。陰陽乳汁。和丸。菉豆大。每歲一丸。乳汁下。(聖惠方)

●治天。月。久。不下。眼見白睛。及角弓反張。聲不出者。雙金散。主之。用大蜈蚣一條。去頭足。酥炙。用竹刀批開。記定左右。又以射

香一錢。亦分左右。各記明。研末。包定。每用左邊者。吹左鼻。右邊者。吹右鼻。各少許。不可過多。若眼未下。再吹些。須眼。下。乃止。(直指方)

●治破傷。中風。欲死。用蜈蚣研末。擦牙。追去。瘡。沫。立。瘳。(聖惠方)

●又用蜈蚣。頭。烏頭。尖。附子。底。焙。消。等分。爲末。每用一字。或半字。熱酒灌之。仍貼瘡上。取汗愈。(儒門事親方)

●治口。眼。喎。斜。口。內。麻。木。者。用蜈蚣三條。一蜜炙。一酒浸。一紙裹。煨。並去頭足。天南星一箇。切。作四片。一蜜炙。一酒浸。一紙裹。煨。一生

用。半。夏。白。芷。各。五。錢。通。爲。末。入。麝香。少。許。每。服。一。錢。熱。酒。調。下。日。一。服。(通變要法方)

●治腹內蛇瘕。誤食菜中蛇精。成蛇瘕。或食蛇肉。成瘕。腹內常饑。

食物。即吐。以赤足蜈蚣一條。炙研末。酒服。(衛生易簡方)

●治蝮蛇。螫。傷。蜈蚣。燒。末。傳。之。

●治射。毒。瘡。大。蜈蚣。一。枚。炙。研。和。酢。傳。之。(千金方)

●治天。蛇。頭。瘡。生。手。指。頭。上。用蜈蚣一條。燒。烟。熏。一。二。次。即。愈。或爲末。猪膽汁。調。塗。之。(奇效方)

●治丹。毒。癰。腫。用。蜈蚣。一。條。白礬一。皂。子。大。搗。丸。一。箇。百。部。二。錢。研末。調。醋。傳。之。(本草衍義方)

●治瘰癧。潰。瘡。茶。蜈蚣。二。味。炙。至。香。熟。搗。爲。末。先。以。甘。草。湯。洗淨。傳。之。(枕中方)

●治。耳。出。膿。用。蜈蚣。末。吹。之。(鮑氏)

●治小兒。禿。瘡。大。蜈蚣。一。條。鹽一分。入。油。內。浸。七。日。取。油。擦。之。極效。(海上方)

●治便毒。初。起。黃。脚。蜈蚣。一。條。瓦。焙。存。性。爲。末。酒。調。服。取。汗。即。散。(濟生祕要方)

●治瘡。癰。瘡。痛。用。赤。足。蜈蚣。焙爲末。入。片。腦。少。許。唾。調。傳。之。(直指方)

●又用蜈蚣三四條。香油煮一二沸。浸之。再入五倍子末二三

十三畫 蜺

瘰癧癰曲。大者一寸。殼高六七分。其肉可供食與藥用。

性質 甘酸冷無毒。

主治 治時氣開胃。壓丹石藥毒。及疔瘡。下溼氣通乳。糟麥食良。生浸取汁。洗疔瘡。

歷代記述攷證 【宋】日華諸

家本草論蜺肉曰。去暴熱。明目。利小便。下熱氣。脚氣溼毒。解酒毒。目黃。浸汁服。治消渴。【明】李時珍本草綱目論蜺肉曰。生蜺浸水。洗痘癰。無癰痕。

參攷資料 蜺肉微毒。多食發嗽。及冷氣消腎。【陳藏器】

【蜺蜡】 命名 本品爲蜺肉之乾者。故名。

主治 解毒。療水土不服。

【蜺爛殼】 性質 鹹溫無毒。

主治 止痢。

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新

修本草論蜺爛殼曰。治陰瘡。【唐】陳藏器本草拾遺論蜺爛殼曰。燒灰飲服。治反胃吐食。除心胸痰水。

【宋】日華諸家本草論蜺爛殼曰。療失精反胃。【明】李時珍本草綱目論蜺爛殼曰。化痰止嘔。治吞酸。

蜺

心痛。及暴嗽。燒灰塗一切瘡。與蚌粉同功。

古籍別名 葵藿。蜺蛆。

【蜺蚣】 (爾雅)天龍。網目。百足蟲。百脚。(俗名)

外國名詞 Scolopendra (拉

丁) Centipede (英)

基本 屬節足動物多足類中之蜈蚣。

產地 陳仁山藥物生產辨云。蜈蚣產湖北武昌洪山宜昌等處。

春季出新。傳聞將鷄毛溼透。於地上捆一大穴。放鷄毛於穴中。溼蓆蓋之。久而久之。則產生此種蜈蚣矣。

形態 蜈蚣爲外觀厭惡之蟲類。春日徘徊各處。覓食動物性之食物。冬則蟄伏。軀體扁平細長。全長五寸。頭及下面爲黃褐色。背作暗綠色。全身有多數環節。每一環節生脚一對。末端如鉤。脚凡十五至二十對。呼吸口開於環節之兩旁。與氣管相通。此蟲卵生。幼時與母蟲異。初孵化時。繞六環節。後每蜕化一次。其環節與脚皆增多。一次頭部具單眼數個。并鞭狀觸

角一對。口有上顎。下顎。顯脚。顯脚乃第一環節脚之變形物。其尖端具毒腺。便於嚙刺。人若被其螫傷。即起劇甚之疼痛。

採取 七月八月間採捕。黑頭赤足者良。



蜈蚣

製法 雷斅曰。凡使蜈蚣。勿用干足蟲。真相似。只是頭上有白肉面。并嘴尖。若誤用。併把著腥臭氣入頂。能致死也。凡治蜈蚣。先以蜈蚣本末。或柳枝末。於土器中炒令木末焦黑。去木末。以竹刀刮去足甲。用李時珍曰。蜈蚣本不知是何物也。今人惟以火炙去頭足。用或去尾足。以薄荷葉火燉用之。

用法 恒以焙制和作外治藥。間有和入內服藥。

性質 辛溫有毒。

效能 祛風治驚癇。解毒療瘡。

主治 鬼注蟲毒。喉諸蛇蟲魚。傷。用治小兒撮口驚風。藥。

毒。殺鬼物老精。溫瘧。去三蟲。(本經)療心腹寒熱積聚。墮胎。去濕血。(別錄)

歷代記述攷證 【宋】日華諸家本草論蜈蚣曰。治癰瘡。【明】李時珍本草綱目論蜈蚣曰。小兒驚癇。風口。瘰癧。丹毒。疥癩。癰腫。便毒。痔漏。蛇腹。蛇瘻。蛇傷。【明】繆希雍本草經疏論蜈蚣曰。蜈蚣味辛。氣溫。有毒。乃屬陽之毒。蟲足厥陰經藥也。善能制蛇。見大蛇便緣上。噉其腦。淮南子云。騰蛇游霧而殆於蜈蚣。正指此也。故本經主噉諸蛇蟲魚毒。及去三蟲。蟲毒也。性復走。風。辟邪。所以能療鬼注溫瘧。殺鬼物老精。辛主散結。溫主通行。故又治心腹寒熱結聚。墮胎。去惡血也。今世又以之治小兒驚癇。風搐。脾風。口。瘰癧。夫瘰癧。癰腫。痔漏。等證。皆用之。【清】黃宮繡本草求真論蜈蚣曰。蜈蚣本屬毒物。性善噉蛇。故治蛇瘻毒者。無越是物。且其性善走。竄。故瘰癧。鬼怪。得此則療。又其味辛。辛則能以散風。故凡小兒驚癇。風搐。脾風。口。得此入肝。則治。又其性溫。溫則能以療結。

即通也。一法加皂角細辛爲末少許尤速。(傷寒論方)

●治噫不下食取崖蜜含。微嗽嚥下。(廣利方)

●治產後口渴。用煉過蜜不計多少。熱水調服即止。(產書方)

●治難產橫生。蜂蜜、真麻油各半碗。煎減半服立下。(卷上方)

●治天行瘡。比歲有病天行。瘡頭面及身。須臾周匝。狀如火。瘡皆戴白漿。隨決隨生。不即療數日必死。差後瘡癰黯色。一錢方滅。此惡毒之氣。世人云。建武中南陽擊虜所得。仍呼爲瘡窟。諸醫參詳療之。取好蜜。通摩瘡上。以蜜煎升麻數數拭之。(肘後方)

●治痘疹作癢難忍。抓成瘡及疱。欲落不落。百花膏用上等石蜜不拘多少。湯和。時時以翎刷之。其瘡易落。自無癢痕。(全幼心鑑方)

●治癰癤瘰癧。白蜜不拘多少。好酒調下有效。

●治五色丹毒。蜜和乾薑末傅之。(肘後方)

●治口中生瘡。蜜浸大青葉含之。(藥性論方)

●治陰頭生瘡。以蜜煎甘草塗之。(外臺祕要方)

●治肛門生瘡。肛門主肺。肺熱即肛塞腫痛。生瘡。白蜜一斤。豬膽汁一枚。相和。微火煎令可丸。丸三寸長。作挺塗油。納下部。肛令後重。須臾通瀉。(梅師方)

●熱油燒痛。以白蜜塗之。(梅師方)

●治疔腫惡毒。用生蜜與隔年葱研膏。先刺破塗之。如人行五里許。則疔出。後以熱醋湯洗去。(濟急仙方)

●治面上黥點。取白蜜和茯苓末塗之。七日便瘥也。(孫真人食忌方)

●治目生珠管。以生蜜塗目。仰臥半日。乃可洗之。日一次。(肘後方)

●治誤吞銅錢。煉蜜服二升。可出矣。(葛氏方)

●治諸魚骨鯁。以好蜜稍稍服之。令下。(葛氏方)

●治年少髮白。拔去白髮。以白蜜塗毛孔中。即生黑髮。不生。取梧桐子搗汁塗上。必生黑者。(梅師方)

方)

用量 三錢至一兩。

施用宜忌 凡脾寒便瀉。及有溼邪中滿者。禁用。與生葱、蔥白同食。則下痢。與鮓同食。則暴死。

參攷資料 ●蜂蜜入藥之功有五。清熱也。補中也。解毒也。潤燥也。止痛也。生則性涼。故能清熱。熟則性溫。故能補中。甘而和平。故能解毒。柔而濡澤。故能潤燥。緩可以

去急。故能止心腹肌肉瘡瘍之痛。和可以致中。故能調和百藥。而與甘草同功。張仲景治陽明結燥。大便不通。蜜煎導法。誠千古神方也。(李時珍)

●但凡覺有熱。四肢不和。即服蜜漿一椀。甚良。又點口中熱膜。以家養白蜜爲上。木蜜次之。崖蜜更次之也。與薑汁熬煉。治癩甚效。(孟詵)

●諸蜜氣味。當以花爲主。冬夏爲上。秋次之。春則易變。而酸。閩廣蜜極熱。以南方少霜雪。諸花多熟也。川蜜溫。西蜜則涼矣。(王穎)

●蜜喜入脾。西北高燥。故入食之有益。東南卑溼。多食則害生於脾也。(朱震亨)

【蜂糖】即蜂蜜之古籍別名。典見

和漢藥考。詳「蜂蜜」條。

【蜂蠟】即黃蠟之處方用名。詳「黃蠟」條。

【蜆】即車螯肉之古籍別名。典見綱目。詳「車螯肉」條。

【蜆】 命名 蜆。現也。本品殼內光耀如日。初出故名。

古籍別名 扁蜆(綱目)金口蜆。

外國名詞 Corbicula leana Prime 或 Cyelina orientalis (拉丁)シジミ或マシジ(日本)

基本 係軟體動物瓣鰓類有管類全緣類蜆科之蜆。

產地 出溪湖中淡水間。



蜆

形態 蜆爲介類蚌蛤屬之一種。殼形略似心臟。右左兩殼同形。殼外有同心之輪紋。約三十層。表皮暗褐。稍帶黃。殼內肉紫白色。殼頂膨起。色黑。但多脫去。表皮露出石灰質。鉸合部有主齒三。外觀帶堅強。殼緣呈鋸齒狀。外套膜厚。其

之令人喉中不安。似覺少有粹味。存若干時。則蜂蜜變濃而成白色顆粒。至下等之蜂蜜。其內有顆粒與雜質。尋常之取蜜法。則由壓蜂房而得之。故蜂蜜以自房中取出者爲佳。中國藥肆中所出售之蜂蜜。蜜中恒見有死蜂。甚污。不可入藥用。蜂蜜之上等者。爲黏性透明之流質。其嗅香而奇。味甜而美。下等則係棕紅色。其作用爲潤內皮。藥微利藥。如小兒便秘服之最宜。多食令人肚疼。宜佐他藥和服。治咳嗽藥亦有效。外用能敷惡瘡。漱口喉等處。方以蜂蜜四錢。硼砂五分末調勻。搽小兒口瘡。(硼砂蜜方)又用蜂蜜與甘草末微火煎凝。捻作錠。端長圓丸藥。納入肛門。導引屎出。尤佳。(蜂蜜甘草方)又日本和漢藥考曰。日本香川。德島。鹿兒島。宮崎。和歌山。沖繩等諸縣。產此養蜂。在日本爲農家副業。法尙幼稚。故所獲蜂蜜不多。品質亦劣。養蜂者及業業者。欲加以研究。可參閱日農商務省農事試驗所出版第五次內國勸業博覽會出品說明書。養蜂。及藥學雜誌第二

百六十九號。佐藤捨次郎氏之蜂蜜及黃蠟談。對於養蜂法。蜂蜜收集法等。可閱東京博物館出版。敦草第二十四號。蜂一覽。及玉利農學博士所著養蜂改良說等。又曰。取蜂蜜宜於春夏及秋季。春季蜂力最旺。爲去舊巢營新巢之時。貯蜜尤多。故收取以此季最佳。日本採收蜂蜜法。即切取蜂房三分之二。入篩或簍置桶上。於爐邊或日光下熱之。則蜜液滴下。日本謂之一番。即漢名生蜜(白蜜)。次將巢房盛於布囊榨之。謂之二番。雜有蜂仔等。其質甚劣。又有不論蜂房新陳。同碎入鍋。加水少許。溫之。入布袋擠出。漢名熟蜜。黃蜜。擠出後之糟滓。可製黃蠟。又精製蜂蜜法。將蜂蜜入磁皿蓋之。靜置寒暖適中。處三四日間。將表面所生泡沫。擷出數次。至已完全不發泡沫而後。已又法於蜂蜜加水四分之一至六分之一。入雞子白攪拌。用文火熱之。擷去上面發出泡沫。投下雞卵。至上浮稠度。乃用毛篩濾過。即成精品。又曰。蜂蜜用於火傷有效。例有六歲小孩。嘗誤將其兩

手置竈火中。其老祖母尙壯健。立抱之奔廚下。擬將兩手傷處。置之水中。時適他室有盛新製蜂蜜之甕。因小孩痛楚異常。無法可施。即將其兩手。插置甕中。痛楚頓解。翌日復插置甕中。及第三日。已告全愈。創處並無損傷。亦全不起水泡。(日本安政七年刊行宇田川興齋譯萬寶新書)又第三版改正日本藥局方云。精製蜂蜜。係取蜂蜜二分。加蒸餾水三分。於重湯煎上溫一時間。俟其冷至約五十度。用緻密絨布濾過。復急於重湯煎上蒸發。使成比重一・二三而止。(第四版改正日本藥局方云。加白陶土精製)本品有良快香氣。又第四版改正日本藥局方曰。蜂蜜概無色。或作淡黃色。或帶褐黃色。新鮮時爲透映黏稠。液味甘美。經久漸析出顆粒。本品微呈酸性。反應於顯微鏡下檢視。可見糖晶及花粉等質。又東洞益吉曰。仲景甘草粉蜜湯證曰。毒藥不止。千金翼方。毒藥作藥毒爲是。此方本主緩結毒急痛。故兼治一切藥毒不止煩悶者。路世見之。以爲蜜能解

百藥毒。蜜若解百藥毒。則仲景之方。何其用蜜之多乎。夫蜜之於諸藥。也能助其毒。又於其病毒。也能緩其急。猶粳米與小麥。平甘草及粉。亦其功大抵相似。故如此方。則爲緩其急用之。凡蜜之爲物。同諸藥用之。則能助其毒。今同甘草及粉用之。則又能緩其急痛也。煩悶豈非藥毒之急乎。又所以兼治蠱蟲心痛也。種又按所謂藥毒者。非攻病毒藥之藥毒。而必是害人體之藥毒。所謂煩悶者。非攻病毒藥之煩悶。而害人藥毒之煩悶也。句止攻病毒藥之煩悶者。非疾醫之義矣。煩悶是毒藥之瞑眩也。豈其止之可乎。余故曰。此藥毒者。非攻病毒藥之藥毒。由此觀之。則蜜之功。可以知矣。(害人毒藥者。蓋非醫人誤治之毒藥)

配合應用 ●治大便不通。陽明病自汗。小便反利。大便硬者。津液內竭也。蜜煎導之。用蜜二合。銅器中微火煎之。候凝如飴狀。至可丸。乘熱捻作挺。令頭銳。大如指。長寸半許。候冷即硬。納便道中。少頃

也。其在毒草近側之蜂房。不宜採取。恐其蜜含有毒質耳。

製法 雷斅曰。凡煉蜜一觔。只得十二兩半。是數若太少太過。並用不得。李時珍曰。凡煉砂蜜。每兩入水四兩。銀石器內。以桑柴火慢煉。掠去浮沫。至滴水成珠不散。乃用謂之水火煉法。又法以器盛置重湯中煮一日。候滴水不散。取用亦佳。且不傷火也。

用法 水煎或水化。或浸藥外傳。或和藥爲丸。

性質 甘平。無毒。

成分 蜂蜜之主成分爲糖類。其他有含淡物花粉及水氣等。

效能 補中益氣。潤燥滑腸。有鎮咳通便之效。用於泌尿器病。喘息。慢性氣管枝加答兒等。其他用作丸劑佐藥及調味藥。

主治 心腹邪氣。諸驚癰瘰。安五臟諸不足。益氣補中。養脾氣。除心煩。飲食不下。止腸瀉。腹中疼痛。口瘡。明耳目。止痛解毒。除衆病。和百藥。久服強志輕身。不老延年神仙。

張仲景之證明 石蜜一味。經

十三畫 蜂

張仲景之實驗。認爲「主治結毒。急痛。兼助諸藥之毒」。茲考徵如下。

①大烏頭煎證曰。寒疝繞臍痛。②烏頭湯證曰。歷節不可屈伸。疼痛。又曰。脚氣疼痛。不可屈伸。又曰。寒疝腹中絞痛。③烏頭桂枝湯證曰。寒疝腹中痛。以上三方。蜜各二升。④大陷胸丸證曰。結胸。項亦強。上方白蜜二合。⑤大半夏湯證曰。嘔吐。心下痞硬。上方白蜜一升。⑥甘草粉蜜湯證曰。心痛。上方蜜四兩。⑦下瘀血湯證曰。產婦腹痛。上方蜜和爲丸。酒煎。又與諸藥等分。之例。⑧甘遂半夏湯證。不具。上方蜜半升。據上諸方。則蜜能治諸結毒。急迫疼痛。明矣。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論蜂蜜曰。牙齒疳。唇口瘡。目膚赤。障殺蟲。【唐】甄權藥性本草論蜂蜜曰。治卒心痛。及赤白痢。水作蜜漿。頓服一椀。止。或以薑汁同蜜各一合。水和頓服。常服面如紅花。【唐】孟詵食療本草論蜂蜜曰。治心腹血刺痛。及赤白痢。同生地黃汁各一匙。服即下。【宋】

寇宗奭本草衍義論蜂蜜曰。同薤白搗塗湯火傷。即時痛止。【明】李時珍本草綱目論蜂蜜曰。和營衛。潤臟腑。通三焦。調脾胃。【明】繆希雍本草經疏論蜂蜜曰。石蜜蜂採百花釀成。故本經味甘氣平。別錄微溫無毒。得草木羣英之精華。合露氣以釀成。故其氣清和其味純。甘施之精神氣血。虛實寒熱。陰陽內外諸病。罔不相宜。經曰。裏不足者。以甘補之。石蜜具天地間至甘之味。故能安五臟諸不足。及益氣補中。除衆病也。心經有熱。則爲諸驚癰瘰。得甘緩之氣。則心火降。煩熱除。諸癰癰瘰平矣。諸痛癢瘡。皆屬心火。故又能止腹中疼痛。及口瘡也。甘主解毒。故能和百藥。甘主入脾。故能養脾氣。脾氣得所。養而飲食自下。腸澀止矣。五臟足。氣血充。則耳目聰明。不飢不老。輕身強志。延年神仙。所自來矣。【明】李士材本草圖解論蜂蜜曰。蜂蜜甘平。和營衛。潤臟腑。通三焦。理脾胃。解諸毒。和百藥。導便結生。能清熱。熱則補中。凡煉蜜一觔。入水四兩。銀石器內。慢火煎。掠去浮沫。至滴

水不散爲度。【清】黃宮繡本草求真論蜂蜜曰。蜜本花木精英。春生露氣。曬得釀而成。生則性涼。清熱。熟則性溫。補中。爲至純粹之味。凡人五臟不足。燥結不解。營衛不調。三焦失職。心腹急痛。肌肉瘡瘍。咳嗽熱刺。眼目眩花。形色枯槁。無不借其潤色。以投如仲景治陽明燥結。大便不解。用蜜煎。取其能通結。燥而不傷脾胃也。滋補藥俱用白蜜爲丸。取其和胃潤肺也。至於赤蜜。食之使人心煩。以其味酸。故惟降火藥用之。白蜜雖補脾肺。然性涼質潤。若脾氣不實。腎氣虛滑。及溼熱痰滯。胸痞不寬者。咸須忌之。白如膏者。良用銀石器。每蜜一斤。入水四兩。桑火慢熬。掠去浮沫。至滴水成珠。用忌蔥酢高。皆同食。

國外學說 英美學說謂蜂蜜產中國西國等處。係蜜蜂在其窩內所釀之糖質。此糖質先成於花心內。蜜蜂食之入其胞內。則改變其形性。吐出於蜂房之內。蜂房內自行流出之蜜。則爲極細之蜂蜜。如其蜜蜂窩中。尚未分羣。則所得之蜂蜜。謂之清蜜。上等之蜂蜜。食

之根名常山。而處方多用常山。少用蜀漆。其功效能蓋相同也。詳『常山』條。

【蜀酸漿】即山茱萸之古籍別名。典見本經。詳『山茱萸』條。

【蜀隨子】即續隨子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『續隨子』條。

【蜂白臘】即白蠟之處方用名。詳『白蠟』條。

【蜂衣仙子】即荔枝之古籍別名。典見和漢藥考。詳『荔枝』條。

【蜂房】即露蜂房之處方用名。詳『露蜂房』條。

【蜂虎】古籍別名 蜜虎。古路哥。嚙嚙哥。(綱目拾遺)

產地 山東多有之。

形態 蜂虎爲卵生類之一種。似蜂而大。首尖身圓。狀如橄欖。形有兩翼。亦如蜂翅。遍身生毛。花斑色。尾有短毫。鋪張如鷄尾。鼻上有鬚二根。喜入花心中。以鬚鉤取花蕊而出。其鬚能伸縮屈曲如象鼻。然以捲物。而喜入鳳仙花叢中。散子於葉背。日久生小灰色蟲。如青蠅。體上有黑白斑暈。食其花葉長大及老。則下根底。變爲蛹。頭粗尾

尖。如海蟾狀。作者黃色。久則蛹出爲蛾。即成蜜虎。如此循環生生不已。可供藥用。

採取 以雄者入藥用。

製法 捕得裝入布袋。掛簷下陰乾。瓦上火焙。去其周身絨毛。翦去頭足翅尾。再以火焙爲末。喉症加冰片少許合研用。

主治 咽喉腫痛。單雙喉蛾。吹之心腹痛。焙酒服一二枚即止。

參攷資料 蜂虎有雌雄。雄者身瘦小。雌者腹大。入藥用雄者。以線穿陰乾。可合房術藥用。山東極多。能食蜂。養蜂家最忌之。其蟲口中。有黑絲。常捲若入蜂窩。即吐直其絲。以刺蜂。蜂即斃。然後食之。蓋蜂針在尾。而此蟲之針在首。想亦有毒。故蜂爲所刺。無不立斃。其蟲於初秋散子在豆莢中。則爲豆蟲。如青蠅狀。食豆在黍稷上。則爲朝天猴。如刺蜜狀。後黍稷白下食而上。最爲莊田之患。然可食。莊人候日未出時。此蟲着露。體重翅輕。不能飛。易於撲取。人捕得。去其翅。置瓦罐內。令其自相撲。擲其體上。細毛自落。然後以油鹽椒薑炒食。

之。味勝蜜蠅。但其體上毛不可着人眼。着眼即目損。(綱目拾遺)

【蜂勑】即露蜂房之古籍別名。典見別錄。詳『露蜂房』條。

【蜂家】即露蜂房之古籍別名。典見和漢藥考。詳『露蜂房』條。

【蜂腸】即露蜂房之古籍別名。典見本經。詳『露蜂房』條。

【蜂葉】即露蜂房之處方用名。詳『露蜂房』條。

【蜂蜜】原名 石蜜。命名 蜜以密成。故名。本經名石蜜。蓋謂生於巖石者良也。

處方用名 蜜精。黃蜜。白蜜。生蜜。煉蜜。

古籍別名 石飴。(本經) 巖蜜。赤蜜。崖蜂。(綱目) 蜂糖。并醲。食蜜。百花。薑。百花精。紫口芝。(和漢藥考)

外國名詞 Mel(拉) Honey(英) Honig(德)

基本 屬膜翅類。蜜蜂之勞動

蜂(職蜂工蜂)吸收花之糖質。後由一種嘔吐作用。釀貯於蜜巢者。產地 陳仁山藥物生產辨云。

蜜糖。以產廣東增城爲第一。瓊州嘉積爲第二。俱運往江門沽。東莞新安。惠州爲第三。南寧。百色爲第四。其次則廣西桂林。江口。廣東北江。連州。樂昌。昌西山下。四府。瓊州。海口等。均有出。南寧。百色蜜。前二三十年來者甚佳。但前十五年至今所到者。無一不混雜有其名。無其實。

形態 蜜之純良品爲淡黃色。濃稠液體。經時稍久。則成顆粒狀。有清香及甘味。比重一·四二五至一·四三四。溶於水及稀酒精。

種類

●生蜜即白蜜。乃割取蜂房受爐火或日光之熱。自然溶解。滴下之蜜液。●熟蜜即黃蜜。乃雜取新舊之房。同碎入鍋。加水溫煮。盛袋榨出之蜜液。●採自高山大樹之自然蜜穴。或大石間。曾經數年之蜂巢者。謂之山蜜。石蜜。岩蜜。爲上。●採於人家或野外。置箱或桶等。養蜂釀成者。謂之飼蜜。或家蜜。爲次。

採取 春夏秋三季間採之。尤以春季爲佳。以春時適其去舊營造新巢之際。貯蜜較他時爲多。故

日華謂主淋瀝。通小腸。催生墮胎。瘰癧。治瘡疥。皆以寒滑見長。惟宜於燥熱之證。而虛者忌之。

配合應用 ①治小便淋痛。葵根洗剉。水煎五七沸。服之。如神。
(衛生寶鑑方)

②治小便便血。葵花根二錢。車前子一錢。水煮。日服之。(簡便單方)

③治小便尿血。葵莖。無灰酒。服方寸匕。日三。(千金方)

④治腸胃生癰。懷忠丹。治內癰。有敗血。腥穢甚。臍腹冷痛。用此排膿下血。單葉紅蜀葵根。白芷各一兩。白枯礬。白芍藥各五錢。爲末。黃蠟溶化。和丸。梧子大。每空心米飲下二十九。待膿血出盡。服十宜散補之。坦俱皆效方)

⑤治諸瘡腫痛。不可忍。者。葵花根去黑皮。搗爛。入井華水。調稠貼之。(普濟方)

⑥治小兒吻瘡。經年欲腐。葵根燒研傳之。(聖惠方)

⑦治小兒口瘡。赤葵莖炙乾。爲末。蜜和含之。(聖惠方)

用量 一錢至三錢。

參攷資料

①蜀葵四時紅色。單葉者。根陰乾。治帶下。排膿。血惡物極驗也。(寇宗奭) ②蜀葵苗不可久食。鈍人志性。若被狗齧者。食之永不瘥也。(孫思邈) ③蜀葵苗合猪肉食。令人無顏色。(李廷飛)

④爾雅云。膏音堅。戎葵也。郭璞注云。今蜀葵也。葉似葵。花如木槿花。戎蜀其所自來。因以名之。(陳藏器) ⑤蜀葵處處人家。植之。春初種子。冬月宿根亦自生。苗嫩時亦可茹食。葉似葵菜而大。亦似絲瓜。有歧叉。過小滿後長莖高五六尺。花似木槿而大有深紅淺紅紫黑白色。單葉千葉之異。昔人謂其疎莖密葉。翠華豔花。金粉檀心者。頗善狀之。惟紅白二色入藥。其實大如指頭。皮薄而扁。內仁如馬兜鈴仁及蕪荑仁。輕虛易種。其褶剝皮可緝布作繩。一種小者名錦葵。卽荊葵也。爾雅謂之葭。音喬。其花大如五銖錢。粉紅色。有紫縷文。掌禹錫補注本草。謂此卽戎葵非矣。然功用亦相似。(李時珍) ⑥五月花開莖高數尺。花有淡紅。鮮紅。黑白各色。又有單瓣千葉之別。堪供

玩賞。鮮紅者最佳。皆自宿根發生。薔子者二年開花。以其莖水浸二日。剝離其皮。可製爲繩。亦可織布。枯莖作薪。耐火。力雖成灰久不熄。見西陽雜俎。(太和本草) ⑦日本藥局方所收之亞爾答亞根。卽係採用日本產之蜀葵製之。蜀葵根一名亞爾答亞根。爲大如手指之長根。其帶灰黃色之繩層已剝去之外。面帶粉白色。內皮層爲長纖維性。其橫斷面之皮部。白色稍厚。木心部作放線狀。味淡泊而黏滑。(和漢藥考)

【蜀葵子】 性質 甘。冷。無毒。主治 淋瀝。通小腸。催生落胎。療水腫。治一切瘡疥。并癰疽赤瘡。

配合應用 ①治大小便閉不通者。用白花胡葵子爲末。煮濃汁服之。(千金方)

②治石淋破血。五月五日收葵子。炒研食前溫酒下一錢。當下石出。(聖惠方)

③治癰腫無頭。蜀葵子爲末。水調傳之。(經驗後方)

參攷資料 按楊士瀛直指方

云。蜀葵子炒入宣毒藥中最驗。又催生方用子二錢。滑石三錢。爲末。順流水服五錢。卽下。(李時珍)

【蜀葵花】 原名 吳葵華。性質 鹹寒。無毒。主治 理心氣不足。

歷代記述攷證 【宋】嘉祐圖經本草論蜀葵。花曰小兒風。癰瘡。明李時珍本草綱目論蜀葵。花曰治帶下。目中溜火。和血潤燥。通竅。利大小腸。

外國名詞 Radix Albu (拉丁)

採取 以紅花單葉者陰乾用。主治 利小便。治淋痛。祛客熱。酒服止尿血。婦人帶下惡物。排膿血。

【蜀葵莖】 性質 甘。微寒。無毒。主治 作蔬茹。潤燥。滑竅。養食。除客熱。利腸胃。治丹石發熱。酒服止熱毒下痢。淋疾。尿血。搗塗口瘡。火瘡。

參攷資料 蜀葵莖能鈍人性志。不可久食。狗咬者食之。永不瘥。合猪肉食。令人無顏色。(綱目)

帶白色。以此根一分。加水十分。即成帶黃色之黏漿。黏漿味淡。無酸性。及安母尼亞性之臭氣。若現穢白色。或已變木質者。俱不堪用。蓋亞爾答亞根之供藥用。以其黏液實極多故也。葵類中雖亦含黏液質。然終不及亞爾答亞根之多。因此日本產之葵根不能入藥。一說蜀葵開白花者。其根頗多黏液質。此層尚須研究。又藥學博士石津利作。嘗將黃蜀葵根試驗。據稱確可代亞爾答亞根用。錄其說如下。亞爾答亞根。係取屬錦葵科二年生植物之主根及副根。剝去外部之袍層。乾而製之。此根含有極多之澱粉。黏液質及亞斯拍拉根約二%。能緩解腸胃之刺激。故用為黏滑性之佐使藥。前藥局方本以蜀葵根定為藥用品。尋以其根質頗堅韌。含粘液質尚少。不適醫家之用。故改正藥局方。改用亞爾答亞根。惟現今盛行之亞爾答亞根。仍非該植物之根。依然習用從前之蜀葵根。初不計藥局方之准與否也。所以然者。因亞爾答亞根在日本甚不易得。曾取黃蜀葵根為

藥學之實習。以時日匆促。研究尚有缺漏之處。惟所得成。竊有足述者。黃蜀葵屬錦葵科植物。含有黏液質極多。水浸其根片時。便成黏漿。從前日本美濃駿河等處。向用為製紙之原料。考黃蜀葵初生葉。祇有三尖。漸長始有五尖。至梢缺刻極深。似大麻葉。柄底有如針之托葉。至秋。每梢頭之葉腋。必開花。一朵。萼重覆如蜀葵花。五瓣淡黃。爪呈深紫色。似草棉花。而大被覆柱筒狀。子室之上。頭為暗紅之五珠。雄蕊滿布其體。莖與葉柄俱帶毛。後結角果。如桐子。長寸許。為鈍五稜。亦有毛。中分五室。藏多數種子。形似苜蓿子。色褐。頗有條頭。此草有大小二種。小者高二三尺。大者六七尺。形狀相似。惟大者葉之缺刻更深。儼如五指。中分小者根之黏液較多。製紙專用此種。大者僅賞其花而已。又黃蜀葵根為長圓錐形。旁生細小之分枝。乾則外面現污灰色。有縱紋。質柔韌。不易破折。嘗將其根行解剖學之檢查。與亞爾答亞根相較。先取此根浸六十%之稀酒精。經兩星期後。視

其橫斷面。則見其構造。與亞爾答亞根大略相同。全面幾皆呈白色。僅新生組織褐色。皮部約占長徑五分之一。至十分之一。有纖細之白色纖維。於木質部為放線狀。而貫徹。後以單顯微鏡檢視皮部。則見其纖維束。排列若輪圈。內皮纖維。為長袍束。至木質部之纖維。則顯然可見也。再以顯微鏡檢視其橫斷面。見其皮部。與木質部之構造。亦與亞爾答亞根無異。處處有黏液細胞。以水浸之。立即膨脹。分外顯明。此黏液細胞中。實含有代表生藥功用之黏液。又曾取此黏液。檢查其化學之本性。法先以黃蜀葵根洗淨。候乾。搗碎。入廣闊之玻璃瓶。約加蒸餾水十倍。未幾即見膨脹。漸因黏液質分泌而成黏漿。一宿後。再視之。全液變為濃稠。即用力搗之。亦不易動。乃用粗布絞榨。除淨污物。遂得透明帶白色之黏液。於此欲分取純粹之黏液。質。須多加酒精。而取其沈澱之黏液。分。再反覆加濃酒精。搓捏洗淨。置生石灰上。乾之。則得灰白色之黏液。此灰白色之黏液。加硝酸而

溫之。俄即發生紅褐色之氣體。約三四時。幾全溶解。止餘灰白色之絮狀物質而已。這紅褐色之氣體。發生終止。仍煮沸片刻。濾過。放置。俟冷。便可析出巨大之針狀結晶。與細小之白色結晶性粉末。於此一面分取。一面使再三結晶。最後檢視該結晶之本質。大部不外葸酸。其隨葸酸而發生之白粉物質。檢其熔點等。純然為黏液酸。據此性質考之。是該黏液乃真正黏液。與亞爾答亞根所含者無異。亞爾答亞根之功效。在於黏液。則黃蜀葵根可以代用。決無疑義。且黃蜀葵日本隨在皆有。其黏液既多。是功效益可信其確實也。

近人學說

張山雷曰。蜀葵雖大於葵。而氣味甘寒。性亦滑利。與葵不異。其苗則孫思邈稱其除客熱。利腸胃。藏器謂治丹石發熱。熱毒下痢。日華謂搗塗火傷。瀉潤謂滑竅治淋。潤燥易產。其花則別錄謂理心氣不足。潔古謂治帶下。赤者主赤帶。白者主白帶。亦治血燥。白治氣燥。皆取其寒滑潤利也。瀨湖謂和血潤燥。利大小腸。其子。則

之一種。形如荏菀而有刺。可供藥用。

性質 苦。平。無毒。

主治 寒熱瘧瘵。癰腫。女子帶下。

下。

【蜀葵】①即羌花之古籍別名。典見別錄。詳「羌花」條。②即羌花之根。詳「黃大戟」條。

【蜀葵】即蜀葵之俗名。詳「蜀葵」條。

【蜀脂】即黃耆之古籍別名。典見別錄。詳「黃耆」條。

【蜀椒】即川椒之原名。詳「川椒」條。

【蜀葵】即黃耆之古籍別名。典見別錄。詳「黃耆」條。

【蜀葵】即黃耆之古籍別名。典見別錄。詳「黃耆」條。

【蜀葵】即黃耆之古籍別名。典見別錄。詳「黃耆」條。

【蜀葵】即黃耆之古籍別名。典見別錄。詳「黃耆」條。

【蜀葵】即黃耆之古籍別名。典見別錄。詳「黃耆」條。

【蜀葵】即黃耆之古籍別名。典見別錄。詳「黃耆」條。

【蜀葵】即黃耆之古籍別名。典見別錄。詳「黃耆」條。

【蜀葵】即黃耆之古籍別名。典見別錄。詳「黃耆」條。

【蜀葵】即黃耆之古籍別名。典見別錄。詳「黃耆」條。

【蜀葵】即黃耆之古籍別名。典見別錄。詳「黃耆」條。

【蜀葵】即黃耆之古籍別名。典見別錄。詳「黃耆」條。

【蜀葵】即黃耆之古籍別名。典見別錄。詳「黃耆」條。

【蜀葵】即黃耆之古籍別名。典見別錄。詳「黃耆」條。

【蜀葵】即黃耆之古籍別名。典見別錄。詳「黃耆」條。

【蜀葵】即黃耆之古籍別名。典見別錄。詳「黃耆」條。

【蜀葵】即黃耆之古籍別名。典見別錄。詳「黃耆」條。

【蜀葵】即黃耆之古籍別名。典見別錄。詳「黃耆」條。

十三畫 蜀

年生草本。與蘆葦相似。桿粗而高。達丈許。葉大闊。二寸。長二尺餘。與莖俱稍帶赤褐色。春日下種。夏月莖梢抽出大穗圓錐花序。花後結實。色亦赤褐。秋日收穫。其米可供食與藥用。

性質 甘。溫。無毒。

主治 溫中。瀉腸胃。止霍亂。黏者與黍功同。

【蜀黍根】主治 利小便。煮汁服。治喘滿。及婦人難產。燒灰酒服。

【蜀葵】命名 本品自蜀戎吳名。惟吳者乃胡之訛也。

古籍別名 葦戎葵（爾雅）吳葵。別錄：胡葵（爾雅翼）莖。杖石。杖紅。杖葵。荻葵。衛足。一文紅。衛足葵。和漢藥考。

外國名詞 Althea rosea, cav. (拉丁)

基本 屬錦葵科。為蜀葵之苗根莖與花子。

產地 李時珍曰：蜀葵處處有之。凡郊野間恒多生焉。

形態 蜀葵為二年生草本。莖

高五尺至七尺。亭亭直立。有茸毛。葉稍呈心臟形。具有五裂至七裂。皆互生。六月開花。葉腋間。大似木槿花。或五瓣。或重瓣。色有紅紫白數種。頗美觀。頂上之花。狀如穗。但葉形卵圓。或作心臟形。邊緣有不整之鋸齒。具有葉柄。色綠。兩面密生茸毛。乾者色暗。或為黃綠色。易破折。根入藥用。尋常多採用剝去外皮之副根。色帶白。無臭味。帶黏滑性。

採取 取四時紅色單葉者陰乾。

性質 甘。微寒。滑。無毒。

成分 亞爾答亞根之成分。為植物黏液（約百分之三十五）。澱粉。亞斯拍拉根（約百分之二）。等蜀葵根所含之成分。與此相同。惟黏液質不多耳。至葉中之成分。亦與根無異。

效能 根莖為治痢氣淋病痢疾藥。

主治 根莖除客熱。利小便。散膿血惡汁。

歷代記述攷證 【唐】孫思邈千金翼論蜀葵苗曰：除客熱。利腸胃。【唐】陳藏器本草拾遺論蜀葵苗曰：煮食治丹石發熱。大人小兒熱毒下痢。【宋】大明日華諸家本草論蜀葵苗曰：搗爛塗火瘡。燒研傅金瘡。【明】李時珍本草綱目論蜀葵苗曰：作蔬食滑養。治淋潤燥。易產。

國外學說 亞爾答亞根為屬於錦葵科植物之宿根。產於歐洲中部。地中海沿岸地方及亞洲。前人譯為蜀葵。實則同名異種。日本藥局方曾採用蜀葵根。旋因該植物黏液不多。改用亞爾答亞根。第四版改正。日本藥局方記載如下：亞爾答亞根者。乃採其副根。剝去枹殼。乾而用之。色帶白。附有似質抗之皺痕。與細微之纖維。其木質及皮。均多澱粉粒。具有排列之纖維束。並含酸鹽細胞。黏液細胞。黏液堆積於細胞膜之內面。其橫斷面除新生組織帶褐色外。其餘均

一四九九



蜀葵

血及頭合搗萬杵。丸梧子大。甚者空腹白湯下十九丸。輕者五丸。日三四服。五日止。小便利爲驗。一加猪苓末二兩。(外臺祕要方)

④治通身腫滿。苦葶麻子炒四兩爲末。棗肉和丸。梧子大。每服十五丸。桑白皮湯下。日三服。此方人不甚信。試之自驗。

⑤治水腫尿澀。用甜葶麻二兩炒爲末。以大棗二十枚。水一大升。煎一升去棗入葶麻末。煎至可丸。如梧子大。每飲服六十九丸。漸加以微利爲度。(梅師方) 又方用葶麻三兩。絹包飯上蒸熟。搗萬杵。丸梧子大。不須蜜和。每服五丸。漸加至七丸。以微利爲佳。不可多服。令人不堪。若氣發服之得利。氣下即止。水氣無比。蕭駙馬水腫服此得瘥。(崔氏方) 又治男女大小頭面手足腫用苦葶麻炒研。棗肉和丸。小豆大。每服十九丸。煎麻子湯下。日三服。五七日小便多則消腫也。忌鹹酸生冷。(外科精義方)

⑥治大腹水腫。用苦葶麻二升。炒爲末。割鷄雄雞血及頭合搗丸。梧子大。每小豆湯下十九丸。日三服。

又方。葶麻二升。春酒五升。漬一夜。稍服一合。小便當利。又方。葶麻一兩。杏仁二十枚。並熬黃色。搗分十服。小便去當瘥。(肘後方)

⑦治肺溼痰喘。甜葶麻炒爲末。棗肉丸服。(摘玄方)

⑧治欬嗽。上氣不得臥。或偏體氣腫。或單面腫。鼓足腫。並主之。葶麻子三升。微火熬研。以絹袋盛。浸清酒五升中。冬七日。夏三日。初服如桃許。大日三夜。一冬月日二夜。一量其氣力。取微利下爲度。如患急者。不待日滿。亦可絞服。(崔知悌方)

⑨治月水不通。葶麻一升爲末。蜜丸。彈子大。綿裹納陰中。二寸一宿。易之。有汗出止。(千金方)

⑩治卒發顛狂。葶麻一升。搗三千杵。取白犬血和丸。麻子大。酒服二九。三服即瘥。(肘後方)

⑪治頭風疼痛。葶麻子爲末。以湯淋汁。沐頭三四度。即愈。(肘後方)

⑫治疳蝨蝕齒。葶麻。雄黃等分。爲末。臘月猪脂和成。以綿裹槐枝蘸點。(金匱方)

⑬治白禿頭瘡。用葶麻末塗之。(聖惠方)

⑭治瘰癧已潰。葶麻二合。豉一升。搗作餅子。如錢大。厚二分。安瘡孔上。艾作炷灸之。令溫熱。不可破肉。數易之而灸。但不可灸初起之瘡。恐葶麻氣入腦傷人也。(永類鈴方)

⑮治馬汗毒氣入腹。葶麻子一兩。炒研水一升。浸湯服。取下惡血。(續十全方)

用費一錢至三錢。

⑯治馬汗毒氣入腹。葶麻子一兩。炒研水一升。浸湯服。取下惡血。(續十全方)

用費一錢至三錢。

⑰治馬汗毒氣入腹。葶麻子一兩。炒研水一升。浸湯服。取下惡血。(續十全方)

⑱治馬汗毒氣入腹。葶麻子一兩。炒研水一升。浸湯服。取下惡血。(續十全方)

⑲治馬汗毒氣入腹。葶麻子一兩。炒研水一升。浸湯服。取下惡血。(續十全方)

則下泄。甜則少緩。量病人虛實用之。不可不審。本草雖云治同而甜苦之味。安得不異。王好古。甘苦二種。正如牽牛黑白二色。急緩不同。又如葫蘆甘苦二味。良毒亦異。大抵甜者下泄之性緩。雖泄肺而不傷胃。苦者下泄之性急。既肺泄而易傷胃。故以大棗輔之。然肺中水氣。臍滿急者。非此不能除。但水去則止。不可過劑。爾既不久服。何至殺人。淮南子云。大戟去水。葶麻愈腹用之不節。乃反成病。亦在用之有節。(李時珍)

【葶】即大蒜之古籍別名。典見綱目。詳「大蒜」條。

【葶菜】即小蒜之古籍別名。典見綱目。詳「小蒜」條。②即大蒜之古籍別名。典見綱目。詳「大蒜」條。

【蕤子】即蒼耳子之古籍別名。典見本草集註。詳「蒼耳子」條。

【蕤】即遠志之古籍別名。典見和漢藥考。詳「遠志」條。

【蕤食蠶】即桑白皮之古籍別名。典見和漢藥考。詳「桑白皮」條。

【蕤繞】即遠志之古籍別名。典見本經。詳「遠志」條。

【蕤繞】即遠志之古籍別名。典見本經。詳「遠志」條。

本草曰。葶藶大於薺。葉似之。三四月開細黃花。有甜苦二種。甜者可食。且柔輭。實圓。又本草綱目啓蒙曰。葶藶乃一種小草。生原野向陽之地。葉似雞兒腸而厚。色淺有毛。就地叢生。入春漸次抽莖。長四五寸。亦或近尺。面綠背紫。莖與葉皆互生。莖端生長穗。開細花。四瓣。類薺花。惟此作黃色。且花後結莢。形似米粒而扁。不作三角形。爲不同耳。初夏子熟。自然從莢中散落。苗根亦與之俱枯。其子視薺粟爲小。色茶褐。味微辛。又古今要覽稿曰。岡村尙謙云。採葶藶子。頗有遲早。隨土地而異。大約至二月杪以迄三月。最爲相宜。過遲則莢開。子落地上。不可得矣。（和漢三才圖會正字通）一種有紅花。葉似薺花。極細。莖高至尺餘。柔輭而難於特立。仲夏開細白花。六月結實。形圓扁。小而味辛。入秋莖葉俱枯。（本草臆斷）大和本草指此種卽葶藶之類。四月柔輭不老。實平而圓。郭璞注爾雅云。薺實似薺。葉細俗呼老薺。與紅毛薺同種。凡葶藶入夏便枯。此薺至秋尙存。故有老薺

之稱。一種名遏藍菜。秋始生苗。至春蕃盛。葉小而互生。莖高至二尺許。梢頭有穗。花後結莢。花白。莢正圓。大如指頭。太田證元曰。葶藶有甜苦二種。甜者多在近郊。苦者不詳。或曰來自西國。未知孰是。春秋繁露云。葶藶枯於仲夏。款冬華於嚴霜。由此考之。苦者卽款冬。華於所稱之遏藍菜。俗呼軍配。至四月必枯。形狀較甜者更大。春開白花。實圓扁。似紅毛薺。而大中藏細子如蘇子。味苦辛。然有可疑者。遏藍菜之果莢。含有臭氣。甚於葱蒜。又其腳葉似薺。莖葉而小。其卽古之惡薺歟。若謂卽係葶藶。殆未免附會也。

近人學說 張山雷曰。葶藶子苦降辛散。而性寒涼。故能破滯開結。定逆止喘。利水消腫。本經主治。皆以破泄爲義。至別錄則專通水道矣。甄權謂療肺壅上氣咳嗽止喘。促除胸中痰飲。瀕湖謂通月經。景岳謂泄氣閉。善逐水。乃氣行而水自行也。故肺中水氣。膈滿脹急者。非此不除。石頑謂其專泄肺氣。而能通膀胱之氣化。蓋惟上竅閉塞。下竅不通。因而積水泛溢。爲喘滿。爲腫脹。爲積聚。辛以散之。苦以泄之。大寒以沈降之。則下行逐水。既泄肺氣。卽通膀胱。爲其體輕而性降也。惟寒泄之品。能通利邪氣之有餘。不能補益正氣之不足。苟非實熱鬱塞。自當知所顧忌。別錄久服令人虛。本是至理。然肺家痰火壅塞。及寒飲瀰漫。喘急氣促。或爲腸脹等證。亦必賴此披堅執銳之才。以成揭穴犁庭之績。自徐氏之才。論十劑之泄。以去閉。偶以大黃葶藶二物並舉。而東垣遂謂葶藶和之。石頑且謂苦寒不減硝黃。丹溪亦有葶藶性急。病涉虛者。殺人甚捷之說。遂令俗人不辨是否。畏如蛇蝎。卽尋常肺氣喘滿。痰飲壅塞之證。亦幾有不敢輕試之意。其亦知實在性質。不過開泄二字。且體質本輕。故能上行入肺。而味又甚淡。何至猛烈。乃臨症以來。所用甚夥。開肺之效。久已共見。而傷肺之弊。尙是無聞。抑且通調水道。固有其功。而傷肺作渴。未見其罪。乃古書多與大黃並論者。則皆因

徐氏偶舉之例。而聽者不察。和而唱之。爲應聲之蟲。無識盲從。可爲浩歎。蓋亦試以二物分煮而嘗之。當可恍然於其氣味厚薄之何似矣。

配合應用 治肺癰喘急不得臥。葶藶大棗瀉肺湯主之。葶藶炒黃。搗末。蜜丸。彈子大。每用大棗二十枚。水三升。煎取二升。入葶藶一丸。更煎取一升。頓服。亦主支飲不得息。（金匱方）

治通身腫滿。苦葶藶炒四兩。爲末。棗肉和丸。梧子大。每服十五丸。桑白皮湯下。日三大效。（外臺祕要方）

治腹脹積聚。葶藶子一升。熬以酒五升。浸七日。日服三合。（千金方）
治痰飲咳嗽。含奇丸。用葶藶子一兩。紙糊炒令黑。知母。貝母各一兩。棗肉半兩。砂糖一兩。半。和丸。彈子大。每以新綿裹一丸。含之。噉津。甚者不過三丸。（醫中方）
治陽水腫。面赤煩渴喘急。小便澀。其效如神。甜葶藶一兩。半。炒研末。漢防已末二兩。以綠頭鴨

形態 葶藶爲二年生草本。莖高六七寸至尺許。葉皆互生。作卵圓或長橢圓形。無葉柄。莖與葉俱生茸毛。花在莖間。分歧爲二三枝。色黃四瓣。綴於梢頭。叢集而爲穗狀花序。果實爲莢果。作長橢圓形。頗似米粒。中藏無數小種子。色茶褐似罌粟子。



葶藶

種類 葶藶有甜苦二種。甜葶藶粒極細。色紅黃。味淡甘而性緩。泄肺不傷胃。苦葶藶粒似蠶豆。形不圓。味微苦而性峻。泄肺又傷胃。

採取 二三月間採實陰乾。
製法 雷斅曰。凡使以葶藶糯米相合。置於甑上微焙。待米熟。去米搗用。

性質 辛寒。無毒。
效能 瀉肺。行水下氣。定喘。用爲利尿及祛痰藥。

主治 癰癥積聚。結氣飲食。寒熱。破堅逐邪。通利水道。(本經)下

十三畫 葶

膀胱水。伏留熱氣。皮間邪水上出。面目浮腫。身暖中風熱。癰癥利小腹。久服令人虛。(別錄)

張仲景之發明 葶藶一味。經張仲景之實驗。認爲「主治水病。旁治肺癰結胸」。茲考徵如下：①葶藶大棗湯證曰。肺癰滿。脹一身面目浮腫。(以上一方葶藶搗丸如彈丸大)②大陷胸丸證曰。結胸。(以上一方葶藶半升)③己椒藶黃丸證曰。腸間有水氣。(以上一方葶藶一兩)歷觀上諸方。一皆是主治水病也。而二方云水病。一方特云結胸。其所謂結胸者。用大陷胸丸。則水利而疾愈。然則葶藶之治水也明矣。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論葶藶曰。療肺壅上氣欬嗽。及止喘促。除胸中痰飲。【明】李時珍本草綱目論葶藶曰。通月經。【明】李士材本草圖解論葶藶曰。葶藶子辛寒。入肺瀉氣。主肺壅上氣。欬嗽喘促。痰氣結聚。通身水氣。按本草十劑云。洩可去閉。葶藶大黃之屬。此二味皆大苦大寒。大黃洩血閉。葶藶洩氣閉。夫葶藶之峻

利。不減大黃。惟急逐水。殊動真氣。稍涉虛者。宜痛戒之。有甜苦二種。苦者專瀉。甜者少緩。然肺家水氣急滿。非此莫能療。但不敢多用耳。

酒炒或糯米拌炒。待米熟。去米用。【清】黃宮繡本草求真論葶藶曰。葶藶辛苦大寒。性急不減硝黃。大瀉肺中水氣。腹急下行。膀胱故凡積聚癥結。伏留熱氣。水腫痰壅。嗽喘經閉。便塞至極等症。無不當用。此謂昔本草十劑篇云。洩可去閉。葶藶大黃之屬。但大黃則瀉脾胃。陰分血閉。葶藶則瀉肺經陽分氣。閉。葶藶有苦有甜。甜者性緩。雖瀉而不傷。苦者性急。既瀉肺而復傷胃。故必用以大棗糯米以制水。但水去則止。不可過劑。觀金匱所云。用葶藶以治頭瘡。藥氣入腦殺人。其意大可知矣。子如黍米。微長。色黃。糯米微炒用。

國外學說 日本古方藥品考曰。衍義云。經既言味辛苦。則苦者自不復入藥也。大抵治體皆以行水走泄爲用。蓋取苦泄之義耳。惟苦葶藶自來絕跡。不論進口貨與本國產皆無之。今藥舖稱甜葶藶

者。粒極細。色紅黃。味淡甘。此齊子或薺子也。其稱苦葶藶者。粒似蠶豆。子不圓。味微苦。此救荒過蠶子也。皆非眞品。全白芥子代用之。最有效。又甜葶藶苗有大小二種。甜葶藶自冬生苗。葉似薺而小。有微毛。至夏抽莖三五寸。開小黃花。漸次結綠莢。扁如胡瓜子形。其子極細。如海金砂。又用藥須知曰。葶藶正二月著花。子宜早收。遲則脫落。形狀似薺。葉有茸毛。但苦味少。其來自中國之種。味極苦。此眞苦葶藶也。本草所謂苦葶藶者是。然其難得。日本所產。殆甜葶藶之類歟。又日用藥品考曰。有甜苦二種。方書單稱葶藶。皆苦葶藶也。藥肆所列。不論中日產。皆以薺子或薺子混充。即所謂甜葶藶也。苦葶藶味至苦。其子苦尤甚。日本竟不見此物。又手板發蒙曰。葶藶子。今稱苦葶藶者。乃過蠶子之子。非眞品也。蓋甜葶藶有來自中國者。苦葶藶則無之。又和漢三才圖會曰。葶藶俗稱狗薺。出於日本之攝州者。良播州產次之。市中所售。多非眞葶藶子。係採薺子充之。又大和

食生葱。令人面上起遊風。生葱同蜜食作下利。燒葱同蜜食。壅氣殺人。(孫思邈) ④生葱合棗食令人病。今大雉肉食。多令人病血。(張仲景) ⑤服地黃常山人忌食葱。(李時珍)

【葱花】 主治 心脾痛如錐刀刺腹脹。用一升。同吳茱萸一升。水八合。煎七合。去滓。分三服。立效。

【葱薤】 卽藜蘆之古籍別名。典見別錄詳「藜蘆」條。

【葱涕】 卽葱汁之古籍別名。典見千金食治詳「葱汁」條。

【葱食治】 詳「葱汁」條。

【葱酒】 基本 本品係用葱根白與豆豉浸成之酒。

主治 解煩熱。補虛勞。又治傷寒頭痛寒熱。解肌發汗。及冷痢腸澼。

【葱豉粥】 基本 本品卽用葱白與豆豉和米煮成之粥。

【葱葉】 性質 微溫。無毒。主治 利五臟。益目精。發黃疸。

歷代記述攷證 【宋】蘇頌圖經本草論葱葉曰。主療水病足腫。經本草論葱葉曰。主療水病足腫。

【宋】日華諸家本草論葱葉曰。煨研。傅金瘡。水入。戰。腫。鹽。研。傅。蛇。蟲。傷。及。中。射。工。溪。毒。

配合應用 ①治水病足腫。葱薤葉煮湯漬之。日三五次妙。(草) ②獨行方。

③治小便不通。葱白連葉搗爛。入蜜合外腎上卽通。(永類鈴方)

④治瘡瘍傷風水腫毒。取葱青葉和乾薑黃蘗等分煮湯浸洗。立愈。(食療本草方)

⑤治蜘蛛咬瘡。偏身生瘡。青葱葉一莖。去尖。入蚯蚓一條在內。待化成水。取點咬處。卽愈。(李時珍) ⑥治毒瘡。取萎黃葱葉煮汁熱漬之。(千金方)

參攷資料 ①煨葱治打撲損。見劉禹錫傳信方。云得於崔給事取葱新拆者。燂火煨熱。剝皮。其間有涕。便將罨損處。仍多煨。續續易

熱者。崔云。頃在澤潞與李抱眞作判官。李相方以毬杖按毬子。其軍將以杖相格。因傷李相拇指。并爪甲劈裂。遂索金創藥。裹之。強索酒飲。而面色愈青。忍痛不止。有軍吏言此方。遂用之。三易。面色卻赤。斯須云。已不痛。凡十數度。用熱葱并涕。纏裹其指。遂畢。席笑語。(蘇頌)

②按張氏經驗方云。金創折傷血出。用葱白連葉煨熱。或鍋烘炒熱。搗爛。傅之。冷卽再易。石城尉戴堯臣試馬損大指。血出淋漓。余用此方。再易而痛止。翌日洗面。不見痕跡。宋推官鮑縣尹皆得此方。每有殺傷氣未絕者。亟食用此。活人甚衆。又凡人頭目重悶。疼痛。李時珍每用葱葉插入鼻內二三寸。并耳內氣通。卽便清爽也。(李時珍)

【葱薤】 卽藜蘆之古籍別名。典見吳普本草詳「藜蘆」條。

【葱薤白】 卽葱白之處方用名。詳「葱白」條。

【葱薤】 卽葱白之處方用名。詳「葱白」條。

【葱薤】 卽葱白之處方用名。詳「葱白」條。

【葱薤】 卽葱白之處方用名。詳「葱白」條。

【葱薤】 卽葱白之處方用名。詳「葱白」條。

李時珍本草綱目論葱薤曰。療飽食房勞。血滲入大腸。便血腸澼。成痔。口乾。研末。每服二錢。溫酒下。

【蕒蕒】 卽黃精之古籍別名。典見別錄詳「黃精」條。②卽玉竹之古籍別名。典見吳普本草。詳「玉竹」條。

【葵子】 卽葵子之原名。詳「冬葵子」條。

【葵菜粥】 主治 潤燥寬腸。

【葵蓴】 卽蓴之秋老者。典見綱目詳「蓴」條。

【蓴蓴】 處方用名 甜蓴。大適。本經。丁。歷。狗。薤。(別錄) 丁樂。公。薤。帝。力。苦。草。良。薤。七。官。(和漢藥考)

外國名詞 *Draba nemorosa*, L. Var. *hebecarpa*, Ledeb. (拉丁)

基本 屬十字花科。爲薹藍之種子。產地 陳仁山藥物生產辨云。薹藍產河南西州。安徽。江蘇等處。山東兗州亦有產。

鉛粉二錢。搗丸服之。卽止。葱能通氣。粉能殺蟲也。(楊氏經驗方)

●治腹皮麻痺不仁者。多煮葱白食之。卽自愈。(危氏方)

●治小便閉脹。不治殺人。葱白三斤。剉炒。帕盛二個。更互熨小腹。氣透卽通也。(許學士本事方)

●治大小便閉。搗葱白和酢。封小腹上。仍灸七壯。(外臺祕要方)

●治大腸虛閉。勻氣散。用連鬚葱一根。薑一塊。鹽一捻。淡鼓三七粒。搗作餅。烘於臍中。紮定良久。氣卽通。不通再作。(楊氏直指方)

●治小兒虛閉。葱白三根。煎湯。調生蜜阿膠末服。仍以葱頭染蜜。插入肛門。少頃卽通。(全幼心鑑方)

●治急淋陰腫。泥葱半斤。煨熟。杵爛。貼臍上。(外臺祕要方)

●治小便淋澀。或有白者。以赤根。橫葱近根截一寸許。安臍中。以艾灸七壯。(經驗方)

●治小兒不尿。乃胎熱也。用大蔥白切四片。用乳汁半盞。同煎片時。分作四服。卽通。不飲乳者。服之卽飲。若臍四旁有青黑色及口

撮者。不可救也。(全幼心鑑方)

●治腫毒尿閉。因腫毒未潰。小便不通。用葱切入。麻油煎至黑色。去葱。取油時塗腫處。卽通。(普濟方)

●治水瘕病腫。葱根白皮。煮汁服一盞。當下水出。病已困者。取根搗爛。坐之。取氣水自下。(聖濟總錄方)

●治陰囊腫痛。葱白、乳香搗塗。卽時痛止。腫消。又方用煨葱入鹽杵如泥塗之。

●治小便溺血。葱白一握。鬱金一兩。水一升。煎二合。溫服。一日三次。(普濟方)

●治腸痔有血。葱白三斤。煮湯熏洗立效。(外臺祕要方)

●治赤白下痢。葱白一握。細切。和米煮粥。日日食之。(食醫心鏡方)

●治便秘初起。葱白炒熱。布包熨數次。乃用傳藥。卽消。又用葱根和蜜搗傳。以紙密護之外。服通氣藥。卽愈。(永類鈴方)

●治癰疽腫硬。烏金散。治癰癰腫硬。無頭不變色者。米粉四兩。葱

白一兩。同炒黑。研末。醋調。貼一伏時。又換。以消爲度。(外科精義方)

●治一切腫毒。葱汁漬之。日四五度。(千金方)

●治乳癰初起。葱汁一升。頓服卽散。(千金方)

●治疔瘡惡腫刺破。以老葱生蜜杵。貼兩時。疔出。以醋湯洗之神效。(聖濟總錄方)

●治小兒禿瘡。冷泔洗淨。以羊角葱搗泥。入蜜和塗之。神效。(楊氏方)

●治刺瘡金瘡。百治不效。葱煎濃汁漬之。甚良。(千金方)

●治金瘡瘀血在腹者。大蔥白二十枚。麻子三升。杵碎。水九升。煮升半。頓服。當吐出膿血而愈。未盡再服。(千金方)

●治血癰怪病。人偏身忽然肉出如雞。既痒且痛。不能飲食。名血癰。不速治。必潰膿血。以赤皮葱燒灰淋洗。飲鼓湯數盞。自安。(夏子益怪病方)

●解金銀毒。用葱白煮汁飲之。(外臺祕要方)

●治腦破骨折。蟹和葱白搗勻

厚封立效。(肘後方)

●治自縊垂死。葱刺耳鼻中。有血出卽甦。

用量 八分至錢半。或二枚至四枚。

施用宜忌 凡無感冒及表虛多汗者。禁用。

著名方劑 白通湯。治少陰下痢。(傷寒方) 葱白四莖。乾薑一兩。附子一枚。(生用。去皮。破八片)上三味。以水三升。煮取一升。去滓分溫再服。

參攷資料 ●葱乃釋家五草之一。生辛散。熟甘溫。外實中空。肺之菜也。肺病宜食之。肺主氣。外應皮毛。其合陽明。故所治之症。多屬太陰陽明。皆取其發散通氣之功。通氣故能解毒。及理血病。氣者血之帥也。氣通則血活矣。金瘡破損。折傷出血。疼痛不止者。王璵百一方。用葱白砂糖等分。研封之。云痛立止。更無痕癢也。葱葉亦可用。又葱管吹鹽入玉莖內。治小便不通。及轉脬危急者。極有捷效。余常用治數人得驗。(李時珍) ●葱主發散。多食昏人神。(寇宗奭) ●正月

十三薑 葱

病人以韭、大蔥、小蔥鹽淹數日食之味良佳。小蔥乃蔥之最細者也。形味俱似夏蔥。祇大小異爾。五月收採。八月下種。一如冬蔥。朝蔥。即胡蔥也。似食蔥而根莖皆細且白。李時珍曰。根似蒜。又如薤。不甚臭。又和漢三才圖會曰。蔥葉圓長無枝。故呼一文字冬蔥。漢葱均十月中下種。初生葉細如針。正月刈葉和醃醬食之。因再三刈。故俗有刈蔥之名。夏月葉硬不可食。所謂漢蔥是也。刈蔥稍長者。八月可移植。灌水培養。則肥盛。莖根長。白色。俗呼根蔥。又名根深。經霜則柔。輒堪羹食。味甚甘美。性溫。能除寒氣。所謂冬蔥是也。四月葉端圓脹。青白色。似花而不開。中有細子。如雞頭子。七月熱時取之。十月種之。成刈蔥一物。而如二種。日本下野州梅澤濃州宮代之蔥。白。其白處近尺長於葉也。上野鹿沼產亦良。近來畿內夏根蔥。肥大無異冬蔥。此蓋春時不刈而移栽於他處。灌水培養作之。最貴。人需不時之美菜。故然爾。但其味究不如經霜者。又念懷食。錫曰。蔥主發散。多食令人

神昏。蔥宜冬月不可多食。能損髮。發人虛氣。五臟悶絕。正月食生蔥。令人面上起遊風。燒蔥同蜜食。壅氣殺人。生蔥和棗食。令人病。合大雉肉食。多令人血病。服地黃常山人須忌之。生蔥不可與鯉合食。能成病。

近人學說 張山雷曰。鮮蔥白經用二三枚。重至五枚。以柔細者為佳。吾吳謂之綿蔥。其粗壯者則曰胡蔥。氣濁力薄。不如柔細之佳。去青用白。取其輕滑。或連鬚用。欲其兼通百脈。若單用青蔥莖。則以疏通肝絡之鬱塞。與蔥白專主發散不同。

配合應用 治感冒風寒。初起即用蔥白一握。淡豆豉半合。泡湯服之。取汗。(溯湖集簡方)

治傷寒頭痛如破者。連鬚蔥白半斤。生薑二兩。水煮溫服。(活人書方)

治時疾頭痛發熱者。以連根蔥白二十根。和米煮粥。入醋少許。熱食取汗即解。(濟生祕覽方)

治數種傷寒。初起一二日不能分別者。用上法取汗。

治傷寒勢復。因交接者。腹痛。卵腫。用蔥白搗爛。苦酒一盞和服之。(千金方)

治風溼身痛。生蔥搗爛。入香油數點。水煎調川芎。麝香末一錢。服取吐。(丹溪心法方)

治妊娠傷寒。赤斑變為黑斑。尿血者。以蔥白一把。水三升。煮熱服汁。食蔥令盡。取汁。(傷寒類要方)

治六月孕動。因驚難救者。蔥白一大握。水三升。煎一升。去滓頓服。(楊氏產乳方)

治胎動下血。病痛搶心。用蔥白煮濃汁飲之。未死即安。已死即出。未效再服。一方加川芎。一方用銀器同米煮粥及羹食。(案師方)

治卒中惡死。或先病。或平居寢臥。奄忽而死。皆是中惡。急取蔥心黃。刺入鼻孔中。男左女右。入七八寸。鼻出血出。即甦。又法用蔥刺入耳中五寸。以鼻中出血。出即活也。如無血出。即不可治矣。相傳此扁鵲秘方也。(崔氏纂要方)

治小兒卒死。無故者。取蔥白納入下部。及兩鼻孔中。氣通或甦。

一四九二

即活。(陳氏經驗方)

治小兒盤腸。內釣腹痛。用蔥湯洗兒腹。仍以炒蔥搗貼臍上。良久尿出痛止。(湯氏嬰孩寶鑑方)

治陰毒腹痛。厥逆。唇青。胸縮。六脈欲絕者。用葱一束。去根及青。留白二寸。烘熱。安臍上。以熨斗火熨之。葱壞則易。良久。熱氣透入。手足溫。有汗即瘳。乃服四逆湯。若熨而手足不溫。不可治。(活人書方)

治脫陽危症。凡人大吐大瀉之後。四肢厥冷。不省人事。或與女子交後。小腹腹痛。外腎搐縮。冷汗出。厥逆。須臾不救。先以蔥白炒熱熨臍。後以蔥白三七莖。搗爛。用酒煮灌之。陽氣即回。此華佗救卒病方也。(華佗方)

治卒心急痛。牙關緊閉。欲絕。以老蔥白五莖。去皮。搗膏。以匙送入咽中。灌以麻油。四兩。但得下咽。即甦。少頃。蟲積皆化。黃水而下。永不再發。累得救人。(瑞竹堂方)

治霍亂煩躁。坐臥不安。蔥白二十莖。大棗二十枚。水三升。煎二升。分服。(深師方)

治蛇蟲心痛。用蔥莖白二寸。

明諸家本草論葱白曰。主天行時疾。頭痛熱狂。霍亂轉筋。及奔豚氣。脚氣。心腹痛。目眩。止心迷悶。【元】李東垣用藥法象論葱白曰。治陽明下痢下血。【明】寧原食鑑本草論葱白曰。達表和裏止血。【明】李時珍本草綱目論葱白曰。除風溼。身痛麻痺。蟲積心痛。止大人陽脫。陰毒腹痛。小兒盤腸內釣。婦人妊娠瀉血。通乳汁。散乳癰。利耳鳴。塗瀾犬傷。制蚯蚓毒。【明】繆希雍本草經疏論葱白曰。葱味辛平。平即涼也。而性無毒。辛能發散。能解肌。能通上下陽氣。故外來拂鬱諸證。悉皆主之。傷寒寒熱。邪氣并也。中風面目腫。風熱鬱也。傷寒骨肉痛。邪始中也。喉痺不通。君相二火上乘於肺也。辛涼發散。得汗則火自散。而喉痺通也。肝開竅於目。散肝中邪熱。故云歸目。除肝邪氣。邪氣散則正氣通。血自和調。而有安胎安中利五臟之功矣。其曰益目睛。殺百藥毒者。則是辛潤利竅而兼解散通氣之力也。【明】李士材本草圖解論葱白曰。葱白辛溫入手大陰足陽明經。主事發散。以通上

下陽氣。故傷寒頭痛用之。少陰下利清穀。裏寒外熱。厥逆脈微。白通湯主之。亦有葱白。面赤者。四逆湯加葱白。成註云。腎惡燥。急食辛以潤之。葱白辛溫。以通陽氣也。陰症厥逆唇青。用葱一束。去根及青。留白二寸。烘熱安臍上。以熨斗熨之。葱壞則易熱氣透入。服四逆湯即瘥。葱同蜜食能殺人。【清】黃宮繡本草求真論葱白曰。葱葉生辛而散。熱甘而溫。外實中空。能入肺經。發汗解肌。以通上下之陽。故書號爲肺榮。其力則能明目利耳通便。及治傷寒頭痛。時疫熱狂。陰毒腹痛之謂。又氣通則血活。故書又載能止諸般血出不調。且氣通則毒解。故書又言。能治諸般惡毒。卽是以思。則和氣血之凝聚是卽寒氣之未散。寒氣之既散是血氣之既理。又安有毒氣不解而云是藥之莫治乎。陽春一回草。木甲坼。其勢誠然也。故葱號爲葱伯。又曰和事草。其意在斯。取白連鬚用。亦有年青者。但過食亦損鬚髮。及有虛氣上沖汗出不止之弊。同蜜食如何殺人。以蜜性最服。葱性最發。同葱

則脹益發。而不可解矣。不死何待。同蜜食。亦令人病。其義可以例推。因并記之。【清】王士雄隨息居飲食譜論葱白曰。辛甘平。利肺通陽。散癰腫。祛風達表。安胎止痛。通乳和營。主霍亂轉筋。奔豚脚氣。調二便。殺諸蟲。理跌撲金瘡。制魚肉諸毒。四季不凋。味辛帶甘而不臭者。良。氣虛易汗者。不可單食。又忌同蜜食。【清】賈九如辨藥指南論葱白曰。葱頭去青。止用白頭。辛溫通竅。專主發散。凡一切表邪之症。大能發汗逐邪。疏通關節。蓋風寒溼之氣。感於皮膚經絡之間。而未深入臟腑之內。宜速去之。開發毛竅。放邪氣出路。則營衛通暢。但發表之意用法不同。須知溫熱寒涼皆能通表發散。若外感風寒。邪止在表。加入麻黃羌活紫蘇白芷辛溫之劑。專主發散。若內蓄鬱熱。邪過在表。加入寒涼與辛溫並用之劑。一則清腸胃而祛積熱。一則開玄府而逐鬱邪。故有雙解通解之義。若邪在半表半裏。加入柴胡葛根苦涼之劑。以和解之。如用之無法。留邪於內。則費力不易治矣。

國外學說 日本大和本草曰。日本葱有四種。大葱。小葱。冬葱。朝葱是也。大葱五月結實。八九月栽。苗冬春可食。深種肥地。白根長大。味佳美。葱中佳品也。煮熱去臭氣。再煮可食。溫補多食能塞氣。因太甘也。二月後莖葉老枯。刈其莖。新葉常生。但不如冬春之美。小葱有二種。分取其根。謂之冬葱。性味勝於夏葱。三月後老不堪食。本草所謂凍夏夏枯是也。夏月則食刈葱。本草所謂漢葱冬枯是也。一名夏葱。又稱五月葱。六月後不堪食。味不如冬葱。凡葱煮熱去臭氣。再煮可食。不如此則惡臭難食。生葱不可食。傷神損性。本草云。葱殺一切魚肉毒。但不可與蜜同食。又服地黃人不可食。若頓死之人。以葱莖刺入鼻七八寸。血出立甦。男女左右又刺入耳中五寸。鼻血出。卽活。不出血死。小兒則以葱白入肛門。并兩鼻孔。此扁鵲秘方也。又園史。葱宜培以雞糞。又曰。葱忌稻稈。葱根不可用。蠶豆之包則立枯不生。試之果然。中國農書所不載也。葱播去後。一夜便生萌芽。成長極速。

十三畫 葱

家本草論葱子曰。溫中益精。

性質 辛溫滑無毒。

【葱汁】

主治 瀉血飲之解藥

蘆及桂毒。

歷代記述攷證 【南北朝】陶

弘景本草集註論葱汁曰。能消玉

爲水化五石。仙方所用【明】李時

珍本草綱目論葱汁曰。散瘀血止

衄止痛。治頭痛耳聾。治痔漏。解衆

藥毒。

配合應用 ●治金瘡出血不

止。取葱炙熱。按汁塗之即止。(梅

師方)

●治火灼丹毒。從頭起者。生葱

汁塗之。

●治痔瘻作痛。葱涎白蜜和塗

之。先以木絮子煎湯薰洗。其冷如

水即效。一人苦此。早間用之。午刻

即安也。唐仲舉方)

●治解鉤吻毒。面青口噤欲死。

以葱涕啖之即解。(千金方)

參攷資料 ●葱汁即葱涕。功

同葱白。古方多用葱涎丸藥。亦取

其通散上焦風氣也。勝金方取汁

入酒少許。滴鼻中。治衄血不止。云

即覺血從腦散下也。又唐瑤經驗

方。以葱汁和蜜少許服之。亦佳。云

鄰媼用此甚效。老僕試之。亦驗。二

物同食害人。向以能治此疾。恐人

脾胃不同。非甚急則不可輕試也。

(李時珍) ●三洞要錄云。葱者。菜

之伯也。能消金錫玉石。神仙消金

玉漿法。於冬至日以蠶盧盛葱汁

及根。埋庭中。次年夏至發出。盡化

爲水。以法漬金玉銀寶石各三分。

自消矣。曝乾如飴。食之可休糧。亦

曰金漿也。(唐慎微)

【葱白】

命名 葱從忽。外直中

空。有忽通之象。故名。而

藥用其葉底之白色根莖。遂稱爲

葱白也。

處方用名 葱莖白。葱頭。

古籍別名 託菜伯和事草。鹿

胎。綱目)

外國名詞 Stone-leek Wal-

shonion. (英)

基本 屬百合科。爲青葱葉底

之球根。

形態 青葱爲多年生草本。用

作蔬菜。世人所盡知也。葉與普通

之葉不同。亦無葉柄。可見但中空

成管。末端尖而直立。有並行之縱

脈。然無中筋。色青綠可愛。高一二

尺。葉底因在土中。不受日光。遂爲

白色。莖短縮。沒入土中。花自葉上

抽出。頂端生如壺之苞。初現綠色。

旋成無數之小花。三瓣雙層。帶白

色。相綴而爲一團。



白 葱

●冬葱即凍葱。蔥蔥或

名大官葱。夏衰冬盛。其莖柔細而

香。●漢葱即木葱。冬則葉枯。其莖

硬粗。故有木名。●胡葱即麥葱。亦

名絲葱。或稱紫蔥。莖葉粗硬。而根

若金線。●蒼葱即山葱。乃生於山

谷者。不入藥用。●樓葱亦冬葱之

類。即龍角葱。亦即龍爪葱。亦名羊

慈葱。莖上生根。可以移下蒔之。

採取 採無時。入藥以冬葱爲

良。

製法 雷斅曰。凡使葱。須採來

依紋擊碎。用綠梅子相對拌蒸一

伏時。去梅子。砂盆中研如膏。瓦器

曬乾用。

一四九〇

用法 水煎或生搗。

性質 辛平無毒。

效能 發表和裏。通陽活血。用

爲發汗利尿藥。齒痛殺蟲藥。又爲

興奮祛痰藥。兼作癆瘵痛風諸症

之包攝創面藥。

作用 入胃後。能刺激胃黏膜。

使胃液分泌增加。至腸能激腸黏

膜。令其吸收作用強大。同時又能

減少腸液之分泌。使大便燥結。并

可殺死小部分之赤痢菌。入血中

驟使血行增進。血壓加高。腎臟之

血管充血。而利尿作用十分增進。

令全身積蓄之過量水分。迅速向

腎臟迫出。同時氣枝管黏膜之分

泌。亦被激而增多。故可助痰之咳

出。

主治 作湯治傷寒熱中風。

面目浮腫。能出汗。又治傷寒骨肉

碎痛。喉痺不通。安胎。歸目。益目。睛

除肝中邪氣。安中利五臟。殺百藥

毒。根治傷寒頭痛。

歷代記述攷證 【唐】陳士良

食性本草論葱白曰。殺一切魚肉

毒。【唐】孟詵食療本草論葱白曰。

通關節。止衄血。利大小便。【宋】大

配造他藥。則取其味美。

配合應用 ①除煩止渴。生葡萄搗濾取汁。以瓦器熬稠。入熟蜜少許。同收點湯飲甚良。(居家必用方)

②治熱淋瀝痛。葡萄搗取自然汁。生藕搗取自然汁。生地黃搗取自然汁。白沙蜜各五合。每服一盞。石器溫服。(聖惠方)

③治胎中衝心。葡萄煎湯飲之。卽下。(聖惠方)

用費 三錢至五錢。

施用宜忌 凡有風熱實邪者禁用。

參攷資料 按魏文帝詔羣臣曰。蒲桃當夏未涉秋。尚有餘暑。醉酒宿食。掩露而食。甘而不飮酸。而不酢冷而不寒。味長汁多。除煩解渴。又釀以爲酒。甘於麴蘖。善醉而易醒。他方之果。甯有匹之者乎。(蘇頌)

④甘酸溫。多食令人卒煩。闕眼暗。(孟詵) ⑤今河東及近汴州郡皆有之。苗作藤蔓而極長大。盛者一二本。綿被山谷。開花極細而黃白色。其實有紫白二色。有圓如珠者。有長似馬乳者。有無核者。

十三畫 葡

董 蒟 葦 葫 葍 葭 葱

皆七月八月熟。取汁可釀酒。按史記云。大宛以葡萄釀酒。富人藏酒萬餘石。久者十數年不敗。張騫使西域得其種。還中國。始有蓋北果之最珍者。今太原尙作此酒寄遠也。其根莖中空相通。暮漉其根。而晨朝水浸于中矣。故俗呼其苗爲木通。以利小腸。江東出一種實細而酸者。名嬰菓子。(蘇頌)

⑥葡萄折藤壓之最易生。春月萌苞生葉。頗似栝樓葉。而有五尖。生纒延蔓引數十丈。三月開小花。成穗。黃白色。仍連着實星。編珠聚。七八月熟。有紫白二色。西人及太原平陽皆作葡萄乾。實之四方。蜀中有綠葡萄。熟時色綠。雲南所出者。大如棗。味尤長。西邊有瓊瓊葡萄。大如五味子。而無核。按物類相感志云。甘草作釘針。葡萄竝立死。以麝香入葡萄皮內。則葡萄盡作香氣。其愛憎異於他草如此。又言其藤穿過葉樹。則實味更美也。三元延壽書言葡萄架下不可飲酒。恐蟲尿傷人也。(李時珍)

【葡萄汁】卽葡萄之處方用名。詳『葡萄』條。

【葡萄乾】卽葡萄之處方用名。詳『葡萄』條。

參攷資料 葡萄釀酒。有熱疾及齒疾瘡疹人。不可飲之。(李時珍)

【葡萄乾】卽葡萄之處方用名。詳『葡萄』條。

【葡萄乾】卽葡萄之處方用名。詳『葡萄』條。

【葡萄乾】卽葡萄之處方用名。詳『葡萄』條。

【葡萄乾】卽葡萄之處方用名。詳『葡萄』條。

【葡萄根及藤葉】 性質 甘。平。瀉。無毒。

主治 養濃汁細飲。止嘔嘔及霍亂後惡心。孕婦子上衝心。飲之卽下胎安。(孟詵)

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論葡萄根及藤葉曰。治腰脚肢腿痛。煎湯淋洗之良。又飲其汁。利小便。通小腸。消腫滿。

【葡萄酒】 基本 本品係用葡萄實。或以藤汁和麴如常法釀成之酒。

性質 甘辛熱微毒。

主治 暖腰腎。壯顏色。耐寒。

參攷資料 葡萄釀酒。有熱疾及齒疾瘡疹人。不可飲之。(李時珍)

【葡萄乾】卽葡萄之處方用名。詳『葡萄』條。

【葡萄乾】卽葡萄之處方用名。詳『葡萄』條。

參攷資料 葡萄乾酒。性熱甚。痰破癖。

於燒酒。切忌多飲。(醫學大辭典)

【葡萄實】卽葡萄之處方用名。詳『葡萄』條。

【葡萄實】卽葡萄之處方用名。詳『葡萄』條。

【葡萄實】卽葡萄之處方用名。詳『葡萄』條。

【葡萄實】卽葡萄之處方用名。詳『葡萄』條。

【葡萄實】卽葡萄之處方用名。詳『葡萄』條。

【葡萄實】卽葡萄之處方用名。詳『葡萄』條。

【葡萄實】卽葡萄之處方用名。詳『葡萄』條。

【葡萄實】卽葡萄之處方用名。詳『葡萄』條。

【葡萄實】卽葡萄之處方用名。詳『葡萄』條。

葡

吳普本草。詳「鼠尾草」條。

【荷】即白薇之古籍別名。典見綱目。詳「白薇」條。

【葡萄】 命名 本品可以造酒。人酣飲之則醺然而醉故名。

處方用名 葡萄實。葡萄汁。葡萄乾。葡萄酒。

古籍別名 蒲桃。草龍珠。蒲萄。蒲陶。賜紫櫻桃。馬乳葡萄。水晶葡萄。紫葡萄。綱目。綠葡萄。

外國名詞 Vitis vinifera, L. (拉丁) Uvae (Graepae) (英) プドウ (日本)

基本 係葡萄科葡萄屬結成之子實。

產地 葡萄原產西域。現在各省各屬均有出。陳仁山藥物生座辨云。葡萄乾產自廣東石龍東莞。

形態 葡萄為蔓生之落葉植物。莖有卷鬚。以攀登於他物。其粗者周圍有數寸。葉互生。作掌狀分裂。嫩時有毛。如綿樣。至老則似平滑。初夏新枝之葉腋抽出花穗。花小。淡綠色。而作圓錐形花序。花瓣五片。在頂上略結合。不開而脫。

落。雄蕊與花瓣同數。雌蕊一。至秋結實。為漿果。多肉味美。至成熟則一朵之數凡六七十粒以上。一果之大小約六七分。呈橢圓形。或圓形。或長橢圓形。外皮綠色。生紫暈。別有紫黑白諸色。可供食藥兩用。



葡 萄

採取 秋季採之。

製法 採得搗取自然汁用。

性質 甘平。瀉無毒。

效能 利筋骨。治痿痺。用作滋養藥。

主治 筋骨痠痺。益氣。倍力。強志。令人肥健。耐饑。忍風寒。逐水利小便。久食輕身。不老延年。可作酒。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論葡萄曰。除腸間水。調中治淋。宋蘇頌嘉祐圖經本草論葡萄曰。時氣痘瘡不出。食之或研酒飲。甚效。清黃宮繡本草求真論葡萄曰。葡萄種類不一。此以貴賤名者。因其形似葡萄。瑣細不大。

故以貴賤名也。張璐論之甚詳。然此生於漠北。南方亦間有之。其幹類木。而係藤木。其子生青熟赤。乾則紫黑。氣味甘鹹而溫。能攝精氣。歸宿腎臟。與五味子功用不甚相遠。凡藤蔓之類。皆屬於筋。草木之實。皆達於臟。不獨此味為然。此物向供食品。不入湯藥。故本草不載。近時北人以之強腎。南人以之稀豆。各有攸宜。強腎方用貴賤葡萄。人參各一錢。火酒浸一宿。清晨塗手心。摩擦腰脊。能助筋力。強壯。若臥時摩擦腰脊。力助陽事。堅強。服之尤為得力。稀痘方用貴賤葡萄一錢。一錢神黃豆一歲一粒。杵為細末。一晝夜蜜水調服。并擦心窩。腰眼。能助腎祛邪。以北方物。尚助東南生氣之不足也。然寒實素弱者宜服。反是則不免有助火之害矣。

而其種植於田園中者亦甚多。至樹身之大小與果之美劣。各處不同。間有生長甚大。能蔓延至最高之頂。如意大利國與印度國常有葡萄樹。能活多年。間亦有存至三四百年者。其性涼。能微利。利小便。於其熟時。作水果食之。則能得其潤。內皮之益。又為養身適口之食物。第食時宜去其皮。因皮難消化。井可用為藥品。如身熱發熱。痢食之。即能解渴。又可作葡萄酒。葡萄酒之用。作葡萄酒乾之法。或將葡萄酒在日光內曬之。或置爐中烘之。或將其蒸燒成灰。將灰浸於水中。得鹼性之水。加熱令沸。將葡萄浸於此水內。數秒時。取出。曬十四五日。即成。或將葡萄串之莖。乘其將熟時。割至將斷。則葡萄在樹上自乾。如西班牙國等處。與地中海東邊士麥拿等處。作葡萄酒乾。均依此法。又阿富汗國作葡萄酒乾。亦依此法。運往印度國出售。有一種葡萄酒。乾大而肉多。其色紫。樣玉葡萄乾之作用。能養身體。虛弱人食之最宜。第乾者連皮。多食恐腸胃發氣。似不及新者之佳。其功用能作潤劑。

國外學說 英美學說謂葡萄產中國。西國等處。種種不一。其汁可釀酒。其樹之產處。極多。古之埃及猶太希臘等國。俱種植此樹。有人疑此樹為波斯國之原產。近則裏海南岸等處。有野生之葡萄樹。

和服。(梅師方)

②治傷筋出血。葛根搗汁飲。乾者煎服。仍熬屑傳之。(外臺祕要方)

③治腰膝疼痛。生葛根嚼之嚥汁。取效乃止。(肘後方)

④治金創中風。痙強欲死。生葛根四大兩。以水三升。煮取一升。去滓分服。口噤者灌之。若乾者搗末。調三指撮。仍以此及竹瀝多服。取效。(廣利方)

⑤治服藥過劑。苦煩。生葛汁飲之。乾者煎汁服。(肘後方)

⑥治酒醉不醒。生葛汁飲二升便愈。(千金方)

⑦治諸藥中毒。發狂煩悶。吐下欲死。葛根煮汁服。(肘後方)

⑧解中蠱毒。氣欲絕者。葛粉三合。水三盞調服。口噤者灌之。(聖惠方)

⑨治虎傷人瘡。生葛煮濃汁洗之。仍搗末。水服方。日夜五六服。(梅師方)

用蠶 一錢至二錢。

施用宜忌 凡陰虛火炎與上盛下虛者禁用。

十三畫 葛

勦

著名方劑 葛根湯。治太陽病項背強。無汗惡風者。又治太陽陽明合病。自下痢者。(傷寒論方)

根四兩。麻黃三兩。(去節)桂枝二兩。芍藥二兩。炙甘草二兩。生薑三兩。大棗十二枚。上七味咬咀。以水一斗。先煮麻黃葛根。減二升。去沫。納諸藥。煮取三升。去滓。溫服一升。覆取微似汗。不須啜粥。餘如桂枝法將息及禁忌。

參攷資料 ①生葛搗汁飲。解溫病發熱。五月中時取根。為屑。療金瘡。斷血為要藥。亦療瘧及瘡至良。(陶弘景) ②凡癰疽已見紅點。不可用葛根升麻湯。恐表虛反增癰爛也。(朱震亨) ③乾葛其氣輕浮。鼓舞胃氣上行。生津液。又解肌熱。治脾胃虛弱。泄瀉聖藥也。(李杲) ④葛根氣味俱薄。輕而上行。浮而微降。陽中陰也。其用有四。止渴一也。解酒二也。發散表邪三也。發瘡疹難出四也。(徐用誠)

本草十劑云。輕可去實。麻黃葛根之屬。蓋麻黃乃太陽經藥。兼入肺經。肺主皮毛。葛根乃陽明經藥。兼入脾經。脾主肌肉。所以二味藥皆

輕揚發散。而所入迥然不同。(李時珍) ⑤葛雖除毒。其根入土五寸。已上者。名葛根。腫者。腫也。服之令人吐。以有微毒也。本經葛穀。即是其實也。(蘇恭) ⑥今處處有之。江浙尤多。春生苗。引蔓長。一

二丈。紫色。葉頗似楸葉。而小。青色。七月着花粉。紫色。似豌豆花。不結實。根形大如手臂。紫黑色。五月五日午時採根。曬乾。以入土深者為佳。今人多作粉食。(蘇頌) ⑦遺贈

之間。冬月取生葛。搗爛。入水中。揉出粉。澄成塊。入沸湯中。良久。色如膠。其體甚韌。以蜜拌食。捺入生薑少許。尤妙。又切入茶中。待實。雖甘而無益。又將生葛根。煮熟。作果實。賣。吉州南安亦然。(寇宗奭) ⑧葛有野生。有家種。其莖延長。取治可作絛。絡其根。外紫。內白。長者七八尺。其葉有三尖。如楓葉。而長。面青

背淡。其花成穗。藥相。紅紫色。其莢如小黃豆。莢亦有毛。其子綠色。扁扁如鹽梅子。核生。嚼氣。八九月採之。本經所謂葛穀是也。唐蘇恭亦言。葛穀是實。而宋蘇頌謂葛花不結實。誤矣。其花曬乾。亦可

輕揚發散。而所入迥然不同。(李時珍) ⑤葛雖除毒。其根入土五寸。已上者。名葛根。腫者。腫也。服之令人吐。以有微毒也。本經葛穀。即是其實也。(蘇恭) ⑥今處處有之。江浙尤多。春生苗。引蔓長。一

二丈。紫色。葉頗似楸葉。而小。青色。七月着花粉。紫色。似豌豆花。不結實。根形大如手臂。紫黑色。五月五日午時採根。曬乾。以入土深者為佳。今人多作粉食。(蘇頌) ⑦遺贈

之間。冬月取生葛。搗爛。入水中。揉出粉。澄成塊。入沸湯中。良久。色如膠。其體甚韌。以蜜拌食。捺入生薑少許。尤妙。又切入茶中。待實。雖甘而無益。又將生葛根。煮熟。作果實。賣。吉州南安亦然。(寇宗奭) ⑧葛有野生。有家種。其莖延長。取治可作絛。絡其根。外紫。內白。長者七八尺。其葉有三尖。如楓葉。而長。面青

背淡。其花成穗。藥相。紅紫色。其莢如小黃豆。莢亦有毛。其子綠色。扁扁如鹽梅子。核生。嚼氣。八九月採之。本經所謂葛穀是也。唐蘇恭亦言。葛穀是實。而宋蘇頌謂葛花不結實。誤矣。其花曬乾。亦可

輕揚發散。而所入迥然不同。(李時珍) ⑤葛雖除毒。其根入土五寸。已上者。名葛根。腫者。腫也。服之令人吐。以有微毒也。本經葛穀。即是其實也。(蘇恭) ⑥今處處有之。江浙尤多。春生苗。引蔓長。一

二丈。紫色。葉頗似楸葉。而小。青色。七月着花粉。紫色。似豌豆花。不結實。根形大如手臂。紫黑色。五月五日午時採根。曬乾。以入土深者為佳。今人多作粉食。(蘇頌) ⑦遺贈

煨食。(李時珍)

【葛根炭】即煨葛根。詳「葛根」條。主治 金瘡止血。接傳之。

【葛根蔓】 主治 卒然喉痺。燒研水服。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論葛根。膝曰消癰腫。

【葛軍】即葛乳之別名。典見綱目拾遺。詳「葛乳」條。

【葛勒蔓】即葎草之古籍別名。典見蜀圖經。詳「葎草」條。

【葛穀】 性質 甘平。無毒。主治 下痢。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論葛穀曰。解酒毒。

【葛藤】 效能 消癰腫。療瘡癰。主治 治喉痺。痔。婦女吹乳。小兒口瘡。

【葛根根】即葛根之古籍別名。典見和漢藥考。詳「葛根」條。

【葛籠】即蜀羊泉之日本名。詳「蜀羊泉」條。

【葛蘖】即千歲蘖之古籍別名。典見毛詩。詳「千歲蘖」條。

【蘖】即鼠尾草之古籍別名。典見

論葛根曰。葛根根主上升。甘主散。表者多用二三錢。能理肌肉之邪。開發腠理而出汗。屬足陽明胃經藥。治傷寒發熱。身乾口燥。目痛不眠。瘧疾熱重。蓋麻黃紫蘇專能攻表。而葛根獨能解肌耳。因其性味甘涼。能鼓舞胃氣。若少用五六分。治胃虛熱渴。酒毒嘔吐。胃中鬱火。牙疼口臭。或佐健脾藥。有醒脾之力。且脾主肌肉。又主四肢。如陽氣鬱遏於脾胃之中。狀非表症。飲食如常。但肌表及四肢發熱如火。以此同升麻柴胡防風羌活升陽散火。清肌退熱。薛立齋常用神劑也。若金瘡。若中風。若痘病。以致口噤者。搗生葛根汁。同竹瀝灌下。即醒。乾者為末。酒調服亦可。痘瘡難出。以此發之甚捷。

近人學說 張山雷曰。葛根氣味薄。質輕且鬆。春生之時。發育極速。最能升發脾胃清陽之氣。傷寒論以為陽明主藥。正惟表寒過鬱於外。胃家陽氣不能散布。故以此輕揚升舉之藥。捷動清陽。捍禦外寒。斯表邪解而胃陽舒展。所以葛根湯中仍有麻黃。明為陽明表

寒之主藥。非陽明裏熱之專司。若已內傳而為陽明熱症。則仲景自有白虎諸法。非葛根湯之所宜用。其葛根黃芩黃連湯方。則主陽明協熱下利。貌視之頗似專為裏有實熱而設。故任用芩連之苦寒。則葛根似亦為清裏之品。抑知本條為太陽病桂枝證。醫反下之之變。邪熱因誤下而入裏。裏雖宜清。而利遂不止。即以脾胃清陽下陷之候。葛根祇以升舉陷下之氣。並非為清裏而設。此皆仲師選用葛根之真旨。由此推之。而知本經之主消渴者。亦以燥令太過。降氣迅速。故飲雖多而渴不解。此藥治之。非特潤燥。亦以升清。又主嘔吐者。亦以胃氣不能散布。致令食不得入。非可概治胃火上逆之嘔吐而淺者視之。僅知為清胃生津。甘潤退熱之普通藥劑。則似是實非。寧獨毫釐之差。直是千里之謬矣。宋人之用葛根柴胡。往往認作解散表熱通套之藥。可謂不辨菽麥。此其精義。惟東垣氏知之最詳。蓋李氏於脾胃氣弱一症。研究獨深。是其生平唯一無二之絕大經驗。闡明

此藥真詮。誠非朱奉議劉河間輩所可幾及。李之旨曰。葛根其氣輕浮。鼓舞胃氣上行。以生津液。又解肌熱。為治脾胃虛弱泄瀉之聖藥。

配合應用 ①葛根湯治陽明胃經溫病。邪熱頭疼發渴。煩悶鼻乾。不得眠。如渴甚。嘔甚。則加石膏麥門冬。知母。竹葉。葛根升麻。治斑痧初發。點粒未形。

②同一切補腎益精藥作丸餌。則起陰。令人有子。
③同升麻入升陽散火。升陽除溼。升陽益胃。清暑益氣。補中益氣等湯用。

④治數種傷寒。庸人不能分別。今取一藥兼治。天行時氣。初覺頭痛內熱。脈洪者。葛根四兩。水二升。入豉一升。煮取半升。服。生薑汁尤佳。(傷寒類要方)

⑤治時氣頭痛。壯熱。生葛根洗淨。搗汁一大盞。豉一合。煎六分。去滓分服。汗出即瘥。未汗再服。若心熱加梔子仁十枚。(聖惠方)

⑥治傷寒頭痛。二三日發熱者。葛根五兩。香豉一升。以童子小便八升。煎取二升。分三服。食葱粥取

汗。(梅師方)

⑦治妊娠發熱。葛根汁二升。分三服。(傷寒類要方)

⑧預防熱病。急黃賊風。葛粉二升。生地黃一升。香豉半升。為散。每食後米飲服方寸匕。日三服。有病五服。(麗安常傷寒論方)

⑨治辟瘴不染。生葛搗汁一小盞。服。去熱毒氣也。(聖惠方)

⑩治煩躁熱渴。葛粉四兩。先以水浸。粟米半升。一夜漉出。拌勻。煮熱。以糜飲和食。(食醫心鏡方)

⑪治小兒熱渴。久不止。葛根半兩。水煎服。(聖惠方)

⑫治乾嘔不息。葛根搗汁。服一升瘥。

⑬治小兒驚吐。壯熱食瀉。葛粉二兩。水二合。調勻。傾入鍋中。重湯燉熟。以糜飲和食。(食醫心鏡方)

⑭治心熱吐血不止。生葛搗汁半升。頓服立瘥。(廣利方)

⑮治衄血不止。生葛搗汁服。三服即止。(聖惠方)

⑯治熱毒下血。因食熱物發者。生葛根二斤。搗汁一升。入藕一升。

葛內精汁盡行漂出。浸兩晝夜。取出用山坑水泡之。泡後略爲曬爽。卽入硫磺概燻之。務使其色白。不計其合用與否。造起開片食之。酸且鹹。清甜之味全無。想葛根乃表散清涼之品。其味既鹹且酸。不敵已幸矣。尙望其能解表乎。此等乾葛。應在淘汰之列。正當造法。將葛去皮。用水洗淨。用大盆滿貯清水。將葛切片如骨牌形。放落清水盆。略浸五分鐘。取起曬乾。用。服時覺煎成之水。有甘涼之味。實無上之珍品也。何必多端弄巧。食其好色。貽害多人。故須從速改良爲要。兩湖安徽江浙均有到過港沽。原枝開直片煎水飲之。猶有原葛清甜之味。惟開片不好看。故無人買之。可知乾葛一味。各省均合製法。獨廣東弄巧取色。至爲不合衛生。至製葛粉之法。於春日發芽時。用長鐵採掘葛根。洗去土氣。於石盤上用木槌或鐵槌細加打爛。盛水於桶。於其中揉出粉漿。乃入布袋絞去粗屑。復用木綿袋濾淨。置一日。去上面之水。曬乾凝固。用刀切開。並削去底面黑粉。再置入桶中。

十三畫 葛

加多量之水攪之。待其沈降。乃使流出上面之水。如此數次。待其已乾。用鐵匙鏟取。攤於鋪灰及布之曬盒中。曬乾之。謂之灰葛。若欲使潔白。可再將灰葛置入桶中。注水攪和。用細袋濾過。放置一日。再換水使之沈降。如此七八次。乃去水氣。移於鋪有乾白紙之曬盒。數日曬乾。則成潔白塊。是卽葛粉。其形態爲純白色。無氣味之粉。末於顯微鏡下檢之。見有大小不等之顆粒。直徑自〇・〇〇二至〇・〇一八密米。

性質 甘。辛。平。無毒。

成分 葛根中含有多量澱粉。謂之葛粉。二呼水粉。供藥用。同天花粉。

效能 升陽。解肌。生津。止渴。用作清涼發汗解熱藥。

主治 消渴。身大熱。嘔吐諸痺。起陰氣。解諸毒。本經療傷寒中風頭痛。解肌發表。出汗。開腠理。療金瘡。止脇風痛。〔別錄〕

張仲景之發明 葛根一味。經張仲景之實驗。認爲『主治項背強。勞治喘而汗出』。茲考徵如下。

●葛根黃連黃芩湯證曰。喘而汗出。〔以上一方。葛根半斤。〕●葛根湯證曰。項背強。●葛根加半夏湯證曰。葛根加半夏湯條曰。太陽與陽明合病。此須疾醫之。言也不取焉。葛根湯證而嘔者。此方卽主之也。●桂枝加葛根湯證曰。項背強。〔以上三方。葛根皆四兩。〕爲則曰。葛根主治項背強急也。葛根湯及桂枝加葛根湯。皆足以徵焉。

歷代記述攷證 〔南北朝〕徐之才雷公藥對論葛根曰。殺野葛巴豆百藥毒。〔唐〕甄權藥性本草論葛根曰。治天行上氣。嘔逆。開胃下食。解酒毒。〔唐〕陳藏器本草拾遺論葛根曰。生者墮胎。熟食消酒毒。可斷殺不饑。作粉尤妙。〔唐〕蘇恭新修本草論葛根曰。獼狗傷。搗汁飲。并未傳之。〔宋〕大明諸家本草論葛根曰。治胸膈煩熱。發狂。止血痢。通小腸。排膿破血。傳蛇蠱。醫畢毒箭傷。〔宋〕開寶重定新本草論葛根曰。作粉止渴。利大小便。解酒去煩熱。壓丹石。傳小兒熱瘡。搗汁飲。治小兒熱瘡。〔明〕李時珍本草綱目論葛根曰。散鬱火。〔明〕李

士材本草圖解論葛根曰。葛根辛甘。陽明藥也。主頭額痛。解肌止渴。宜痲發痘。消毒解醒。〔清〕黃宮繡本草求真論葛根曰。葛根辛苦性平。輕揚升發。能入足陽明胃經。鼓其胃氣上行。生津止渴。兼入脾經。開腠發汗。解肌退熱。緣傷寒太陽病罷。傳入陽明。則頭循經而痛。胃被寒蔽。而氣不得上升。入肺則渴。胃主肌肉。氣不宜通。則熱故常用。此以治俾其氣升。生津。肌解熱退。而無復傳之勢矣。但葛根一味。必其於頭額狹之處。痛如刀劈。方謂邪傳陽明。其藥可用。若使未入陽明。又是引邪入內。不可用也。卽邪在於太陽。而略見於陽明。則以方來之陽明爲重。故必用葛根以絕其路。若使陽明症備。而止兼有太陽。則又以未罷之太陽爲重。故又不用葛根。且陽明主肌肉者也。而用乾葛。大開肌肉。則津液盡從外泄。恐胃愈燥而陰立亡。至於疹痘未發。則可用此升提。酒醉則可用此解醒。火鬱則可用此升散。但亦須審中病輒止。不可過用。以致胃氣有傷也。〔清〕賈九如辨藥指南

腹中有白子如小米。三二分。安白板上。陰二三日收之。若有人患十年淋服三枚。八九年以還服二枚。服時以水如棗許着。小盃中。爪用研之。當扁於水中仰面吞之。勿令近牙齒間。藥雖微小。下喉自覺至下焦淋所有頃藥作。大煩急不可堪者。飲乾麥飯汁則藥熱止也。若無乾麥飯。但水亦可耳。老小服三分之一。當下淋疾如膿血。連連爾去者。或如指頭。或青或黃。不拘男女皆愈。若藥不快。淋不下。以意節度。更增服之。此蟲五六月為享長。頭赤身黑。七月為斑蝥。九月為地膽。隨時變耳。(蘇頌)

【葛公藤】

(葛祖方)

古籍別名 家母藤。

形態 葉似蛇卵草。又似吉慶子。面青有蒙背白色。三葉分枝。梗似薔薇有刺。四月間結子。

配合應用 ●血症將葛公根一兩。忌鐵器。用水擊碎。以水二大盆。煎作一盤。加好酒一盤。再煎至茶杯八分。臥時服。服後蓋暖周身。以手磨胸膈腹數遍。明晚如前再服一兩。後日亦如前服一兩。連

服三日愈。(傳信方)

●葛公草一名家母藤。治腳氣腫疼。沙木腿搗汁。熬成膏。鷄翎掃患處。乾即潤之。(葛祖方)

【葛仙米】

命名 本品昔為葛洪隱居之食。採充糧米而食。故名。

古籍別名 鮮者名天仙藥。乾者名天仙米。(綱目拾遺)

產地 多生南省諸山之山陰石間。

形態 葛仙米為菜類。石耳屬之一種。狀似木耳。其色紫綠。採而乾之。粒圓如黍。揉麵釀酒。氣極芳香。煮熟為羹。優如青螺。可供菜茹與藥用。

性質 甘。寒。無毒。

主治 利臟胃。胸膈。解熱。清神。去痰火。久服延年。

【葛豆】即刀豆之古籍別名。典見和漢藥考。詳「刀豆」條。

【葛乳】

古籍別名 葛花菜。葛(綱目拾遺)

性質 甘。苦。涼。無毒。

用法 解肌熱。散風火。

主治 風熱斑疹。醒酒。解酒積。

參攷資料 一名葛花菜。名山皆有。亦產高州。粵志高州多種葛。雷州人市之為絲。給秋霜時有葛乳涌生地上。如芝如菌。赤色。味甘脆。微苦。乃葛之精華也。亦曰葛覃。李灝湖僅據太山志載其醒酒與酒積成疾。他皆未及。故特補之。(趙恕軒)

【葛花】

性質 甘。平。無毒。

主治 消酒。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論葛花曰。腸風下血。參攷資料 葛花同小豆花。乾末酒服。飲酒不醉也。(陶弘景) 【葛花菜】即葛乳之別名。典見綱目拾遺。詳「葛乳」條。

【葛根】

原名 乾葛。

命名 葛從葛諧聲也。

入藥用根。故名。

處方用名 煨葛根。粉葛根。葛根炭。

古籍別名 雞齊。本經。鹿藿。黃斤。(別錄) 鹿豆。鹿豆。忠葛。藤根。鐵葛。藤。雞齊根。(和漢藥考)

外國名詞 Pachyrhizus angulatus

基本 屬豇科為葛之根。

產地 各省均有出。江浙尤多。形態 葛為多年之自生蔓草。長達二三丈。恒纏繞木石。葉互生。為大形複葉。由三小葉而成。表面綠色。內面帶白色。與莖莖俱有褐色毛茸。初秋於葉腋生五六寸穗狀梗。開赤紫色蝶形花。作總狀花序排列。花後結扁形之莢。莢其種子嚼之有腥氣。根外面淡紫色。內部白色。根為類似薯類之紡錘狀。最大者直徑七八寸。長達一丈。販賣品有曬乾及生乾二種。前者白色帶白粉。後者呈黃褐色。



根 葛

採取 五六月間採根曬乾。

製法 凡使須揀雪白多粉者佳。去皮用。陳仁山云。廣東現所沽葛。由喃嚨庄客將葛切開。用一池約可容葛七八擔者。葛放池中。用蠔殼灰生鹽兩味開水浸之。所有

動。少頃漸定。後隔三日一作。以愈爲度。(聖濟總錄方)

用量 三分至五分。

參攷資料 ①葎草生故墟道

旁。葉似蓖麻而小且薄。蔓生有細刺。亦名葎葎。蔓古方亦時有用之。

(蘇恭)②葎草二月生苗。莖有細刺。葉對節生。一葉五尖。微似蓖麻。而有細齒。八九月開細紫花。成簇。

結子狀如黃麻子。(李時珍)③葎草莖有細刺。善勒入膚。故名勒草。詭爲葎草。又詭爲來葎。皆方音也。

別錄勒草卽此草也。(李時珍)

【葎田】卽葎葎之古籍別名。典見綱目。詳「葎葎」條。

【葎】卽桑樅之古籍別名。典見和漢藥考。詳「桑樅」條。

古鑿別名 鴻護。龍古。龍鼓。游龍。詩經「石龍」。

天蓼。(別錄)大蓼(綱目)大毛蓼。

(日本)葱涕(千金方)

外國名詞 Polygonum orientale, L. var. pilosum, Meian. (拉丁)オホケタマホタルタデ(日本)

基本 係蓼科蓼屬。爲葎草之

子實。

產地 原產東印度。凡田野水

澤間恒有生長。

形態 葎草爲澤草類之一年

生。草本高五六尺。莖與葉密生毛。葉大卵形而尖。葉柄長。秋月莖頭與枝梢開花。花帶紅色。密生成穗狀。其子扁如酸棗仁而小。色赤黑而肉白。與花莖葉俱可供藥用。

性實 鹹。微寒。無毒。

主治 消渴。去熱明目。益氣。

歷代記述攷證 【宋】寇宗奭

本草衍義論葎草曰。治瘰癧。

參攷資料 ①此蓼甚大。而花

亦繁紅。故曰葎。曰鴻護亦大也。別

錄有名未用。草部中有天蓼云。一

名石龍。生水中。陳藏器解云。天蓼

卽水葎。一名游龍。一名大蓼。據此

則二條乃一指其實。一指莖葉而

言也。(李時珍)②葎生水旁。如馬

蓼而大。五月採實。(別錄)③今生

下溼地甚多。極似馬蓼而甚長大。

詩稱隔有游龍。郭璞云。卽龍古也。

(陶弘景)④葎卽水葎也。似蓼而

葉大。赤白色。高丈餘。爾雅云。葎

古其大者曰藟。音詭。陸璣云。游龍

一名馬蓼。然馬蓼自是一種也。(

蘇頌)⑤葎草莖粗如拇指。有毛

其葉大如商陸。葉色淺紅。成穗。秋

深子成扁如酸棗仁而小。其色赤

黑而肉白。不甚辛。炆爛可食。(李



葎草

時珍)

【葎草花】 主治 散血。消積。止

毒。性實 辛。有

歷代記述攷證 【宋】蘇頌嘉

祐圖經本草論天蓼曰。根莖除惡

瘡腫。水氣。腳氣。煮濃汁漬之。

【葛上亭長】 命名 本品黑

之着玄衣赤帽。故名。

古鑿別名 豆蛭(動物辭典)

外國名詞 Epicaute got-hami, Mats. (拉丁) Y-x-x-x

基本 係節肢動物昆蟲類蝨

翅類地膽科之葛上亭長蟲。

產地 生葛上。處處有之。

形態 葛上亭長爲卵生蟲類

甲蟲屬之一種。其體黑色。額頰及

後頭赤褐。被黃短毛。眼呈腎臟形

觸角側扁。雄之觸角中央膨大。前

胸比頭狹。前方爲頸狀而細小。中

央有直列黃毛。翅鞘細長。稍呈圓

柱形。兩翅之周圍密被短黃毛。中

央各有黃毛之直列。翅面密被黑

色短毛。腹下各節有黃毛。直紋。腳

長。各被黃毛。體長六七分。葛蔓藤

汁及豆葉等爲食。捕得可供藥用。

採取 七月間在葛上採之。曝

乾用。

製法 與斑蝥同。

性質 辛。微溫。有毒。

主治 蟲毒。鬼疔。破淋結。積聚。

墮胎。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論葛上亭長曰。通血閉

微塊。鬼胎。餘功同斑蝥。

施用宜忌 惡畏同斑蝥。

參攷資料 深師療淋用亭長

之說最詳。云取葛上亭長。折斷腹

一四八三

葉下紅。(綱目拾遺)

形態 乃小木也。生山土。長不過一二尺。葉如石楠。四月生蕊。五六朵。成簇。垂如芝麻鈴樣。花作青白色。六七月結小子。如天竺子。霜後色紅。儼如天竺子而大。俗呼矮脚樟。以其樹樟葉而本短也。山人每捆之入市。售作盆玩。又名葉下紅。

主治 吐血和氣。

配合應用 ①治吐血。葉底紅。即矮脚樟。用二兩洗淨。木槌搗爛。豬肺一個。洗血淨。將葉入肺管內。河井水各三碗煮爛。至五更去葉。連湯食之。一二次愈。多食絕後患。(楊春涯經驗方)

②某撫軍得宮傳祕方。治吐血。勞傷怯症垂危。久嗽成勞。無不立愈。曾經試驗多人。用平地木葉乾者三錢。豬肺連心一具。水洗淨。血用白湯焯過。以瓦片挑開肺管。將葉包裹麻線縛好。再入水煮熟。先吃肺湯。然後去藥食肺。若嫌味淡。以清漿糖食。一肺後病勢自減。食三肺無不愈者。但所用乃平地木。與葉下紅有別。或一類相同。其

性本通耶。(陶殿元方)

③治偏墜疝氣。平地木搗汁沖酒服半碗。屢效。(李氏草祕方)

【葉底紅】即兔耳一枝箭之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「兔耳一枝箭」條。

【葉金草】即金莖之古籍別名。典見別錄。詳「金莖」條。

【葉柳草】即巴戟天之古籍別名。典見和漢藥考。詳「巴戟天」條。

【葉蘭】即蜘蛛香之日本名。詳「蜘蛛香」條。

【菖茸】即蘘荷之古籍別名。典見說文。詳「蘘荷」條。

【菖當子】即萊服子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「萊服子」條。

【菖草】古籍別名。勒草。來菴草。(別錄)葛勒蔓。(蜀圖經)

基本 係屬桑科菖草之莖。

產地 凡故墟道旁與山野間恒多生焉。

形態 菖草為山野自生之多。年生草。春月生苗。纏絡他物。莖略帶四角形。有毛刺。葉對生。作掌狀分裂。類大麻葉。有剛毛及長葉柄。

邊緣有鋸齒。花無花冠。且係單性。雌雄異株。雄者作圓錐花序排列。長五六寸。萼片及雄蕊各五。雌者數個集合。作粗梗穗狀。成實則為卵圓形或橢圓形之莢。莢呈淡綠色。有香氣及苦味。種子黑色如大麻子。



草 菖

性質 苦寒。無毒。

成分 為揮發油。單寧。樹脂質等。

效能 用作苦味健胃藥。

主治 主瘀血。止精。益盛氣。

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新修本草論菖草曰。菖草主五淋利小便。止水痢。除瘧虛熱。湯煮汁或生搗汁服。【宋】寇宗奭本草衍義論菖草曰。生汁一合服。治傷寒汗後虛熱。【宋】蘇頌圖經本草論菖草曰。療膏淋。久痢。疥癩。【明】李時珍本草綱目論菖草曰。潤三焦。消

等。

五穀。益五臟。除九蟲。辟瘴疫。傳蛇蠍傷。

配合應用 ①治小便石淋。菖草掘出根。挽斷。以盂於坎中承取汁。服一升。石當出。不出更服。(范汪方)

②治小便便淋。菖草搗生汁三升。酢二合。合和頓服。當尿下白汁。亦治尿血淋瀝。及產婦汗血。汚衣赤色。(范汪方)

③治久痢成疳。葛勒蔓末。以管吹入肛門中。不過數次如神。

④治新久瘧疾。用葛菖草一握。一名勒蔓。去兩頭。秋冬用乾者。恒山末等分。以淡漿水二大盞浸藥。星月下露一宿。五更煎一盞分二服。以吐痰愈。

⑤治遍體癩瘡。菖草一擔。以水二石煮取一石。漬之。不過三作愈。(韋伯獨行方)

⑥治烏類風瘡。菖草三秤。切洗。益母草一秤。切。以水二石五斗。煮取一石五斗。去滓。入甕中。浸浴一時方出。坐密室中。又暖湯浴一時乃出。暗臥取汗。勿令見風。明日又浴。如浴時癢痒不可忍。切勿搔。

瀉。能下黏液膿液。利小便。通經閉。治痛風。傷冷毒痛。及胃寒傷冷毒。黏液癰塞。頭胸諸症。疏濬神思。鬱憂病。脾病。黃疸。汚液。散劑用半錢至一錢。泡劑。浸劑。或作越幾斯。用至二錢。但不能迅速下瀉。而使人惡心。腹痛。故宜加桂丁香。乾薑。益智等香竇藥用之。或云此藥止漏汗有殊效。亦能止勞瘵狀消耗汗。又東京醫事新誌第六百六十號載有猪子本田兩氏之北海道靈藥託波西一文。對於落葉松茸有詳細報告。轉錄於下。託波西一名愛布里古。為一種菌。羣寄生於落葉松。形稍圓。表面帶黃白或黃褐色。凸凹不平。切斷之。內部充實。毫無空虛。其色潔白。質如陶土。試取一小片。嘗之初。無特異之味。後則漸苦。北海道人頗珍重之用之。於諸種疾病云。分析託波西。可得二種物質。一為有機酸。一為華爾斯狀化合物。有機酸為無色結晶物。冷水難溶。逢熱湯則漸漸發生泡沫而溶化。但冷則復行析出。逢酒精最易溶化。但其鹼鹽溶而重金屬鹽（即銀鹽。鉍鹽等）不溶。此性

質與阿格里克斯酸。大抵相同。華爾斯狀物質。可從上述酒精溶液製造之。服下大量託波西。則發吐瀉。試以三。〇與大服下。經半小時即行嘔吐。著者猪子博士。嘗試服〇。二。半日後即瀉下。轉便。氏又嘗試驗。託波西之刺戟消化器。究係何種成分。即用分析而得之。有機酸。〇。五。製成乳劑。使一大服之。又將華爾斯狀物質。一。〇。亦製成乳劑。使另一犬服之。甲犬經二十分鐘即發嘔吐。乙犬無異狀。因知有刺戟性者。實為有機酸也。又用此酸。就赤蛙試驗。確定其有壓抑汗腺分泌之作用。即於赤蛙注入此酸。〇。〇三。經二十分鐘後。見其皮膚漸漸減少黏滑性。次漸乾燥。在觸診上。尤易感知。此性質與阿格里克斯酸。完全相同。由以上試驗。知託波西確有制汗作用。因試用於盜汗。頗有效果。嘗有一三十五歲之梅毒患者。每夜盜汗。使服託波西。〇。〇六。盜汗如故。次日再服同量。盜汗稍減。第三日服。〇。〇八。盜汗全止。又有一三十四歲之脚氣患者。衰弱盜

汗。服託波西。〇。〇六。稍減。次日服同量。盜汗全止。患者服此。概未現出不快副作用。用量一回。〇。〇六至。〇。一。處方如下。託波西末。〇。〇六至。〇。一。白糖。〇。三。隨臥頓服。一次不效。可連服數日。但服多量。往往有下痢之虞。宜加阿片用之。

【落葉松菌】即落葉松茸之古籍別名。典見和漢藥考。詳『落葉松茸』條。

【落葉松寄生】即落葉松茸之古籍別名。典見和漢藥考。詳『落葉松茸』條。

【落鴈木】**命名** 本品藤高丈餘。雁過皆繞其中。故名。或謂鴈脚至代州鴈門而生。遂有是稱。

產地 生南海山野中。

形態 落鴈木為蔓草類之一種。蔓莖四邊如刀削。纏繞木上。葉如茶。無花實。其莖葉可供藥用。

採取 四月採之。

性質 甘平溫無毒。

主治 風痛。傷折。脚氣腫。腹滿。虛脹。以粉木皮同煮汁洗之。立效。

又婦人陰瘡浮泡。以樺木皮同煮汁洗之。

歷代記述攷證 【宋】蘇頌圖經本草論落鴈木曰。產後血氣痛。并折傷內損諸疾。煮汁服。

【落蘇】即茄子之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『茄子』條。即金絲草之古籍別名。典見救急方。詳『金絲草』條。

【菰】即白蒿之古籍別名。典見綱目。詳『白蒿』條。

【菰菜】即魚腥草之古籍別名。典見嘉祐圖經本草。詳『魚腥草』條。

【葉下紅】即葉底紅之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『葉底紅』條。

【葉子金】即金之產於蜀中者之別名。典見寶貨辨疑。詳『金』條。

【葉子香】即沈香之一種。性質效能。詳『沈香』條。

【葉子雌黃】與雄黃同類。出於山之陰者為雌黃。葉子者。文理層疊也。典見素問刺法論。詳『雌黃』條。

【葉牡丹】即甘藍之日本別名。詳『甘藍』條。

【葉底紅】**古籍別名** 平地木。（李氏草秘）矮脚樟。

不甚烈。在空氣中亦不變化。達攝氏零度之冷氣則凝結。如橄欖油至零下二十六度。則全冰結。

性質 甘平。氣腥。無毒。

成分 爲脂肪油。蛋白質。炭水化合物。纖維。灰質等。其脂肪油。爲落花生主成分。含有四十二至五十五%。由阿拉吉琪克酸(Arachidic acid, $C_{22}H_{44}O_2$)及里克諾里克酸(Lignoric acid, $C_{24}H_{48}O_2$)之不飽和性油酸類而成。

主治 滑腸下積。功同橄欖油。

【落迴】即博落迴之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「博落迴」條。

【落首】即海藻之古籍別名。典見本經。詳「海藻」條。

【落得打】 古籍別名 土木香。山雄黃。五香草。珍珠倒捲簾。(綱目拾遺)

形態 落得打爲山草類之一種。苗長二三尺。葉細碎如蒿艾。又如薄荷。有清香。秋開小花。白色。結子亦白色。成穗。纍纍如水紅花狀。其根似玉竹而無節。搗爛有黏性。可供藥用。花莖詳見各該條。

性質 甘平。無毒。

主治 跌打損傷。及金瘡出血。煎服搗傅之。

參攷資料 ①落得打行血宜酒炒。止血宜醋炒。(醫學大辭典)

②落得打治跌打損傷神效。曾記辛巳年小婢失足。從樓梯墜下。瘀血積滯。因採此搗汁沖酒服。以渣罨傷處。一飯頃。疼痛即散。內瘀亦瀉出。藥有清香者。是此藥以家種隔二三年者入藥用良。野產者入藥有草氣。胃弱者服之多吐。(趙學敏)

【落得打】即七葉草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「七葉草」條。

【落得打花】 **主治** 擦牙疼。治頭風風氣。

【落得咬】即蛇草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「蛇草」條。

【落得打莖枝】 **採取** 五月間採嫩枝用。

性質 甘平。溫。無毒。

主治 去風調氣活血。療跌打損傷。無名腫毒。去瘡瘍瘀血死肉。令人不痛。

【落葵】 **命名** 本品葉冷滑如葵故名。

古籍別名 天葵。繁露。別錄。

落葵。爾雅。藤葵。(食鑑)藤菜。御菜。燕脂菜。胡燕脂。承露。(綱目)蔓菜。(日本)

外國名詞 Basella alba, L. (拉丁) ツルムラサキ (日本)

基本 係落葵科落葵屬。爲落葵之葉。其子詳見該條。

產地 生原野園圃間。

形態 落葵爲菜之一年生草。本莖葉俱柔輭。葉互生。卵形。夏秋葉腋抽出長梗。開花。初白繼紅。內外二瓣中綴以雌雄蕊。花後結小圓實。熟則深紫色。或黑色。

性質 酸寒。滑。無毒。

主治 滑中散熱。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論落葵葉曰。利大小腸。

參攷資料 ①落葵甘微酸。冷滑。脾冷人不可食。(李時珍) ②曾爲狗留者。食之終身不痿。(陶弘景)

【落葵子】 **製法** 取子蒸過。烈日中曝乾。揆去皮取

仁細研。和白蜜調勻。作面脂用。
主治 悅澤人面。

【落葉松茸】 **古籍別名** 圓松菌。落葉松寄生。(和漢藥考)

外國名詞 Fungus laricina, (拉丁) Agaric of larch (英) Larchenschwamm, (德)

基本 係寄生於一種落葉松之菌。

產地 和漢藥考曰。落葉松茸產日本寒地。尤以北海道爲最多。土人珍之爲靈藥。

形態 落葉松茸形類木耳。作半圓狀。大小不一。上面平滑。有白色或黃褐色之輪紋。下面則有橙黃色或褐色之無數繸孔。上品者裏面白色。質堅而輕。味苦辛。次者使人作嘔。或爲粉末吸之。使人發噁。

用法 去外膜。曬乾爲粉末用。(欲爲粉末。可加糊搗爲泥乾後研末)

成分 爲苦味性樹脂。有機酸。膠質。蛋白質等。

效能 用作制汗藥。日本北海道人。用治腹痛。積痛等。
國外學說 荷蘭藥鏡曰。性收

【落蒂】即地膚子之古籍別名。典見諸家本草。詳「地膚子」條。

【落蒂毒】即地膚子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「地膚子」條。

【落花生】 命名 花謝落地。其中心有絲垂入土而結實。故名。

古籍別名 番豆。(物理小識) 落地生土露子。長生果。土豆。香芋。(食物便覽)

外國名詞 Arachis hypogaeae, L. (拉丁) Pee-nut; Earth-nut; Ground-nut. (英)

基本 係屬豆科落花生之種子。

產地 落花生原係南美熱帶地方之產物。我國閩省產者。出興化為第一。味甘而粒滿。名黃土。出臺灣者。味澁而粒細。名白土。江浙亦有出。日本以紀伊地方最多。

形態 落花生為一年生草本。莖高二三尺。其枝蔓延地上。葉為由四小葉而成之羽狀複葉。於夏秋間開黃色小蝶形花。受精後。花托伸長向地。終伸入地下一二寸。處子房或熟結成革質繭狀莢實。

故名落花生。莢實長一寸餘。作灰白色。外有紋理。中藏種子一粒。至四粒。種子為白色。被有淡紅色薄膜。



落花生

採取 每年冬初掘土挖取洗淨曝乾。

用法 炒食或煮食。

性質 甘辛。無毒。

效能 悅脾和胃。潤肺化痰。有滋養功效。

主治 潤肺。解毒。化痰。炒食甘溫。養胃。調氣。耐飢。入饌頗佳。榨油甚劣。以肥白香甘者良。有火者但宜煮食。

歷代記述攷證 【清】汪詒庵本草備要論花生曰。辛能潤肺。香能舒脾。果中佳品。【清】吳儀洛本草從新論花生曰。潤肺。補脾。和平可貴。【清】黃宮繡本草求真論花生曰。花生味甘而辛。體潤氣香。性平無毒。按書言此。香可舒脾。辛可

潤肺。菓中佳品。誠佳品也。然云炒食無害。論亦未周。蓋此氣味雖純。既不等於胡桃肉之熱。復不類烏芋菱角之涼。食則清香可愛。適口助者。最為得宜。第此體潤質滑。施於體燥堅實則可。施於體寒滯滯中氣不運。恣啖不休。保無害脾胃之弊乎。仍當從其體氣以為辨別。則得之矣。

配合應用 ①止用花生淨肉。炒極焦。研極細。擦鬚一二日後色黑如漆。(前友梁烏鬚簡便方)

②安定臣云。昔曾患四日兩頭痛。諸方莫效。有人喜食炒花生。每日食三兩。不半月而愈。

施用宜忌 性能動火生痰。不宜多食。切勿與黃熟瓜同食。食之必死。被馬踢傷者。忌服。服之瘡更增痛。

參攷資料 ①落花生本草未收。本無當醫藥之用。然能益脾潤肺。實佳果也。因世人謗之者多。故附見於此。明其有利無害也。(汪詒庵) ②花生本有滋痰之功。予家凡患咳嗽。止用花生生去殼膜。取淨肉。沖湯服。痰嗽自安。豈非化痰之功。善於瓜姜貝母。世俗以火炒食。反能生痰矣。(童鹿菴) ③生研用下痰。炒熟用開胃。醒脾。滑腸。乾嗽者宜餐。滋燥潤火。按花生乃花謝落土。感土氣而成實。故有入脾和胃之功。又能通肺氣。(藥性考) ④長生果產閩地。花落土中即生。從古無此。近始有之。味甘氣香。能健脾胃。飲食難消者宜之。或云與王瓜相反。予曾二者同食。未蒙其害。因表出之。(蓬原) ⑤花生殼焙研極細末。著人身體。沾肉。即生奇痒。(韓柳生) ⑥花生不可與黃熟瓜同吃。吃則立死。所謂黃熟瓜。即香瓜。非長而白色。可以醃吃之。黃瓜也。始知俗傳之誤。(劉啓堂經驗方) ⑦花生昔年無之。自清康熙初年。僧應元往扶桑。覓種寄回。始有此品。(趙學敏)

【落花生油】

原名 果油。基本 本品即以落花生果實。榨取白色之脂肪油。

形態 落花生油。係將落花生種子。用冷壓榨出者。為白色或淡黃色。液比重〇・九一二。氣味俱

十三畫 篇落

和漢藥考。詳「篇蓄」條。

【篇蓄】 處方用名 篇蓄草。地篇蓄。

古籍別名 扁竹。(陶弘景)扁

辨。扁草。(吳普本草)粉節草。道生

草。(綱目)薄。篇蓄。竹筴。百節

草。猪牙草。鐵綿草。(和漢藥考)殘

竹草。(藥物生產辨)

外國名詞 Knot, Grass.

(英) 基本 屬麥科庭柳類。為篇蓄

之葉莖。 產地 陳仁山藥物生產辨云。

篇蓄產廣東龍門。從化。新安。惠州

等處。各省亦有。產南順地方。俗稱

其為殘竹草。牛最喜啖之。其頭即

篇蓄也。 形態 篇蓄為草本植物。多繁

殖路旁。高達一尺。全體類麥。葉厚

互生。夏季於葉腋簇開淡紅色或

帶青色之小花。花後結黑色三角

形小實。根強潤。深入土中。吸收肥

性質 苦。平。無毒。 效能 殺蟲治蛇痛。通淋利小

便。 主治 浸淫疥癩。疽痔。殺三蟲。

(本經)療女子陰蝕。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥

性本草論篇蓄曰。煮汁飲。小兒療

蛇蟲有驗。【明】李時珍本草綱目

論篇蓄曰。治霍亂黃疸。利小便。小

兒愈病。【明】李士材本草圖解論

篇蓄曰。篇蓄苦寒。利小便。驅濕熱。

殺諸蟲。【清】黃宮繡本草求真論

篇蓄曰。篇蓄味苦。氣平。功端利水

清熱。除濕殺蟲。是以小兒愈病。女

子陰蝕。浸淫癰瘡。疽痔諸病。無不

藉此以為主治耳。以其味苦則熱

泄。味苦則蟲伏。但此止屬標治。不

能益人。勿常用也。葉細如竹。莖

一四七八

①治痔發腫痛。扁竹搗汁。服一

升。一二服。不瘥。再服。亦取汁和麪

作餅。飪。煮食。日三次。(藥性論方)

②治惡瘡癰瘡作痛。扁竹搗封

癰瘡即瘥。(肘後方)

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡無蟲積及中虛

溲便不利者禁。用。

參攷料資 ①許慎說文作扁

筑。與竹同音。節間有粉。多生道旁。

故方士呼為粉節草。道生草。(李

時珍) ②處處有之。布地而生。花

節間白。葉細。人呼為扁竹。(陶

弘景) ③春中布地生道旁。苗似

黑麥。葉細。綠如竹。赤莖如銀。節

間花出。甚細微。青黃色。根如薔根。

四五月採出。陰乾。對圖經云。二月

日乾。郭璞注。爾雅云。似小蘗。赤莖

利溼之功用。然亦惟溼阻熱結為

宜。而氣虛之病。皆非其治。若溼熱

瘡癰。浸淫。痛痒。紅腫。四溢。膿水淋

漓等證。尤其專職。

配合應用 ①治熱淋瀝痛。扁

竹煎湯類飲。(生生編方)

②治熱黃疸疾。扁竹搗汁。頓服

一升。多年者。日再服之。(藥性論

方)

③治霍亂吐利。扁竹入豉汁中。

下五味。煮羹食。(食醫心鏡方)

④治丹石衝眼。服丹石人毒發。

衝眼腫痛。扁竹根一握。洗搗汁服

之。(食療本草方)

⑤治蛇咬心痛。治小兒蛇咬心

痛。面青口中沫出。臨死者。取扁竹

十斤。剉以水一石。煎至一斗。去滓

煎如餲。隔宿勿食。空服一升。蟲即

下也。仍常煮汁作飯食。海上歌云。

心頭急痛不能當。我有仙人海上

方。篇蓄醋煎通口。嚙管教時刻便

安康。(食療本草方)

⑥治蟲食下部。蟲狀如蝸牛。食

下部作痒。取扁竹一把。水二升。煮

熱。五歲兒。空腹服三五合。(楊氏

產乳方)

【落花生】即落花生之古籍別名。

典見綱目拾遺。詳「落花生」條。

飲食諸論荳草曰。荳草甘平利腸。清熱養心。解憂釋忿。醒酒除黃。草寒宜之。與病無忌。

近人學說 張山雷曰。荳草為涼降之品。專於清熱利水。陳藏器稱其根主沙淋。下水氣。酒疸。偏身黃者。搗汁服。寇宗奭稱其主大熱。衄血。研搗和生薑汁細呷之。景岳稱其并治帶濁。丹溪謂其善於下走。皆導熱利溼之用也。其花今為恒食之品。亦稟涼降之性。日華謂治小便赤澀。身體煩熱。蘇頌謂利胸膈。安五臟。瀕湖謂消食。利溼熱。其旨皆同。又今人恒以治氣火上。升夜少安寐。其效頗著。蓋其花亦朝開夜合。能順陰陽。陽吸之宜。而又能涼降泄火。以療陰火上。浮暮不歸合之證。固其宜也。

配合應用 ①治通身水腫。鹿葱根葉曬乾為末。每服二錢。入席下壓半錢。食前米飲服。(聖惠方)

②治小便不通。荳草根煎水頻飲。(杏林摘要)

③治大便秘血。荳草根和生薑油炒酒衝服。(聖濟總錄方)

④治食丹藥毒。荳草根研汁服

之事林廣記方)

用量 錢半至三錢。

參攷資料 ①荳本作說。說。忘也。詩云。焉得說草。言樹之背。謂憂不能自遣。故欲樹此草。玩味以忘憂也。吳人謂之療愁。董子云。欲忘人之憂。則體之。丹棘一名忘憂。故也。其苗煮食。氣味如葱。而鹿食九種解毒之草。荳乃其一。故又名鹿葱。周處風土記云。懷妊婦人佩其花。則生男。故名宜男。李九華延壽書云。嫩苗為蔬。食之動風。令人昏然如醉。因名忘憂。此亦一說也。替康養生論神農經言中藥養性。故合歡獨忿。荳草忘憂。亦謂食之也。鄭樵通志乃言荳草。一名合歡者誤矣。(李時珍)

②荳草處處田野有之。俗名鹿葱。五月採花。八月採根。今人多採其嫩苗及花附作蔬食。(蘇頌)

【荳草根】 主治 沙淋。下水氣。酒疸。黃色。遍身者。搗汁服。

歷代記述攷證 【宋】寇宗奭本草衍義論荳草根曰。大熱。衄血。研汁一大盃。和生薑汁半盃。細呷

之。【明】李時珍本草綱目論荳草根曰。吹乳。癰腫。痛。搗酒服。以滓封之。

【蕒子】即側子之古籍別名。典見說文。詳【側子】條。

【高荳】 命名 本品來自高國。故名。

古籍別名 高菜。千金菜。(綱目) 嫩根名高荳。(俗名)

外國名詞 *Lactuca Sativa*, *Biach* (拉丁) *チシヤ* *チサ* (日本)

基本 係菊科高荳屬。為高荳之根葉。其子詳見該條。

產地 生原野園間。

形態 高荳為菜類之一。年或越年生。草本。高三尺餘。上部之葉無柄而尖。抱於莖上。下部之葉廣而長。折之有白色黏汁。春末梢頭分枝開花。舌狀花冠。黃色。



荳 高

性質 苦。冷。微毒。

主治 利五臟。通經脈。開胸膈。功同白荳。

歷代記述攷證 【明】寧原食鑑本草論高荳根葉曰。利氣。堅筋骨。去口氣。白齒牙。明眼目。【明】李時珍本草綱目論高荳根葉曰。通乳汁。利小便。殺蟲蛇毒。

參攷資料 ①高荳有白者紫者。其紫者入燒煉藥用。(陳藏器)

②久食昏人目。患冷人不宜食也。(李廷飛)

③按彭乘云。高荳有毒。百蟲不敢近。蛇虺觸之。則目瞑不見物。人中毒以薑汁解之。(李時珍)

④紫高荳有毒。入燒煉用。丹房鑑源曰。高荳用硫黃種結砂子。制砂又曰。紫色高荳。和土作器。火煨如銅也。(陳藏器)

【高荳子】 製法 入藥宜炒用。

主治 下乳汁。通小便。治陰腫痔漏下血。傷損作痛。

【高荳】即高荳之嫩根。詳【高荳】條。

【高荳】即高荳之古籍別名。典見綱目。詳【高荳】條。

【蕒筑】即蕒蓄之古籍別名。典見

熱沖陳酒服三次即愈。

●治痔瘡腫痛難行猪腿骨去兩頭同萬年青入砂鍋內水煮一炷香乘熱熏溫洗日三次數日愈永不發(活人書方)

●治經喉風用萬年青根頭切碎打爛絞汁灌下吐出痰涎即好偏口閉用牙刷刷挖開灌下不吐再用髮梢進喉間探之(經驗方)

參攷資料 萬年青以葉短尾圓者爲真多作草薰氣入腹令人嘔吐(趙學敏)

【萬年青子】 主治 催生。用乳香湯下一粒

【萬年青花】 主治 一切跌打損傷同山芝麻、椶櫚樹花、威靈仙汁和丸酒下

【萬年青葉】 採取 以嫩者陰乾用。

性質 苦、微甘、無毒。

主治 解毒、清胃降火、止吐血。同紅棗七枚煎飲。坐板瘡四月八日探之煎洗痔瘡取汁搽之能制汞。

【萬年青】即法製青皮之古籍別名典見易簡方詳「青皮」條。

【萬年霜】即人中白之古籍別名典見和漢藥考詳「人中白」條。

【萬年藤】即木通之古籍別名典見藥性本草詳「木通」條。

【萬兩】即砂砂根之日本名詳「砂砂根」條。

【萬年精】即茯苓之古籍別名典見和漢藥考詳「茯苓」條。

【萬真鹿】即豬脂之古籍別名典見和漢藥考詳「豬脂」條。

【萬金茸】即紫苑之古籍別名典見和漢藥考詳「紫苑」條。

【萬歷龍鳳錢】 基本 明萬曆年所鑄之錢。上鑄龍鳳之形者。

主治 婦人臨產置錢一文手掌內可催生。

【萬歲】即卷柏之古籍別名典見別錄詳「卷柏」條。

【萬歲棗】即無漏子之古籍別名典見一統志詳「無漏子」條。

【萬歲藤】即天門冬之古籍別名典見和漢藥考詳「天門冬」條。

【萬歲藤】即天門冬之古籍別名典見綱目詳「天門冬」條。

【萬壽果】即枳椇子之古籍別名。

典見藥物生產辨詳「枳椇子」條。

【萱】即芒之日本名詳「芒」條。

【萱花】即萱草之處方用名詳「萱草」條。

【萱草】 處方用名 藥草(詩經)

古籍別名 忘憂(說文)丹棘(古今注)鹿葱(嘉祐本草)護草(毛詩)鹿劍(土宿)妓女(吳普)

療慾宜男(綱目)忘草(日本)黃花菜金針菜(隨息居飲食譜)

外國名詞 Hemerocallis (L'ave, I. (拉丁) ワスレダサヒルナ(日本)

基本 係百合科萱草屬爲萱草之苗花。

產地 凡山野平原之溼地恒有生長。

形態 萱草爲溼草類之多年生草本葉如蒲葦而柔弱新舊相代四時青翠夏月抽莖高二三尺莖端著以數花花瓣六出四垂朝開暮萎花有紅黃紫等色亦有單瓣重瓣之別至秋深花乃盡結果細似三角形內有子大如梧子色黑而光澤其嫩芽及花柔輭而味

甘。皆可供食。並可充藥用。

探取 五月採花。八月採根。採得後曬乾用。

用法 恒以煮熟調味供食。入藥水煎或到末用。

性質 甘涼無毒。

效能 祛溼熱利胸膈。用作利尿藥。

主治 作殖利胸膈。安五臟。令人好歡樂。無憂輕身明目。

歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草論萱草曰。養食。治小便赤澀。身體煩熱。除酒疸。【明】李時珍本草綱目論萱草曰。消食。利溼熱。

【明】李士材本草圖解論萱草曰。萱草一名鹿葱。性涼無毒。處處有之。孕婦佩帶共花。即生男子。故又名宜男草。【清】黃宮繡本草求真論萱草曰。萱草何以萱名。以其草屬蔚茂。植之可以解憂。苗如葱葉。烹食可以適口。味甘而氣微涼。能去溼利水。除熱通淋。止渴消煩。開胸寬膈。令人心平氣和。無有憂鬱。是以命名。但氣味清淡。服之功未即臻。不似氣猛烈藥。一入口而即見其有效也。【清】王士雄隨息居

見其有效也。【清】王士雄隨息居

所織成者。非染色也。

【經考】即黃芩之古籍別名。典見別錄。詳「黃芩」條。

【經考】即黃芩之古籍別名。典見別錄。詳「黃芩」條。

【經考】即黃芩之古籍別名。典見別錄。詳「黃芩」條。

【經考】即黃芩之古籍別名。典見別錄。詳「黃芩」條。

【經考】即黃芩之古籍別名。典見別錄。詳「黃芩」條。

【經考】即黃芩之古籍別名。典見別錄。詳「黃芩」條。

【經考】即黃芩之古籍別名。典見別錄。詳「黃芩」條。

【經考】即黃芩之古籍別名。典見別錄。詳「黃芩」條。

【經考】即黃芩之古籍別名。典見別錄。詳「黃芩」條。

【經考】即黃芩之古籍別名。典見別錄。詳「黃芩」條。

【經考】即黃芩之古籍別名。典見別錄。詳「黃芩」條。

【經考】即黃芩之古籍別名。典見別錄。詳「黃芩」條。

【經考】即黃芩之古籍別名。典見別錄。詳「黃芩」條。

【經考】即黃芩之古籍別名。典見別錄。詳「黃芩」條。

【經考】即黃芩之古籍別名。典見別錄。詳「黃芩」條。

【經考】即黃芩之古籍別名。典見別錄。詳「黃芩」條。

【經考】即黃芩之古籍別名。典見別錄。詳「黃芩」條。

【經考】即黃芩之古籍別名。典見別錄。詳「黃芩」條。

【經考】即黃芩之古籍別名。典見別錄。詳「黃芩」條。

【經考】即黃芩之古籍別名。典見別錄。詳「黃芩」條。

【經考】即黃芩之古籍別名。典見別錄。詳「黃芩」條。

【經考】即黃芩之古籍別名。典見別錄。詳「黃芩」條。

【經考】即黃芩之古籍別名。典見別錄。詳「黃芩」條。

【經考】即黃芩之古籍別名。典見別錄。詳「黃芩」條。

【經考】即黃芩之古籍別名。典見別錄。詳「黃芩」條。

【經考】即黃芩之古籍別名。典見別錄。詳「黃芩」條。

【經考】即黃芩之古籍別名。典見別錄。詳「黃芩」條。

見蜀本草。詳「光明鹽」條。

【聖先子】即預知子之古籍別名。典見日華諸家本草。詳「預知子」條。

【聖知子】即預知子之古籍別名。典見日華諸家本草。詳「預知子」條。

【聖知子】即預知子之古籍別名。典見日華諸家本草。詳「預知子」條。

【聖知子】即預知子之古籍別名。典見日華諸家本草。詳「預知子」條。

【聖知子】即預知子之古籍別名。典見日華諸家本草。詳「預知子」條。

【聖知子】即預知子之古籍別名。典見日華諸家本草。詳「預知子」條。

【聖知子】即預知子之古籍別名。典見日華諸家本草。詳「預知子」條。

【聖知子】即預知子之古籍別名。典見日華諸家本草。詳「預知子」條。

【聖知子】即預知子之古籍別名。典見日華諸家本草。詳「預知子」條。

【聖知子】即預知子之古籍別名。典見日華諸家本草。詳「預知子」條。

【聖知子】即預知子之古籍別名。典見日華諸家本草。詳「預知子」條。

【聖知子】即預知子之古籍別名。典見日華諸家本草。詳「預知子」條。

【聖知子】即預知子之古籍別名。典見日華諸家本草。詳「預知子」條。

【聖知子】即預知子之古籍別名。典見日華諸家本草。詳「預知子」條。

【聖知子】即預知子之古籍別名。典見日華諸家本草。詳「預知子」條。

【聖知子】即預知子之古籍別名。典見日華諸家本草。詳「預知子」條。

【聖知子】即預知子之古籍別名。典見日華諸家本草。詳「預知子」條。

【聖知子】即預知子之古籍別名。典見日華諸家本草。詳「預知子」條。

【聖知子】即預知子之古籍別名。典見日華諸家本草。詳「預知子」條。

【聖知子】即預知子之古籍別名。典見日華諸家本草。詳「預知子」條。

【聖知子】即預知子之古籍別名。典見日華諸家本草。詳「預知子」條。

【聖知子】即預知子之古籍別名。典見日華諸家本草。詳「預知子」條。

【聖知子】即預知子之古籍別名。典見日華諸家本草。詳「預知子」條。

【聖知子】即預知子之古籍別名。典見日華諸家本草。詳「預知子」條。

【聖知子】即預知子之古籍別名。典見日華諸家本草。詳「預知子」條。

【聖知子】即預知子之古籍別名。典見日華諸家本草。詳「預知子」條。

【聖知子】即預知子之古籍別名。典見日華諸家本草。詳「預知子」條。

別錄。詳「蟬蛻」條。

【萬一藤】(綱目拾遺) 萬吉。

產地 生嶺南諸地。

基本 萬一藤爲蔓草類之一種。蔓如小豆。可供藥用。

主治 蛇咬。杵末。水和傳之。

【萬吉】即萬一藤之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「萬一藤」條。

【萬年灰】即石灰之陳者。效能詳「石灰」條。

【萬年松】即卷柏之俗名。詳「卷柏」條。

【萬年枝】即玉柏之古籍別名。典見綱目。詳「玉柏」條。

【萬年枝】即玉柏之古籍別名。典見綱目。詳「玉柏」條。

【萬年枝】即玉柏之古籍別名。典見綱目。詳「玉柏」條。

【萬年枝】即玉柏之古籍別名。典見綱目。詳「玉柏」條。

【萬年枝】即玉柏之古籍別名。典見綱目。詳「玉柏」條。

【萬年枝】即玉柏之古籍別名。典見綱目。詳「玉柏」條。

【萬年枝】即玉柏之古籍別名。典見綱目。詳「玉柏」條。

【萬年枝】即玉柏之古籍別名。典見綱目。詳「玉柏」條。

【萬年枝】即玉柏之古籍別名。典見綱目。詳「玉柏」條。

【萬年枝】即玉柏之古籍別名。典見綱目。詳「玉柏」條。

【萬年枝】即玉柏之古籍別名。典見綱目。詳「玉柏」條。

【萬年枝】即玉柏之古籍別名。典見綱目。詳「玉柏」條。

【萬年枝】即玉柏之古籍別名。典見綱目。詳「玉柏」條。

【萬年枝】即玉柏之古籍別名。典見綱目。詳「玉柏」條。

【萬年枝】即玉柏之古籍別名。典見綱目。詳「玉柏」條。

【萬年枝】即玉柏之古籍別名。典見綱目。詳「玉柏」條。

【萬年枝】即玉柏之古籍別名。典見綱目。詳「玉柏」條。

【萬年枝】即玉柏之古籍別名。典見綱目。詳「玉柏」條。

【萬年枝】即玉柏之古籍別名。典見綱目。詳「玉柏」條。

【萬年枝】即玉柏之古籍別名。典見綱目。詳「玉柏」條。

多栽種。其根可供藥用。子花葉詳見各該條。

【萬一藤】(綱目拾遺) 萬吉。

產地 生嶺南諸地。

基本 萬一藤爲蔓草類之一種。蔓如小豆。可供藥用。

主治 蛇咬。杵末。水和傳之。

【萬吉】即萬一藤之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「萬一藤」條。

【萬年灰】即石灰之陳者。效能詳「石灰」條。

【萬年松】即卷柏之俗名。詳「卷柏」條。

【萬年枝】即玉柏之古籍別名。典見綱目。詳「玉柏」條。

【萬年枝】即玉柏之古籍別名。典見綱目。詳「玉柏」條。

【萬年枝】即玉柏之古籍別名。典見綱目。詳「玉柏」條。

【萬年枝】即玉柏之古籍別名。典見綱目。詳「玉柏」條。

【萬年枝】即玉柏之古籍別名。典見綱目。詳「玉柏」條。

【萬年枝】即玉柏之古籍別名。典見綱目。詳「玉柏」條。

【萬年枝】即玉柏之古籍別名。典見綱目。詳「玉柏」條。

【萬年枝】即玉柏之古籍別名。典見綱目。詳「玉柏」條。

【萬年枝】即玉柏之古籍別名。典見綱目。詳「玉柏」條。

【萬年枝】即玉柏之古籍別名。典見綱目。詳「玉柏」條。

【萬年枝】即玉柏之古籍別名。典見綱目。詳「玉柏」條。

【萬年枝】即玉柏之古籍別名。典見綱目。詳「玉柏」條。

【萬年枝】即玉柏之古籍別名。典見綱目。詳「玉柏」條。

【萬年枝】即玉柏之古籍別名。典見綱目。詳「玉柏」條。

【萬年枝】即玉柏之古籍別名。典見綱目。詳「玉柏」條。

【萬年枝】即玉柏之古籍別名。典見綱目。詳「玉柏」條。

【萬年枝】即玉柏之古籍別名。典見綱目。詳「玉柏」條。

【萬年枝】即玉柏之古籍別名。典見綱目。詳「玉柏」條。

【萬年枝】即玉柏之古籍別名。典見綱目。詳「玉柏」條。

【萬年枝】即玉柏之古籍別名。典見綱目。詳「玉柏」條。



青 年 萬

性質 甘。苦。寒。無毒。

主治 咽喉急閉。搗汁和醋灌之。吐痰而愈。並療火丹收溼熱洗脚氣。湯火傷。天泡瘡。白蛇纏解中滿。蟲脹。黃疸。心疼。哮喘。咳嗽。打傷。腸噎。

配合應用 ①白火丹。萬年青。搗汁服。祝氏效方。

②靈藥丹。治頭風如神。用萬年青根。削尖。蘸砂。塞鼻孔內。左塞右。右塞左。兩邊痛者。齊塞。神效。取清水鼻涕下。須一週時妙。(嵩崖雜記方)

③治老幼脫肛。萬年青連根煎湯洗。用五椀子末敷上立效。(活人書方)

④蛇毒。用萬年青磨塗。渣卷皆妙。(德勝堂方)

⑤治陰囊大。用萬年青根搗汁。

⑥治陰囊大。用萬年青根搗汁。

⑦治陰囊大。用萬年青根搗汁。

⑧治陰囊大。用萬年青根搗汁。

⑨治陰囊大。用萬年青根搗汁。

⑩治陰囊大。用萬年青根搗汁。

⑪治陰囊大。用萬年青根搗汁。

⑫治陰囊大。用萬年青根搗汁。

⑬治陰囊大。用萬年青根搗汁。

⑭治陰囊大。用萬年青根搗汁。

⑮治陰囊大。用萬年青根搗汁。

⑯治陰囊大。用萬年青根搗汁。

⑰治陰囊大。用萬年青根搗汁。

⑱治陰囊大。用萬年青根搗汁。

⑲治陰囊大。用萬年青根搗汁。

助穀神者。碎米濃作汁飲如乳酪。類以豆許與兒飲之。二七日可與哺。慎不得與雜業也。(肘後方)

①治初生無皮色赤但有紅筋。乃受胎未足也。用早白米粉撲之。肌膚自生。(聖濟總錄方)

②治小兒甜瘡生於面耳。令母頻嚼白米。臥時塗之。不過三五次即愈。

③荒年辟穀。粳米一升。酒三升。漬之。曝乾。又漬酒浸取出。稍食之。可辟三十日。足一斗三升。辟穀一年。(肘後方)

④治胎動腹痛。急下黃汁。用粳米五升。黃芪六兩。水七升。煎二升。分四服。(聖惠方)

⑤治赤根丁腫。白粉熬黑和蜜傅之。(千金方)

參攷資料 ⑥粳米赤者粒大。而香。水漬之有味。益人。大抵新熟者動氣。經年者亦發病。惟江南人多收火稻貯倉。燒去毛。至春舂米食之。即不發病。宜入溫中益氣補下元也。(孟詵) ⑦粳有早中晚三收。以晚白米爲第一。各處所產。種類甚多。氣味不能無少異。而亦不

珍

【粳米禾稈】 主治 解砒毒。燒灰。新汲水淋汁。濾清。冷服一椀。毒當下出。

【粳米泔水】 原名 浙二泔。泔洗米也。泔。甘汁也。蓋謂泔水宜取第二次者。清而可用。故名。古籍別名 米泔。(綱目)

性質 甘寒。無毒。 主治 清熱。止煩渴。利小便。涼血。

參攷資料 風熱赤眼。以浙二泔。睡時冷調洗肝散。菊花散之類服之。(戴原禮)

【粳米粉】 即粳米之處方用名。詳「粳米」條。

【粳米殼奴】 基本 本品即穀穗煤黑者。 主治 走馬喉痺。燒研。酒服方寸匕。立效。

【粳米湯】 原名 炒米湯。 基本 本品係用炒粳米。煮成之湯。 主治 益胃除溼。不去火毒。令人作渴。

【粳米粥】 性質 甘溫。平。無毒。 主治 利小便。止煩渴。養腸胃。

參攷資料 按羅天益寶鑑云。粳粟米粥。氣薄味淡。陽中之陰也。所以淡滲下行。能利小便。導滯通云。一人病淋。素不服藥。予令專喫粟米粥。絕去他味。旬餘減。川餘痊。此五穀治病之理也。又張耒粥記云。每日起食粥一大碗。空腹胃虛。穀氣便作。所補不細。又極柔膩。與腸胃相得。最爲飲食之妙訣。齊和尚說山中僧。每將旦一粥。甚繫利害。如不食。則終日覺臍腸燥渴。蓋粥能暢胃氣。生津液也。大抵養生求安樂。亦無深遠難知之事。不過輕食之間爾。故作此勸人。每日食粥。勿大笑也。又蘇軾帖云。夜饑甚。吳子野勸食白粥。云能推陳致新。利膈益胃。粥既快美。粥後一覺妙不可言也。此皆著粥之有益如此。(李時珍)

【粳稻米】 即粳米之處方用名。詳「粳米」條。

【絹】 基本 本品乃素帛也。生曰絹。熟曰練。用蠶之黃絲。

米曰。合芡實作粥食。益精強志。聽耳明目。【明】李時珍本草綱目論。粳米曰。能通血脈和五臟。好顏色。【明】繆希雍本草經疏論粳米曰。粳米即人所常食米。感天地沖和之氣。同造化生育之功。爲五穀之長。人相賴以爲命者也。經曰。安穀則昌。絕穀則亡。仲景曰。人受氣於水穀。以養神。水穀盡而神去。自上古聖人樹藝至今。不可一日無此也。稟土德之正。其味甘而淡。其性平而無毒。雖專主脾胃。而五臟生氣血脈精髓。因之以充溢。周身筋骨肌肉皮膚。因之而強健。本經益氣止煩止洩。特其餘事耳。【明】李士材本草圖解論粳米曰。粳米味甘苦平無毒。主益氣止煩止泄。溫中和胃氣。長肌肉穀芽。即大米穀水浸生芽者。皆脾進食寬中消穀。【清】黃宮繡本草求真論粳米曰。粳米即人常食之米也。稟天地中和之氣。味甘性平。人非此物不能養生。故性溫主脾胃。而兼及他臟。凡五臟血脈。靡不因此而灌溉。五臟積液。靡不因此而充溢。他如周身筋骨肌肉皮膚。靡不因此而強健。故凡白虎桃花竹葉石膏等湯。靡不因此以爲固中清熱。然米既有早晚之不同。復有地土出處之各異。早米受氣既早。性雖溫而質多黏。食之反能戀膈。晚米受氣既遲。其性稍涼。服之不無稍清。而白晚性滯。尤覺滋害。出於高地。則米硬而質潔。出於窪處。則米潤而性陰。然總於中是固。諸方用此佐助。蓋惡藥性苦寒。得此甘緩同入。俾胃氣不致頓損。而熱與煩亦得與之俱安矣。此雖常食之物。不甚有益。而一參以藥投。則其力甚巨。未可等爲泛常而忽視也。【清】王士雄隨息居飲食譜論粳米曰。秬米（亦作粳）甘平宜煮粥食。功與秠同。秠亦可粥而秬較稠。秠亦可飯而秠耐飢。粥飯爲世間第一補人之物。強食亦能致病。我生易云。節飲食。論語云。食無求飽。厚生者能釋其義。不必別求他法也。惟患停飲者不宜啜粥。粥脹實。雖米湯不可入口。以其性補。能閉塞隧絡也。故貧人患虛證。以濃米飲代參湯。每收奇績。若人衆之家。大鍋煮粥時。俟粥鍋滾起沫團。醱滑如膏。

者。名曰米油。亦曰粥油。撇取淡服。或加煉過食鹽少許。服亦可大能補液增精。有裨羸老。至病人產婦。粥養最宜。以其較和爲柔。而較梗不黏也。亦可磨粉作糕。而嘉興人不善藏穀。收米入甕。落甕變紅。名曰冬春米。精華盡去。糟粕徒存。暴殄天物。莫此爲甚。炒米雖香。性燥助火。非中寒便瀉者。忌之。又有一種香秬米。自然有香。亦名香珠米。煮粥時稍加入之。香美異常。尤能醒胃。凡煮粥宜用井泉水。則味更佳也。

近人學說 丁福保曰。米粒之中。蛋白質七。八。脂肪二。一。灰分一。二。水分一。三。二。除去水分之時。則其成分。蛋白質爲第一。脂肪次之。灰分又次之。蛋白質與雞卵之白相同。爲第一滋養人體之物。其他二成分。亦不可缺少。多數食物中。米爲最要。吾人以米爲常食。由於習慣。而適於人體。近時肉食盛行以來。有謂食獸肉鳥肉較米食爲優者。然但食肉類而廢食米。斷不能保其健康。以米中之蛋白質與雞卵及肉類中所含者。

爲同一之成分。縱令不食肉類。雞卵亦有同一之效能。米中之脂肪。實有強壯身體使之肥滿之效。而其消化大抵於食後一時間已竟其功。

配合應用 ①治霍亂吐瀉。煩渴欲絕。用粳米二合。研粉入水二盞。研汁和淡竹瀝一合。頓服。（普濟方）

②治赤痢熱燥。粳米半升。水研取汁。入油瓷瓶中。蠟紙封口。沉井底一夜。平旦服之。吳內翰家乳母病此。服之有效。（普濟方）

③治自汗不止。粳米粉絹包。頻頻撲之。

④治五種尸病。粳米二升。水六升。煮一沸。服日三。（肘後方）

⑤治卒心氣痛。粳米一升。水六升。煮六七沸。服（肘後方）

⑥治米癢暗。有人入好啞米。久則成瘡。不得米則吐出清水。得米即止。米不消化。久亦斃人。用白米五合。雞屎一升。同炒焦爲末。水一升。頓服。少時吐出。微如研米汁。或白沫。淡水乃愈也。（千金方）

⑦治小兒初生三日。應開腸胃。

【Boric Acid】即蓬砂製煉者之化學名稱。功能勝尋常蓬砂。見『蓬砂』條。

【碎米柴】基本 碎米柴爲雜用。草類之一種。可供藥用。

主治 癰腫發背。入傳藥用。

【碎骨子】即淡竹根之古籍別名。典見綱目。詳『淡竹葉』條。

【禁生】即石斛之古籍別名。典見本經。詳『石斛』條。

【禁宮花】即王不留行之古籍別名。典見諸家本草。詳『王不留行』條。

【稗】命名 稗乃卑賤之義。本品爲禾之卑賤者。故名。

古籍別名 水稗。旱稗。紫黑色者名烏木。〔綱目〕

外國名詞 Panicum Crus

Galli. L. (拉丁) ヌハ イヌ

日本 (日本)

基本 係禾本科稗屬。

產地 田野處處有之。

形態 稗爲穀類之一年生草本。水生者莖扁。上青下紫。旱生者則綠色。高一二尺。或三四尺。葉細

長而尖。有平行脈。葉柄爲鞘狀而抱莖。初秋小花。圓錐花序。殼上有芒。與稃相似而較小。色紫黑。或淡綠色。子茶褐色。其米可供食與藥用。

性質 辛。甘。苦。微寒。無毒。

主治 瘡食。益氣宣脾。

主治 金瘡及傷損。

【稗苗根】血出不已。搗傳或研末。參之。即止。甚驗。

【稠梨】即櫻類之古籍別名。典見綱目。拾遺。詳『櫻類』條。

【稠膏覃】係香覃之一種。生於山間。絕頂樹杪。初如露珠。圓瑩。淺黃白色。味尤甘美。老則味減。蒸時參和衆味。加以酒。勿攪動。動則涎腥。不可食。性質效能與香覃同。參見『香覃』條。

【雅蓴】即蓴之嫩莖。典見綱目。詳『蓴』條。

【稔】即大棗之古籍別名。典見和漢藥考。詳『大棗』條。

【窟荊樹】即無漏子之樹名。典見西陽雜俎。詳『無漏子』條。

【窠屑】即桑寄生之古籍別名。典見和漢藥考。詳『桑寄生』條。

【窠童】即桑寄生之古籍別名。典見和漢藥考。詳『桑寄生』條。

【唱】即魚狗之古籍別名。典見爾雅。詳『魚狗』條。

【寬冬】即麥門冬之處方用名。詳『麥門冬』條。

【筵門冬】即天門冬之古籍別名。典見嘉祐本草。詳『天門冬』條。

【梁】即粟米之原名。詳『粟米』條。

【梁米粥】性質 甘溫。平。無毒。主治 利小便。止煩渴。養腸胃。

【粳米】命名 粳者硬也。本品性剛少黏。故名。

處方用名 粳稻米。粳米粉。古籍別名 秬米。粳米。〔綱目〕

外國名詞 Oryza sativa, (拉丁) イネ ウルチ コメ

基本 係禾本科稻屬。爲粳稻之子實。

產地 各省皆有出。原產於東印度。

形態 粳稻爲栽於水田中之一年生草本。莖高三四尺。作圓柱狀。直立而中空。有節。葉狹長。有尖

端。葉脈平行。葉柄包圍於莖外如鞘狀。互生。秋月莖梢抽穗而著小花。無萼及花冠。有內外兩殼。雄蕊六枚。雌蕊一枚。柱頭呈羽狀。果實爲穎果。有早中晚三收。其米供食。又充藥用。



米 粳

採取 八九月刈收之。
製法 收得曬乾。磨去殼。杵去糠。

性質 甘。苦。平。無毒。
效能 補肺脾。益腸胃。專作滋養強壯藥。

主治 益氣。止煩。止渴。止洩。

歷代記述攷證 【唐】韓保昇蜀本草論粳米曰。溫中和胃。氣長肌肉。【唐】孟詵食療本草論粳米曰。煮汁。主心痛。止渴。斷熱。毒下痢。

【唐】孫思邈千金翼論粳米曰。常食乾粳飯。令人不噎。【宋】日華諸家本草論粳米曰。補中壯筋骨。益腸胃。【元】王好古湯液本草論粳

米曰。補中壯筋骨。益腸胃。【元】王好古湯液本草論粳

今隴西四陽黑水當歸多肉少枝。

氣香。名馬尾當歸。西川北部當歸多根枝而細。歷陽所出者色白而氣味薄。不相似。呼爲草當歸。缺少時亦用之。(陶弘景) ④今出當州宕州翼州松州以宕州者最勝。有二種。一種似大葉芎藭者名馬尾當歸。今人多用。一種似細葉芎藭者名蠶頭當歸。即陶稱歷陽者。不堪用。莖葉並卑下於芎藭。(蘇恭)

⑤今川蜀陝西諸郡及江寧府滁州皆有之。以蜀中者爲勝。春生苗綠葉有三瓣。七八月開花似薔薇。淺紫色。根黑黃色。以肉厚而不枯者爲勝。(蘇頌) ⑥今陝蜀秦州汝州諸處人多栽蒔爲貨。以秦歸頭圓尾多色淡氣香肥潤者名馬尾歸。最勝他處。頭大尾粗。色白堅枯者爲饒頭歸。止宜入發散藥。爾韓恣言川產者力剛而善攻。秦產者力柔而善補是矣。(李時珍)

【當歸酒】 基本 本品係用當歸煎汁或浸酒。

主治 和血脈堅筋骨止諸痛調經水。

【當歸藥】 即當歸之處方用名。詳

十三畫 當

痰 睡 睪 矮 碇 碗 硃 礪

『當歸』條。

【當藥】 即酸模之古籍別名。典見綱目。詳『酸模』條。

【當藥】 即苦草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『苦草』條。

【痰切豆】 即鹿藿之日本名。詳『鹿藿』條。

【痰宮劈歷】 即半夏之古籍別名。典見和漢藥考。詳『半夏』條。

【睡菜】 命名 本品土人採根爲鹽菹。食之好睡。故名。

古籍別名 眠菜。綽菜。醉草。嬾婦藏。(綱目) 水柏。(日本)

外國名詞 *Montanthes trifoliata* L. (拉丁) ミヅガシハ ミヅハンゲ (日本)

基本 係龍膽科睡菜屬。爲睡菜之根。

產地 生池沼間。

形態 睡菜爲水菜類之一種。葉類慈姑。由三小葉成。小葉有鈍鋸齒。夏月自根間抽莖。長尺餘。梢上著二寸許之疎穗。而開花。花冠呈白色。內面密生白色。其根可供

藥用。

性質 甘。微苦。寒。無毒。

主治 心膈邪熱。不得眠。

命名 本品花形似蓮。晝開夜閉。而清香氣爽。令人思睡。故名。

古籍別名 眠菜。睡蓮菜。瑞蓮花。(綱目拾遺)

外國名詞 *Nymphaea tetragona*, Georg. var. *angustata*, Casp.

產地 粵中之池沼間多有之。

形態 睡蓮爲水草類之多年生草本。幹如銀股。心似雞頭。以水之深淺爲長短。一根似藕。條葉布數重。如荷而大。類似芙蓉。葉脚有深缺刻。秋月開重瓣之五色花。或有外紫內白。其花晝放夜合。自未刻以後。即縮入水底。至晝復出。採得可供藥用。



睡蓮

採取 須於雞鳴時採之。

主治 消暑解醒。佩之好眠。

【睡蓮菜】 即睡蓮之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『睡蓮』條。

【睡蟲】 即砂梭子之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『砂梭子』條。

【睪鳩】 即鴉之古籍別名。典見周詩。詳『鴉』條。

【矮茶】 即紫金牛之古籍別名。典見植物名彙。詳『紫金牛』條。

【矮脚樟】 ①即烏藥之古籍別名。典見和漢藥考。詳『烏藥』條。②即葉底紅之別名。典見綱目拾遺。詳『葉底紅』條。

【矮脚鳳尾】 即翠羽草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『翠羽草』條。

【矮樟】 即烏藥之古籍別名。典見和漢藥考。詳『烏藥』條。

【碇草】 即淫羊藿之古籍別名。典見和漢藥考。詳『淫羊藿』條。

【碗兒胭脂】 即油胭脂之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『油胭脂』條。

【碇礪石】 即礪石之古籍別名。典見綱目。詳『礪石』條。

【礪砂】 即蓬砂之處方用名。詳『蓬砂』條。

【礪酸】 *Acidum Boricum*

●治產後腹痛如絞。當歸末五錢。白蜜一合。水一盞。煎一盞。分爲二服。未效再服。(婦人良方)

●治產後自汗。壯熱氣短。腰脚痛不可轉。當歸三錢。黃芪白芍藥酒炒各二錢。生薑五片。水一盞。半煎七分溫服。(和劑局方)

●治產後中風。不省人事。口吐涎沫。手足痙攣。當歸。荆芥穗等分爲末。每服二錢。水一盞。酒少許。童尿少許。煎七分溫服之下咽。即有生意。神效。(聖惠方)

●治小兒胎寒好啼。晝夜不止。因此成癰。當歸末一小豆大。以乳汁灌之。日夜三四度。(肘後方)

●治小兒脾瀝。不早治。成脾風。或腫赤。或出水。用當歸末傅之一方入麝香少許。一方用胡粉等分試之最驗。若愈後因尿入復作。再傅即愈。(聖惠方)

●治湯火傷瘡。嫩赤潰爛。用此生肌拔熱止痛。當歸黃蠟各一兩。麻油四兩。以油煎當歸焦黃。去滓納蠟攪成膏。出火毒攤貼之。(和劑局方)

●治白黃色枯。舌縮恍惚。若語

亂者死。當歸。白朮二兩。水煎。入生薑汁。蜜和服。(三十六黃方)

●用薑 錢半至三錢

●施用宜忌 凡脾虛溼鬱。及大便滑瀉者。禁用。惡蘭茹。溼麵。畏菖蒲。海藻。牡蒙。生薑。制雄黃。

●著名方劑 ●當歸生薑羊肉湯。治產後腹中疔痛。並腹中寒疝。虛勞不足。(金匱方) ●當歸三兩。生薑五兩。羊肉一斤。上以水八升。煮取三升。溫服。七合。日三服。 ●當歸補血湯。治男婦血虛。似白虎症。肌熱面赤。煩渴引飲。脈來洪大。而虛重。按則微。此方主之。(寶鑑方) ●當歸二錢。黃耆一兩。上二味。水煎服。

●當歸六黃湯。治陰虛有火。盜汗發熱。古方。當歸。生地。熟地。黃芩。黃連。黃柏。各等分。黃耆加倍。上藥以水煎服。 ●當歸龍薈丸。治肝經實火。大便秘結。小便澀滯。或胸脇作痛。陰囊腫脹。凡屬肝經實火。皆宜服之。宣明方) ●當歸。龍腦。草。黃連。黃芩。山梔。各一兩。大黃。蘆薈。青黛。各五錢。木香。二錢。半。麝香五分。(另研)上爲末。炒。神麴糊丸。每服二十九丸。姜湯下。 ●當歸四逆湯。治

手足厥冷。脈細欲絕。脈浮革。因而腸鳴者。(傷寒方) ●當歸。桂枝。白芍。各三兩。細辛二兩。大棗。念五枚。甘草。通草。各二兩。上七味。以水八升。煮取三升。去滓。溫服。一升。日三服。 ●當歸芍藥散。治婦人懷妊。腹中疔痛。(金匱方) ●當歸三兩。芍藥一斤。茯苓。四兩。白朮。四兩。澤瀉。半斤。芎藭。三兩。右杵爲散。取方寸匕。酒和。日三服。 ●當歸貝母苦參丸。治妊娠小便難。飲食如故者。(金匱方) ●常歸。貝母。苦參。各等分。上三味末之。蜜丸。如小豆大。飲服三丸。加至十丸。 ●當歸散。婦人妊娠宜常服。(金匱方) ●當歸。黃芩。芍藥。芎藭。各一斤。白朮。半斤。上五味。杵爲散。酒服。方寸匕。日再服。妊娠常服。即易產。胎無苦疾。產後百病悉主之。

●參攷資料 ●世俗多謂惟能治血。而金匱外臺。千金諸方。皆爲人補不足。決取立效之藥。古方用治婦人產後惡血上衝。取效無怠。於此。凡氣血昏亂者。服之即定。可以補虛。備產後要藥也。(陳承) ●其用有三。一。心經本藥。二。和血。三。

治諸病夜甚。凡血受病。必須用之。血壅而不流。則痛。當歸之甘。溫。能和血。辛。溫。能散內寒。苦。溫。能助心散寒。使氣血各有所歸。(張元素)

●入手少陰。以其心生血也。入足太陰。以其脾養血也。入足厥陰。以其肝藏血也。頭能破血。身能養血。足能行血。全用同人。參黃芪。則補氣而生血。同牽牛。大黃。則行氣而破血。從桂附。榮莢。則熱從大黃。芒硝。則寒佐使分定。用者當知。酒蒸治頭痛。諸痛皆屬火。故以血藥主之。(王好古) ●按爾雅。薛山。薺。又云。薺。白薺。薺。音。百。薺。即古。芹。字。郭璞。註。云。當歸。也。似。芹。而。粗。大。許。慎。說。文。云。生。山。中。者。名。薺。一名。山。薺。然。則。當。歸。芹。類。也。在。平。地。者。名。芹。生。山。中。粗。大。者。名。當。歸。也。(蘇頌)

●當歸本非芹類。特以花葉似芹。故得芹名。古人娶妻爲嗣續也。當歸調血。爲女人要藥。有思夫之意。故有當歸之名。正與唐詩。胡麻好種。無人種。正是歸時。又不歸之旨。相同。崔豹。古今注。云。古人相贈。以芍藥。相招。以文。無文。無一名。當歸。芍藥。一名。將離。故也。(李時珍)

●當歸一名。將離。故也。(李時珍)

●當歸一名。將離。故也。(李時珍)

●當歸一名。將離。故也。(李時珍)

●當歸一名。將離。故也。(李時珍)

●當歸一名。將離。故也。(李時珍)

●當歸一名。將離。故也。(李時珍)

●當歸一名。將離。故也。(李時珍)

●當歸一名。將離。故也。(李時珍)

證平後矣。

配合應用

●治婦人產後百病。當歸、川芎、芍藥、地黃、名四物湯。

主婦人血分百病。加炒黑乾薑、炒黑豆、澤蘭、牛膝、益母草、蒲黃。

●當歸、桂枝、朮、菊花、牛膝、主痺。

●治瘧在陰分久不止。當歸、牛膝、鼈甲、橘皮、生薑。

●治心血虛不得眠。當歸、酸棗仁、遠志、人參、茯苓。

●治盜汗。當歸、黃耆、生熟地黃、黃芩、黃連、黃蘗。

●治破傷風。當歸、荊芥、白芷、芍藥、地黃。

●治一切折傷。跌打、挫閃、作疼。當歸、續斷、牛膝、杜仲、地黃、鹿角屑、桂。

●治難產及倒生。當歸、川芎、人參。

●治產後血上薄心。當歸、益母草、紅藍花、蒲黃、牛膝。

●治婦人血閉無子。當歸、白膠、地黃、芍藥、續斷、杜仲。

●治滑下純血。裏急後重。當歸、地榆、金銀花、滑石、紅麴。

●治血虛發熱。當歸補血湯。治

肌熱燥熱。困渴引飲。目赤面紅。晝夜不眠。其脈洪大而虛。重按全無力。此血虛之候也。得於肌肉勞役。證象白虎。但脈不長實為異耳。若誤服白虎湯即死。宜此主之。當歸身酒洗二錢。綿黃芪蜜炙一兩。作

一服。水二鍾煎。一鍾空心溫服。日再服。(東垣蘭室秘藏方)

●治失血眩暈。凡傷胎去血。產後去血崩中。去血金瘡。去血拔牙。去血一切去血過多。心煩眩暈。悶絕不省人事。當歸二兩。芍藥一兩。每用五錢。水七分。酒三分。煎七分。熱服。日二。(婦人良方)

●治衄血不止。當歸焙研末。每服一錢。米飲調下。(聖濟總錄方)

●治小便出血。當歸四兩。剉酒三升。煮取一升。頓服。(肘後方)

●治頭痛欲裂。當歸二兩。酒一升。煮取六合。飲之。日再服。(外臺祕要方)

●治內虛目暗。補氣養血。用當歸生曬六兩。附子火炮一兩。為末。煉蜜丸。梧子大。每服三十丸。溫酒下。名六一丸。(聖濟總錄方)

●治心下痛刺。當歸為末。酒服

方寸匕。(必效方)

●治手臂疼痛。當歸三兩。切。酒浸三日。溫飲之。飲盡。別以三兩再浸。以瘥為度。(事林廣記方)

●治溫瘧不止。當歸一兩。水煎飲。日一服。(聖濟總錄方)

●治久痢不止。當歸二兩。吳茱萸一兩。同炒香。去萸不用。為末。蜜丸。桐子大。每服三十丸。米飲下。名勝金丸。(普濟方)

●治大便不通。當歸、白芷等分。為末。每服二錢。米湯下。(聖濟總錄方)

●治婦人百病。諸虛不足者。當歸四兩。地黃二兩。為末。蜜丸。梧子大。每食前米飲下十五丸。(太醫支法存方)

●治月經逆行。從口鼻出。先以京墨磨汁服止之。次用當歸尾。紅花各三錢。水一鍾半。煎八分。溫服。其經即通。(簡便方)

●治室女經閉。當歸尾。沒藥各一錢。為末。紅花浸酒。面北飲之一日一服。(普濟方)

●治婦人血氣。臍下氣脹。月經不利。血氣上攻。欲嘔。不得睡。用當

歸四錢。乾漆燒存性二錢。為末。煉蜜丸。梧子大。每服十五丸。溫酒下。(永類鈴方)

●治墮胎下血不止。當歸焙一兩。葱白一握。每服五錢。酒一盞。半煎八分。溫服。(聖濟總錄方)

●治妊娠胎動。神妙佛手散。治婦人妊娠傷動。或子死腹中。血下疼痛。口噤欲死。服此探之。不損則痛止。已損便立下。此乃徐玉神驗方也。當歸二兩。芍藥一兩。為粗末。每服三錢。水一盞。煎令泣泣欲乾。投酒一盞。再煎一沸。溫服。或灌之。如人行五里。再服。不過三五服便效。(備急方)

●治產難胎死。橫生倒生。用當歸三兩。芍藥一兩。為末。先以大黑豆炒焦。入流水一盞。煮便一盞。煎至一盞。分為二服。未效再服。(婦人良方)

●治倒產子死不出。當歸末。酒服方寸匕。(子母祕錄方)

●治產後血脹腹痛。引脇。當歸二錢。乾薑炮五分。為末。每服三錢。水一盞。煎八分。入醪酢少許。熱服。(婦人良方)

癖。經閉瘀滯。此皆血聚。用歸尾以破血也。若全用治血虛昏亂者。服之即安。有各歸氣血於經絡之功。故名當歸。取其氣香體潤。同參朮用滋脾陰。如脾虛者米拌炒用。使無便滑之虞。凡痰涎者恐其黏膩。泄瀉者恐其滑腸。嘔吐者恐其泥膈。氣喘聲啞者恐其辛溫。心性喜飲。肺氣欲收。切宜忌之。

國外學說 日本學說謂當歸者。以中國產爲最良。在日本則產於兵庫。福島縣等。漢醫用之。爲通經清涼藥。能領諸血各歸其所。當歸之經。故名。即補血之聖藥也。然其作用甚可疑。毫無確實之根據。其成分亦尚未明瞭。用量大約六〇至一六〇。又日本大和國宇陀郡栽種當歸。於十一月採掘。其經二年之根。曬乾之。浸置熱湯中。片時。懸簷下乾曬二個月。將其乾定者。約一斤爲一束。收藏至清明。再曬二三日。每百斤用樟腦半斤。密封櫃中。至九月乃開櫃取出。售之。英美學說謂當歸產中國之四川。陝西及江寧府滁州等處。其根可入藥。其功用。能開胃暖胃。處

方。以當歸一分。濃酒八分。先用酒六分。浸二天。間時搖動。裝淋筒淋乾。再加餘酒漂淋。仍足八分爲度。每服一錢零五釐。以至二錢一分。（當歸酒方）

近人學說 荊武蒙曰。拙荆戴英。生來健康。向無經病。民國十四年春。曾舉一子。臨盆非常困難。經施種種注射手術。母子得慶俱全。然已衰憊不勝矣。嗣後竭力調護。母體漸臻健康。小兒亦強壯活潑。越六個月而經再行。覺下腹部發牽引性疼痛。下紫黑色銕狀血塊。經淨痛止。展轉不愈。已兩越寒暑矣。婦人畏羞。祕而不言。嗣經覺察。堅詢所苦。答如上稱。并謂心身康泰時。痛少。癢。癢倦時。則增劇。且趨前移後。甚不規則。云云。當採以強壯劑。及治經痛最新製劑。如「佛里爾珠」(Vajri) 安濟室閣「Andysmen」 凡拉蒙「Verramon」等等。或則收效一時。或則效力毫無。訴之新醫藥。伎已窮焉。病者謂余曰。子曷不以中藥療我乎。余唯唯。因思當歸一物。中國古醫籍上盛稱能調經種子。有補

血補氣之功。婦科產科方上。鮮有不用當歸者。乃不雜他藥。於舊藥舖中。單購當歸若干。每日煎煮五錢。數次分服。約十餘日。紅潮旋至。痛苦大減。因更持續服。服一星期。其後準期經至。痛苦若失。纏綿頑疾。一旦而除。驚喜莫名。詎料第三月經又停止。心滋疑焉。以爲藥性已失。越數星期。而現全身疲乏。暈眩。嘔惡之象。知又撒下孽根矣。去年春。欣然復舉一男。因更嘆當歸之真有調經種子之偉功也。按當歸一物。中醫固奉爲補劑怪品。最近據外人報告。亦謂婦人月經失常。當歸能統治之。可知當歸確有調經之主要功能。種子則爲偶然之結果耳。凡因經病而患嗣續艱難者。殆有試服之價值矣。聞德國怡默克(F. Merck)大藥廠。將當歸運諸中國。經精良化學的操。去其渣滓。存其菁華。製成藥劑。名曰當歸精。想其效力偉大。當更倍蓰矣。張山雪曰。當歸是血家氣藥。以辛升運行爲用。以溫和煥然爲功。氣血虛寒者得之。則血隨氣行。而歸其所歸。此當歸命名之

正義也。昔人每謂身能補血。頭能止血。尾能行血。全能和血。故上散下。可補可攻。頭尾之性情不同。斯攻守之取效自別。吾國藥物學之精細。所以異乎西人之專論物質。而無投不利者。其神髓在是。願謂歸身主守。補固有功。歸尾上通。逐瘀自驗。而歸頭乘上行之性。使血溺血。崩中淋帶等之陰陽陷陷者。升之固宜。若吐血衄血之氣火上升者。助以溫升。豈不爲虎傅翼。是止血二字之所當因症而施。固不可拘守其止之一字。而誤謂其無所不可也。且凡失血之症。氣火沖激。擾動血絡。而循行不守。故道者。實居多數。歸之氣味俱厚。行則有餘。守則不足。亦不可過信歸所當歸一語。而有循名失實之咎。即如局方四物一湯。舉國醫家。孰不知其是血家聖藥。且自海藏種種加味。而六合諸方。可謂五花八門。無美不備。極盡醫林能事。究竟即以四物言之。已是走者太走。守者太守。各有其主。未必水乳交融。更何論信手拈來者之合宜與否。此則泥於迹象。太嫌呆板。去神化二字。

虛。故猝中於邪也。客氣者。外來之寒氣也。溫中則寒氣自散矣。虛冷者。內虛血不營於肉分。故冷也。補五臟生肌肉者。歸脾屬陰。陰者血也。陰氣足則營血旺而肌肉長也。急人虛冷。加而用之。【明】李士材本草圖解論當歸曰。當歸甘辛微溫。入心肝脾三經。主一切風。一切氣。一切血。溫中。止頭目。心腹諸痛。破惡血。養心。血。潤腸胃。養筋骨。澤皮膚。理癰疽。排膿。止痛。生肌。氣血昏亂。服之而定。能領諸血各歸其所當之經。故名當歸。脾胃瀉者忌之。去蘆。酒洗微焙。【清】黃宮繡本草求真論當歸曰。當歸辛甘溫潤。諸書載爲入心生血上品。緣脈爲血府。諸脈皆屬於心。心無血養。則脈不通。血無氣附。則血滯而不行。當歸氣味辛甘。既不虛其過散。復不虛其過緩。得其溫中之潤。陰中之陽。故能通心而血生。存爲血中氣藥。故凡一切血症陰虛陽無所附。而見血枯血燥。血脫血閉等症。則當用此主治。按當歸頭則止血上行。身則養血中守。尾則破血下流。全則活血不走。古方合白芍芍

芎。地黃同用。名爲四物湯總劑。蓋謂得芍以爲長養生發之機。地黃以爲滋補化源之自。白芍以爲救陰斂陽之本。則血始能以生。若血虛而氣不固。則當佐以人參黃芪。血熱佐以條芩。梔連。血積佐以大黃。牽牛。與夫營虛而表不解。則當佐以柴葛升麻桂。衛熱而表不斂。則當佐以大黃。隨其病之所向。以爲出入。加減。要使血滯能通。血虛能補。血枯能潤。血亂能撫。俾血與氣附。氣與血固。而不致散亂。而無所歸耳。書命其名曰歸。卽是此意。是以氣逆而見欬逆上聞者。則當用此以和血。而和氣則降矣。寒鬱而見癰疽腹脹頭痛者。則當用此以散寒。寒散而血則和矣。血虛而見風痿無汗者。則當用此以養血。血養而風則散矣。他如瘡瘍癰疽。而見痛苦異常。肌肉失養。而見皮膚不潤。並衝脈爲病。而見氣逆裏急。帶脈爲病。而見腹痛。腰如坐水。亦何莫不因血虛氣無所附之意。得此則排膿止痛。癰消毒去腐。澤皮潤而無枯槁不榮之患矣。然此味辛則散。氣虛火盛者切忌。味

甘則壅。脾胃虛寒者則忌。體潤性滑。大腸泄瀉者則忌。不可不熟晰而明辨耳。至書既言當歸入心。而又曰入肝入脾。無非因其血補。而肝與脾皆有統臟之意。秦產頭圓尾多。色紫氣香肥潤。名馬尾當歸。其性力至善補。川產尾粗堅枯。名鐵頭當歸。其性力剛善攻。只宜發散。收貯曬乾。乘熱紙封。內宜用酒洗。【清】張隱庵本草崇原論當歸曰。當歸花紅根黑者。氣味苦溫。稟少陰水之火。氣上平。交各有所歸。則欬逆上氣自平矣。治溫瘧寒熱洗洗在皮膚中者。助心主之血液。從經脈而外充於皮膚。則溫瘧之寒熱洗洗然而皮膚中者可治也。治婦人漏下絕子者。助腎臟之精氣。從下而上交於心包。則婦人漏下無時。而絕子可治也。治諸惡瘡瘍者。養血解毒也。治金瘡養血生肌也。凡藥皆可養飲。獨當歸言養汁飲者。以中焦取汁。變化而赤。則爲血。當歸滋中焦之汁。以養血。故曰養汁。謂養汁飲之。得其專精矣。【清】徐洄溪本草經百種錄論當歸曰。當歸辛香而潤。香則

走脾。潤則補血。故能透入中焦。營氣之分。而爲補營之聖藥。又曰。當歸爲血家必用之藥。而本經無一字及於補血養血者。何也。蓋氣無形可驟生。血有形難速長。凡通閉順氣和陰清火降逆生津去風利竅。一切滋潤通利之品。皆能令陰氣流通。不使亢陽致害。卽所以生血也。當歸辛芳溫潤。兼比較長。實爲養血之要品。惟苦其血充之效。則血之得所養。不待言而可知。此等當參全經。而悟其理。【清】賈九如辨藥指南論當歸曰。當歸性溫能散。帶甘能緩。經曰。肝欲散以辛散之。肝苦急以甘緩之。緩之散之。肝性所喜。卽所爲補。故專入肝以助血海。使血流行。凡藥體性分根升梢降中守。此獨一物而全備。頭補血上行。身養血中守。梢破血下行。全活血運行周身。治血虛不足。行。全活血運行周身。治血虛不足。縱慾耗精。陰虛勞怯。去血過多。難毒潰後。此皆血脫。用歸頭以補血也。治精神困倦。腰精腰酸。女人血滯。目痛牙疼。癰久虛證。純血痢疾。此皆血少。用歸身以養血也。治諸腫毒。跌撲金瘡。皮膚流癢。溼痺癢

【當陸】卽商陸之古籍別名。典見開寶本草。詳「商陸」條。

【當道】卽車前草之古籍別名。典見本經。詳「車前草」條。

【當歸】
命名 本品功能調氣養血。使氣血各有所歸。
故名。

處方用名 全當歸。白當歸。西箱歸。川當歸。大當歸。秦當歸。白歸。烏當歸。歸尾。油當歸。

古籍別名 乾歸（本經）山蕲。白蕲（爾雅）文無。秦歸（綱目）草頭歸。陶弘景。馬尾歸。大芹。名薛。衆馬。給繻女。二天。地仙。圓夷。靈芝。僑庵草（和漢藥考）。

外國名詞 Arelia Edulis.

基本 屬繖形科當歸之根。

產地 陳仁山藥物生產辨云。

當歸以陝西漢中府興安縣西固等爲最。其次則四川階州龍安大寧廠甘肅等。近日雲南有來。味帶苦辣。與西歸之香甜純味有別。四川甘肅河南產者。亦可用之。但雲南產者不適用。

形態 當歸爲一年生之草本。

春月生苗。莖高三四尺。葉爲由多數分裂小葉而成之羽狀複葉。深綠色。有光澤。夏月於梢頭開小白花。作繖繖形花序排列。秋季結淡綠色漿果。其根有分歧。天然生根。小而香氣強。栽植者反之。根粗而氣味異。藥用以天然根爲佳。販賣品有生乾。蒸乾二種。但多爲蒸乾。品長概四五寸。外部黃褐色。內部類白色。中有黃色木心。常溼潤。味辛甘。

種類 秦產者。力柔而善補。川產者。力剛而善攻。秦歸狀似大葉芎藭。頭圓尾多。色紫氣香。肥潤者卽所謂馬尾歸。其餘如川產者。狀似細葉芎藭。頭大尾粗。色白堅枯。卽所謂鐵頭歸。

採取 二月八月間。採根陰乾。製法 雷斅曰。凡使當歸。須去頭蘆。以酒浸一宿入藥。張元素曰。先以酒洗淨土。治上酒浸。治外酒洗過。或火乾日乾入藥。李時珍曰。凡曬乾。乘熱紙封。收之不蛀。聖濟總錄。墮胎下血不止。當歸焙用。

用法 與他藥水煎。或酒浸。或熬膏。或剉末。和作丸散。

性質 苦。溫。無毒。

成分 其中含有多量蔗糖。效能 補血。活血。潤燥。滑腸。用作調血通經。爲女科要藥。

作用 在胃中僅能促進胃液之分泌增多。至腸始漸被吸入血中。同時又能激腸之黏膜。使腸壁吸收力強大。本品入血中。其作用專在刺激血液中之氮化酵素。令血液之氮化迅速。細胞之新陳作用亦隨之而增進。血壓亦較爲增高。同時卵巢亦能誘起充血之作用。

主治 欬逆上氣。溫瘧寒熱。洗在皮膚中。婦人漏下絕子。溫中止痛。除客血內寒。中風。瘧。汗不出。淫痺。中惡客氣。虛冷。補五臟。生肌肉。諸惡瘡瘍。金瘡。煮汁飲之。

歷代記載攷證 【唐】甄權藥性本草論當歸曰。止嘔逆。虛勞寒熱。下痢腹痛。齒痛。女人產血腰痛。崩中。補諸不足。【宋】大明諸家本草論當歸曰。治一切風。一切氣。補一切勞。破惡血。養新血。及癥瘕。腸胃冷。【元】王好古湯液本草論當歸曰。主痿痺。嗜臥。足下熱而痛。衝

脈爲病。氣逆裏急。帶脈爲病。腹痛。腰溶溶如坐水中。【明】李時珍本草綱目論當歸曰。治頭痛。心腹諸痛。潤腸胃。筋骨皮。治難疽。排膿止痛。和血補血。【明】繆希雍本草經疏論當歸曰。當歸辛大溫。無毒。甘以緩之。辛以散之。潤之。溫以通之。暢之。入手少陰足厥陰。亦入足大陰。活血補血之要藥。故主欬逆上氣也。溫瘧寒熱。洗在皮膚中者。邪在厥陰也。行血則厥陰之邪自解。故寒熱洗洗隨愈也。婦人以血爲主。漏下絕子。血枯故也。諸惡瘡瘍。其已潰者。溫補內寒。則補血而生肌肉也。金瘡以活血補血爲要。破傷風亦然。並煮飲之。內虛則中寒。甘溫益血。故能溫中。血凝則痛。活血故痛自止。血溢出膜外。或在腸胃。曰客血。得溫得辛。則客血自散也。內寒者。甘溫益血之效也。中風瘧。瘧卽角弓反張也。汗不出者。風邪乘虛客血分也。得辛溫則血行而和。故瘧自柔而汗自出也。瘧者。血分爲邪所客。故拘攣而痛也。風寒瘧三者。合而成瘧。血行則邪不能客。故瘧自除也。中惡者。內

（朱排山柑園小識）○獅油性最猛烈。內服尤不可單用。更勿多服。嘉慶元年三月。予友邵某得獅油少許。因病欲服之。未果。爲一鄉人轉乞去。市於人。獲重價。其人市得服半黍許。夜半而死。鄉人懼罪。亦投水死。蓋外用不妨。內服尤宜審慎。以人之腸胃太弱。不任峻利之攻削耳。善透經絡。凡用勿多。（趙學敏）

【獅頭參】即防風黨參之別名。典見翁有良辨誤。詳『黨參』條。

【瑛瑛】即瑛瑛之原名。詳『瑛瑛』條。

【場花】即山攀之古籍別名。典見綱目。詳『山攀』條。

【瑞香】原名 睡香。相傳廬山一比丘僧。晝寢岩下。夢中但聞異香。酷烈覺而尋之。因得此。故名。後有好事者聞而寄之。以爲祥瑞之徵。迺改名瑞香。

古籍別名 世英。佳客。花賊。珠友。奪皮香。風流樹。紫丁香。紫風流。錦被堆。蓬萊花。七里香。沈丁香。露甲。蓬萊紫。（和漢藥考）

十三畫 獅

瑞

香

科

爲

瑞

香

之

根

皮。

基本

屬

瑞

香

科

爲

瑞

香

之

根

製法 採得洗淨日乾。性質 甘。鹹。無毒。效能 治骨痛。療喉痺。用作驅除微毒藥。主治 急喉風。用白花者。研水灌之。用釐 八分至一錢半。參攷資料 南土處處山中有之。枝幹婆娑。柔條厚葉。四時不凋。冬春之交。開花成簇。長三四分。如丁香狀。有黃白紫三色。格古論云。瑞香高者三四尺。有數種。有枇杷葉者。楊梅葉者。柯葉者。總于者。攀枝者。惟攀枝者花紫香烈。枇杷葉者結子。其始出於廬山。宋時人家栽之。始著名。攀枝者其節彎曲如斷折之狀也。其根綿纏而香。（李時珍）



(一) 香瑞

形蘆 瑞香爲常綠小灌木。人家庭園常種之。莖高四五尺。極枝有兩又至三又。外皮平滑。色灰褐。枝葉繁茂。葉形長橢圓。或廣披針形。全緣長二三寸。末端帶尖。基部次第狹小。遂成葉柄。皆互生。質厚而膜。面深綠色。有光澤。背淡綠色。冬月葉腋發生花蕾。春分前後開類似堯花之四瓣合瓣花。相綴而爲頭狀花序。一簇約有十朵至十六朵。花被內面粉紅色。外面紫紅色。有皺襞。香氣極其。其開白花者。謂之白瑞香。果實每不能結成。



(二) 香瑞

目。詳『天花粉』條。

【瑞蓮】即睡蓮之別名。詳『睡蓮』條。

【瑞聖奴】即甘之古籍別名。典見綱目。詳『甘』條。

【瑞蓮花】即睡蓮之古籍別名。典見綱目。拾遺詳『睡蓮』條。

【瑞龍腦】即龍腦香之別名。典見天寶本草。詳『龍腦香』條。

【瑞鳳】即鳳凰之別名。典見禽經。詳『鳳凰』條。

【瑟瑟】即酸子之別名。典見山海經。詳『寶石』條。

【瓶香】性質 微寒。無毒。主治 天行時毒。水腫浮氣。水煎洗風瀉。

參攷資料 瓶香係芳香類排草香之一種。爲熱帶地之產品也。即乳香之以瓶收者。性質功效較尋常乳香力遜。詳『乳香』條。

【當石】即三葉之古籍別名。典見別錄。詳『三葉』條。

【當門子】即麝香之處方用名。詳『麝香』條。

【當耶】即螳螂之古籍別名。典見綱目。詳『螳螂』條。

一四六五

瑞

香

科

爲

瑞

香

之

根

皮。

基本

屬

瑞

香

【煨天麻】即天麻用火煨成者之處方用名。詳『天麻』條。

【煨木香】即木香煨成者之處方用名。詳『木香』條。

【煨石膏】即石膏煨成者之處方用名。詳『石膏』條。

【煨肉果】即肉豆蔻煨成者之處方用名。詳『肉豆蔻』條。

【煨草果】即草豆蔻以火煨成者之處方用名。詳『草豆蔻』條。

【煨葛根】即葛根之處方用名。如治泄利。將葛根煨熟用之。詳『葛根』條。

【煨薑】製法 以薑洗淨。外裹溼紙。入炭火煨。令紙焦。及薑外皮微焦。中心呈深黃色則透矣。

主治 和中止嘔。及與大棗並用。能行脾胃津液而和營衛。(吳遵程)

【獼牛】即犍牛之古籍別名。典見綱目。詳『犍牛』條。

【獼桂】即肉桂之處方用名。詳『肉桂』條。

【獼耳】即藟荷之古籍別名。典見說文。詳『藟荷』條。

【獼柿】即君還子之日本名。詳『君還子』條。

【獅】古鑑別名 狻猊。虬。(綱目)

外國名詞 Fels Leo L. (拉丁) Lion (英) シシ (日本)

基本 係脊椎動物哺乳類有胎盤類食肉類裂腳類貓科之獅。

產地 出非洲及南美洲之巴西國諸地。

形態 獅為獸類之一種。形略似貓。頭部圓。肩部最壯大。至後方漸狹小。四肢強健。有鉤爪。掌有肉塊。行走無聲。尾細長。末端具叢毛。雄者頸間有長鬚毛。毛色淡黃帶褐。體長丈許。雌者較小。而尤猙獰。棲山林。食諸獸。吼聲可達數里。稱為百獸之王。其尿可供藥用。



獅

主治 燒之殺百蟲。辟鬼氣。塗一切惡瘡。即結痂而愈。

參攷資料 獅屎堅如鐵石。磨之作紅色。燒之有臭氣。須用鐵匣盛之。周圍護以鐵屑。否則易於朽爛。(醫學大辭典)

【獅子朮】即於朮之盤結而生。醜怪猙獰如獸形者。典見萬歷杭州府志。詳『於朮』條。

【獅子草】即九龍草之古籍別名。典見百草鏡。詳『九龍草』條。

【獅子盤頭蕋】即黨參之古籍別名。典見黨參新研究。詳『黨參』條。

【獅子驢】即耳草葉之別名。詳『耳草葉』條。

【獅血】主治 燒之殺百蟲。去鬼氣。

【獅油】命名 本品係以獅脂熬取之油。故名。

形態 獅油冷凝時。則堅硬如石。熔熱時。則可挑絲一二尺長。不斷。可供藥用。

辨偽 以微黑色者及塗指甲上。涼透指甲者。真。又方以黍許入沸湯。湯即不沸。

性質 辛溫有毒。

主治 消熱結。療腸瘕。通二便。不利。酒服二三釐自效。

參攷資料 獅為百獸之長。性最難馴。一吼則百獸辟易。爾雅言其食虎豹。熊太古言其乳入牛。

羊馬乳中皆化為水。西域人捕得。取其油入貢。以供宮人滌除衣垢之用。又能去紙上墨跡。刮少許。隔紙裏之。即脫。予嘗試用。垢雖去而衣易毀。紙易脆。僅供一時之用。雖係方物。方藥罕用。近世醫者以之治噎膈病。蓋噎膈皆鬱痰癥積所致。用取滌痰之意。試之輒驗。由是方家爭為奇物。但性最猛烈。力能墮胎。孕婦忌用。象油亦能去垢。滌痰。但不能去墨跡耳。(蓬原)

【獅子油白膩如猪肪。氣味俱薄。利小便。凡大小便不通。雖腹脹痛病在危急者。以酒或白湯送下三四釐。或半分即通。嘗有一因受暑熱。遂致小便不通。每月一發。發至二三日。後發痛如割。至不可忍。屢投藥祈死。人或以獅油少許投之。片刻即通。奏效之速。無逾於此。而本草不著其功用何哉。豈當時未知用歟。第虛秘者似宜附而用之。

【獅油白膩如猪肪。氣味俱薄。利小便。凡大小便不通。雖腹脹痛病在危急者。以酒或白湯送下三四釐。或半分即通。嘗有一因受暑熱。遂致小便不通。每月一發。發至二三日。後發痛如割。至不可忍。屢投藥祈死。人或以獅油少許投之。片刻即通。奏效之速。無逾於此。而本草不著其功用何哉。豈當時未知用歟。第虛秘者似宜附而用之。

【獅油白膩如猪肪。氣味俱薄。利小便。凡大小便不通。雖腹脹痛病在危急者。以酒或白湯送下三四釐。或半分即通。嘗有一因受暑熱。遂致小便不通。每月一發。發至二三日。後發痛如割。至不可忍。屢投藥祈死。人或以獅油少許投之。片刻即通。奏效之速。無逾於此。而本草不著其功用何哉。豈當時未知用歟。第虛秘者似宜附而用之。

石也。〔陳藏器〕凡使有多般。其白滑石如方解石。色似冰白。畫石上有白膩文者真也。烏滑石似壁畫石。上有青白膩文。入用亦妙。綠滑石性寒有毒。不入藥用。黃滑石似金。顯圓。畫石上有青黑色者勿用。殺人。冷滑石青黃色。畫石上作白膩文。亦勿用之。〔雷斅〕今道永萊濠州皆有之。凡二種。道永州出者白滑如凝脂。南城志云。營成縣出磐石。即滑石也。土人以爲燒器。煮魚食是也。萊濠州出者理粗質青。有黑點。亦謂之斑石。二種皆可作器。甚精好。初出輒柔。彼人就穴中制作。用力殊少也。本草所載土地皆是北方。而今醫家所用白色者自南方來。或云沂州所出。其白佳。與本草所云太山之陰相合。而彼土不取爲藥。今濠州所供青滑石。云性寒無毒。主心氣滯滯。與本經大同小異。又張勃吳錄地理志及大康地記云。鬱林州布山縣馬湖馬嶺山皆有。越甚毒。殺人。有冷石可以解之。石色赤黑。味苦。屑之著瘡中。并以切齒立蘇。一名切齒石。今人多用冷石作粉治瘡。

『菊花』條。
〔煎香〕即沈香之肌理有黑脈紋。入水中浮牛沈者爲沈香中之次品。詳『沈香』條。
〔煎澤草〕即蘭草之古籍別名。典見本草集註。詳『蘭草』條。
〔煙〕即煙草之簡稱。詳『煙草』條。
〔煤油〕即石油之別名。詳『石油』條。
〔煤炭〕即石炭之別名。典見綱目。詳『石炭』條。
〔煤參〕命名。形如參。皮心俱青黑。故名。出陝西西安等處。性實。味微苦。甘。主治。功力同人參。但較薄耳。參攷資料。煤參出陝西華山食之多吐。其性亦劣。〔施柳南〕

〔煤精〕即土壘之別名。詳『土壘』條。
〔煨人牙〕即人牙煨成者之處方用名。詳『人牙』條。
〔煨牙齒〕即人牙煨成者之處方用名。詳『人牙』條。
〔煨石決明〕即石決明煨成者之處方用名。詳『石決明』條。
〔煨石燕〕即石燕煨成者之處方用名。詳『石燕』條。
〔煨牡蠣〕即牡蠣之處方用名。詳『牡蠣』條。
〔煨豬石〕即代豬石煨成者之處方用名。詳『代豬石』條。
〔煨龍骨〕即龍骨煨成者之處方用名。詳『龍骨』條。
〔煨磁石〕即磁石煨過者之處方用名。詳『磁石』條。
〔煨礞石〕即礞石煨成者之處方用名。詳『礞石』條。
〔煨礬石〕即礬石煨成者之處方用名。詳『礬石』條。
〔煨牛膽汁〕即牛膽煉成汁者之處方用名。詳『牛膽』條。
〔煉蜜〕即蜂蜜之已煉過者。詳『蜂蜜』條。
〔煉豬油〕即豬脂之處方用名。詳『豬脂』條。
〔黏〕即杉材之古籍別名。典見綱目。詳『杉材』條。
〔照子〕即古銅鏡之古籍別名。典見綱目。詳『古銅鏡』條。
〔燭片〕即馬刀之古籍別名。典見綱目。詳『馬刀』條。

十三畫 滑

源 溜 滌 煎 煙 煤 煨 煉 黏 照 煇

關瀝痛。癢身熱嘔吐。洩瀉腸辟。下痢赤白。除煩熱。胸中積聚寒熱。止消渴。蓄水。婦人催生下乳。治吹乳乳癰。牙齦齒疳。此藥大養脾胃之氣。通九竅六腑。去留結。通經脈。消水穀。安魂定魄。乃神驗之仙藥也。

劉河間傷寒直格本方。白滑石水飛過六兩。粉甘草一兩。爲末。每服三錢。蜜少許。溫水調下。實熱則用新汲水下。解利則葱鼓湯下。通乳用豬肉麵湯調下。催生用香油漿水調下。凡難產或死胎不下。皆由風熱燥澀。結滯緊飲。不能舒緩故也。此藥力至。則結滯頓開而瘥矣。如用以治痢。照雷公炮製用牡丹皮同煮過。加丹砂水飛細末。每兩一錢。名辰砂六一散。治心經伏暑。下痢純血煩躁口渴。神昏不爽。

②治腦上煩熱。多渴。利九錢。滑石二兩。搗水三大盞。煎二盞。去滓入粳米煮粥食。(聖惠方)

③治女勞黃疸。日晡發熱惡寒。少腹急。大便溏黑。額黑。滑石石膏等分研末。大麥汁服方寸匕。日三。小便大利。愈腹滿者難治。(千金方)

④治乳石發動。煩熱煩渴。滑石粉半兩。水一盞。絞白汁頓服。(聖惠方)

⑤治氣壅關格不通。小便淋結。臍下妨悶。兼痛。滑石粉水調服一兩。(廣利方)

⑥治小便不通。滑石末一升。車前汁和塗臍之四畔。方四寸。乾即易之。冬月水和。(楊氏產乳方)

⑦治婦人轉胞。因過忍小便而致。滑石末葱湯服二錢。(聖惠方)

⑧伏暑水泄。白龍丸。滑石火煨過一兩。硫黃四錢。爲末。麵糊丸。菉豆大。每用淡薑湯。隨大小服。又方。治伏暑。或吐或瀉。或嘔。小便赤。煩渴。玉液散。用桂府滑石燒四兩。薑香一錢。丁香一錢。爲末。米湯服二錢。亦治霍亂。(普濟方)

⑨治痘瘡狂亂。循衣摸牀。大渴引飲。用益元散一兩。加朱砂飛過二錢。冰片三分。麝香一分。用燈心湯調二三錢服。(王氏痘疹方)

⑩治風毒熱瘡。遍身出黃水。用桂府滑石末。傳之次日。愈。先以虎杖。豌豆。甘草等分煎湯。洗後乃搽。(普濟方)

⑪治腳指縫爛。滑石一兩。石膏煨半兩。枯礬少許。研搽之。亦治陰下溼汗。(集簡方)

⑫治傷寒衄血。滑石末。飯丸梧子大。每服十丸。微嚙破。新水嚥下。立止。湯晦叔云。鼻衄乃當汗不汗所致。其血紫黑。時不以多少。不可止之。且服溫藥。調其營衛。待血鮮時。急服此藥止之也。(本事方)

⑬治暴得吐逆。不下食。生滑石末二錢。匕溫水服。仍以細麵半盞押定。(本草衍義方)

⑭治妊娠子淋。不得小便。滑石末水和泥。臍下二寸。(外臺祕要方)

⑮治杖瘡腫痛。滑石。赤石脂。大黃等分。爲末。茶湯洗淨貼。(趙氏經驗方)

⑯治熱毒怪病。目赤鼻脹。大喘。渾身出斑。毛髮如鐵。乃因中熱毒氣結於下焦。用滑石白礬各一兩。爲末。作一服。水三盞煎減半。不住飲之。(夏子益奇疾方)

⑰用量 三錢至四錢。

⑱施用宜忌 凡陰虛而無溼熱者。禁用。惡曾青。制雄黃。以石華爲

之使。

著名方劑

①滑石代赭湯。治百合病下之後者。主之。(金匱)百合七枚。擘。滑石三兩。(碎綿裹)代赭石如彈丸大一枚。(碎綿裹)以水洗百合漬一宿。當白沫出。去其水。更以泉水二升。煎取一升。去滓。別以泉水二升。煎滑石代赭取一升。去滓。合和重煎。取一升。五合分溫服。②滑石白魚散。主小便不利。(金匱)滑石二分。亂髮二分。(燒)白魚二分。上三味杵爲散。飲服半錢。日三服。

參攷資料

①古方治淋瀝。多單使滑石。又與石葦同搗末。飲服刀圭。更驗。又主石淋。取十二分。研粉。分作兩服。水調下。煩熱定。即停後服。(蘇頌)②入足太陽經。滑能利竅。以通水道。爲至燥之劑。諸苦湯用滑石。阿膠。同爲滑劑。以利水道。愈致生暈。同煎去滓。澄清。以解利。淡味滲洩。爲陽。故解表利小便也。若小便自利者。不宜用。(王好古)③始安按縣所出二石。形質既異。所用又殊。始安者。輒滑而白。宜入藥。東萊者。硬澀而青。乃作器

爛之效。

主治 身熱洩瀉。女子乳難。經閉。利小便。瀉胃中積聚。寒熱。益精氣。久服輕身耐饑。長年(本經)通九竅。六腑津液去留結止。渴令人利中(別錄)

張仲景之發明 滑石一味。經

張仲景之實驗。認為『主治小便不利。勞治渴』。茲考徵如下。猪苓湯證曰。渴欲飲水。小便不利。(以上一方滑石一兩)此一方可見滑石所主治也。滑石白魚散證曰。小便不利。蒲灰散證曰。小便不利。余未試。二方是以不取徵焉。

歷代記述攷證 【元】朱丹溪

本草衍義補遺論滑石曰。燥溼分水道。實大腸。化食毒。行積滯。逐凝血。解燥渴。補脾胃。降心火。偏主石淋。爲要藥。【明】李時珍本草綱目論滑石曰。療黃疸。水腫。脚氣。吐血。衄血。金瘡。血出。諸瘡。腫毒。【明】繆希雍本草經疏論滑石曰。滑石石中之得冲氣者也。故味甘淡氣寒而無毒。滑以利諸竅。通滯滯下垢膩。甘以和胃氣。寒以散積熱。甘寒滑利以合共用。是爲祛暑散熱利

十三 滑

水除溼。消積滯。利下竅之要藥。本經用以主身熱。洩瀉。女子乳難。瀉胃中積聚。寒熱者。解足陽明胃家之熱也。利小便。癃閉者。通膀胱利陰竅也。其曰益精氣。久服輕身耐飢。長年。此則必無是理矣。別錄通九竅。津液去留結止。渴令人利中者。溼熱解則胃氣和而津液自生。下竅通則諸壅自洩也。丹溪用以燥溼分水道。實大腸。化食毒。行積滯。逐瘀血。解燥渴。補脾胃。降心火。偏主石淋。皆此意耳。【清】黃宮繡

本草求真論滑石曰。滑石何以滑名。因其性滑而名之也。滑石味甘。氣寒。色白。服則能以清熱降火。通竅利便。生津止渴。爲足太陽膀胱經藥。故凡中暑積熱。嘔吐煩渴。黃疸水腫。脚氣淋閉。水溼瀉利。吐血衄血。諸症。腫毒。乳汁不通。胎產難下。服此皆能蕩熱除溼。通計滑胎。然其開竅利溼不獨盡由小便而下。蓋能上開腠理而發表。是除上中之溼熱。下利便溺而行。是除中下之溼熱。溼去則三焦寧而表裏安。溼去則蘭門通而陰陽利矣。河間益元散用此。通治上下表裏諸

病。其意在此。滑石既屬滲利。如何又言止渴。因其溼熱既溼。則脾胃中和而渴自止耳。故書又載能理脾胃。義亦由此。白而潤者良。

國外學說 日本和漢藥考曰。

滑石種類頗多。由其色澤形狀及品質等。而別爲蠟石。溫石。凍石。石鹼石等。又日本藥局方曰。滑石爲微細粉碎之珪酸。銕於指間捻之。覺如脂肪。不溶於水及酒精。漢醫以爲淋病之主藥。扶氏藥物學云。於「インテルトリ」用爲撒布粉劑。或爲丸劑之衣。用量四・〇至一六・〇。又英美藥學說謂滑石中西國均產。內含鎂。養。玻。養。銦。養等。其功用。惟腹具酸者服之。則能合酸作瀉。又能作摻粉用。本草綱目謂其能療治石淋。黃疸。水腫。脚氣。吐血。鼻血。諸瘡。腫痛。且去身熱。補脾胃。能通九竅。六腑津液。未知其何所據而云然。

近代學說 黎伯概曰。滑石有三種。二種是真。一種是假。真者一

種是川滑石。出四川。一種是漳滑石。出漳州。質皆甚滑。名實相負。細驗之。漳滑石質輕。色微紅。川滑石質堅。色微青。在藥性爲通利。小便。消解血液與淋巴液中之炎熱。從小便而解。正是利用其滑性。滑石在化學上之元質爲鎂。爲輕金屬之鹽類。能中和酸性液。熱病卽酸性液發炎。滑石收其酸性液。排泄於尿。非常靈敏。當用真滑石。漳產質鬆而輕易。通達腸膜之液。川產質緻而密。下行通利之力尤銳。二者比較。實以川產爲勝。惟一種偽滑石。質粗鈍。澇而不見滑。實另一種土石。其元質不必爲鎂。究不知出產何處。查其來源。已研成粉。而用紙包裹。以其不滑而澇。則不惟無益。而反有害。醫家處方。但書滑石。藥店率以此物應之。余問之藥店。俱云若要真滑石。須如書川字字樣。卽得真物。余復驗藥店所製之六一散。亦多用滑石者。而用真滑石者。亦有之。並不一致。以手捻之一。滑一滑。卽可立辨。

配合應用 滑石和甘草爲

益元散。又名天水散。六一散。太白散。解中暑傷寒疫癘。并汗後遺熱。勞復。諸疾。兼解兩感傷寒。百藥酒食邪熱。煩滿。短氣。腹脹。悶痛。淋

可供藥用。

主治 帶之。辟溪毒。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論溪鬼蟲角曰陰乾。爲末佩之。亦辟射工毒。

參攷資料 ①溪鬼蟲。蟾蜍。蠶

能食之。鵝鴨亦辟之。〔李時珍〕

②溪毒中人。一名中水。一名中溪。

一名水病。似射工而無物。春月多

病之。頭痛惡寒。狀如傷寒。二三日

則腹中生蟲。食人下部。漸蝕五臟。

注下不禁。雖良醫不能療也。初得

則下部若有瘡。正赤如截肉。爲陽

毒。最急若瘡如蟲。爲陰毒。少緩

皆殺人不。過二十日。方家用藥。與

傷寒溫病相似。或以小蒜煮湯浴

之。及諸藥方。又云江南射工毒。蟲

在山間。水中人行或浴。則此蟲含

沙射人形影。則病有四種。初得皆

如傷寒。或似中惡。一種偏身有黑

鱗子。四邊悉赤。犯之如刺。一種作

瘡。久即穿陷。一種突起如石。一種

如火灼爛瘡也。療之並無方法。王

充論衡云。短狐含太陽毒氣而生。

故有弓矢射人。中人如火灼也。〔

李時珍〕

【溪孫】即白菖之古籍別名。典見

本草拾遺。詳「白菖」條。

【溪楓】即水楊柳之古籍別名。詳

「水楊柳」條。

【溪蕪】係菖蒲之生於溪澗。根瘦

而赤。常稍密者。性質效能同菖蒲。

詳「菖蒲」條。

【溪鴨】即鸕鶿之古籍別名。典見

異物志。詳「鸕鶿」條。

【洩】即童便之古籍別名。典見素

問。詳「童便」條。

【洩疏】古醫別名 巨骨。〔別

錄〕

性質 生田野間。

形態 洩疏爲灌木類之一種。

高丈餘。與枸杞相類。有刺。皮白中

空。結實亦似杞子。兩兩相對。秋月

熟。則色赤。可供藥用。

採取 八月九月間採之。

性質 辛寒。無毒。

主治 皮膚中熱。除邪氣。止遺



洩疏

溺。利水道。〔本經〕除胃中熱。下氣。

可作浴湯。〔別錄〕

參攷資料 ①洩疏以漏蘆爲

之使。②千金方。治婦人下焦三十

六疾之承澤丸中用之。〔李時珍〕

【溶魚】即鱸魚之古籍別名。典見

綱目。詳「鱸魚」條。

【溺白涎】即人中白之原名。詳「

人中白」條。

【淫生蟲】即鼠婦之古籍別名。典

見圖經本草。詳「鼠婦」條。

【滂藤】即扶芳藤之古籍別名。典

見綱目。詳「扶芳藤」條。

【滋草】即藜蘆之古籍別名。典見

千金食治。詳「藜蘆」條。

命名 本品性滑利。數

實又滑膩。故名。

處方用名 原滑石。飛滑石。塊

滑石。粉。

古醫別名 液石。番石。〔別錄〕

桂林滑石。桂府滑石。〔綱目〕替石。

脫石。冷石。〔陶弘景〕盡石。〔本草

衍義〕久冷白滑石。液石。稜利。竅

共石。活石。斑石。硝石。白玉粉。白仲

寧。立制石。雷河督子。〔和漢藥考〕

烏滑石。〔炮炙論〕

外國名詞 Talcum (拉丁)

Talc (英) Talk (德)

基本 爲單斜形之鑽石。

產地 陳仁山藥物生產詳云。

滑石又名畫石。原產四川雲南廣

東亦有出。和漢藥考曰。日本之石

見越前越中阿波備前伯耆上野

等處產此。

形態 滑石多數爲纖維狀。塊

狀。粒狀。或葉狀。間有爲片。方。柱。狀

結晶體者。無色者少。多爲青白。黃

白。灰綠。或銀灰。諸色。有脂肪狀。或

真珠狀。光澤。質柔。脆。硬度一。〇。

爲岩石中硬度之最低者。比重爲

二。六至二。八。其面光滑如油。

故名。

製法 雷敦曰。凡使滑石。須用

白滑石。以刀刮淨。研粉。以牡丹皮

同煮一伏時。去牡丹皮。取滑石。以

東流水淘過。曬乾。用。

性質 甘寒。無毒。

成分 主成分爲含水硅酸鈣。

此外含有少許雜物。

效能 滑利。竅。逐濕熱。治瀉痢。

通淋。閉。用作淋病藥。及黃疸水腫

藥。其精製者。有滑澤皮膚。防其糜

爛。

由皮膚吸收。亦易僅取。查痛風。藥疹。皮膚病。瘡後之餘。病。腺病。梅毒等疾患者。則以浴此泉爲佳。吸入法。是由呼吸器。黏膜之吸收。而作用於上氣道。以奏效。古來所稱爲療之湯之理由。即因吸入此溫泉所含之硫水素。刺戟粘膜。使祛痰容易。略痰爲多。故以此而得名也。

④食鹽泉。食鹽泉之效。則基因於鈉鹽。與其他之固形成分及瓦斯也。飲用則因刺戟口腔及胃黏膜之神經。結果。唾液胃液之分泌。爲反射作用的增加。以助消化。及強壯胃之運動。在腸管則促進其蠕動及分泌。故食慾旺盛。其作用於血液。則赤血球及血色素增多。物質代謝尤以氮素(Nitrogen)之代謝爲良好。胃之運動及分泌有障礙時。慢性胃炎。十二指腸炎。膽囊炎。腸蠕動障礙等症。及肝之充血。腺病。脾腫用之均奏效果。若入浴則食鹽刺戟皮膚。促進皮脂腺汗腺之分泌。但他方面又因食鹽之細結晶。附着於皮膚表面。皮膚爲器械之刺戟。防止體溫放散。故浴後覺溫暖。

十三 鹽 溫

近人學說。祝振綱云。人體皮膚。如無糜爛創傷。則湯火難以侵入。因之行溫泉浴時。其泉中之成分。皮膚亦未必吸收於體內。即能透入。其量亦微。世人以爲溫泉中所含之藥物。能被吸收於皮內。此其觀念錯誤。但溫泉之於皮膚病。卻能直接奏效。然應用溫泉浴法。亦不無流弊。故所患之皮膚病。是否適宜溫泉。於俗醫仍在捉摸之中。漫無準則。蓋皮膚病中。往往有因溼潤之刺戟。以致病勢增劇者。況溫度較高。而含有藥物之溫泉。其更富於刺戟性。而能使病增劇。不尤可慮乎。彼因入浴治療。以致病勢增劇之患者。屢見不鮮。凡此皆因不明浴治之理。濫用高溫度之溫泉浴所致也。蓋溫泉種類甚多。其中對於皮膚病認爲最有效力者。厥惟硫黃泉。因其溫度有高低。所含硫黃有多寡。而其效力亦未必一定要之急性皮膚病患者。對於任何溫泉。均不宜浴爲是。慢性皮膚病。卻不妨用硫黃泉或鈉泉浴治。但高溫亦非所宜耳。

參攷資料 ①雲南甯洱縣城

深

西北二十里。四季之中。泉水滾熱。近之者無不流汗。燭犬之屬。毛無不脫落者。是以人不敢入其中沐浴。(樸歷) ②溫泉下有硫黃。即令水熱。猶有硫黃臭。硫黃主治諸瘡。故水亦宜熱。當其熱處。可燂豬羊熟鷄子也。(陳藏器) ③溫泉有處甚多。按胡仔漁隱叢話云。湯泉多作硫黃氣。浴之則饑人肌膚。惟新安黃山。是朱砂泉。春時水即微紅。可煮茗。長安驪山。是礬石泉。不甚作氣也。礬石雖紅不熱。當是雄黃。爾有礬石處。亦有湯泉。浴之有毒。(李時珍) ④廬山有溫泉。方士往往教患疥癬風癩楊梅瘡者。飽食入池。久浴得汗出乃止。旬日自愈也。(汪穎)

【溫湯】即溫泉之原名。詳「溫泉」條。

【溫慈】即萊菔之古籍別名。典見爾雅。詳「萊菔」條。

【溫藤】 庭地 生山谷間。形藤。溫藤爲蔓草類之一種。蔓經樹木。四時不凋。其莖葉可供藥用。性質。甘溫。無毒。

主治 氣血積冷。浸酒服。

【溪狗】 庭地 生南方溪澗中。形龜。溪狗爲溼生蟲類之一種。狀如蝦蟆。尾長三四寸。可供藥用。

性質 有小毒。

主治 溪毒及遊蟲。燒末水服。

【溪砂】即硃砂之古籍別名。典見和漢藥考。詳「硃砂」條。

【溪鬼蟲】 古籍別名 射工。(綱目)抱樞。雜俎(含沙)詩註。短狐(廣雅)水狐(玄記)。

庭地 生南方溪澗中。

形態 溪鬼蟲爲溼生蟲類甲蟲屬之一種。體長二三寸。廣一寸。形扁。前闊後狹。似蟬。腹腰背硬如鼈。質殼黑色。下有翅。能飛作鋸鋸聲。頭闊喙尖。有二骨眼。頭目醜黑。如狐。如鬼。喙頭有尖角。如爪。長一二分。六足如蟹。二足在喙下者大。而一爪四足在腹下者小而歧。爪時或雙屈。前足抱拱其喙。正如橫弩上矢之狀。或含沙射人形影。冬日伏磐石間。所居之處。大雪不積。氣起如蒸。掘下一尺可得之。其角

液之附着物。亦隨皮垢以俱除。且以其高溫作用。調節皮膚之體溫。同時刺激皮膚之神經。以促進其生理之機能。使血液循環。皆形旺盛。並能促進新陳代謝。如頭部鬱血等。皆得導之以下行。尤於女子之月經不調等症。可作未發之預防。此外更能增進食慾。舒暢精神。如於硫黃泉浴後。尤能驅除皮膚病之微生物。故於各種慢性皮膚病尤奏功效。

主治 諸風。筋骨攣縮。肌膚頑痺。手足不遂。肩髮脫落。楊梅瘡疥。風癩諸癬。

國外學說 日本藤溪剛一云。溫泉混有種種之藥物。保有溫度。含有稀少之瓦斯。爲今日理學的醫治唯一療法。茲將各溫泉質之作用效果。述之如次。●炭酸泉。可供飲料。若入此泉水於口中。則有一種特殊之氣味。同時入胃。則刺激胃之黏膜神經。層層以助鹽酸之分泌。促進食慾。強健胃之運動。促進乳糜之流通。又腸之移動。亦同樣強健而助消化。胃之黏膜。因充血之結果。使泉水與含於其內

之成分。容易吸收。遂至顯利尿之效。尿液之分泌亦增多。但此爲間接之影響也。又對於呼吸器黏膜之卡他亦有效。而使呼吸爲愉快。將炭酸泉混於溫牛乳而飲之。最佳。又適宜於消化不良。但一時飲以大量。或持續的飲用時。則反有害於消化。●鹼泉。胃酸過多時。若鹼酸則能中和之。且有抑止醱酵之異常。促進腸之運動。又鼻腔咽喉喉頭等。可除去其附着之黏膜。本泉是有溶解尿酸及舊酸結石。及利尿之效。於腎臟結石。膀胱結石。膽石症。膽囊炎之治療。亦有同樣之效。又有抑止糖尿病之糖量。但患肺結核。惡性腫瘍者。則此泉宜忌避之。因鹼炭酸泉。若長使用。則有害於營養。易陷於消化不良。故虛弱及元氣虧乏者。宜忌飲之。當飲本泉時。以擇空腹時爲佳。尿之發現。驗實者亦早。一日之飲用量。爲二百五分。爲二回或六回飲之。若食事之間飲之。則胃酸之中。和爲強。故須避之。慢性胃潰瘍。亦以早晨空腹時飲用爲宜。至炭酸泉。或鹼炭酸泉。若含有多量炭酸

瓦斯時。則作爲炭酸湯而利用之。入浴於此種炭酸湯時。忽然在皮膚表面。有無數微點之小空泡密着之。但經數分間。則皮膚潮紅而至。感有溫暖。本泉於心臟瓣膜。不全閉鎖。心臟之過緊張。動脈硬化。症。痰心症之心臟病。每多奏效。故在西洋方面。著名之心臟病專門。溫泉池甚夥。其由各國而往訪之。不絕於道。其他如病後之恢復衰弱。神經痛。知覺過敏。痙攣。末梢神經麻痺。陰痿症。不妊症。及有流產之習慣者。均宜適用。入浴於少含炭酸瓦斯之鹼泉。則因溶解皮膚之分泌物而刺激。故對於皮膚爲有效。●鐵泉。鐵泉爲活動於血液者。即赤血球增殖。血色素增多。體重增加。體溫亦昇。高半度至一度。脈搏充實。而有力。使搏數亦多。一般血液物質代謝病。雖可使用此鐵泉。但亦有宜禁者。鐵泉之增加血液者。若爲高山之溫泉。則其受土地氣候之影響。而更爲顯效。若選擇五百米之高山。則比之低地之效力。強有二三倍。因氣壓之低者。對於造血作用最佳也。其他

如貧血。萎黃病。瘧病後。腎臟炎。精神過勞。又重病後之衰弱。慢性神經疾患。性慾之疾患。及有流產習慣之婦女等。則以本泉爲宜。飲用鐵泉時。以每朝用四百至六百瓦。如在食時飲之。則鐵質易吸收。但鐵泉有使消化不良之傾向。故消化不良。宜注意用之。因飲用後。每有使胃停滯之感。全身異和。易起便秘。又牙齒每至染黑色。叢生亦爲黑色。又如肺結核。或咯血時。心臟病。小循環之體積。胃腸之潰瘍等。則本泉爲禁忌。施行入浴法。則刺激末梢神經。促進溫感。與亢奮。而皮膚潮紅。知覺銳敏。脈搏充實。而強壯。故適應於麻痺。神經衰弱。小兒之飲量。比大人少。通常用西洋湯匙三四杯。一日三四回飲之。更佳。●硫黃泉。硫黃泉是可行飲用。入浴。吸入之。三法。飲用法。可單飲其泉水。或混於牛乳及其他之清涼水飲之。通常一日量。由一百五十至三百五十瓦。每朝空腹時飲之。本泉成分中之硫化水素。是由胃腸吸收。入浴時。溫度愈高。皮膚充血。而其機能愈增高。硫黃之

性質 甘平。無毒。

主治 療癰。

歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草論楮樹皮白汁曰傳蛇蟲蜂蠍大咬。

參攷資料 楮皮中白汁。能合碌砂爲團。故名五金膠漆。(大明)

古法黏經書。以楮樹汁和白芨飛麵調糊接紙。永不脫解。過於膠漆。(李時珍)

【楮樹枝莖】

主治 瘰癧癰癤。煮湯洗浴。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論楮樹枝莖曰。搗濃汁服治小便不通。

【楸】

命名 本品葉大而早脫。至秋已呈凋狀。故名。

古籍別名 刺楸。角楸。

外國名詞 Malloetus japonicus, Muel. Arg. (拉丁)アカ

メカシハ(日本)

基本 係大戟科楸屬。爲楸樹之木皮。其子枝葉詳見各該條。形態 楸爲喬木類之落葉木。本高七八丈。葉大約三四寸。圓形。

十三畫 楮

楸 枝 殿 溫

或廣卵形。有尖端。掌狀淺裂。嫩葉及葉柄帶赤色。夏月枝梢開細小黃綠色花。穗狀花序。有萼。無花瓣。單性。雌雄異株。結實外面多顆刺。熟則開裂。吐出種子。色紅黃黑如櫻桃。味甚清香可食。



楸

性質 苦。小寒。無毒。

主治 吐逆。殺三蟲。及皮膚蟲。煎膏黏傳惡瘡。疔瘰癧。腫疔痔除膿血。生肌膚。長筋骨。

歷代記述攷證 【唐】李珣海藥本草論楸木皮曰。消食澀腸。下氣。治上氣咳嗽。亦入面藥。【明】李時珍本草綱目論楸木皮曰。口吻生瘡貼之。頻易取效。

製法 凡使須去盡子仁。用否則食之。令人心煩。

【楸子】

性質 甘。酸。無毒。

主治 多食滯氣。令人好睡。

【楸枝】

主治 煎湯。洗疽瘰癧。

【楸葉】

性質 苦。小寒。無毒。

主治 搗傅瘡腫。煮湯洗膿血。冬取乾葉用之。諸癰腫潰及內有刺不出者。取葉十重貼之。

參攷資料 楸乃外科要藥。而近人少知。葛常之韻語陽秋云。有人患發背潰爛。腸胃可窺。百方不瘥。一醫用於秋。日太陽未升時。採楸樹葉熬之爲膏。傳其外。內以雲母膏作小丸服。盡四兩。不累日而愈也。東晉范汪名醫也。亦稱楸葉治瘡腫之功。則楸有拔毒排膿之力。可知。(李時珍)

【檣楸】即枳椇之古籍別名。典見廣記詳「枳椇」條。

【殿春客】即白芍之古籍別名。典見「補漢藥考詳」白芍條。

【楸泉】原名 溫湯。命名 以其泉水比其他岩泉溫度較高。故名。

古籍別名 沸泉(陳藏器)滾泉。聚溫泉。湯泉(綱目)。

基本 係泉水中含有各種礦物質之泉流。

產地

溫泉水世界各國之凡毗近火山熱地者。多有之。中國陝西臨潼縣之驪山溫泉。北平之湯山。閩侯之福州。雲南元江之溫玉泉。均爲有名之湯泉。

形態

溫泉爲地層岩之空隙處。噴裂之岩泉。以其毗連火山熱地。故泉流溫。泉源自山腹石中流出。傾瀉下流。其色清澈。且暑熱如沸湯。甚之有攝氏寒暑表七八十度之高。故必和以冷水。然後可浴。惟湯池開鑿較久者。則其溫度亦漸漸減低。尋常患皮膚病者。以硫黃泉入浴爲最佳。

用法

溫泉水可供飲料。煮茗入浴均可。

性質

辛。溫。微毒。

成分

溫泉所含礦物之成分。以地質之異。所以有種種不同之泉流。發見。有含礫性鹽類者。有含硫黃者。有含食鹽鐵。或炭酸者。尙有含其他物質者。細析甚多。大略不過如此。

作用

浴後能使皮膚之上皮細胞膨脹。礦化。而表皮外之老廢物。亦同時容易剝離。即皮脂與汗。

〔聖惠方〕

① 治天行病後兩脇脹滿。臍下如水腫。以穀枝汁隨意服愈。(外臺祕要方)

② 治鼻衄。小勢輒出。楮葉取汁飲三升良。(肘後方)

③ 治小兒下痢赤白。作渴。得水又嘔逆者。搗葉炙香。以飲漿半升。浸至水綠。去葉以木瓜一箇切內汁中煮二沸。去木瓜細細飲之。(子母祕錄方)

④ 治通身水腫。楮枝葉煎如饒。空腹服一匕。日三服。(聖惠方)

⑤ 治肝熱生翳。楮實研細。食後蜜湯服一錢。日再服。(直指方)

⑥ 治金瘡出血。用穀子搗傅之。(外臺祕要方)

⑦ 治喉痺喉風。五月五日。或六月六日。七月七日。採楮桃陰乾。每用一個。爲末。并華水服之。重者兩個。(集簡方)

⑧ 治身面石疽。狀如瘰癧。而皮厚。穀子搗傅之。(外臺祕要方)

⑨ 治金瘡出血。用穀子搗傅之。(外臺祕要方)

⑩ 治目昏難視。楮桃。荊芥穗各

五百枚。爲末。煉蜜丸。彈子大。每食後嚼一丸。薄荷湯送下。一日三服。(衛生易簡方)

⑪ 治目昏難視。楮桃。荊芥穗各

五百枚。爲末。煉蜜丸。彈子大。每食後嚼一丸。薄荷湯送下。一日三服。

〔衛生易簡方〕

① 治目昏難視。楮桃。荊芥穗各

五百枚。爲末。煉蜜丸。彈子大。每食後嚼一丸。薄荷湯送下。一日三服。

② 治目昏難視。楮桃。荊芥穗各

五百枚。爲末。煉蜜丸。彈子大。每食後嚼一丸。薄荷湯送下。一日三服。

③ 治目昏難視。楮桃。荊芥穗各

五百枚。爲末。煉蜜丸。彈子大。每食後嚼一丸。薄荷湯送下。一日三服。

④ 治目昏難視。楮桃。荊芥穗各

五百枚。爲末。煉蜜丸。彈子大。每食後嚼一丸。薄荷湯送下。一日三服。

⑤ 治目昏難視。楮桃。荊芥穗各

五百枚。爲末。煉蜜丸。彈子大。每食後嚼一丸。薄荷湯送下。一日三服。

⑥ 治目昏難視。楮桃。荊芥穗各

五百枚。爲末。煉蜜丸。彈子大。每食後嚼一丸。薄荷湯送下。一日三服。

祖食飽。喉中噎。國醫莫能愈。吳廷紹獨請進楮實湯。一服疾失去。羣

醫他日取用皆不驗。吳廷紹答云。噎因甘起。故以此治之。愚謂此乃

治骨哽堅。梗之義。爾輩醫用治他噎。故不驗也。(李時珍)

① 構楮兩樹。易生。葉多。濫毛。南人剝皮。擣膏

造紙。亦緝練爲布。不堅。易朽。裴淵廣州記言。蠻夷取穀皮。熟。麤。爲揭

裏。屬布。以擬毡。甚煖也。其木腐後生菌。耳。味甚佳。好。(許慎)

② 陸機詩。疎云。構幽州謂之穀桑。或曰。構桑。荊揚交廣謂之穀。(蘇頌)

③ 陸佃埤雅作穀米之穀。訓爲善者誤矣。或以楮構別爲二物者。亦誤矣。

(李時珍) ④ 此有二種。一種皮有斑花文。謂之斑穀。今人用皮爲冠

者。一種皮白。無花。枝葉大相類。但取其葉。似葡萄。葉作瓣。而有子者

爲佳。其實初夏生。大如彈丸。青綠色。至六七月。漸深紅色。乃成熟。

八九月採。水浸去皮。種取中子。段成式酉陽雜俎云。穀田久廢。必生構

葉。有瓣曰楮。無曰構。陸機詩。疎云。江南人。績其皮。以爲布。又搗以爲

紙。長數丈。光澤甚好。又食其嫩芽

以當菜茹。今楮紙用之最博。楮布

不見有之。醫方但貴楮實。餘亦稱用。(蘇恭)

① 按許慎說文。言楮穀乃一種也。不必分別。惟辨雌雄耳。

雄者皮斑而葉無。雌者皮白而葉有。種又

採花食之。雌者皮白而葉有。種又

亦開碎花。結實如楊梅。半熟時水

漂。去子。蜜煎作果食。二種樹並易

生。葉多。濫毛。南人剝皮。擣膏造紙。

亦緝練爲布。不堅。易朽。裴淵廣州

記言。蠻夷取穀皮。熟。麤。爲揭裏。屬

布。以擬毡。甚煖也。其木腐後生菌

耳。味甚佳。好。(李時珍)

② 陸機詩。疎云。構幽州謂之穀桑。或曰。構桑。荊揚交廣謂之穀。(蘇頌)

③ 陸佃埤雅作穀米之穀。訓爲善者誤矣。或以楮構別爲二物者。亦誤矣。

〔楮樹白皮〕

性質 甘平。無毒。

主治 逐水利小便。

歷代記述攷證 〔魏〕吳普本草論楮樹皮曰。治喉痺。唐甄權

藥性本草論楮樹皮曰。治水腫氣滿。明〕李時珍本草綱目論楮樹

皮曰。煮汁釀酒。飲治水腫入腹短氣咳嗽。爲散服。治下血血崩。

〔楮樹皮中白汁〕 古籍別名 構膠 五金

膠漆。綱目

性質 甘平。無毒。

主治 止吐衄血痢。婦人血崩。月經不絕。產後血暈。金瘡出血。

性質 甘涼。無毒。

主治 小兒身熱。食不生肌。可作浴湯。又主惡瘡生肉。

歷代記述按證 【唐】蘇恭新

修本草論楮葉曰。治鼻衄。數升不

斷者。搗汁三升。再三服之。良久即

止。嫩茹之。去四肢風痺。及赤白下

痢。【唐】甄權藥性本草論楮葉曰。

炒研搜麵。作為餛飩食之。主水痢。

【宋】大明諸家本草論楮葉曰。治

刺風身癢。【明】李時珍本草綱目

論楮葉曰。利小便。去風溼。腫脹白

濁。疝氣。癰瘡。

【楮實子】原名 穀實。

命名 楮本作杔。其

皮可績為紵故也。又楚人呼乳為

穀。因木中白汁如乳故名。

古籍別名 穀實（別錄）穀桑。

（陸璣詩疏）楮桃（綱目）穀。（圖

經本草）斑殼（唐本草）

學名 Broussonetia Kassi-

noki Sieb.

基本 係屬桑科楮樹之實。

產地 陳仁山藥物生產辨云。

楮實子產江蘇蘇州之山野間。七

月新。

形態 楮為落葉灌木。高五六

尺。葉類桑而面粗糙。長四五寸。邊

緣有細鋸齒。花為單性。雌雄異株。

雄花長寸許。花穗下垂。呈黃白色。

雌花相聚作球狀。呈紫色。實大寸

許。類蛇莓（Indianstrawberry）

熟則作紅色。樹皮為製紙原料。



子實楮

採取 ①構樹花。獸藏人採食

以充饑。②楮實半熟時。採取蜜煎。

可作果食。③楮樹嫩芽。採之可當

菜茹。④楮實子成熟時。色深紅。每

年八九月採之。

製法 雷斅曰。採得後水浸三

日。攪旋投水浮者去之。曬乾。以酒

浸一伏時。了蒸之。從巳至亥。焙乾

用。又經驗方。煎法。六月六日。取穀

子五升。以水一斗。煮取五升。去滓

微火煎如錫用。

性質 甘寒。無毒。

效能 消水腫。壯筋骨。明目。輭

堅。用作強壯藥。

主治 陰痿水腫。益氣充肌。明

目。久服不飢。不老輕身。

歷代記述按證 【宋】大明日

華諸家本草論楮實子曰。壯筋骨。

助陽氣。補虛勞。又健腰膝。益顏

色。【明】經希雅本草經疏論楮實子

曰。楮實味甘。氣寒無毒。氣薄味厚。

陰也。降也。入足太陰經。其主水腫

益氣充肌膚者。脾為土臟。而主肌

肉。脾虛則肌肉不充。土虛則水溼

泛溢。甘為土化。能入脾堅土。則水

腫消。肌肉充。氣自益矣。明目者。目

得血而能視。脾旺自能生血也。陰

痿者。精氣竭也。脾實則能生精。而

灌注於腎。故陰自強也。補脾益氣

則五臟皆實。不饑耐老。輕身是其

驗矣。【明】李士材本草圖解論楮

實子曰。楮實甘平。益腎助陽。療腫

去水。能軟骨治痺。【清】黃宮繡本

草求真論楮實子曰。楮實書言味

甘氣寒。雖於諸臟陰血有補。得此

顏色。潤筋骨。壯腰膝。健肌肉。充水

腫消。以致陰痿起。陽氣助。是明指

其陽旺陰弱。得此陰血有補。故能

使陽不勝而助之。非云陽痿由於

陽衰。得此可以助陽也。若以純陰

之品。可以補陽。則於理甚不合矣。

況書又云。骨硬可用楮實煎湯。以

服。及紙燒灰存性調服。以治血崩

血暈。並用衙門牌紙燒吞。以斷婦

人生育。與脾胃虛人禁用。久服令

人骨癢。豈非性屬陰寒。虛則受其

益。過則增其害之意乎。輭骨之說

未嘗不是。取浸水中不浮者。酒蒸

用。

配合應用 ①治水氣蠱脹。楮

實子丸。以潔淨府。用楮實一斗。水

三升。熬成膏。伏者三兩。白丁香一

兩。半為末。以膏和丸。楮子大。從少

至多。至小便清利。腹減為度。後服

治中湯。養之。忌甘苦酸補及發動

之物。（活法機要方）

②治女子月經不絕。來無時者。

取案紙三十張。燒灰。以清酒半升

和調服之。頓定。導中血。羣服之。立

驗。已斷者。去板齒灌之。經一日亦

活。（劉禹錫傳信方）

③治癰瘰癧。用楮葉搗爛。傳上

云。榆。喬而柔故謂之榆。其粉則有分之道。故謂之粉。其莢飄零故曰零榆。李時珍云。此即今之榆樹取皮刮去上赤皮。亦可臨時用之。性至滑利。初生莢仁以作糜羹。令人多睡。嵇康所謂榆令人眠也。陶弘景云。榆三月實熟。尋即落矣。今云八月採實。恐誤也。蘇恭云。江東無大榆。有刺榆秋實。故經云。八月採者誤也。刺榆皮不滑利。陳藏器云。榆三月生莢。古人採仁以糜羹。今無復食者。惟用陳老實作醬耳。按爾雅疏云。榆類有數十種。葉皆相似。但皮及木理有異耳。刺榆有針刺如柘。其葉如榆。論為蔬羹。滑於白榆。即爾雅所謂樞莖。詩經所謂山有樞是也。白榆先生葉。却着莢。皮白色。二月剥皮。刮去粗皺。中極滑白。即爾雅所謂榆白粉是也。荒歲農人取皮為粉食之。當糧不損人。四月採實。蘇頌云。邢昺爾雅疏云。榆有數十種。今人不能盡別。惟知莢榆。白榆。刺榆。榔榆數者而已。莢榆白榆。皆大榆也。有赤白二種。白者名粉。其木甚高大。未生葉時。枝條間先生榆莢。

形狀似錢而小。色白成串。俗呼榆錢。後方生葉。似山茱萸葉而長尖。輪潤澤。嫩葉醃浸。淘過可食。故內則云。葦葢粉榆。兔蕒漚以滑之。三月採榆錢。可作羹。亦可收至冬釀酒。淹過晒乾。可為醬。即榆仁醬也。崔實月令謂之醬榆。音牟輪者。是也。山榆之莢名蕪莢。與此相近。但味稍苦耳。諸榆性皆屬地。故其下五穀不植。古人春取榆火。今人採其白皮為榆麵。水調和香劑。黏滑勝於膠漆。承曰。榆皮溼搗如糊。用黏瓦石極有力。汴洛人以石為確嘴。用此膠之。李時珍云。

【榆耳】 基本 本品即係榆樹上之木耳。

採取 八月採之。

主治 令人不飢。

參攷資料 八月榆樺。以美酒漬曝。同青梁米。紫苋實。蒸熟為末。每服三撮。酒下。令人辟穀不飢。淮南萬畢一。

【榆花】 主治 小兒痢疾。小便不利。傷熱。

性質 微辛。平。無毒。

【榆莢仁】 主治 作糜羹食。令

人多睡。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論榆仁曰。主婦人帶下。和牛肉作羹食。唐孟詵食療本草論榆仁曰。子醬似蕪莢。能助肺殺諸蟲。下氣。令人能食。消心腹間惡氣。卒心痛。塗諸瘡。以陳者良。

【榆葉】 性質 甘平。滑利。無毒。

主治 嫩葉作羹。及糜食。消水腫。利小便。下石淋。墜丹石。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論榆葉曰。煎汁洗酒。蠶鼻。同酸漿仁等分。蜜丸。日服。治膽熱。虛勞不眠。

參攷資料 榆葉曝乾為末。淡鹽水拌。或炙或曬乾。拌菜食之。亦辛滑下水氣。李時珍云。

【樛木】 古籍別名 吻頭。拾遺。鵲不踏。綱目。

外國名詞 *Aralia sinensis*。

基本 係五加科樛木屬。藥用樛木之白皮。

產地 生山野間。

形態 樛木為灌木類之落葉木本。幹高丈餘。莖與葉有銳刺。葉

為二回羽狀複葉。小葉甚多。卵形。花小。白色。花五瓣。雄蕊與花瓣同數。互生。圓錐花序。嫩枝嫩葉有芳香。

性實 辛。平。有小毒。

主治 水瀉。煮汁服。

參攷資料 樛木白皮能爛齒牙。有蟲者取片許。內牙中。當自爛落。陳藏器云。

【樛】 即蕪莢之木幹。生於山中。狀似榆葉。圓而厚。皮有細刺。性質效能與共。子實無異。詳蕪莢條。

【楮耳】 基本 本品即楮樹上之木耳。

主治 功同木耳。

【楮李】 即鼠李子之古籍別名。典見錢氏。詳鼠李子條。

【楮桃】 即楮實子之古籍別名。典見集簡方。詳楮實子條。

【楮紙】 命名 本品係用楮皮製成之紙。故名。



木 樛

利小便。作漿及煮水服之。治水蠱癰。外用能作潤皮劑。解炎。處方以榆皮一分切片。沸汽水十六分。共入有蓋器內。浸二點鐘。濾渣。外用能治大頭瘡。火眼。每服二兩至四兩。(榆皮漿方)又荷蘭藥鏡云。春日採榆樹細枝。去外面之粗皮。用裏面之白皮。惟過於細嫩之梢枝無效。藥舖清雅云。進口貨之榆白皮。非純白皮。乃連外皮售之。其功效。皮性收滯。爲愈瘡發汗之良藥。凡疥癬乾癬等不甚經久之症。並一切皮膚病。用之極有神效。或異常頑惡險重之疥癬。雖用水銀劑及吐涎法而不治者。用此則愈。方用榆皮八盎斯。水四磅。煎至減半。去滓。每日早晚服八盎斯。連服數日。煎時須慢火久熬。令不甚稠。黏名榆皮排毒煎。某醫云。患乾癬頑癬。禿瘡。惡毒頭瘡。雁瘡等經久之頑固皮膚病。用對症之藥劑。不驗。施水銀吐涎法不治者。改用此藥。無不有效。已治愈者。難儘指算。予用此方。略有加減。方用榆白皮四盎斯。水四磅。煎至減半。令服。但服後往往大便秘結。故時時兼用

緩下劑。又此藥煎濃。則藥汁稠黏。味惡難服。須如前述。則稍帶收斂之味。已耳。若製成越幾斯劑。收滯極甚。服此藥而奏效者。初時瘡反加甚。須久服。乃逐漸乾愈。世人每求速效。故旋服旋輟。果能持之以恆。耐心守候。則無不應驗。如神。惟受毒已深者。即幸而治愈。終恐復發。防遏之法。宜每逢春秋。連服前方數日。庶其毒可除淨也。

配合應用 ①斷穀不饑。榆皮、檀皮爲末。日服數合。(救荒本草方)

②治喘喘不止。榆白皮。陰乾。焙爲末。每日旦夜用水五合。末二錢。煎如膠服。(食療本草方)

③治久嗽欲死。許明則有效方。用厚榆皮。削如指大。長尺餘。納喉中。頻出入。當吐膿血而愈。(古今錄驗方)

④治虛勞白濁。榆白皮二升。水用三斗。煮取五升。分之五服。(千金方)

⑤治小便氣淋。榆枝、石燕子。煎水日服。(普濟方)

⑥治五淋澀痛。榆白皮。陰乾。焙

研。每以二錢。水五合。煎如膠。日二服。(普濟方)

⑦治渴而尿多。非淋也。用榆皮二片。去黑皮。以水一斗。煮取五升。一服三合。日三服之。甚效。(外臺祕要方)

⑧治身體暴腫。榆皮搗末。同米作粥食之。小便良。(備急方)

⑨治臨月易產。榆皮焙爲末。臨月日三服。方寸匕。令產極易。(陳承本草別說方)

⑩治墮胎下血不止。用榆白皮。當歸焙各半兩。入生薑水煎服之。(普濟方)

⑪治胎死腹中。或母病欲下胎。榆白皮黃汁服二升。(子母祕錄方)

⑫治身首生瘡。榆白皮末。油和塗之。蟲當出。(子母祕錄方)

⑬治火灼爛瘡。榆白皮嚼塗之。(千金方)

⑭治五色丹毒。俗名遊腫。犯者多死。不可輕視。以榆白皮末。鷄子白和塗之。(千金方)

⑮治小兒蟲瘡。榆皮末。和豬脂塗綿上覆之。蟲出立瘳。(千金方)

⑯治癰疽發背。榆皮白皮切。清水洗搗極爛。和香油傳之。留頭出氣。燥則以苦菜類潤。不黏更換新者。將愈以桑葉嚼爛。隨大小貼之。口合乃止。神效。(救急方)

⑰治小兒瘰癧。榆白皮生搗如泥。封之。類易。(必效方)

⑱治小兒瘰癧。醋和榆白皮末塗之。蟲當出。(產乳方)

用量 一錢半至三錢。

應用宜忌 凡脾胃虛寒而無

溼熱者禁用。

參攷資料 ①高昌人多搗白

皮爲末。和菜菔食甚美。令人能食。

仙家服。服丹石人亦服之。取利

關節故也。(孟詵)②榆皮榆葉性

皆滑利下降。手足太陽陽明經

是也。故人小便不通。五淋腫滿。喘

嗽不眠。經脉胎產諸證。宜之本草

十劑云。滑可去著。冬葵子榆白皮

之屬。蓋亦取其利竅。滲溼熱消留

著有形之物。爾氣盛而壅者。宜之。若胃寒而虛者。久服滲利。恐洩真氣。本經所謂久服輕身不饑。蘇頌所謂榆粉多食。不損人者。恐非確論也。(李時珍)③按王安石字說

【槲實】即烏梅之古籍別名。典見本經。詳「烏梅」條。

【棟子】即金鈴子之古籍別名。典見本經。詳「金鈴子」條。

【棟參】即人參之古籍別名。典見和漢藥考。詳「人參」條。

【棟連】即黃連之古籍別名。典見和漢藥考。詳「黃連」條。

【楞葱】即沙葱之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「沙葱」條。

【楠木】**命名** 本品乃南方之木故名。

古籍別名 楠（綱目）交讓木（植物學大辭典）散柏南（俗名）

外國名詞 Machilus Nanmu, Hemsl. (拉丁) ナンボク (日本)

基本 係樟科大樟屬。藥用楠之枝葉。

產地 生黔蜀諸地之山中。

形態 楠木爲香木類之常綠喬木幹直立。高者十餘丈。童叟如蓋。葉長橢圓形。新舊迭生。花開淡綠色或赤黃色。結實紫黑如丁香。木色赤者堅。白者脆。密緻芳香。可供棟梁器具之用。枝葉可供藥用。



性質 辛。微溫。無毒。

主治 霍亂吐下不止。煮汁服。歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草論楠木材與枝葉曰。煎湯洗轉筋及足腫。枝下同功。

楠木皮 **性質** 苦溫。無毒。

主治 霍亂吐瀉。小兒吐乳。暖胃正氣。并宜煎服。

【榆仁醬】 **古籍別名** 醬醢。（綱目）

採取 以陳久者入藥用。

製法 李時珍曰。造法。取榆仁水浸一伏時。袋盛。揉洗去涎。以麥汁拌晒。如此七次。同發過麵麴如造醬法。下鹽晒之。每一升麴四斤。鹽一斤。水五斤。

性質 辛。溫。無毒。

主治 利大小便。心腹惡氣。殺諸蟲。不宜多食。

【榆白皮】 **古籍別名** 零榆皮。（本經）白者名栲山

榆。（綱目）刺榆。（爾雅）

外國名詞 Ulmi Cortex

基本 屬榆科。爲春榆之枝皮。形態 春榆爲落葉喬木。多生於寒溼之地。老樹幹高十丈。周圍可一丈五尺。小樹之分枝向上。大樹則下垂。葉互生。作橢圓或倒卵圓形。未端尖。底部狹窄。如楔。邊緣有重鋸齒。大葉長三寸半。闊二寸。半面深綠。背淡綠。脈上有細軟毛。花先新葉而開。大約三四月間。已簇生。暗紫綠色之小花。花冠作鐘形。邊緣有四裂至八裂。單性花及兩性花俱有之。果實扁圓。大三四分。有似膜之翅。中藏扁平之種子。本品爲榆樹之內皮。色白。作扁平之長片。味帶收斂性。

採取 二月採皮。取白。曝乾。

製法 去粗皮。取白。剉焙用。

性質 甘平。滑利。無毒。

【清】黃宮繡本草求真論榆白皮曰。榆白皮與冬葵子性皆滑利。味亦相同。故五淋腫滿及胎產不下。皆宜服此以治。但榆有二種。曰赤曰白。白榆皮服能止喘除咳。而使人睡較之赤榆皮之除邪氣稍有不同。然其滑利則一。若脾胃虛寒服之恐損真耳。

【明】李時珍本草綱目論榆白皮曰。利關竅。滲溼熱。行津液。消癰腫。

【唐】甄權藥性本草論榆白皮曰。滑胎。利五淋。治麁喘。療不眠。【唐】孟詵食療本草論榆白皮曰。生皮搗和三年醋滓。封暴患赤腫。女人妬乳。腫日六七易效。【宋】大明日華諸家本草論榆白皮曰。通經脈。搗漚傳癰瘡。

【明】李時珍本草綱目論榆白皮曰。利關竅。滲溼熱。行津液。消癰腫。

【清】黃宮繡本草求真論榆白皮曰。榆白皮與冬葵子性皆滑利。味亦相同。故五淋腫滿及胎產不下。皆宜服此以治。但榆有二種。曰赤曰白。白榆皮服能止喘除咳。而使人睡較之赤榆皮之除邪氣稍有不同。然其滑利則一。若脾胃虛寒服之恐損真耳。

【明】李時珍本草綱目論榆白皮曰。利關竅。滲溼熱。行津液。消癰腫。

【清】黃宮繡本草求真論榆白皮曰。榆白皮與冬葵子性皆滑利。味亦相同。故五淋腫滿及胎產不下。皆宜服此以治。但榆有二種。曰赤曰白。白榆皮服能止喘除咳。而使人睡較之赤榆皮之除邪氣稍有不同。然其滑利則一。若脾胃虛寒服之恐損真耳。

【明】李時珍本草綱目論榆白皮曰。利關竅。滲溼熱。行津液。消癰腫。



皮 白 榆

效能 滲溼熱。通二便。用作利水及祛痰藥。

主治 大小便不通。利水道。除邪氣。久服斷穀。輕身不饑。其實尤良。（本經）療腸胃邪熱氣。消腫。治小兒頭瘡。疳疔。（別錄）

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論榆白皮曰。滑胎。利五淋。治麁喘。療不眠。【唐】孟詵食療本草論榆白皮曰。生皮搗和三年醋滓。封暴患赤腫。女人妬乳。腫日六七易效。【宋】大明日華諸家本草論榆白皮曰。通經脈。搗漚傳癰瘡。

【明】李時珍本草綱目論榆白皮曰。利關竅。滲溼熱。行津液。消癰腫。

【清】黃宮繡本草求真論榆白皮曰。榆白皮與冬葵子性皆滑利。味亦相同。故五淋腫滿及胎產不下。皆宜服此以治。但榆有二種。曰赤曰白。白榆皮服能止喘除咳。而使人睡較之赤榆皮之除邪氣稍有不同。然其滑利則一。若脾胃虛寒服之恐損真耳。

【明】李時珍本草綱目論榆白皮曰。利關竅。滲溼熱。行津液。消癰腫。

【清】黃宮繡本草求真論榆白皮曰。榆白皮與冬葵子性皆滑利。味亦相同。故五淋腫滿及胎產不下。皆宜服此以治。但榆有二種。曰赤曰白。白榆皮服能止喘除咳。而使人睡較之赤榆皮之除邪氣稍有不同。然其滑利則一。若脾胃虛寒服之恐損真耳。

【明】李時珍本草綱目論榆白皮曰。利關竅。滲溼熱。行津液。消癰腫。

【清】黃宮繡本草求真論榆白皮曰。榆白皮與冬葵子性皆滑利。味亦相同。故五淋腫滿及胎產不下。皆宜服此以治。但榆有二種。曰赤曰白。白榆皮服能止喘除咳。而使人睡較之赤榆皮之除邪氣稍有不同。然其滑利則一。若脾胃虛寒服之恐損真耳。

【明】李時珍本草綱目論榆白皮曰。利關竅。滲溼熱。行津液。消癰腫。

【清】黃宮繡本草求真論榆白皮曰。榆白皮與冬葵子性皆滑利。味亦相同。故五淋腫滿及胎產不下。皆宜服此以治。但榆有二種。曰赤曰白。白榆皮服能止喘除咳。而使人睡較之赤榆皮之除邪氣稍有不同。然其滑利則一。若脾胃虛寒服之恐損真耳。

【明】李時珍本草綱目論榆白皮曰。利關竅。滲溼熱。行津液。消癰腫。

【清】黃宮繡本草求真論榆白皮曰。榆白皮與冬葵子性皆滑利。味亦相同。故五淋腫滿及胎產不下。皆宜服此以治。但榆有二種。曰赤曰白。白榆皮服能止喘除咳。而使人睡較之赤榆皮之除邪氣稍有不同。然其滑利則一。若脾胃虛寒服之恐損真耳。

膏攤貼之。(儒門事親方)

①治諸瘡不合白膠香、輕粉、各二錢、豬脂和塗。(直指方)

②治一切惡瘡。水沉金絲膏。用白膠香、麝香各一兩。以麻油、黃蠟各二錢半同溶化。入冷水中。扯干。遍攤貼之。(儒門事親方)

③治惡瘡疼痛。風香、膩粉等分。爲末。漿水洗淨貼之。(壽親養老書方)

④治久近惡瘡。白膠香爲末。以酒瓶上築葉夾末貼之。(袖珍方)

⑤治小兒疥癬。白膠香、黃蘗、輕粉等分爲末。羊骨髓和傅之。(儒門事親方)

⑥治大便秘不通。白膠香、牛糞大。鼠糞二枚。研勻。水和作挺。納入肛門。良久自通。(普濟方)

⑦治年久牙疼。風香脂爲末。以香爐內灰和勻。每日搽擦。(危氏得效方)

⑧治魚骨哽咽。白膠香細細吞之。(聖惠方)

用量 八分至一錢半。
施用宜忌 凡無瘀滯者禁用。
參攷資料 ①風香松脂皆可

十三畫 楓

槭 楔 楸 楚 楷

亂乳香。但楓香微白黃色。燒之可見真偽。(寇宗奭) ①楓香松脂皆可亂乳香。其功雖次於乳香。而亦彷彿不遠。(李時珍) ②今南方及關陝甚多。樹甚高大。似白楊。葉圓而作歧。有三角而香。二月有花白色。乃連着。實大如鴨卵。八月九月熟時。曝乾可燒。南方草木狀云。楓實惟九真有之。用之有神。乃難得之物。其脂爲白膠香。五月斫爲坎。十一月採之。說文解字云。楓木厚。

葉弱枝善搖。漢宮殿中多植之。至霜後。葉丹可愛。故稱楓宸。任昉述異記云。南中有楓子鬼。木之老者爲人形。亦呼爲靈楓。蓋瘡癰也。至今越巫有得之者。以雕刻鬼神。可致靈異。(蘇頌) ③王瓊軒輅本紀云。黃帝殺蚩尤於黎山之邱。擲其械於大荒之中。化爲楓木之林。爾雅注云。其脂入地。千年爲琥珀。(韓保昇) ④楓木枝幹修偉。大者連數圍。其木甚堅。有赤有白。白者細膩。其實成毬。有柔刺。積含膏。楓實惟出九真者。不知卽此楓否。孫炎爾雅正義云。楓子鬼。乃攝木上寄生。枝高三四尺。天旱以泥塗之。



樹 楓

卽雨也。荀伯子臨川記云。嶺南楓木。歲久生瘤。如人形。遇暴雷大雨。則暗長三五尺。謂之楓人。宋齊丘化書云。老楓化爲羽人。數說不同。大抵癭瘤之說。猶有理也。(李時珍) ⑤

【楓寄生】卽楓上寄生之簡稱。詳『楓上寄生』條。

【楓脂】卽楓香脂之古籍別名。典見和漢藥考。詳『楓香脂』條。

【楓脂香】卽蘇合香之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蘇合香』條。

【楓菌】 性質 有毒。

參攷資料 楓菌食之。令人笑不止。地漿解之。(陶弘景)

【楓實】卽楓果之原名。詳『楓果』條。

【楓樹根及葉】 主治 癰疽。并以滓貼之。

已成。搗酒飲。

【槭葉】卽君遷子之古籍別名。典見千金食治。詳『君遷子』條。

【楔】卽櫻桃之別名。典見爾雅。詳『櫻桃』條。

【楸】卽木瓜之古籍別名。典見綱目。詳『木瓜』條。

【楚鳥】卽烏鴉之古籍別名。典見綱目。詳『烏鴉』條。

【楚雀】卽鶯之古籍別名。典見陸璣詩疏。詳『鶯』條。

【楚蕊】卽萊菔之古籍別名。典見圖經本草。詳『萊菔』條。

【楚菴子】卽萊菴子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『萊菴子』條。

【楚葵】卽水芹菜之古籍別名。典見爾雅。詳『水芹菜』條。

①卽紫葇之古籍別名。典見圖經本草。詳『紫葇』條。

【楚鳩】卽斑鳩之古籍別名。典見綱目。詳『斑鳩』條。

【楚衡】卽杜若之古籍別名。典見廣雅。詳『杜若』條。

【楚實】卽牡荊實之古籍別名。典見綱目。詳『牡荊實』條。

【楷】卽牡荊實之古籍別名。典見綱目。詳『牡荊實』條。

果條。

【楓柳皮】

產地 寄生楓樹間。
形態 楓柳爲寓木

類之一種。其葉似桃。莖赤根黃。結實六月成熟。色綠而細。其莖皮剝取可供藥用。

性質 辛大熱。有毒。

主治 風濕齒痛。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論楓柳皮曰。積年痛風不可忍。久治無效者。細剉焙。不限多少。入腦麝浸酒。常服以醉爲度。

【楓香脂】

命名 本品乃楓樹之脂。色白氣香。其狀

如膠。故又謂之白膠香。

古籍別名 白膠香（綱目）須

薩折羅婆香（金光明經）楓脂。楓

乳。楓人。楓皮。楓子。鬼雲香。（和漢

藥考）攝攝（爾雅）香楓（俗名）

外國名詞 Mastix（拉丁）

（德）Maechha（英）

基本 屬漆樹科。爲楓樹枝幹。

損傷處其脂滲出凝結之塊。

產地 凡中國南方及南歐北

非等處之山野岩谷間。恒有生焉。

形態 楓爲灌木。本產於中國

及南歐。北非等處。高一丈至丈五。

葉爲羽狀複葉。小葉形如披針。或爲長卵圓形。葉腋開極小之花。形

狀似房。後結小果。其成熟者。作紅褐色。其香脂作顆粒小者。如芝蔴

大者若小豆。形橢圓或卵圓。色黃似枸櫞。微透明。有時亦作灰褐等

色。比重約一・〇七四。質脆弱。破碎之面。光澤若玻璃。遇熱則發臭。

頗似拔爾撒謬。咀嚼之覺似蠟。其味苦。

採取 五月斫樹爲坎。十一月

製法 李時珍曰。凡用以蠶水

煮二十沸。入冷水中。揉扯數十次。

曬乾用。

用法 恒以到末和作丸散。

性質 辛苦平無毒。

成分 含有瑪斯知克酸約九

十分。及瑪斯知涅約十分。前者酒

精能溶解。後者酒精不能溶解。

效能 調氣血。消滯疰。止吐衄。

治瘡疥。用作收斂藥。爲外科要藥。

主治 癰瘡。風痒。浮腫。燙水浴

之。又生齒痛。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論楓香脂曰。一切癰疽

瘡疥。金瘡。吐衄。咯血。活血。生肌。止

痛。解毒。燒過。搽牙。永無牙疾。【明】

繆希雍本草經疏論楓香脂曰。楓

香脂味辛苦。氣平無毒。爲活血涼

血之藥。凡熱則生風。又血熱則壅

而發癰。癰風爲木化。風火相搏。則

爲浮腫。苦平能涼血熱。兼辛又能

散風。故主血熱生風之證。風火既

散。則肌肉和而浮腫自消。齒痛亦

因風熱上攻。風熱既散。則痛自止

矣。【清】黃宮繡本草求真論楓香

脂曰。楓香係楓膏脂所成。結而爲

香。故曰楓香。又曰白膠者。按楓性

最疎通。故木易蛀。外科用以透毒

金瘡。未數即效。筋斷即續。齒齦腫

痛。燒灰搽牙。甚工。咳嗽膿血。同藥

服之。即止。皆取透發病氣之意。故

能見其皆治也。以蠶水煮二十沸

入冷水中。揉扯數十次。曬乾用。

化爲樹脂。惟此藥並無凝固蛋白

質。及膠質之性。又手板發蒙曰。日

本之有楓樹。始自享保間。乃中國

種也。葉大。可四五寸。有三尖。夏末

結實。名楓林。楓香脂其樹脂也。名

白膠香。或單稱白膠。亦曰鹿角膠。

配合應用 ①治吐血不止。白

膠香爲散。每服二錢。新汲水調下。

（簡要濟衆方）

②治吐血衄血。白膠香。蛤粉等

分爲末。姜汁調服。（王璵百一選

方）

③治吐血咯血。用白膠香。銅青

各一錢。爲末。入乾柿內。紙包。煨熟。

食之。（濟衆方）又用白膠香。切片

炙黃。一兩。新綿一兩。燒灰。爲末。每

服一錢。米飲下。（聖惠方）

④治金瘡。斷筋。用楓香末。傅之。

（危氏得效方）

⑤治便難。膿血。白膠香一兩。爲

末。入麝香。輕粉。少許。搽之。（袖珍

方）

⑥治小兒奶疳。生面上。用楓香

爲膏。攤貼之。（活幼全書方）

⑦治療癰癰。白膠香一兩。化

開。以蓖麻子六十四粒。研入。待成

【楊梅樹皮及根皮】

全治 煎湯

洗惡瘡疥癬。

歷代記述攷證

【明】李時珍

本草綱目論楊梅樹皮及根皮曰
煎水漱牙痛服之解砒毒燒灰油
調塗湯火傷

配合應用

●治中砒毒。心腹
絞痛欲吐不吐。面青肢冷。用楊梅
樹皮煎湯二三盞服之即愈（王
碩易簡方）

●治風蟲牙痛。用楊梅根皮厚

者焙一兩。川芎麝五錢。麝香少許
研末。每用半錢。鼻內噤之。口中含
水。涎出痛止（普濟方）又用楊梅
根皮。韭菜根。樹案上油泥等分。搗
勻。貼於兩腮。上半時辰。其蟲從眼
角出也。屢用有效之方（摘要方）

【楊溪瓜】即西瓜之秋生冬熟者
功效較尋常西瓜良。詳「西瓜」條

【楊櫨】

本草 古籍別名 空疏（唐

外國名詞 Diervilla japon-

ica, DC. (拉丁) タニウツギ

ニウツギ (日本)


基本 保忍冬科楊櫨屬。爲楊

櫨之葉。

產地 生山野及離垣間。

形態 楊櫨爲灌木類之落葉

木本。高六七尺餘。葉大。對生。卵形
而尖。有鋸齒。下面生毛。六月間開
花。合瓣花序。甚長。帶赤色。花冠之
筒上部膨大。花柱亦長。而略短於
花冠。雄蕊五。雌蕊一。常以數花攢
簇。而生。結實爲莢果。其葉可供藥
用。



楊櫨

性質 苦寒。有毒。

主治 疽瘰。惡瘡。水黃汁洗之。

立瘥。

【楊櫨耳】

基本 本品係楊櫨

性質 平。無毒。

主治 老血結塊。破血止血。養

服之。

【楓人】即楓香脂之古籍別名。典

見和漢藥考。詳「楓香脂」條。

【楓子鬼】即楓香脂之古籍別名。

典見和漢藥考。詳「楓香脂」條。

【楓上寄生】

原名 風木藤

古籍別名 吊

殺網絲。上樹獨絲。鐵角絲兒（綱

目拾遺）

基本 係屬漆樹科。爲楓樹枝

節處附着之寄生植物。

形態 楓上寄生。即楓樹間之

蔓藤。年遠結成連珠如傀儡者。可

供藥用。

主治 追風。蒸酒服。爲治癱瘓

勾急之要藥。同金雀根。土當歸。石

牀花根。石蠶蒸酒服。

【楓木上蠶】即楓果之別名。典見

綱目。詳「楓果」條。

【楓木皮】

性質 辛。平。有小毒。

主治 止水痢。煎飲。

歷代記述攷證

【宋】大明諸

家本草論楓木皮曰。止霍亂。刺風。

冷風。煎湯浴之。

參攷資料 楓皮性溫。能止水

痢。蘇恭云。下水腫。水腫非藥所

療也（陳藏器）

【楓皮】即楓香脂之古籍別名。典

見和漢藥考。詳「楓香脂」條。

【楓乳】即楓香脂之古籍別名。典

見和漢藥考。詳「楓香脂」條。

【楓果】

原名 楓實

命名 本品即楓樹所

結之果實。故名。

古籍別名 攝子。路路通。（綱

目拾遺）九空子（俗名）

形態 楓果外有刺球如栗殼。

內有核多孔穴。如蜂巢。可供藥用。

採取 以產浙江臨安及安樂

山者良。入藥尤以無蟲耐久者用。

主治 辟瘴。卻癰。明日除濕。舒

經絡。拘攣。周身痺痛。手足及腰痛

焚之。嗅其烟氣。皆愈。熏衣被。可除

蛋。

配合應用 ●治癰。楓木上蠶

十個。燒灰存性。白砒五釐。共末。香

油擦上即愈（德勝堂方）

●治賊毒。路路通一個。楓存性。

研末。酒煎服（古今良方）

參攷資料 楓果俗名路路通。

村姬贊於疑云。可明目。宜老焚之。

香。郁可燻衣辟邪。出雲南者焚之。

殺鬼。去邪辟瘴。而其性大能通

十二經穴。故治水腫。服用之。以其

能逐伏水也（綱目拾遺）

【楓香果】即楓果之別名。詳「楓

綱目。詳「白朮」條。

【楊柳】即柳之古籍別名。典見綱目。詳「柳」條。

【楊桐】即南天燭之古籍別名。典見綱目。詳「南天燭」條。

【楊家果】即楊梅之古籍別名。典見和漢藥考。詳「楊梅」條。

【楊梅】
命名 本品形如水楊子而味酸似梅故名。

古籍別名 杔子（綱目）火實。

火齊金丸楊果龍睛楊氏子楊家果鵝頭紅鵝頂紅日精膏公（和漢藥考）

外國名詞 Myrica rubra, (拉丁)

基本 屬楊梅科。為楊梅之果實。

產地 凡山野川谷間恒有產焉。

形態 楊梅為常綠樹。產暖地。寒冷處鮮有之。樹高二丈餘。葉作倒卵圓形。或長橢圓形。彼此互生。初夏開褐色小花。雄雌異株。而生入秋則結核果。球圓形。色帶白。或紅紫。大三四分許。外有無數之乳頭突起。厥狀頗似蛇莓。味酸甘。樹

皮頗厚。外現黃灰黑色。有縱裂之淺溝。內作暗褐色。味具收斂之性。入水煎之。則得紅褐色之液汁。其中含有鞣酸及黃色素等。



楊梅

採取 五月採實。

性質 酸甘溫。無毒。

效能 用為收斂藥。及調氣和胃藥。

主治 鹽藏食。去痰。止嘔。噦。消食。下酒。乾作屑。臨飲酒時服方寸匕。止吐瀉。

歷代記述攷證 【宋】孟詵食療本草論楊梅曰。止渴。和五臟。能

療腸胃。除煩。憤惡。氣。燒灰。服。斷下痢。甚驗。鹽者。常含一枚。咽汁。利五

臟下氣。【清】王士雄隨息居飲食譜論楊梅曰。楊梅甘酸溫。宜鹽鹽

少許。食。析。醒止渴。活血消痰。瀉腸胃。除煩。瀉惡。氣。鹽藏蜜漬。酒浸。糖

收。為。脯。為。乾。消。食。止。痢。大。而。純。甜。者。勝。多。食。動。血。酸。者。尤。甚。諸。病。挾

熱者忌之。

國外學說 本草食鑑曰。楊梅實氣味酸甘溫無毒。主治消食止

嘔及渴。瀉腸胃。除惡氣。又大和本草曰。楊梅五月實。熟實大色紫黑。

味甘美。本草云。鹽藏食之。能去疾。止嘔噦。消食。下酒。常含鹹楊梅一

枚。利咽汁。五臟下氣。人家多儲之。配合應用 治下痢不止。用

楊梅燒研。每米飲服二錢。日二服。（普濟方）

治頭痛不止。楊梅為末。以少許。嚥鼻。取嚏。妙。

治頭風作痛。楊梅為末。每食後。薄荷茶服二錢。或以消風散同煎服。或同搗末。以白梅肉和丸。彈

子大。每食後。葱茶嚼下一丸。（朱氏集驗方）

治一切損傷。止血生肌。令無癰痕。用鹽藏楊梅和核搗如泥。微

成。挺子。以竹筒收之。凡遇破傷。研末。傳之。神聖絕妙。（經驗方）

參攷資料 楊梅生江南嶺南山谷。樹若荔枝。樹而葉細。陰青。

子形似水楊子。而生青熟紅。肉在核上。無皮壳。四月五月採之。南人

醃藏為果。寄至北方。馬志）楊梅樹葉如龍眼及紫瑞香。冬月不凋。二月開花。結實。形如椿實。子五

月熟。有紅白紫三種。紅勝於白。紫勝於紅。顆大而核細。鹽藏蜜漬。傳

收。皆佳。東方朔林邑記云。邑有楊梅。其大如盃。盤青時極酸。熟則如

蜜。用以釀酒。號為梅香。耐甚珍重。之。贊寧物類相感志云。案上接楊

梅。則不酸。楊梅樹生瘴。以甘草釘釘之。則無苦。物理之妙也。（李時珍）

熱微毒久食令人發熱。損齒及筋。忌生葱同食。（玉璣說）

【楊梅青】即空青之古籍別名。典見綱目。詳「空青」條。

【楊梅核仁】
採取 以梯漆拌核曝之。則核自裂。取仁用。

主治 腳氣。

【楊梅樹皮及根】
主治 煎湯洗疥癬。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論楊梅樹皮及根曰。煎

水。漱牙痛。服之。解蛇毒。燒灰。油調塗。湯火傷。

盡者禁用。

參攷資料 ①椿根白皮性涼而能瀉血凡濕熱為病瀉痢濁帶精滑夢遺諸證無不用之有燥下

⑤治下利清血腹中刺痛椿根白皮洗刮曬研醋和丸梧子大每空心米飲下三四十丸一加蒼朮枳殼減半(經驗方)

⑥治臟毒下痢赤白用香椿洗刮取皮日乾為末飲下一錢立效(經驗方)

⑦治臟毒下血溫白丸用椿根白皮去粗皮酒浸曬研棗肉和丸梧子大每淡酒服五十丸或酒糊丸亦可(儒門事親方)

⑧治血痢下血臘月日未出時取背陰地北引椿根皮東流水洗淨掛風處陰乾為末每二兩入寒食麵一兩新汲水丸梧子大陰乾每服三十丸水煮滾傾出溫水送下忌見日則無效名如神丸(普濟方)

⑨治脾毒腸風因營衛虛弱風氣襲之熱氣乘之血滲腸間故大便下血用吳椿根刮去粗皮焙乾四兩蒼朮米泔浸焙枳殼麩炒各一兩為末醋糊丸如梧子大每服五十丸米飲下日三服(本事方)

用薑錢半至三錢
施用宜忌 凡陰虛而積滯未

十三畫 椿

楊

東呼為虎目樹亦名虎眼謂葉脫處有痕如虎之眼曰又如楊蒲子故得此名(李時珍)⑩二木南北皆有之形幹大抵相類但椿木實而葉香可噉椿木疏而氣臭膳夫亦能熬去氣並採無時椿木最為無用莊子所謂吾有大木人謂之樗其木擁腫不中繩墨小枝曲拳不中規矩者爾雅云枲山樗郭璞註云枲以樗色小白生山中因名亦類漆樹俗語云樗樗漆漆相似如一陸機詩疏云山枲與山樗無異葉差狹爾吳人以葉為茗(蘇頌)⑪樗之有花者無莢有莢者無花其莢夏月常生吳樗上未見椿上有莢者然世俗不辨椿樗之異故呼樗莢為椿莢爾(掌禹錫)⑫椿樗乃一木三種也椿木皮細肌實而赤嫩葉香甘可茹椿木皮粗肌虛而白其葉臭惡獸年人或採食樗木即樗之生山中者木亦虛大梓人亦或用之然爪之如腐朽故古人以為不材之木不似椿木堅實可入棟樑也(李時珍)

【椿樗莢子】

古醫別名 風眼草(綱目)

主治 腸風便血小便下血療骨腫

【椿樗葉】

性實 苦溫有小毒
風疳樗木根葉尤良

歷代記述攷證

【明】李時珍

本草綱目論椿樗葉曰白壳不生髮取椿桃柳葉心搗汁頻塗之

參攷資料

⑬椿葉無毒椿葉有小毒(李時珍)⑭椿樗之嫩芽

淪食消風祛毒(生生編)⑮椿芽多食動風薰十二經脈五臟六腑

令人神昏血氣微若和豬肉熱麵類食則中滿蓋擁經絡也(孟詵)

【楊氏子】即楊梅之古籍別名典見和漢藥考詳「楊梅」條

【楊妃垢】即古鏡鑷之古籍別名典見綱目詳「古鏡鑷」條

【楊妃粉】產地 出陝西西安府馬嵬坡上土

三尺再下有此粉風光潔淨

【楊果】即楊梅之古籍別名典見和漢藥考詳「楊梅」條

【楊杞】即白朮之古籍別名典見

十三畫 椿

效能。燥溼。清熱。瀉腸。固下。專作收斂藥。

主治 疳瘻。椿根尤良。

歷代記述攷證 【南北朝】雷

敦雷公炮炙論椿樗白皮曰利瀉。【唐】陳藏器本草拾遺論椿樗白皮曰去口鼻疳蟲殺蛇蟲疥瘻鬼疰傳尸蠱毒下血及赤白久痢。【唐】蕭炳四聲本草論椿樗白皮曰得地榆止疳痢。【宋】大明日華諸家本草論椿樗白皮曰止女子血崩產後血不止赤帶腸風瀉血不住腸滑瀉縮小便蜜炙用。【元】朱丹溪本草衍義補遺論椿樗白皮曰治赤白濁赤白帶溼氣下痢精滑夢遺燥下溼去肺胃陳積痰。【明】繆希雍本草經疏論椿樗白皮曰椿味苦有毒甄權言微熱震亨言涼而燥然考其用必是微寒苦燥之藥入手足陽明經本經主甘瀉及洗疥瘡風疽藏器去口鼻疳蟲疥瘻者因腸胃有溼熱故現是證苦涼而燥所以外治皆得也藏器又主殺蛇蟲蠱毒下血及赤白久痢日華子主腸風瀉血蕭炳云得地榆主疳痢孟詵云止女子

血崩及產後血不止赤帶皆取其苦能燥溼寒能除熱瀉能收斂之功耳探得去粗皮蜜炙用。【明】李

士材本草圖解論椿樗白皮曰椿白皮苦而微溫專以固攝為用故瀉痢腸風遺濁崩帶者並主之然必病久而滑始為相宜若新病蛋服強勉固澀必變他症而成痼疾矣凡用刮去粗皮生用則能通利酸醋炙即能固澀

國外學說 英美學說謂臭樗產中國印度國取該樹根皮可為藥品第藥肆中所出售者則係此樹皮而非純根皮其功用能開胃收斂驅蟲處方以臭樗根皮一分沸水二十分泡兩點鐘濾渣為度每服一兩至二兩。【臭樗泡水平方】又臭樗鮮根皮汁三分濃酒一分和勻候七天過淋紙為度宜存陰涼處每服二錢一分至三錢一分半。【臭樗汁方】配合應用 ①治下血經年椿根白皮三錢水一盞煎七分入酒半盞服。【存仁方】 ②治小兒疳瘻困重者用椿根白皮搗粉以水和藥作大饅飩子

日曬少時又搗如此三遍以水煮熟空腹吞七枚重者不過七服愈。【外臺秘要方】

③治小兒疳疾椿根白皮日乾二兩為末以粟米淘淨研濃汁和丸梧子大十歲兒二四丸米飲下量大小加減仍以丸納竹筒中吹入鼻內二度良。【子母祕錄方】 ④治下利清血腹中刺痛椿根皮洗刮曬研醋糊丸梧子大空心米飲下三四十九。【經驗方】 ⑤治產後腸脫不能收拾者椿根取皮焙乾一握水五升連根葱五莖漢椒一握同煎至三升去渣傾盆內乘熱熏洗冷則再熱一服可作五次用洗後睡少時忌酸醃醬麵發風毒物及用心勞力等事。【婦人良方】

⑥治女人白帶椿根白皮滑石等分為末粥丸梧子大空腹白湯下一百丸。【丹溪方】 ⑦寇宗奭云洛陽一女子年四十六七耽飲無度多食魚蟹畜毒在臟日夜二十三十瀉大便與膿血雜下大腸連肛門痛不堪忍醫以止血痢藥不效又以腸風藥則益甚。蓋腸風則有血無膿如此半年氣血漸弱食減肌瘦服熱藥則腹愈痛血愈下服冷藥則注泄食減服溫平藥則病不知如此期年垂命待盡或人教服人參散一服知二服減三服膿血皆定遂常服之而愈其方治大腸風虛飲酒過度挾熱下痢膿血痛甚多日不瘥用椿根白皮一兩人參一兩為末每服二錢空心米飲調服忌油膩麵青菜菜子甜物雞豬魚羊蒜薤等

一四四六

⑧治休息痢疾日夜無度腥臭不可近臍腹撮痛東垣脾胃論用椿根白皮調黎勒各半兩母丁香三十箇為末醋和丸梧子大每服五十九米飲下又用椿根白皮束南行者長流水內漂三日去黃皮稍為末每一兩加木香二錢粳米飯為丸每服一錢二分空腹米飲下。【唐鑑經驗方】 ⑨治水穀下痢及每至立秋前後即患痢兼腰痛取椿根一大兩搗篩以好麵捻作饅飩如早子大水煮熟每日空心服十枚並無禁忌神良。【劉禹錫傳信方】

桐灰 隨左右吹之。(黎居士方)

①治血崩不止。燒桐皮。燒存性。空心淡酒服三錢。一方加煨白礬等分。(婦人良方)

②治血淋不止。燒桐皮。半燒半炒。爲末。每服二錢。其效。(衛生家寶方)

③治下血不止。燒桐皮。半斤。括一箇。燒灰。每服二錢。米飲調下。(百一選方)

④治水穀痢下。燒桐皮。燒研水服方寸匕。(近效方)

⑤治小便不通。燒皮。毛燒存性。以水酒服二錢。卽通利。累試甚驗。(攝生方)

用量 錢半至二錢。

施用宜忌 凡無瘀滯及有實邪者禁用。

參攷資料 ①燒皮。燒黑。治婦人血露。及婦人吐血。須佐以他藥。

(寇宗奭) ②燒灰性澀。若失血過多。瘀滯已盡者。用之切當。所謂澀可去脫也。與亂髮同用。更良。年久敗。燒入藥尤妙。(李時珍) ③燒桐川。廣甚多。今江南亦種之。最難長。初生葉如白。葉高二三尺。則木

十三畫 櫻

櫻 椿

端數葉。大如扇。上變四散。歧裂。其莖三稜。四時不凋。其幹正直。無枝。近葉有皮裹之。每長一層。卽爲一節。幹身赤黑。皆筋絡。宜爲鑪杵。亦可旋爲器物。其皮有絲毛。錯縱如織。剝取縷解。可織衣帽。椅椅之屬。大爲時利。每歲必兩三割之。否則樹死。或不長也。三月於木端莖中出數黃苞。苞中有細子。成列。乃花之孕也。狀如魚腹。孕子。謂之櫻魚。亦曰櫻筍。漸長出苞。則成花穗。黃白色。結實纒纒。大如豆。生黃熟黑。甚堅實。或云南方此木有兩種。一種有皮絲。可作繩。一種小而無絲。惟葉可作帚。鄭樵通志以爲王簪者。非也。王簪乃落蒂之名。卽地膚子。別有蒲葵。葉與此相似。而柔薄。可爲扇笠。許慎說文以爲櫻櫚亦誤矣。(李時珍)

【櫻櫚子及花】 古籍別名 子嫩者名櫻筍。(綱目)

性質 苦。澀。平。無毒。

主治 瀉腸。止瀉痢。腸風。崩中帶下。及養血。

參攷資料 ①櫻櫚子有小毒。

載人喉。未可輕服。(陳藏器) ②櫻櫚子。溫。有大毒。不堪食。(李珣) ③櫻魚。皆言有毒。不可食。而廣蜀人蜜麥醋浸。以供佛寄遠。蘇東坡亦有食櫻筍詩。乃制去其毒爾。(李時珍)

【櫻櫚】 卽櫻櫚之俗名。詳「櫻櫚」條。

【櫻桑】 卽楮之古籍別名。典見陸機詩疏。詳「楮」條。

【楮聖】 卽摹擬之古籍別名。典見和漢藥考。詳「摹擬」條。

【椿】 卽椿樹。白皮之簡稱。詳「椿樹白皮」條。

【椿根白皮】 卽椿樹白皮之處方用名。詳「椿樹白皮」條。

【椿樹白皮】 原名 香者名椿樹名。椿臭者名椿山。

處方用名 椿根白皮。臭椿皮。香椿皮。

古籍別名 大眼桐。(綱目) 虎目樹。山椿虎眼。(綱目拾遺)

外國名詞 Alantulus glandulosa, Desf.

基本 屬棟科香椿之根皮。

產地 陳仁山藥物生產辨云。椿白皮產直隸西山齊堂地方。收成限於五月初一至十五日爲止。過此時期。則難以剝削也。

形態 香椿爲落葉喬木。高達三四丈。葉爲羽狀複葉。小葉作平滑長橢圓形。前端尖。嫩時呈紅色。與枝俱有氣味。五六月間。開五瓣小白花。後結黃褐色鐘狀實。根皮厚。作淡褐色。內面有布紋。藥舖往往有以山茶花根皮混充者。

採取 五月間剝採木皮及根皮。陰乾。

製法 雷斅曰。凡使椿根皮。須用不近西頭者。爲上。採出以生蔥拌。蒸半日。剝細。以袋盛掛屋南畔。陰乾用。李時珍曰。椿樹木皮根。並刮去粗皮。陰乾。臨用時。切焙入用更佳。

性質 苦。澀。無毒。



椿 樹 白 皮

十三畫 椰

檳 櫚

性質 甘。溫。無毒。

主治 止消渴。塗頭益髮令黑。

歷代記述攷證 【唐】李珣海

藥本草論椰子漿曰。治吐血水腫。

去風熱。

參攷資料 ①椰子漿性熱。故

飲之者多昏如醉狀。異物志云食

其肉則不饑。飲其漿則增渴。(李

時珍) ②椰子生海南極熱之地

土人賴此解夏月毒渴。天之生物

各因其材也。(朱丹溪)

椰子膏

基本 本品係以椰

子殼熬成黑色之膏

主治 塗癬疾。

【椰中酒】即椰子漿之俗名。詳「

椰根皮

製法 實皮亦可入

性質 苦。平。無毒。

主治 煮汁飲。止吐衄霍亂。燒

研。新汲水服。止卒心痛。

椰樹油

基本 本品即椰樹

主治 祛暑止渴。療齒痛。烏髭

髮。塗凍瘡。

【櫻】①即木槿之古籍別名。典見

爾雅。詳「木槿」條。②即柚之古籍

別名。典見綱目。詳「柚」條。

【櫻魚】即櫻櫚子之古籍別名。典

見綱目。詳「櫻櫚子」條。

【櫻荷】①即櫻櫚子之古籍別名。

典見綱目。詳「櫻櫚子」條。②即櫻

櫚子之嫩者。詳「櫻櫚子及花」條。

主治 赤白帶。腸紅血

功同當歸。

參攷資料 滇南各甸土司記

櫻櫚產騰越州外各土司中。穴居

櫻櫚木中。食其根脂汁。狀如海參

粗如臂。色黑。土人以爲珍饈。土司

餽貴客。必向各峒丁索取此蟲作

供。連櫻木數尺解送。剖木取之作

羹。味絕鮮美。肉亦堅韌。而腴。絕似

遠東海參。云食之增髓益血。尤治

帶下。彼土婦人無患帶者。以食此

蟲也。(趙韞軒)

櫻櫚

命名 本品皮中毛穠

如馬之鬣。故名。

處方用名 棕櫚皮。棕櫚炭。

古籍別名 桄櫚。綱目。櫻櫚。

棕櫚。俗名。子名櫻荷。或櫻

外國名詞 Trachycarpus

excelsae, Wendl. (拉丁) 木

口(日本)

基本 係櫻櫚科。爲櫻櫚之樹

皮。

產地 凡暖地山野及川廣諸

地均有出。



櫻 櫚

形體 櫻櫚爲常綠喬木。幹直

立。似圓柱。高二三丈。無枝條。幹之

周圍全面。留有舊葉柄之基脚部。

徑四寸至八寸。葉甚大。作掌狀分

裂。有長柄叢生。幹端外向。四面花

小。色淡黃。集生於分枝之花軸上。

由苞以包被之。其苞大。色亦淡黃。

雄花形如粟粒。雌花結實。呈核果

狀。大似豌豆。其在葉之基部。而包

幹之皮中。有絲毛。頗強韌。稱爲櫻

毛。可供器具。繩帶。箱篋之材料。其

皮月生一瓣。歲生十二瓣。如當閏

界紋。且瓣無完成者。與常瓣有別。

稱爲閏月櫻櫚皮。

採取 九月十月間。採皮陰乾。

製法 大明曰。凡使櫻櫚皮。宜

燒存性用。

性質 苦。澇。平。無毒。

效能 瀉腸固脫。瀉熱止血。專

作收斂藥。

主治 止鼻衄吐血。破癥。治腸

風赤白痢。崩中帶下。

歷代記述攷證 【唐】李珣海

藥本草論櫻櫚皮曰。主金瘡疥癬

生肌止血。【明】經希雍本草經疏

論櫻櫚皮曰。櫻櫚皮味苦澇。氣平

無毒。本經主諸病。皆燒灰用者。凡

血得熱則行。得黑灰則止。故主鼻

衄吐血。苦能瀉熱。澇可去脫。故主

崩中帶下。及腸風赤白痢也。止血

固脫之性。而能消瘀血。故能破癥

也。凡失血過多。內無瘀滯者。用之

切當。與亂髮灰同入更良。如暴得

吐血。瘀滯方動。暴得崩中。惡露未

竭。溼熱下痢。初發。腸風。帶下方。熾

年久敗者良。

配合應用

①治鼻血不止。櫻

名。典見綱目。詳「海松子」條。

【新羅參】即荊芥之古籍別名。典見綱目。詳「荊芥」條。

【新羅參】即高麗參產於朝鮮新羅地方者。詳「高麗參」條。

【新羅葛】即王瓜之古籍別名。典見和漢藥考。詳「王瓜」條。

【新羅薄荷】即連錢草之古籍別名。典見和漢藥考。詳「連錢草」條。

【暈石】產地 生海底。

一種。狀如石紫褐色。乃海中鹹水所結成。自然生暈。可供藥用。

性質 鹹寒。無毒。

主治 石淋。磨汁飲之。或燒赤投酒中飲。

【會及】即五味子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「五味子」條。

【會州白藥】形態 會州白藥為蔓草類之一種。葉如白紙。可供藥用。

主治 療金瘡。止血生肌。碎末傳之。

【椰子】古籍別名 越王頭。胥餘。綱目。南洋椰子。錫蘭椰子。西貢椰子。鳳凰椰子。帝王

椰子。胥耶。(植物學大辭典)

外國名詞 Cocos nucifera, (拉丁) ヤシ ボンヤシ ヤシホ ヤギ(日本)

基本 係棕櫚科椰子屬。為椰子之子。其子皮子殼。子葉油膏。肉根皮。詳見各該條。

產地 亞非利加洲與東印度為原產地。凡熱帶諸處皆有之。

形態 椰子為喬木類之常綠。木本。幹高五丈。或十丈。圍三尺許。葉大。羽狀分裂。叢生於樹幹頂上。花單性。雌雄同株。果實每年生數十枚。長形。有三稜。長八九寸。徑四五寸。大如斗。狀似瓠。繫房房相連。一房二十八實。或三十實不等。有黃毛。賴皮。甚粗厚。苞包之。即椰衣。中有殼。類似檳榔。殼上有二穴。殼中似嘉臘。肉極甘。脆。白如雪。核圓黑。堅潤。長三寸。與膚肉皆緊着於皮。中空有清液。甘美而有酒氣。

可製酒。木材堅緻。可供建築。其類可入藥用。

採取 六七月間實熟時採之。

性質 甘平。無毒。

主治 益氣。

歷代記述 陸遊【明】汪穎食物本草論椰子。曰。治風。【明】李時珍本草綱目論椰子。曰。令人面澤不饑。

【椰子皮】製法 蘇頌曰。不拘時月。採其根皮。入藥。

性質 苦平。無毒。

主治 止血。療鼻衄。吐逆霍亂。

養汁飲之。

歷代記述 陸遊【明】李時珍本草綱目論椰子皮。曰。治卒心痛。燒存性。研。以新汲水服一錢。極驗。

【椰子油】基本 本品係用椰子子果核榨取之油。

外國名詞 Oleum Cocos, (拉丁) Cocoa-nut Oil Corps Oil, (英) Kokosnussol, (德)

形態 椰子油為類似豚脂之脂肪油。色白。或微帶黃。帶一種臭氣。比重〇・八一至〇・八三。凝

固點十六至十八度。融解點二十四至二十八度。酒精難於溶解。置空氣中。易於變性。

製法 壓榨果核。絞出其油。或與水同煮。候沸。將浮於液面之油。放冷。收取。是為粗製油。若更將粗製油。融解。加熱。通以蒸汽。除淨揮散之分。再加白土。細細攪拌。更用熱水洗滌。收取其油。即成精製油。

成分 椰子油中含加布洛酸(Caproic Acid.) 加布勒克酸(Caprylic Acid.) 老迦克酸(Lauric Acid.) 迷利歐克酸(Myristic Acid.) 薄爾密克酸(Palmitic Acid.) 諸成分。因以構成。便利失林與伊打。

主治 塗擦皮膚。腫脹變硬。及疥癬癰疾。

【椰子肉】主治 益氣生風。筋骨疼痛。楊梅下疳。

主治 楊梅瘡。筋骨痛。燒存性。臨時炒熱。以滾酒泡服二三錢。暖酒取汗。其痛即止。神驗。

【椰子漿】古籍別名 椰中酒。(俗名) 樹頭酒。



椰子

『天龍骨』條。

【嫁茄】即茄子之古籍別名。典見綱目。詳『茄子』條。

【鹽蘗酸】即石蒜之古籍別名。典見綱目。詳『石蒜』條。

【風盤蟲】即行夜之古籍別名。典見本草集註。詳『行夜』條。

【盧藥】基本 盧藥爲雜草類之一種。莖如乾茅色帶黃赤。可供藥用。

性質 鹹溫。無毒。

主治 折傷內損瘀血。生膚止痛。治五臟。除邪氣。補虛損。產後血病。水瀉服。亦可搗傳。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論盧藥曰。治墜馬內損。取末一兩。牛乳一錢煎服。

古籍別名 臺藁。藁薇。

性質 辛熱。無毒。

主治 胃中冷吐水。不下食。歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論廉薑曰。溫中下氣。消食益智。

參攷資料 ●廉薑似薑。生嶺南劍南。人多食之。〔陳藏器〕●按

異物志云。生沙石中。似薑。大如蕨氣。猛近於臭。南人以爲蠱。其法。陳皮以黑梅及鹽汁漬之乃成也。又鄭樵云。廉薑似山薑而根大。〔李時珍〕

【葉皮】即刺蝟皮之古籍別名。典見爾雅。詳『刺蝟皮』條。

【薇莖】即藟本之古籍別名。典見別錄。詳『藟本』條。

【愛老】即佛桑花重臺者之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『佛桑花』條。

【愛韭】即麥門冬之齊名。典見綱目。詳『麥門冬』條。

【感米】即苡仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳『以仁』條。

【感藤】即甘藤之古籍別名。典見綱目。詳『甘藤』條。

【懷火】即景天之古籍別名。典見本經。詳『景天』條。

【搖車】即翹搖之古籍別名。典見爾雅。詳『翹搖』條。

【搜山虎】即羊躑躅根之古籍別名。典見綱目。詳『羊躑躅』條。

【搜夾子】即蠼螋之古籍別名。詳『蠼螋』條。

【搜籬】即吳茱萸之古籍別名。典見和漢藥考。詳『吳茱萸』條。

【槌胡根】性質 甘寒。無毒。主治 潤五臟。止消渴。除煩去熱。明目功用與麥門冬相等。

參攷資料 生江西南川谷陸地。苗如萱草。其根似天門冬。凡用抽去心。〔陳藏器〕

【搬藍】即茄連之古籍別名。詳『茄連』條。

【新坑砂】即硃砂之古籍別名。典見綱目。詳『硃砂』條。

【新汲水】命名 本品即井中新汲之水。故名。主治 消渴。反胃。熱痢。熱淋。小便赤澀。卻邪。調中。下熱氣。並宜飲之。射瀝腫令散。洗漆瘡。治墜損腸出。冷噴其身。面則腸自入也。又解閉口。椒毒。下魚骨。哽。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論新汲水曰。解砒石烏喙。燒酒。煤炭。馬刀毒。治熱悶昏。瘡煩渴。

參攷資料 凡飲水瘵疾。皆取新汲清泉。不用停污濁。暖。非直無

效。亦且損人。虞搏曰。新汲井華水。取天一眞氣。浮於水面。用以煎補陰之劑。及鍊丹。煮茗。性味同於雪水也。〔掌禹錫〕

【新葶】即肺那之別名。典見藥物大成。詳『番瀉葉』條。

【新麻布】命名 本品係麻質所織之新布。故名。主治 能逐瘀血。婦人血閉。腹痛。產後血痛。以數重包白鹽。一合。煨研。溫酒服之。

【新會皮】即橘皮之處方用名。詳『橘皮』條。

【新會橙】即橙之產於廣東新會縣者。在橙類中爲最佳。詳『橙』條。

【新絲綿】主治 五野鷄病。燒灰。每服二錢。

【新雉木】形態 新雉木爲雜木之一種。結實如桃。可供藥用。

採取 七月採陰乾用。性質 苦溫。無毒。主治 風眩頭痛。煎湯沐之。

【新羅白肉】即白附子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『白附子』條。

【新羅松子】即海松子之古籍別

之內。

性質 甘。酸。溫。平。無毒。

主治 作藥食。治風寒溼痺。五緩六急。安胎。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食

療本草論黑雌雞肉曰。治反胃及腹痛。腰折骨痛。乳癰。又新產婦以一隻治淨。和五味炒香。投二升酒中。封一宿取飲。又和烏油麻二升熬香入酒中極效。【宋】日華諸家本草論黑雌雞肉曰。安心定志。除邪辟惡氣。治血邪破心中宿血。治癰疽。排膿補新血。及產後虛羸。益色助氣。

【黑漆】即乾漆之別名。詳『乾漆』條。

【黑鴛鴦】即鴛鴦香之色黑者。詳『鴛鴦香』條。

【黑錫】即鉛之處方用名。詳『鉛』條。

【黑錫灰】①即鉛灰之古籍別名。典見綱目。詳『鉛』條。②即鉛灰之原名。詳『鉛灰』條。

【黑頭草】即體腸之古籍別名。典見綱目。詳『體腸』條。

【黑龍衣】即鼈甲之古籍別名。典

見和漢藥考。詳『鼈甲』條。

【黑蠶】即炮蠶之原名。詳『炮蠶』條。

【黑蠶豆】即小豆之色黑者。功效詳『蠶豆』條。

【黑鱧】即鱧魚之古籍別名。典見綱目。詳『鱧魚』條。

【黑鰓】即鰓魚之古籍別名。典見圖經本草。詳『鰓魚』條。

十三畫

【亂銀絲】即杜仲之古籍別名。典見和漢藥考。詳『杜仲』條。

【亂髮灰】即血餘炭之原名。詳『血餘炭』條。

【催生草】即雙頭蓬之古籍別名。典見綱目。詳『雙頭蓬』條。

【催生蘭】古籍別名。報喜蘭。綱目拾遺。

形骸 催生蘭爲蘭之一種。懸生樹間。勿侵地氣。種法以空爲根。以露爲命。形與蘭相似。每莖作七八枝。開花似蠟梅。紅紫色。香味亦同。相傳謂其花遇有吉事則開。可供藥用。

主治 催生寤生者。以花懸戶

上卽生。

【催風使】產地 生山地間。基本 催風使爲雜草類之一種。冬夏常青。其葉可供藥用。

主治 療風疾。

【催歸】即杜鵑之古籍別名。典見綱目。詳『杜鵑』條。

【僊蟾】即蛤蚧之古籍別名。典見綱目。詳『蛤蚧』條。

【勤母】即貝母之古籍別名。典見別錄。詳『貝母』條。

【嗔尸羅】即茅香之古籍別名。典見金光明經。詳『茅香』條。

【嗔魚】即河豚之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『河豚』條。

【嗎提口】古籍別名。瑪替哥。譯音。

產地 此藥產於南亞美利加之祕魯國。

基本 屬芳香類。藥用根。效能 活血行氣。壯陽強腎。

主治 腎虛白濁。白帶白淋。

【圓三七】即三七圓形者之別名。詳『三七』條。

【圓眼】即龍眼之俗名。詳『龍眼』

條。

【圓筍】即冬筍之已出土者。長尺許。以其彎圓故名。性質功能與冬筍同。詳『筍』條。

【圓蛤】即蛤蜊圓者之別名。詳『蛤蜊』條。

【圓黃】即牛黃成塊形者之別名。詳『牛黃』條。

【圓藥】即落葉松茸之古籍別名。典見和漢藥考。詳『落葉松茸』條。

【圓萎子】即胡萎之古籍別名。典見和漢藥考。詳『胡萎』條。

【塊砂】即硃砂之古籍別名。典見和漢藥考。詳『硃砂』條。

【塊辰砂】即硃砂之處方用名。詳『硃砂』條。

【塊沉香】即沉香之處方用名。詳『沉香』條。

【塊滑石】即滑石之處方用名。詳『滑石』條。

【場香】即乳香溶化在地者之別名。詳『乳香』條。

【場橘】即橘實之外皮綠色。內瓢紅色。瓣巨多液者之別名。性質效能與尋常橘同。詳『橘實』條。

【塔頂石灰】即天龍骨之原名。詳

十二畫 黑

十三畫 亂催僊勤嗔嗔嗎圓塊塌塔

十二畫 黑

【黑玉】即玉之色黑如純漆者。功用詳『玉』條。

【黑石】即膽礬之古籍別名。與見本經。詳『膽礬』條。

【黑石子】即無名異之俗名。詳『無名異』條。

【黑石脂】命名 本品即石脂之黑色者故名。

古鑑別名 石墨石涅。畫眉石。

（綱目）

性質 鹹平。無毒。

主治 養腎氣。強陰。主陰蝕瘡。止腸澼洩痢。療口瘡咽痛。久服益氣不饑延年。

參攷資料 黑石脂亦可為墨。其性黏舌。與石灰不同。南人謂之畫眉石。即許氏說文所謂黛畫眉石也。（李時珍）

【黑石華】基本 黑石華為石類之一種。可供藥用。

產地 生山東半島山中陰石間。

性質 甘。無毒。

主治 陰痿消渴。去熱。療婦人月水不調。

【黑羊石】產地 出山東舊兗州府宮山中。

形態 黑羊石為石類之一種。

以色黑有牆壁光瑩者。可供藥用。

採取 春月掘地採之。

性質 淡。生涼熱。無毒。

主治 解藥毒。

【黑老虎】產地 廣東北江、英德、清遠等處。

主治 產後半身不遂。

【黑豆】即黑大豆之處方用名。詳『黑大豆』條。

【黑大豆】條。

【黑辛夷】即白芍之古籍別名。與見和漢藥考。詳『白芍』條。

【黑林檎】即林檎實之紫黑色者。詳『林檎』條。

【黑狗脊】即狗脊根之黑色者。功用詳『狗脊』條。即貫衆之古籍別名。典見綱目。詳『貫衆』條。

【黑芝】命名 本品即芝草之黑色者故名。

古鑑別名 玄芝（本經）

性質 鹹平。無毒。

主治 癰利水道。益腎氣。通九竅。聰察。久服輕身不老。延年神仙。

【黑花蛇】即烏梢蛇之古籍別名。

典見綱目。詳『烏梢蛇』條。

【黑虎】即黑蝦蟆之原名。詳『黑蝦蟆』條。

【黑金】即鐵之古籍別名。典見綱目。詳『鐵』條。

【黑附子】命名 本品係用附子炮黑者故名。

性質 辛。甘。大熱。有毒。

主治 溫通元陽。峻補虛寒。但非若生用者功能發散耳。

【黑附子】即附子之古籍別名。典見綱目。詳『附子』條。

【黑胡椒】即胡椒實之乾而色黑者。詳『胡椒』條。

【黑砂星】即夜明砂之古籍別名。典見綱目。詳『夜明砂』條。

【黑胡椒】條。

【黑風蛇】即烏梢蛇之古籍別名。典見和漢藥考。詳『烏梢蛇』條。

【黑料豆】即糧豆之古籍別名。典見綱目。詳『糧豆』條。

【黑桑椹】即桑椹之處方用名。詳『桑椹』條。

【黑荊芥】即荊芥黑色者之處方用名。詳『荊芥』條。

【黑兜蟲】即九香蟲之古籍別名。典見綱目。詳『九香蟲』條。

【黑參】即玄參之古籍別名。典見綱目。詳『玄參』條。

【黑梢蛇】即烏梢蛇之產於江東者。能纏物至死。性質效能。與烏梢蛇同。詳『烏梢蛇』條。

【黑殺屋】即夜明砂之古籍別名。典見和漢藥考。詳『夜明砂』條。

【黑細豆】即糧豆之古籍別名。典見綱目。詳『糧豆』條。

【黑蛇根】即升麻之古籍別名。典見和漢藥考。詳『升麻』條。

【黑魚】即鮠魚之古籍別名。典見和漢藥考。詳『鮠魚』條。即鱧魚之俗名。詳『鱧魚』條。

【黑犀角】即犀角之處方用名。詳『犀角』條。

【黑棗】即大棗黑者之處方用名。詳『大棗』條。

【黑場香】即乳香之色黑者。為乳香中之下品。效能詳『乳香』條。

【黑蜂】即竹蜂之古籍別名。典見揚雄方言。詳『竹蜂』條。

【黑鉛】即鉛之古籍別名。典見新集藥錄。詳『鉛』條。

【黑雌雞肉】基本 本品即黑色毛羽雌雞。

黑色毛羽雌雞

●辟穢時氣。以新布盛大豆一斗。納井中一宿。取出。每服七粒。佳。
(領要方)

●治菜中蛇蠱。蛇毒入菜果中食之。令人得病。名蛇蠱。又豆爲末。酒漬絞汁服半升。

●治身如蟲行。用大豆水漬絞漿。旦日洗之。或加少麵。沐髮亦良。
(千金方)

●治小兒丹毒。濃煮大豆汁。塗之甚良。
(千金方)

●治風疽瘡疥。凡脚腫及臍腹中痒。搗則黃汁出者是也。以青竹筒三尺。着大豆一升在內。以馬屎糠火燒熏。以器兩頭取汁。搽之。先以泔清和鹽洗之。不過三度。極效。
(千金方)

●治肝虛目暗。迎風下淚。用臘月牯牛膽盛黑豆。懸風處取出。每夜吞三七粒。久久自明。
(龍木論方)

●治小兒胎熱。黑豆二錢。甘草一錢。入燈心七寸。淡竹葉一片。水煎。全効心鑑方。

●治天蛇頭指。痛臭甚者。黑豆生研末。入蠶內籠之。
(濟急方)

用量 三錢至一兩。

施用宜忌 凡脾胃虛寒及無熱毒者禁用。畏五參、龍膽、忌豬肉、厚朴、草麻子、得前胡、烏喙、杏仁、牡蠣及諸膽汁良。

參攷資料 ●仙方修治末服之。可以辟穀度饑。然多食令人體重。久則如故也。
(蘇頌) ●按養老書云。李守愚每晨水吞黑豆二七枚。謂之五臟穀。到老不衰。大豆有五色。各治五臟。惟黑豆屬水性寒。爲腎之穀。入腎功多。故能治水。消脹下氣。制風熱而活血解毒。所謂同氣相求也。又按古方稱大豆解百藥毒。予每試之。大不然。又加甘草。其驗乃奇。如此之事。不可不知。
(李時珍) ●大豆性平。炒食極熱。煮食甚寒。作豉極冷。造醬及生黃卷。則平。牛食之。溫。馬食之。冷。一體之中。用之數變。
(陳藏器) ●服草麻子者。忌炒豆。犯之。脹滿致死。服厚朴者。亦忌之。動氣也。
(李時珍) ●豆未皆莢穀之總稱也。篆文未象莢生附莖下垂之形。豆象子在莢中之形。廣雅云。大豆菽也。小豆荅也。
(李時珍) ●大豆有黑白黃

褐青斑數色。黑者名烏豆。可入藥。及充食作豉。黃者可作腐。榨油造醬。餘但可作腐及炒食而已。皆以夏至前後下種。苗高三四尺。葉團有尖。秋間小白花。成叢。結莢長寸餘。經霜乃枯。按呂氏春秋云。得時之豆長莢短足。其莢二七爲族。多枝數節。大莢則圓。小莢則團。先時者必長莢。浮葉疎節。本虛不實。後時者必短莢。疎節本實。又范勝之種植書云。夏至種豆。不用深耕。豆花憎見日。則黃爛而根焦矣。知歲所宜。以莢盛豆子。平量埋陰地。冬至後十五日發。取量之最多者種焉。蓋大豆保歲易得。可以備凶年。小豆不保歲而難得也。
(李時珍)

【黑大豆皮】 主治 生用療瘡。瘡口。爛。

【黑大豆花】 主治 目盲翳膜。

【黑大豆苗】 效能 止渴。

【黑大豆葉】 主治 搗傳蛇咬。頻易取效。

參攷資料 按抱朴子內篇云。相國張文蔚莊內有鼠狼穴。養四子。爲蛇所吞。鼠狼雌雄情切。乃於穴外坩土壅穴。俟蛇出頭。度其回轉不便。當腰咬斷。而勞腹脚出。四子尚有氣。置於穴外。唧豆葉嚼而傳之。皆活。後人以豆葉治蛇咬。蓋本於此。
(李時珍)

【黑小豆】 即稽豆之古籍別名。典見綱目。詳「稽豆」條。

【黑山梔】 即山梔子焙炒成者之處方用名。詳「山梔子」條。

【黑丑】 即牽牛子之古籍別名。典見綱目。詳「牽牛子」條。

【黑元參】 即玄參之處方用名。詳「玄參」條。

【黑升麻】 即升麻之日本名。詳「升麻」條。

【黑火柴頭魚】 即鱧魚之古籍別名。典見醫林集要。詳「鱧魚」條。

【黑牛兒】 即蜚蠊之古籍別名。典見綱目。詳「蜚蠊」條。

【黑司命】 即肉蓯蓉之古籍別名。典見吳普本草。詳「肉蓯蓉」條。

【黑虎】 即鵠之古籍別名。典見綱目。詳「鵠」條。

豆一升。分作十袋。沸湯中蒸過。更互熨之。三遍則愈。(普濟方)

●治卒然中惡。大豆二七枚。雞子黃一箇。酒半升。和勻頓服。(千金方)

●治陰毒傷寒危篤者。用黑豆炒乾。投酒熱飲。或灌之。吐則復飲。汗出爲度。(居家必用方)

●治腸痛如打。大豆半升。熬焦入酒一升。煮沸。飲取醉。(肘後方)

●治腸脇卒痛。大豆炒二升。酒三升。煮二升。頓服。(肘後方)

●治卒然腰痛。大豆六升。水拌濯。炒熱。布裏熨之。冷即易。乃張文仲所處方也。(延年祕錄方)

●治脚氣衝心。煩悶不識人。以大豆一升。水三升。濃煮取汁。服未定。再服。(廣利方)

●治身面浮腫。烏豆一升。水五升。煮汁三升。入酒五升。更煮三升。分溫三服。不瘥。再合(千金方)。又用烏豆煮至皮乾爲末。每服二錢。米飲下。(百一選方)

●治新久水腫。大豆一斗。清水一斗。煮取八升。去豆入薄酒八升。再煎取八升服之。再三服。水當從

小便中出。(范汪方)

●治腹中痞。夏秋之交。露坐夜久。腹中痞。如礫石在腹。用大豆半升。生薑八分。水三升。煎一升。已來。頓服。(經驗方)

●治霍亂腹痛。大豆生研。水服方寸匕。(普濟方)

●治水痢不止。用大豆一升。炒白朮半兩。爲末。每服三錢。米飲下。(指南方)

●治赤痢腹痛。黑豆、茱萸子二件。搓摩。吞嚥之良。(經驗方)

●治男子便血。用黑豆一升。炒焦研末。熱酒淋之。去豆飲酒。神效。(活人心鏡方)

●治一切下血。雄黑豆緊小者。以皂角湯微浸炒熟。去皮爲末。煉豬脂和丸。梧子大。每服三十九丸。陳米飲下。(中藏經方)

●治小兒沙淋。黑豆一百二十箇。生甘草一寸。新水煮熟。入滑石末。乘熱飲之良。(全幼心鑑方)

●治腎虛消渴。難治者。黑大豆炒。天花粉等分。爲末。糊丸。梧子大。每黑豆湯下七十九丸。日二名。救活丸。(普濟方)

●治消渴飲水。烏豆置牛膽中陰乾。百日吞盡。即瘥。(肘後方)

●治晝夜不眠。以新布火炙熨目。并蒸大豆。更番囊盛枕之。冷即易。終夜常枕之。即愈。(肘後方)

●治疫癘發腫。大豆二合。炒熟。炙甘草一錢。水一盞。煎汁。時時飲之。夷堅志云。靖康二年。春。京師大疫。有異人書此方於壁間。用之立驗也。

●治乳石發熱。烏豆二升。水九升。銅器煮五升。汁熬稠一升。飲之。(外臺祕要方)

●解暑祇毒。大豆煮汁飲之良。(肘後方)

●治酒食諸毒。大豆一升。煮汁服。得吐即愈。(廣記方)

●解諸魚毒。用大豆煮汁飲之。(衛生方)

●解巴豆毒。下利不止。大豆煮汁一升。飲之。(肘後方)

●治惡刺瘡痛。大豆煮汁漬之。即瘥。(千金方)

●治湯火灼瘡。大豆煮汁飲之。易愈無斑。(祕錄方)

●治打頭背腫。用豆黃末傅之。

(千金方)

●治折傷。傷喉。瘀血在腹。氣短。大豆五升。水一斗。煮汁二升。頓服。劇者。不過三作。(千金方)

●治疏瘡煩躁。大豆煮汁飲之。佳。(子母祕錄方)

●治痘瘡。溼爛。黑大豆研末。傅之。

●治小兒頭瘡。黑豆炒存性。研水調傅之。(普濟方)

●治染髮令烏。醋煮黑大豆去豆煎稠。染之。(千金方)

●治牙齒不生。不拘大人小兒。年多者。用黑豆三十粒。牛糞火內燒令烟盡。研入麝香少許。先以針挑破血出。以少許搽之。不得見風。忌酸鹹物。(經驗方)

●治牙齒疼痛。黑豆煮酒。頻頻漱之良。(周密治然齊抄方)

●治妊娠腰痛。大豆一升。酒三升。煮七合。空心飲之。(心鏡方)

●治子死腹中。月數未足。母欲悶絕者。用大豆三升。以醋煮濃汁。頓服立出。(產乳方)

●治胞衣不下。大豆半升。醇酒三升。煮一升。分三服。(產書方)

石藥毒。牛馬溫毒。【明】李時珍本草綱目論黑大豆曰。煮汁解礬石。砒石甘遂天雄附子射罔巴豆芫青斑蝥百藥之毒及蟲毒入藥治下痢瘡痛衝酒治風痺及陰毒腹痛牛膽貯之止消渴治腎病利水下氣制諸風熱活血解諸毒。

配合應用 ⑤服食大豆令人長肌膚益顏色填骨髓加氣力補虛能食。不過兩劑用大豆五升。如作醬法取黃搗末以豬肪煉膏和丸梧子大每服五十丸至百丸溫酒下神驗祕方也。肥人不可服之（延年祕錄方）

④救荒濟饑博物志云左慈荒年法用大豆粒細調勻者生熟按令光暖徹豆內先日不食以冷水頓服訖一切魚肉菓菜不得復經口渴即飲冷水初小困十數日後體力壯健不復思食也。黃山谷救荒法黑豆買衆各一升煮熟去衆曬乾每日空心喫五七粒食百木枝葉皆有昧可飽也。王氏農書云昔晉惠帝永甯二年黃門侍郎劉景先表奏臣遇太白山隱氏傳濟饑辟穀仙方臣家大小七十餘口

更不食別物。若不如斯。臣一家甘受刑戮。其方用大豆五斗淘淨。蒸三遍去皮。用大麻子三斗浸一宿。亦蒸三遍令口開取仁各搗爲末和搗作團如拳大入飯內蒸從戌至子時止。寅時出飯午時曬乾爲末乾服之以飽爲度不得食一切物第一頓得七日不饑第二頓得四十九日不饑第三頓得三百日不饑第四頓得二千四百日不饑更不必服永不饑也不問老少但依法服食令人強壯容貌紅白永不憔悴口渴即研大麻子湯飲之轉更滋潤臟腑若要重喫物用葵子三合研末煎湯冷服取下藥如金色任喫諸物並無所損。前知隨州朱頌教民用之有驗。序其首尾勒石於漢陽大別山太平興國寺。又方用黑豆五斗淘淨蒸三遍曬乾去皮爲末秋麻子三升浸去皮曬研糯米三斗做粥和搗爲劑如拳大入甌中蒸一宿取曬爲末用紅小棗五斗煮去皮核和爲劑如拳大再蒸一夜服之至飽爲度如渴飲麻子水便滋潤臟腑也。脂麻亦可但不得食一切之物。

⑥炒豆漿湯蘇頌曰古方有紫湯破血去風除氣防熱產後兩日尤宜服之用烏豆五升清酒一斗炒令烟絕投酒中待酒紫赤色去豆量性服之可日夜三盡神驗。中風口噤加雞屎白二升和炒投之。⑦豆淋酒法寇宗奭曰治產後百病或血熱覺有餘血水氣或中風困篤或背強口噤或但煩熱癢癢口渴或身頭皆腫或身痒嘔逆直視或手足煩痺頭旋眼眩此皆虛熱中風也用大豆三升熬熟至微烟出入瓶中以酒五升沃之經一日以上服酒一升溫覆令少汗出身潤即愈口噤者加獨活半斤微微搥破同沃之產後宜常服以防風氣又消結血。⑧治中風口噤即上方日服一升（千金方）

⑨治頭風頭痛即上方密封七日溫服（千金方）

⑩治破傷中風口噤用大豆一升熬去腥氣勿使太熟杵末蒸令氣遍取下飯以酒一升淋之溫服一升取汗傳膏瘡上即愈（千金方）又用黑豆四十枚硃砂二十文同研末以酒半盞調服之（經驗方）

⑪治頭項強硬不得顧視大豆一升蒸變色蕞褻枕之（千金方）

⑫治暴得風疾四肢攣縮不能行動取大豆三升淘淨溼蒸以醋二升傾入瓶中鋪於地上設席豆上令病人臥之仍重蓋五六層衣豆漸漸漸却衣仍令一人於被內引挽擊急處更蒸豆再作併飲煎溼湯如此三日三夜即休（崔氏纂要方）

⑬風入臟中治新久腫風入臟中以大豆一斗水五斗煮取一斗二升去滓入美酒斗半煎取九升且服取汗神驗（千金方）

⑭治風毒攻心煩躁恍惚大豆半升淘淨以水二升煮取七合食後服之（心鏡方）

⑮治卒風不語大豆煮汁煎礬如飴含之并飲汁（肘後方）又治喉痺不語（千金方）

⑯治卒然失音用大生豆一升青竹筴子四十九枚長四寸闊一分水煮熟日夜二服瘥（孟詵方）

⑰治熱毒攻眼赤痛瞼浮用黑

十二畫 黍 黑

療本草論黍米曰。燒灰和油塗杖瘡止痛。不作癰。【明】李時珍本草綱目論黍米曰。嚼濃汁塗小兒鵝口瘡有效。

參攷資料 ①黍米肺之穀也。肺病宜食之。主益氣。【孫思邈】

黍者暑也。以其象火爲南方之穀。蓋黍最黏滯。與糯米同性。其氣溫暖。故功能補肺。而多食作煩熱。緩筋骨也。孟氏謂其性寒非矣。【李時珍】 ②黍米性寒有小毒。發故疾。久食昏五臟。令人好睡。緩人筋骨。絕血脈。小兒多食。令久不能行。小貓犬食之。其脚踡屈。合發菜食成痼疾。合牛肉白酒食則生寸白蟲。【孟詵】 ③稷之黏者爲黍。粟之黏者爲稷。稷之黏者爲糯。別錄本文者黍稷糯稻之性味功用甚明。【李時珍】

【黍石】即文石之古籍別名。典見別錄。詳「文石」條。

【黍米粥】 性質 甘溫。無毒。 主治 益氣。治脾胃虛寒。洩痢吐逆。小兒痘瘡白色。

【黍莖根】 性質 辛熱。有小毒。 主治 煮汁飲之解。

苦瓠毒。浴身。去浮腫。和小豆煮汁服。下小便。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論黍莖根曰。燒灰酒服方寸匕。治妊娠尿血。丹黍根莖煮汁服。利小便。止上喘。

參攷資料 醉臥黍根。令人生厲。人家取其莖穗作提拂掃地。用以煮汁入藥更佳。【孟詵】

【黍刺棘】即沙米之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「沙米」條。

【黍黏子】即牛蒡子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「牛蒡子」條。

【黍翹草】即鼠麴草之古籍別名。典見和漢藥考。詳「鼠麴草」條。

【黑三稜】即三稜之古籍別名。典見圖經本草。詳「三稜」條。

【黑三稜粉】即華薺粉之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「華薺粉」條。

【黑大豆】 原名 大豆。 命名 本品有黑白二種。入藥用其色黑者故名。

古籍別名 大豆。【本經】菽。

（俗名）木。【綱目】

外國名詞 Black Soja-bean.

（英）基本 屬豆科。爲黑大豆之種子。

產地 凡江、浙、湘、鄂諸地之原野間恒多產焉。

形態 黑大豆爲一年生草本。廣種於亞洲之東部。莖高二三尺。葉爲三片複葉。其小葉作卵圓形。頭端尖。莖與葉俱密生茸毛。花開於夏日。色白。或帶紫。形似蝶。果實爲莢果。亦生茸毛。中藏種子四五粒。其種類極多。以其成熟有早晚。種子有大小。色又各不相同。故名稱遂異也。

種植 每年夏至前後下種。凡田野園圃間恒多栽植。

採取 九月間採之。

製法 採得去莢殼曬乾。炒用。

或生用。

性質 甘平。無毒。

成分 黑大豆中含有植物性蛋白質極多。故食料必需之。於其營養上分析之。得各成分如下。水分一六・〇。九。蛋白質四〇・二。

一四三六

五。脂肪一八・二六。無氮素物二一・九七。纖維三・八六。灰分四・五四。

效能 祛風熱。解諸毒。兼有滋養之效。

主治 生研塗腫。煮汁飲。殺鬼毒止痛。【本經】逐水服。除胃中熱。痺傷中淋露。下瘀血。散五臟結積。內寒。殺烏豆毒。炒爲屑。小胃中熱。除痺去腫。止腹脹。消穀。【別錄】

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新修本草論黑大豆曰。煮食。治溫毒水腫。【唐】陳藏器本草拾遺論黑大豆曰。炒黑熱投酒中飲之。治風痺癱緩。口噤。產後頭風。食罷生吞半兩。去心胸煩熱。熱風恍惚。明目。鎮心。溫補。久服好顏色。變白不老。煮食性寒。下熱氣。腫壓丹石煩熱消腫。【唐】孟詵食療本草論黑大豆曰。主中風脚弱。產後諸疾。同甘草煮湯飲。去一切熱毒氣。治風毒脚氣。煮食治心痛。筋攣。膝痛。腿痛。同桑柴煮食。下水鼓腹脹。和飯搗塗一切毒腫。療男女人陰腫。以綿裹納之。【宋】日華諸家本草論黑大豆曰。調中下氣。通關脈。制食。

(姚和濟衆方)

●治狐鼠刺人腫痛。用熱蠟着瘡。并烟薰之。令汗出即愈。(肘後方)

●治大咬瘡發。以蠟炙溶灌入瘡中。(葛氏方)

●治蛇毒螫傷。以竹筒合瘡上溶蠟灌之效。(徐玉方)

●治湯火傷瘡。嫩赤疼痛。毒腐成膿。用此炭熱毒止疼痛。欬瘡口。用麻油四兩當歸一兩。煎焦去滓。入黃蠟一兩攪化放冷。攤帛貼之神效。(醫林集要方)

●治臍腫爛瘡。用桃柳槐椿棟五枝。同荊芥煎湯。洗拭淨。以生黃蠟攤油紙上。隨瘡大小貼十層。以帛拴定。三日一洗。除去一層。不用一月痊愈。(醫林集要方)

●治妊娠胎漏。黃蠟一兩。老酒一壺。二物在慢火上溶化熱。服頃刻即止。

●治呃逆不止。黃蠟燒烟。熏二次即止。(醫方摘要方)

●治霍亂吐利。蠟一彈丸。熱酒一升化服即止。(肘後方)

●治諸般瘡毒。臘瘡金瘡湯火

等瘡。用黃蠟一兩。香油二兩。黃丹半兩。同化開。頓冷。瓶收攤貼。(王仲勉經驗方)

●治瘡。錢半至三錢。施用宜忌。凡有滯滯痰鬱者。禁用惡花。齊蛤。

●蜜成於蠟。而萬物之至味。莫甘於蜜。莫淡於蠟。得非厚於此。必薄於彼耶。蜜之氣味俱厚。故養脾。蠟之氣味俱薄。故養胃。厚者味甘。而性緩實柔。故潤臟。肺薄者味淡。而性膏實堅。故止洩。

瘡。張仲景治痢有調氣飲。千金方治痢有膠蠟湯。其效甚捷。蓋有見於此歟。又華陀治老小下痢。食入即吐。用白蠟方寸匕。雞子黃一箇。石蜜苦酒。髮灰。黃連末各半。雞子殼。先煎蜜。還苦酒。雞子四味。令勻。乃納連髮熬。至可丸乃止。二日服。盡神效無比也。此方用之。屢經效驗。乃知本經主下痢膿血之方。深當膺服也。李時珍。和松脂。杏仁。棗肉。茯苓等分合成。食後服五十九。便不飢。(甄權)古人荒歲多食蠟以度飢。但合大棗咀嚼即易爛也。(蘇頌)

【黃護草】 基本 黃護草爲雜草類之一種。可供藥用。

產地 生隴西諸地。

性質 無毒。

主治 除痺益氣。令人嗜食。

古籍別名 經解。(別錄)

【黃辯】 基本 黃辯爲雜草類之一種。可供藥用。

性質 甘。平。無毒。

主治 主心腹痛。疝瘕。口瘡。臍傷。

【黃躑躅】 即羊躑躅之古籍別名。典見綱目。詳「羊躑躅」條。

【黃鯉】 即鯉魚之古籍別名。典見綱目。詳「鯉魚」條。

【黃雞菜】 即黃瓜菜之古籍別名。典見救荒本草。詳「黃瓜菜」條。

【黃纒草】 即黃草之俗名。詳「黃草」條。

【黃鸝】 即鶯之古籍別名。典見陸機詩疏。詳「鶯」條。

命名 黍從禾從念。象細粒散珠之形。而黍者。暑也。待暑而生。暑後而成。故名。

古籍別名 赤黍名。蜀黍。白黍名。黑黍名。秬。一稊。二米名。秠。(爾雅) 黃黍。大黑黍。牛黍。燕黍。馬黍。騊皮。稻尾。郭義恭廣志。餅黍。(日本)

外國名詞 Panicum miliaceum L. (拉丁)モチキヨ(日本)

基本 係禾本科稷屬。爲黍之子實莖根詳見該條。

產地 溫帶熱帶諸地皆有之。

形態 黍爲穀類之一。生草本。高四五尺。葉細長而尖。有並行脈及粗毛。花有三雄蕊。單花爲穗狀花序。實有赤白黃黑茶等色。粒勻無參差。性黏。可供食與釀酒及藥用。

性質 甘。溫。無毒。

主治 益氣補中。

歷代記述攷證 【唐】孟誥食

一四三五

亦有產蠟之樹。如烏柏樹等。在西國多未知之。昔人以爲蜂從花中取蜜。運帶至窩內作蜂房。今時始知蜂腹內之鱗形處有核。能結成此質。用此質造成蜂房。而其蠟必爲所食之物變成。又製法將蜂房切碎。壓出蜂蜜。其餘質在沸水中融化之。加熱若干時。則其異質或能消化。或能分開。待冷。則其蠟結成定質。再融化之。濾之。待冷。則成塊。成餅形。色暗黃。其臭則奇而有趣。涼水不化。濃酒微化。熱松香油全化。加熱至一百四十六度。則自化。其作用爲潤皮。聚合於他質成膏。則能在腐蝕或刺戟之處。作一蓋護之。令不遇空氣。或他質。如傷風。或久延赤白痢。用此最佳。外科之用。處在作藥膏。硬膏。油膏。用時以黃蠟一分。煉猪油四分。先將黃蠟鑄化。再加猪油調勻。至涼爲度。配油膏類用。此方較白油膏易存。故美國常用之。(黃油膏方)日本和漢藥考曰。從蜂巢採取蜂蜜。而以殘巢製黃蠟。法將殘巢放入釜中。和水於火上煎沸。盛囊中壓搾。如此則蠟質浮於水上。此時再

和水煎數次。後祇燐化蠟質。移於他器。使之成塊。更注沸湯數次。使脫去黃色。漸次成爲白色堅塊。初製者謂之黃蠟。再製者謂之蠟蠟。(日本和歌山縣之製法)又第四版改正日本藥局方曰。黃蠟係蜂巢採取蜂蜜後。注意熔成者。本品爲淡黃色。或黃色塊。於六十三度至六十四度熔融。成爲帶有蜂蜜香氣之澄明液。比重〇・九六二至〇・九七二。又遠西名物考曰。黃蠟外敷。能使堅硬者化軟。解凝結。緩和急迫。消散醃膿。或腫瘍。乳頭。瘰癧。腫痛。及瘡裂等塗之。極有效。多用作膏藥。白蠟之性狀功用。大抵與黃蠟相同。但須清涼症。多用白蠟。較黃蠟少緩和急迫功效。赤痢用下方多見效。玫瑰昆設爾弗方。玫瑰昆設爾弗二益斯。黃蠟四錢。甘扁桃油一益斯半。將蠟及油置文火上細烱。和玫瑰昆設爾弗服之。或視其症加阿芙蓉少許。有殊效。勞瘵之症。或體質薄弱。肺之運營罷勞。患咳嗽。喘急。吐血。聲啞等症。或傷冷毒之痰咳甚者。用左方多效。薰蠟方於黃蠟加松香

或乳香沒藥等分。或加香膏(即乳香)適宜。入小鍋置文火上。漸次融解之。則生佳香。患者常以口受其蒸氣吸入之。

配合應用 ①治赤白痢。小腹痛不可忍。下重。或面青手足俱變者。用黃蠟三錢。阿膠三錢。同溶化入黃連末五錢。攪勻。分三次熱服。神效。(仲景調氣方)

②治熱痢及婦人產後下痢。用蠟二基子。大阿膠二錢。當歸二錢。半黃連三錢。黃蘗一錢。陳廩米半升。水三鍾。煮米至一升。去米入藥。煎至一鍾。溫服神效。(千金膠蠟湯)

③治急心疼痛。用黃蠟燈上燒化。丸炙子大。百草霜爲衣。并水下三丸。

④立效丸。治肺虛膈熱。咳嗽氣急。煩滿咽乾。燥渴欲飲冷水。體倦肌瘦。發熱減食。喉音嘶不出。黃蠟溶濾令淨。漿水煮過八兩。再化作一百二十丸。以蛤粉四兩爲衣。養藥每服一丸。胡桃半箇細嚼溫水下。即臥閉口不語。日二。(普濟方)

⑤治肝虛雀目。黃蠟不拘多少。溶汁取出。入蛤粉相和得所。每用刀子切下二錢。以猪肝二兩。開摻藥在內。麻繩扎定。水一椀。同入銚子內。煮熱。取出。乘熱蒸眼。至溫。并肝食之。日二。以平安爲度。其效如神。(集驗方)

⑥治頭風擊疼。湖南押衙顏思退傳方。用蠟二斤。鹽半斤。相和於鑊羅中。溶令相入。捏作一兜。勢可合腦大小。空頭至額。其痛立止也。(經驗方)

⑦治脚上轉筋。劉禹錫續傳信方。用蠟半斤。銷之塗舊絹帛上。隨患大小。闊狹。乘熱纏脚。須當脚心。便著襪裏之。冷即易。仍貼兩手心。(圖經方)

⑧治暴風身冷。暴風。通身水冷如灘。緩者用上方法。隨所患大小。闊狹。攤貼。并裹手足心。亦治風毒驚悸。

⑨治破傷風濕。如癰者。以黃蠟一塊。熱酒化開。服立效。與玉真散對用尤妙。(瑞竹堂方)

⑩治代指疼痛。以蠟松膠相和。火炙。籠指即瘥。(千金方)

⑪治脚上凍瘡。濃煎黃蠟塗之。

小。可採蠟。其木材黃色。可作染料與藥用。

性質 苦寒。無毒。

主治 除煩熱。解酒疸目黃。水

煮服之。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論黃檀木曰。洗赤眼。及湯火漆瘡。

【黃礬】

命名 本品即礬石之黃色者。故名。

性質 酸。清。鹹。有毒。

主治 療瘡生肉。

歷代記述攷證 【唐】李珣海

藥本草論黃礬曰。野雞瘻痔。惡瘡疥癬。【元】李東垣用藥法象論黃礬曰。治陽明風熱牙疼。

參攷資料 ①黃礬丹竈家所

須。亦入染皮用。【蘇恭】②黃礬出

陝西瓜州沙州。及舶上來者。爲上

黃色。狀如胡桐淚。入於綠礬中。揀

出黃色者。充之。非真也。波斯出者

打破中有金絲文。謂之金線礬。磨

刀劍顯花文。丹房鑑源云。五色山

脂。吳黃礬也。【李時珍】

【黃礬】即礬之古籍別名。典見綱

目詳「礬」條。

十二畫 黃

【黃薑蜂巢】即露蜂房之古籍別名。典見和漢藥考。詳「露蜂房」條。

【黃蘗】即黃柏之處方用名。詳「黃柏」條。

【黃蠟】原名 蜜蠟。

命名 本品生於蜜中。故曰蜜蠟。乃蜂蜜之底。其色黃。故

又名之曰黃蠟。

處方用名 黃蜡。黃蜂蠟。蜂蠟。

古籍別名 黃占。和漢藥考。

外國名詞 Cera Flava (拉

丁) Yellow wax. Bees wax (英) Gelb Wachs (德)

基本 黃蠟由蜜蜂腹部輪節

狀處分泌。燭空氣而凝結。係用以

造成蜂巢及蜜槽者。

產地 陳仁山藥物生產辨云。

黃蠟產湖北涇陽爲最。沙市次之。

雲南又次之。廣東瓊州。欽州。北海

均有出。但去蜜糖不清。味香。易生

蟲。又有一種洋蠟。由喇喇吉打運

來。蠟質略硬。其餘日本出之魚油

蠟。又有用火水渣而製成者。非有

閱歷。不易辨別。

形態 黃蠟爲有甘味狀氣味

之黃色或褐色蠟狀固塊。破折面

作細粒狀。於四十九度至五十五

度。柔軔於六十度至六十四度融

解。比重〇・九六二至〇・九六

七。不溶於水及冷酒精。溶於煮沸

酒精及伊打。

種類 ①黃蠟乃取蜜後。將殘

蜂房煉過。濾入水中。候其凝結。色

黃者。②白蠟係用黃蠟更用水煮

溶化。以好蘇紙摺作數層。入冷水

蘸淨。輕貼蠟上。一吸即起。仍投冷

水中。有蠟凝紙上。即剝取之。再吸

再剝。以盡爲度。鋪於竹器中。蠟之

乾則顯酒以水。久之凝結。色白者

③蟲白蠟係小蟲所作。其蟲食冬

青樹汁。吐涎黏嫩枝上。至秋刮取。

以水煮溶。置冷水中。則凝聚成塊。

色白。此即所謂蟲白蠟。與蜜蠟之

白者不同。

用法 水煎或剉末。或水化而

作丸散用。

性質 甘。溫。無毒。

成分 黃蠟成分。由產地而異。

但其主要者爲蜜里辛(Myricin

$C_{15}H_{21}O_2$)。塞林(Cerin $C_{25}H_{40}O_2$)及塞洛列因(Cerolein)。此

三物。用煮沸酒精處理之。可使分

離。即甲不溶於煮沸酒精。乙則溶

化。冷即析出。丙則溶存而不析出。

效能 續絕傷金瘡。治下痢。膿

血。用作賦形藥。又爲生肌止痛之

瘡。傷止血藥。專治創傷。腸出血。微

毒。

作用 有直接凝固血液之功。

且有制腐滅菌之效。

主治 蜜蠟主下痢。膿血。補中。

續絕傷金瘡。血氣不饑耐老。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥

性本草論黃蠟曰。孕婦胎動。下血

不絕。欲死。以雞子大煎三五沸。投

美酒半升。服。立瘥。又主白髮。蠟去

消蠟點孔中。卽生黑者。明李士

材本草圖解論黃蠟曰。蠟主下痢。

貼瘡。生肌止痛。【清】黃元御玉楸

藥解論黃蠟曰。黃蠟凝聚。收澀。治

泄痢。便膿。胎動。下血。跌打金刃。湯

火。蛇咬。凍裂。一切諸瘡。愈破風。

國外學說 英美學說謂黃蠟

各處產之。乃取蜜後。懷清沸水中

候凝取之。以共色黃。故名黃蠟。有

數種植物能生蠟質。如棕櫚樹及

數種楊梅樹之類。中國與日本同

丁四三三

【黃藥子】 古籍別名 赤藥。(圖經) 木藥子大苦。

紅藥子(綱目)

產地 在山野間。

形態 黃藥子爲蔓草類之一種。莖高二三尺。柔而有節。形似藤。實非藤。葉大作掌狀。長三寸許。開細白花。其根長尺許。大者圍二三寸。外褐內黃赤。可供藥用。

採取 十月間採根用。

性質 苦平無毒。

主治 諸惡腫瘡癰。喉痺。蛇犬咬毒。研水服之亦含亦塗。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論黃藥子曰涼血降火消癰解毒。

參攷資料 孫思邈千金月令方。療忽生癰疾一二年者。以萬州黃藥子半斤。須緊重者爲上。如輕虛即是他州者。力慢。須用加倍。取無灰酒一斗。投藥入中固濟瓶。以糠火燒一伏時待酒冷。乃開時時飲一杯。不令絕酒氣。經三五日後。常把鏡自照。覺消即停飲。不爾便令人項細也。劉禹錫傳信方亦著其效。云得之邕州從事張君。君目

擊有效。復試其驗如神。其方並同。惟小有異處。是燒酒候香出外。瓶頭有津出。即止。不待一宿。火不可得。猛耳。(蘇頌)

【黃藥酒】 命名 本品係用黃藥子製成之酒。故名。

製法 用萬縣緊重者之黃藥子三斤。無灰酒一斗。以藥納入。固封瓶口。以糠火緩燒一伏時。至酒氣香出。瓶頭有津。即止。候冷。取酒服。或將藥切片。袋盛。浸酒煮服。

主治 諸癰瘡結氣。

古籍別名 黃鱸魚。

黃魴魚(綱目)

外國名詞 Pseudobagrus auraticus Temm and schlegel (拉丁) ギギ 或 ギバチ (日本)

基本 係脊椎動物魚類喉鰓類鮎魚科之黃類魚。

產地 生江湖淡水中。

形態 黃類魚爲無鱗類魚屬之一種。體長。形略似鮎。尾甚側扁。頭闊扁。口吻短。眼小。分生爲上位。而被薄皮。上下兩顎皆有毛狀之

闊齒列一帶。口蓋亦有齒。鼻旁有觸鬚一對。上下顎亦有一對。兩眼間廣闊而隆起。全體甚黏滑。脊背皆有鱗刺。其棘甚強。力能飛躍。背青黃色。腹色黃。其肉可供食與藥用。

性質 甘平。微毒。

主治 醒酒。

歷代記述攷證 【明】吳瑞日用本草論黃類魚肉曰祛風【明】李時珍本草綱目論黃類魚肉曰養食消水腫。利小便。燒灰治瘰癧。久潰不收。飲及諸惡瘡。

施用宜忌 反荊芥。同食害人。

參攷資料 黃類魚爲無鱗魚類。無鱗之魚不益人。發瘡疥。(孟詵)

【黃類魚涎】 採取 翹下取之。

主治 消渴。

參攷資料 凡消渴飲水無度。以黃類魚涎和青蛤粉。滑石等分。和丸服。粟米湯下三十丸。(綱目)

【黃類魚類骨】 主治 喉痺。腫痛。燒研茶服三錢。

【黃鱸魚】 命名 魚鰾肥白。故名。本品鰾腹多脂。故名。古籍別名 黃骨魚。黃姑魚。(綱目)

產地 生江湖中。

形態 黃鰾魚爲鱗魚屬之一種。狀如白鰻。而頭尾不昂。身扁。鱗細。色白。闊不逾寸。長不盈尺。鰾腹多脂。味美。肉可供藥用。其油詳見該條。

性質 甘溫。無毒。

主治 白煮汁飲。止胃寒洩瀉。

參攷資料 黃鰾魚油燃燈。令人目昏。(李時珍)

外國名詞 Rhinoptera (拉丁) ワウ

基本 係漆樹科漆樹屬之黃櫨。

產地 出豫蜀諸省。

形態 黃櫨爲喬木類之落葉木。本高一二丈。葉作羽狀複葉。小者爲長卵形。有光澤。春夏間開小花。花爲圓錐形花序。結實圓扁。而

一四三二

四枚。體鱗二十列。腹鱗二百二十枚。肛門鱗分裂尾下鱗一百一十一對。體暗綠色。背有淡黑色條紋。長四尺七寸。其行緩遲。常入人家捕食鼠類。兒養爲玩物。其肉可供食與藥用。



黃領蛇

性質 甘。溫。有小毒。

主治 鹽酒或入丸散。主風癩頑癬惡瘡。自死蛇漬汁。塗大疥。麥汁浸臂腕作痛。燒灰同豬脂塗風癬漏瘡。婦人妬乳。獼犬咬傷。

【黃領蛇吞鼠】

基本 黃領蛇吞入腹中

之鼠。尚未消化者。

主治 風癩蟻瘻有細孔如鍼者。以臘月豬脂煎焦。去滓塗之。

【黃領蛇吞鼈】

基本 黃領蛇吞入腹中

之鼈。尚未消盡者。

主治 噎膈勞嗽蛇瘻。

【黃領蛇骨】

主治 久瘡勞瘻。炙入丸散用。

【黃領蛇頭】

主治 燒灰。主久瘻及小腸癰入丸散用。

【黃鯪】即黃類魚之古籍別名。典見綱目。詳「黃類魚」條。

【黃鰐魚】即杜父魚之古籍別名。典見綱目。詳「杜父魚」條。

【黃鰔】即鯽魚之古籍別名。典見綱目。詳「鯽魚」條。

【黃鵠】即鸛鷀之古籍別名。典見綱目。詳「鸛鷀」條。

【黃龍湯】即金汁之古籍別名。典見本草集註。詳「金汁」條。

【黃環】

命名 本品葉黃而圓。故名。

古籍別名 凌泉。大就。（本經）

實名狼跋子。（別錄）就葛度穀（唐本生芻根非。吳普）

產地 生山野平原間。

形態 黃環爲蔓草類之一種。莖長二尺許。葉圓色黃。花紫色。結實有子。其根形似葛。可供藥用。其子詳見「狼跋子」條。

採取 三月間採根用。

性質 苦。平。無毒。

主治 蠱毒鬼疰。鬼魅。邪氣在臟中。除咳逆寒熱。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論黃環根曰。治上氣急及百邪。【明】李時珍本草綱目論黃環根曰。治痰嗽。消水腫。利小便。

施用宜忌 惡茯苓。防己。乾薑。爲尾爲之使。

【黃環子】即狼跋子之原名。詳「狼跋子」條。

【黃薑】即薑黃之處方用名。詳「薑黃」條。

【黃藍】即紅藍之古籍別名。典見開寶本草。詳「紅藍花」條。

【黃藍花】即紅花之古籍別名。典見和漢藥考。詳「紅花」條。

【黃蟲】

產地 生澤地間。

形態 黃蟲爲溼生蟲類之一種。赤頭長足有角。羣集而居。可供藥用。

採取 七月七日採之。

性質 苦。

主治 療寒熱。

【黃鰐】即黃色鯉魚。典見圖經本草。詳「鯉魚」條。

【黃鵠】即鵠之古籍別名。典見綱目。詳「鵠」條。

【黃犢子臍屎】

基本 本品即黃色小牛

之臍中屎。採取 以新生未食草者收乾。

主治 九竅四肢指歧間血出。乃暴怒所爲。燒此末。水服方寸匕。日四五服良。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論黃犢子臍屎曰。主中惡霍亂及鬼擊吐血。以一升和酒三升煮汁服。

【黃藜蘆】即木藜蘆之古籍別名。典見綱目。詳「木藜蘆」條。

性質 甘。苦。平。無毒。

【黃藤】 主治 飲食中毒。利小便。煮汁類服即解。

（參攷資料）黃藤生嶺南。狀若防己。俚人常服此藤。縱飲食有毒。亦自然不發。席辨刺史云。甚有效。（李時珍）

【黃藤】即鉤吻之古籍別名。典見綱目。詳「鉤吻」條。

者住。

製法 用米麥合磨成粉。和水成餅。麻葉裹之。待生黃衣。取出曬乾用。

性質 甘。溫。無毒。

主治 功同女麴。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器

本草拾遺論黃蒸麴曰。溫補。能消諸生物。【宋】日華諸家本草論黃

蒸麴曰。溫中下氣。消食除煩。【明】

李時珍本草綱目論黃蒸麴曰。治

食黃。黃汗。

【黃蒿】即鼠麴草之古籍別名。典

見本草會編。詳「鼠麴草」條。

【黃蜜】即蜂蜜之黃色者。詳「蜂

蜜」條。

【黃蠶蠟】即黃蠟之處方用名。詳

「黃蠟」條。

【黃蜡】即黃蠟之處方用名。詳「

黃蠟」條。

【黃遠】即射干之古籍別名。典見

吳普本草。詳「射干」條。

【黃薑】即香薑之一種。詳「香薑」

條。【黃寮郎】(綱目) 古籍別名 倒摘刺。

產地 生山野間。

形態 黃寮郎為雜草類之一種。冬夏常青。其根可供藥用。

主治 風疾。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論黃寮郎根曰。治咽痛

搗汁入酒滴之。牙痛刀上燒取煙

煤。綿裹塞痛處。

【黃彈子】即黃皮果之古籍別名。

典見綱目拾遺。詳「黃皮果」條。

【黃德祖】 產地 本品生垣上。

形態 黃德祖為雜

草類之一種。葉如尖刀。獨梗如芋

花紅色。白頭。如何首烏。可供藥用。

主治 瘡癰。

【黃德祖】即淫羊藿之古籍別名。

典見和漢藥考。詳「淫羊藿」條。

主治 霍亂痢

疾。合諸香丸服。

命名 本品芽

味苦。瀉如黃連。

故名。

【黃練藤芽】 古籍別名 回味。黃連頭。黃連

芽。(綱目拾遺) 形態 黃練為蔓草類藤屬之一種。蔓生大樹間。葉似桑寄生。又

似槐葉。尖長柔滑。肥厚光澤。二三月間。枯枝生芽。淡紅色。如椿芽。生

食之。苦中帶甘。清香可口。醃以為

菜。與芹芽、椿芽、蘆芽並重。採乾代

茶。又勝於茗。可供藥用。其藤皮詳

見該條。

性質 苦。澀。寒。無毒。

主治 解暑。止渴。利便。生津。明

目。清熱解毒。治喉痛咽咽。醒酒舌

爛口糜。嚼汁可解。

【黃蓬草】即葶草之古籍別名。典

見綱目拾遺。詳「蓬草」條。

【黃楊侯】即青鸛之古籍別名。典

見綱目拾遺。詳「青鸛」條。

【黃橘皮】即橘皮之原名。詳「橘

皮」條。

【黃獨】即土芋之古籍別名。典

見綱目。詳「土芋」條。即黃精之

古籍別名。典見和漢藥考。詳「黃

精」條。

【黃獨子】即土芋根之別名。詳「

土芋」條。

【黃礪石】即石硫黃之古籍別名。

典見和漢藥考。詳「石硫黃」條。【黃薑】即香薑。生色黃者之古籍別名。典見陳仁玉菌譜。詳「香

薑」條。

【黃頰魚】即鯪魚之古籍別名。

典見綱目。詳「鯪魚」條。即黃頰

魚之古籍別名。典見詩注。詳「黃

頰魚」條。

【黃龍尾】即金頂龍芽草之古籍

別名。典見滇南本草。詳「仙龍草」

條。

命名 頰。喉下也。本

品喉下色黃。故名。

古籍別名 黃喉蛇。色赤者名

赤棟蛇。桑根蛇。(綱目) 青大蛇。

(動物學大辭典)

外國名詞 Elaphe clima-

cophora Schleg 或 Elaphevir-

gatus (拉丁) フオダイシエー

(日本)

基本 係脊椎動物爬蟲類蛇

類。開口類黃頰蛇科。為黃頰蛇之

肉。其頭骨所吞鼠所吞蛙。詳見各

該條。

產地 在原野間。

形態 黃頰蛇為蛇類之一種。

頭部較小。舌分歧。無毒牙。吻端頗闊。鼻間鑷小。額鑷前方頗闊。後方尖狹。鼻孔圓大。上唇鑷八枚。唇鑷

●補虛精氣。黃精、枸杞子等分。搗作餅。日乾爲末。煉蜜丸。梧子大。每湯下五十丸。(奇效良方)

用量 三錢至四錢。

施用宜忌 凡脾胃虛寒。大便滑瀉者禁用。忌梅實、花葉子並同。

參攷資料 ●神仙芝草經云。

黃精寬中益氣。使五臟調良。肌肉充盈。骨髓堅強。其力增倍。多年不老。顏色鮮明。髮白更黑。齒落更生。又能先下三尸蟲。上尸名彭質。好寶物。百廿日下。中尸名彭矯。好五味。六十日下。下尸名彭居。好五色。三十日下。皆爛出也。根爲精氣。花實爲飛英。皆可服食。又按雷氏炮炙論序云。駐色延年。精煎神錦。註云。以黃精自然汁拌研細神錦。於柳木甌中蒸七日。以木蜜丸服之。木蜜。枳椇也。神錦不知是何物。或云碌砂也。(李時珍) ●按抱朴子云。黃精服其花。勝其實。服其實。勝其根。但花難得。得其生花十斛。乾之。纔可得五六斗爾。非大有力者不能辦也。日服三合。服之十年。乃得其益。其斷穀不及朮。卮餌令人肥健。可以貢重涉險。但不及黃精。

之甘美易食。凶年可與老少代糧。謂之米舖也。(禹錫) ●徐鉉稽神錄云。臨川士家一婢。逃入深山中。久久不見。野草枝葉可愛。取根食之。久久不饑。夜息大樹下。聞草中動。以爲虎攫。上樹避之。及曉下地。其身歛然。凌空而去。若飛鳥焉。數載。家人採薪見之。捕之不得。隨絕壁下網圍之。俄而騰上山頂。或云。此婢安有仙骨。不過靈藥服食爾。遂以酒餌置往來之路。果來食。遂不能去。擒之。具述其故。指所食之草。卽是黃精也。(唐慎微) ●黃精爲服食要藥。故別錄列於草部之首。仙家以爲芝草之類。以其得坤土之精粹。故謂之黃精。五符經云。黃精獲天地之淳精。故名爲戊己芝。是此義也。餘糧救窮。以功名也。鹿竹菟竹。因葉似竹而鹿兔食之也。垂珠。以子形也。陳氏拾遺。荒草卽此也。(李時珍) ●根似嫩薑。俗名野生薑。九蒸九曝。可以代糧。又名米舖。(陳嘉謨) ●今處處有之。二月始生。一枝多葉。葉狀似竹而短。根似萎蕤。萎蕤根如荻根。及菴蒲概節而平直。黃精根如鬼臼。

黃連。大節而不平。雖燥並柔。有脂潤。俗方無用此。而爲仙經所貴。根葉花實皆可餌服。酒散隨宜。具在斷穀方中。其葉乃與鉤吻相似。惟莖不紫。花不黃。爲異。而人多惑之。其類乃殊。遂致死生之反。亦爲奇事。(陶弘景) ●鉤吻眞似黃精。只是葉頭尖。有毛。鉤子一箇。若誤服之。害人。黃精葉似竹也。(雷斅) ●黃精。肥地生者卽大如拳。薄地生者猶如拇指。萎蕤。肥根。頗同小者。肌理形色大都相似。今以鬼臼黃連爲比。殊無彷彿。黃精葉似柳。及龍膽。徐長卿。莖而堅。其鉤吻蔓生。葉如柿葉。殊非比類。(蘇恭) ●黃精南北皆有。以嵩山茅山者爲佳。三月生苗。高一二尺。以來葉如竹葉而短。兩兩相對。莖梗柔脆。頗似桃枝。本黃末赤。四月開青白花。狀如小豆花。結子白如黍粒。亦有無子者。根如嫩生薑。而黃色。二月採根。蒸過曝乾。用。今過八月採。山中人九蒸九曝。作果賣。黃黑色。而甚甘美。其苗初生時。人多採爲菜茹。謂之畢菜。味極美。江南人說黃精苗葉類鉤吻。但鉤吻葉頭極尖。

而根細。而蘇恭言鉤吻蔓生。恐爾北所產之異耳。(蘇頌) ●黃精。野生山中。亦可劈。根長二寸。稀種之。一年後極稠。子亦可種。其葉似竹而不尖。或兩葉三葉四五葉俱對節而生。其根橫行。狀如萎蕤。俗採其苗。燻熟。淘去苦味。食之。名筆管菜。

【黃精】卽人參之古籍別名。典見吳普本草詳「人參」條。

【黃精酒】製法 用黃精、蒼朮各五斤。天門冬三斤。黃汁一石。同麴十斤。糯米一石。如常釀酒飲。

主治 壯筋骨。益精髓。變白髮。治百病。

【黃藤】卽酸漿之古籍別名。典見爾雅詳「酸漿」條。

【黃蕪】卽黃蕪蕪之原名。詳「黃蕪」條。

【黃蒸麴】原名 黃蒸。命名 本品係以米麥粉和麴。待其蒸熟成黃者。故名。

古醫別名 黃衣。(蘇恭) 麥黃。

(綱目)

採取 於六七月作而生綠塵。

一四二九

下箇稱之爲鹼性液。以下更檢此兩樣浸出液對於各種試藥之反應如次。酸性液依鹽化白金水素酸現淡褐色絮狀晶單寧酸現白色馬耶路氏試藥初現白色繼則急變爲褐色之沈澱。沃度鉀現赤褐色絮狀沈澱。昇汞現帶褐色絮狀沈澱。磷毛利浦淀酸初現白色後乃變灰色絮狀沈澱。鹽化金水素酸初現白色後變褐色之沈澱。沃度蒼鉛現帶褐色絮狀沈澱。依皮苦林酸初現淡黃色繼則急變爲褐色之絮狀沈澱。武奧佛郎酸現初白後褐之沈澱。磷武奧佛郎酸初現白色後乃急變爲褐色之絮狀沈澱。沃度卡特米讓現帶褐色絮狀沈澱。毛利浦淀酸亦現帶褐色之絮狀沈澱也。鹼性液依鹽化白金水素酸磷毛利浦淀酸毛利浦淀酸磷武奧佛郎酸武奧佛郎酸等具現與上同樣之沈澱。

效能 潤肺生津。治勞傷瘵精。體用作滋養緩和藥。

主治 補中益氣。除風溼。安五臟。久服輕身延年不饑。

歷代記述攷證 【宋】日華諸

家本草論黃精曰。補五勞七傷。助筋骨耐寒暑。益脾胃潤心肺。單服九蒸九曝。食之駐顏斷穀。明李時珍本草綱目論黃精曰。補諸虛止寒熱。填精髓。下三尸蟲。清黃宮。補本草求真論黃精曰。黃精書極稱滋潤。其氣平味甘。治能補中益五臟。補脾胃。潤心肺。填精補助筋骨。除風溼。下三蟲。且得坤土之精粹。久服不飢。其言極是。但究其氣味。止能入脾補陰。若使挾有痰濕。則食之反更助痰。根紫花黃。葉如竹葉者是。俗名山薑。九蒸九曬用。

國外學說 日本和漢藥考曰。黃精種類頗多。分述於下。①黃精生山中陰地。有數種。春皆自宿根生苗。初出土時有繆包之狀。如小筍。惟不直立。葉圓嫩綠。有光澤。似百合葉。細瘦而互生。②竹葉黃精葉形狹長。如竹葉。又似百合葉。柔薄光滑。有細縱理。長三五寸。四五寸。月於葉間開花。作筒狀。末分五瓣。形如沙參花。無蒂。色白。瓣微綠。皆下垂。後結圓實。較南天燭子爲大。熟則成黑色。中有細子。其根白色。

橫生而有節。歲增一節。積年漸長。本草原始言生刺人喉。是爲玉竹黃精。③大葉黃精。葉長大。苗粗高四五尺。根節圓扁。大一寸餘。相連橫生。形如白及根。山農煮熱食之。味如薯蕷。是爲白及黃精。④圓葉黃精。苗高一二尺。莖較竹葉黃精爲細。葉較萎蕤葉爲短。堅硬有光。其花亦小。根與竹葉黃精無異。⑤唐種黃精。享保年中傳入日本。其狀與玉竹黃精無異。惟其葉或互生。或兩葉相對。或五七葉相對。雜生一莖。如紹興本草所繪爲異耳。是爲正精。葢器說云。『偏精功用不如正精』。據此當以唐種爲上品。日產皆偏精也。此外品類尚多。日本藥舖所售皆本國產。以澳洲南部所出者爲上品。其形最肥大。又出蒸黃精。黑色。味如熟地。黃用供果食。本草原始云。『熟味甘。堪食。深黑色。象地黃。有二三歧者。有一二歧者』。即此。熟指九蒸九曝也。

近人學說 ①袁淑範曰。黃精之學名。極不一致。蓋因產地不一。其形狀亦遂之而異之故也。例如

Polygonatum macropodum, Polygonatum giganteum, Polygonatum multiflorum, Polygonatum chinense, 及 Polygonatum latifolium, Polygonatum falcatum, 等皆爲其學名。今姑以 Polygonatum oenocaulatum 爲其學名。②張山雷曰。黃精不載於本經。今產於徽州。徽人常以爲饋贈之品。蒸之極熟。隨時可食。味甘而厚。膩頗類熟地。黃古今醫方極少用。此蓋平居服食之品。非去病之藥物也。按其功用。亦大類熟地。補血補陰。而養脾胃。是其專長。但膩滯之物。有溼痰者弗服。而胃納不旺者。亦必避之。

配合應用 ①補肝明目。黃精二斤。薑黃一升。淘同和九蒸九曬。爲末。空心每米飲下二錢。日二服。延年益壽。〔聖惠方〕

②治大風癰瘡。營氣不清。久風入脈。因而成癰。鼻壞色敗。用黃精根去皮。潔淨。溪水洗二斤。曝納粟米飯中。蒸至米熟。時時食之。〔聖濟總錄方〕

【黃鼠】

古籍別名 禮鼠拱鼠。
(韓文) 鼯鼠。銀鼠青鼠。

鼯鼠(綱目)

產地 出山西、陝西沙漠諸地。

形態 黃鼠爲獸類鼠屬之一種。體如大鼠。尾足俱短。毛黃色。見人則交其前足於頸。拱而如揖。乃竄入穴。穴於沙漠土中。皮可爲裘。領肉味美。可供食與藥用。

性質 甘平。無毒。

主治 潤肺生津。煎膏貼瘡腫。

解毒止痛。

參攷資料 ①黃鼠肉多食發瘡(正要) ②黃鼠北方所食之物。

而方書無載。按經驗良方有靈鼠膏。云治諸瘡腫毒。去痛退熱。用大黃鼠一箇。清油一斤。慢火煎焦。水上試油不散。乃濾淨澄清。再煎。次入炒紫黃丹五兩。柳枝不住攪勻。漢水成珠。下黃蠟一兩。熬黑。乃成。去火毒三日。如常攤貼。(李時珍)

【黃鼠狼】即鼯鼠之古籍別名。典見綱目詳【鼯鼠】條。

【黃精】

命名 昔人以本品得坤土之氣。獲天地之精。故名。

處方用名 製黃精。

古籍別名 黃芝(瑞草經) 戊己芝(五符經) 菟竹鹿竹救窮草。重樓。鶴格。垂珠。馬箭。白及。荷格。嚴。以上別錄。仙人餘糧。(陶弘景) 米歸。野生薑(蒙筌) 龍衡(廣雅) 救荒草(綱目拾遺) 黃孫。衣。黃獨。飛英。卑菜。玉芝草。太陽草。竹大根。沙田鹽(和漢藥考) 筆管菜(俗名)

學名 Polygonatum Chinensis

基本 屬百合科黃精之根莖。

產地 陳仁山藥物生產辨云。黃精以湖南產者爲正。形象菱角。肉色黑。其餘連州。樂昌。西江。八屬。廣西南寧。均有出產。但種類不同。形如玉竹頭。長身瓜藤樣。而味略有辛辣。湖南產之正黃精。一片純甜。切開肉紋亦有別。

形態 黃精爲山野自生之宿。



(一) 精 黃

根草。種類頗多。莖高自一二尺至四五尺。葉由種類而異。五月間。於莖頂及葉腋開青白色花。下垂如懸。鳴子。鳴子乃日本農家用以驅逐田園鳥雀之物。於板面懸細竹。以繩引之。則鳴。故一名鳴子百合。(因葉狀如百合葉) 其根爲黑褐色。地下莖。有節。年久者肥大。販賣品中。混有萎蕤。別之之法。以有節者爲生薑手黃精(真黃精) 無節者爲地黃手黃精(萎蕤)。



(二) 精 黃

採取 二月八月採之。陰乾。製法 雷斅曰。凡採得以溪水洗淨。蒸之。從已至子。薄切。曝乾。用。蘇頌曰。羊公服黃精法。二月三月。採根。入地八九寸。爲上。細切。一石。以水二石五斗。煮去苦味。漉出。囊中壓取汁。澄清。再煎。如膏。乃止。以炒黑黃豆末相和。得所。捏作餅子。如錢大。初服二枚。日益之。亦可焙乾。篩末水服。孟詵曰。餌黃精法。取

藥子去底。釜內安置得所。入黃精。令滿。密蓋。蒸至氣溜。即曝之。如此九蒸。九曝。若生則刺人咽喉。用法 與他藥水煎。或酒浸。或蒸搗。和作丸散。

性質 甘平。無毒。

成分 黃精之化學成分的研究。日本中尾博士曾於南滿洲藥學會發表之。今介紹於左。取五〇乃至一〇〇瓦之黃精粉。末用邵哥雷氏浸出器。以以脫浸出之。至無移行於以脫之物時爲止。蒸餾其以脫液。稱其殘渣。爲以脫殘幾斯。次乃蒸散殘幾斯於試料中。之以脫使之乾燥。後更以強酒精浸出之。至無浸出物爲止。蒸發其酒精溶液。稱其殘渣。爲酒精殘幾斯。同樣更乾燥其殘留試料。後用熱湯浸出之。作成水性殘幾斯。後乃用鹽酸酸性水。溶解其以脫殘幾斯。濾過。以以脫振盪之。棄其溶於以脫之部分。取其透明之鹽酸酸性液(以下單稱之爲酸性液) 次更溶其鹽酸酸性水抽出後之殘渣於炭酸鹼性水。濾過。更用以脫振盪之。同樣取其透明之溶液(以

相援連理。陰庇百丈。其出雲南者。似海棠。稍大。香似佛手。甘脆如梨。多津液。其出蜀中者。樹而不結實。皮類川樅。葉似桂葉。而稍大。形圓。四時不凋。幹則癰腫。根皆蟠露。土上。至於石崖之側。全不藉土氣而生。於某月種植。每歲必於某月始芽。其根皮可供藥用。

主治 疥癬。煎湯浴之。

【黃葵子】即黃蜀葵子之簡稱。詳『黃蜀葵』條。

【黃蜀葵】 **古醫別名** 側金盞花。 **(綱目)** 棉花葵。

(植物圖考)

外國名詞 Hibiscus Muni.

Hot.L. (拉丁) トロアノヒネ (日本)

基本 係錦葵科木樨屬。爲黃蜀葵之花蕾。

產地 在原野間。

形態 黃蜀葵爲溼草類之越年或一年生草本。春月下種生苗莖高三四尺。其矮者高不及尺。根長而肥大。葉互生。掌狀深裂。花大瓣有五黃色。下部帶有紅色。總苞四片至七片。其根肥大。有黏液。供

製紙之糊料。結角大如拇指。長二寸許。本大末尖。六棱有毛。老則色黑。其稜自裂中有六房如芝蔴房。房內有子如苧麻子。色亦黑。花子及根俱可供藥用。



黃蜀葵

性質 甘。寒。滑。無毒。

主治 小便淋。及催生。治諸惡瘡。膿水久不瘳者。作末傳之。即愈。爲瘡家要藥。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論黃蜀葵花曰。消癰腫。浸油塗湯火傷。

近人學說 張山雷曰。此又別

是一種。非即蜀葵之黃花者。葉似鷄爪。秋深開花。今之所謂秋葵花也。性亦寒涼潤利。因之亦以葵名。嘉祐本草謂其花主小便淋。催生治惡瘡。膿水不差。作末敷之。瀕湖謂其花消癰腫。其子亦消癰腫。治五淋水腫。通乳汁。爲催生利小便要藥。瀕湖引經驗方。黃蜀葵花。麻

油浸蜜收。治湯火灼傷。今有預製以備緩急者。頗能止痛定腐。甚有效也。

參攷資料 ①冬葵、黃葵、蜀葵。

形狀雖各不同。而性俱寒滑。故所主療不甚相遠。(蘇頌) ②黃葵子古方少用。今爲催生及利小便要藥。或用或入湯散皆宜。蓋其性滑與冬葵子同功。故也。花子與根性功相同。可以互用。無花用子。無子用根。(李時珍) ③黃蜀葵花近道處處有之。春生苗葉。頗似蜀而葉尖狹。多刻缺。夏未開花。淺黃色。六月採陰乾之。(禹錫) ④黃蜀葵與蜀葵別種。非是蜀葵中黃者也。葉心下有紫橙色。摘下別散。日乾之不爾。即溫爛也。(寇宗奭) ⑤黃葵二月下種。或宿子在土自生。至夏始長。葉大如莧。麻葉深綠色。開歧丫有五尖。如人爪形。旁有小尖。六月開花。大如桃。鵝黃色。紫心。六瓣而側。日開。午收。暮落。人亦呼爲側金盞花。隨卽結角。大如拇指。長二寸許。本大末尖。六棱有毛。老則黑色。其稜自綻。內有六房如芝蔴房。其子累累在房內。狀如苧麻子。

色黑。其莖長者六七尺。剝皮可作繩索。(李時珍)

【黃蜀葵子及根】 **性質** 甘。寒。滑。無毒。

主治 癰腫。利小便。五淋水腫。產難。通乳汁。

【黃蜂】即大黃蜂之簡稱。詳『黃蜂』條。

【黃蜂蠟】即黃蠟之處方用名。詳『黃蠟』條。

【黃雌雞肉】 **性質** 甘。酸。鹹。平。無毒。

主治 傷中。消渴。小便數而不禁。腸辟。洩痢。補益五臟。絕傷。療五勞。益氣力。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論黃雌雞肉曰。補丈夫陽氣。治冷氣疾。著牀者漸漸食之。良以光粉諸石末和飯。飼雞食。甚補益。【宋】日華諸家本草論黃雌雞肉曰。治勞劣。添髓補精。助陽氣。暖小腸。止洩精。補水氣。【明】李時珍本草綱目論黃雌雞肉曰。治產後虛羸。煮汁煎藥服佳。

【黃零草】即佩蘭之古籍別名。典見庚辛玉冊。詳『佩蘭』條。

根搗爛。酒煎。露一宿。次早服之。氣鬱心疼。肚疼。痢疾。痞結。並一切血症。同虎杖龍芽用。爲治諸血之聖藥。

【黃麻蟲】 基本 本品係生於黃麻梗內之一種幼蟲。

採取 秋時收取。以葱管藏之。性質 溫。

主治 疔毒。

配合應用 ①用黃麻梗內蟲以葱葉包貯。掛風頭令乾。將疔瘡挑破。以麻蟲少許。入於所挑之處。瘡卽化爲水而愈。(程林卽得方)

②治疥。蜚蠊。用蜚蠊三個。肚白者佳。黃麻蟲十個。二味搗勻。撥破患處貼之。如患在手足有紅絲上臂絲盡處。將針挑斷。出血。仍用前藥毒重者更服敗毒藥。(陶節菴方)

③用黃麻梗中蟲一條。焙乾爲末。酒調服下。疔化爲水。(葉氏方)

參攷資料 百草鏡。麻蟲生麻梗近根上一節中。二月化爲飛蟲。穿穴去。山人每於刈麻時。將蟲連麻梗寸斷。布袋裝盛。帶至南方。

貨與養禽鳥家。飼畫眉百靈之用。云其蟲性暖。去風行血。鳥食之。可以禦寒。蟲形如小蠶。細長明淨。入藥須連麻梗蒸焙用。如用生者。須以葱藏。

【黃喉蛇】 卽黃領蛇之古籍別名。典見綱目。詳「黃領蛇」條。

【黃筍】 卽桃竹筍之別名。詳「桃竹筍」條。

【黃結】 卽山豆根之古籍別名。典見綱目。詳「山豆根」條。

【黃菊花】 卽菊花之處方用名。詳「菊花」條。

【黃菊花】 卽野菊花之處方用名。詳「野菊花」條。

【黃雅菜】 卽黃矮菜之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「黃矮菜」條。

【黃魴】 卽黃類魚之古籍別名。典見綱目。詳「黃類魚」條。

【黃黍】 卽黍之古籍別名。典見郭義恭廣志。詳「黍」條。

【黃嗜】 卽黃耆之古籍別名。典見綱目。詳「黃耆」條。

【黃楊木】 基本 係黃楊科。黃楊屬。產地 生山野間。

形態 黃楊木爲灌木類之常綠木。枝條繁茂。高二尺許。不易長大。俗謂歲長一寸。葉如初生槐芽。卵形對生。而青厚。四時不凋。春開小花。淡黃色。其木材堅韌。可作梳。剉印等最良。并可供藥用。

採取 凡取木。於陰晦夜無星時。伐之。則裂者良。

性質 苦平。無毒。

主治 婦人難產。入達生散中。用。又主暑月生癰。搗爛塗之。

【黃矮菜】 原名 黃芽菜。細無滓。故名。古籍別名 黃雅菜。花交菜。(綱目拾遺) 膠菜。(俗名)

形態 黃矮菜爲菜類。莖之變種。莖葉皆扁。層層圍裹。全體成圓柱形。頂成圓形。葉色淡黑。柔嫩甘美。可供蔬茹與藥用。

性質 甘溫。滑。無毒。

主治 利腸胃。除胸煩。解酒渴。補虛羸。和止嗽。滑竅降氣。

施用宜忌 凡患洩痢者禁用。

參攷資料 黃短矮菜有南北二種。南產者惟杭城太平門外沙

地產者爲最。他處悉高大粗鬆。絕無捲心密葉。味亦較遜。北產糧艘帶來者。味更美。質更細。且無粗筋。有重至十餘斤一槩者。南中亦不易得也。陳確齋云。食之潤肌膚。利五臟。且能降氣清音聲。(趙學敏)

【黃稞】 爲青稞之一種。功用詳「青稞」條。

【黃梁米】 命名 本品卽梁米之黃色者故名。

性質 甘平。無毒。

主治 益氣和中。止洩。

歷代記述攷證 【宋】日華諸家本草論黃梁米曰。去客風頑痺。

【明】李時珍本草綱目論黃梁米曰。止霍亂下痢。利小便。除煩熱。

參攷資料 ①青梁白梁。性質皆微涼。獨黃梁性味甘平。豈非得土之中和氣多耶。寇宗奭 ②諸梁比之他穀。最益脾胃。(蘇頌)

【黃葛樹】 古籍別名 嘉樹。(綱目拾遺) 黃果。(居易錄)

形態 黃葛樹爲喬木類之一種。種有三。共出羅江縣者。兩樹對植。圍各二三尺。上引橫枝。巨二丈。

久服長生。神仙傳載。封君達黑穴公。並服黃連五十年。得仙。竊謂黃連大苦大寒之藥。用之降火燥溼。中病即當止。豈可久服。使肅殺之令常行。而伐其生發沖和之氣乎。素問岐岐伯言。五味入胃。各歸所喜。攻久而增氣。物化之常也。氣增而久之由也。王冰註云。酸入肝。為溫。苦入心。為熱。辛入肺。為清。鹹入腎。為寒。甘入脾。為至陰。而四氣象之。皆得其味。而益其氣。故各從本臟之氣為用。所以久服黃連苦參。反熱從火化也。餘味皆然。久則臟氣偏勝。即有偏絕。則有暴夭之道。是以絕粒服餌之人。不暴亡者。無五味偏助也。又秦觀與喬希聖論黃連書云。聞公以眼疾。餌黃連至十數兩。猶不已。殆不可也。醫經有久服黃連苦參。反熱之說。此雖大寒。其味至苦。入胃則先歸於心。久而不已。心火偏勝。則熱乃其理也。况眼疾本於肝熱。肝與心為子母。心火也。肝亦火也。腎孤臟也。人患一水不勝二火。豈可久服苦藥。使心有所偏勝。是以火救火。其可乎。藥公此書。蓋因王公之說。而推詳之也。我明荆端王素多火病。醫令服金花丸。乃冬連梔藥四味。餌至數年。其火愈熾。遂至內障。表明觀此。則寒苦之藥。不但使人不能長生。久則氣增偏勝。速天之由矣。當以素問之言為法。陶氏道書。久服長生之說。皆謬談也。誤人最甚。醫宜知之。楊士瀛云。黃連能去心竅惡血。李時珍。

【黃連祖】即淫羊藿之古籍別名。典見日華諸家本草。詳「淫羊藿」條。
 【黃連頭】即黃練藤芽之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「黃練藤芽」條。
 【黃連芽】即黃練藤芽之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「黃練藤芽」條。
 【黃連祖】即淫羊藿之古籍別名。典見日華諸家本草。詳「淫羊藿」條。
 【黃連頭】即黃練藤芽之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「黃練藤芽」條。
 【黃連芽】即黃練藤芽之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「黃練藤芽」條。
 【黃雀】即雀之小而黃口者。典見綱目詳「雀」條。
 【黃雀花】即金雀花之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「金雀花」條。
 【黃魚】即石首魚之處方用名。詳「石首魚」條。
 【黃魚】即鱸魚之古籍別名。典見食療本草。詳「鱸魚」條。

【黃鳥】即鶯之古籍別名。典見詩經。詳「鶯」條。

【黃麻】 古籍別名 牛泥茨。三珠草。天紫蘇。（綱目拾遺）

外國名詞 Corchorus capsa

（L.）（拉丁）ツナン カナヒキヤ（日本）

基本 係田麻科黃麻屬。為黃麻之皮。

產地 出東印度及北省諸地。

形態 黃麻為麻之一種。一年生草本。高二三尺。三月生苗。葉為長卵形。端尖。互生。有微毛。大葉旁有兩小葉。如杏葉。夏秋間葉腋開小花。黃色。五瓣。至秋每葉生子三粒。如粟米。子內有一粒如菜子。嫩青老黑。其莖皮之纖維可製繩袋等物。並可供藥用。其根子葉詳見各該條。



黃 麻

性質 苦。溫。無毒。
 主治 專破血。通小便。陳者燒研酒服。

【黃麻子】 性質 熱。
 主治 行血。治咳嗽肺。

參攷資料 黃麻子功能行血。同風茄可製麻藥。（醫學大辭典）

【黃麻仁】即大麻仁之俗名。詳「大麻仁」條。

【黃麻根】 基本 本品即大麻之根與葉。

主治 搗汁或煮汁服。主瘰癧石淋。

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新修本草論麻根曰。治產難衣不出。破血。墮胎。帶下。崩中。不止者。以水煮服之。效。唐甄權藥性本草論麻根曰。治熱淋。下血。不止。取三九枚。洗淨。水五升。煮三升。分服。血止神驗。宋蘇頌圖經本草論麻根曰。根及葉。搗汁服。治過打瘀血。心腹滿。氣短。及腕折。骨痛。不可忍者。皆效。無則以麻煮汁代之。

【黃麻葉】 性質 苦。微辛。無毒。
 主治 婦人血崩。連。

瘡妙。

⑤治痔瘻後瀉瀉用黃連同乾葛甘草升麻芍藥。

⑥治酒病酒傷用黃連同五味子麥門冬乾葛神效。

⑦治口糜口瘡用黃連同五味子甘草煮濃汁漱口良。

⑧治卒消渴小便多用黃連同麥門冬五味子。

⑨治虛人患瀉下及老人產婦瀉下不止用黃連人參蓮子。

用量 三分至八分。

施用宜忌 凡病人血少氣虛脾胃薄弱血不足以致驚悸不眠而兼煩熱燥渴及產後不眠血虛發熱泄瀉腹痛小兒痘瘡陽虛作瀉行藥後瀉瀉老人脾胃虛寒作瀉陰虛人天明瀉瀉病名腎泄真陰不足內熱煩躁諸證禁用惡菊

花玄參白蘚皮芫花白殭蠶長款冬牛膝忌豬肉黃芩龍骨爲之使

著名方劑 ①左金丸治肝臟火實左脇作痛者丹溪黃連六兩柴黃一兩上爲細末粥丸煎

白朮橘皮下黃連散治大人小兒熱氣盛熱乘於血血乘熱氣溢

於鼻衄血得寒則凝凝結聚得熱則流散妄行黃連黃芩柏葉甘草各等分爲末煎去滓溫服

②香連丸治一切痢疾黃連五兩甘草三兩上以蜜水略拌溼置鍋中重湯

十二畫 黃

蒸良久取出曬乾如此者九次

入木香一兩爲末糊丸小陷胸湯治病在心下按之則痛脈浮滑者傷寒論黃連一兩半夏洗

牛升括實實一個三味水六升先煮括實取三升去滓納諸藥煮取

二升去滓分溫三服

③三黃湯治三焦實熱一切有餘火症及大便

祕結者本方黃連黃芩大黃各等分水煎服

參攷資料 ④黃連性寒味苦氣味俱厚可升可降陰中陽也入

手少陰經其用有六瀉心臟火一也去中焦溼熱二也諸瘡必用三

也去風溼四也赤眼暴發五也止中邪見血六也張仲景治九種心

下痞五等瀉心湯皆用之張元素

⑤黃連苦燥苦入心火就燥瀉心者其實瀉脾也實則瀉其子

也王好古

⑥黃連去中焦溼熱而瀉心火若脾胃氣虛不能轉運

者則以茯苓黃芩代之以豬膽汁拌炒佐以龍膽草則大瀉肝膽之

火下痢胃口熱禁口者用黃連人參煎湯終日呷之如吐再強飲但

得一呷下咽便好朱震亨

⑦古方以黃連爲治痢之最蓋治痢之宜辛苦寒寒辛能發散開通鬱結

苦能燥溼寒能勝熱使氣宣平而已諸苦寒藥多泄惟黃連黃蘗性

冷而燥能降火去溼而止瀉痢故治痢以之爲君張元素

⑧今人多用黃連治痢蓋執以苦燥之義下便但見腸虛泄微似有血便

卽用之又不可顧寒熱多少惟欲盡劑由是多致危困若氣實初病熱

多血痢服之便止不必盡劑虛而冷者慎勿輕用

⑨諸痛痒瘡皆屬心火凡諸瘡宜以黃連當歸爲君甘草黃芩爲佐凡服暴

發赤腫痛不可忍宜黃連當歸以酒浸煎之宿食不消心下痞滿

者須用連枳李杲

⑩黃連治目方多而羊肝丸尤奇異今醫家洗眼以黃連當歸芍藥等分用雪水

或甜水煎湯熱洗之冷卽再溫甚益眼目但是風毒赤目花翳用之

無不神效蓋眼目之病皆是血脈凝滯使然故以行血藥合黃連治

之血得熱則行故乘熱洗也蘇頌

⑪火分之病黃連爲主不但瀉心火而與辛藥諸苦藥列稱者

此也此日疾人以人乳浸蒸或點或服之生用爲君佐以官桂少許

煎卽沸入蜜空心服之能使心腎交於頃刻入五苓滑石大治夢遺

以黃土薑汁酒蜜四炒爲君以使君子爲臣白芍藥酒煮爲佐廣木

香爲使治小兒五疳以萊菔炒加木香等分生大黃倍之水丸治五

痢此皆得制方之法也韓愈

⑫黃連治目及痢爲要藥古方治痢香連丸用黃連木香黃連散用乾

薑黃連變通丸用黃連萊菔黃連散用黃連生薑治消渴用酒蒸黃

連治伏暑用酒煮黃連治下血用黃連大蘇治肝火用黃連萊菔治

口瘡用黃連細辛皆是一冷一熱一陰一陽寒因熱用熱因寒用君

臣相佐陰陽相濟最得制方之妙所以有成功而無偏勝之害也

李時珍 ⑬本經別錄並無黃連久服長生之說惟陶弘景言道方

廣連。色不黃則名不稱。性味既殊。功用自劣。誤服之則貽害多矣。①曹炳章曰。按黃連背陰草根也。苗似茶叢。經冬不凋。生於深山窮谷。幽僻無日照之處。必得凝寒之氣者爲上。八九月出新種。類甚多。隨地皆產。且有野生種植之別。惟四川野生者多佳品。爲治療上之要藥。

近人學說 ①顧子靜曰。黃連爲毛茛科植物黃連之根莖。秋日採集。除去鬚根。而乾燥用之。色黃無臭。氣味頗苦。日本猪子氏施精密試驗。得下之結論。①黃連之有效成分。爲備利備林。②備利備林於諸種之消化器病。最有效。③黃連之療治器病。功效甚著。片山寬助氏謂虎列拉（即霍亂）之初期。用黃連三分至五分。以一茶杯水煎出。一次服食。一日五六次。有特效。高橋正純氏謂腸炎。用黃連一錢煎。一茶杯水。分四次。一日服下。痢頓止。二三日全治。數多之患者。試用。均有良效。豐村讓氏謂黃連之功效有四。①大人及小兒之急性腸炎。用黃連四分煎。

一茶杯水。分三次。一日服。有大致。②但此爲成人量。小兒宜按年齡酌減。③小兒並無中毒之恐。④赤痢。最初一二日間。投下劑。後與黃連。有效。⑤腸寒扶斯（即傷寒）之下痢。亦由黃連而治。⑥腸結核。亦稱腸癰。之下痢。用黃連。亦得美滿之結果。黃連之用量。一日量。約爲一分五釐至四分五釐。⑦張山雷曰。黃連苦寒。所主皆溼積熱鬱之證。目痛。皆傷泣出。溼熱之鬱於上者也。目爲肝之竅。肝家鬱熱。目爲之病。苦寒清肝。則目自明。腸瀉腹痛。乃膿血交黏之滯下病。辭古止作辟。即帷裳變積之壁。故辟字有積聚之義。腸辟者。謂腸間積聚之溼熱也。燥溼清熱。故黃連爲治療滯下之主藥。下痢。則泄瀉也。惟泄瀉之病。有因於暑熱。亦有因於脾虛。暑熱者。宜苦以堅之。而脾虛則非其治矣。婦人陰中腫痛。亦溼滯熱鬱證也。別錄主五臟冷熱。久下洩。瀉膿血。即本經之腸澼也。消渴爲胃腸之熱證。大驚爲心月之熱證。苦寒清熱。是以主之。除水者。以熱結之水道不通言。

之。非通治脾胃虛寒之水病也。利骨者。苦以堅之耳。調胃厚腸。謂澱化溼熱。而腸胃調和。益臆者。清肝熱。即所以祛臆邪。即上文主大驚之意。療口瘡者。亦清脾胃之熱邪也。又曰。黃連大苦大寒。苦燥溼。寒勝熱。能泄降一切有餘之溼火。而心脾肝腎之熱。膽胃大小腸之火。無不治之。以上以清風火之目病中。以平肝胃之嘔吐下。以通腹痛之滯下。皆燥溼清熱之效也。又苦先入心。清滌血熱。故血家諸病。如吐血。衄血。便血。淋濁。痔漏。崩帶等證。及癰瘍。斑疹。丹毒。並皆仰給於此。但目疾。須合泄風行血。滯下。須兼行氣導濁。嘔吐。須兼鎮墜化痰。方有捷效。僅恃苦寒。亦不能操必勝之券。且連之苦寒。尤以苦勝。故燥溼之功。獨顯。凡諸證之必需於連者。類皆溼熱鬱蒸。特以爲苦燥泄降之資。不僅以清熱見長。凡非舌厚苦黃膩濁滿布者。亦不任此大苦大燥之品。即瘡瘍一科。世人幾視爲陽證通用之藥。實則惟疔毒一證。發於實火。需連最多。餘惟溼熱交結。亦所恒用。此外血熱血毒。

之不挾溼邪者。自有清血解毒之劑。亦非專恃黃連。可以通治也。

配合應用 ①治痧癰已透而煩躁不止。有神用黃連。同赤樺木。入三黃石膏湯。

②治盜汗有神。用黃連入當歸六黃湯。加棗仁龍眼。

③治風熱上攻。目赤痛。用黃連。同地黃甘菊荊芥穗甘草梢芎藭柴胡。蟬蛻。木通。

④黃連末一兩。同雄羊肝一具。生搗勻。衆手丸。如桐子。每服以滾藥水吞廿一丸。諸眼目疾及障翳青盲皆主之。禁食豬肉。雞油。汁。亦勿入口。作六劑。必效矣。

⑤黃連同當歸。甘菊花。人乳浸。入明礬。銅絲各少許。洗目甚效。

⑥治一切滯下。膿血。用黃連同芍藥。蓮子。藕豆。升麻。甘草。滑石。紅粳。

⑦治滯下純血。腹痛。用黃連同槐花。枳殼。乳香。沒藥。

⑧治小兒一切疳熱。用黃連同五穀蘆薈。白蕪黃。青黛。白檀花。白芙蓉花。如神。

⑨黃連同赤小豆爲細末。傅痔。

則爲陽盛。陽盛則宜瀉火。然致此陽盛。亦必其陰本虛。故阿膠芍藥雞子黃。無非救陰之品。瀉火則惟待苓連。而苓止一兩。連乃四兩。此黃連之任。獨冠一方。無可議矣。迨二方面觀。又可悟黃連一味。在黃連湯。爲溫劑中寒藥。在黃連阿膠湯。爲補劑中瀉藥矣。【清】賈九如辨藥指南論黃連曰。黃連味苦。苦能燥溼而去垢。性寒。寒能勝熱而不滯。善理心脾之火。凡口瘡牙疼。耳鳴目痛。煩躁惡心。中焦鬱熱。嘔吐痞悶。腸澀下痢。小兒疳積。傷寒吐瀉。諸痛瘡瘍。皆不可缺。入香連丸。祛腸中積滯。有厚腸之功。入吳茱丸。除吞吐酸水。有清胃之力。此皆一寒一熱。陰陽相濟。最得制方之妙。若薑製以和其寒。少變其性。引至熱所。不至抵牾。則能止嘔。酒炒。引上焦清頭目。豬膽拌炒。瀉肝膽火。單炒黑用。脾虛熱瀉。獨爲妙劑。生用。癰腫解毒。尤其所宜。但胃中停食。及胃虛作嘔。傷寒下早致瀉。皆宜禁用。

國外學說 日本藥學博士猪子吉人氏言其根中含有祕魯培

十二畫 黃

林 (Berberin $\text{C}_{20}\text{H}_{19}\text{NO}_4$)。奧格倫僕根中所含主成分相同。故其效用。亦與格倫僕根同。祕魯培林爲美麗微細黃色星狀結晶體之植物鹽基。無臭而味極苦。並言其根中。平均含有一五%。又用普通煎法。其湯中含有九%。其醫治之用。試驗於動物。見有收糖子宮之作用。因其有制酸及收斂作用。故對目膜腸胃之炎症。確能奏效。據臨床經驗。以諸般消化器病。及腸加答兒。最爲奏效。貝爾貝林爲一種亞爾加魯兒度。廣存於植物界中。在一八三五年始經普西納爾氏自 Berberis vulgaris, L. 中發現。依原植物之名。始命名爲貝爾貝林 (Berberin)。溫度至攝氏百二十度時。則熔融變爲赤褐色之樹脂樣物。而依須密都氏及西路巴哈氏 (Arch. d. pharmac. 1867, Heft. 4) 之研究。謂貝爾貝林之鹼性液中。加過錳酸加里。酸化時。則能發生。可令人注目之一種分解產物。即 Hemipineure 而在 Grmelin, Handb. d. Organ. Chem. IV, ante, 4.

p. 336 中則載有雅片鹽基納爾科季 (Narcotin)。酸化時亦發生 Hemipineure。如此則 Berberin 與 Narcotin 在化學上既有如斯之關係。而在生理作用。似亦應有相當之關係也。依佛爾古氏 (Falk. 1851) 就家兔之研究。曰。投以致死量。〇・五乃至一〇・五瓦時。則呼吸起障礙。後肢痺癢。終陷於描弱而死。然後再又與 Grmelin 等就犬重複試驗。則雖用至一・七五瓦亦不能致死。故 Grmelin 氏在其有機化學第四卷中。則記 Berberin 爲無毒之物質。貝爾貝林對人體之毒亦甚輕微。不足介意。況且依貝爾古路及普西納路兩氏謂其。〇・二至〇・六具有亢進食慾之功效。依基電路氏研究。曰。貝爾貝林雖有制止酸酵作用。而毫無防腐作用。黃連中雖無鞣酸。而有收斂作用。概屬貝爾貝林之功也。普西納爾曾用黃連爲健胃藥。特別是對於熱性病之恢復期有效。其外如消化不良。胃病。各種下痢。加答兒性黃疸等。皆有效。一回常用其一

・一至一・八製成煎劑九〇。〇用之。由是觀之。我國古時治目。治痢。用黃連之所以有效者。明矣。卽因黃連之有效成分。貝爾貝林有收斂作用。故對於眼目之炎性疾患有效。因其有制酸及收斂作用。故能奏止泄之功。況且依包路氏 (Bohl) 謂一般苦味質藥。皆能刺激腸黏膜。及其附近之淋巴裝置。使淋巴球。卽白血球。增殖。進入人體之防禦力。而黃連卽屬一種苦味藥。當然亦能使白血球增殖。亢進其止痢之功效也。而黃連因其刺激腸黏膜。及其附近之淋巴裝置之作用。故亦能增進食慾。能亢進其吸收作用。此黃連在今日醫界。猶能保存其地位。在歐美藥制中之所以收爲苦味健胃止泄劑也。

辨偽 鄭肖巖曰。黃連僞名廣遠。卽洋川連。色不黃。中有花點。皮黑面有毛。按黃連以四川雅州出者爲佳。故名雅連。形如雞距。故又名雞爪連。氣味苦寒。色極黃。易於辨識。近有辦峨眉山所產者。價值甚昂。漳泉人最喜購之。若此種

消。癰疽瘍瘡能愈。肝虛能鎮。與婦人陰蝕。小兒疳積。並火眼赤痛。吐血衄血。諸癰等症。亦無不由此調治。亦何莫不因溼熱火退而言。豈於溼除火退之外。尚有治效之著哉。況此性稟純陰。在人腸胃素厚。挾有燥溼火熱。服之過多。尚有偏性爲害。而致胃陽頓絕。生氣漸滅。矧有脾陽素弱。因此一言流播。而可恃爲常服者乎。今人一見火熾。不論是寒是熱。是虛是實。輒以取投。以致偏勝貽害。暗受天折。殊堪嘆惜。出四川瘦小狀類。鸞爪連爪連珠者良。薑汁炒【清】。鄒樹本經疏證論黃連曰。徐洄溪曰。苦屬火。性皆熱者。常理也。黃連至苦。而反至寒。則得火之味。與水之性。故能除水火相亂之病。水火相亂者。溼熱是也。是故熱氣目痛。腎傷淚出。目不明。乃溼熱在上。腸澼腹痛。下利。乃溼熱在中。婦人陰中腫痛。乃溼熱在下。者悉能除之矣。凡藥能去溼者。必增熱。能除熱者。必不能去溼。惟黃連能以苦燥溼。以寒除熱。一舉而兩得焉。黃連根株叢延蔓。引相屬。有數百株共一莖者。故

名連。其治亦多蔓延淹久之證。如浸淫瘡。黃連粉主之是矣。夫名浸淫。則非初起暴得之疾。亦非一治可瘳之候。故傷寒論金匱要略兩書。從未有新得之病用黃連者。黃連根黃花黃實。皆具土色。四月開花。六月結實。七月根聚。適逢太陰溼土陽明燥金主令時。宜乎爲入脾胃之藥矣。乃仲景諸瀉心湯。以之爲關鍵。何歟。夫仲景瀉心瀉心證之源。曰病發於陽。而反下之。熱入因作結胸。病發於陰。而反下之。因作痞。結胸稱熱入痞不稱熱入。可見所入之邪。非陽邪矣。陰邪結於陽位。心下痞硬。非心病而何。心自病。不能煖土。土遂不運。而乾噫食臭。乾噫心煩下利。腹中雷鳴者。心氣被遏。不能上行。下走腸間也。夫心之爲體。於卦象離。今被邪逼。則外陽內伐。內陰騰沸。故半夏甘草生薑三瀉心湯。治陰邪之未化者也。大黃黃連附子二瀉心湯。治陰邪之已化者也。陰邪已化。不逼心陽。則在內之沸亂略定。惟在外之邪氣尙阻。則取二黃之泄熱。蕩去其邪。邪去正自安矣。惡寒

汗出者。在上之陰邪繞化。在下之陰氣復逆。故輕取仁黃之氣。以蕩熱除穢。重任附子之威。以追逐逆陰。使之異趨。同歸相成。而不相背也。其未化者。陽餒胸於陽位。而恣肆於陰分。邪盤踞於清道。而潰泄於下焦。非乾薑半夏生薑之振散陰霾。不足以廓清心之外邪。非入蕩黃連之養陰泄熱。不足以安擾心之內訌。然則直謂之補心可也。而曰瀉心何哉。夫稱謂當循其實。補者益其虛。瀉者泄其實。今者明因邪氣入伐。致心臟內訌。若曰補則嫌於無邪矣。顧可乎。本經所謂腸澼腹痛下利者。與此正同。蓋腸澼腹痛下利。多發於夏秋溼熱之交。盛暑之時。心氣發舒。其驗在汗。所謂汗爲心液也。當此之時。或由口食寒膩。阻遏其發舒之氣。或由乘風取涼。使汗不得暢。於是火鬱於中。陰凝於外。因遂生溼淫復生熱。寒熱與溼輾轉膠固。故後世所製香連實連等法。均仿此意爲之。傷寒胸中有熱。胃中有邪氣。腹中痛。欲嘔吐者。黃連湯主之。少陰病二三日已上。心中煩。不得臥。黃連

阿膠湯主之。二方皆以黃連爲君。二證皆發於心。可見黃連爲瀉心火之劑矣。成無已曰。陰不得升。獨治於下。爲腹中痛。陽不得降。獨治於上。爲胸中熱。欲嘔吐。夫陰之升。其體由胃。其用由肝。陽之降。其源由肺。其責由心。然脾胃爲升降之樞。脾提胃肝之氣。以升。胃曳心肺之氣。而降。故治陰之不升。必兼治脾。治陽之不降。必兼治胃。是於黃連湯。又可參黃連爲心胃之劑。嘔吐爲胃病。故後世治嘔用黃連。其效最捷。蓋上升皆火之變。見人身之火。惟欲其升降。升則爲病。即所謂諸嘔吐酸。諸逆沖上。皆屬於火者。也。尤在溼日。陽經之寒變爲熱。則歸於氣。陰經之寒變爲熱。則歸於血。陽經之熱。或有歸於血者。惟陰經之熱。則必不歸於氣。故三陰有熱結證。不用調胃承氣小承氣。而獨用大承氣。諸下利證。不已。必便膿血。是其驗也。心中煩。不得臥。熱證也。至二三日已上。乃心中煩。不得臥。則非始即屬熱矣。始即屬熱。心中煩。不得臥者。爲陰虛。陰虛則不得瀉火。今至二三日已上。始見

治上焦火。則以酒炒。治中焦火。則以薑汁炒。治下焦火。則以鹽水炒。或朴硝炒。治氣分溼熱火。則以茱萸湯浸炒。治血分塊中伏火。則以乾漆水炒。治食積火。則以黃土炒。諸法不獨爲之引導。蓋辛熱能製其苦寒。鹹寒能制其燥性。在用者詳酌之。

性質 苦寒。無毒。

成分 黃連含有『秘魯培林。』

(Berberin $C_{20}H_{19}NO_3$) 與格倫僕根中所含主成分相同。故其效用亦與格倫僕根同。祕魯培林爲美麗微細黃色星狀結晶體之植物鹽基。無臭而味極苦。對於試驗紙呈中性反應。冷水及冷酒精難溶。用溫湯及溫酒精則易溶而呈黃色。液將其熱至百度。初變赤色。終復返爲黃色。若再加高熱。則分解發出黃色蒸氣。

效能 清心火。燥脾溼。涼血。消瘀。厚腸。止瀉。用作瀉火燥溼之健胃藥。又治胃酸缺乏之消化不良症。初期亦病。慢性腸炎。漏膿眼等作用。加增胃液之不足。使消化機能亢進。又能刺激脈管運動。

之中樞神經。而使腸壁之脈管收縮。如與痢病菌相遇。有制其繁殖力。并能阻止其本身之活動力。

主治 熱氣目痛。皆傷泣出。明目。腸瀉。腸痛。下痢。婦人陰腫。痛久服令人不忘。(本經)又主五臟冷熱。久下洩。瀉膿血。止消渴。大驚。除水利骨。調胃厚腸。益膽。並療口瘡。(別錄)

張仲景之發明 黃連一味。經

張仲景之實驗。認爲主治中心煩悸。旁治心下痞。吐下。腹中痛。茲考徵如下。●黃連阿膠湯證曰。心中煩。不得臥。(以上黃連四兩)●黃連湯證曰。胸中有熱。腹中痛。欲嘔。吐。●乾薑黃連黃芩人參湯證曰。吐下。●葛根黃連黃芩湯證曰。利遂不吐。●白頭翁湯證曰。下利欲飲水。(以上黃連皆三兩)●大黃黃連瀉心湯證曰。心下痞。按之濡。

●瀉心湯證曰。心下痞。(以上黃連皆一兩。而亦三兩之例)●歷觀上諸方。黃連治心中煩悸也明矣。故心中煩悸。而痞者。吐者。利者。腹痛者。用此皆治也。此外用黃連一兩

方多。其比餘藥分量差少。但舉心胸之微疾。不足取而徵焉。故不枚舉也。

歷代記述攷證

【唐】陳藏器本草拾遺論黃連曰。治羸瘦氣急。【宋】大明日華諸家本草論黃連曰。治五勞七傷。益氣。止心腹痛。驚悸。煩躁。潤心肺。長肉。止血。天行熱疾。止盜汗。并瘡疥。諸肚蒸爲丸。治小兒疳氣。殺蟲。(金)張元素珍珠囊論黃連曰。治鬱熱在中。煩躁惡心。兀兀欲吐。心下痞滿。【元】王好古湯液本草論黃連曰。主心病逆而盛。心積伏梁。【明】李時珍本草綱目論黃連曰。去心數惡血。解服藥過煩燥。及巴豆輕粉毒。【明】李士材本草圖解論黃連曰。黃連苦寒入心。爲治火之主藥。瀉心火而除痞滿。療痢疾而止腹痛。清肝膽而明耳目。祛溼熱而理瘡瘍。利水道而厚腸胃。去心數之惡血。治心積之伏梁。嚴謂黃連大苦大寒。行隆冬肅殺之令。譬如聖世不廢刑威。惟不得已而後敢用。若概施之。則暴虐甚而德意窮。民不堪命矣。喜用寒涼者。尙其戒諸黃連止

入心家。言清肝膽者。實則瀉子之法也。清心火者。生用。清肝膽火者。吳茱萸拌炒。上焦之火宜酒炒。下焦之火宜鹹水炒。中焦之火宜薑汁炒。蓋辛熱能制其苦寒。鹽潤能制其燥耳。【明】繆希雍本草經疏論黃連曰。黃連氣味苦寒而無毒。味厚於氣。味苦而厚陰也。宜其下洩。欲使上行。須加引導。入手少陰陽明。足少陽厥陰。足陽明太陽。爲病酒之仙藥。滯下之神草。六經所至。各有殊功。其主熱氣目痛。皆傷淚出。明目。大驚。益膽者。涼心清肝膽也。腸瀉腹痛。下痢。別錄兼主泄瀉。泄者。瀉利也。瀉者。大腸下血也。俗呼爲瀉毒除水。利骨。厚腸胃。療口瘡者。瀉除腸胃脾三家之濕熱也。久服令人不忘者。心家無火。則清。清則明。故不忘。禪家習定多飲苦者。亦此義爾。【清】黃宮繡本草求真論黃連曰。黃連大苦大寒。據書所載。治功備極表著。且以別錄中有厚腸胃一語。互爲傳播。以至於今。謬尤莫闕。貽害無窮。詎知黃連止瀉瀉心之品。除溼之味。即云腸瀉能止。口乾能除。痞滿腹痛能

十二畫 黃

之皮部及淡黃色之木部。木部中有大髓心或髓心空洞。本品無臭而味極苦。



連黃

種類 ①菊葉黃連 (*Coptis anemoneifolia* S. et Z.) 葉類菊葉。早春抽莖。長四寸至一尺許。分出數梗。皆互生。每梢開白花。花後生新葉。②芹葉黃連 一名長葉黃連 (*Coptis branchyptetala*, S. et Z.) 爲二回羽狀複葉。類芹葉。③細葉黃連 (*Coptis branchyptetala*, S. et Z. Var. *pygmaea*, Miq.) 爲數回羽狀複葉。爲前者之變種。④大葉黃連 一名薩摩黃連 (*Coptis orientalis*, Maxim.) 葉類菊葉而粗大。⑤五加葉黃連 一名梅花黃連 (*Coptis quinquefolia*, Miq.) 葉爲五梗狀小葉。似五加葉而小。⑥三葉黃連 一名醋漿草黃連 (*Coptis trifolia*, Salisb.) 莖高三寸。葉爲

倒卵圓形。三小葉。邊緣有銳齒。

種植 栽培黃連。有分根栽培。與下種栽培二種之別。分根栽培者。以其株下根部分其根而植之。也。下種栽培者。以其種子播下於地。而後漸漸生長者也。總之。分根與下種。無甚差異。不過分根取其生長速。下種取其種實多而已。欲栽培者。皆可取其法而行之。①氣候及適地。栽培黃連。氣候以溫。和少寒。冷者爲最適。若寒冷過甚。地方及熱帶地方。均不適其生長。土質則溼潤之砂質土。爲最佳。次之。則腐植質土。尙能生育。餘若黏土。重黏土。石灰土等。皆不能生長也。故氣候土質。爲栽培黃連者。應究之事項。否則不察氣候。不辨土質。而妄栽於不適之土地。不宜之氣候。則徒耗多量之資本。費多時之勞力。恐難得其良果也。②產地及種類。黃連產地甚少。吾國僅揚子江一帶。如湖北。安徽。四川等地方。略有產出。然其品質。不無優劣。產於四川者。爲最佳。產於湖北者。次之。產於安徽者。爲最劣。故藥品上所用黃連。以四川爲最多。爲其品質優佳。凡黃連所需要之氣候土質。正適其當也。至於種類。以產出地名之。③治地。耕起砂質地之土塊。使之細碎。而後可以作畦。若不作畦。則排水須易。不使停滯。積水。若排水不易。積水停滯。則土中之空氣。難以流通。有礙黃連之生長。以致結果不良。以上所述。乃分根栽培之治地也。下種栽培。則否。先作冷床。而後播種於其中。迨其稍長。再移植於他土。④栽種。欲以分根栽培黃連者。於秋時分其根。而栽培於砂質土中可也。種子栽培者。治地作床。既畢。之後。下種於冷床中。疎整之。以待春期之假植也。假植之後。苗生長至二三年。然後於秋時。八九月之交。乃作畦。以移植之。畦幅三尺五寸至四尺五寸。株與株相隔約一尺。⑤管理。黃連爲木本植物。其管理較草本植物爲易。故除草等項。可毋庸十分注意。惟有暇時。除之則更佳。⑥施肥。黃連所需肥料。以堆肥。油粕二種爲主。餘若糞素。磷酸。加里等肥料。皆不適於黃連之生長。故可不施。每黃連一畝地。積當需堆肥二百

一四一八

斤左右。用油粕約五十斤左右。且未施。以先堆肥與油粕二肥。互相混和。堆積之。以待其腐熟。而後施之。時。期分三次。第一次在下種後施之。第二次在假植後施之。第三次在移植後施之。可也。⑦收穫。調製。收穫之期。在定植後四五年。於秋季八九月之間。採收之。既刈獲。後。去其毛根。不可洗滌。即曝於日中。待乾燥之後。藏於木製之箱中。而置於高燥處。以待市價可也。⑧計算。因栽培之巧拙。亦有優劣之分。優者。每畝之收量。約百餘斤。劣者。亦可得七八十斤。其價以品質之優劣而定。且其市價。又不一律。故不贅述。

採取 七八月間。根緊。乃堪採之。

製法 雷斅曰。凡使黃連。以布拭去肉毛。用漿浸二伏時。漚出。於柳木火上焙乾。用李時珍曰。五臟六腑皆有火。平則治動。則病。故有君火相火之說。其實一氣而已。黃連入手。少陰經。爲治火主藥。本臟火則生用。治肝膽實火。則以豬膽汁浸炒。治肝膽虛火。則以醋浸炒。

作藥扶疏。百本戴在首。如衛氣出目行頭。(衛出下焦其行始明。明穴)自上而下。從外而內。百骸百脈。咸衛外而固矣。其行可久可速。能知衛氣出入之道路。便能了知黃芪之功用矣。(虛不遠)

【黃茶菊】 命名 本品即茶菊之黃花者故名。

探取 以紫蒂者爲佳。
性質 苦微甘平無毒。

主治 去風明目。搜肝氣。益肺腎。治頭暈目眩。補血潤容。入血分。

【黃荊】 即荊子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蔓荊子』條。

【黃荊實】 即荊實之古籍別名。典見圖經本草。詳『荊實』條。

【黃草】 ①即葦草之古籍別名。典見吳普本草。詳『葦草』條。②即艾葉之古籍別名。典見埤雅。詳『艾葉』條。

【黃骨魚】 即黃鱮魚之古籍別名。典見綱目。詳『黃鱮魚』條。

【黃婆爛】 即胡頹子之古籍別名。典見綱目。詳『胡頹子』條。

【黃梅】 即迎春花之日本名。詳『迎春花』條。

【黃梅】 即迎春花之日本名。詳『迎春花』條。

【黃梅花】 即蠟梅花之古籍別名。典見綱目。詳『蠟梅花』條。

【黃梔子】 即山梔子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『山梔子』條。

【黃硫砂】 即硫黃之古籍別名。典見藥性。詳『硫黃』條。

【黃腹蠶】 即巧婦鳥之古籍別名。典見綱目。詳『巧婦鳥』條。

【黃袍】 即鶯之古籍別名。典見陸璣詩疏。詳『鶯』條。

【黃連】 命名 本品根如連珠而色黃故名。

處方用名 川黃連。小川連。川雅連。川連上。川連雅。連古勇。連真川連。

古籍別名 王連。(本經)支連。(藥性)水連。(名實)宣連。上草。棟連。淨黃連。滴膽芝。(和漢藥考)

學名 *Coptis teeta*, Wall.

外國名詞 *Radix coptidis*, (拉丁) *Coptis-root*, (英) *Kop-tis wurzel*, (德)

基本 黃連屬毛茛科。此係採掘其曾經七八年之根莖。去鬚根曬乾而用之者。

產地 黃連爲治療上之要藥。

產地 黃連爲治療上之要藥。

隨地皆產。且有野生種之別。惟四川野生者爲最佳。故名川連。茲將其產別形態詳別於下。四川峨嵋山產者曰峨嵋連。蘆鞭而綠刺硬皮黃。切開空心。有菊花紋。金黃色者爲最上品。瀘州野生者曰瀘州連。蘆鞭中空而圓。有硬刺。色黃帶青。頭尾均勻。切開亦有菊紋。亦佳。馬湖所出者亦鞭。蘆鞭刺。皮色青帶黑。首尾一樣有節。均爲佳。紫岩溝五厘山出者。瘦小。有蜂腰。皮毛柔。鞭蘆鞭刺亦佳。以上皆野山出品。打箭爐出者。亦曰水連。皮黑刺少。無蘆鞭。有枝。色黃。略次。重慶種出者。曰母珠連。硬蘆鞭而扁。頭粗尾細。色黃。更次。喇山種出者。曰喇連。蘆鞭硬刺。略軟。色黃。切開空心者。亦次。四川石柱縣種出者。曰味連。形似雞爪。連亦次。嘉定管高廟所出者。曰嘉定連。俗名母連。種後五年出土。皮如鱗甲。肉色黃而帶紅。亦次。南川金佛山產者。曰金山連。蘆鞭連少。亦次。岡山種出者。曰岡連。皆次。以上皆四川產也。雲南野出者。曰雲景連。體軟。蘆鞭。形似鴨腳爪。皮黑。肉色黃。亦次。種者

蘆鞭刺軟。更次。廣西產者曰新山連。皮光。色黃。質重。斷則淡黃色。其次。處州出產。曰土連。皮色黃。肉質心淡。色味雖苦。兼甜。亦極次劣。奇會工出者。曰會連。形似母連。皮略黑。肉空。蠶乃馬所食。不入藥用。鷄屎連。色黑。細小。斷則綠色而淡。亦極次劣。不入藥。近有日本產者。曰洋連。形色與川連相同。皮光而毛刺。肉黃。取汁可爲染色。故又曰色連。性更次劣。不堪入藥。自雲連至洋連。終俱屬側路偽品。服之甚爲害人。望藥界注意爲幸。

形態 黃連爲生長山野宿根草。其種類甚多。莖高自二三寸至尺餘。四時不凋。春季於舊葉旁抽花莖。其上部簇生白色花。葉由種類而異。而其載於日本藥局方以 *Coptis anemoneifolia*, *S. et Z.* 及其他 *Coptis* 屬根莖充之。其形態以丹波黃連規定之。載於日本藥局方者如次。黃連粗約一至五密米。長約至四仙米。多彎曲。有細小多數副根。處處有疣狀隆起。外面呈黃灰色。破折面尖銳粗糙。橫斷面則現出厚暗橙黃色。

徵論方

①治酒疸黃疾。心下懊痛。足脛滿。小便黃。飲酒發赤。黑黃斑。由大醉當風入水所致。用黃耆二兩。木蘭一兩。爲末。酒服。方寸匕。日三服。(肘後方)

②治氣虛白濁。黃芪鹽炒半兩。茯苓一兩。爲末。每服一錢。白湯下。(經驗良方)

③治渴補虛。男子婦人諸虛不足。煩悸焦渴。面色萎黃。不能飲食。或先渴而後發瘡癰。或先癰疽而後發渴。並宜常服此藥。平補氣血。安和臟腑。終身可免癰疽之疾。用綿黃耆箭筈者去蘆。六兩。一牛生焙。一半以鹽水潤溼。飯上蒸三次。焙到粉甘草一兩。一牛生用。一半炙黃爲末。每服二錢。白湯點服。早晨日午各一服。亦可煎服。名黃耆六一湯。(外科精要方)

④治老人悶塞。綿黃耆。陳皮去白各半兩。爲末。每服三錢。用大麻子一合。研爛。以水濾漿。煎至乳起。入白蜜一匙。再煎沸。調藥空心服。甚者不過二服。此藥不冷不熱。常服無秘塞之患。其效如神。(和劑

局方)

⑤治腸風瀉血。黃耆。黃連等分。爲末。麵糊丸。綠豆大。每服三十丸。米飲下。(孫用和祕寶方)

⑥治尿血。沙淋。痛不可忍。黃耆人參等分。爲末。以大蘿蔔一個。切一指厚。大四五片。蜜二兩。淹炙。令盡。不令焦。點末食。無時。以鹽湯下。(永類鈴方)

⑦治吐血不止。黃耆二錢半。紫背浮萍五錢。爲末。每服一錢。薑蜜水下。(聖濟總錄方)

⑧治咳嗽膿血。咽乾。乃因虛中有熱。不可服涼藥。以好黃耆四兩。甘草一兩。爲末。每服二錢。點湯服。(席延賞方)

⑨治肺癰得吐。黃耆二兩。爲末。每服二錢。水一盞。煎至六分。溫服日三四服。(聖惠方)

⑩治胎動不安。腹痛下黃汁。黃耆。川芎。各一兩。糯米一合。水一升。煎半升。分服。(婦人良方)

⑪治陰汗淫溼。綿黃耆酒炒。爲末。以熱豬心點喫。(濟急方)

⑫治瘡疽內固。黃耆人參各一兩。爲末。入真龍腦一錢。用生藕汁

和丸。綠豆大。每服二十九丸。溫水下。日日服。(本事方)

⑬用量 錢半至三錢。

⑭施用宜忌 凡非氣虛而表裏有實邪者。禁用。惡龜甲。白鮮皮。畏防風。茯苓爲之使。

⑮著名方劑 ①玉屏風散。治自汗不止。氣虛表弱。易感風寒。(潔古方) 黃芪(炙) 防風各一兩。白朮(炒) 三兩。共研末服。②保元湯。治小兒慢驚。痘證險惡不起。以及虛寒雜病。(東垣方) 黃芪三錢。人參二錢。炙甘草一錢。生薑一片。肉桂(春夏二分。秋冬六七分) 水煎服。

⑯參攷資料 ①黃耆治氣虛。盜汗并自汗。及膚痛。是皮表之藥。治咯血。榮脾胃。是中州之藥。治傷寒尺脈不至。補腎臟元氣。是裏藥。乃上中下內外三焦之藥也。(王好古) ②黃耆補元氣。肥白而多汗者爲宜。若面黑形實而瘦者服之。令人胸滿。宜以三拗湯瀉之。(朱震亨) ③黃耆防風。世多相須而用。唐許胤宗爲新蔡王外兵參軍。王太后病風。不能言。脈沉難對醫。

告術窮。胤宗曰。餌液不可進。卽以黃耆防風。煮湯數十斛。置床下。氣如霧熏。薄之。是夕語。(本草衍義)

⑰黃耆出隴西者。溫補。出白水者。冷補。又有赤色者。可作膏用。消癰腫。(陶弘景) ⑱凡虛而有客熱者。用白水黃耆。虛而有客冷者。用隴西黃耆。(陳藏器) ⑲黃耆藥中補益。呼爲羊肉。(一) 白水耆。涼。無毒。排膿活血。及治煩悶熱毒。骨蒸。

(二) 赤水耆。涼。無毒。治血退熱毒。(三) 木耆。涼。無毒。治煩排膿之力較遜。(大明日華本草) ⑳黃耆甘溫。純陽。其用有五。補諸虛不足。一也。益元氣。二也。壯脾胃。三也。去肌熱。四也。排膿止痛。活血生血。內托癰疽。爲瘡家聖藥。五也。又補五臟諸虛。治脈弦自汗。瀉陰火。去虛風。無汗則發之。有汗則止之。(張元素)

㉑防風能制黃耆。黃耆得防風。其功愈大。乃相畏而相使也。(李東垣) ㉒凡氣實內塞。胸膈閉悶。腸胃有積滯。及多怒肝氣不和者。勿服。其陽盛陰虛。上焦熱甚。下焦虛寒者。忌之。痘瘡血分熱甚。者禁用。(繆仲淳) ㉓黃耆獨聖。叢生。

禁。用。(繆仲淳) ㉔黃耆獨聖。叢生。

依余個人所閱之參考書，皆謂產自我國及日本。從未有記自歐洲亦產者。其學名因此亦紛紛不一。西人則多譯自日本。如 Chinese Materia Medica 及 Botanical Chemical and Pharmacological reference list to Chinese Materia Medica 等，則記其學名為 Astragalus Hoangchehy。察“Hoangchehy”是日人讀黃芪之音。又如稱爲 Astragalus hiroshimanus Mak 者，因黃芪在日本多產自安藝。即今之廣島之地方，因命名謂廣島黃芪。日人讀廣島之音爲“Hiroshima”，故西人即譯爲 Astragalus hiroshimanus。如是吾人如稱爲 Astragalus huang-chi，似亦未嘗不可。且黃芪本產地而異其功效。如李時珍在本草綱目發明中，引陶弘景之言曰：出隴西者溫補，出白水者冷補。如是吾人何能以日本產之 Astragalus hiroshimanus 表示中國黃芪。此鄙意以爲，如果稱爲 Astragalus hiroshimanus，何如稱之謂 Astragalus huang-chi 爲妥。又素稱精

通湖北產植物名之英人 Henry 氏在彼所著之 Anaphabetical list of Chinese names of plants 中，記黃芪之學名爲 Astragalus Henry oliv。故日人多以之爲中國黃芪之學名。如 Chimoyama Pharmacognosie 及 Pharmaceutische Botanik 等書，多記爲 Astragalus Henry oliv。又和漢藥考則記中國產者爲 Astragalus Henry oliv。日本產者爲 Hedysarum esculentum Ledeb。而國人又有以 Astragalus hiroshimanus Mak 或 Hoangchehy 爲中國黃芪之學名者。其屬背謬錯誤者，不可不喻矣。今姑就余個人之意見，謹定學名及其種類於次。黃芪 Huang-chi (中) 黃芪 Hoangchehy (日) (一) Astragalus Huang-chi 產自中國 (Astragalus Hoangchehy) (Astragalus Henry oliv) (中) Astragalus Chih-shui-Huangchi 陝西同州赤水鄉 (二) Astragalus

Pe-shui-Huangchi 陝西同州白水鄉 (丙) Astragalus Mien-Huang-chi 山西沁州綿上 (丁) Astragalus Mien-chou-Huang-chi 產自滿洲 (戊) Astragalus Mu-Huang-chi (一) Astragalus hiroshimanus Mak 產自日本 (廣島) (二) Astragalus reflexipolius Miqu 產自日本 (四) Astragalus adungensis pall 產自日本富士 (五) Hedysarum esculentum, Ledeb 產自日本。總之吾人研究國藥，固應先擇其功效卓著，富有興味者研究之。然如甘草黃耆人參等中醫常用之藥，似亦不可屏棄不遺。因研究最終之目的，爲解決實地之問題。故也。至黃耆之種類及學名，皆因產地而異。吾人不應以日本產之 Astragalus hiroshimanus Mak 表示國產黃耆。況我國黃耆又有赤白水綿耆等之區別也。昔日醫籍雖記黃耆爲補虛延長氣息之聖藥，然依余之不完備之試驗成績判斷時，黃耆至少亦不能具有強壯之功效。其有效之主要

成分，雖不敢斷言。然屬 Alkaloid 爲不可少疑之事實也。

配合應用 ①黃耆在補中益氣湯、甘溫能除大熱、爲治勞倦發熱之要劑。

②黃耆同生熟地、黃、黃蘗、黃牛黃連、當歸、加酸棗仁、炒熟研，爲治陰虛盜汗之正法。本方去三黃，加人參、五味子、酸棗仁，治表虛自汗。

③黃耆同桂枝、白芍藥、防風、炙甘草，能實表，治表虛畏風、傷風自汗。

④黃耆與茅山朮、生地黃等分、牛膝、黃芩、減半，作丸，治積年溼毒、癰瘡，百藥不效。

⑤主甲疽疔腫爛，生脚指甲邊赤肉出。黃耆二兩、蘭茹三兩，苦酒漬一宿，豬脂五合，微火上煎，取三合，絞去滓，以汁塗上，日三四易。其對即消。(外臺秘要方)

⑥黃耆同白芷、白及、甘草、金銀花、皂角刺，排膿止痛。

⑦黃耆同人參、甘草，治天行痘瘡，陽虛無熱證。

⑧治小便不通，綿黃耆二錢，水二錢，煎一錢，溫服小兒減半。(總

無不節取本經排膿止痛四字。泛指爲瘡家必用之藥。所以庸俗之書治瘍各方類皆不問虛實。插入黃芪一味。自謂能讀本草。而富貴家亦喜其堂皇冠冕。信之不疑。不知毒勢方張。而用實表之藥。爲虎傅翼。適以愈張其獷。則腫瘍難消。潰瘍毒熾。排膿適以生膿。止痛乃以增痛。皆誤讀本經之咎矣。潔古所謂內托阻陰疽。注重陰證。猶可說也。然堅腫而實其表。亦以助邪。終屬非法。且瘡家聖藥四字。卽爲後人沿訛襲謬之根。而繆氏經疏竟謂其治小兒胎毒瘡癰。則皆熱毒淫火之病。而投甘溫固表。直是抱薪救火。誤讀古書。抑何至於此極。景岳石頑皆高明之士。所謂藥物皆有經驗。而猶仍斯謬。又何怪庸耳俗目之人云亦云。蒞蘆依機耶。壽頤於瘍科一門。具有師承。凡在腫瘍及潰瘍之毒勢未清者。概不浪投補劑。以取悅富貴之家。惟廣久元虛或虛寒之體。始以四君六君保元歸脾等方。隨宜擇用。非矯異於庸俗也。亦澄清之不容不爾者也。敢揭而出之。爲世俗之

治瘍者告。俾知本草經固未嘗不可信。特不可爲誤讀古書者所惑。庶幾令病人少受痛楚。亦治醫者之陰德也。白朮條中昔人曾有潰瘍禁用之說。以其能生膿作痛也。張石頑亦信之。試問同是補益肌肉之品。何以一忌一宜。大相刺謬如此。豈有朮之補脾。必生膿作痛。而芪之固表。反有消膿止痛之理。則後先虛實。不加辨別。而混爲一例之過也。須知藥之治病。全在用之得當。同此一病。而前後之虛實不同。斯攻補卽當異治。若但執一病名。而不問虛實。不問寒熱。泛泛然號於衆曰。某藥爲宜。某藥爲忌。豈理也哉。甄權治虛喘腎衰。蓋誤認其補氣之過也。也要知升舉之品。正與喘證之氣逆上壅相反。且腎衰作喘。本是氣虛不攝。陰火上衝。攝納歸元。猶恐不及。乃復舉而升之。則根本既搖。而速之厥矣。此東垣之補中益氣湯。所以最不宜於肝腎之虛也。張潔古謂其瀉肺火。蓋亦指氣虛發熱言之。虛火不藏。面赤發熱。有似肺家之火。則芪以補脾益氣。能退大熱。若火熱刑金。

而妄投補益。則謬矣。東垣謂防風能制黃芪。而芪得防風。則功愈大。云云。頃讀既以制之。而反能大其功。自盾自矛。最爲可笑。蓋既惑於前人相制之謬說。而又無解於許胤宗之以黃芪防風湯。薰愈柳太后中風口噤之病。乃欲申一說以解其紛。而不悟。適以造成怪誕支離之弊。蓋防風黃芪。均是行表之藥。道合志同。何云相制。胤宗之法。自有巧思。不意東垣倡此奇談。殊爲可駭。要知徒逞臆見。毫不足徵。後學萬弗泥此。庶不汨沒性靈。塞智巧。中風口噤。不語。最多氣升痰升。內因之病。風藥表藥。直是煽毒。古人多作外風治瘳。皆是誤認。所以古之治案。多難盡信。許氏此案。見舊唐書本傳。治法新穎。獨闢蹊徑。如謂果能取效。恐亦未必。蓋史乘中所載醫家治驗。大都意想之辭。試爲細覈醫藥理法。多難符合。良由秉筆者傳聞得之。而文人又皆不知醫學。則人云亦云。但知其新奇可喜。又安能辨得醫理病理之確當與否。于長孟堅之倉公等傳。尙多不可索解。更何論平范。

嘩譁壽以下。如華佗傳等皆是。况乎中風一證。平仆昏迷。本非外受之風。素問謂是血菀於上。名以薄厥。又謂氣血交并於上。名以大厥。今西醫謂之血冲腦經。皆不可妄用風藥。壽頤頗有中風對論三卷。專論此病。以實驗爲主。一說古書辛散溫藥之誤。胤宗此案。果是外風。則不服而藥已覺有意於奇效。否亦殊難必。若是內因。則爲害必甚。雖入正史。頃終不敢深信。而東垣黃芪之說。更是匪夷所思。出乎情理之外。潔古有黃芪無汗發之有汗止之一說。而後人之編本草者。多循例照錄。無汗能發。有汗能止。二句。幾以此物爲發汗止汗之專藥。亦知二者之功用。一散一收。正如冰炭之相反。而不相合。天下安有一物而具有水火二性之理。乃黃芪之效力如此。寧非絕大怪異。抑知黃芪能遠表而補益衛陽。明係固表之藥。何以能發汗。蓋惟衛分充盈。而陽氣流通。固亦有時而微汗津津者。潔古意中固自有說。然約而稱之。則非立言之體矣。袁淑範曰。黃芪學名之商樞。

治痢疾。及梅毒。頗有效。其拉丁名爲「阿斯篤拉格留斯」。愛基斯如卑斯。用根及子。味微甘。收瀉水煎服。治下痢赤痢。利小便。又作漱藥。能刷淨斷頭。爛使之治愈。又爲末。搽經久潰瘍及瘡。傷使排膿而愈。或用治梅毒諸症。左方多有效。

辨僞 鄭肖巖曰。黃芪僞名介芪。介或作蓋。條硬無味。色白不黃。按黃芪以山西綿上出者爲佳。故一名綿芪。色黃帶白。緊實如箭竿。故又名北箭芪。折之柔韌如綿。故能入肌腠而補氣。若介芪之呆劣。又安可用乎。聞蓋芪性極發散。有人誤服。汗流不止。其性與綿芪大相反。用者當明辨之。曹炳章曰。按黃芪冬季出新山西太原府里陵地方出者。名上芪。其貨直長。細軟而無細枝。細皮皺紋。切斷有菊花紋。兼有金井玉欄杆之紋。色白。黃味甜鮮。潔帶有莖豆氣。爲最道地。又大同府五台山出。粗皮細硬。枝短味淡。作小把。爲台芪。俗稱小把芪。略次。亳州出者。性硬筋多。翻而肉色黃。爲毫芪。俗稱奎芪。亦

次。陝西出者。爲西芪。性更硬。味極甜。更次。蛟城出者。爲蛟芪。枝短皮粗。無枝。極次。四川出者。爲川芪。小把。皮紅黑色。性硬筋細。如麻。味青草氣。爲最下品。服之致腹滿。最能害人。凡外症瘡瘍用黃芪。如陽癰。托毒化膿。及虛體痘瘡。四陷皆用。生陰疽。補托轉陽。用炙。皆須太原產之上芪。立能見效。若以側路雜芪充用。則爲害甚烈。不可不辨矣。

近人學說 徐錫年曰。黃芪味甘。性溫。氣升。質降。爲溫養脾胃。益氣固表之品。本經論其功用。有治癰疽久敗。排膿止痛。大風癰疾。五痔風瘻。補虛小兒百病等文。後人用之。如補中益氣湯。當歸補血湯。黃芪建中湯。諸方。皆以黃芪爲補中溫養。益氣實表之品。誠足以發明黃芪之功用矣。迨夫後賢繼起。議論紛紛。以致本經意旨。愈說愈晦。愈趨愈下。如金元大家張潔古者。以本經主治癰疽久敗。排膿止痛二語。遂倡出黃芪爲瘡家聖藥之說。味者不察。一律沿襲。於是治瘍諸家。不問症情。不辨虛實。竟以黃芪一味。視同神聖。無往不用。以

致補住邪火。增長毒炎者。比比皆然也。瘍症暴發。毒勢方張。或爲痰火互結。或爲溼毒積熱。始則微腫。堅大。繼則潰爛。膿膿。滲溼。攻痰。化毒清火。此其治也。乃一用黃芪。甘溫升發。實表固裏。助其蘊藏之資。增其養癰之患。甚至於燎原而莫可救。是素稱爲瘡家之聖藥者。今

其皮味濃厚。力量皆在皮中。故能直達人之膚表肌肉。固護衛陽。充實表分。是其專長。所以表虛諸病。最爲神劑。但升舉有餘。偏於陽分。氣虛陽虛者。宜升宜提。而陰虛火擾者。宜禁。若肝腎不足。不可誤

與升陽。伐其根本。故凡飢飽勞役。脾陽下陷。氣怯神疲者。及瘡久脾虛。清氣不升。寒熱不止者。授以東垣之補中益氣湯。無不捷效。正以黃芪爲參朮之佐。而又得升柴以升舉之。則脾陽復辟。而中州之大氣。幹旋矣。正謂黃芪爲固表主藥。甘溫之性。專走肌肉皮膚。本草經之癰疽久敗。瘡排膿止痛。明謂其專治癰疽之久敗者。則排膿止痛。蓋久敗之潰瘍。肌肉久壞。膿水頻仍。表氣大虛。黃芪益氣固表。以療其虛。斯能排膿止痛耳。張隱菴亦謂癰疽日久。正氣衰微。故爲久敗。乃後人習焉不察。誤認其通治癰疽。置久敗二字於不問。張潔古則稱其內托陰疽。爲瘡家聖藥。經仲醇則稱其治小兒胎毒瘡癰。張景岳則稱其生者可治癰疽。張石頑則稱其托已潰瘡瘍。餘子碌碌

爲瘍症之砒礪矣。雖然。此非黃芪之咎也。乃用之者不識其時耳。然則黃芪果何時而可用乎。曰。潰瘍久敗。肌肉難生。膿水不淨。此久病元虛。脾陽衰弱。瘡口潰塌。不能興其生發之機能。黃芪甘溫。補益元氣。且走肌腠。投於此際。可謂有利無弊。誠爲聖品矣。是故本經以治癰疽久敗。排膿止痛者。即此意也。張隱庵曰。癰疽日久。正氣衰微。故日久敗。不意高明如潔古者。竟抹煞本經久敗兩字。倡此範統之說。致後人有濫用之弊。殆亦其本意所不及料者。敢實一得。用者審之。張山雷曰。黃芪具春令升發之性。味甘氣溫。色黃。皆得中和之正。故能補益中土。溫養脾胃。凡中氣不振。脾土虛弱。清氣下陷者。最宜

疽排膿止痛。長肉生肌。爲瘡家聖藥。又治女子月候不勻。血崩帶下。胎前產後氣耗血虛。並療小兒百病。清張隱庵本草原論黃耆曰。黃耆色黃。味甘微溫。稟火土相生之氣。化土主肌肉。火主經脈。故主治肌肉之癰。經脈之疽也。癰疽日久。正氣衰微。至三焦之氣不溫。肌肉則爲久敗瘡。黃耆助三焦出氣以溫肌肉。故可治也。癰疽未潰。化血爲膿。痛不可忍。黃耆補氣助陽。陽氣化血而排膿。膿排則痛止。火風癰疾。謂之癰瘍。乃風寒客於脈而不去。鼻柱壞而色敗。皮膚潰癰者是也。今夫五疔者。牡痔。牝痔。腸痔。脈痔。血痔。是熱邪淫於下也。鼠瘻者。腎臟水毒上淫於脈。致頸項潰腫。或空或凸。是寒邪客於上也。夫癰疾五疔鼠瘻。乃邪在經脈。而證見於肌肉皮膚。黃耆內資經脈。外資肌肉。是以三證咸宜。又曰補虛者。乃補正氣之虛。而經脈調和。肌肉充足也。小兒經脈未盛。肌肉未盈。血氣皆微。故治小兒百病。【清】鄭師本經疏證論黃耆曰。黃耆根莖。皆旁無歧互。獨上獨下。其

根中央黃。次層白。外層褐。顯然三層。畫分明白。又其味甘。其氣微溫。直入中土。而行三焦。故能內補中氣。則本經所謂補虛。別錄所謂補丈夫虛損。五勞羸瘦。益氣也。能中行營氣。則本經所謂主癰疽久敗瘡。排膿止痛。大風癰疾。別錄所謂逐五臟間惡血也。能下行衛氣。則本經所謂五疔鼠瘻。別錄所謂婦人子臟風。邪氣腹痛。洩利也。癰疽篇。寒邪客於經絡之中。則血泣不通。衛氣滯之。不得復反。故癰腫寒氣化爲熱。熱勝則肉腐爲膿。素問風論。風氣與太陽俱入。行諸脈。散於分肉。與衛氣相干。其道不利。故使肌肉憤。有瘍。衛氣有所凝。故肉有不仁。營氣熱。附不清。故使鼻柱壞。而色敗。名曰癰風。生氣通天論。營氣不從逆於肉理。乃生癰腫。歷歷明微。莫非營衛之病。而營衛所以屬三焦。三焦所以屬中土者。靈樞營衛生會篇。上焦出於胃上口。貫膈。並咽。布胸中。以發呼吸。而行營衛。是爲中氣。中焦亦並胃中。出上焦之後。此所受氣。泌糟粕。蒸津液。上注於肺。乃化爲血。是爲

營氣。下焦別迴腸。瀉泌別汁。注於膀胱。是爲衛氣。三者皆本於水穀。是三焦爲營衛之本。脾胃之蒸腐變化。又爲三焦之本。黃耆一源三派。滲三焦之根。利營衛之氣。故凡營衛間阻滯。無不盡通。所謂源清流自潔者也。【清】黃宮繡本草求真論黃耆曰。黃耆味甘性溫。質輕皮黃。肉白。故能入脾補氣。入表實衛。爲補氣諸藥之最。是以有善之稱。且著其功曰。生用則能固表。無汗能發。有汗能收。是明指其表實則邪可逐。故無汗能發。表固則氣不外洩。故有汗能止耳。又著其功曰。熱則生血。生肌。排膿。內托。是蓋指其氣足。則血與肉皆生。毒化成膿。而爲瘡瘍聖藥矣。至於豆瘡不起。陽虛無熱。書言於善。最宜皆是取其質輕達表。功專實衛。而能升氣於表。又言力能補腎。以治兩帶淋濁。是蓋取其補中升氣。則腎受陰。而兩帶淋濁自止。然與人參比較。則參氣味甘平。陽氣有陰。善則秉性純陽。而陰氣絕少。蓋一宜於中虛。而泄瀉痞滿。倦意可除。一更宜於表虛。而自汗亡陽。潰瘍不起。

可治。且一宜於水虧。而氣不得宣發。一更宜於火衰。而氣不得上達之爲異耳。書言黃耆性長防風。其功益大。蓋謂能助善達表。相畏而更相依。是以如斯。若使陽盛陰虛。上焦熱甚。下焦虛寒。肝氣不和。肺脈洪大者。則並戒其勿用矣。出山西黎民大。而肥潤筋直。良瘦小。色黑堅硬不軟者。服之令人胸滿。血虛肺燥。翅扇蜜炙。發表生用。氣虛肺寒。酒炒。腎虛氣薄。鹽湯蒸潤。切片用。【清】賈九如辨藥指南論黃耆曰。黃耆皮黃。入脾。肉白。走肺。性溫。能升陽。味甘。淡。用蜜炒。又能溫中。主健脾。故內傷氣虛。少用。以佐人參。使補中益氣。治脾虛泄瀉。瘧痢日久。吐衄。脈紅。諸久失血。後及痘瘡。瘰癧。主補肺。故表疎衛虛。多用。以君人參。作飲汁固表。治白汗盜汗。諸毒潰後。收口。生肌。及瘰癧瘰癧。瘰癧久不愈者。從骨托毒而出。必須鹽炒。痘科虛不發者。在表助氣爲先。又宜生用。若氣有餘。表邪旺。賤理實。三焦餘熱未淨。萬不可加。

七寸許之短棒狀。外面呈淡褐色。有螺旋狀之隆起線。內部爲黃白色。折之柔韌如綿。破折面爲纖維狀。其味微甘。稍帶芳香性。世多採

背宿根充實。假黃耆俗呼爲土黃耆。不知背宿根堅而脆。肉色黃。味亦苦。黃耆軟而綿。肉白味甘。此爲異耳。又按本草圖譜引草木圖說。謂開淡黃花者。名曰木黃耆。學名則爲 Astragalus reflexisipulus Ait. 產自日本安藝廣島地方。綱目記木耆短而理橫。又爲開紫花者。產自駿州富士名之曰富士黃耆。學名則爲 Astragalus Adungensis Pall. 莖如蔓根亦白。二者皆屬下品。

採取 二月十月間採之。
製法 雷斂曰。凡使勿用木耆。草真相似。只是生時葉短并根橫也。須去頭上皺皮。蒸半日。擘細於槐砧上剉用。李時珍曰。今人但槌扁以蜜水塗炙數次。以熟爲度。亦有以鹽湯潤透。器盛於湯瓶蒸熟切用者。

性質 甘。微溫。無毒。
效能 益氣固衛。托瘡。生肌。用

作和緩強壯藥。及利尿止痛排膿劑。又爲瘡瘍癰疽。以及痘證不起之要藥。

作用 入胃後。能助胃之消化力。而能與胃酸化合。至小腸被其吸入血中。促進血液之進行。故能托瘡排膿。振興精神。增高體力。
主治 癰疽久敗瘡。排膿止痛。大風。癰疾。五痔。鼠瘻。補虛。小兒百病。(本經)婦人子臘。邪氣。逐五臟間惡血。補丈夫虛損。五勞羸瘦。止渴。腹痛。洩痢。益氣利陰氣。(別錄)

張仲景之發明 黃耆一藥。經張仲景氏之實驗。認爲能治肌表之水。故能治黃汗盜汗皮水。又旁治身體重及麻木不仁者。考證如下。①耆芍桂枝苦酒湯證曰。身體腫發。熱汗出而渴。又云。汗沾衣。色正黃。如藥汁。②防己黃耆湯證曰。身重。汗出惡風。(以上二方黃耆皆五兩)③防己茯苓湯證曰。四肢腫。水氣在皮膚中。④黃耆桂枝五物湯證曰。身體不仁。(以上二方黃耆皆三兩)⑤桂枝加黃耆湯證曰。身常暮盜汗出者。又云。從

腰以上必汗出。下無汗。腰腹弛痛。如有物在皮中狀。(以上一方黃耆二兩)⑥黃耆建中湯證。不具也。(以上一方黃耆一兩半)歷觀上諸方。黃耆主治肌表之水也。故能治黃汗盜汗皮水。又能治身體腫或不仁者。是腫與不仁。亦皆肌表之水也。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論黃耆曰。主虛喘。腎衰耳聾。療寒熱。治發背。內補。宋日華諸家本草論黃耆曰。黃耆助氣壯筋骨。長肉補血。破癥癰。療癰疽。賢腸風血。關帶下。赤白痢。產前後一切病。月候不勻。痰嗽頭風。熱毒赤目。【金】張元素珍珠囊論黃耆曰。治虛勞。自汗。補肺氣。瀉肺火。心火。實皮毛。益胃氣。去肌熱。及諸經之痛。【元】王好古湯液本草論黃耆曰。主大陰虛疾。陽維爲病。苦寒熱。督脈爲病。逆氣裏急。又曰。黃耆治盜汗。并自汗。及膚痛。是表皮之藥。治咯血。柔脾胃。是中州之藥。治傷寒尺脈不至。補腎臟元氣。是裏藥。乃上中下內外三焦之藥也。【元】李東垣用藥法象論黃耆曰。黃耆

補三焦。實衛氣。與桂同功。特比桂甘平。不辛熱爲異耳。蓋桂則通血脈。能破血。而實衛氣。芪則益氣也。【明】陳嘉謨本草蒙筌論黃耆曰。參芪俱益虛損。但人參能補元氣。調中。黃芪兼補衛氣。實表。如共劑而用。須別主補。凡內傷脾胃。發熱惡寒。怠惰嗜臥。嘔吐洩瀉。及脹滿痞塞。形羸力乏。脈微神短。參爲君。黃爲臣。若表虛而自汗盜汗。漸至亡陽。諸潰瘍多耗膿血。嬰兒痘疹未灌全漿。一切陰毒不起之疾。治之。又須實衛護營。當以芪爲君。參爲臣。【清】楊時泰本草述鉤元論黃耆曰。黃耆味甘。氣微溫。氣厚於味。可升可降。陰中之陽也。入手足太陰氣分。甘溫純陽。主益肺氣。溫分肉。實皮毛。固腠理。人補表之元氣。虛弱。通和陽氣。利陰氣。泄火邪。能活血脈。生血助胃氣。(治脾胃虛弱。脈弦。血脈不行。羸瘦腹滿)益三焦元陽。補五臟諸虛不足。丈夫虛損。羸瘦。短氣虛喘。腎衰耳聾。瀉久。腸風。老人氣虛腸悶。更治虛煩。肌熱。虛勞。自汗盜汗。若表虛有邪。發汗不出。服之。自汗并內托陰

【黃茄水】（靈法）秋天黃老茄子不計多少以新瓶盛埋地中。年化為水取出應用。

主治 大風熱痰能消痰成水。

【黃茅根】（即白茅根之一種）參詳『白茅根』條。即地筋之處方用名。詳『地筋』條。

【黃香】（即松脂之古籍別名）典見和漢藥考。詳『松脂』條。

【黃孫】（即王孫之古籍別名）典見別錄。詳『王孫』條。即黃精之古籍別名。典見和漢藥考。詳『黃精』條。

【黃桐】（即桐之古籍別名）典見經本草。詳『桐』條。

【黃稗】（形態）黃稗為雜草類之一種。形如桐根。可供藥用。

性質 苦。無毒。
主治 除心煩。止汗出。
【黃耆】（命名）耆長也。本品色黃為補藥之長故名。

處方用名 黃芪。生黃耆。炙黃耆。清炙耆。蜜炙耆。大耆。綿黃芪。古籍別名 戴椹（本經）戴椹。蜀脂。日本艾草。芟草。獨椹（別錄）。

王孫（藥性）羊肉（日華）黃嗜。綿耆。戴粉（綱目）妬婦。甘板。麻百藥。和漢藥考。

外國名詞 Astragalus, hirsutissimus, Mak (拉一)

藥商隱名 上有芪。西上芪。芪面。又有因產地而名者。如白水黃芪。赤水黃芪。木黃芪。土黃芪。岩黃芪。

基本 黃耆屬荳科。中國產者。用黃耆之地下莖。日本產者。用岩黃耆之地下莖。黃耆葉似槐葉而微尖小。又似葵葉而微闊大。青色。開黃紫花。大如槐花。結小尖角。長寸許。根長二三尺。以緊實如箭幹者為良。嫩苗亦可燻食。其子收之。十月下種。如種棠法。

產地 黃耆之產地。在昔日中國醫籍。多謂出自隴西。如秦州記曰。隴西襄武縣出黃耆。又唐慎微證類本草及李時珍本草綱目。皆引證陶宏景之言曰。第一出隴西。洮陽李氏在綱目集解中。又引陳承言曰。黃耆本出綿上。為良。而圖經繪澤州黃耆者。實為地與綿上相鄰故也。元王好古曰。綿上即

山西沁州。而白水在陝西同州。明陳嘉謨亦謂綿上沁州鄉名。白水赤水二鄉俱屬隴西。如是黃芪在昔時似皆謂出自陝西及山西。即赤水鄉白水鄉與綿上。故有赤水耆白水耆與綿耆之稱也。今吾東省亦出。如奉天之法庫縣及東蒙古臨西一帶。黃耆皆上品。和漢藥考云。白水赤水耆。俱陝西之鄉名。綿耆出於山西沁州綿上。故名。或云用其皮折之。柔韌如綿者為良。乃謂之綿黃芪。木黃芪者。短而理橫。今人多以苜蓿根假之。俗呼為土黃芪。但堅而脆。味苦。令人瘦。黃芪柔而味甘。令人肥。大異。用者宜審。木黃芪亦勿用。碧黃耆產加賀國白山和泉國金剛山。及安藝廣島等。為宿根草。春季抽莖。高三四尺。葉為多數小葉所成之複葉。有毛茸。秋季開類小豆花之淡黃色。花後結莢實。中有小子一種。呼富士黃耆者。產駿河國富士山莖。如莖花淺黃色。結莢角。又有一種紫色者。根莖俱小而硬。謂之本黃耆。陳仁山藥物生產辨云。正芪產區分三處。一關東。二寧古塔。三

卜奎。產東三省伊黎。吉林。三姓地方。清明後收成。入山採掘。至六七月間。乃上市。沖口芪。產區亦廣。產於山西省渾源州近陽高縣一帶。收穫在秋後冬前。擇出勻滑直強者。先製粉芪。綿芪。專消三江一帶。次下者。乃製沖口芪。染成黑皮。而渾源芪。牛莊芪。即此芪製剝原來生芪而來。是以不黑皮。又有一種名管芪。實為川芪。原產四川碧江汶縣。灌縣。江油縣等處。又有一種名禹州芪。乃由口外運至禹州。扎把而來。原色白皮。亦是生芪。非產禹州粉芪。原出陝西岷州大同宣化等處。

形態 黃耆為荳科植物 (Leguminosae) 中蝴蝶花形科植物 (Papilionaceae) 宿根草 Astragalus Henryi Oliv. 之根。同種類之植物有數種。即因其產地亦別其形狀及種類。如陶弘景謂出隴西洮陽者。色黃白。味甜美。出黑水宕昌者。色白。肌理粗新者。亦甘。又蘇頌曰。黃耆之出綿上者。其皮折之。柔韌如綿。故謂之綿黃耆。本草綱目謂今市場販者。多切成六

除下焦溼腫三也。痢疾先見血四也。臍中痛五也。補腎不足壯骨髓六也。凡腎水膀胱不足。諸痿厥腰無力於黃芪湯中加用之。使兩足膝中氣力涌出。痿軟即便去也。乃瘰癧必用之藥。蜜炒研末。治口瘡如神。故雷公炮炙論云。口瘡舌折立愈。黃酥謂以酥炙根黃含之也。
(張元素) 黃芪蒼朮乃治痿要藥。凡去下焦溼熱作腫及痛并膀胱有火邪并小便不利及黃濕者並用酒洗黃芪。知母爲君。茯苓澤瀉爲佐。凡小便不通而口渴者邪熱在氣分。肺中伏熱不能生水是絕小便之源也。法當用氣味俱薄淡滲之藥。豬苓澤瀉之類。瀉肺火而清肺金。滋水之化源。若邪熱在下焦血分不渴而小便不通者乃素間所謂無陰則陽無以生。無陽則陰無以化。膀胱者州都之官。津液藏焉。氣化則能出矣。法當用氣味俱厚。陰中之陰藥治之。黃芪知母是也。長安王善夫病小便不通。漸成中滿。腹堅如石。脚腿裂破出水。雙睛凸出。飲食不下。痛苦不可名狀。治滿利小便滲瀉之藥服遍

矣。予診之曰。此乃奉養太過。膏粱積熱。損傷腎水。致膀胱久而乾涸。小便不化。火又逆上。而爲嘔噦。難經所謂關則不得小便。格則吐逆者。潔古老人言熱在下焦。但治下焦。其病必愈。遂處以北方寒水所化大苦寒之藥。黃芪知母各一兩。酒洗焙燥。入桂一錢。爲引。熱水丸如夾子大。每服二百丸。沸湯下。少時如刀刺。前陰火燒之狀。溺如瀑泉。涌出。淋下成流。顧盼之間。腫脹消散。內經云。熱者寒之。腎惡燥。急食辛以潤之。以黃芪之苦寒。瀉熱補水。潤燥爲君。知母之苦寒。瀉腎火爲佐。肉桂甘熱爲使。寒因熱引也。(李杲) 古書言知母佐黃芪。滋陰降火。有金水相生之義。黃芪無知母。猶水母之無蝦也。蓋黃芪能制膀胱命門陰中之火。知母能清肺金滋腎水之化源。故潔古東垣丹溪皆以爲滋陰降火要藥。上古所未言也。蓋氣爲陽。血爲陰。邪火煎熬。則陰血漸涸。故陰虛火動之病。須之。然必少壯氣盛能食者用之相宜。若中氣不足而邪火熾盛者。久服則有寒中之變。近時虛

損及縱然求嗣之人。用補陰藥。往往以此二味爲君。日日服。每降令太過。脾胃受傷。真陽暗損。積氣不暖。致生他病。盡不知此物苦寒而滑瀉。且苦味久服。有反從火化之害。故葉氏醫學統旨有四物加知母黃芪久服傷胃。不能生陰之戒。
(李時珍) 黃芪本經言藥木及根。不言藥皮。豈古時木與皮通用乎。李時珍云。藥木今出邵陵者。輕薄色深爲勝。出東山者厚而色淺。其根於道家入木芝品。今人不知取服。(陶弘景) 子藥亦名山石榴子似女貞。皮白不黃。亦名小藥。所在有之。今云皮黃誤矣。按今俗用子藥皆多刺小樹。名刺藥。非小藥也。(蘇恭) 黃芪樹高數丈。葉似吳茱萸。亦如紫椿。經冬不凋。皮外白裏深黃色。其根結塊。如松下茯苓。今所在有之。出房而合等州山谷中。皮緊厚二三分。鮮黃者上。二月五月採皮日乾。(掌禹錫) 黃芪藥處有之以蜀中出肉厚色深者爲佳。(蘇頌) 黃芪梔子入肺黃連入心。黃芪入腎燥溼所歸。各從其類也。故活人書四味解

蕩湯。乃上下內外通治之藥。(王好古)

【黃柏炭】即黃柏炒過者之處方用名。詳「黃柏」條。

【黃柏根】原命 檣桓。性質 苦寒。無毒。

主治 心腹百病。安魂魄。耐饑渴。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論黃柏根曰去萬病爲散飲服。

【黃砒】即雌黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳「雌黃」條。

【黃芩】即連翹之古籍別名。典見和漢藥考。詳「連翹」條。

【黃英】即石硫黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳「石硫黃」條。

【黃英香】即檀香之古籍別名。典見和漢藥考。詳「檀香」條。

【黃屑】形骸 黃屑爲雜木類之一種。其樹如櫟可供藥用。

性質 苦寒。無毒。

主治 心腹痛。霍亂。破血。酒煎服。酒疸。目黃及野雞病。熱痢下血。水煮服。

平。●曹炳章曰按黃柏。四川順慶府南充縣出者爲川柏。色老黃。內

外皮黃黑。塊片小者佳。可作染料。用湖南及關東出者。爲關柏。塊片

甚大而薄。色淡黃者。次。東洋出者。爲洋柏。色亦淡黃。質鬆。更不入藥。

配合應用 ●黃蘗爲足少陰

腎經藥。然以柴胡引之。則入膽。以黃連。葛根。升麻引之。則入腸胃。及

太陰脾經。治溼熱滯下。佐牛膝。枸杞。地黃。五味子。鼈甲。青蒿。則益陰

除熱。佐甘菊。枸杞。地黃。葵藜。女貞。實則益精明目。得猪膽汁。水銀粉。

則主諸熱瘡。有蟲久不合口。得鉛丹。則生肌止痛。得木瓜。茯苓。二朮。

石斛。地黃。則除溼健步。佐白芍藥。甘草。則主火熱腹痛。

●治口中及舌上生瘡。劉黃蘗合之。(外臺祕要方)

●治小兒重舌。以黃蘗。苦竹瀝。浸點舌上。(千金方)

●治咽喉卒腫。食飲不通。黃蘗搗末。苦酒和敷腫上。佳。(肘後方)

●治傷寒時氣。溫病。毒攻手足腫痛。欲斷。亦治毒攻陰腫。細劉黃蘗五斤。以水三斗煮漬之。(傷寒

類要方)

●治食自死六畜肉中毒。黃蘗末服方寸匕。未解再服之。(葛氏方)

●治嘔血。黃蘗蜜塗炙乾。杵爲末。麥冬湯調下二錢匕。立瘥。(經驗方)

●治癰疽發背。或發乳房。初起微赤。不急治之。即殺人。搗黃蘗末和雞子白塗之。(梅師方)

●治吐血熱極。用黃蘗二兩。蜜炙搗末。每服二錢。溫糯米飲調下。(簡要濟衆方)

●治小兒熱瀉。黃蘗削皮。焙爲末。用薄米飲丸如粟大。每服十九米飲下。(十全博救方)

●治傷寒熱病。口瘡。黃蘗削去麤皮。蜜漬一宿。唯飲令濃。含其汁良久。吐更含。若胸中熱。有瘡時。飲三五合尤佳。(深師方)

●衍義云。藥水今用皮。以蜜炙。與青黛各一分。同爲末。入生龍腦一字。研勻。治心脾熱舌煩生瘡。當

瘡上有涎。即吐又張。仲景蜜皮湯。無不驗。傷寒論中已著。

●治妊娠下痢白色。晝夜三五

十行。根黃厚者。蜜炒令焦爲末。大蘇煨熟。去皮。搗爛如泥。和丸。梧子大。每空心米飲下。三五十丸。日三服。神妙不可述。(婦人良方)

●治赤白濁淫。及夢洩精滑。眞珠粉丸。黃蘗炒。眞蛤粉各一斤。爲末。煉蜜丸。菟豆大。每服一百丸。空心溫酒下。黃蘗苦而降火。蛤粉鹹而補腎也。又方。加知母。炒牡蠣。煨山藥。炒等分。爲末。糊丸。梧子大。每服八十丸。鹽湯下。(潔古家珍方)

●治積熱夢遺。心忪恍惚。腸中有熱。宜清心丸主之。黃蘗末一兩。片腦一錢。煉蜜丸。梧子大。每服十五丸。麥冬湯下。此大智禪師方也。(許學士本事方)

●治口疳。臭爛。綠雲散。用黃蘗五錢。銅綠二錢。爲末。搽之。漱去涎。(三因方)

●治鼻疳。有蟲。黃蘗二兩。冷水浸一宿。絞汁溫服。(聖惠方)

●治癰毛毒瘡。生頭中。初生如蒲桃。痛甚。黃蘗一兩。乳香二錢。半爲末。槐花煎水調作餅。貼於瘡上。(普濟方)

●治小兒脾瘡。不合者。黃蘗末

塗之。又方。治腫瘡。熱瘡。黃蘗末一兩。輕粉三錢。豬膽汁調搽之。或只用蜜炙黃蘗末一味。(子母祕錄方)

●治火毒生瘡。凡人冬月向火。火氣入內。兩股生瘡。其汁淋漓。用黃蘗末搽之。立愈。一婦生此人。無識者。用此而愈。(張果醫說方)

●斂瘡生肌。黃蘗末。麵糊調塗效。(宣明方)

用量 錢半至三錢

施用宜忌 凡非實火諸症。及脾虛多瀉。胃薄少食者。禁用。惡乾漆。

著名方劑 ●滋腎丸。治肺痿。聲嘶。喉痛。咳血。煩躁。及溼熱下注。小便澀瀉等症。(東垣方) 黃柏

(酒炒)二兩。知母(酒浸炒)二兩。肉桂一錢。爲細末。熱水丸。梧子大。每服五十丸。空心下。二妙散。治

溼熱下注。足軟。附腫。及筋骨疼痛。(丹溪方) 黃柏(炒)蒼朮(炒去

皮)各等分。爲末。生姜研。沸湯調服。

參攷資料 ●黃蘗之用有六。

薄勝。心火一也。利小便。結二也。

一四〇八

自去耳鳴消渴便閉及溼熱爲病而見諸痿癱瘓水瀉熱利黃疸水腫痔血腸風漏下赤白與夫諸痛瘡癰就益內攻診其尺果洪大按之而有力可炒黑暫用使其溼熱順流而下陰火因而潛伏則陰不受煎熬而陰乃得長矣非謂眞陰虛損服此卽有滋潤之力也故於實熱實火則宜而於虛熱虛火則徒有損而無益矣今天下人不問虛實竟有爲去熱治勞之妙藥而不知陰寒之性能損人氣滅人食命門眞元之火一見而消亡脾胃運行之職一見而阻喪元氣既虛又用苦寒遏絕生機莫此爲甚川產肉厚色深者良生用降實火蜜炙則不傷胃炒黑能止崩帶酒製治上蜜製治中鹽製治下【清】賈

九如辨藥指南論黃柏曰黃柏樹高數丈其皮從上直下味苦入骨是以降火能自頂至踵淪膚徹髓無不週到專瀉腎與膀胱之火蓋腎屬寒水水少則漸消涸竭則變熱若氣從臍下起者陰火也內經曰腎欲堅以苦堅之堅卽爲補丹誤以此一味名大補丸用鹽水製

使鹽以入腎主降陰火以救腎水用蜜湯拌炒取其變脆而不驟下治五心煩熱目痛口瘡諸症單炒褐色治腸紅痔漏遺精白濁溼熱黃疸及膀胱熱瀉腹內痛凡屬相火用此抑之腎自堅固而無狂蕩之意因味苦能走骨能沉下用酒拌炒四物湯調服領入血分治四肢骨節走痛足膝酸疼無力遍身惡瘡及腳氣氣攻冲嘔逆惡心陰虛血熱火氣於足者蓋此一味名潛行散能瀉陰中之火亦能安蛔蟲以苦降之之義也

國外學說 日本學說謂黃柏與黃連同含有「ベルベリン」然其含量比黃連爲劣故治療上之價值亦因之而少諸子氏就二三古書調查關於黃柏之事項知凡供外用時多爲火傷皮膚之炎症等廣益本草大成第十二卷第四葉曰小兒臍生瘡不合者黃藥末塗之（子母祕傳）人冬月向火火氣內入兩股瘡生汁出不止者黃藥末塗立癒（醫說）藥性能毒大成第二卷第三十五頁曰除下部之溼瘡毒腫蜜炒爲末塗於口瘡

甚佳諸子氏欲探其原因試取黃柏之一定量澆水而浸出之則浸液呈膠狀通過濾紙甚難（於濾液中加亞爾個兒亦不沈降是與護謨相反）又嘗其少量但覺辛味（因含有「ベルベリン」）之外尙有黏液之味氏因察所謂植物性黏液之存在否製出而定其量則黃柏中約含七至八分之植物性黏液故以黃柏供外用者唯因其含有植物性黏液也然則如亞爾答亞麻仁錦葵等於表皮剝脫皮膚炎等殆可供舊布溼溫療法之用又依此理由於愈心腸胃炎咽喉炎等當可內服氏又試驗植物性黏液之外並無護謨類之存在蓋黃藥之主成分爲祕魯培林其試驗成績有已故醫學博士諸子吉人氏之報告詳載東京醫學會雜誌第二卷第十二號又日本

市上有售所謂陀羅尼助者爲有光澤之黑色板狀塊係煎熬黃藥而成之一種水製越幾斯用代熊膽言海云昔有僧誦陀羅尼時製此用爲防睡之助云其味極苦製於吉野大峯之洞川僞稱係大峯

所燒香煙煤加百草製成或用胡黃連（千振）根製者云又藥學雜誌第二百十四號載有藥學得業士平井方澄氏之「鳥取縣產煉熊之試驗報告」一文詳述煉熊之功效形態及其成分等其言曰煉熊在東國地方呼陀羅尼助內服治腦痛腹痛等外用點充血目爛目等或用以貼於打傷刀傷等農家則用作牛馬脾藥試驗其成分可證明其中含有祕魯培林古來使用煉熊其主效亦卽在此祕魯培林加之含有多量樹脂類與祕魯培林相並故於內服外用能奏上述功效而民間用此亦確實有效故煉熊實爲不可輕視之民間藥以余觀之本品之製法能加以改良將可得有力之製品云詳細請再參閱該雜誌

辨僞 鄭肖巖曰黃栢本出漢中山谷今以蜀中產者皮厚色深爲佳樹高數丈葉似紫椿經冬不凋皮外白裏深黃色入藥用其根結塊如松下茯苓氣味苦寒無毒近有一種僞品色黃而黑味竟不苦不知何物假充用之得無害

形。前端尖。長二三寸。表面綠色。背帶白色。夏月開黃綠色五瓣聚繖花。花爲單性。雄蕊異株。果實爲漿果。作球圓形。大二三分。熟則呈黑色。有苦味。其皮表面黃褐色。有深裂痕皺紋。內面作黃色而光滑。



黃 柏

採取 二月五月採皮。日乾。

製法 雷斅曰。凡使黃蘗皮。削中粗皮。用生蜜水浸半日。漉出曬乾。用蜜塗文武火炙。令蜜盡爲度。每五兩用蜜三兩。張元素曰。二製治上焦。單製治中焦。不製治下焦也。李時珍曰。黃柏性寒而沉。生用則降黃火。熟用則不傷胃。酒製則治上。鹽製則治下。蜜製則治中。

性質 苦寒無毒。

成分 黃柏之有效成分。亦爲祕魯培林 (Berberin) 與黃連同效。能瀉相火。清溼熱。用作變質。強壯健胃藥。及用以增進食欲。又可外用爲眼科藥。與皮膚病藥。

又治糖尿病。腎臟炎。

作用 有增進胃液。促進消化之能。至腸有刺激腸壁神經。使腸吸收增加。入血後。能使血液循環有標準之次數。而神經亦同時振興。

主治 五臟腸胃中結熱。黃疸腸痔。止洩痢。女子漏下。赤白陰陽蝕瘡。本經療驚氣。在皮間肌膚熱。赤起。目熱。赤痛。口瘡。久服通神。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】陳藏器

本草拾遺論黃柏曰。熱瘡。胞起蟲瘡。血痢。止消渴。殺蛇蟲。【唐】甄權藥性本草論黃柏曰。男子陰痿。及傳莖上瘡。治下血。如鷄鴨肝片。【宋】大明日華諸家本草論黃柏曰。安心除勞。治骨蒸。洗肝明目。多淚。口乾心熱。殺疳蟲。治疳心。心痛。鼻衄。腸風。下血。後急。熱腫痛。【金】張元素珍珠囊論黃柏曰。瀉膀胱相火。補腎水不足。堅腎壯骨。腰膝下焦虛。諸痿癱瘓。利下。殺除熱。【元】李東垣用藥法象論黃柏曰。瀉伏火。救腎水。治衝脈氣逆。不渴而小便不通。諸瘡痛不可忍。【元】朱丹

溪本草衍義補遺論黃柏曰。得知母滋陰降火。得蒼朮除溼清熱。爲治痿要藥。得細辛瀉膀胱火。治口

舌生瘡。【明】李時珍本草綱目論黃柏曰。傳小兒頭瘡。【明】李士材本草圖解論黃柏曰。黃蘗苦寒。沉而下降。爲足少陰足太陽引經之劑。肅清龍雷之火。滋濡腎水之枯。疏小便。癰結。祛下焦溼腫。凡目赤耳鳴。口瘡。消渴。血痢。吐衄。腸風。腰膝痠軟者。咸資其用。最謂黃蘗制下焦命門。陰中之火。知母滋上焦肺金。生水之源。蓋邪火焰明。則真陰消涸。真陰消涸。則邪火益烈。取知柏之苦寒。以抑南扶北。誠如久旱甘霖。然惟火旺胃強者當之。乃稱合劑。倘中氣已殘。則邪火雖元命日虛。炎從事勿衰。將有寒中之變。非與甘溫則大熱不除。近世殊昧斯旨。而致天枉者。不可勝數矣。【明】繆希雍本草經疏論黃柏曰。黃蘗稟至陰之氣。而得清寒之性者也。其味苦。其氣寒。其性無毒。故應主五臟腸胃中結熱。蓋陰不足。則熱始結於腸胃。黃蘗雖由溼熱。然必發於真陰不足之人。腸癖痔

瀉。亦皆溼熱傷血所致。洩痢者。滯下也。亦溼熱干犯腸胃之病。女子漏下。赤白陰傷。蝕瘡。皆溼熱乘陰虛。流客下部。而成。膚熱赤起。目熱赤痛。口瘡。皆陰虛血熱所生病也。以至陰之氣。補至陰之不足。虛則補之。以類相從。故陰回熱解。溼燥而諸證自除矣。乃足少陰腎經之要藥。專治陰虛生內熱。諸證功烈甚偉。非常藥可比也。潔古用以瀉膀胱相火。補腎水不足。堅腎壯骨。體虛下焦虛。諸痿癱瘓。利下。殺除熱。東垣用以瀉伏火。救腎水。治衝脈氣逆。不渴而小便不通。諸瘡痛。不可忍。丹溪謂得知母滋陰降火。得蒼朮除溼清熱。爲治痿要藥。得細辛瀉膀胱火。治口舌生瘡。【清】黃宮繇本草求真論黃柏曰。黃蘗昔人同知。母用於六味丸中。名爲知蘗八味丸。又同知藥各一兩。酒洗焙研入桂。名爲滋腎丸。謂其可滋真陰。此說一出。而天下翕然宗之。以至於今。牢不可破。詎知黃蘗性稟至陰。味苦性寒。行降走瀉殺之令。故獨入少陰瀉火。入膀胱瀉熱。凡人病因火亢。而見骨蒸勞熱。

細長青色。兩兩相對。六月開紫花。

根如知母粗細。長四寸。二月八月探根曝乾。吳普本草云。二月生赤黃葉。兩兩四面相值。其莖空中。或方圓高三四尺。四月花紫紅。赤六月花黃黑。根黃。二月至九月採。與今所說有小異也。(蘇頌)

【黃芩子】

主治 腸胃腹血。

【黃芩】即黃書之處方用名。詳『黃芩』條。

【黃芩花】即薺花之古籍別名。與見和漢藥考。詳『薺花』條。即芫花之古籍別名。與見和漢藥考。詳『芫花』條。

【黃花了】

形體 黃花了爲雞草類之一種。春生青葉。開花似辣菜花。黃色。秋日結實。可供藥用。

主治 咽喉齒痛諸病。

【黃花子草】即綿絮頭草之古籍別名。與見綱目拾遺。詳『綿絮頭草』條。

【黃花母】即山柳菊之別名。詳『山柳菊』條。

【黃花地丁】即蒲公英之原名。詳『蒲公英』條。

『蒲公英』條。

【黃花苗】即蒲公英之古籍別名。與見和漢藥考。詳『蒲公英』條。

【黃花草】即千里光之古籍別名。與見綱目拾遺。詳『千里光』條。

【黃花郎草】即蒲公英之古籍別名。與見和漢藥考。詳『蒲公英』條。

【黃花魚】即石首魚之古籍別名。與見臨海志。詳『石首魚』條。

【黃花菜】即薺草之古籍別名。與見綱目。詳『薺草』條。即黃瓜菜之古籍別名。與見食療本草。詳『黃瓜菜』條。即白花菜之黃花者。詳『白花菜』條。

【黃花演】即千里光之古籍別名。與見綱目拾遺。詳『千里光』條。

【黃花蒿】命名 本品形似青蒿而色淡黃。故名。

古籍別名 臭蒿。草蒿。(綱目)

外國名詞 Artemisia annua, L. (拉丁) クリミンジン

基本 係菊科艾屬。爲黃花蒿之葉。

產地 在原野田澤間。

形態 黃花蒿爲溼草類之一

年生草本。高三四尺。複葉細裂。花小筒狀。花冠帶黃色。頭狀花序。甚圓。其葉擦碎之。則發辛惡臭。其葉與子俱可供藥用。



黃花蒿

性質 辛苦。涼。無毒。

主治 小兒風寒驚熱。

參攷資料 黃花蒿一名臭蒿。臭蒿一名草蒿。(大明) 香蒿。臭蒿一名草蒿。此蒿與青蒿相似。但此蒿色綠帶淡黃。氣辛臭。不可食。人家採以髹醬黃酒麴者是也。(李時珍)

【黃花蒿子】

性質 辛。涼。無毒。

主治 治勞下氣。開胃。止盜汗。及邪氣鬼毒。

【黃芽菜】即白菜之古籍別名。與見植物學大辭典。詳『白菜』條。

【黃矮菜之原名。詳『黃矮菜』條。

【黃金石】即雄黃之古籍別名。與

見本經。詳『雄黃』條。

【黃金花】即百脈根之日本名。詳『百脈根』條。

【黃金粉】即鍋焦之古籍別名。與見綱目拾遺。詳『鍋焦』條。

【黃柏】原名 藥木。藥皮。命名 黃柏後人簡寫之名也。

處方用名 黃藥。黃柏炭。川黃柏。黃川柏。

古籍別名 山層。和漢藥考) 根名 檀根。(綱目)

外國名詞 Evodia Glauca

基本 屬芸香科之落葉喬木。爲 Phellodendron amurense 之樹皮。

產地 陳仁山藥物生產辨云。黃柏以北江星子。連州爲最。廣西桂林亦可。身結色青黃。可憎薄些。產日本者厚。但其身鬆色黃而無。編青。橫濱好些。神戶次之。又有產錦州者。由烟台牛莊運來。與日本產者同類。更薄而劣。

形態 黃藥爲深山自生之落葉喬木。寒地最多。高達三四丈。葉對生。爲羽狀複葉。其小葉作橢圓

爲末。每服一字。水飲下。(普濟方)

①治肝熱生翳。不拘大人小兒。

黃芩一兩。淡豉三兩爲末。每服三錢。以熱酒煎。溫湯送下。日二服。忌酒麪。(衛生家寶方)

②治少陽頭痛。亦治太陽頭痛。

不拘偏正。小清空。用片黃芩酒浸透。曬乾爲末。每服一錢。茶酒任下。(東垣方)

③治眉眶作痛。風熱有痰。黃芩酒浸。白芷等分爲末。每服二錢。茶下。(潔古方)

④治吐血衄血。或發或止。積熱所致。黃芩一兩。去中心黑朽者爲末。每服三錢。水一盞。煎六分。和滓溫服。(聖惠方)

⑤治吐血衄下血。黃芩三兩。水三升。煎一升半。每溫服一錢。亦治婦人漏下血。(龐安時卒病論方)

⑥治血淋熱痛。黃芩一兩。水煎服。千金方。

⑦治經水不斷。芩心丸。治婦人四十九歲已後。天癸當住。每月却行。或過多不止。用條芩心二兩。米醋浸七日。炙乾。又浸。如此七次。爲末。醋糊丸。梧子大。每服七十丸。空

心溫酒下。日二次。(瑞竹堂方)

⑧治崩中下血。黃芩爲細末。每服一錢。露蘆酒下。以秤錘燒赤。淬酒中。也。許學士云。崩中多用止血及補血藥。此方乃治陽乘於陰。所謂天暑地熱。經水沸溢者也。(本事方)

⑨安胎清熱。條芩、白朮等分炒爲末。米飲和。凡梧子大。每服五十丸。白湯下。或加神麪。凡妊娠調理。以四物去地黃。加白朮。黃芩爲末。常服甚良。(丹溪方)

⑩治產後血渴。飲水不止。黃芩、麥門冬等分。水煎溫服。無時。(楊氏家藏方)

⑪治火瘡出血。一人灸火至五壯。血出不止。如尿。手冷飲絕。以酒炒黃芩二錢爲末。酒服即止。(李樓怪證奇方)

⑫治老小火丹。黃芩末水調塗之。(梅師方)

用量 錢半至二錢。

施用宜忌 凡脾胃虛寒及無

溼熱實火者。禁用。惡葱實。畏丹砂。牡丹。麝香。山藥。黃龍骨爲之使。

著名方劑 黃芩湯。太陽與少

陽合病。自下痢者。此主之。(傷寒論) 黃芩三兩。甘草芍藥各二兩。大棗十二枚。上四味。水一斗。煮取三升。去滓。溫服一升。日再夜一服。

參攷資料 ①黃芩之中。枯而

飄者。瀉肺火。利氣消痰。除風熱。清肌表之熱。細實而堅者。瀉大腸火。養陰退陽。補膀胱寒水。滋其化源。高下之分。與枳實枳殼同例。(李杲)

②黃芩之用。有九。瀉肺熱一也。上焦皮膚風熱。風溼二也。去諸熱三也。利胸中氣四也。消痰隔五也。除脾經諸溼六也。夏月須用七也。婦人產後養陰退陽八也。安胎九也。酒炒上行。主上部積血。非此不能除。下痢膿血。腹痛後重。身熱久不能止者。與芍藥甘草同用之。凡諸痛瘡不可忍。宜芩連苦寒之藥。詳上下分。身稍及引經藥用之。張元素

③黃芩降痰。假其降火也。凡去上焦溼熱。須以酒洗過。用片芩瀉肺火。須用桑白皮佐之。若肺虛者。多用則傷肺。必先以天門冬保定肺氣。而後用之。黃芩白朮。乃安胎聖藥。俗以黃芩爲寒而不敢用。蓋不知胎孕宜清熱涼血。

血不妄行。乃能養胎。黃芩乃上中二焦藥。能降火下行。白朮能補脾也。(朱震亨) ④張仲景治傷寒心下痞滿。瀉心湯凡四方。皆用黃芩。以其主諸熱。利小腸故也。又太陽病下之利不止。喘而汗出者。有葛根黃芩黃連湯。及主妊娠安胎散亦多用之。(蘇頌) ⑤得厚朴黃連止腹痛。得五味子。牡蠣。令人有子。得黃芪。白飲。赤小豆。療鼠瘻。(徐之才) ⑥得酒上行。得豬膽汁。除肝膽火。得柴胡。退寒熱。得芍藥。治下痢。得桑白皮。瀉肺火。得白朮。安胎。(李時珍) ⑦圖者名于芩。破者名宿芩。其腹中皆爛。故名腐腸。(陶弘景) ⑧宿芩乃舊根。多中空。外黃內黑。即今所謂片芩。乃又有腐腸。婦人諸名。妬婦心。黯故。以比之子。芩乃新根。多內實。即今所謂條芩。或云西芩。多中空而色黯。比芩多內實而深黃。(李時珍) ⑨今出宜州。鄜州。涇州者佳。兗州大賈亦好。名蛇尾。芩。(蘇恭) ⑩今川蜀河東。陝西。近郡皆有之。苗長尺餘。莖幹粗如筋。葉從地四面作叢生。類紫草。高一尺許。亦有獨莖者。葉

心湯外。亦絕不用。今以千金方參合而考之。亦頗有意義可尋也。千金治黃方。凡有黃芩者。多云一身面目悉黃。金匱要略中所載有身熱。面黃者。有額上黑者。有面青目黑者。可知痘證非一身面目悉黃者。不可用矣。千金治熱利。冷利。痞瀉。利小兒。利用黃芩方。多有壯熱一語。可知洩利無熱者。不可用矣。大抵氣主充周。無處不到。凡病有彼此不相侔者。必非氣分之病。黃芩主氣分之熱。於此不可以相證乎。千金治小兒核腫壯熱有實方。及治小兒熱毒入膀胱中。忽患小便不通。欲小便則澀痛不出。出少如血。須臾復出。地膚子湯。治小兒落牀墮地。如有瘀血。腹中陰陰寒熱。不肯乳哺。但啼哭叫喚。蒲黃湯。皆有黃芩。考茲數證。均為氣熱攻血。亦微其病本之治別錄。所謂黃芩治小兒腹痛者。於此可明其旨矣。即其治小腹絞痛。亦當與此不異。蓋傷寒金匱兩書。僅有腹痛去黃芩之文。大率黃芩所治之小腹絞痛。必煩熱。必口渴。必小便有異於常。捨此則非所宜矣。【清】賈九

十一 薑 黃

如辨藥指南論黃芩曰。黃芩中枯者名枯芩。條細者名條芩。一品宜分兩用。蓋枯芩體輕上浮。專瀉肺胃上焦之火。主治胸中逆氣。膈上熱痰。咳嗽喘急。目赤齒痛。吐衄失血。發斑發黃。痘疹清毒。以其大能涼隔也。其條芩體重。主降。專瀉大腸下焦之火。主治大便閉結。小便淋瀝。小腹急脹。腸紅痢疾。血熱崩中。胎漏下血。挾熱腹痛。諸語狂言。以其大能清腸也。同枳實。紫朴。能消穀食。因邪熱不殺穀。以此清胃則穀易消。同柴胡。退熱。為柴胡散火之標。以此折火之本。同白朮。安胎。蓋白朮健脾。但胎坐中。宮氣不運行。易生鬱熱。以此清氣。胎動自安。用豬膽汁拌製。入厥陰肝經。以清抑鬱之火。止胎前瘧寒戰振動。不使墮胎。

國外學說 日本學說謂黃芩漢醫頗珍重之。稱為有清涼解熱利尿之效。豬子氏因漢醫珍重黃芩。苦於不明其理由。高橋學士發見一種結晶性物質。附以「スクテラリン」之名。稱於治療上無特殊之作用。黃芩果為有效與否。暫時尚為一疑問而已。（中外醫事新報和漢藥論）又和漢藥考用為清涼解熱藥。用量二、〇至六、〇。又曰。藥肆所售黃芩。有漢、朝鮮和三種。漢種呈黃黑色。有苦味。為上品。其中老根。色頗黑。內部空虛。味苦。日本呼真餘手。其嫩根形細長。內部充實。日本呼軸手。朝鮮種呈鮮黃色。苦味薄。為中品。日本種根細長。而有縱皺。往往分歧。外面灰黃色。內部鮮黃色。味稍苦。含樹脂。為下品。

近人學說 袁淑範曰。按黃芩為屬唇形科宿根植物。美國藥制中早已揭載。有一種黃芩。其有效成分。據日人高橋順太郎氏之研究。則為一種呈黃色針狀或板狀。無臭無味之結晶體也。因其原植物之名。為 *Coutellaria baicai-janae*。故雖命名為「Coutellaria baicai-janae」（黃芩精）將切碎之黃芩。用以太冷浸。蒸餾其浸出液。則析去黃色之結晶塊。再將此結晶塊溶解於沸騰酒精中。放置數時間後。即能析出黃色針狀或板狀之黃芩精結晶也。

配合應用 ①治溼熱作泄腹痛。黃芩、芍藥、黃連、炙甘草、車前子、防風、升麻。

②治滯下腹痛。黃芩、芍藥、黃連、炙甘草、滑石、升麻。

③三黃丸。孫思邈千金方云。巴郡太守。奏加減三黃丸。療男子五癆七傷。消渴。不生肌肉。婦人帶下。手足寒熱。瀉五臟火。春三月。黃芩四兩。大黃三兩。黃連四兩。夏三月。黃芩六兩。大黃一兩。黃連七兩。秋三月。黃芩六兩。大黃三兩。黃連三兩。冬三月。黃芩三兩。大黃五兩。黃連二兩。三物隨時合。搗下篩。蜜丸。烏豆大米飲下。每服五丸。日三。不知。增至七丸。服一月。病愈。久服走及奔馬。人用有驗。藥食豬肉。（圖經本草方）

④三補丸。治上焦積熱。瀉五臟大黃連。黃蘗等分。為末。蒸餅丸。梧子大。每服二三十丸。白湯下。（丹溪方）

⑤治肺中有火。清金丸。用片芩炒為末。水丸。梧子大。每服二三十丸。白湯下。（丹溪方）

⑥治小兒驚啼。黃芩、人參等分。

一血分熱結者與芍藥爲耦。(桂枝柴胡湯。黃芩湯。大柴胡湯。黃連阿膠湯。蠶甲煎丸。大黃廬蟲丸。奔蛇湯。王不留行散。當歸散。) 淫熱阻中者與黃連爲耦。(半夏瀉心湯。甘草瀉心湯。生薑瀉心湯。葛根黃芩黃連湯。乾薑黃芩黃連人參湯。) 以柴胡能開氣分之結不能洩氣分之熱芍藥能開血分之結不能清迫血之熱黃連能治溼生之熱不能治熱生之溼譬之解關但去其關者未平其致關之怒關終未已也。故黃芩協柴胡能清氣分之熱協芍藥能洩迫血之熱協黃連能解熱生之溼也。小柴胡證腹中痛者去黃芩加芍藥。心下悸小便不利者去黃芩加茯苓。夫腹中痛未必非氣血之結而心下悸小便不利亦何以決知其非氣熱而生之水且本經明言黃芩能逐水別錄明言黃芩能除小腹絞痛利小腸而遠去之何耶殊不知治腹滿痛腹痛繞臍痛少腹疝痛有可用寒藥者惟腹中痛者必無中熱之理仲景是以於厥陰篇特標其旨曰腹中痛若轉氣下趨少腹

者此欲自利也其他如真武湯之腹痛小便不利小建中湯之腹中急痛附子粳米湯之腹中寒氣雷鳴切痛當歸生薑羊肉湯之腹中痛及脇痛裏急抵當烏頭桂枝湯之腹中痛逆冷手足不仁致痛雖殊治痛亦異用溫藥則同以是知腹痛下一中字則與凡痛有別用黃芩諸方必無此矣彼小腹絞痛者乃熱氣迫血血結少腹而痛與蠶甲煎丸大黃廬蟲丸王不留行散之用黃芩不殊也小便不利原不必忌黃芩小便不利而心下悸則不容更用黃芩何則仲景云太陽病小便利者以飲水多必心下悸小便少者必苦裏急也彼雖論血結此亦可借以喻氣結曰飲水多而心下悸則非熱阻所化之水矣熱阻所化之水可以黃芩逐飲水而停蓄者其可以黃芩逐之耶蓋水氣凌心爲悸必寒水乃然若熱化之水氣則脾家上升瀾濛之氣中焦變化取赤之汁終日周流於腹中而稟命於心君若均能致悸則無病人有不悸時耶李瀕湖言有人素多酒慾少腹絞痛不可

忍小便如淋諸藥不效偶用黃芩木通甘草三味煎服遂止王海藏言有人因虛服附子藥多病小便闕服芩連藥而愈大抵黃芩之用凡氣分有餘挾熱攻衝他所者乃爲的對若他所自病不係熱氣攻衝者則不可服服之必益虛其氣他所之病反足以攻衝於氣矣或問黃芩湯治何等證其證腹痛與否若腹痛何以用黃芩若腹不痛何以用芍藥曰其證身熱不惡風亦不惡熱或下利或嘔腹則不痛蓋芍藥甘草大棗桂枝湯裏藥也以不惡風故不用薑桂黃芩甘草大棗小柴胡湯裏藥也以不往來寒熱故不用柴胡以其常熱故不用人參薑若不嘔則并不用半夏生薑至芍藥則並不因腹痛而用以桂枝湯證原無腹痛也亦不心下痞輒以不去大棗也夫芍藥甘草湯治傷寒汗出誤服桂枝湯後足脛拘急已見其能破陽邪於陰分矣加以黃芩不益可見陽分之熱甚盛攻於陰分爲利非陰中自有慾陽之結耶仲景於厥陰篇云傷寒脈遲與黃芩湯除其熱腹中則

冷不能食可知黃芩湯證之脈必數黃芩所治之熱必自裏達外不治但在表分之熱矣黃芩治自裏達外之熱千金歷有明文芍藥湯治產後虛熱頭痛若通身發熱者加黃芩慎火草散治腸中漏下赤白青黑腐臭不可近熱多者加知母黃芩道人深師增損腎瀝湯治風虛勞損挾毒脚弱疼痛下焦虛冷胸中有熱其熱多者加黃芩又可知陰虛氣盛熱自內出者黃芩亦能治之而不但治感觸所化體中達外之熱矣李瀕湖自緣感冒咳嗽既久且犯戒遂病骨蒸發熱膚如火燎每日吐痰盈碗疊月煩渴寢食幾廢脈浮洪循服柴胡麥冬冬前瀝諸藥月餘益劇皆以爲必死其尊人以謂李東垣治肺熱如火燎煩躁引飲薑甚者宜一味黃芩以瀉肺經氣分之火遂按方用黃芩一兩煎服次日身熱盡退痰嗽皆愈於此益可知黃芩所治必肺經氣分之熱肺經氣分之熱必甚甚於夜也黃芩本經主黃疸腸澼利金匱要略及傷寒論發黃證皆不用洩利證兩書陰瀉瀉

病自瘳矣。苦寒能除溼熱。所以小腸利而水自逐。源清則流潔也。血閉者。實熱在血分。即熱入血室。令人經閉不通。溼熱解則榮氣清而自行也。惡瘡疽蝕者。血熱則留結而爲癰腫潰爛也。火瘍者。火氣傷血也。涼血除熱則自愈也。別錄消痰熱者。熱在胸中則生痰火。在少腹則絞痛。小兒內熱則腹痛。胃中溼熱去則胃安而消穀也。淋露下血是熱在陰分也。其治往來寒熱者。邪在少陽也。五淋者。溼熱勝所致也。苦寒清肅之氣勝。則邪氣自解。是伐其本也。【明】李士材本草圖解論黃芩曰。黃芩苦寒輕飄者入肺。堅實者入大腸。主風熱溼熱痰熱骨蒸。火咳下利。喉間腥氣。上部積血。寒熱往來。失血癰疽。安胎療淋。養陰退陽。得酒上行。得豬膽除肝膽火。得柴胡退寒熱。得芍藥治下利。得桑皮瀉肺火。得白朮安胎。稍挾虛者。切勿輕用。【清】黃宮繡本草求真論黃芩曰。黃芩書載味苦入心。又載入肺。瀉火入脾。除溼入大腸。以治腸澼腹痛。入小腸膀胱。以治淋閉。且治中焦實火。及

邪在少陽膽經。得此以爲清理。三藥而上下表裏皆治。其功力之泛濫。殆有難爲揣主者耳。不知內火衝激。外邪傳入。皆能惡害。上如胸膈咽喉。下如肚腹二便。中如表裏之所。陰陽之界。無不病症悉形。以故腹痛腸澼。寒熱往來。黃疸淋閉。胸高氣喘。癰疽瘡瘍。火嗽喉腥。經閉胎漏。口渴津枯。一皆溼之所淫。熱之所浸。火之所勝。黃芩味苦性寒。枯而大者。輕飄上升以清肺。肺清則痰自理矣。實而細者。沉重下降以利便。便利則腸腑自去。酒炒則腸熱可除。而肝膽火熄。生用則實熱堪投。而腹痛斯愈。且得白朮砂仁以安胎。得厚朴黃連以除腹瀉。得芍藥以治痢。得柴胡以治寒熱往來。此雖合上與下。表裏皆治。而究止爲上中二焦。瀉火除熱。與溼之味矣。但肺虛腹痛。屬寒者。切忌黃明者。良中虛者。爲枯芩。即片芩。內實者。爲條芩。即子芩。上行酒炒。瀉肝膽火。【清】張隱庵本草崇原論黃芩曰。黃芩色黃。內空。能清腸胃之熱。外肌皮而性寒。能清肌表之熱。乃手足陽明兼手太陰之

藥也。主治諸熱黃疸。腸澼洩痢者。主諸經之熱。歸於胃土。而爲黃疸。歸於大腸。而爲洩痢。黃芩中空。主清腸胃之熱。故能治之。腸胃受濁。得肺氣通調。則水津四布。血氣運行。逐水下血。閉者。黃芩外肌皮而清肌表。清則肺氣和。而留水可逐。血閉自下矣。火熱之氣留於肌肉皮膚。則爲惡瘡疽蝕。惡瘡疽蝕。名曰火瘍。黃芩治之。清肌表也。【清】葉天士本草經解論黃芩曰。黃芩氣平。稟天秋涼之金氣。入手太陰肺經。其味無毒。得南方之火味。入手少陰心經。氣味俱降。陰也。心者火臟也。十二官之君。諸熱之主也。苦平清心。故主諸熱。黃疸者。溼熱乘脾之症也。脾爲太陰。溼土。土溼熱。則本色現而發黃疸。黃芩苦平清肺。肺亦太陰。太陰溼熱退。而脾疸亦平也。肺與大腸相表裏。大腸溼熱。則腸澼洩痢。黃芩清肺。肺清則通調水道。而溼熱下逐。腸肺復其燥金之性。而洩痢愈矣。肺司水道。熱則肺失清肅之令。而水道不通。水因而蓄。爲黃芩清肺。則氣化下。及膀胱而水下。逐矣。血閉者。實

熱在血分。而經閉不通也。心主血。味苦清心。則能下洩。所以主之。惡瘡疽蝕者。係瘡疽敗壞潰腐而不收口也。火瘍。火傷瘡也。皆心火有餘。而腐壞肺之皮毛也。苦平清心。肺所以主諸痛痒瘡瘍也。【清】陳修園本草經讀論黃芩曰。黃芩與黃連黃蘗。皆氣寒味苦。而色黃。主治大略相似。大抵氣寒皆能除熱。味苦皆能燥溼。色黃者。皆屬於土。黃而明亮者。則屬於金。金借土之色。以爲色。故五金以黃金爲貴也。但黃芩中空。似腸胃。腸爲手陽明胃。爲足陽明。其主諸熱者。指腸胃諸熱病而言也。黃疸爲大腸經中之鬱熱。逐水者。逐腸中之水也。下血閉者。攻腸中之蓄血。惡瘡疽蝕。火瘍者。爲肌肉之熱毒。陽明主肌肉。瀉陽明之火。即所以解毒也。本經主治之言如此。仲景於少陽經用之。於心下悸。易茯苓。於腹痛。易芍藥。又於本經言外別有會悟也。【清】鄭樹本經疏證論黃芩曰。仲景用黃芩有三。耦爲氣分熱結者。與柴胡爲耦。一小柴胡湯。大柴胡湯。柴胡桂枝乾薑湯。柴胡桂枝湯。

皆平補。宜於虛熱。若鹿角膠則性味熱補。非虛熱者所宜。不可不致辨也。(李時珍)

【黃昏】即王孫之古籍別名。典見別錄。詳「王孫」條。

【黃杏影子】即山梔子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「山梔子」條。

【黃松節】即茯神木之原名。詳「茯神木」條。

【黃果】即黃葛樹之古籍別名。典見居易錄。詳「黃葛樹」條。

【黃泥螺】即吐鐵之古籍別名。典見海味彙隱。詳「吐鐵」條。

【黃物】即金之古籍別名。典見和漢藥考。詳「金」條。

【黃芝】命名 本品為芝之黃色者。故名。

古籍別名 金芝(本經)
性質 甘平。無毒。

主治 心腹五邪。益脾氣。安神。忠信和樂。久食輕身延年。

【黃芝】即黃精之古籍別名。典見瑞草經。詳「黃精」條。

【玉竹】即玉竹之古籍別名。典見和漢藥考。詳「玉竹」條。

【黃芩】命名 芩說文作荃。謂其色黃也。又芩者黔也。黔乃黃黑之色也。故名。

處方用名 條芩。于芩。淡于芩。淡黃芩。酒芩。東芩。

古籍別名 腐腸(本經)。空腸。內虛。經芩。黃文(別錄)。宿芩。(陶弘景)。妬婦。印頭。(吳普本草)。苦督郵。記事(綱目)。枯尾。北芩。片芩。枯腸。裏腐草。裏朽草。紅谷。樹裏朽斤草。(和漢藥考)

學名 Scutellaria baicalensis Geoy

基本 屬玄參科。為黃芩之根。產地 陳仁山藥物生產辨云。黃芩山西直隸熱河一帶。均有出。俱野生。春以清明節前收成。秋以立秋後收成。

形態 黃芩為多年自生之宿根草。春季自宿根抽出方莖。高二三尺。葉對生。作披針形。類柳葉。有毛茸。無葉柄。夏月於莖上及枝梢開紫色或白色唇形花。花後結乾果。中有球形黑色種子。根長大呈深黃色。長約五六寸。大者達尺

餘。外面暗灰色。內部暗褐色。木部粗糙。呈淡黃色。其髓稍緻密。呈褐黃色。皮部與木部。易於剝離。概無香氣。稍有苦味。

種類 宿芩乃舊根也。中空。外黃內黑。即今所謂片芩。枯芩。子芩乃新根也。中多堅實而細。即今所謂條芩。鼠尾芩。

採取 二月九月間採根。陰乾。製法 李時珍曰。凡使黃芩。得酒上行。得豬膽汁。除肝膽火。得柴胡退寒熱。得芍藥治下痢。得桑白皮瀉肺火。得白朮安胎。

性質 苦平。無毒。

成分 高橋醫學博士試驗黃芩根。發見有作黃色針狀或板狀結晶體之一種植物鹽。基名為司克胎拉林(Scutellarin C₁₅H₁₆O₆)

效能 瀉實火。清溼熱。治泄痢。療瘡瘍。用作清涼解熱藥。又治流行性感冒。破傷風。

作用 在胃內能增胃酸之不足。以助長消化之功能。至腸中略有激腸蠕動之效。入血內能減退組織細胞之氯化機能。以阻止體

溫之增高。

主治 諸熱。黃疸。腸澼洩痢。逐水。下血閉。惡瘡。瘰癧。火瘡(本經)療痰熱。胃中熱。小腹痛。絞痛。消穀利。小腸女子血閉淋露。下血。小兒腹痛(別錄)

歷代記述攷證

【唐】甄權藥性本草論黃芩曰。治熱毒。骨蒸。寒熱往來。腸胃不利。破癰氣。治五淋。令人宣暢。去關節煩悶。解熱渴。

【宋】大明諸家本草論黃芩曰。下氣。主天行熱疾。疔瘡。排膿。治乳癰發背。【金】張元素珍珠囊論黃芩曰。涼心。治肺中溼熱。瀉肺火。上逆。療上熱。目中腫赤。瘀血壅盛。上部積血。補膀胱寒水。安胎。養陰退陽。

【明】李時珍本草綱目論黃芩曰。治風熱。溼熱。頭疼。奔豚。熱痛。火咳。肺痿。喉。腥。諸失血。【明】經希雍本草經疏論黃芩曰。黃芩味苦平。無毒。別錄益之以大寒。味厚。氣薄。入手太陰。少陰。太陽。陽明。亦入足少陽。其性清肅。所以除邪。味苦。所以燥溼。陰寒。所以勝熱。故主諸熱。諸熱者。邪熱。與溼熱也。黃疸。腸澼。洩痢。皆溼熱勝之病也。折其本。則諸

產地 廣東、廣西及熱帶諸地多有之。

形態 黃皮爲莢果類之一種。其果大如龍眼。皮色黃白。有微毛。瓢白如肪。有青籽數枚。或似棟子及小棗狀。可供食與藥用。

性質 酸。平。無毒。
主治 消食順氣。除暑。止嘔逆。痰水。胸膈滿痛。蚊蟲上攻。心下作痛。

參攷資料 廣東瑣語。載果中有白蠟子。與黃皮果絕相似。而味尤勝。諺有云。黃皮白蠟。甜酸相雜。想功亦不甚遠也。食荔枝太多。用黃皮果解之。(趙學敏)

【黃皮核】 產地 以廣府屬爲最多。

主治 塗小兒頭上瘡癬。疳氣。
【黃石】 ①即人參之古籍別名。典見和漢藥考。詳「人參」條。②即方解石之原名。詳「方解石」條。

【黃石脂】 命名 本品爲石脂之黃色者故名。

性質 苦。平。無毒。
主治 養脾氣。安五臟。調中。大小兒洩瀉。腸澀。去膿血。去白蟲。

除黃痘瘰癧。久服輕身延年。施用宜忌 惡細辛。畏蜚蠊。黃連。甘草。曾青爲之使。

【黃石華】 產地 生山東半島山中。

形態 黃石華爲石類之一種。其色黃。可供藥用。
性質 甘。無毒。
主治 陰痿。消渴。腸中熱。解百毒。

【黃安】 即雌黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳「雌黃」條。

【黃米】 ①即稗之古籍別名。典見綱目。詳「稗」條。②即稷米之俗名。詳「稷米」條。

【黃羊】 命名 本品腹帶黃色。而幼稚肥小者故名。

古籍別名 蘭耳羊。(綱目)
產地 出關西。西番及桂林諸地。

形態 黃羊爲獸類。羊屬之一種。其狀與羊同。但低小。細肋。腹下黃色。羊如殺羊。數十成羣。喜臥沙漠地。及野草中。其出桂林者。則深褐色。黑脊白斑。與鹿相近。皮可爲金褥。肉可食。與藥用。其體詳見該條。

性質 甘。溫。無毒。
主治 補中益氣。並治勞傷虛寒。

參攷資料 黃羊肉煮汁無味。其膳不可食。(綱目)

【黃羊髓】 主治 補益。功同羊髓。

【黃衣】 ①即黃蒸翅之古籍別名。典見新修本草圖經。詳「黃蒸翅」條。②即黃精之古籍別名。典見和漢藥考。詳「黃精」條。

【黃伯勞】 即鶯之古籍別名。典見綱目。詳「鶯」條。

【黃杜】 即苦蜜之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「苦蜜」條。

【黃杜鵑】 即羊躑躅之古籍別名。典見本草蒙筌。詳「羊躑躅」條。

【黃沈香】 即沈香之別名。詳「沈香」條。

【黃沙石】 即鐘乳石之古籍別名。典見藥性。詳「鐘乳石」條。

【黃葩】 即香薷之一種。典見綱目。詳「香薷」條。

【黃良】 即大黃之古籍別名。典見本經。詳「大黃」條。

【黃豆】 即黃大豆之古籍別名。典見寧原。詳「黃大豆」條。

【黃防風】 即防風之處方用名。詳「防風」條。

【黃卷皮】 即大豆卷之古籍別名。典見和漢藥考。詳「大豆卷」條。

【黃姑魚】 即黃鰻魚之古籍別名。典見綱目。詳「黃鰻魚」條。

【黃明膠】 命名 本品即用牛皮熬成之膠。其色黃明。故名。

古籍別名 牛皮膠。(食療本草) 水膠。(外臺祕要) 海犀膏。(綱目) 青膠。

性質 甘。平。無毒。

主治 吐血。衄血。下血。血淋。下痢。妊娠胎動。血下。風溼。走注。疼痛。打撲傷損。湯火灼瘡。一切癰疽腫毒。活血止痛。潤燥。利大小腸。

參攷資料 本經白膠一名鹿角膠。黃鹿角作之。阿膠一名傳致膠。黃牛皮作之。其說甚明。黃明膠即今水膠。乃牛皮所作。其色黃明。非白膠也。但非阿井水所作耳。但其功用亦與阿膠彷彿。阿膠難得。則黃牛皮膠亦可權用。其性味

【黃斤】即葛根之古籍別名。典見別錄。詳「葛根」條。

【黃牙】①即石硫黃之古籍別名。典見綱目。詳「石硫黃」條。②即金之古籍別名。典見鏡源。詳「金」條。

【黃牙石】即金牙石之古籍別名。典見綱目。詳「金牙石」條。

【黃牛肉】即牛肉之處方用名。詳「牛肉」條。

【黃牛根】即土茯苓之古籍別名。典見和漢藥考。詳「土茯苓」條。

【黃占】即黃蠟之古籍別名。典見和漢藥考。詳「黃蠟」條。

【黃奴】即雄黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳「雄黃」條。

【黃瓜】原名 胡瓜。命名 本品來自西域。故曰胡瓜。後因避諱遂改爲黃瓜。

外國名詞 Cucumis sativus。

ト(拉丁) キウリ(日本)

基本 係葫蘆科胡瓜屬之果實。

形態 黃瓜爲菜類之一年生草本。由卷鬚而上昇。葉爲心臟形。淺裂如掌狀。有葉柄互生。夏日開花。花單性。合瓣。花冠黃色。雄花與

雌花同株。雄蕊三。雌花子房下位。有三側膜胎座。果實細長爲瓠果。有刺甚多。恒供食用。亦可充藥用。



黃 瓜

性質 甘寒。有小毒。

主治 清熱解渴。利水道。

歷代記述攷證 【清】黃宮繡

本草求真論黃瓜曰。胡瓜氣味甘寒。服此止能清熱利水。別無裨益。故南人坐坑。用此以爲席珍。南人

值疊。用此以爲供蔬。并或咽喉腫痛。用此入藥。以爲吹消。杖瘡火眼。

用此納硝刮粉。以爲點茶湯火傷。灼用此搗碎入瓶取水以爲刷數。

水病肚脹用此連子醋煮空心以爲投服。小兒熱痢用此投蠶。以爲

投治。皆以取其甘寒解毒之意。然使臟寒氣陰。復則能以動氣。發熱

作癰。且發脚氣。生瘡。小兒過服。尤易作瀉。生疳。不可不慎。藥則苦平

小毒。能治小兒因癖。【清】王士雄

隨息居飲食譜論黃瓜曰。黃瓜生

食甘寒。清熱利水。可茹可饌。兼蔬之用。而發風動熱。天行病後痞瘰。瀉痢。脚氣。瘡疥。產後痧痘。皆忌之。

參攷資料 ①北人避石勒諱

改呼黃瓜。至今因之。【陳藏器】②張壽使西域得種。故名胡瓜。按杜

寶拾遺錄云。隋大業四年。避諱。改胡瓜爲黃瓜。與陳氏之說微異。今

俗以月令王瓜生。卽此誤矣。王瓜土瓜也。【李時珍】③胡瓜處處有

之。正二月下種。三月生苗。引蔓。葉如冬瓜。葉亦有毛。四五月開黃花。

結瓜。圍二三寸。長者至尺許。青色皮上有瘡癰如疣子。至老則黃赤

色。其子與菜瓜子同一種。五月種者。霜時結瓜。白色而短。並生熟可

食。兼蔬蔬之用。糟醬不及菜瓜也。【李時珍】④黃瓜善解火毒。北方

坐臥坑床。用此或爲珍品。南人以之供蔬。不甚有益。惟值暑時用此

爲蔬。亦可稍清暑熱。生食者不可多用。醋和蜜同食。可治小兒熱痢。

【陸冕英】

【黃瓜仁】即瓜囊仁之古籍別名。典見別錄。詳「瓜囊仁」條。

【黃瓜根】主治 搗傳狐刺毒腫。

命名 本品花黃。其氣如瓜。故又名黃瓜菜。

古藥別名 黃花菜。食療。黃

鵪菜。救荒。苦菜。【日本】

外國名詞 Lactuca Thunbergiana, Maxim. (拉丁) "ガナ(日本)

基本 係菊科萵苣屬黃瓜菜之莖葉。

產地 生山野田澤間。

形態 黃瓜菜爲雜草類之一種。高一二尺。葉形不一。大抵細長

披針形。有缺刻。不整齊。根莖有長柄莖葉則無柄。基脚抱莖。上初夏

分枝開花。舌狀花冠。黃色。結實小而平滑。有冠毛。其莖葉可供藥用。

性質 甘微苦。微寒。無毒。

主治 通結氣。利腸胃。

性質 苦平。有小毒。歲用一葉。生搗攪汁服。得吐下良。

古藥別名 黃彈子。【綱目拾遺】

一三九七

性質 辛甘熱微毒。

主治 瘡癤疥癬髮腫。

【黃大豆稽】

主治 燒灰入點。去惡肉藥。

【黃大戟】

即芫花之根有毒。功能消腫。詳「芫花」條。

【黃子】

即女麴之古籍別名。典見綱目詳「女麴」條。

【黃丹】

原名 鉛丹。

命名 本品係用黑鉛和硝黃鹽礬煅煉而成黃色之丹藥故名。

處方用名

丹粉。

古籍別名

朱粉。鉛華。(綱目)丹。赤丹。金柳。軍門。國丹。華蓋。龍汁。

彼丹。鉛黃華。(和漢藥考)

外國名詞 Minium (拉丁) Red Lead (英) Mennige (德)

基本 係金屬礦石類。為黑鉛煉成之丹。

產地 產鉛諸地。均有法製出沽。

形態 黃丹為黃赤色重粉末。

熾熱之放出養氣一部分。變為養化鉛。置於普通溶解劑不能溶解。

逢硝酸。則溶解一部分成為硝酸鉛。餘則留下褐色之過養化鉛。

採取 採無時。

製法 李時珍曰。按獨孤酒丹房鑑源云。炒鉛丹法。用鉛一斤。土硫黃十兩。消石一兩。鎔鉛成汁。下醋點之。滾沸時下硫一塊。少頃下消黃待沸定。再點醋。依前下少許。

消黃待為末。則成丹矣。今人以作鉛粉。不盡者用消石礬石炒成丹。

若轉丹為鉛。只用連鬚葱白汁。拌丹慢煎。煨成金汁。傾出。即還鉛矣。

貨者多以鹽消砂石雜之。凡用以水漂去消鹽。飛去砂石。澄乾。微火炒紫色。地上去火毒。入藥會典云。

黑鉛一斤。燒丹一斤。五錢三分也。

用法 恒剉末。和作丸散。或和入外治傳藥。

性質 辛微寒。無毒。

效能 內服墜痰鎮心。外傳拔毒生肌。用作解熱解毒藥。又為專供外科製造膏藥之要品。

主治 吐逆胃反。驚癇癰疾。除熱下氣。鎮化還成丸。久服通神明。(本經)止小便。除毒熱。臍擊。金瘡血溢。(別錄)

歷代記述攷證

【唐】甄權藥性本草論黃丹曰。驚悸狂走。消渴。煎膏用。止痛生肌。

【宋】大明諸家本草論黃丹曰。鎮心安神。止吐血及嗽。傳瘡長肉。及湯火瘡染髮。

【宋】寇宗奭本草衍義論黃丹曰。治瘡及久積。【明】李時珍本草綱目論黃丹曰。墜痰殺蟲去怯。除忤惡。止痢明目。

【清】黃宮繡本草求真論黃丹曰。鉛丹即名黃丹。係用黑鉛硝黃鹽礬煅煉而成。故味兼鹹而走血。其性亦能殺蟲解熱。墜痰祛積。且更拔毒去瘀。長肉生肌。膏藥每取為用。目暴赤痛。鉛丹調貼太陽立效。

配合應用 ①治消渴煩飢。黃丹新汲水服一錢。以蕎麥粥壓之。(聖惠方)

②治吐逆不止。碧霞丹。用北黃丹四兩。米醋半升。煎乾。炭火三秤。就銚內煨紅。冷定為末。粟米飯丸梧子大。每服七丸。醋湯下。(集驗方)

③治小兒吐逆不止。宜此清礬。燒針丸。用黃丹研末。小棗肉和丸。夾子大。每以一九針。簽於燈上燒。

過研細。乳汁調下。一加硃砂。枯礬等分。(謝氏小兒方)

④治反胃氣逆。胃虛。鉛丹二兩。白礬二兩。生石膏半兩。以丹礬研勻。入坩鍋內。以炭半秤。煨赤。更養一夜。出毒兩日。入亭脂同研。粟米飯和丸。綠豆大。每日米飲下十五丸。(聖濟總錄方)

⑤治泄瀉下痢赤白。用棗肉搗爛。入黃丹。白礬各皂子大。粳米飯一團。和丸。彈子大。纔線穿於燈上。燒過為末。米飲服之。(摘玄方)

⑥治赤白痢下。黃丹炒紫。黃連炒等分。為末。以糊丸。麻子大。每服五十丸。生薑甘草湯下。(普濟方)

⑦治妊娠下利疼痛。可用烏雞卵一箇。開孔。去白留黃。入鉛丹五錢。攪勻。泥裹煨乾。研末。每服二錢。米飲下一服。愈是男。二服愈是女。(三因方)

⑧治吐血。咯血。咳血。黃丹新汲水服一錢。(經驗方)

⑨治寒熱瘧疾。體虛汗多者。黃丹。白草霜等分。為末。發日空心米飲服三錢。不過二服。愈或糊丸。或蒜丸。皆效。又用飛炒黃丹一兩。恒

脂」條。

【須臾】即鵲鷗之古籍別名。典見

爾雅。詳「鵲鷗」條。

【駝】即駝之古籍別名。典見綱

目詳「駝」條。

【螳螂】即螳螂之古籍別名。典見揚

雄方言。詳「螳螂」條。

【黃土】命名 本品即土之黃

色者故名。

製法 陳藏器曰。凡使黃土。當

去土上惡物用。

性質 甘平。無毒。

主治 洩痢冷熱赤白。腹內熱

毒絞結痛。下血。取乾土水煮三五

沸。絞去滓。暖服一二升。又解諸藥

毒中肉毒。合口椒毒。野菌毒。

參攷資料 按劉跂錢乙傳云。

元豐中。皇子儀國公病瘧。經國醫

未能治。長公主舉乙入進黃土湯。

而愈。神宗召見。問黃土愈疾之狀。

乙對曰。以土勝水。水得其平。則風

自退。爾上悅。擢太醫丞。又克堅志

云。吳少師得疾。數月消瘦。每日飲

食入咽。如萬蟲攪攻。且痒且病。皆

以爲勞瘵。迎明醫張銳診之。銳令

明旦勿食。遣卒詣十里外取行路

黃土至。以溫酒二升攪之。投藥百

粒飲之。覺痛幾不堪。及登瀝。下馬

蝗千餘宛。其半已困死。吳亦憑

基調理三日乃安。因言夏月出師

燥渴。飲潤水一盃。似有物入咽。遂

得此病。銳曰。蟲入人臟。勢必孳生

穢。則聚啞。精血飽則散處臟腑。苟

知殺之。而不能掃。取終無益也。是

以請公榜腹。以誘之。因蟲久不得

土味。又喜酒。故乘機畢集。一洗而

空之。公大喜。厚賂謝之。以禮送歸

(李時珍)

【黃土】即落花生出於福建興化

實粒滿而味甜者之古籍別名。典

見綱目拾遺。詳「落花生」條。

命名 本品乃大豆

之色黃者故名。

古籍別名 黃豆(寧原)

外國名詞 Glycine hispida,

Mexim (拉丁) グイジン

ミンマ オホマメ (日本)

基本 係豇科大豆屬。爲黃大

豆之子實。

形態 黃大豆爲穀類之一年

生草本。高二尺餘。莖葉皆有毛。葉

互生複葉。自三小葉成小葉。邊緣

無齒牙。夏秋開小花。作蝶形花冠。

色白或帶紫。雄蕊二。雌蕊一。果實

爲莢。有毛。其子實形如大豆而色

淡黃。供食用。亦可充藥用。

採取 夏秋採之。

用法 恒以水煮。調味供食。入

藥水煎或剉末用。

性質 甘溫。無毒。

效能 消水腫。瘡癤。用作緩

和滋養藥。

主治 寬中下氣。利大腸。消水

腫毒。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論黃大豆曰。研末。熱水

和塗。痘後癰。【清】黃宮繡本草求

真論黃大豆曰。黃大豆按書既言

味甘。服多壅氣。生痰動嗽。又曰寬

中下氣。利大腸。消水腫。其理

似屬兩歧。詎知書言甘壅如滯。是

即炒熱而氣不洩之意也。書言寬

中下氣。利腸。是即生冷未炒之意

也。凡物生則疎泄。熟則壅滯。大豆

其味雖甘。其性雖溫。然生則水氣

未泄。服之多有疎泄之害。故豆須

分生熟而治。則有補瀉之爲別耳。

是以書載誤食毒物。須生搗研水

塗之。諸菌毒不得吐者。濃煎汁飲

試內癰及臭毒腹痛。並與生黃豆

嚼。甜而不惡心者是。即上部結有

癰膿及中具毒發癰之真候。惟有

痘後餘毒發癰。並痘後風癰。痘後

生瘡。腫癰。背脊等症。則或煎湯炒

黑爲末。以治。用補則須假以炒熟。

然必少食則宜。若使多服不節。則

必見有生痰壅氣動嗽之弊矣。豆

油辛甘而熱。與豆氣味稍別。能塗

瘡。疥。解髮疽。蒿燒灰。點惡瘡。去惡

肉。【清】王士雄隨息居飲食譜論

黃大豆曰。黃大豆甘平。補中解毒。

宜煮食。炒食則壅氣。浸發芽。摘

根爲蔬。味最鮮美。肺癰。癆氣。生嚼

不腥。疑似之間。試之甚驗。痘後癰

毒。嚼生黃豆塗之。即潰。浸搗搗塗

諸癰瘡亦妙。

【黃大豆油】 基本 本品係

用黃大豆所榨

取之油。

一二三五

十二畫 須

肥 髮 黃

黃

黃

即青木香之古籍別名。典見綱目。詳『青木香』條。

【雲砂】即雲母之古籍別名。典見本經詳『雲母』條。

【雲膽】即雲母之古籍別名。典見和漢藥考。詳『雲母』條。

【雲苔】即茯苓之處方用名。詳『茯苓』條。

【雲苔塊】即茯苓之處方用名。詳『茯苓』條。

【雲英】即雲母之古籍別名。典見本經。詳『雲母』條。①即絡石之古籍別名。典見吳普本草。詳『絡石』條。②即雲實之古籍別名。典見別錄。詳『雲實』條。

【雲香】即楓香脂之古籍別名。典見和漢藥考。詳『楓香脂』條。

【雲核】形體 色黃白如雲母。產地 羅浮山中。

性實 平。

主治 却疾延年。餘同雲母。

【雲珠】即雲母之古籍別名。典見本經。詳『雲母』條。①即絡石之古籍別名。典見和漢藥考。詳『絡石』條。

【雲茯苓】即茯苓之處方用名。詳

『茯苓』條。

【雲茯神】即茯神之處方用名。詳『茯神』條。

【雲茶】即石蕊之古籍別名。典見綱目。詳『石蕊』條。

【雲液】即雲母之古籍別名。典見本經。詳『雲母』條。

【雲華】即雲母之古籍別名。典見本經。詳『雲母』條。

【雲實】古籍別名 員實。雲英。豆。羊石子。臭草。〔圖經〕櫟刺。精刺。〔綱目〕苗名草雲母。〔唐本〕

基本 係屬豇科雲實之種子。產地 別錄曰雲實生河間川谷。凡山野間恒多生焉。



雲實

形體 雲實係落葉灌木。直立或橫伸。長達丈餘。葉為多數小葉所成之羽狀複葉。莖葉俱有刺。夏

月於梢上抽花莖。長達尺餘。開黃色花。類藤花。相綴作總狀花。後結

莢果。類藤豆。大二寸許。中有褐色種子。大如豆。似蓖麻子。

採取 三四月採苗。九十月採實。曝乾。

製法 雷斅曰。凡採得粗搗。相對拌。渾顆。樣實。蒸一日。揀出。曝乾。

性實 辛溫。無毒。

效能 治痢療瘧。殺蟲蠱毒。去邪惡結氣。止痛除寒熱。本經。消渴。〔別錄〕

歷代記述攷證 【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論雲實曰。治瘧多用。〔明〕李時珍本草綱目論雲實曰。主下。腫。脹。血。

配合應用 治瘧下不止。雲實。女萎各一兩。桂半兩。川烏頭二兩。為末。蜜丸。梧子大。每服五丸。水下。日三服。〔肘後方〕

用量 一錢至錢半。

參攷資料 ①員亦音雲。其義未詳。豆以子形名。羊石當作羊矢。其子肖之故也。〔李時珍〕②處處有之子。細如荏靡子而小。黑。其實亦類黃荏。燒之致鬼。未見其法術。〔陶弘景〕③雲實大如黍及麻子。

黃黑似豆。故名天豆。叢生澤旁。高五六尺。葉如細槐。亦如首蓿。枝間微刺。俗謂苗為草雲母。陶云似葶。塵者非也。〔蘇恭〕④葉如槐而狹。長。枝上有刺。苗名臭草。又名羊石子。草實名馬豆。三月四月採苗。十月採實。過時即枯落也。〔蘇頌〕⑤此草山原甚多。俗名枯刺。赤莖。中空。有刺。高者如薔。其葉如槐。三月開黃花。纍然滿枝。莢長三寸許。狀如肥苞。莢內有子五六粒。正如鵲豆。兩頭微尖。有黃黑斑紋。厚殼。白仁。咬之極堅。重有腥氣。〔李時珍〕

【雲實花】主治 見鬼精多食。令人狂走。〔本經〕殺精物。下水。燒之致鬼。〔別錄〕

【雲實根】主治 骨哽及咽喉痛。研汁嚥之。

【雲莖】即茶葉之別名。詳『茶葉』條。

【順流水】即流水之古籍別名。典見綱目。詳『流水』條。

【須丸】即代赭石之古籍別名。典見本經。詳『代赭石』條。

【須薩折羅婆香】即楓香脂之古籍別名。典見金光明經。詳『楓香脂』條。

十日諸病皆愈。顏色日少。長生神仙。(千金方)

⑤治痰飲頭痛。往來寒熱。用雲母粉二兩。鍊過。桓山一兩。爲末。每服方寸匕。湯服。取吐。忌生葱生菜。(深師方)

⑥治牝瘧多寒。雲母燒二日夜。龍骨。蜀漆。燒去腥。等分爲散。未發前。漿水服半錢。(金匱方)

⑦治小兒下痢赤白。及水痢。雲母粉半兩。煮白粥調食之。(食醫心鏡方)

⑧治赤白久痢。積年不愈。飲調雲母粉方寸匕。服二服。立見神效。(千金方)

⑨治婦人帶下。水和雲母粉方寸匕。服。立見神效。(千金方)

⑩治小便淋疾。溫水和雲母粉服三錢。(千金方)

⑪治婦人難產。經日不生。雲母粉半兩。溫酒調服。入口卽產。不順者卽順。萬不失一。陸氏云。此是何德揚方也。已救三五十人。(積德堂方)

⑫治粉滓面皴。雲母粉。杏仁等分。爲末。黃牛乳并略蒸。夜塗且洗。

(聖濟總錄方)

①治風寒濕身。百治不愈。煨雲母粉。清水調服二錢。良。(千金方)

②治一切惡瘡。用雲母粉傳之。(千金方)

③治火瘡敗壞。雲母粉和生羊髓塗之。(聖惠方)

④治金瘡出血。雲母粉傳之。絕妙。(事林廣記方)

⑤治風熱汗出。水和雲母粉服三錢。不過再服。立愈。(千金方)

⑥用薑三錢至四錢。施用宜忌。凡非實症者。禁用。

惡徐長卿。忌羊肉粉。長蛇甲及流水。澤瀉爲之使。

參攷資料 ①古雖有服藥法。今人服者至少。謹之至也。惟合雲母膏。治一切癰毒瘡等。方見和劑局方。(寇宗奭) ②明皇雜錄云。開元中名醫紀昀。觀人顏色談笑。知病淺深。不待診脈。帝召入掖庭。看一宮人。每日晨則笑歌啼號。若狂疾。而足不能履地。朋視之曰。此必因食飽而大促力。頓仆於地。而然。乃飲雲母湯。熱寐而失所苦。問之。乃言太華公主載誕。某當主誦。懼

聲不能清。長。因喫飽。踣蹙。飽而歌。大曲。唱罷。覺胸中甚熱。戲於砌臺。因墜下。久而方甦。遂病。此也。又經。效方云。青城山。大人觀主。康道豐。治百病。雲母粉。方用雲母一斤。折。開。揉入大瓶內。築實。上澆水銀一。兩。封固。以十斤頂火。煨赤。取出。卻。并香葱。紫連翹草。二件。合搗如泥。後以夾絹袋盛於大水盆內。搗取。粉。餘滓。未盡。再添草葉。重搗取。粉。以木盤一面。於灰上印一淺坑。鋪。紙。傾粉在內。候乾。焙之。以麵糊丸。梧子大。遇有病者。服之。無不效。知。成都府辛諫。諫。曾患大風。衆醫不。愈。道豐進此服之神驗。(唐慎微)

③他物埋之卽朽。着火卽焦。而五。雲入猛火中。經時不焦。埋之不腐。故服之者。長生。入水不濡。入火不。燒。踐棘不害。(抱朴子) ④昔人言。雲母壅尸。亡人不朽。蓋發馮貴人。冢。形貌如生。因共姦之。發晉幽公。塚。百戶縱橫及衣服。皆如生人。中。並有雲母壅之故也。(李時珍)

⑤雲母生太山山谷。齊山。廬山。及瑣。琊北定山石間。二月採之。雲華五。色具。雲英。色多青。雲珠。色多赤。雲。液。色多白。雲砂。色青黃。礬石。色正。白。(別錄)

⑥雲母石。卽雲母之處。方用名。詳。『雲母』條。

⑦雲母砂。卽礬砂之古籍別名。典。見本草集註。詳『礬砂』條。

⑧雲母礬。卽明礬之古籍別名。典。見綱目。詳『礬石』條。

⑨雲芝茶。基本。本品名茶。而。實非茶。乃山石所生。石衣。如苔蘚之屬。

產地。山東蒙山。在蒙陰縣城。南三十里。高二里許。周圍約三。百餘里。產茶曰雲芝茶。土人售於。市曰蒙山茶。

性質。寒冷。主治。胃熱消積。

⑩雲花。卽絡石之古籍別名。典。見吳普本草。詳『絡石』條。

⑪雲花草。原名。雲花子。形。雲花草爲雜。草類之一種。狀如麻黃。而中堅。實。可供藥用。

主治。療馬疥。

⑫雲南根。卽馬兜鈴根之古籍。別名。典。見綱目。詳『馬兜鈴』條。

母(白雲母)及鐵雲母(黑雲母)二種。又由形態色彩成分等區分之。其主要者為羽狀雲母柱狀雲母綠雲母鐵雲母等。

製法 雷斅曰。凡使雲母。須用黃黑者厚。而頑赤色者輕。婦人手持者。並不中用。須要光瑩如水色者為上。每一片用小地膽草。紫背天葵。生甘草。地黃汁各一盞。乾者細剉。溼者取汁。放入鐵鍋中安置。取天池水三盞。著水煮七日七夜。水火勿令失度。雲母自然成碧玉漿。在鍋底。却以天池水猛投其中。攪之。浮如蛸涎者即去之。如此三度。淘淨。取沉香一兩。搗作末。以天池水煎沉香湯二升。以末分為三度。再淘雲母漿。盡日曬任用。抱朴子曰。服五雲之法。或以桂蔥水玉化之為水。或以露於鐵器中。以原水熬之為水。或以消石合於箇中。連之為水。或以蜜洩為醕。或以秋露漬之百日。韋囊挺以為粉。或以無顏草榨血合餅之。服至一年。百病俱除。至三年返老成童。五年可以役使鬼神。胡演曰。鍊粉法。八九月間。取雲母以礬石拌勻。入瓦罐

內封口。三伏日則自柔輾。去礬。次日取百草頭上露水漬之。百日用韋囊挺以為粉。李時珍曰。道書言鹽湯煮雲母。亦可為粉。又云。雲母一觔。鹽一斗。漬之。銅器中蒸一日。白中搗成粉。又云。雲母一觔。白鹽一升。同搗細。入布袋。按之。沃令鹽味盡。懸高處風吹。自然成粉。

用法 恒以剉末和作丸散用。
性質 甘平。無毒。
成分 為珪酸、礬土、鉀、鈉、鎂、鈣、銅、(少量)水氣等。

效能 補中理勞傷。補腎治瘡。痢。用作緩和強壯藥。又為瘡瘍癰疽藥。內服治肺結核。動脈硬化症。外用療膿瘍。

作用 入胃後有中和酸液之能。使胃內過多之鹽酸。化為有用之消化酵素。一部分至小腸。始被吸收。而入血液。中此硅質。白血球之繁殖。即行增加。血液之凝固力亦同時加大。能使被結核菌侵腐之周圍包圍。滅殺其蔓延之能力。而於動脈硬化。尤有防止之功效。

主治 身皮死肌。中風寒熱。如

在車船上。除邪氣。安五臟。益子精。明目。(本經)下氣堅肌。續絕補中。療五勞七傷。虛損少氣。止痢。久服悅澤不老。耐寒暑。志高神仙。(別錄)

歷代記述攷證 [唐]甄權藥性本草論雲母曰。主下痢腸辟。補腎冷。[明]繆希雍本草經疏論雲母曰。雲母本經載其味甘氣平。詳其主治。亦應有溫。韓保昇曰。雲母色白而主肺。此石藥中溫良之品也。以其法金。故主身皮死肌。及中風寒熱。如在車船上。甘能緩。溫能和。故除邪氣。石性鎮壓。能使火下。火下則水上。是既濟之象也。故安五臟。益子精。明目。久服輕身延年。別錄主下氣堅肌。續絕補中。療五勞七傷。虛損少氣。久服悅澤不老。耐寒暑。志高神仙。皆此意也。其曰止痢者。久痢則腸胃俱虛。甘溫足以回其虛。下墜足以去其積。故亦主之也。[清]黃宮繡本草求真論雲母曰。雲母生於泰山山谷。氣味甘平。而溫諸書皆言達肌溫肉。安臟定魄。補中絕續。故凡死肌敗肉。惡毒陰症。及車船眩暈。痰飲頭痛。

皆當用此調治。以其溫有陽和之力。重有鎮攝之能。故能使之辟邪而鎮怯也。但書有言。久服身輕。解。不過極為贊揚。且因是物經時不焦。入土不腐。故云服可長生。其說即出本經。豈真事哉。但此性屬助陽。陰虛火炎者勿服。以色白光瑩者良。

配合應用 雲母得鉛丹熬成膏。可貼一切癰疽瘡毒。和以昇丹細末。更著奇效。

服食雲母 上白雲母二十斤。薄壁。以露水八斗。作湯。分半淘洗一次。又作二斗。作湯。納芒硝十斤。木器中漬二十日。取出。絹袋盛。懸屋上。勿見風。日令燥。以鹿皮為囊。揉之。從旦至午。篩淨。復揉得好粉五斗。餘者棄之。以粉一斗。納崖蜜二升。攪糊。入竹筒內。薄削封口。漆固。埋北垣南墻下。入地六尺。覆土。春夏四十日。秋冬三十日。出之。當成水。若洞洞不消。更埋三十日。此水能治萬病。及勞氣風疾。每以溫水一合和服之。日三服。十日小便當變黃。二十日腹中寒澀消。三十日齒更生。四十日不畏風寒。五

各二兩末。以一盆蓋之。羊毛泥固濟作三隅竈。以陳葦燒一日。取其

飛黃用之。大雄黃乃治瘡殺毒要藥也。而人肝經氣分。故肝風肝氣

驚癇痰涎。頭痛眩暈。暑瘧泄痢。積聚諸病。用之有殊功。又能化血爲

水。而方士乃鍊治服餌。神異其說。被其毒者多矣。按洪邁夷堅志云。

虞雅公允文感暑痢。連月不瘥。忽夢至一處。見一人如仙官。延之坐

壁間。有藥方。其辭云。暑毒在脾。滯氣連脚。不泄則痢。不痢則癰。獨鍊

雄黃。蒸餅和藥。別作治療。醫者大錯。公依方用雄黃水飛九度。竹筒

盛。蒸七次。研末。蒸餅和丸。梧子大。每甘草湯下七丸。日三服。果愈。太

平廣記載成都劉無名服雄黃長生之說。方士言爾不可信。(李時珍)

④今人敲取石黃中精明者爲雄黃。外黑者爲熏黃。雄黃燒之不臭。熏黃燒之則臭。以此分別也。

(陳藏器)⑤今階州即古武都山中有之。形塊如丹砂。明徹不夾石。其色如雞冠者。眞有青黑色而堅者。名熏黃。有形色似眞而氣臭者。名臭黃。並不入服食。只可療瘡疥。

其臭以醋洗之便去。足以亂眞。尤宜辨。又階州接西戎界。出一種水窟雄黃。生於山岩中有水流處。其石名青煙石。白鮮石。雄黃出其中。其塊大者如胡桃。小者如粟。豆上有孔。數其色深紅而微紫。體極輕虛。而功用更勝。丹竈家尤貴重之。

(蘇頌)⑥武都水窟雄黃。北人以充丹砂。但研細色帶黃爾。(李時珍)

【雄黃油】即石腦油之古籍別名。典見綱目。詳「石腦油」條。

【雄黃蟲】基本 雄黃蟲爲卵生蟲類之一種。狀如蠅。可供藥用。

主治 明目益氣力。

【雄精】即雄黃之處方用名。詳「雄黃」條。

【雄膽】性質 詳雄黃條。

主治 殺三蟲毒。除痼疾。駐容延年。

參攷資料 王存恩太僕貴陽人云。其土多山。出雄黃。有大至數百觔者。中有浮沙成團如鵝卵。曰雄膽。破之有清水。澀許。急飲之。沉疴俱消。壽二百歲。特以山民頑穢。

遇之不識。即散漫不得飲耳。有一人飲之。至今猶在。健如三十許人。自言百五十餘歲矣。(六研齋筆記)

【雄雞冠血】即雞冠血之處方用名。詳「雞冠血」條。

【雅友】即茉莉花之古籍別名。典見和漢藥考。詳「茉莉花」條。

【雅客】即水仙之古籍別名。典見和漢藥考。詳「水仙」條。

【雅梨】即梨之處方用名。詳「梨」條。

【雅連】即黃連之處方用名。詳「黃連」條。

【雅蒜】即水仙之古籍別名。典見本草會編。詳「水仙」條。

【雲丹】即礞石之古籍別名。典見吳普本草。詳「礞石」條。

【雲母】命名 荊南志云。華容方臺山出雲母。土人候雲以出之處。於下掘取。無不大獲。有長五六尺。可爲屏風者。但掘時忌作聲也。據此則此石乃雲之根。故得雲母之名。

處方用名 雲母石。

古籍別名 雲華。雲珠。雲英。雲。

液。雲砂。本經(礞石。綱目)地。涿貝石。雲騰。千層紙。金星石。(和漢藥考)

外國名詞 Glimmer

基本 屬巖石類。爲雲母之一種。

產地 陳仁山藥物生產辨云。雲母石產自雲南省和漢藥考曰。日本之三河。若狹。甲斐。近江。美濃。磐城諸處產此。

形態 雲母爲斜方柱狀礦石。常有銳角。劈開完全。沿其薄面剝離之。則作有彈力性薄片狀。又有作板狀。鱗皮狀者。色有白。淡黃。綠。褐。黑等。硬度二至三。略有真珠光。

種類 抱朴子云。向日視之色青。白多。黑者名雲母。宜冬服。色黃白多。青者名雲英。宜春服。色青白多。赤者名雲珠。宜夏服。色如冰。露。

午黃。午白者名雲砂。宜季夏服。色黃白。晶品者名雲液。宜秋服。較然純白。明澈者名礞石。四時可服。其黯黯純黑。有文斑鐵色者名雲膽。其色雜黑而強。硬者名地涿。以上二種不可服食。又和漢藥考曰。雲母種類頗多。大別之爲加里雲。

下只三服止。(普濟方)

治中成舌強。正舌散。用雄黃荊芥穗等分爲末。豆淋酒服二錢。

●治破傷中風雄黃白芷等分爲末酒煎灌之卽甦（邵真人經驗方）

⑤治瘋狗咬傷雄黃五錢麝香二錢爲末酒下作二服（救急良方）

治百蟲入耳雄黃燒燃熏之
自出(十便良方)

●治馬汗入瘡。雄黃白礬各一錢。烏梅三個。巴豆一個。合研。以油調。牛錢傳之良。(經驗方)

⑤治蜘蛛傷人用雄黃末傅之。
(朝野僉載方)

③治金瘡內漏雄黃半豆大納之。仍以小便服五錢。血皆化爲水。
(肘後方)

③治杖瘡腫痛雄黃二分蜜陀
僧一分研末水調傅之極妙（救
急方）

③治中藥箭毒雄黃末傅之沸汗出愈（外臺祕要方）

⑤ 解藜蘆毒。水服雄黃末一錢。

（外臺祕要方）

●治小兒痘疔雄黃一錢紫草三錢爲末胭脂汁調先以銀簪挑破搽之極妙。(痘疹證治方)

●治白禿頭瘡雄黃豬膽汁和傳之（聖濟總錄方）

●治眉毛脫落雄黃末一兩醋和塗之（聖濟總錄方）

●治筋肉化蟲有蟲如蟹走於皮下作聲如小兒啼爲筋肉之化。

雄黃雷丸各一兩爲末摻豬肉上炙熱喫盡自安（夏氏奇疾方）

●治風痒如蟲成煉雄黃松脂
等分研末蜜丸梧桐子大每飲下

十丸日三服百日愈忌酒肉鹽豉
(千金方)

⑤ 治疔瘡惡毒刺四邊及中心以雄黃末傅之。神效。（千金方）又

⑤治蛇經惡瘡。雄黃末醋調傅之。(普濟方)

④治經喉風痺雄黃磨新汲水一盞服取吐下愈(千金方)

治風熱痛用雄黃乾薑各等分爲末。噤鼻左痛。噤右。右痛。噤左。

⑤治牙齒蟲痛雄黃末和棗肉丸塞孔中（傷寒類要方）。

⑤治走馬牙疳臭爛出血雄黃豆大七粒。每粒以淮棗去核包之。

鐵線串於燈上燒化爲末。每以少許摻之去涎。以愈爲度。(全幼心

治小兒牙疳。雄黃一錢。銅綠

二錢爲末貼之（陳氏小兒方）

研末獵豬膽和用槐枝點之（金匱方）

⑤治耳出臭膿雄黃雌黃硫黃等分爲末吹之（聖濟總錄方）

用量 八分至錢半。

施用宜忌 凡陰虧血虛者禁

參攷資料 ●帶雄黃入山林。

卽不畏蛇。若蛇中人。以少許傳之。
登時愈。吳楚之地。暑溼鬱蒸。多毒
蟲。及射工沙虱之類。但以雄黃大
蒜等分合搗一丸佩之。或已中者。

塗之亦良（抱朴子）○雄黃治瘡瘍尙矣。周禮瘍醫療瘍以五毒攻之。鄭康成注云。今醫方有五毒之藥。作之合黃堊。置石膽、丹砂、雄黃、

風寒積聚也是以聖惠方之治狐惑。肘後方之治陰腫如斗。家祕方之消癰母。急救方之治風狗咬傷。聖濟之治白禿頭瘡。何一不用雄黃。以爲調治。至云能解蛇虺毒。蘆等毒。以其蛇屬陰物。藜蘆陰草也。瘰癧肉瘻氣能治者。以其一屬氣結一屬積滯也。目痛能愈者。以其肝得辛散之意也。明徹不臭者。良醋浸。入萊菔汁。麝乾用。生山陰者名雄黃。功用略同。劣者名蠟黃。燒之則臭。止可薰瘡疥。殺蟲虱。

配合應用 治卒中邪。雄黃末吹鼻中。(集驗方)

治鬼繫成病。腹中煩滿欲絕。雄黃粉酒服。一刀圭。日三服。化血爲水也。(千金方)

治辟穢。雄黃可用。雄黃帶頭上。或以蠟許繫左腋下。終身不礙。(張文仲方)

治家有邪氣。用真雄黃三錢。水一碗。以東南桃枝呪酒滿屋。則絕迹。(集簡方)

治女人病邪。女人與邪物交通。獨言獨笑。悲思恍惚者。雄黃一兩。松脂二兩。溶化。以虎爪攪之。丸

如彈子。夜燒於籠中。令女坐其上。以被蒙之。露頭在外。不過三劑。自斷。仍以雄黃。人參。防風。五味子等分爲末。每日井水服方寸匕。取愈。(肘後方)

小丹服法。雄黃。柏子仁。各二斤。松脂煉過十斤。合搗爲丸。每旦北向服五丸。百日後拘魂制魄。與神人交見。(太上變玄經方)

轉女爲男。婦人覺有妊。以雄黃一兩。絳蠶盛之。養胎。轉女成男。取陽精之全於地產也。(千金方)

治小兒諸癰。雄黃。硃砂等分爲末。每服一錢。豬心血入鹽水調下。(直指方)

治骨蒸發熱。雄黃末一兩。入小便一升。研如粉。乃取黃理石一枚。方圓一尺者。炭火燒之。三食頃。濃淋汁於石上。置薄氈於上。患人脫衣坐之。衣被圍住。勿令洩氣。三五度瘥。(外臺祕要方)

治傷寒咳嗽。服藥無效。雄黃二錢。酒一盞。煎七分。乘熱嗅其氣。即止。(活人方)

治傷寒狐惑。蟲蝕下部。痛痒不止。雄黃半兩。燒於瓶中。薰其下

部。(聖惠方)

治偏頭風病。至癰散。用雄黃細辛等分爲末。每以一字吹鼻。左痛吹右。右痛吹左。(博濟方)

治五戶注病。發則痛變無常。昏光沉重。經絡臃腫。上衝心脇。即身中尸鬼接引爲害也。雄黃大蒜各一兩。杵丸。彈子大。每熱酒服一丸。(肘後方)

治腹脇痞塊。雄黃一兩。白礬一兩。爲末。麵糊調膏攤貼。即見功效。未效再貼。(集玄方)

治脇下痼疾。及傷飲食。黃黃丸。用雄黃一兩。巴豆五錢。同研。入白麵二兩。滴水爲丸。梧子大。每服二十四丸。漿水煮三十沸。入冷漿水沉冷吞下。以利爲度。如神。(保命集方)

治飲酒成癖。酒癡丸。治飲酒過度。頭旋。惡心。嘔吐。及酒停積於胃間。遇飲即吐。久而成癖。雄黃皂角子大六個。巴豆連皮油十五個。蠟梢十五個。同研。入白麵五兩。牛滴水丸。豌豆大。將乾入鉄內炒香。將一粒放水試之。浮則取起。收之。每服二丸。溫酒下。(和濟局方)

治髮癰飲油。有飲油五升以來。方快者。不爾則病。此是髮入於胃。氣血裏之化爲蟲也。雄黃半兩。爲末。水調服之。蟲自出。(夏子益奇疾方)

治瘰癧積聚。去三尸。益氣延年。卻老雄黃二兩。爲末。水飛九度。入新竹筒內。以蒸餅一塊。塞口。蒸七度。用好粉脂一兩。和丸。綠豆大。每服七丸。酒下。日三服。(千金方)

治小腹痛滿。不得小便。雄黃末。蠶丸。寒陰孔中。(傷寒類要方)

治陰腫如斗。痛不可忍。雄黃。礬石各二兩。甘草一尺。水五升。煮二升。浸之。(肘後方)

治中飲食毒。雄黃。青黛等分。爲末。每服二錢。新汲水下。(鄧筆峯方)

治蟲毒蟲毒。雄黃。生礬等分。端午日研化蠟丸。梧子大。每服七丸。(蘇東坡方)

治結陰便血。雄黃不拘多少。入棗內。線繫定。煎湯用銚一兩。化汁。傾入湯內。同煮。自早至晚。不住添沸湯。取出爲末。共棗汁和丸。梧子大。每服三十丸。煎黑飴湯空心

頂上。以膏藥蓋之。拔去蠶肉。放出黃水即愈。

【雄黃】 命名 本品生山之陽。是丹之雄故名。

處方用名 雄精。

古籍別名 黃金石（本經）石黃。唐本。蜜黃（綱目）白陵。丹山。

地精。夜金。男精。男生。黃奴。朱雀金。天陽石。帝男。血帝。男精。迄利。加柔。黃雄。丹山。月魂。太句。首中。石雞冠石。和漢藥考。

外國名 Beelgar, Orpiment. (英)

基本 屬神礦斜方系。為紅黃色之不透明固體。

產地 陳仁山藥物生產辨云。雄黃產湖南津市。以蘇片紅熟為好。和漢藥考曰。日本之石狩。陸奥。陸前。岩代。下野等地產此。

形態 雄黃係產於黏土或噴火口附近之美黃色或橙黃色小板狀結晶礦石。時或作粒狀。又有葡萄狀鐘乳狀等者。其面有線痕。有真珠光。半透明。硬度一。五。溶於硝酸。苛性亞爾加里。安母尼亞等。

製法 雷敦曰。凡使雄黃。須以三兩為率。用甘草。紫背天葵。地膽。碧稜花。各五兩。細切。取東流水。入坩鍋中。煮三伏時。漉出。搗如粉。水飛。澄去黑者。曬乾。再研。其內有劫鐵石。又號。赴矢黃。能劫於鐵。并不入藥用。孫思邈曰。凡服用用武都雄黃。須以油煎九日。九夜。乃可入藥。不然有毒。李時珍曰。又有用醋入蘿蔔汁。煮乾。用妙抱朴子。日或以豬脂裹蒸之。於赤土下。或以松脂和之。或以三物煉之。或布帛如衣服之。令人長生。除百病。殺三蟲。伏火者。可點銅成金。變銀成金。

用法 恒以剉末。和作丸散用。

性質 苦平寒有毒。

成分 為三硫化砷 (As₂S₃)。

效能 燥溼殺蟲。療疥癬。規痰解毒。治瘡癰。用作腐蝕藥。脫毛藥。又治風癱。痔疾。惡瘡。及毒蛇毒蟲。整傷之解毒藥。

作用 與砒石同。但內服較砒石之刺激性為少。外用之效。則較勝於砒石。

主治 寒熱。鼠瘻。惡瘡。疽痔。死肌。殺精物。惡鬼。邪氣。百蟲。毒。勝五。

兵。鍊食之。輕身神仙。（本經）療疥蟲。蠶瘡。目痛。鼻中息肉。及絕筋破骨。百節中大風。積聚。癰氣。中惡。腹痛。鬼注。殺諸蛇。虺。毒。解黎蘆毒。悅澤人面。餌服之者。皆飛入腦中。勝鬼神。延年益壽。保中不饑。得銅可作金。（別錄）


歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草論雄黃曰。主疥癬。風邪。癰瘤。風瘡。一切蟲獸傷。【元】王好古湯液本草論雄黃曰。搜肝氣。瀉肝風。消涎積。【明】李時珍本草綱目論雄黃曰。治瘡疾。寒熱。伏暑泄痢。酒飲成癖。驚癇。頭風眩暈。化腹中瘀血。殺勞蟲。疥蟲。【明】經希雅本草經疏論雄黃曰。雄黃味苦平氣。寒有毒。別錄加甘大溫。甄權言辛大毒。察其功用。應是辛苦溫之藥。而甘寒則非也。氣味俱厚。升也。陽也。入足陽明經。其主殺精物。惡鬼邪氣。及中惡腹痛。鬼注者。蓋以陽明虛則邪惡易侵。陰氣勝則精鬼易惡。得陽氣之正者。能破幽暗。所以殺一切鬼邪。勝五兵也。寒熱。鼠瘻。惡瘡。疽痔。死肌。疥蟲。蠶瘡。諸證。皆溼熱留滯肌肉所致。久則浸淫而生蟲。此藥苦辛。能燥溼殺蟲。故為瘡家要藥。其主鼻中息肉者。肺氣結也。癰氣者。大腸積滯也。筋骨斷絕者。氣血不續也。辛能散結。溫能通行。氣血辛溫相合。而殺蟲。故能搜剔百節中大風。積聚也。虺蛇陰物。藜蘆陰草。雄黃稟純陽之氣。所以善殺百蟲。蛇虺毒。及解藜蘆毒也。別錄復有目痛及悅澤人面之語。悉非正治。鍊餌之法。出自仙經。以銅為金。亦黃白術中事耳。【明】李士材本草圖解論雄黃曰。雄黃辛溫有毒。肝家藥也。搜肝氣。瀉肝風。消涎積。解百毒。辟百邪。殺百蟲。截邪病。理蛇傷。然能化血為水。血虛大忌用之。當歸白芷。藤黃。地黃。紫河車。均能制其毒。【清】黃宮繡本草求真論雄黃曰。雄黃生山之陽。得氣之正。味辛而苦。氣溫有毒。凡人陽氣虛則邪易侵。陰氣勝則鬼易憑。貢二氣之精者。能破羣妖。受陽氣之正者。能辟幽暗。故能治寒熱。鼠瘻。惡瘡。疽痔。死肌。疥蟲。蠶瘡。諸症。皆由溼熱侵於肌肉而成。服此辛以散結。溫以行氣。辛溫相合。而蟲殺。故能搜剔百節中。

典見綱目。詳『麥門冬』條。

【雁】古籍別名 鴻（綱目）僧婆（梵書）江鵝（俗名）

產地 出江湖池澤間。

形態 雁爲水禽類之一種。其狀如鵝體長二尺許。嘴長微黃背部褐色。翼帶青灰色。胸腹有黑斑。爪、脚橙黃色。首長而尾羽短。鳴聲嘹亮。飛時自成行列。爲春去秋來之候鳥。其肉可供食與藥用。



雁

性質 甘。平。無毒。

主治 祛風。療麻痺。壯筋骨。

歷代記述攷證 【宋】寇宗奭

本草衍義論雁肉曰。食之治諸風。

【明】李時珍本草綱目論雁肉曰。

利臟腑。解丹石毒。

參攷資料 雁肉七月勿食。食

之傷人神。禮云。食雁去腎。不利人。

（孫思邈）

【雁毛】 空治 喉下白毛。療小兒疳有效。

歷代記述攷證 【宋】日華諸

家本草論雁毛曰。自落翎毛。小兒佩之辟驚癇。

參攷資料 按西陽雜俎云。臨

邑人春夏羅取鴻雁毛以禦暑。又淮南萬術術云。鴻毛作囊。可以渡江。此亦中流一壺之意。水行者不可不知。李時珍。

【雁來紅】 古籍別名 老少年

形態 老少年苗初出似莧。莖

葉穗子與雞冠無異。至深秋本高六七尺。則腳葉深紫而頂葉大。鮮紅可愛。愈久愈妍。此花秋色之最佳者。



紅 來 雁

主治 鼻淵。

參攷資料 雁來紅一名老

少年。無有用入藥者。惟急救方有治腦漏法。用老少年煎湯。熱薰鼻

內。然後將湯服二三口。大妙。冬間用根。○瀕湖綱目青箱下附雁來紅。無主治。土宿真君本草雁來紅制法。○眼科要覽。老少年。銀杏部

殼爲君。宜渣根。大業者佳。千里光雄楊梅樹根皮爲臣。煎成濃膏。量

加製甘石。冰片。又方加茶樹根皮爲

爲膏子。眼藥去遠年障翳。○有一種少年老。頂黃紅而腳葉綠。爲別一種。枝頭亂葉叢生。有紅紫黃綠

相兼雜出者。名十樣錦。一種根下葉綠。頂上葉純黃者。名雁來黃。

【雁肪】 古籍別名 鵞肪。○網

性質 甘。平。無毒。

主治 風擊拘急。偏枯。血氣不通。利久服。益氣不飢。輕身耐老。○本經。長毛髮鬚眉。○別錄。

歷代記述攷證 【魏】吳普本

草論雁肪曰。殺諸石藥毒。【宋】日

華諸家本草論雁肪曰。治耳聾。和

豆黃作丸。補勞瘦。肥白人。【明】李

時珍本草綱目論雁肪曰。塗癰腫

耳疳。又治結熱。胸痞。嘔吐。

【雁屎白】 主治 灸瘡腫痛。塗

之。

【雁音草】 即發草之日本別名。詳『發草』條。

【雁骨】 主治 煨灰。和米泔沐

頭長髮。【雁喙】 即灰實之古籍別名。典見

古今注。詳『灰實』條。

【雁喙實】 即灰實之古籍別名。典見和漢藥考。詳『灰實』條。

【雁鳴】 即灰實之古籍別名。典見和漢藥考。詳『灰實』條。

【雁實】 即灰實之古籍別名。典見和漢藥考。詳『灰實』條。

【雁膳】 即灰實之古籍別名。典見和漢藥考。詳『灰實』條。

【雁頭】 即灰實之古籍別名。典見和漢藥考。詳『灰實』條。

【狐尿】 即狐尿之原名。詳『狐尿』條。

【雄雀屎】 即白丁香之原名。詳『白丁香』條。

【雄魚白】 即烏魚蛋之古籍別名。典見藥性考。詳『烏魚蛋』條。

【雄豬眼梢肉】 主治 能拔

癰口。癰用雄豬眼梢肉三錢。剉爛

如泥。加滑石末四錢。和勻敷患處。

汲水調塗。(僊門事親方)

●治元氣虛寒。精滑不禁。大腑

瀉瀉。手足厥冷。陽起石煨研。鍾乳

粉各等分。酒煮附子末。同麵糊丸。

梧子大。每空心米飲下五十丸。以

愈爲度。(濟生方)

●治陰痿陰汗。陽起石煨爲末。

每服二錢。鹽酒下。(普濟方)

用量 一錢至錢半

施用宜忌 陰虛火旺者。以及

陽痿屬於失志者。崩漏由於火盛

而非虛寒者。禁用。惡澤瀉。茵桂。雷

丸。石葵。蛇蛻。畏菟絲子。忌羊血。桑

螵蛸爲之使。

參攷資料 ●陽起石如狼牙

者。其外色不白如薑石。其大塊

者亦內白。治男子婦人下部虛冷。

腎氣乏絕。子臟久寒者。須水飛研

用。凡石藥冷熱皆有毒。正宜斟酌

(慈寧齋) ●陽起石右腎命門氣

分藥也。下焦虛寒者宜用之。然亦

非久服之物。張子和僊門事親云。

喉痺相火急速之病也。相火龍火

也。宜以火逐之。一男子病纏喉風

腫。表裏皆藥不能下。以涼藥灌入

鼻中。下十餘行。外以陽起石燒赤。

伏龍肝等分。研極細末。日以新汲

水調掃百遍。三日熱始退。腫始消

此亦從合之道也。(李時珍) ●陽

起石所出與雲母同。而甚似雲母。

但厚異耳。今用乃出益州。與礬石

同處。色小黃黑。但礬石雲母根未

知孰是。俗用乃稀。仙經服之。(陶

弘景) ●陽起石以白色肌理似

殷孽。乃夾帶雲母滋潤者爲良。故

本經一名白石。今用純黑如炭者

誤矣。雲母之黑者名雲騰。服之損

人。則黑陽起石亦必惡矣。今齊山

在齊州西北。無陽起石。石乃在齊

山西北六七里。廬山出之本經雲

山或廬山說也。太山沂州惟有黑

者。其白者獨出於齊州。(蘇恭) ●

陽起石今惟出齊州。他處不復有。

齊州惟一土山。石出其中。彼人謂

之陽起山。其山常有溫暖氣。雖盛

冬大雪徧境。獨此山無積白。蓋石

氣熏蒸使然也。山惟一穴。官中常

禁閉。至初冬則州發丁夫。遣人監

取。歲月積久。其穴益深。鑿擊他石

得之甚難。以白色明瑩若狼牙者

爲上。亦有挾他石作塊者。不堪每

歲採擇。上供剩餘州中貨之不爾。

無由得也。貨者雖多。而精好者亦

難得。舊說是雲母根。其中猶帶雲

母。今不復見此矣。古方服食不見

用者。今補下藥多用之。(蘇頌)

【陽荷】即蘆荷之古籍別名。典見

黔志。詳「蘆荷」條。

【陽雀】即杜鵑之古籍別名。典見

綱目。詳「杜鵑」條。

【陽精】即大生地之古籍別名。典

見和漢藥考。詳「大生地」條。

【陽鴉】即陽烏之古籍別名。典見

本草拾遺。詳「陽烏」條。

【陽棧】即鹿梨之古籍別名。典見

爾雅。詳「鹿梨」條。

【陽鱉】即白魚之別名。詳「白魚」

條。

【陽燧鏡】製法 趙氏集要古

有烙法。今罕用之。不

但粗工不知用法。抑且患者見之

駭然。故以此代之。法用乾蟬酥剉

薄片。焙研。硃砂水飛。川烏草烏各

五分。礬蠶一條。各研細。將硫黃一

兩五錢置杓內。微火鎔化。入藥末

攪勻。急攪爲要。遲則凝矣。傾入磁

盆內。速撤成片。待冷收用。

主治 治溼痰流注。附骨陰疽。

寒溼瘡毒。經久不消。內潰不痛者。

能使未成即消。已成即潰。已潰即

斂。如若風痺。用竹筴點之。有酸痛

處。筆蘸墨記之。照墨上灸。若腿膝

疼痛。灸鬼眼穴。諸瘡初起。灸三五

壯即瘥。

【陽薑】即蘆荷之別名。典見植物

圖考。詳「蘆荷」條。

【限支】產地 出江蘇邳縣。及

四川平縣。

形態 限支爲灌木類之一種。

樹高丈餘。枝修而弱。開白花。結實

大如雀卵。狀似荔枝。其肉黃色。可

供藥用。

性質 甘。無毒。

主治 七種疝氣。一切瘡瘍疥

癬。

【隊隊】產地 出雲南緬甸諸

地。

形態 隊隊爲溼生蟲類之一

種。狀如壁蟲。生有定偶。出必雌雄

相隨。可供藥用。

主治 夫婦不和。入媚藥用。

【階砂】即硃砂之古籍別名。典見

和漢藥考。詳「硃砂」條。

【階前草】即麥門冬之古籍別名。

Itte (拉一) Tremolite (英)

基本 屬礦石類。爲似針狀之石塊。

產地 陳仁山藥物生產辨云。產山東山西。

形態 陽起石爲束針狀之塊。色白或灰。或淡綠。發石膏之光澤。質柔軟。易破碎。作細絲狀。胎生於寒水石及苦灰石中間有透明者。入藥以白色者爲上。

製法 大明曰。凡使陽起石入藥。燒後水煨用之。凝白者佳。李時珍曰。凡用火中煨赤。酒淬七次。研細水飛過日乾。亦有用燒酒浸過。同樟腦入罐升煉取粉用者。

用法 與他藥末糊丸。不入湯劑。

性質 鹹。微溫。無毒。

成分 昔人以陽起石爲雲母之根。主要之成分。爲無水硅酸及苦土。此外尙含有加爾吏膜及鐵等。

效能 強陽事。療陰痿。消癥瘕。治崩漏。用作陰瘰癧藥。

主治 崩中漏下。破子臍中血。癥瘕結氣。寒熱腹痛。無子。陰痿不

起。補不足。(本經)療男子莖頭寒。陰下溼痒。去臭汗。消水腫。久服不饑。令人有子。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥

性本草論陽起石曰。補腎氣。精乏

腰痛。膝寒。溼痺。子宮久冷。冷瘕。寒

瘕。止月水不定。【宋】大明日華諸

家本草論陽起石曰。治帶下。溫疫

冷氣。補五勞七傷。【元】王好古湯

液本草論陽起石曰。補命門不足

【明】李時珍本草綱目論陽起石

曰。散諸熱腫。【明】經希雍本草經

疏論陽起石曰。陽起石稟純陽之

氣。以生本經味鹹氣微溫無毒。觀

圖經所載齊州陽起山。其山常有

煖氣。雖盛冬大雪徧境。獨此山無

少積。蓋石氣薰蒸也。其爲氣之溫

煖。當不甚微矣。味鹹而氣溫。入右

腎命門。補助陽氣。并除積寒宿血

留滯下焦之聖藥。故能主崩中漏

下。及破子臍中血。癥瘕結氣。寒熱

腹痛。及男子莖頭寒。陰痿不起。陰

下溼痒。令人有子也。真陽足。則五

臟之氣充溢。邪淫之氣外散。故久

服不飢。并去臭汗也。別錄又主消

水腫者。蓋指真火歸元。則能煖下

焦。薰蒸糟粕。化精微。助脾土。以制

水也。【明】李士材本草圖解論陽

起石曰。陽起石鹹溫。主下部虛寒。

助陽種子。火煖水飛。陰虛火旺者

忌之。陽痿屬於失志。以致火氣閉

塞。不得發越。而然。及崩中漏下。由

於火盛而非虛寒者。並不宜服也。

【清】黃宮繡本草求真論陽起石

曰。陽起石即雲母根也。雖大雪遍

境。此山獨無。稟純陽之氣。以生。味

鹹氣溫無毒。能補命門相火。凡因

火衰寒氣內停。宿血留滯。而見陰

痿。精滑。子宮虛冷。腰膝冷痺。水腫

癥瘕。服此即能有効。以其性稟純

陽故耳。是以育龜丸用此。以爲嗣

續宗統之基。不可以厚薄論也。功

雖難於疏黃。但疏黃大熱。號爲火

精。此則其力稍遜。而於陽之不能

起者。克起。陽起之號。於是而名。出

齊州。雲頭兩脚。鸞鷀毛。色白滋潤

者。良火煨醋淬七次。研粉。水飛用。

【清】張隱庵本草崇原論陽起石

曰。主治崩中漏下者。崩漏爲陰。今

隨陽氣而上升也。破子臍中血。及

癥瘕結氣者。陽長陰消。陽氣透發

則癥結破散矣。婦人月事不以時

下。則寒熱腹痛而無子。陽起石真

下。啓元。陰中有陽。陰陽和而寒熱

除。月事調而生息繁矣。男子精虛

則陰痿不起。陽起石助陰中之陽

故治陰痿不起。而補腎精之不足

【清】黃元御玉楸藥解論陽起石

曰。陽起石溫暖肝腎。強健宗筋。治

寒疝。冷瘕。崩漏。帶下。陰下溼癢。腰

膝酸疼。腹痛。無子。經期不定。

國外學說 英美學說謂陽起

石內含銨鉍鐵鋁玻璃酸等質。別無

功用。不可作藥品云。

辨偽 李時珍曰。陽起石真者

頗少。以雲頭兩脚。輕鬆如狼牙者

爲佳。其鋪茸莖角者不佳。王逮平

典術乃云。黃白而赤重厚者佳。雲

母之根也。庚辛玉冊云。陽起陽石

也。齊州揀金山出者勝。其尖似箭

簇者。力強如狗牙者。力微。置大雪

中。倏然沒者爲真。

配合應用 陽起石同破故

紙。鹿茸。臘腸。臍。菟絲子。狗陰。垂。肉

菴容。巴戟天。治命門虛寒。陰痿不

起。精寒無嗣。服之能令陽道豐隆。

使人有子。總治男子九醜之疾。

治丹毒腫痒。陽起石煨研。新

羊酥。①以羊牛乳製成者名羊牛酥。②以牛乳製成者名牛酥。

採取 用牛羊之乳汁入鍋煮二三沸。傾入盆內。冷定。待其上面結皮。取皮再煎油。出去渣。入鍋。即成酥油。或以桶盛乳。以木棍搗半日。俟焦沫出。撇取煎去焦皮。亦成酥油。

製法 凡入藥以微火溶化。濾淨用之良。

主治 療眼目。隨左右納鼻中。垂頭少頃。令流入。則目中物與淚俱出。塗蜂蟄蟲咬。

參攷資料 ①酥乃酪作。其性與酪異。然牛酥功勝羊酥。犛牛酥復勝家牛酥。②蘇恭。③酥以犛牛犛牛乳者爲上。白羊者次之。④孫思邈。⑤牛乳冷。羊牛溫。牛酥不離寒。病之兼熱者宜之。羊酥不離溫。病之兼寒者宜之。蓋各有所長。惟犛酥功雖勝於羊而難得。⑥汪機。⑦酥乃酪之浮而所成。今人多以白羊脂雜之。不可不辨。⑧李時珍。

【酥油】即酥之別名。典見綱目。詳『酥』條。

【酥蜜粥】 基本 本品即以酥蜜和米煮成之粥。

主治 養心肺。

【鈹粉】即白粉之古籍別名。典見綱目。詳『白粉』條。

【鈹華】①即白粉之古籍別名。典見綱目。詳『白粉』條。②即黃丹之古籍別名。典見綱目。詳『黃丹』條。

【鈹】即金之古籍別名。典見爾雅。詳『金』條。

【鈹】即錫之古籍別名。典見綱目。詳『錫』條。

【開口川椒】即川椒之處方用名。詳『川椒』條。

【開口吳荑】即吳荑之處方用名。詳『吳荑菜』條。

【開口花椒】即花椒之處方用名。詳『花椒』條。

【開金鎖】 產地 出江浙兩省。形態 爲山草類之一種。高三四尺。葉如草薺。根如首烏而無稜。肉白色而無紋。略似菝葜。無刺。可供藥用。

性質 苦。平。無毒。

主治 祛風溼。療手足不遂。筋骨疼痛。同蒼朮當歸用。

【開屏鳳尾】即翠雲草之古籍別名。典見綱目。拾遺。詳『翠羽草』條。

【開鬱半夏麴】 原名 開鬱麴。製法 用半夏末。合香附。蒼朮。撫芎各等分。熬煎成膏。草薑七日。待生黃衣。懸掛風乾。入藥用。

採取 以陳久者良。

主治 療鬱痰。

【開鬱麴】即開鬱半夏麴之原名。詳『開鬱半夏麴』條。

【閏月樓皮】 命名 本品即生之皮。故名。採取 以陳久者入藥良。主治 血症。煨研服。

【陽古米】即粳粟子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『粳粟子』條。

【陽明子】即水銀之古籍別名。典見石藥爾雅。詳『水銀』條。

【陽侯】即石硫黃之古籍別名。典見外家。詳『石硫黃』條。

【陽春雪】即苜蓿之古籍別名。典見和漢藥考。詳『苜蓿』條。

【陽桃】①即五欽子之古籍別名。典見綱目。詳『五欽子』條。②即獼猴桃之古籍別名。典見日用本草。詳『獼猴桃』條。

【陽鳥】 古籍別名 陽鷗。拾遺。產地 出建州諸地。形態 陽鳥爲水禽類之一種。形似鷗而小。身黑。頸長。面白。其嘴可供藥用。

主治 療蟲咬成瘡。燒灰酒服。

【陽起石】 命名 本品能起陽之不能起者故名。古籍別名 羊起石。別錄。白石。本經。石生五精金。五精陰華。五色美藥。和漢藥考。

外國名詞 Asbestos tremo-

形體 都柄爲喬木類之一種。

樹高丈餘。二月開花。赤色。結實似木瓜。大如鵝卵。狀若青梅。秋月成熟。鹽漬蜜餞。可供食與藥用。



子 桤 都

性質 酸。澀。平。無毒。
主治 久食益氣止洩。

歷代記述攷證 【唐】李珣海

藥本草論都柄子曰。安神溫腸。治痔。久服無損。【明】李時珍本草綱目論都柄子曰。解酒止煩渴。

【都梁香葉】即澤蘭葉之古籍別名。典見本草集註。詳「澤蘭葉」條。

【都淋藤】即馬兜鈴之古籍別名。典見肘後方。詳「馬兜鈴」條。

【都管草】 古籍別名 香毯。(圖經)

學名 Angelica kiusiana,

Max.

基本 係繖形科。爲都管草之根。

產地 多在山谷田野間。

形體 都管草爲山草類之多

年生草本。高尺許。其葉一似土當歸。其根似羌活。亦有莖作蔓生者。採得可供藥用。

性質 苦。辛。無毒。

主治 風腫癰毒赤疔。以醋磨塗之。亦治咽喉腫痛。切片含之立愈。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論都管草曰。解蜈蚣蛇毒。

近人學說 袁淑範曰。都管草

依魏美氏謂其有效成分。恐係一種油類(Angelicaol)或係一種苦味質(Angelikahter)

參攷資料 ①都管草生宜州

田野。根似羌活。頭。歲長一節。苗高一尺許。葉似土當歸。有重疊。二月八月採根。陰乾。施州生者作蔓。又名香毯。蔓長丈餘。赤色。秋結紅實。四時皆有。採其根枝。淋洗風毒痛腫。(蘇頌)按范成大桂海志云。廣西出之。一莖六葉。李時珍

【都管草】即天麻之古籍別名。典見和漢藥考。詳「天麻」條。

【酢】即醋之古籍別名。典見綱目。詳「醋」條。

【酢桶】即鹽麩子之古籍別名。典見本草拾遺。詳「鹽麩子」條。

【酢漿】即地榆之古籍別名。典見綱目。詳「地榆」條。

【酢漿草】 命名 本品莖葉皆

有酸味。故名。

古籍別名 酸漿。赤孫施。(圖

經)醋母。小酸茅。鳩酸(蘇恭)酸箕。李當之。三葉酸。三角酸。酸母。雀兒酸。雀林草(綱目)

外國名詞 Oxalis corniculata, L. (拉丁) カタバミ ス

イモノクサ(日本) 基本 係酢漿草科酢漿草屬。爲酢漿草之莖葉。

產地 生原野道旁及田澤之

陰溼諸地。

形體 酢漿草爲石草類之多

年生草本。莖傾臥地上。嫩者匍匐。長三四寸。葉爲掌狀複葉。小葉三片。倒心臟形。葉柄頗長。互生。夜則小葉閉合下垂。翌朝復展。秋抽花軸。着一花或數花。花小。五瓣。黃色。結實爲蒴果。熟則裂。能散其種子。

其莖葉可供藥用。



草 漿 酢

採取 四月五月採陰乾。

性質 酸。寒。無毒。

主治 殺諸小蟲。惡瘡癰瘍。搗傅之。食之解熱渴。

歷代記述攷證 【宋】蘇頌圖

經本草論酢漿草曰。赤孫施治婦人血結。用一搗洗。燉酒服之。【明】李時珍本草綱目論酢漿草曰。主小便諸淋。赤白帶下。同地錢地龍。治沙石淋。煎湯洗痔。痛脫肛甚效。搗塗湯火蛇蟻傷。

參攷資料 ①酢漿草嫩時用

指石器。令白如銀。(蘇頌)②酢漿

草能制砂求。酒礬砒石。李時珍

【酢】 命名 本品尋常多用牛

羊乳合熬煉取之油。故名。

古籍別名 酥油。馬思哥油。(綱目)

種類 ①以水牛乳製成者名

水牛酥。②以白羊乳製成者名白

直。無枝。可供藥用。

性質 鹹溫無毒。

主治 水腫浮氣結聚。宿滯不消。腹中虛鳴並養服之。

【越瓜】 故名 本品出於越地。

古籍別名 稍瓜(食物)菜瓜(綱目)長者名羊角瓜。醬瓜(俗名)白瓜。淺瓜(日本)

外國名詞 Cucumis Conon, Thunb. (拉丁)シロウリ

アサウリ(日本)

基本 係蒟蒻科胡瓜屬。為越瓜之果實。

產地 原產越中。今南北皆有之。

形態 越瓜為菜類之一年生蔓草本。就地蔓生。全體與甜瓜相似。花期花色亦相同。夏秋間結瓜實。橢圓形。長自七八寸至尺許。外皮淡綠色。越產者則白色。子如胡瓜子。大如麥粒。其果實可供食用。

性質 甘寒。無毒。

主治 利腸胃。止煩渴。

歷代記述攷證 【明】常效先

心鏡篇論越瓜曰。和飯作酢。久食益腸胃。

參攷資料 越瓜生食多冷中動氣。令人心痛。臍下凝結。發諸瘡。又令人虛弱。不能行。不益小兒。天行病後不可食。又不得與牛乳酪及鮮同食。(孟詵)越瓜生食可充果蔬。醬敗糖醋藏浸皆宜。亦可作菹。按蕭子真云。菜瓜能暗人耳目。觀驢馬食之。即眼爛。可知矣。(李時珍)

【越砂】即硃砂之古籍別名。典見本草集註。詳「硃砂」條。

【越桃】即山梔子之古籍別名。典見別錄。詳「山梔子」條。

【越桐】即山梔子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「山梔子」條。

【越砥】即羊肝石之古籍別名。典見別錄。詳「羊肝石」條。

【越鳥】即孔雀之古籍別名。典見綱目。詳「孔雀」條。

【越椒】即食茱萸之古籍別名。典見博雅。詳「食茱萸」條。

【越雄】即鸛鷀之古籍別名。典見綱目。詳「鸛鷀」條。

【附蟪】即蛭蝟之古籍別名。典見

和漢藥考。詳「蛭蝟」條。

【軸脂】即車脂之古籍別名。典見綱目。詳「車脂」條。

【軋】即連翹之古籍別名。典見和漢藥考。詳「連翹」條。

【進賢菜子】即蒼耳子之古籍別名。典見記事珠。詳「蒼耳子」條。

【都勾樹】即莎木麵之古籍別名。典見綱目。詳「莎木麵」條。

【都念子】古籍別名 倒捻子。(綱目)

產地 出粵省諸地。

形態 都念子為灌木類之一種。樹高丈餘。枝柯細長。似蜀葵。小而深紫。中心黃色。葉如白楊花。如芍藥。而小。春月開花。有紅白兩色。色鮮可愛。結實如柿。有四葉承之。外紫內赤。小而無核。味甚甘美。或謂有細核。嚼之惡。惡有聲。味帶苦。沁子實可供食與藥用。

性質 甘寒。小溫。無毒。

主治 痰嗽。喉氣。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論都念子曰。暖腹腸益肌肉。

參攷資料 都念子為補血良

品。小兒食之。則大便難暢。其產羅浮者。尤佳。其皮漬之。得膠。可以代柿。名海漆。與漆同功。功適青黏。汁若臘脂。可作染料。其花可以釀酒。(醫學大辭典)

【都念子】即倒捻子之古籍別名。典見綱目。詳「倒捻子」條。

【都念葉】 主治 夏秋暑濕下痢。亦可為藥用。

【都咸子】 產地 出嶺南山谷間。

形態 都咸子為喬木類之一種。樹如李。三月開花。結實大如指。長三寸。秋月成熟。色正黑。其子及木皮與葉俱可供藥用。

性質 甘平。無毒。

主治 火乾作飲。止渴潤肺。去煩除痰。

歷代記述攷證 【唐】李珣海藥本草論都咸子及木皮與葉曰。去傷寒清涕。嗽逆上氣。宜煎服之。

【都馬蛇】即蝸牛之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蝸牛」條。

【都梔子】 古籍別名 構子。(綱目)

產地 生嶺南山谷中。

【象骨】 主治 解毒。參攷資料 胸前小橫骨。燒灰酒服。令人能浮。(開寶)

【象睛】 主治 目疾和人乳滴之。

【象鼻草】 基本 象鼻草爲雜草類之一種。可供藥用。

產地 出舊雲南府境。

主治 丹毒。跌撲損傷。

【象殼】 卽象粟子之古籍別名。典見綱目。詳「象粟子」條。

【象頭花】 卽由跋之古籍別名。典見植物名實圖考。詳「由跋」條。

【象膽】 製法 雷獸曰凡使勿用雜膽。其象膽乾後。上有青竹文斑。光膩。其味微帶甘。入藥勿便和衆藥。須先搗成粉。乃和衆藥。

性質 苦。寒。微毒。

主治 明目。治疳。

歷代記載攷證 【唐】李珣海藥本草論象膽曰。治瘡腫。以水化塗之。治口臭。以綿裹少許。貼齒根。平日漱去數度。卽痊。

參攷資料 象膽明目。能去塵。

膜也。與熊膽同功。雷獸炮炙論云。象膽揮黏是矣。(李時珍)

【象膽】 卽蘆薈之俗名。詳「蘆薈」條。

【象蕒】 採取 以野象者良。主治 燒煮鷄掌風。和升麻水煎服。發瘰癧瘡。

【貂尾】 基本 貂出西北塞外。食松栗。卽南中松狗之類。其行捷穿樹枝如飛。蓋以尾爲用者。故其力在尾。

主治 凍瘡。用貂尾燒存性爲末。摻爛處。自愈未破者。用舊貂皮毛煨研香油和搽。

【貂鼠】 古籍別名 栗鼠。(爾雅) 松狗。貂。銀貂。(綱目)

基本 係脊椎動物哺乳類。有胎盤類。食肉類。裂腳類。鼬鼠科。爲貂鼠之肉。其毛皮詳見該條。

產地 出北寒帶諸地。如東三省。三姓。琿春。寧古塔等處之山林中。多有之。

形態 貂鼠爲鼠類之一種。大形。貂鼠爲鼠類之一種。大形。

貂鼠爲鼠類之一種。大形。

如鼬。尾粗。毛長寸許。體狹。長約二尺。形如鼬。口吻尖銳。有黑鬚。耳殼短而圓。四肢短。前比後更短。趾有鉤爪。毛色黃或紫黑。可作裘服。甚貴。其肉可供藥用。

種類 ①毛色帶黃者名黃貂。

②毛色帶白者名銀貂。

性質 甘平。無毒。

主治 功用同鼠肉。

【貂鼠毛皮】 主治 磨沙眯。目以裘袖拭之。卽出。凍瘡未潰。以舊者煨研和塗。

【鼬獸】 卽臘腸之古籍別名。典見和漢藥考。詳「臘腸」條。

【貴老】 卽橘皮之古籍別名。典見和漢藥考。詳「橘皮」條。

【買子木】 卽賣子木之古籍別名。典見綱目。詳「賣子木」條。

【買麻藤】 命名 本品堅韌如麻。言買其藤。猶得麻也。故名。

產地 出廣東高要縣一帶。

形態 買麻藤爲蔓草類之一種。緣樹而生。莖多汁液。折斷飲之。可以止渴。結子味苦。可食。其藤又可製履與供藥用。

主治 蛇咬。鮮乾俱效。

【貽貝】 卽貝子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「貝子」條。

【貽貝】 卽淡菜之古籍別名。典見動物學大辭典。詳「淡菜」條。

【貢龜】 古籍別名 三足龜。(爾雅)

基本 貢龜爲龜類之一種。身有三足。其肉可供藥用。

主治 消脹。辟時疾。

【越王蛇】 卽兩頭蛇之古籍別名。典見綱目。詳「兩頭蛇」條。

【越王約髮】 卽兩頭蛇之古籍別名。典見綱目。詳「兩頭蛇」條。

【越王鳥】 卽驢驘之古籍別名。典見綱目。詳「驢驘」條。

【越王頭】 卽椰子之古籍別名。典見綱目。詳「椰子」條。

【越王餘算】 命名 相傳本品爲晉安越王渡南海。將黑角白骨作算籌。其有餘者。棄水中。而生此物。故名。

古籍別名 白珊瑚。

產地 生海中。

形態 越王餘算爲水草類之一種。其實堅緻似珊瑚。惟色白。幹

【象牙】

處方用名 象牙屑。象牙絲。

古籍別名 伽耶牙（戶北錄）
基本 爲哺乳動物類象之牙齒。

產地 陳仁山藥物生產辨云。象牙產自暹羅安南。其屑廣東象牙店有沽。

形態 象爲獸類。乃陸生動物中之最大者。體長丈餘。被毛極精。鼻長八尺許。爲圓筒狀。屈伸自然。食物賴鼻送口。先端有小塊突起。如人指能拾纖介之物。頗覺銳利。眼細小上顎之門窗有二。延長而挺出口外者。象牙也。下顎無門窗。四肢皆大。各有五趾。趾端有蹄。其尾稍小。先端爲總狀。其皮牙等俱可供藥用。

製法 剉末用。

性質 甘寒。無毒。

效能 止血。散瘀。拔毒生肌。用作收斂藥及清熱藥。

主治 諸鐵及雜物入肉。刮牙屑和水數之。立出。治癰病。刮齒屑炒黃研末飲服。

歷代記述攷證 【宋】蘇頌嘉

祐圖經本草論象牙曰。諸物刺咽中磨水服之亦出。若舊梳屑尤佳。

【明】李時珍本草綱目論象牙曰。主風癰驚悸。一切邪魅精物。熱疾骨蒸。及諸瘡。並宜生屑入藥。【清】

黃宮繡本草求真論象牙曰。象牙味甘性寒。按象性主剛猛。而牙則善脫。故凡皮肉間有形滯物。及邪魅驚悸風癰並惡瘡。內有毒未拔者。服之立能有効。以其具有脫性。故能以脫引脫耳。是以癰腫不解。用牙磨水服之。并挫末蜜塗之。即效。諸鐵竹木刺入肉。刮削煎湯。溫服即愈。諸骨鯁入於喉。刮下薄片。類服即吐。不吐再服。以吐出爲度。

【清】張石頑張氏醫通曰。象牙甘寒。能解癰腫諸毒。磨水服之。造筋磨爛之末。生蜜調塗。治諸鐵雜物入肉。舊梳刮薄片屑。溫湯頻服。治竹木刺及諸魚骨鯁。即時吐出。不吐再服。以吐出爲度。非刮下薄片不能應手也。【清】張景岳景岳全書曰。味甘氣涼。能清心腎之火。可療驚悸風狂骨蒸痰熱。鬼精邪氣。

配合應用 ①治小便不通脹急者。象牙生煎服之（救急方）。

②治小便過多。象牙燒灰飲服之（聖濟總錄方）。

③治痘疹不收。象牙屑。銅銹炒黃。紅色爲末。每服七八分。或一錢。白水下（王氏痘疹方）。

④治諸獸骨鯁。象牙磨水吞之（永類鈴方）。

⑤治骨刺入肉。象牙刮末。以水煮白梅肉。調塗自軟（簡要濟衆方）。

⑥治鐵箭入肉。象牙刮末。水和敷之。即出也。

用量 五分至八分。

參攷資料 ①真臘風土記云。象牙殺取者上。也。白死者次之。蛇於山中多年者下矣。或謂一歲一換牙者。非也（蘇頌）②西域重象牙。用飾牀座。中國貴之以爲笏。象每啖牙。自埋藏之。昆崙諸國。人以木牙。潛易取焉（甄權）③象牙取口兩邊各出一牙。下垂夾鼻者。非口內食齒。齒別入藥。今爲象笏者。是牙也（寇宗奭）

【象牙屑】即象牙之處方用名。詳【象牙】條。

【象牙絲】即象牙之處方用名。詳【象牙】條。

【象牙屑】即象牙之處方用名。詳【象牙】條。

【象牙屑】即象牙之處方用名。詳【象牙】條。

【象牙屑】即象牙之處方用名。詳【象牙】條。

【象牙屑】即象牙之處方用名。詳【象牙】條。

『象牙』條

主治 下疳。燒灰和油敷之。又治金瘡。不合。

參攷資料 象肉。墮腿。人以斧刃刺之。半日即合。故近時治金瘡不合者。用其皮灰（李時珍）。

性質 甘。淡。平。無毒。

主治 燒灰和油塗瘡。

歷代記述攷證 【宋】日華諸家本草論象肉曰。生煮汁服。治小便不利。燒灰飲服。治小便多。

參攷資料 ①象肉多食令人體重（開寶）②象肉肥脆。少類豬肉。味淡而含滑。則其通小便者。亦淡滲滑竅之義。燒之則從火化。故又能縮小便也（李時珍）。

【象尾毛】 參攷資料 象尾毛可去火。並可作剔牙籤（趙學敏）。

【象豆】即檣藤子之古籍別名。典見開寶本草。詳【檣藤子】條。

【象貝母】即浙貝母之處方用名。詳【浙貝母】條。

【象馬】即當歸之古籍別名。典見和漢藥考。詳【當歸】條。

訶黎勒、陳橘皮、厚朴各三兩。搗篩蜜丸。大如梧子。每服二十丸。白湯下。即愈。(圖經本草方)

⑦ 治水瀉下痢。訶黎勒炮二分。肉豆蔻一分。爲末。米飲。每服二錢。(聖惠方)

⑧ 治下痢轉白。訶子三箇。二炮。

一生爲末。沸湯調服。水痢加甘草末一錢。(普濟方)

⑨ 治赤白下痢。訶子十二箇。六生六煨。去核焙爲末。赤痢生甘草湯下。白痢炙甘草湯下。不過再服。(趙原陽濟急方)

⑩ 治妬精下疳。大訶子燒灰。入麝香少許。先以米泔水洗後。搽之。或以荊芥、黃蘗、甘草、馬鞭草、葱白煎湯洗亦可。普方士周守真醫疳疔爛莖一二寸。用此取效也。(洪適夷堅志方)

用量 八分至錢半。
施用宜忌 凡肺脾有實火與實邪者禁用。

著名方劑 ① 訶黎勒散。治氣痢。(金匱方) 訶黎勒十枚(煨)杵爲散。粥飲和頓服。② 訶黎勒丸。治腸胃積寒。久痢純白。或有青黑。日

夜無度。(局方) 肉豆蔻、去皮、木香、乾姜(炮)各二十兩。兩精砂仁、訶黎勒、皮、川烏頭(泡去皮臍)、白礬(煨)各十分。龍骨、洗赤石脂各八十兩。爲末。用粟米飯爲丸。如梧子大。每服二十九至三十九。溫粟米飲下。食前服。甚者加倍。③ 訶黎勒丸。治大腸虛冷。泄瀉不止。腹脇引痛。飲食不化。(濟生方) 訶黎勒(麵包煨)、附子(泡)、肉豆蔻(麵包煨)、木香、吳茱萸(炒)、龍骨(生用)、茯苓、葶藶等分。爲末。生薑汁煮麵糊丸。如梧子大。每服七十九。空心米飲下。

參攷資料

① 訶黎勒氣虛人亦宜。緩緩煨熟。少服。此物雖瀉腸而又泄氣。其味苦澀故爾。(寇宗奭) ② 肺苦氣上逆。急食苦以泄之。以酸補之。訶子苦重瀉氣。酸輕不能補肺。故嗽藥中不用。(李杲)

③ 訶子同烏梅五倍子用則收斂。同橘皮厚朴用則下氣。同人參用則能補肺。治咳嗽。東垣云。嗽藥不用者非矣。但咳嗽未久者不可驟用。爾。啗含草木狀言作飲久服。令髮髮白者。變黑。亦取其瀉也。(李

時珍) ④ 訶黎皮主嗽。肉主眼瀉。痛。波斯人將訶黎勒大腹等在船上。用防不虞。或遇大魚放涎。滑水中數里。船不能通。乃煮此洗其涎。滑。尋化爲水。則其治氣消痰。功力可知矣。(李珣) ⑤ 金光明經言。流水長者除病品云。熱病下藥服訶黎勒。又廣異記云。高仙芝在大食國。得訶黎勒長三寸。置抹肚下。便覺腹中痛。因大痢十餘行。疑訶黎勒爲祟。後問火食長老云。此物人帶一切病消。利者乃出惡物爾。仙芝寶之。後被誅。失所在。(唐慎微)

⑥ 今嶺南皆有。而廣州最盛。樹似木槌。花白。子形似梔子。橄欖。青黃色。皮肉相着。七八月實熟時。採六路者佳。嶺南異物志云。廣川法性寺有四十五株。子極小而味不澀。皆是六路。每歲州貢。只以此寺者。寺有古井。木根蘸水。水味不鹹。每子熟時。有佳客至。則院僧煎湯以延之。其法用新摘訶子五枚。甘草一寸。破之。汲井水同煎。色若新茶。今其寺謂之乾明古寺。尚在舊木猶有六七株。南海風俗尙貴此湯。然煎之不必盡如昔時之法也。訶

子未熟時。風飄墮者。謂之隨風子。曝乾收之。益小者佳。彼人尤珍貴之。(蘇頌) ⑦ 凡使勿用訶黎勒。个个毗頭也。若訶黎勒文。只有六路。或多或少。並是雜路。勒皆圓而露文。或八路至十三路。號曰椰精。勒瀉不堪用。(雷斅)

【訶子炭】即訶子炒黑者之處方用名。詳「訶子」條。

【訶子核】主治 磨白蜜。注目。去風赤痛。神良。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論訶子核曰。止咳及洩痢。

【訶子葉】主治 下氣消痰。止渴及洩痢。煎飲服功。

同訶黎。

【訶梨子】即橄欖之古籍別名。典見和漢藥考。詳「橄欖」條。

【訶梨勒】即訶子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「訶子」條。

【訶黎勒】即訶子之原名。詳「訶子」條。

【象毛】即金鎖銀開之古籍別名。典見汪連仕採藥書。詳「金鎖銀開」條。

能敵苦。瀉瀉未極。又止帶。甘則瀉中尤有緩也。二者須索其肉之有異。以施治。乃為得之。再按訶子下逆氣。瀉結氣。通積聚。利咽喉。歷考成方。如息賁之枳實散。伏梁之半夏散。奔豚之木香檳榔散。便閉之七宣丸。又聲瘕之訶子湯。梅核氣之清咽屑。或止同於降瀉。從邪之實者論治。或更同於寒涼之降瀉。從實邪之有熱者論治也。又如胸痞氣滯。脇肋刺痛之沉香升降散。胸痺喘息之利膈散。息賁之半夏湯。喘證之蘇杏散。或兼補劑。從虛中有實者論治。或更兼溫補。從虛中有寒者論治也。是其降瀉為功。豈得畏氣虛而不用乎。至又有用其酸與瀉者。義固非與降瀉相戾也。人身肺氣猶天。其職司降。而有降。即有收。自飛門至於魄門。皆一氣之所貫。經故曰。魄門亦為五臟使。言臟腑糟粕。固由其瀉。而臟氣升降。亦藉以調。訶子入手太陰陽明。其味始於瀉苦。終於酸甘。降與收隨所合而為用。是以丹溪治久嗽。劫劑。則同於百藥煎。荊芥穗。河間治失音發聲。則同於桔梗木通。

童便。東垣以止久痢。則同於御米殼。乾薑陳皮。實鑑則合於椿白皮。母丁香。其通便閉也。合杏仁。麻仁。枳殼為二仁丸。協柴胡。枳實。桃仁。大黃。木香為七宣丸。釋此不可以識訶子之長技。亦惟我所使。總之以以降瀉。宜於氣實。實者邪氣實。用以收瀉。則宜於氣虛。虛者正氣虛。此中後先主輔。惟當適事為故耳。至繆氏致慎於火嗽。濕熱痢立論。良是。第丹溪治火嗽。久病有同杏仁。青黛。海粉。皂角。膽星而用者。又治濕熱久痢。有同地榆。當歸。木香。黃連。阿膠。烏梅而用者。正可推此類以盡變也。又如滑瀉之治。有訶子散。以治熱。更有訶子丸。以治寒。舉寒熱而皆宜。其故可思矣。再河間治熱滑。訶子散用訶子。木香。黃連。甘草。其云腹痛漸止。瀉下漸少。宜此藥止之。知止之不已。宜因其歸而送之。加厚樸一兩。竭其邪氣也。玩此則主輔應有合宜之味。而火嗽濕熱痢。又何不宜於訶子耶。【清】賈九如辨藥指南論訶子曰。訶子味苦而帶酸。澀能降。能收。兼得其善。盡金空則鳴。肺氣為

火邪鬱遏。以致吼喘咳嗽。或至聲啞。用此降火斂肺。則肺竅無壅塞。聲音清曉矣。取其澀可去脫。若久瀉久痢。則實邪去而元氣脫。用此同健脾之藥。固澀大腸。瀉痢自止。但苦能泄氣。真氣太虛者。宜少用之。

配合應用 ①治肺虛受寒喘嗽。用訶子人參。

②訶子得橘皮。砂仁。主冷氣入內。心腹脹滿。及因寒食不下。

③訶子得益智。止氣虛寒。小水不禁。

④訶子佐樗根白皮。止腸澼瀉血。

⑤訶子佐白朮。蓮實。止久洩因於虛寒。

⑥訶子同蛇牀子。五味子。山茱萸。杜仲。續斷。止虛寒帶下。

⑦訶子同人參。肉苳菰。則實大腸。

⑧治下氣消食。訶黎一枚為末。瓦器中水一大升。煎三兩沸。下藥更煎三五沸。如麴塵色。入少鹽飲之。【食醫心鏡方】

⑨治一切氣疾。宿食不消。訶黎

一枚。入夜含之。至明嚼嚙。又訶黎三枚。溼紙包煨熟。取核細嚼。以牛乳下。【千金方】

⑩治氣嗽日久。生訶黎一枚。含之。嚙汁。瘥後口爽。不知食味。却煎檳榔湯一盤。服。立便有味。此知連州成密方也。【經驗方】

⑪治嘔逆不食。訶黎勒皮二兩。炒研糊丸。梧子大。空心湯服。二十丸。日三服。【廣濟方】

⑫治風痰霍亂。食不消。大便瀉。訶黎三枚。取皮為末。和酒頓服。三五次。妙。【外臺祕要方】

⑬治小兒霍亂。訶黎一枚為末。沸湯服一半。未止再服。【子母祕錄方】

⑭治小兒風痰。癰閉。語音不出。氣促喘悶。手足搖動。訶子半生。半炮。去核。大腹皮等分。水煎服。名二聖散。【全幼心鑑方】

⑮治風熱衝頂熱悶。訶黎二枚為末。芒硝一錢。同入醋中。攪令消。磨塗熱處。【外臺祕要方】

⑯治氣痢水瀉。訶黎勒十枚。麴裹。火煨熟。去核研末。粥飲頓服。亦可飯丸服。一加木香。又長服方

【蛤蚧粉】即蛤粉之原名。詳『蛤粉』條。

【蛤蜊】即蜆之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蜆』條。

【蛤蚧】即蛤蚧之古籍別名。典見諸家本草。詳『蛤蚧』條。

【蛭】即馬陸之古籍別名。典見綱目。詳『馬陸』條。

【蛭】即蛭之古籍別名。典見綱目。詳『蛭』條。

【訶子】原名訶梨勒。又名訶黎勒。梵言。天主持來也。

【訶子】原名訶梨勒。又名訶黎勒。梵言。天主持來也。

【訶子】原名訶梨勒。又名訶黎勒。梵言。天主持來也。

【訶子】原名訶梨勒。又名訶黎勒。梵言。天主持來也。

【訶子】原名訶梨勒。又名訶黎勒。梵言。天主持來也。

【訶子】原名訶梨勒。又名訶黎勒。梵言。天主持來也。

【訶子】原名訶梨勒。又名訶黎勒。梵言。天主持來也。

十二畫 蛤

蛭 蛇 訶

形體 爲褐色卵圓形之石質。類槌實。縱有六棱。皮厚而有皺紋。及光澤。內部堅實。帶黃色。味苦。

採取 七八月間。採六路者。製法 雷數曰。凡使訶子。須以酒浸後。煮一伏時。以刀削去路。取細到焙用。用肉則去核。

性質 苦溫無毒。

成分 主要素含有沒食子酸。 $(C_{14}H_{10}O_5 \cdot CO_2H)$ 。單甾酸。 $(C_{14}H_{10}O_5 \cdot 2H_2O \cdot 2H_2O)$ 。及沒食子鞣酸。故印度地方。用於染色及鞣皮革等。

效能 飲肺。瀉腸。用爲瀉痢藥。及作收斂藥。又治赤痢。腸黏膜炎。作用 入胃後。令胃內之 Be_{2+} 及蛋白質皆凝固。而消化力被阻。且能將胃黏膜收縮。使分泌減退。至腸能收縮。腸壁之微血管。減輕下痢。且微有殺菌之功。由腸壁吸入血中。能使血液流動之血管收縮。阻止血液及白血球之滲出。故有間接止血之功。又能使腸收縮而減下痢。

主治 冷氣。心腹脹滿。下食。歷代記述攷證 【唐】甄權藥

性本草論訶子曰。破胸膈結氣。通利津液。止水道。黑髮髮。【唐】蘇頌四聲本草論訶子曰。下宿物。止腸辟久洩。赤白痢。【唐】蘇恭新修本草論訶子曰。治痰嗽。咽喉不利。含三數枚。殊勝。【宋】大明日華諸家本草論訶子曰。消痰下氣。化食開胃。除煩。治水調中。止嘔吐。霍亂。心腹虛痛。奔豚腎氣。肺氣喘急。五膈氣。腸風瀉血。崩中帶下。懷孕漏胎。及胎動欲生。脹悶。氣喘。并患痢人。肛門急痛。產婦陰痛。和蠟燭烟薰之。及煎湯薰洗。【元】朱丹溪本草衍義補遺論訶子曰。實大腸。飲肺降火。【明】繆希雍本草經疏論訶子曰。訶梨勒。其味苦。溫。其氣溫。而無毒。善所以洩瀉。所以收溫。所以通。惟飲故能主冷氣。心腹脹滿。惟溫故能下食。甄權用以止水道。蘇頌用以止腸辟久洩。蘇頌用以療腸風瀉血。帶下。朱震亨用以實大腸。無非苦溫收斂。皆治標之功也。【明】李士材本草圖解論訶子曰。訶梨勒。即訶子。酸苦溫。肺與大腸藥也。酸溫能固腸。止瀉。苦溫可下氣。寬中止嗽。化痰。亦下氣之功。

腸風止血。亦固腸之力。生用則能清金行氣。煨熟則能溫胃固腸。波斯國大魚放涎。水中凝滑。船不能通。投訶子湯。尋化爲水。則其化痰可知。麵裹煨去核。【清】黃宮繡本草求真論訶子曰。訶子味苦酸溫。氣溫無毒。雖有收斂止瀉之功。然味苦居多。服之反使氣下泄。故書載能消痰降火。止喘定逆。且於虛人不宜獨用。至於嗽痢初起。用最切忌。以其止有劫截之功耳。服此能平胃和中。亦能消膨去脹。使中自和。用非脾胃虛弱。於中實有補也。波斯國人行舟。遇大魚涎滑數里。舟不能行。投以訶子。其滑即化。則其化痰消痰。概可見矣。第性兼收瀉。外邪未除。其切禁爲。出番船及積。色黑肉厚者良。酒蒸去核。用肉。生清肺氣。熱溫胃固腸。【清】楊時泰本草述鈞元論訶子曰。方書於訶子。有止用皮者。有止用肉者。其肉先瀉次苦。而瀉不敵苦。又次酸及甘乃甚微。是肉之爲用。降瀉居多。而瀉中猶有收斂。更合於中土之氣。而不盡瀉也。其皮瀉與苦等。次止有甘亦甚微。是皮之瀉

一三七七

壁之隙。又名石龍。俗稱四脚蛇」之說。頗不相符。遍地平原。尚多原野。草木茂密。熱帶產之。爬蟲處。處有之。蜥蜴類尤為蕃盛。此類多無毒。不咬人。嘗經目睹者。有十餘種。昨天還重捉一物。到寓頭。身形態似蛤。身長六寸。尾長尺許。作三稜狀。身上被以無色透明之薄鱗。能自脫換。有蛇退不成條。背赤褐。有淺黃色星點。肢短。五趾長而屈曲。爪勾利。頗似圖畫之龍爪。蛇舌不能鳴。棲於山野石壁間。還名蜥甲。入藥。我疑此即石龍。蜥蜴也。唯其舌分歧。常自伸縮如蛇。與載籍微有不同耳。

配合應用 治久嗽肺癰。寇宗奭曰。久嗽不愈。肺積虛熱成癰。咳出膿血。曉夕不止。喉中氣塞。胸膈噎痛。用蛤蚧阿膠鹿角膠生犀角羚羊角各二錢半。用河水三升。銀石器內文火熬至半升。濾汁。時仰臥細呷。日一服。

治喘嗽面浮并四肢浮者。蛤蚧一雌一雄。頭尾全者。法酒和蜜塗之。炙熱。藥國人參似人形者半兩。為末。化蠟四兩。和作六餅。每煮

糯米薄粥一盞。投入一餅。攪化細細熱呷之。〔普濟方〕

用量 八分至錢半。

施用宜忌 凡非關脾胃兩虛。而有風寒實邪者。禁用。

參攷資料 普人言補虛弱。人參羊肉之屬。蛤蚧補肺氣。定喘止渴。功同人參。益陰血。助精扶蘇。功同羊肉。近世治勞損弱。許叔微治精渴皆用之。俱取其滋補也。劉純云。氣液衰陰血竭者。宜用之。何大英云。定喘止嗽。莫佳於此。〔李時珍〕

蛤蚧生嶺南山谷及城牆或大樹間。形如大守宮。身長四五寸。尾與身等。最惜其尾。見人取之多。自嚼斷其尾而去。藥力在尾。尾不全者不效。揚雄方言云。桂林之中守宮能鳴者。俗謂之蛤蚧。蓋相似也。〔馬志〕

生廣南水中。夜即居於榕樹上。雌雄相隨。投一獲二。近日西路亦有之。其狀雖小。滋力一般。俚人採之。割腹以竹張開。曝乾。醫之。〔李珣〕

人欲得首尾全者。以兩股長柄鐵叉。如黏蠟等狀。伺於榕木間。以叉刺之一股中。腦一股着尾。故不能嚼也。入藥須

雌雄兩用。或云陽人用雄。陰人用雌。〔蘇頌〕


蛤蚧一物。確是生息於牆隅屋角者。試審察其足短趾薄。爪利。便知是為遊絲之用。若生於山地池塘。即為兩棲類。必須具備善走善躍之足。兼有潛水習性。乃能適應生存。此物類之公例也。據說。〔嘗於叻坡京菓舖酒樓前看過生活者。以小竹籠拘禁。放於水桶裏。標樣發售。曰。梧州生蛤蚧。以是可知其為水產物云。〕我亦曾見過。那似乎。是鬼蛤而非蛤蚧。其形相似而實不同也。〔程登瀛〕

鬼蛤一作桂蛤。亦以廣西蒼梧產為最著。閩南嶺東亦有之。俗名烏鬼魚。學名疑即螺螄。山湖池中常見之。形色似蝦蟆。身滑無鱗。色黑。腹赤。白有黑斑。四足短小。不適於步行。尾長而扁。為便於游泳之用。此屬兩棲類。大蛙之有尾者。與蛤蚧之屬蜥蜴類。科屬亦不相同。也想不僅足下一人有此懷疑。故公開發答。倘望助坡同志。往粵人京菓舖審視之。放水桶中者。果為蛤蚧乎。抑如上述之桂蛤乎。〔程登瀛〕

【蛤蚧尾】即蛤蚧之處方用名。詳『蛤蚧』條。

【蛤魚】即田雞之古籍別名。典見綱目。詳『田雞』條。

【蛤蚧肉】性質 鹹。冷。無毒。主治 煮食醃酒。



蛤蚧肉

歷代記述攷證

【宋】掌禹錫嘉祐補註本草論蛤蚧肉曰。潤五臟。止消渴。開胃。治老癯為寒熱。婦人血塊。宜煮食之。

參攷資料 高武痘疹正宗云。俗言蛤蚧海蟾。能發疹。多致傷損。肺胃。生痰作嘔。作瀉。此皆嗜笑作罪也。又言痘毒入目者。以蛤蚧汁點之。可代空青。夫空青得銅之精氣。而生性寒。可治赤目。若痘毒是臟腑毒氣上衝。非空青可治。蛤蚧雖寒。而溼中有火。亦不可不知矣。〔李時珍〕

蛤蚧肉性雖冷。乃與丹石人相反。食之令腹結痛。〔陳藏器〕

喘。助陽益精。大有奇功。李珣曰。凡用須炙令黃色。熟搗。口含少許。奔走不喘。息者爲真也。今市肆有一種紅點蛤蚧者。有大毒。萬不可服用。者須揀尾全者。細驗皮色。有無紅點。方可入藥。曹炳章曰。按詹曝日記云。蛤蚧蛇身而四足。形如鼯虎。身有瘰癧五色。俱備其疥。處又似蝦蟆。最臭惡。余初入鎮安路旁。見之。疑爲四足蛇。甚惡之。問土人。乃知爲蛤蚧也。郡衙傍山處。處有之。夜輒聞其鳴。一聲曰蛤。一聲曰蚧。能叫至十三聲。方止者乃佳。其物每年一聲。十三聲則年久而有。力也。能潤肺納氣。壯陽益氣。口咬物則至死不釋。故捕者輒以小竹片繫之。使咬。即挑之來。雖已入石縫中。亦可乘其咬而掣出也。遇其雌雄相接時。取之。則有用於房中術。然不易遇也。藥肆中所售。兩兩成對者。乃取其兩身聯屬之耳。其力在尾而頭足有毒。故用之者。必尾全而去其頭足。鄭君云。紅點。或指活時言。其活時身上五色俱備。在市上通行者。色皆青綠色。有鱗鱗而無紅點也。

十二畫 蛤

近人學說 程登瀛云。蛤蚧入

爬蟲類。與蜥蜴同類。異種。英文名作 *Lizard*。謂有烏紅二種。體細長。作圓筒狀。四肢短小。無蹠趾。爪銳利。趾間有鱗片。善附着他物。首似蝦蟆。兩頸有細齒。頸旁有發音膜。膜後各有一小竅。若雞耳。此發音器之構成。與蝦蟆異。意其發聲不從口出也。背被以細鱗。青綠色。有黃紅點。或黃褐灰暗色。上有鮮紅斑點。居樓棟破壁間。舊謂產於廣西。余見自安南至暹羅宋卡。處處有之。宋卡以下。英屬馬來各地。則無此物。惟中國地產者。色暗。而暹地產者。色較淺淡。爲稍異耳。余初至暹境。一夜忽聞吭厲之鳴聲。審視之一。爬蟲長可五六寸。遊行於牆隅。爲前所不曾見者。詢問同僑。或云壁虎。或云本頭公雞。本頭公即叻坡之大伯公。察其形態。絕似蛤蚧。佛寺路旁。每座必有一對。多則三四對。鳴一聲。轉兩音。若「獨架」「獨架」聲。隆而凄厲。非雌雄互叫也。暹人擬呼爲 *Tokain*。譯音即獨架。華僑亦多從之。傳說此物棲於屋內主與旺。又謂暹國

十三省。能聞其連鳴十三聲。『常叫七八聲即止』方止者。爲將來富冠全國之徵兆。暹爲佛教國。此物神秘意思。故擾人清夢。而人不甚惡之。有惡之者。則以紅烟和紅灰爲餌。誘捕之。年來在暹地見詩歌筆記之詠志。此物者。名人人殊。余欲知其在載籍作何名。乃從書本上抄錄蜥蜴類。如大守宮壁虎。鬣虎。草龍。石龍。蛇。四脚蛇。等凡三年積二十七條。錯綜互見。形態習性。皆與此不符。惟名之曰「蛤蚧」。最爲恰當。但未聞有人稱爲蛤蚧。捉之入藥。故不敢告人。但以蛤蚧示還人。皆隨口答曰獨架。其相像之點。亦可想見矣。嗣後捉兩隻。曬乾。與蛤蚧比勘。色帶灰褐。紅綠斑點。亦較鮮明。惟辨別須從固形之特徵。區別。則色彩小異。不足爲區別標準。譬如人固一望而知其爲人。若細察其色相。蓋無一絕相肖者。近見暹醫採入藥。就詢之。據云。入酒浸劑。功能去風溼。益氣力。翻查英暹文動物學書。暹名獨架。英文名作 *Lizard*。與蛤蚧英名 *Lizard*。有烏紅二種之說。全相吻

合。至是我以爲 *Polecat*。即蛤蚧之疑。想可得證實矣。鄭君云。市上有紅點蛤蚧。殆即此物。但謂有大毒。萬不可服。則尙須研究。方書載蛤蚧有小毒。紅蛤蚧當然亦有毒。用時祇須修淨酒製。便可穩當。蓋毒之大小。頗難分別。要在用量與炮製爲異耳。毒蛇至毒也。去頭皮脊髓。同玉桂明硃。煮食。閩人視爲清補妙品。潮人竟成條焙。焦入酒。以治癰腫。暹人取毒蛇頭。敷服。以治癰腫。初見之。莫不駭怪。詎知適量毒藥。正所以治病也。現蜥蜴類大多無毒。不傷人。南洋華僑勞動界。常採用四脚蛇。蜥蛇。浸酒者。亦以此類物體中含有特種可礮液。利去風溼。可以從化驗證實之。故余以爲涓公河以南所產之紅蛤蚧。亦可以入藥也。暹人用之。亟稱其功效甚著。可爲左證。按南洋所謂四脚蛇者。長二尺以上。重至六七斤。皮厚。可製錢袋。卵大如鵝蛋。拾獲將出殼之蛇胎。一窠四五粒者。值三四元。爲主治風痺之要藥。與辭書所載「蜥蜴。胎生。長六七寸。尾易斷。斷後復生。常棲於石

江湖之蛤蚧蚌粉也。今人指稱但曰海粉。蛤蚧。寇氏所謂乘蛤之灰是矣。近世獨取蛤蚧粉入藥。然貨者亦多乘蛤也。大抵海中蚌蛤蚧

蠣性味鹹寒。不甚相遠。功能軟散小異大同。非若江湖蚌蛤無鹹水浸漬。但能清熱利溼而已。今藥肆有一種狀如線粉者。謂之海粉。得水則易爛。蓋後人因名售物也。然出海中沙石間。故功亦能化痰墮

聖。李時珍曰。蛤蚧生東南海中。自殼紫唇。大二三寸者。閩浙人以其肉充海錯。亦作醬醃。其殼火煨作粉。名曰蛤蚧粉也。(汪機)

【蛤粉炒阿膠】即阿膠以蛤粉拌炒成者之處方用名。詳「阿膠」條。

【蛤蚧】 命名 本品雄者為蛤。雌者為蚧。夜聞其鳴聲。一曰蛤。一曰蚧。遂因其聲而命其名也。

處方用名 蛤蚧尾。對蛤蚧。古籍別名 蛤蚧(日華)僂蟾。

(綱目)

基本 係爬蟲類脊椎動物蜥蜴屬之蛤蚧。

產地 陳仁山藥物生產辨云。

蛤蚧產廣西。以龍州為多。其次瀘。墟貴縣南寧百色等均有出。梧州乃聚處。實非梧州所產。

形態 蛤蚧為蜥蜴同類。異種長四五寸。首如蝦蟆。背綠色。有白點。或鮮紅斑紋。其鱗如米粟。為十二行。居梁棟破壁間。夜出食蟲。蟲者皮粗口大。身小尾短。雌者皮細口尖。身大尾小。雌雄相呼。累日相交。兩兩互抱。捕者擊之。雖死不開。故入藥其功效尤著。

製法 雷敩曰。其毒在眼。須去眼及甲上尾上腹上肉毛。以酒浸透。隔兩重紙緩焙令乾。以蠶器盛。懸屋東角上一夜。用之。力可十倍。勿傷尾也。日華曰。凡用頭足。洗去蟻內不淨。以酥炙用。或用蜜炙。李珣曰。凡用須炙令黃色。熱搗口含少許。奔走不喘。息者為真也。宜丸散中用。

性質 鹹平。有小毒。效能 補肺腎。定喘嗽。用作滋養強壯藥。

主治 久咳嗽。肺勞傳尸。殺鬼物邪氣。下淋瀝。通水道。歷代記述攷證 【唐】李珣海

藥本草論蛤蚧曰。肺痿咯血。咳嗽上氣。治折傷。【宋】日華諸家本草論蛤蚧曰。下石淋。通月經。治肺氣療咳血。【明】李時珍本草綱目論蛤蚧曰。肺氣。益精血。定喘止咳。療肺癰。消渴。助陽道。【明】繆希雍本草經疏論蛤蚧曰。蛤蚧味鹹。氣平。有小毒。其主久肺勞。傳尸。鬼物邪氣。咳嗽。淋瀝者。皆肺腎為病。勞極則肺腎虛而生熱。故外邪易侵。內證兼發也。蛤蚧屬陰。能補水之上源。則肺腎皆得所養。而勞熱咳嗽自除。邪物鬼氣自去矣。肺朝百脈。通調水道。下輸膀胱。肺氣清。故淋瀝水道自通也。又顧玲海槎錄云。

廣西橫州甚多。蛤蚧。牝牡上下相呼。累日情洽乃交。兩相抱負。自墮於地。人往捕之。亦不知覺。以手分劈。雖死不開。乃用熟稿草細纏。蒸過。暴乾。舊之。煉為房中之藥。甚效。尋常捕者。不論雌雄。但可為雜藥用。【清】黃宮繡本草求真論蛤蚧曰。蛤蚧絕與蛤蚧不類。生於廣南。身長七八寸。首如蟾蜍。背綠色。斑頭圓肉滿。鱗小而厚。鳴則上下相呼。雌雄相應。情洽乃交。兩相抱負。

自墜於地。往捕劈之。至死不開。大助命門相火。故書載為房術要藥。且色白入肺。功兼人參羊肉之用。故用能治虛損痿弱。消渴喘嗽。肺痿吐沫等症。專取交合肺腎諸氣入藥。去頭留尾。酥炙口含少許。雖疾走而氣不喘。則知益之功為莫大焉。但市多以龍子混冒。舉世亦不深辨。如龍子則割開而身多赤斑。皮端助陽火。難治陽痿。性少止瀉。蛤蚧則經束多對。通身自鱗。兼溫肺氣。故補氣喘之最宜。其藥不論牝牡皆可。即非相抱時捕之。功用亦同。但其藥力在尾。尾不全者不效。去頭足。

辨偽 鄭省巖曰。蛤蚧生嶺南山谷。及城牆或大樹間。形如大守宮。身長四五寸。尾與身等。自惜其尾。見人取之。多自嚙斷其尾而去。藥力在尾。尾不全者不效。北戶錄云。其首如蟾蜍。背綠色。上有黃斑點。如古錦紋。其聲最大。蘇頌云。入藥肆須雌雄兩川最驗。或云。陽人用雄。陰人用雌。雷敩曰。雄為蛤。身小尾粗。雌為蚧。皮細口尖。身大尾小。氣味鹹平。有小毒。治虛勞嗽。

齊也。

配合應用

●治脚脛爛瘡。吳穰不可近。用蛭蚰十條。瓦焙研末。油調傅之。立效(救急方)

●治痔熱腫痛。用大蛭蚰一箇。研泥。入片腦一字。燕脂。坯子半錢。同傳之。(大全良方)

施用宜忌 凡無實火熱毒者禁用。

參攷資料

按蔡條鐵園叢語云。嶠南地多蜈蚣大者二三尺。蠟人覓死。惟見托胎蟲則踴躍不行。蟲乃登其首。陷其腦而死。故以此蟲生搗塗蜈蚣傷。立時疼痛止也。又大全方云。痔熱腫痛。用大蛭蚰一箇。研泥。入龍腦一字。燕脂。坯子半錢。同傳之。先以石薺煮水。熏洗尤妙。五羊大帥趙尙書夫人病此。止以蛭蚰京墨研塗。亦妙。大抵與蝸牛同功。(李時珍)

【蛭蚰】

即蛭蚰之古籍別名。典見本草集註。詳「蛭蚰」條。

【蛭蚰】

即木蠹蟲之古籍別名。典見綱目。詳「木蠹蟲」條。

【蛤粉】

原名 蛤蜊粉。命名 蛤類之有利於

人者。故名蛤蜊。蛤粉。即用蛤蜊殼煨到末所成之粉。

古籍別名 蛤蜊粉。海蛤粉。(綱目)

基本 係水族動物介類蚌蛤屬。用海蛤蜊殼煨成之粉。

產地 陳仁山藥物生產辨云。海蛤粉產廣東鹹水海。新安平海一帶多出。

形態 蛤蜊大者二三寸。其殼幾為正圓形。外面黃褐色。輪紋稍高。疊內面白色。煨研之。成為極細之白粉末。

採取 春夏間採之。

製法 朱震亨曰。蛤粉用蛤蜊燒煨成粉。不入煎劑。李時珍曰。按吳球云。凡用蛤粉。取紫口蛤蜊殼炭火煨成。以熟梔樓連子同搗和成團。風乾用。最妙。

用法 恒以剉末和藥。

性質 鹹。寒。無毒。

效能 清熱。利溼。化痰。散結。用作收斂劑。又為軟堅藥。

主治 熱痰溼痰。老痰頑痰。疝氣。白濁。帶下同香附末。薑汁調服。

主心痛。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論蛤粉曰。清熱利溼。化痰。定喘。嗽。止嘔。逆。消浮。腫。利小便。止遺精。白濁。心脾疼痛。化積塊。

解結氣。消癰核。散腫毒。治婦人血病。油調藥湯火傷。【清】黃宮繡本

草求真論蛤粉曰。蛤蜊粉即海內水蚌殼。煨而為粉也。與黃海淡水蚌殼不同。功與牡蠣相似。但此止

有斂滯化堅解熱之力。故能消痰止咳。治腫。昔宋徽宗寵妃患此。李

防禦寬得市人海蚌蛤蜊粉。少加青黛。以淡鹽水加麻油數滴調服

而愈。亦是斂肺清熱之意。無他治也。內鹹冷解酒熱。文蛤背有紫斑

紋。比較蛤蜊殼稍厚。性味主治頗近。但此性兼利水。止渴除煩。並治

血熱崩中。帶下。總取其寒鹹滲飲之義耳。海蛤係海內爛壳。混雜沙

泥。火煨為粉。亦屬利水消腫止咳之品。然總不類牡蠣。功專收滯固

脫解熱為事也。

配合應用 ●治氣虛水腫。昔

滁州酒庫攢司陳通患水腫垂死。

諸醫不治。一姬令以大蒜十個搗

如泥。入蛤粉丸。梧子大。每食前白

湯下二十丸。服盡小便下數桶而愈。(普濟方)

●治心氣疼痛。真蛤粉炒過白。

佐以香附末等分。白湯淨服。(聖

惠方)

●治白濁遺精。潔古云。陽盛陰

虛。故精泄也。真珠粉丸主之。用蛤

粉煨一斤。黃柏新瓦炒過一斤。為

細末。白水丸。如梧子大。每服一百

丸。空心用溫酒下。日二次。蛤粉味

鹹而且能補腎陰。黃柏苦而降心

火也。

●治雀目夜盲。真蛤粉炒黃為

末。以油燻化和丸。皂子大。內於猪

腰子中。麻絮定。蒸食之一日。一服

(儒門事親方)

用量 八分至錢半。

施用宜忌 凡脾胃虛寒者禁

用。

參攷資料 ●蛤粉能降能消。

能更。能燥。朱震亨云。寒制火而

鹹潤下。故能降焉。寒散熱而鹹走

血。故能消焉。堅者更之以鹹。取其

屬水而性潤也。溼者燥之以滲。取

其經火化而利小便也。李時珍云。

海蛤粉者。海中諸蛤之粉。以別

一二七三

【萎陵菜】即柴胡之古籍別名。典見和漢藥考。詳『柴胡』條。

【萎蒿】即白蒿之古籍別名。典見中國醫學大辭典。詳『白蒿』條。

【萎莎】即玉竹之古籍別名。典見爾雅。詳『玉竹』條。

【萎蕤】即玉竹之原名。詳『玉竹』條。

【葳】即五味子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『五味子』條。

【落】即蒜之生於水中者。典見呂忱字林。詳『山蒜』條。

【葛花】即商陸花之原名。詳『商陸花』條。

【莉草】即葶麻之日本別名。詳『葶麻』條。

【虛中】即鍾乳石之古籍別名。典見吳普本草。詳『鍾乳石』條。

【虛飯】即冰片之古籍別名。典見和漢藥考。詳『冰片』條。

【蛔】即就蟲之古籍別名。典見綱目。詳『就蟲』條。

【蛭】即就蟲之古籍別名。典見綱目。詳『就蟲』條。

【蟲蠹】即蟲蠹之別名。詳『蟲蠹』條。

【蛙食】即浮萍之古籍別名。典見和漢藥考。詳『浮萍』條。

【蛭蟬】即全蠍之古籍別名。典見開寶本草。詳『全蠍』條。

【蛭蟬】即鼠婦之古籍別名。典見本經。詳『鼠婦』條。

【蛭蟬】即全蠍之古籍別名。典見和漢藥考。詳『全蠍』條。

【蛭蟬】即雄蟹之古籍別名。典見綱目。詳『蟹』條。

【蛭斗】即蛭蚪之古籍別名。典見綱目。詳『蛭蚪』條。

【蛭蟬】即附蝸蝓蠹土蝸。別錄。托胎蟲。蔡條鐵圍叢語。鼻涕蟲。俗名。蛭蝓。綱目。附蝸。蛭窮。蝦。拾石夾子。無殼。耳拔伊。和漢藥考。無殼蝸蠹。爾雅。

外國名詞 Zucc (英)

基本 屬腹足類之蛭蝓。

產地 凡池澤間及牆壁石垣之陰溼地方恒多生焉。

形態 蛭蝓為溼生之軟體動物。體闊三四分。長二寸餘。背面有網羅狀黑綫。呈褐灰。褐黑或赤褐。色。觸角為黑色。分泌多量黏液。

其所經之處。留下銀色綫。此蟲晝伏暮出。概食菌類為生。冬季潛伏地下。若用食鹽。砂糖等撒於其體。則分泌黏液甚多。終發痙攣而斃。



蛭 蝓

種類 負殼者為蝸牛。無殼者為蛭蝓。

用法 生搗塗敷。或焙研調傳。性質 鹹寒。無毒。

效能 塗瘡瘍。消腫痛。用作解蜈蚣毒之要藥。

主治 賊風喘僻。軟筋。及脫肛。驚癲。擊縮。

歷代記述攷證 【宋】寇宗奭本草衍義論蛭蝓曰。解蜈蚣毒。

【明】李時珍本草綱目論蛭蝓曰。腫毒。熱。熱。瘡。腫。痛。【明】繆希雍本草經疏論蛭蝓曰。蛭蝓蝸牛。稟陰溼之氣而生。故味鹹氣寒無毒。

經曰。清靜則肉腠閉拒。雖大風苛毒。弗能害也。如陰血虧竭。陽氣躁擾。則腠理不密。賊風乘虛而入。風主搖動。中於經絡。故喎僻。攣縮。軟筋。筋急。所自來矣。又風為陽邪。筋脈得之皆燥。急。燥。寒。能。陰。潤。燥。證除矣。驚痛者。風熱也。脫肛者。大腸熱也。腕跌者。血脈傷必發熱也。鹹寒。總除諸熱。所以主之。蜈蚣性畏二物。不敢過其所行之路。觸其身即死。故人取以治蜈蚣毒。【清】張隱菴本草原論蛭蝓曰。蛭蝓感雨溼之氣而生。故氣味鹹寒。主定驚。清熱。解毒。輪筋。寇宗奭曰。蛭蝓能解蜈蚣毒。近時治咽喉腫痛。風熱喉痺。用簪腳檢之內入喉中。冷吞下即愈。

近人學說 馬叔循曰。驗方新編治癰條下有蛭蝓和搗銅錢合

罌之方。予初欲試其方。而難得其

錢。一日捉蛭蝓數十條。選青錢五

六枚。於小口中搗之。頃刻而糜。抹之錢如粉而亮如金。惟治癰不見大效。因念物性相制。誠不堪理測。而其毀銅之功。當遠勝於胡桃

消腫毒。

歷代記述攷證

【明】李時珍

本草綱目論萊菔子曰下氣定喘治痰消食除脹利大小便止氣痛下痢後重發瘡疹【清】黃宮繡本草求真論萊菔子曰萊菔子氣味甚辛生用研注能吐風痰有倒牆推壁之功迅利莫禦若醋研數則癰腫立消炒熟則下氣定喘消食寬膨一生一熱性氣懸殊

參攷資料 ●萊菔子治痰有推牆倒壁之功(朱丹溪) ●萊菔子之功長於利氣生能升熱能降升則吐風痰散風寒發瘡疹降則定痰喘咳嗽調下痢後重止內痛皆是利氣之效予曾用果有殊績(李時珍)

【萊菔花】

主治 用糟下酒藏食之甚美明目

【萊菔粥】

基本 本品係萊菔和米煮成之粥

主治 消食利膈

【薤蒿】即青葙子之古籍別名典見本經詳「青葙子」條
【萌】即竹筍之古籍別名典見僧贊寧詳「竹筍」條

【萌蒿皮】即合歡皮之古籍別名典見綱目詳「合歡皮」條

【萍蓬草】

原名 水粟。命名 本品結子如粟如蓬子故名

處方用名 水粟根。

古醫別名 水粟子水粟包水笠綱目 堯葵骨蓬川骨(和漢藥考)

外國名詞 Nuphar japonicum, DC(拉丁)

基本 屬睡蓮科為萍蓬草之根。產地 凡池澤河流之淺水間恒有生長。

形態 萍蓬草為多年生草本。春日根間叢生多葉葉分二種出水之葉作箭形似里芋葉而長質稍厚在水中之葉則大而柔軟色亦較淡且大小不同大者可尺許小者纔二三寸夏秋之交水面自抽出花梗開五瓣之黃花大尺寸許形似梅花根為多節之長根頗似腐骨外面粗糙色帶褐處處有黑斑內部帶白色質輕如粉藥舖所售者多截作二三寸長更縱破

爲二



萍蓬草

採取 冬十月間採之。

製法 採得去粗皮曬乾。

性質 甘寒無毒。

主治 和血行瘀用爲消血藥。不饑厚腸胃。

國外學說 日本一本堂藥選曰萍蓬根在水中如骨狀故謂之川骨亦有栽植池中以賞玩者與荷花同故日本所在多有藥舖所售皆真用時去粗皮水洗到細破瘀血導新血治跌打損傷微毒癰結產後瘀血諸症又和漢三才圖會曰根甘寒如藕凶年人亦食之香味如藕煮食如栗補虛益氣力厚腸胃按萍蓬草根如腐骨(味鹹大冷)花黃色莖頭著葉夏月採根切片曝於暑熱石上如值陰雨則色變黑不堪用略似腐骨故俗呼川骨葉似款冬葉而稍軟日

本方多用之入金瘡跌傷及胎前產後藥中爲破血止血之要藥。

用量 錢半至三錢

參攷資料 ●萍蓬草生南方池澤葉大如荷花亦黃未開時狀如算袋其根如藕飢年可以當穀(陳藏器) ●水粟三月出水莖大如指葉似荷葉而大徑四五寸初生如荷葉六七月開黃花結實狀如角黍長二寸許內有細子一包如墨粟澤農採之洗擦去皮蒸曝舂取米作粥飯食之其根大如栗亦如雞頭子根狀年人亦食之作藕香味如栗子昔楚王渡江得萍實大如斗赤如日食之甜如蜜者蓋此類也若水萍安得有實耶三四月採莖葉取汁煮硫黃能拒火又段公路北戶錄有睡蓮亦此類也其葉如荷而大其花布葉數重當夏盡開花夜縮入水晝復出(李時珍)

【萍蓬草子】

性質 甘。澀。平。無毒。

主治 助脾厚腸令人不饑。

【薤蒿】即玉竹之古籍別名典見綱目詳「玉竹」條

飯上蒸熟。取去菜莢。以蘿蔔焙研末。糊丸。梧子大。每服五十丸。鹽湯下。日三服。(普濟方)

③治沙石諸淋。疼不可忍。用蘿蔔切片。蜜浸少時。炙乾數次。不可過焦。細嚼。鹽湯下。日三服。名眼眩膏。(普濟方)

④治遍身浮腫。出了子蘿蔔。淨麥等分。浸湯飲之。(聖濟總錄方)

⑤治脚氣走痛。蘿蔔煎湯洗之。仍以蘿蔔曬乾爲末。鋪襪內。(聖濟總錄方)

⑥治偏正頭痛。生蘿蔔汁一蜺殼。仰臥。隨左右注鼻中。神效。王荊公病頭痛。有道人傳此方。移時遂愈也。以此治人。不可勝數。(如宜方)

⑦治失音不語。蘿蔔生搗汁。入薑汁同服。(普濟方)

⑧治喉痺腫痛。蘿蔔汁和皂莢漿服取吐。(普濟方)

⑨治滿口爛瘡。蘿蔔自然汁頻漱。治涎妙。(集簡方)

⑩治湯火傷灼。生蘿蔔搗塗之。子亦可。亦治花火傷肌。烟熏欲死。(聖濟總錄方)

⑪治打撲血聚。皮不破者。用蘿蔔或葉搗封之。(邵氏方)

用量 錢半至三錢
施用宜忌 凡氣虛血虧諸症。禁用。服首烏地黃者忌之。

參攷資料 ①萊菔功同蕪菁。然力猛。更出其右。斷下方亦用其根。燒熟入藥。尤能制麵毒。昔有婆羅門僧來。見食麥麵者。驚云。此大熱。何以食之。又見食中有蘆根。乃云。賴有此以解其性。自此相傳。食麵必啖蘆根。(蘇頌) ②萊菔搗爛制麵作饅飪食之。最佳。飽食亦不發熱。酥煎食之下氣。凡人飲食過度。生嘔噦之便消。(蕭炳) ③洞微志云。齊州有人病狂。云夢中見紅裳女子。引入宮殿。中小姑令歌。每日遂歌云。五靈樓閣曉玲瓏。天府由來是此中。惆悵閨懷言不盡。一丸蘿蔔火吾宮。有一道士云。此犯大麥毒也。少女心神。小姑脾神。醫經言。蘿蔔制麵毒。故曰火吾宮。火者毀也。遂以藥并蘿蔔治之。果愈。又按張杲醫說云。饒民李七病鼻衄甚危。醫以蘿蔔自然汁和無灰酒飲之。即止。蓋血隨氣運。氣滯

故血妄行。蘿蔔下氣而酒導之。故也。又云。有人好食豆腐中毒。醫治不效。忽見賣豆腐人言。其妻誤以蘿蔔湯入鍋中。遂致不成。其人心悟。乃以蘿蔔湯飲之。而瘳。物理之妙如此。又延壽書載。李師逃難入石窟中。賊以烟熏之。垂死。摸得蘿蔔菜一束。嚼汁嚥下。此法備急。不可不知。(李時珍) ④萊菔俗名蘿蔔。按爾雅云。突蘆菔。孫炎註云。紫花菘也。俗呼溫菘。似蕪菁。大根俗名菘突。一名蘆菔是也。(韓保昇) ⑤紫花菘。溫菘。皆南人所呼。吳人呼楚菘。廣南人呼秦菘。(蘇頌) ⑥萊菔南北通有。北土尤多。有大小二種。大者肉堅。宜煮食。小者白而脆。宜生啖。河朔極有大者。而江南安州洪州信陽者甚大。重至五六斤。或近一秤。亦一時種時之力也。(蘇頌) ⑦萊菔今天下通有之。昔人以蕪菁萊菔二物混註。圓人種萊菔。六月下種。秋採苗。冬掘根。春末抽高臺。開小花紫碧色。夏初結角。其子大如大麻子。圓長不等。黃赤色。五月亦可再種。其葉有大者如蕪菁。細者如花芥。皆有

細柔毛。其根有紅白二色。其狀有長圓二類。大抵生沙壤者脆而甘。生瘠地者堅而辣。根葉皆可生可熟。可菹可醬。可豉可醋。可糖可腊。可飯。乃蔬中之最有利益者。而古人深詳之。豈因其賤而忽之耶。抑未諳其利耶。(李時珍)

古籍別名 溫菘子。子。菘子。登菘子。楚菘子。菘菘子。蘿白子。蘿肥子。蘆菔子。蘆菘子。紫花菘子。(和漢藥考)

形態 萊菔子爲蘿蔔之扁平長圓形種子。大如麻子。表面呈黃赤色。

性質 辛。甘。平。無毒。

效能 用作健胃祛痰藥。及爲消化藥。又治惡臭性枝氣管炎。慢性消化不良症。

作用 入胃能助胃液消化。澱粉。使造成多量之糖素。至腸始漸次吸入腸壁而達血中。令血液氣化增進。全身熱量增高。肺臟之呼吸作用。亦同進行。痰質遂被迫而出。

主治 研汁服。吐風痰。同醋研。

裂。剛硬而有毛茸。梢上分歧。開淡紫或白色四瓣十字花。作繖狀花序排列。後結莢形閉果。根長。大白色多肉。



(二) 萊菔

種植 田圃恒以栽種。乃供菜茹食用。每年五六月或八九月下種。約經百日採食。

採取 秋採苗。冬採根。夏採子。

用法 搗汁用。

性質 辛甘無毒。

效能 破氣化痰。清熱消食。

主治 散服及炮炙服食。天下氣。消穀和中。去痰癖。肥健人。生瘡。

汁服 止消渴。試大有驗。

歷代記述攷證 【唐】蕭炳四

聲本草論萊菔曰。利關節。理顏色。

練五臟惡氣。制麪毒。行風氣。去除

邪熱氣。【唐】孟詵食療本草論萊

菔曰。利五臟輕身。令人白淨。肌細。

【宋】日華諸家本草論萊菔曰。消

痰止咳。兼治肺痿吐血。溫中補不

足。同羊肉銀魚羹食。治勞瘵咳嗽。【元】吳瑞日用本草論萊菔曰。搗汁服。治吐血衄血。【明】汪穎食物

本草論萊菔曰。同猪肉食。益人生

搏服治禁口痢。【明】寧原食鑑本

草論萊菔曰。寬胸膈。利大小便。生

食止渴。寬中。煮食化痰消導。【明】

汪機本草會編論萊菔曰。殺魚腥

氣。治豆腐積。【明】李時珍本草綱

目論萊菔曰。主吞酸。化積滯。解酒

毒。散瘀血。甚效。未服治五淋。丸服

治白濁。煎湯洗脚氣。飲汁治下痢

及失音。并烟薰欲死。生搗塗打撲

湯火傷。【明】繆希雍本草經疏論

萊菔曰。萊菔根味辛甘。氣溫。無毒。

孟詵云。性冷。大明云。平。詳其功用。

應是生者味辛。性冷。熟者味甘。溫

平。故本經下氣消穀。去痰癖。肥健

人。及溫中補不足。寬胸膈。利大小

便。化痰消導者。煮熟之用也。止消

渴。制麪毒。行風氣。去邪熱。氣治肺

痿吐血。肺熱咳嗽。下痢者。生食之

用也。大抵入手足太陰手足陽明

經。故所主皆脾胃腸胃之病。【明】

李士材本草圖解論萊菔曰。萊菔

辛甘。下氣消食。和中化痰。解醒散

血。大治吞酸。搗汁服。治吐血衄血。消

渴。塗跌打湯火傷。解麪毒。楊億云。

種芋三十畝。省米三十斛。種菔三

十畝。益米三十斛。則蘿蔔果能消

食也。服地黃何首烏。忌食蘿蔔。令

人髮變白。有人被賊。火薰垂死。以

蘿蔔菜生嚼汁嚥。即甦。子能定喘

消痰。消食除脹。利大小便。消癰腫

毒。生用能升。熟用能降。

配合應用 ①治年遠脾泄。百

藥不效。單煮白萊菔終日啖之。不

輟必差。

②治食物作酸。蘿蔔生嚼數片。

或生菜嚼之。亦佳。絕妙。乾者熟者

鹽醃者。及人胃冷者。皆不效。【集

簡方】

③治反胃噎疾。蘿蔔蜜煎浸。細

細嚼嚥良。【普濟方】

④治消渴飲水。獨勝散。用出了

干蘿蔔三枚。淨洗切片。日乾。爲末。

每服二錢。煎豬肉湯。澄清調下。日

三服。漸增至三錢。生者搗汁亦可。

或以汁煮粥食之。【圖經方】

⑤治肺痿咳血。蘿蔔和羊肉或

鯽魚煮熟類食。【普濟方】

入酒少許熱服。并以汁注鼻中。皆

良。或以酒煎沸入蘿蔔再煎飲之。

【易簡方】

⑥治下痢禁口。蘿蔔搗汁一小

盞。蜜一盞。水一盞。同煎。早。一服。午

一服。日啖米飲吞阿膠丸百粒。如

無蘿蔔。以子搗汁亦可。一方加枯

礬七分。同煎。一方只用蘿蔔菜煎

湯。日飲之。又用蘿蔔片不拘新

舊。染蜜嚥之。嚥汁味淡。再換。覺思

食。以肉羹粥與食。不可過多。亦治

痢後腸痛。【普濟方】

⑦治大腸便血。大蘿蔔皮燒存

性。荷葉燒存性。蒲黃生用。等分爲

末。每服一錢。米飲下。【普濟方】

⑧治腸風下血。蜜炙蘿蔔。任意

食之。昔一婦人服此有效。【百一

選方】

⑨治酒疾。下血。連旬不止。用大

蘿蔔二十枚。留青葉寸餘。以井水

入罐中。煮十分爛。入淡醋空心任

食。【壽親養老方】

⑩治大腸脫肛。生萊菔搗。實臍

中。束之。覺有瘡。即除。【摘玄方】

⑪治小便白濁。生蘿蔔剉碎。留

而必以大明氏爲荒謬之尤。不知瀕湖何所取裁。亦爲之作抄書膏而不加芟難耶。

配合應用 ①草薺得牛膝、木瓜、慈苳仁、黃藥、骨碎補續斷、杜仲、石斛、生地、黃狗脊、治腰脊痛、強骨節、加尤苳蒲、茯苓、治周痺。

②草薺同黃耆、生地、黃金銀花、皂角刺、皂莢子、牛膝、木瓜、石斛、慈苳仁、海風藤、白殭蠶、胡麻、治惡瘡久不瘳。

③草薺同蓮子、茯苓、車前子、木通、澤瀉、牛膝、黃藥、甘草、可分清除溼。

④治腰脚痺軟、行履不穩者、草薺二十四分、杜仲八分、搗篩、每旦溫酒服三錢、比禁牛肉。(唐德宗貞元廣利方)

⑤治小便頻數、川草薺一斤爲末、酒糊丸、梧子大、每鹽酒下七十丸。(集玄方)

⑥治白濁頻數、凝面如油、澄下如膏、乃真元不足、下焦虛寒、草薺分清飲、用草薺、石菖蒲、益智仁、烏藥等分、每服四錢、水一盞、入鹽一捻、煎七分、食前溫服、日一服、效乃

止。

⑦治腸風痔漏、如聖散、用草薺、貫衆、去土等分爲末、每服三錢、溫酒空心服之。(孫尚藥傳家祕寶方)

⑧治頭痛發汗、草薺、旋覆花、虎頭骨、酥炙、等分爲散、欲發時、以溫酒服二錢、暖臥取汗、立瘳。(聖濟總錄方)

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡陰虛而無溼熱者、禁用。畏葵根、大黃、柴胡、前胡、忌茗醋。惡苳爲之使。

參攷資料 ①草薺、拔莢、土茯苓、三物形雖不同、而主治之功不相遠。豈亦一類數種乎。雷斅炮炙論序云、薺、皺、旋、多、夜、煎、竹、木、竹、木、草、薺、也、旋、多、白、濁、皆、是、溼、氣、下、流、草、薺、能、治、陽、明、之、溼、而、固、下、焦、故、能、去、濁、分清、楊、俊、家、藏、方、治、真、元、不、足、下、焦、虛、寒、小、便、頻、數、白、濁、如、膏、有、草、薺、分清、飲、正、此、意、也、又、楊、子、建、萬、全、護、命、方、云、凡、人、小、便、頻、數、不、計、度、數、便、壅、內、痛、不、可、忍、者、此、疾、必、先、大、腑、秘、熱、不、通、水、液、只、就、小、腸、大、腑、愈、加、乾、竭、甚、則、渾、身、

熱、心躁思涼水。如此即重症也。此疾本因食酒色。積有餘毒。腐物瘀血之類。隨虛水入於小腸。故便時作痛。也不飲酒者。必平生過食辛熱。輩膩之物。又因色傷。而然。此乃小便頻數而痛。與淋證溼而痛者不同也。宜用草薺一兩。水浸少時。以鹽半兩同炒。去鹽爲末。每服二錢。用水一盞。煎八分。和滓服之。使水道轉入大腸。仍以葱湯頻洗穀道。令氣得通。則小便數及痛自減也。(李時珍) ②此有二種。莖有刺者。根白實。無刺者。根虛軟。輒者爲勝。蔓生。葉似薺。預(蘇恭) ③草薺蔓生。葉似拔莢。而大如盤。其根硬大者。如商陸。而堅。今人皆以土茯苓爲草薺。誤矣。莖葉根苗皆不同。(李時珍) ④土茯苓與草薺形雖不同。功用相倣。亦善祛風除溼。去濁分清。均治惡瘡化毒。東山經言食之已風。此頭風方中。所以用之神效歟。俗稱寒冷。服之無子。不知本草謂其甘淡性平。有健脾胃。止泄瀉。補下焦。治陰痿之功也。(顧松園)

【莨菪】即羊桃之古籍別名。典見

熱。心躁思涼水。如此即重症也。此疾本因食酒色。積有餘毒。腐物瘀血之類。隨虛水入於小腸。故便時作痛。也不飲酒者。必平生過食辛熱。輩膩之物。又因色傷。而然。此乃小便頻數而痛。與淋證溼而痛者不同也。宜用草薺一兩。水浸少時。以鹽半兩同炒。去鹽爲末。每服二錢。用水一盞。煎八分。和滓服之。使水道轉入大腸。仍以葱湯頻洗穀道。令氣得通。則小便數及痛自減也。(李時珍) ②此有二種。莖有刺者。根白實。無刺者。根虛軟。輒者爲勝。蔓生。葉似薺。預(蘇恭) ③草薺蔓生。葉似拔莢。而大如盤。其根硬大者。如商陸。而堅。今人皆以土茯苓爲草薺。誤矣。莖葉根苗皆不同。(李時珍) ④土茯苓與草薺形雖不同。功用相倣。亦善祛風除溼。去濁分清。均治惡瘡化毒。東山經言食之已風。此頭風方中。所以用之神效歟。俗稱寒冷。服之無子。不知本草謂其甘淡性平。有健脾胃。止泄瀉。補下焦。治陰痿之功也。(顧松園)

【莨菪】即羊桃之古籍別名。典見

熱。心躁思涼水。如此即重症也。此疾本因食酒色。積有餘毒。腐物瘀血之類。隨虛水入於小腸。故便時作痛。也不飲酒者。必平生過食辛熱。輩膩之物。又因色傷。而然。此乃小便頻數而痛。與淋證溼而痛者不同也。宜用草薺一兩。水浸少時。以鹽半兩同炒。去鹽爲末。每服二錢。用水一盞。煎八分。和滓服之。使水道轉入大腸。仍以葱湯頻洗穀道。令氣得通。則小便數及痛自減也。(李時珍) ②此有二種。莖有刺者。根白實。無刺者。根虛軟。輒者爲勝。蔓生。葉似薺。預(蘇恭) ③草薺蔓生。葉似拔莢。而大如盤。其根硬大者。如商陸。而堅。今人皆以土茯苓爲草薺。誤矣。莖葉根苗皆不同。(李時珍) ④土茯苓與草薺形雖不同。功用相倣。亦善祛風除溼。去濁分清。均治惡瘡化毒。東山經言食之已風。此頭風方中。所以用之神效歟。俗稱寒冷。服之無子。不知本草謂其甘淡性平。有健脾胃。止泄瀉。補下焦。治陰痿之功也。(顧松園)

熱。心躁思涼水。如此即重症也。此疾本因食酒色。積有餘毒。腐物瘀血之類。隨虛水入於小腸。故便時作痛。也不飲酒者。必平生過食辛熱。輩膩之物。又因色傷。而然。此乃小便頻數而痛。與淋證溼而痛者不同也。宜用草薺一兩。水浸少時。以鹽半兩同炒。去鹽爲末。每服二錢。用水一盞。煎八分。和滓服之。使水道轉入大腸。仍以葱湯頻洗穀道。令氣得通。則小便數及痛自減也。(李時珍) ②此有二種。莖有刺者。根白實。無刺者。根虛軟。輒者爲勝。蔓生。葉似薺。預(蘇恭) ③草薺蔓生。葉似拔莢。而大如盤。其根硬大者。如商陸。而堅。今人皆以土茯苓爲草薺。誤矣。莖葉根苗皆不同。(李時珍) ④土茯苓與草薺形雖不同。功用相倣。亦善祛風除溼。去濁分清。均治惡瘡化毒。東山經言食之已風。此頭風方中。所以用之神效歟。俗稱寒冷。服之無子。不知本草謂其甘淡性平。有健脾胃。止泄瀉。補下焦。治陰痿之功也。(顧松園)

爾雅。詳「羊桃」條。
【莨菪子】即莨菪子。詳「莨菪子」條。

【莨菪】即藜之古籍別名。典見陸璣詩疏。詳「藜」條。

【萊菔】 命名 本品在上古謂之蘆菔。中古轉爲萊菔。後世遂訛爲蘿蔔。蘿蔔乃俗名也。古籍別名 蘆菔、蘿蔔、菔突、紫花菔、沙蘿蔔(綱目)、溫菔、土酥(爾雅)、菔蕪(廣韻)、楚菔、秦菔(圖經)、破地維、夏生(王禎農書)、外國名詞 Rhabanus Sa-

tivus, L. (拉丁) Radish-seed (英)

基本 屬十字花科。爲蘿蔔之根。

產地 萊菔各省均有。江蘇以宜興者爲佳。

形態 莖爲一年或越年生。草本莖高達三四尺。葉作羽狀分



(一) 萊菔

經希雅本草經疏論草薺曰。草薺味苦甘平。無毒。爲祛風除溼補益下元之要藥。故主腰背痛。強骨節。風寒溼周痺。惡瘡不瘳。熱氣傷中。悲恐陰痿。失溺關節。老血。老人五緩。正以苦能燥溼。甘入脾而益血。故悉主之。甄權又主冷風痺。腰脚癱緩不遂。手足驚掣。男子腰骨久冷。腎間有溼。膀胱宿水。日華子主頭旋痛。痰水。臍堅。筋骨益精。明目。中風失音。海藏主肝虛。李氏治白濁莖中痛。痔漏瘻瘡。已上諸證。無非陽明溼熱流入下焦。客於肝腎所致。此藥祛陽明之溼熱。以固下焦。故能去濁分清。而療下元虛冷溼邪爲病也。【明】李士材本草圖經論草薺曰。草薺苦平。胃與肝藥也。搜風去溼。補腎強筋。主白濁莖中痛。陰痿失溺。惡瘡入肝。搜風。故能理風與筋之病。古人或稱其攝濁之功。或稱其逐水之效。何兩說相懸耶。不知腎爲閉蟄封藏之本。腎氣強旺。則自能收攝。而妄水亦無容藏之地。且善清胃家溼熱。故能去濁分清也。楊氏草薺分清

飲。正得此意。【清】黃宮繡本草求真論草薺曰。草薺味苦氣平。功祛風除溼固腎。凡人大便燥結。小便頻數。每於便時。痛不可忍。者此必大便熱閉。積熱腐瘻。瘀滯。同液乘虛流入小腸。故於便時。即作痛也。且水道不清。則溼熱不除。而肝火愈熾。筋骨愈癢。草薺氣味苦平。既能入肝祛風。復能引水歸入大腸。以通穀道。俾水液澄清。而無痛苦之患矣。又安有痺痛腰冷。膀胱宿水。與陰痿失溺。痔漏瘻瘡之累乎。昔人云。既有逐水之功。復有攝精之力。洵不誣耳。按薺。土茯苓與草薺雖不相類。而功用不遠。白虛輒者良。【清】賈九如辨藥指南論草薺曰。草薺性味淡薄。長於滲溼。帶苦亦能降下。主治風寒溼痺。男子白濁。莖中作痛。女人白帶。病後胃中濁氣下流所致。以此入胃驅溼。其症自愈。又治瘡疥惡厲。溼鬱肌腠。營衛不得宣行。致經脈拘攣。手足不便。以此滲去脾溼。能令血脈調和也。

近人學說 張山雷曰。草薺蔓生。故性流通。脈絡而利筋骨。入藥用根。則沈墜下降。故主治下焦。雖微苦能泄。而質輕氣清。色味皆淡。則清熱理溼。多入氣分。少入血分。本經主腰背痛。乃腎有溼熱。濁氣不去。而腰脊爲之疼痛。非腎虛無溼之腰痛。所可渾同施治。強骨節者。宜通百脈。溼濁去而正氣自強。非能補益。以助其強固。此藥理之至易辨者。楊氏有草薺分清飲。專治溼熱淋濁。正是此意。惟方中有益智仁溫而且澁。性正相反。不能並列。殊有誤會。瀨湖綱目謂草薺能治陽明之溼。而固下焦。故能去濁分清。立說甚允。然又謂楊氏此方。治真元不足。下焦虛寒。小便頻數云云。則與草薺性情兩相背謬。殆爲智仁一物。而展轉誤認。甚非藥理之真。讀古人書。慎勿爲其所眩。本經又主風寒溼周痺。頗謂惟溼熱痺著。最爲合宜。若曰風寒必非此苦澁淡滲者。所能倖效。又治惡瘡不瘳。熱氣者。豈非爲溼與熱薰之主藥乎。別錄謂主傷中。亦惟脾爲溼困者。宜之。決非補中之藥。又治悲恐。頗不可解。又謂陰痿失溺。則溼熱閉結者。亦有委甃不

仁。洩溺不利之症。必非可以起虛痿。又謂治老人五緩。關節老血。則語大浮泛。且與草薺真性。不相符合。何可輕信。不謂穆仲淳因此二語。竟謂此物爲補益下元之要藥。又謂甘入脾而益血。以滲泄利溼之效用。而說到補陰上去。可謂顛預已極。不如石頑逢原。謂古人或稱攝精。或稱利水。何其兩說相懸。不知溼濁去而腎無邪熱之擾。腎氣業能收攝。頗能窺見玄奧也。甄權謂主冷氣痛。痺腰脚癱緩不遂。男子腎腰痛久冷。【晉】公對切音憤。玉篇謂腰忽痛也。【壽】頤按此即周痺陰萎之症。然惟溼熱爲患。乃宜此藥。甄氏冷氣久冷之說。大誤。甄又謂治腎間有溼。膀胱宿水。是也。而今本瀨湖綱目引此二句。脫一溼字。乃作腎間有膀胱宿水。遂令人無從索解。俗本誤人。真是不小。穆氏經疏引此。不誤。王好古謂補肝虛。亦不可訓。尤奇者。莫如日華本草。竟謂補水臟。堅筋骨。益精明。目頭旋痼疾。中風失音云云。龐雜之極。最爲蕪穢。顧每謂唐宋人藥物之學。固多有未可盡信者。

形。莖。草。薺。爲。莖。生。草。本。苗。薺。

俱青葉作三叉似山薯又似綠豆
葉花有黃紅白數色亦有無花而

結白子者其根爲黃白色多節之根粗四五分狀如山藥。

採取 二月八月採根曝乾。

製法 凡使須以其根細長淺。

白而虛軟者佳酒浸一宿焙乾或鹽水炒用。

性質 苦平無毒
效能 瀉血分。溼熱。癰淋濁水。

瀉用爲治風利。溼及諸瘡藥。
主治 腰脊痛。強骨節。風寒溼。

周痺。惡瘡。不瘳。熱氣。（本經）傷中。悲怒。陰痿。失溺。老人五緩。關節老。

歷代記述攷證【唐】甄權藥

性本草論草薺曰冷風癰痺腰肚
癱緩不遂手足驚掣男子腎腰痛

諸家本草論萆薢曰頭旋痼疾補

王好古湯液本草論葶藶曰補肝

虛【明】李時珍本草綱目論黃疸
曰治白濁莖中痛痔瘻壞瘡【明】

東之土太。
形。莖。草。薺。爲。蔓。生。草。本。苗。薺。

俱青葉作三叉似山薯又似綠豆
葉花有黃紅白數色亦有無花而

結白子者其根爲黃白色多節之根粗四五分狀如山藥。

採取 二月八月採根曝乾。

製法 凡使須以其根細長淺。

白而虛軟者佳酒浸一宿焙乾或鹽水炒用。

性質 苦平無毒
效能 瀉血分。溼熱。癰淋濁水。

瀉用爲治風利。溼及諸瘡藥。
主治 腰脊痛。強骨節。風寒溼。

周痺。惡瘡。不瘳。熱氣。（本經）傷中。悲怒。陰痿。失溺。老人五緩。關節老。

歷代記述攷證【唐】甄權藥

性本草論草薺曰冷風癰痺腰肚
癰緩不遂手足驚掣男子腎腰痛

諸家本草論萆薢曰頭旋痼疾補

王好古湯液本草論葶藶曰補肝

虛【明】李時珍本草綱目論黃疸
曰治白濁莖中痛痔瘻壞瘡【明】

【菴摩落迦果】即菴摩勒之古籍別名。典見梵書。詳「菴摩勒」條。

【菴摩羅迦果】即菴摩羅果之古籍別名。典見佛書。詳「菴摩羅」條。

【菴羅果】
古籍別名 菴摩羅迦果（佛書）香蓋

（綱目）

基本 出西域諸地。安南諸番地亦有之。

形態 菴羅果爲果類。奈屬之一種。葉似茶葉。實似北梨。夏月乃成熟。可供食與藥用。其葉詳見該條。

採取 五月六月採之。

性質 甘溫無毒。

主治 食之止渴。

歷代記述攷證 【唐】陸士良

食性本草論菴羅果曰主婦人經脈不通丈夫營衛中血脈不行久食令人不飢。

參攷資料 菴羅果動風。凡天

行病及食飽後俱不可食。同大蒜辛物食之令人患黃病（馬志）

【菴羅葉】
基本 本品即菴羅果之葉也。

主治 渴疾煎湯飲。

【菴蘭子】
命名 菴草堂也。閩里門也。本品老莖可以蓋覆菴間。故名。

處方用名 菴蘭實。蘭蒿子。菴蘭蒿。

古籍別名 覆蘭（綱目）大蓬（日本）

基本 係菊科艾屬。爲菴蘭之子實。

產地 凡山野川澤及平原溼地。恒有生長。

形態 菴蘭爲溼草類之多年生草本。高數尺。莖白如艾而粗。葉如菊而缺刻不深。質厚。稍葉較細。通常有三尖。夏秋間自葉腋出細莖開小頭狀花。排列作穗狀。色淡黃或淡褐色。似牡蒿而微大。其實小如艾。中有細子。極易繁衍。採得子實供藥用。

採取 九十月間採之。

製法 採得陰乾用。

性質 苦。微寒。無毒。

效能 散瘀血止痛。逐水邪。消腫。用作利尿藥。又爲活血鎮痛藥。

主治 五臟瘀血。腹中水氣。臧膜留熱。風寒溼痺。身體諸痛。久服

輕身延年不老（本經）又療心下堅。脇中寒熱。周痺。婦人月水不通。消食明目（別錄）

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論菴蘭子曰益氣。主男子陰痿不起。治心腹脹滿【宋】大明諸家本草論菴蘭子曰腰脚重痛。膀胱痛及骨節煩痛。不下食【明】李時珍本草綱目論菴蘭子曰搗酒飲。治因挫腰痛及婦人產後血氣痛【明】李士材本草圖解論菴蘭子曰菴蘭子味苦。微寒無毒。主風寒溼痺水腫。

配合應用 ①菴蘭子同牛膝。茜草白芨消腹癰。去留血。又主瘀血腹脹。俗呼爲單腹脹。四肢不腫者是其候也。

②善辟蛇。蛇著之即爛。

③治癰血不散。變成癰腫。生菴蘭蒿搗汁一升服之（廣利方）

④治月水不通。婦人宿有風冷。留血積聚。月水不通。菴蘭子一升。桃仁二升。酒浸去皮尖。研勻。入瓶內。以酒二升。浸封五日。後每飲三合。日三服（聖惠方）

⑤治產後血痛。菴蘭子一兩。水

一升。童子小便二盃。煎服。（瀕湖集簡方）

用量 錢半至二錢。

施用宜忌 凡無瘀滯溼阻者。禁用。荊實意爲之使。

參攷資料 ①本經言久服輕身不老。而古方少有服食者。惟入諸雜治藥中。如胡治治驚邪。狸骨丸之類。大方中用之。孫思邈千金翼。韋伯獨行方。主跪折瘀血。並單用菴蘭煮汁服。亦可未服。今人治打撲多用此法。或飲或散。其效最速（蘇頌）②貞元廣利方謂之菴蘭蒿云。又史注云。菴蘭軍行宿室也。則間似當作廬（李時珍）③菴蘭子生雍州川谷。亦生上黨及道邊。十月採實陰乾（別錄）④今江淮亦有之。春生苗。葉如艾蒿。高二三尺。七月開花。八月結實。九月採實（蘇頌）⑤狀如蒿艾之類。近道處處有之。仙經亦時用之。人家種此辟蛇也（陶弘景）⑥菴蘭葉不似艾。似菊葉而薄。多細丫。而背皆青。高者四五尺。其莖白色。如艾實中有細子。極易繁衍。莖花者以之接菊（李時珍）

十二畫 菱

水族中此物最不治病。若過食腹脹者。可燒薑酒服之。即消。亦可含吳茱萸咽津。(孟詵) 仇池筆記言菱花開背日。夾花開向日。故菱寒而夾暖。別錄言菱實性平。豈生者性冷而乾者則性平歟。(李時珍) 其葉支散。故字從支。其角棱峭。故謂之菱。而俗呼為菱角也。昔人多不分別。淮王安貧武陵記以三角四角者為菱。兩角者為菱左傳屈到嗜菱。即此物也。爾雅謂之厥藴。音肩。又許慎說文云。菱。楚謂之菱。秦謂之薺。唐楊氏丹鉛錄以菱為雞頭。引離騷。薺荷以為衣。言菱葉不可緝衣。皆誤矣。按爾雅薺荷。乃決明之名。非厥藴也。又爾雅菱荷。乃藕。上出水生花之莖。非雞頭也。與菱同名異物。(李時珍) 菱莖有湖澤處則有之。菱落泥中。最易生發。有野蔞家菱。皆三月生。莖延引葉浮水上。扁而有尖。光而如鏡。葉下之莖。有股如蝦。一莖一葉。兩兩相差。如蝶翅狀。五六月開小白花。背日而生。晝合宵抗。隨月輕移。其實有數種。或三角四角。或兩角無角。野菱自生湖

菲 芡 菴

中。葉實俱小。其角硬直。刺人。其色嫩青。老黑。嫩時割食。甘美。老則蒸食之。野人曝乾。剝米為飯。為粥。為饅。為果。皆可代糧。其莖亦可曝收。和米作餅。以度荒歉。蓋澤農有利之物也。家菱種於陂塘。葉實俱大。角更而脆。亦有兩角彎卷如弓形者。其色有青有紅有紫。嫩時割食。皮脆肉美。蓋佳果也。老則殼黑而硬。墜入江中。謂之烏菱。冬月取之。風乾為果。生熟皆佳。夏月以蠶水澆其葉。則實更肥美。按段成式酉陽雜俎云。蘇州折要菱。多兩角。荊州郢城菱。三角無刺。可以按莎。漢武帝昆明池有浮根菱。亦曰青水菱。莖沒水下。菱出水。上或云玄都有雞翎菱。碧色。狀如雞飛。仙人甌伯子常食之。(李時珍)

【菱肉】即菱之處方用名。詳「菱」條。
【菱弟】即芡實之古籍別名。典見和漢藥考。詳「芡實」條。
【菱角】即菱之處方用名。詳「菱」條。

【菱粉】基本 本品係用菱莖搗浸澄出之粉。

製法 同藕粉條。
主治 補脾胃。強脚膝。益氣耐饑。健力行水。去暑解毒。
參攷資料 菱粉食之腹脹者。用葛湯或酒可解之。(趙學敏)

【菱殼】採取 以老而堅黑者入藥良。

性質 濡無毒。

主治 頭面黃水瘡。無名腫毒。指頭天蛇。燒灰香油調敷。脫肛。先以麻油潤腸頭塗。再以菱殼水洗之。染髮髮。

【菱蒂】主治 去疣子。取鮮者搽之。

【菱實粉粥】基本 本品係用菱實粉和米煮成之粥。

主治 益腸胃。解內熱。
【菲根】即羊蹄之古籍別名。典見和漢藥考。詳「羊蹄」條。

【葦草】即葦草之古籍別名。典見許慎說文。詳「葦草」條。

【葦摩勒】古鑿別名 餘甘草。(唐本) 葦摩落迦果。

基本 係大戟科神子木屬。為(梵書)

一三六四

葦摩勒之實與仁。

產地 生山谷中。

形態 葦摩勒為喬木類之落葉木。本葉長五六分。為線狀橢圓形。葉端鈍。對生於纖枝上。並列而如羽狀複葉。雄花雌花生於同株。花細小。黃色。雄花叢生。有花梗。雌花少數。無梗。花被五六片。為卵長形。結實為肉質。形圓而帶六稜。大如梅子。色青白。連核作五六瓣。乾則並核皆裂。至冬成熟。其實與仁俱可供藥用。

性質 甘寒。無毒。

主治 風虛熱氣。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論葦摩勒實與仁。補益強氣。合鐵粉一斤用。變白不老。取子壓汁和油塗頭。生髮。去風癢。令髮生如漆黑。【唐】李珣海藥本草論葦摩勒實與仁。曰主丹石傷。肺上氣咳嗽。久服輕身延年。長生服乳石人宜常食之。【宋】寇宗奭本草衍義論葦摩勒實與仁。曰為末點湯服。解金石毒。【明】李時珍本草綱目論葦摩勒實與仁。曰解硫黃毒。

並未傳之。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論菩薩石曰。明日去翳。

【菩薩豆】即續隨子之古籍別名。

【見日華諸家本草。詳『續隨子』條。

【菩薩草】 產地 生江浙諸省之山野間。

形態 菩薩草爲毒草類之一種。四時不凋。秋冬有花。結赤子如

蕁頭。其根可供藥用。採取 冬月採之。

性質 苦。無毒。

主治 中諸食毒。酒研服。諸蟲傷。搗汁飲。并傳患處。妊娠咳嗽。搗飾蜜丸服。

【華木】即芙蓉之古籍別名。典見綱目。詳『芙蓉』條。

【華草】即陸英之古籍別名。典見別錄。詳『陸英』條。

【華蓋】即黃丹之古籍別名。典見和漢藥考。詳『黃丹』條。

【華蟲】即雉之古籍別名。典見綱目。詳『雉』條。

【蕓】即茭白之原名。詳『茭白』條。

食物本草。詳『土菌』條。
【菰手】即茭把之原名。詳『茭把』條。
【菰米】即茭米之原名。詳『茭米』條。
【菰苳】即茭把之古籍別名。典見蜀本草。詳『茭把』條。
【菰根】即茭白根之別名。詳『茭白根』條。
【菰筍】即茭白之芽。典見綱目。詳『茭白』條。
【菰菜】即茭白之古籍別名。典見圖經本草。詳『茭白』條。
【菰詩】即茭白根之古籍別名。典見綱目。詳『茭白根』條。
【菰蔣草】即茭白之苗有莖梗者。典見本草拾遺。詳『茭白』條。
【菱】 原名 菱實。
命名 本品苗葉支散。故字從支。其角棱峭。故謂之菱。
處方用名 菱角。菱肉。
古籍別名 菱（別錄） 水果。（風俗通） 厥藟。藟（爾雅） 沙角。陵野菱。家菱。折腰菱。郢城菱。浮根菱。青水菱（綱目） 烏菱（俗名）
外國名詞 Trapa natans,

1 (Trapa chinensis, Lour.)
(拉丁) ヲシ ヒシノミ (日本)
基本 係菱科菱屬。藥用其角。

產地 多在池澤陂塘中。

形態 菱爲水草類之一年生草本。根生土中。其莖自水中達水面。及細裂之根狀葉。漂於水中。葉略作三角形。有鋸齒。葉柄長。浮水面。中部膨大爲浮囊。夏月開花。花白。有四瓣雄蕊。四枚單生於葉腋。果實爲兩角形。有青紅二色。與花殼。粉粉皆可療疾。詳各該條。



菱

採取 夏秋採之。
用法 生食或蒸煮。或搗爛澄粉用。

性質 甘。平。無毒。

效能 消暑。泄熱。用作解熱解毒藥。又爲滋補劑。

主治 安中。補五臟。不飢。輕身。

歷代記述攷證 【南北朝】陶弘景本草集註論菱曰。蒸暴和蜜餌之。可斷穀長生。【宋】蘇頌嘉祐

圖經本草論菱曰。解丹石毒。【明】李時珍本草綱目論菱曰。解暑。解

傷寒。積熱。止消渴。解酒毒。射菌毒。

【清】黃宮繡本草求真論菱曰。菱

角種類雖多。氣滯則一。即書有言

安中消水。止渴解酒。療瘧治痢。及

有紅蕩白補。生熟降升之說。然亦

止供食品。而於治療則無。且於過

食則有腹滿煩脹。損陽痿莖之虞。

必取麝香生薑吳茱萸作湯。及或

沉香磨汁以導。是亦味甘性寒。助

溼增滯之一證也。乎性平之說。似

不足信。【清】王士雄隨息居飲食

譜論菱曰。菱實鮮者甘涼。析醒清

熱。多食損陽助溼。胃寒脾弱人忌

之。老者風乾。肉反轉燥。熟者甘平

充飢代穀。亦可澄粉。補氣厚腸。多

食滯氣。胸腹痞脹者忌之。茨花向

日。萎花向月。故秋煖而落寒。鏡號

菱花。謂女人容貌如月也。

參攷資料 ①搗爛澄粉食。補

中延年（廬仙）②生食性冷利。多

食傷人臟腑。損陽氣。癢瘰生蠱蟲。

膩滯者絕異。繆仲醇謂五味之中辛通四氣。經言辛以潤之。菟絲子之屬是也。與辛香燥熱之辛迥乎不同。所解極爲剴切。本經續絕傷補不足。益氣力。肥健人。於滋補之中。皆有宜通百脈。溫運陽和之意。不僅以物質主治。而含天然之氣味性情。此吾國藥物之學。不言理化。而實得理化之學。最上乘者。汁去面好。亦柔潤肌膚之功用。久服則陰液足。而目自明。陽氣長。而身自輕。皆有至理。弗疑爲仙佛家欺人之語。別錄所謂養陰強肌。堅筋骨。亦陰陽兩調之義。莖寒。精滑。則元陽不運。而至陰不攝也。溺有餘瀝。則腎陽不布。而大氣不舉也。若夫口苦燥渴。明爲陰液之枯涸。寒血成積。亦爲陽氣之不宜。惟此善滋陰液。而又敷布陽和。流通百脈。所以治之。以視地黃輩之專於補陰。守而不走者。固有間矣。(張山雷)

【菟絲子苗】

性質 甘平。無毒。

主治 研汁塗面去面黥。
歷代記述攷證 【南北朝】陶

弘景本草集註論菟絲子苗曰。接碎煎湯。浴小兒。瘰癧。參攷資料 菟絲子苗汁。伏三黃。硫末。結草砂。(綱目)

【菟葵】

古籍別名 天葵。(圖經) 著雷丸草。(外丹本草) 節分草。植物學大辭典

外國名詞 Eranthis pinnatifida, Maxim. (拉丁) セツパンサウ(日本)

基本 係毛茛科菟葵屬。藥用其苗莖。

產地 凡山野樹陰平原澤田間有出。

形態 菟葵爲溼草類之多年野生草本。莖高三寸或五寸。葉爲掌狀深裂。有長葉柄。三四月間在葉之總苞間抽出一梗。開白色五瓣花於莖頂。其莖紫黑。堪供藥用。

採取 六七月間採莖葉。日乾用。

性質 甘寒。無毒。

主治 下諸石五淋。止虎蛇毒。諸瘡搗汁飲之。塗瘡能解毒止痛。

參攷資料 菟葵苗如石龍芮而莖光澤。花白似梅。其莖紫黑。

莖嫩極滑。所在下澤田間皆有。人多識之。六月七月採莖葉。曝乾入藥。(蘇恭) 郭璞注爾雅云。菟葵似葵而小。葉狀如葵。有毛。灼之可食。而滑。(掌禹錫) 菟葵綠葉如黃蜀葵。其花似拒霜。雅。其形至小。如初開單葉蜀葵。有檀心。色如牡丹。姚黃。其葉則蜀葵也。唐劉夢得所謂菟葵燕麥動搖春風者是也。(寇宗奭) 按鄭樵通志云。菟葵。天葵也。狀如葵。葉大如錢。而厚。面青背微紫。生於崖石。凡丹石之類。得此而後能神。所以雷公炮炙論云。如要形堅。豈忘紫背。謂其能堅鉛也。此說得於天台一僧。又按南宮從晦蟬神書云。紫背天葵。出蜀中。羅草也。生於水際。取自然汁。煮成則堅。亦能煮八石拒火也。又按初虞世古今錄驗云。五月五前。齋戒。看桑下有菟葵者。至五日中午。時至桑下。咒曰。繫黎乎。俱當蘇婆訶。咒畢。乃以手摩桑陰一遍。口留菟葵及五葉草。嚼熟。以唾塗手。熟揩令徧。再齋七日。不得洗手。後有蛇蠍蠹蝨咬傷者。以此手摩之。卽愈也。李時珍竊謂古有視由一

科。此亦其類。但不知必用菟葵。取何義也。若謂其相制。則治毒蟲之草亦多矣。(李時珍)

【菟槐】 卽苦參之古籍別名。典見別錄。詳苦參條。

【菟縷】 卽菟絲子之古籍別名。典見別錄。詳菟絲子條。

【菟蘆】 卽菟絲子之古籍別名。典見本經。詳菟絲子條。

【菟葵】 卽菟絲子之古籍別名。典見別錄。詳菟絲子條。

原名 菠薐。

古籍別名 波斯草。波斯菜。赤根菜。(綱目) 洋菜。紅菜。(綱目拾遺)

外國名詞 Spinacea oleracea, Mill. (拉丁) ハウレンサウ(日本)

基本 係藜科菠薐屬。爲菠菜之莖葉。

形態 菠薐爲菜類之一年生或越年生草本。高二尺許。葉互生。作卵圓形而尖。如三角狀。其基部之兩側有尖部。花小黃綠色。花單性。雄花與雌花異株。其根赤而味甜。實有刺。狀如葵。

一二六

杜仲、補骨脂氣味辛溫。性崑綫下。不似菟絲氣味甘平。而不重降耳。

若服之而見陽強不痿。其便燥結。小水赤澀者。以性主補故也。但菟絲子最難得真。實者有以水犀草子種出。形像絕似。藥肆所賣。多屬此物。然服之亦有微功。浸酒煮爛。作餅曬乾。^{〔清〕}賈九如辨藥指南論菟絲子曰。菟絲子莖莖草上無根。假氣而生。凝仲春正陽之氣。方始結實。稟氣中和。性味甘平。取子主於降。用之入腎。善補而不峻。益陰而固陽。凡滑精便濁。尿血餘瀝。虛損勞傷。腰膝積冷。頑麻無力。皆歸腎虛所致。以此調養。無不奏效。又因味甘。甘能助脾。療脾虛久瀉。飲食不化。四肢困倦。脾氣漸旺。則衛氣自冲。肌肉得養矣。

配合應用 ①菟絲子、蓮實、山藥、人參。能實脾止泄。嗜食加五味子、肉豆蔻砂仁。能治腎泄。②菟絲子五味子、沙苑蒺藜、覆盆子、蓮鬚、山茱萸、巴戟、天車、前子、沒食子、枸杞子。能益脾胃。固精種子。

③菟絲子、甘菊花、沙苑蒺藜、甘

枸杞子、熟地黃、羚羊角、穀精草、決明子。能明目。

④治丈夫腰膝積冷痛。或頑麻無力。菟絲子、尤人參、牛膝、胡麻仁。⑤單服偏補人衛氣。能助人筋脈。

⑥王好古云。能補肝臟虛。故去風專主腰膝。腰膝者肝腎之所治也。

⑦治消渴不止。菟絲子煎汁。任意飲之。以止爲度。^{〔事林廣記方〕}

⑧治陽氣虛損。用菟絲子熟地黃等分爲末。酒糊丸。梧子大。每服五十丸。氣虛人參湯下。氣逆沈香湯下。^{〔簡便方〕}又用菟絲子酒浸十日。水淘。杜仲焙研。蜜炙一兩。以薯蕷末酒煮糊丸。梧子大。每空心酒下五十丸。^{〔經驗方〕}

⑨治白濁遺精。茯菟丸。治思慮太過。心腎虛損。眞陽不固。漸有遺瀝。小便白濁。夢寐頻泄。菟絲子五兩。白茯苓三兩。石蓮肉二兩。爲末。酒糊丸。梧子大。每服三五十丸。空心鹽湯下。^{〔和劑局方〕}

⑩治小便淋瀝。菟絲子煮汁飲。^{〔范汪方〕}

⑪治小便赤濁。心腎不足。精少血燥。口乾煩熱。頭暈怔忡。菟絲子麥冬等分爲末。蜜丸。梧子大。鹽湯每下七十丸。

⑫治腰膝疼痛。或頑麻無力。菟絲子洗一兩。牛膝二兩。同入銀器內。酒浸一寸五分。曝爲末。將原酒煮糊丸。梧子大。每空心酒服三二十丸。^{〔經驗方〕}

⑬治肝傷目暗。菟絲子三兩。酒浸三日。曝乾爲末。雞子白和丸。梧子大。空心溫酒下二十丸。^{〔聖惠方〕}

⑭治身面卒腫洪大。用菟絲子一升。酒五升。漬二三日。每飲一升。日三服。不消再造。^{〔肘後方〕}

⑮治婦人橫生。菟絲子末。酒服二錢。一加車前子等分。^{〔聖惠方〕}

⑯治眉鍊癰瘡。菟絲子炒研油調傳之。^{〔山居四要方〕}

⑰治穀道赤痛。菟絲子熬黃黑爲末。雞子白和塗之。亦治痔如蟲咬。^{〔肘後方〕}

用量 一錢至三錢。
施用宜忌 凡腎家多火。陽強不痿。以及大便燥結者。禁用。惡灌

菌。馨積。松枝爲使。得酒良。
著名方劑 ①伏菟丸。治強中消渴。^{〔局方〕}菟絲子^{〔酒浸〕}十兩。茯苓三兩。石蓮子三兩。五味子八兩。山藥六兩。上以酒煮山藥。搗和藥末爲丸。②大菟絲子丸。治腎氣虛損。五勞七傷。脚膝痠疼。面目黧黑。目眩耳鳴。心衝氣短。時有盜汗。小便數滑。^{〔局方〕}菟絲子、鹿茸、^{〔酥炙去毛〕}澤瀉、石龍芮、桂枝、附子各一兩。石斛、熟地、茯苓、牛膝^{〔酒浸焙〕}。山黃肉、續斷、防風、杜仲、菴蓉^{〔酒浸焙〕}。補骨脂^{〔酒炒〕}。蕪澄茄、巴戟、沉香、茴香各七錢。半。五味子、川芎、桑螵蛸、覆盆子各五錢。上爲細末。麵糊爲丸。

參攷資料 ①抱朴子仙方單服法。取實一斗。酒一斗。浸曝乾。再浸又曝。令酒盡乃止。搗細。每酒服二錢。日二服。此藥治腰膝去風。兼能明目。久服令人光澤。老變爲少。十日外飲。暖如湯沃雪也。^{〔蘇頌〕}

②菟絲莖生。施於草上。柔細且長。而極堅。割子又多脂。故爲養陰通絡上品。其味微辛。則陰中有陽。守而能走。與其他滋陰諸藥之偏於

而能走。與其他滋陰諸藥之偏於

和漢藥考。詳「薄荷」條。

【菟丘】卽菟絲子之古籍別名。典見廣雅。詳「菟絲子」條。

【菟竹】卽黃精之古籍別名。典見別錄。詳「黃精」條。

【菟葵】卽款冬花之古籍別名。典見爾雅。詳「款冬花」條。

見爾雅。詳「款冬花」條。

見爾雅。詳「款冬花」條。

見爾雅。詳「款冬花」條。

見爾雅。詳「款冬花」條。

見爾雅。詳「款冬花」條。

見爾雅。詳「款冬花」條。

見爾雅。詳「款冬花」條。

見爾雅。詳「款冬花」條。

見爾雅。詳「款冬花」條。

見爾雅。詳「款冬花」條。

見爾雅。詳「款冬花」條。

見爾雅。詳「款冬花」條。

見爾雅。詳「款冬花」條。

見爾雅。詳「款冬花」條。

見爾雅。詳「款冬花」條。

見爾雅。詳「款冬花」條。

見爾雅。詳「款冬花」條。

見爾雅。詳「款冬花」條。

見爾雅。詳「款冬花」條。

見爾雅。詳「款冬花」條。

見爾雅。詳「款冬花」條。

見爾雅。詳「款冬花」條。

十二畫 菟

物而纏繞之。自絕其根。而由被纏之植物吸取滋養料以生長。莖細而白色。後呈黃白色。不含葉綠素。莖之分歧。纏掛植物之梢。狀如掛麵。葉細小作鱗狀。曝視之若無葉。晚夏開花。大二三寸。帶赤白色。後結實。大一分餘。熟則是黑褐色。內有種子二三粒。形似蘿蔔子。



(一) 子絲菟



(二) 子絲菟

採取 每年九月採實曬乾。

製法 雷歌曰。凡使勿用天君草子。真相似。只是味酸澀并黏也。

菟絲探得去殼。用苦酒浸一二日。漉出。以黃精自然汁相對。浸一宿。

至明。用微火煎至乾。入臼中。燒熱。

鐵杵杵去三千餘杵。成粉用之。李時珍曰。凡用以溫水。淘去沙泥。酒

時珍曰。凡用以溫水。淘去沙泥。酒

時珍曰。凡用以溫水。淘去沙泥。酒

時珍曰。凡用以溫水。淘去沙泥。酒

浸一宿。曝乾搗之。不盡者。再浸曝搗。須臾悉細。又法酒浸四五日。蒸曝四五次。研作餅。焙乾。再研末。或云。曝乾時。入紙條數枚。同搗。卽刻成粉。且省力也。

性質 辛甘平。無毒。

效能 補肝腎。生精髓。用作強壯收斂藥。

主治 續絕傷。補不足。益氣力。

肥健人。本經。養肌強陰。堅筋骨。

主莖中寒。精自出。溺有餘瀝。口苦燥渴。寒血爲積。久服明目。輕身延年。別錄。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥

性本草論菟絲子曰。治男女虛冷。

添精益髓。去腰疼。膝冷。治消渴。熱中久服。去面黧。悅顏色。宋。大明

日華諸家本草論菟絲子曰。補五勞七傷。治鬼交泄精。尿血。潤心肺。

【元】王好古湯液本草論菟絲子曰。補肝臟風虛。明。經希雍本草

經疏論菟絲子曰。菟絲子本經言其味辛平。別錄益之以甘者。正雷

公所謂寒中和凝正陽之氣而結者也。其爲無毒。明矣。五味之中。惟

辛通四氣。復兼四味。經曰。腎苦燥。

急食辛以潤之。菟絲子之屬是也。

與辛香燥熱之辛。迥乎不同矣。學

者不以辭害義。可也。爲補脾腎肝

三經要藥。主續絕傷。補不足。益氣

力。肥健者。三經俱實。則絕傷續而

不足。補矣。脾統血。合肌肉。而主四

肢。足陽明大陰之氣盛。則力長。而

肥健。補脾故養肌。益肝腎故強陰。

堅筋骨。煖而能補腎中陽氣。故主莖中寒。精自出。溺有餘瀝。口苦燥渴者。脾腎虛而生內熱。津液因之不足也。二臟得補。則二病自愈。寒血爲積者。勞傷則血瘀。陽氣乏絕。則內寒。血隨氣行。氣弱不能統血。以行。久而爲積矣。凡勞傷。皆脾腎肝三臟主之。肝脾氣旺。則瘀血自行也。久服明目。輕身延年者。目得血而能視。肝開竅於目。瞳子神光屬腎。肝腎實。則目自明。臟實精滿。則身自輕。延年可必矣。清。黃宮繡本草求真論菟絲子曰。菟絲辛甘溫平。質黏。溫而不燥。補而不滯。得天地中和之氣。故書稱爲補髓添精。強筋健骨。止遺固泄。緩腰溫膝。明目祛風。爲補脾腎脾氣要劑。合補骨脂。杜仲用之。最爲得宜。但

除一切風痺。

【菜藍】 產地 廣信多出。形態 黑根有鬚。叢生綠莖。微有疏節。葉似大葉柴胡。粗紋疎齒可供藥用。



菜藍

主治 治跌打損傷。

【拔莖】 原名 拔莖。命名 拔莖猶嫩結。矮結者。短也。本品莖莖雖堅強。但短而小。故名。江浙人遂謂之拔莖。

古籍別名 金剛根。王瓜草。(日華)鐵菱角。(綱目)拔莖。金剛刺。金剛骨。金剛拙。荆崗沙。老君鬚。鼈兒攪。(和漢藥考)矮結。(綱目)基本 屬百合科拔莖之地下莖。

產地 多在山野間。

形態 拔莖為山野自生之上界蔓草。莖莖細而堅。每節莖有光澤。高自二三尺至六尺。有曲刺。葉互生。作卵圓形或橢圓形。惟托葉

變為卷鬚。恒纏繞他物。夏季於葉腋綴黃綠色六瓣小花。作繖形。雌雄異株。花後結紅色漿果。如豆大。其根為木質狀或粉狀之地下莖。有節塊。稍有鬚根。長六七寸。粗一二寸。外面褐色。內部淡紅色。稍有不快苦味。市上用以混充土茯苓者。

變為卷鬚。恒纏繞他物。夏季於葉腋綴黃綠色六瓣小花。作繖形。雌雄異株。花後結紅色漿果。如豆大。其根為木質狀或粉狀之地下莖。有節塊。稍有鬚根。長六七寸。粗一二寸。外面褐色。內部淡紅色。稍有不快苦味。市上用以混充土茯苓者。



拔莖

採取 二月八月間。採根曝乾。製法 凡使以米泔浸。削去皮。

用。

性質 甘。酸。平。溫。無毒。

成分 含有斯密拉辛。樹脂。色素。單寧。澱粉等。斯密拉辛。為白色無臭之結晶體。有苦味。稍溶於水。善溶於酒精。伊打等。逢強硫酸初變紅色。次變紫色。終變黃色。

效能 止渴。治痢。用作發汗劑。

主治 腰背疼痛。風痺。益血。氣。止小便利。

歷代記述攷證 【宋】大明日

華諸家本草論拔莖曰。治時疾。瘧瘵。【元】王好古湯液本草論拔莖曰。補肝經風虛。【明】李時珍本草綱目論拔莖曰。治消渴。月崩。下利。

配合應用 ①治小便滑數。金剛骨為末。每服三錢。溫酒下。睡時(儒門事親方)

②治沙石淋疾。重者取去根本。用拔莖二兩為末。每米飲服二錢。後以地椒煎湯。浴腰腹。須臾即通也。(聖濟總錄方)

③治消渴不止。拔莖即拔莖。咬咀半兩。水三盞。烏梅一個。煎一盞溫服。(普濟方)

④治下痢赤白。金剛根。蠟茶等分。為末。白梅肉。搗丸。炙子大。每服五七丸。小兒三九丸。白痢甘草湯下。赤痢烏梅湯下。(衛生易簡方)

⑤治風毒脚弱。痺滿上氣。田舍貧家用此最良。用拔莖洗到一斛。以水三斛。煮取九斗。漬麴去滓。取一斛。漬飲如常。釀酒。任意日飲之。(肘後方)

用量 三錢至四錢。

參攷資料 ①取根浸赤汁。煮粉食。辟瘴。(蘇頌) ②今近道及江

新州郡多有之。苗莖成莖。長二三尺。有刺。其葉如冬青。烏藥葉而差大。秋生黃花。結黑子。如櫻桃大。其根作塊。人呼金剛根。(蘇頌) ③拔莖山野中甚多。其莖似蔓而堅強。直生有刺。其葉圓大。狀如馬蹄。光澤似柿葉。不類冬青。秋開黃花。結紅子。其根甚硬。有硬鬚。如刺。其葉煎飲。酸澀。野人採其根。葉入染家用。名鐵菱角。吳普本草以拔莖為狗脊非矣。(李時珍) ④歲時記曰。昔有道士。每年除夜至閏里。各贈藥一劑。將此納入紅袋。浸置井中。元日自水中取出。和酒飲之。則不染瘟疫。名曰屠蘇酒。蓋即屠去邪氣而蘇之意。其藥用赤朮。桂心。各七錢半。防風一兩。拔莖。蜀椒。桔梗。大黃。各五錢。七分。烏頭二錢半。赤小豆十四枚。配合而成。

【拔莖】 即薄荷之古籍別名。典見揚雄甘泉賦。詳「薄荷」條。

【拔莖】 即拔莖之原名。詳「拔莖」條。

【拔莖】 即薄荷之原名。詳「薄荷」條。

瀘) 石菖蒲舒心氣暢心神。怡

心情。益心志。妙藥也。而世俗有散心之說。不知創自何人。審是則文王嗜此。何以多男而壽考耶。故清解藥用之。賴以祛痰穢之濁而衛宮城。滋養藥用之。藉以宣心思之結而通神明。(王秉衡) ④菖蒲主耳聾。癰瘡溫腸胃止小便利。十二字。瀘湖綱目以爲出於本經。而問經堂輯本無之。徐洄溪本經百種亦不錄。御覽引本經。有生石上一寸九節者。久服輕身。云云。大觀本則無。生石上三字。有一寸九節者。良六字。作黑字。則大觀本以此六字爲出於名醫別錄者也。昌今本作菖。考左氏傳享有昌歎。杜注。昌歎。昌蒲。趙周禮。臨人朝事之豆。其實有昌本。鄭注。昌本。昌蒲。根切之。四寸爲菖。說文。菖。菖蒲也。廣雅。邱昌陽。菖蒲也。呂氏春秋。冬至後五旬七日。昌始生。淮南說山訓。昌羊去蚤蟲而來鈴。籍字皆作昌。則從草之菖。孳生後矣。(張山雷) ⑤上洛郡蜀梁州嚴道縣。在蜀郡。今乃處處有生。石上。概節爲好。在下溼地。大根者。名昌陽。不堪服食。眞

菖蒲葉有脊。一如劍刃。四月五月

亦作小釐花也。東閩溪澤。又有名溪蓀者。根形氣色極似石上菖蒲。而葉正如蒲無脊。俗人多呼此爲石上菖蒲者。謬矣。此止主咳逆斷蚤風。不入服食用。詩詠多云蘭蓀。芷謂此也。(陶弘景) ⑥菖蒲處處有之。而池州戎州者佳。春生青葉。長一二尺許。其葉中心有脊狀如劍。無花實。今以五月五日收之。其根盤屈有節。狀如馬鞭。大一根旁引三四根。旁根節尤密。亦有一寸十二節者。採之初。虛輒曝乾。方堅實。折之中心色微赤。嚼之辛香少。滓人多植於乾燥沙土中。臘月移之。尤易活。黔蜀蠻人。常將隨行。以治卒患心痛。其生蠻谷中者。尤佳。人家移種者。亦堪用。但乾後辛香堅實。不及蠻人持來者。此皆醫方所用石菖蒲也。又有水菖蒲。生溪澗水澤中。不堪入藥。今藥肆所貨。多以二種相雜。尤難辨也。(蘇頌) ⑦菖蒲。今陽羨山中。生水石間者。其葉逆水而生。根鬚絡石。略無少泥土。根葉極緊細。一寸不啻九節。入藥極佳。兩浙人家。以瓦石

器種之。且暮易水則茂。水濁及有

泥滓。則萎。近方多用石菖蒲。必此類也。其池澤所生。肥大節疏粗慢。恐不可入藥。唯可作果盤。氣味不烈。而和淡爾。(馬志) ⑧菖蒲新舊相代。四時常青。羅浮山記言。山中菖蒲。一寸二十節。抱朴子言。服食以一寸九節紫花者。尤善。蘇頌言。無花實。然今菖蒲。二三月間。抽莖開細黃花。成穗。而昔人言。菖蒲難得見花。非謂無花也。應劭風俗通云。菖蒲放花。人得食之。長年是矣。(李時珍) ⑨石菖根多節者。良。一寸九節者。名石上菖蒲。今單稱曰菖蒲。即石上菖蒲也。名白菖者。乃端陽菖蒲也。(手板發蒙) ⑩石菖多栽水盆。常澆水。則能繁茂。眼病人見其蒼色。爲快。春抽莖。開細黃花。成穗。凡石菖。菖蒲之類。葉有劍脊。氣甚芳香。白菖。燕于花之類。葉無劍脊。輒而韌。色亦較淡。無香氣。謂之錢蒲。又一種。髹石菖。一名高麗石菖。葉長一二寸。甚細小。爲貴品。(和漢三才圖會)

【菖蒲酒】基本 本品係用菖蒲煎汁。和麴米釀或浸成之酒。
主治 三十六風。一十二癰。通血脈。治骨疼。久服耳目聰明。
【菖】即白菖之原名。詳「白菖」條。
【菖子】即白菖子之原名。詳「白菖子」條。
【菖藍】爲藍之一種。其葉色白如菖。故名。①即大青之古籍別名。典見綱目。詳「大青」條。
【菜瓜】即越瓜之古籍別名。典見綱目。詳「越瓜」條。
【菜伯】即薤白之古籍別名。典見綱目。詳「薤白」條。
【菜油】即芸薹子之油之古籍別名。典見綱目。詳「芸薹」條。
【菜芝】即薤之古籍別名。典見別錄。詳「薤」條。
【菜花魚】即杜父魚之俗名。詳「杜父魚」條。
【菜花銅】基本 此乃天生黃色之銅。今之黃銅。乃赤銅合爐甘石煉成。
性質 味辛。
主治 欽金瘡。傷口。強脾益神。

●治胎動半產。卒動不安。或腰痛胎轉。搶心。下血不止。或日月未足而欲產。並以苳蒲根搗一二升服之。(千金方)

●治產後崩中。下血不止。苳蒲一兩半。酒二盞。煎取一盞。去滓。分三服。食前溫下。(千金方)

●治耳卒聾閉。苳蒲根一寸。巴豆一粒。去心同搗。作七丸。綿裹一丸塞耳。日一換。一方不用巴豆用苳麻仁。(肘後方)

●治病後耳聾。生苳蒲汁滴之。(聖惠方)

●治蚤虱入耳。苳蒲末炒熱。袋盛枕之。即愈。(聖濟總錄方)

●治諸般赤眼。攀睛雲翳。用苳蒲自然汁。文武火熬作膏。日點之。(聖濟總錄方)

●治眼瞼挑鍼。獨生苳蒲根。同鹽研敷。(壽域聖方)

●治癰疽發背。生苳蒲搗貼之。瘡乾者爲末水調塗之。(孫用和祕寶方)

●治熱毒瘡。有人遍體生瘡。痛而不痒。手足尤甚。黏着衣被。曉夕不得睡。有人教以苳蒲三斗。日

乾爲末。撒布席上臥之。仍以衣被覆之。既不黏衣。又復得睡。不五七日。其瘡如失。後以治人。應手如驗。(衍義本草方)

●治風癱有蟲。苳蒲末五斤。酒浸釜中。蒸之。使味出。先絕酒。一日每服一升。或半升。(千金方)

●治陰汗溼痒。石苳蒲蛇床子等分。爲末。日搽二三次。(濟急仙方)

用量 八分至錢半。

施用宜忌 凡陰血不足。精滑汗多者。禁用。惡麻黃。地膽。忌羊肉。飴糖。勿犯鐵器。犯之令人吐逆。秦皮。秦艽爲之使。

著名方劑 ①枕中方。治好忘。(千金)苳蒲。龜甲。遠志。(去心)龍骨等分。上四味。治下。酒服。方寸匕。日三。常服。令人大聰。②鎮心省睡。益智方。(千金翼)苳蒲。益智子各八兩。遠志。(去心)五十兩。三味爲末。以淳糯米酒服。方寸匕。百日有效。祕不令人知。

參攷資料 ①苳蒲世又謂之蘭蓀。生水次。失水則枯。根節密者。氣味足。石苳蒲根絡石而生者。節

乃密。入藥須用此等。(寇宗奭)②古方有單服苳蒲法。蜀人治心腹冷氣。搗痛者。取一二寸。槌碎。同吳茱萸煎湯飲之。亦將隨行。卒患心痛。嚼一二寸。熱湯或酒送下。亦效。(蘇頌)③苳蒲氣溫。味辛。乃手少陰足厥陰之藥。心氣不足者。用之。虛則補其母。也。肝苦急。以辛補之。是矣。道藏經有苳蒲傳一卷。其語粗陋。今略節其要云。苳蒲者。水草之精英。神仙之靈藥也。其法採緊小似魚鱗者。一斤。以水及米泔浸各一宿。刮去皮。切曝乾。搗篩。以糯米粥和勻。更入熟蜜搜和。丸如梧子大。稀葛袋盛置。當風處令乾。每旦酒飲。任下三十九。臨臥更服三十九。服至一月。消食。二月。痰除。服至五年。骨體充。顏色澤。白髮黑。落齒更生。其藥以五德配五行。葉青。花赤。節白。心黃。根黑。能治一切諸風。手足頑痺。癱緩不遂。五勞七傷。填血補腦。堅骨髓。長精神。潤五臟。裨六腑。開胃口。和血脈。益口齒。明耳目。澤皮膚。去寒熱。除三尸九蟲。天行時疾。瘴疫。癘病。瀉痢。痔漏。婦人帶下。產後血暈。並以酒服。河內

藥。敬母中風。服之一年而百病愈。寇天師服之得道。至今廟前猶生苳蒲。鄭魚曾原等皆以服此得道也。又按葛洪抱朴子云。韓衆服苳蒲十三年。身上生毛。冬袒不寒。日記萬言。商丘子不娶。惟食苳蒲根不饑不老。不知所終。神仙傳云。咸陽王典。食苳蒲得長生。安期生採一寸九節苳蒲。服仙去。又按羅仙神隱書云。石苳蒲置一盆於几上。夜間觀書。則收烟無害目之患。或置星露之下。至旦取葉。尖露水洗目。大能明視。久則白晝見星。端午日以服酒尤妙。蘇東坡云。凡草生石上。必須微土。以附其根。惟石苳蒲濯去泥土。漬以清水。置盆中。可數十年不枯。節葉堅。根纒連。絡蒼然於几案間。久更可喜。其延年終身之力。既非昌陽可比。至於忍寒淡泊。不待泥土而生。又豈昌陽所能彷彿哉。(李時珍)④下痢禁口。雖是脾虛。亦熱氣閉隔。心胸所致。俗用木香失之。溫用山藥失之。閉。惟參苓白朮散。加石苳蒲。糯米飲調下。或用參苓石蓮肉少入苳蒲。服胸次一開。自然思食。(楊士

濁蒙蔽。胸痺氣滯。舌苔白膩垢穢。或黃厚者。非此芬芳利竅。不能疏通。非肺胃燥咳。及腎虛之咳逆上氣可比。開心孔。補五臟者。亦以痰濁壅塞而言。落滋邪穢。則九竅通靈。而臟氣自得其補益。非溫燥之物。能補五臟真陰也。而俗人謬謂菖蒲能開心竅。及反以導引痰涎。直入心包。比之開門迎賊者。過矣。且清芬之氣。能助人振刷精神。故使耳目聰明。九竅通利。凡寒飲閉塞。肺氣不宜。則令人音瘖。菖蒲能逐飲宣竅。而聲自開。以視虛勞金破之不鳴。顯然有別。主耳聾以下十二字。其義殊與上文不類。大觀本不在白之例。恐是後人臚入。姑存而不論。其止小便利一說。蓋指清氣下陷。收攝無權之症。辛溫能升舉下陷之氣。或可治之。別錄主肢脾痺。不得屈伸。則即本經之主風寒溼痺。瘰癧無別。殊是蛇足。溫瘧亦時行之戾氣。而兼有溼痰蒙蔽。菖蒲滌痰辟穢。裨助正氣。故能治之。然瘧之虛實寒熱。各各不同。偏舉小兒。似嫌泛濫。且作浴湯外治。其效亦趲。別錄此條。皆非精要。

十二畫 菖

大是可疑。或後人有所點竄歟。又曰。甄權治耳鳴。則溼痰蒙其清氣。而甲木少陽之氣。鬱而不伸者。即開通九竅之功效也。若肝腎陰虛。浮陽上擾之耳鳴。則非辛溫所宜矣。甄權又治頭風淚下。亦惟寒風外束者為宜。若肝陽自擾之頭風。又不可一例論治。甄氏又謂治鬼氣。瀕湖謂治中惡卒死。客忤。則皆陰靈不正之氣。固芳香辟穢之正治也。大明謂除煩悶。止心腹痛。霍亂轉筋。皆指寒溼交互。汨沒真陽者。菖蒲秉芳冽之正氣。自能勝邪。而行氣定痛。後人薑香正氣等方。以及腦麝等疫諸丸散。皆即此例。然菖蒲雖溫。辟惡可言。而溫中尚嫌不足。其直中三陰之大痛吐瀉。轉筋冷汗。脈伏色青等症。亦非此所能獨當大任。

配合應用 ①菖蒲同熟地黃、黃槩作丸。治腎虛耳聾。若中年預服。可使老而聰聰。

②菖蒲同二朮、木瓜、薏仁、石斛、革薺、黃槩。為除溼強步之要藥。兼治下部膿窠淫瘡如神。

③菖蒲佐人參、麥門冬、酸棗仁、

茯神、遠志、生熟地黃。為補心之劑。如心氣鬱結者。加沈香。能益火以開心。

④菖蒲可辟蠱蟲。

⑤功能聰耳明目。益智不忘。於甲子日取菖蒲一寸九節者。陰乾。百日為末。每酒服方寸匕。日三服。

(千金方服食法)

⑥七月七日取菖蒲為末。酒服方寸匕。飲酒不醉。好事者服而驗之。久服聰明。(千金方)

⑦治三十六風。有不治者。服之悉效。菖蒲薄切三斤。盛於絹袋。玄水一斛。即清酒也。懸浸之。密封百日。視之。如柔綠色。以一斗熟黍米納其中。封十四日。取出日飲。(夏禹神仙經方)

⑧治癰疽風疾。以九節菖蒲不開。雞犬聲者。去毛。水白搗末。以黑纈。豬心一個。批開。砂礬煮湯。調服三錢。日一服。(醫學正傳方)

⑨凡尸厥之病。卒死脈猶動。聽其耳目中。如微語聲。股間暖者是也。覺死之病。臥忽不寤。勿以火照。但痛齧其踵及足拇趾甲際。唾其面。即甦。仍以菖蒲末吹鼻中。桂末

納舌下。并以菖蒲汁灌之。(肘後方)

⑩治卒中客忤。用菖蒲根搗汁含之。立止。(肘後方)

⑪除一切惡。用端午日切菖蒲漬酒飲之。或加雄黃少許。(洞天保生錄方)

⑫治喉痺腫痛。用菖蒲根嚼汁。燒鐵針銼滓酒一盞飲之。(聖濟總錄方)

⑬治霍亂腹痛。生菖蒲到四兩。和搗汁。分溫四服。(聖惠方)

⑭治諸積癰脹。如食積、氣積、血積之類。石菖蒲八兩。剉。班蝥四兩。去翅足。同炒黃。去蜜。以布袋盛。拽去蜃屑。為末。醋和。丸梧子大。每服三五丸。溫白湯下。治腫脹尤妙。或入香附二錢。(奇效方)

⑮治肺損吐血。九節菖蒲末。白麵等分。每服三錢。新汲水下。日一服。(聖濟總錄方)

⑯解一切毒。石菖蒲、白礬等分。為末。新汲水下。(事林廣記方)

⑰治赤白帶下。石菖蒲。破故紙等分。炒為末。每服二錢。更以菖蒲浸酒調服。日一服。(婦人良方)

燥溼。溫能辟寒。辛可散結。風寒溼三者。合而成痺。去此三邪。痺自愈矣。陽氣開發。芬芳輕揚。氣重於味。辛兼橫走。故能下氣開心。咳逆者。氣逆之候也。下氣則咳逆上氣可去。五臟之壅遏。既微。則九竅應之而通。故聰明耳目。出音聲。主耳聾。辛以散之。故治癰瘡。氣味辛溫。氣厚發熱。故溫腸胃。膀胱虛寒。則小便不禁。腸胃既溫。則膀胱與焉。故止小便。脾主四肢。脾溼既祛。則四肢溼痺之得屈伸自利。山嵐瘴氣。最能使小兒發瘧。寒溼之甚。莫過山嵐。既散其邪。則病本已拔。瘧焉得而不已焉。作浴湯。及久服輕身者。除溼之驗也。不迷惑。益心智高。志者。心竅開利也。其曰補五臟延年者。單指巖棲修煉之士。辟穀服餌之用。以其助發陽氣。辟除陰風。兼可參合養性諸藥。如黃精。青黏。地黃。天門冬之屬。資其宣導。臻乎太和。故亦爲仙經要藥。至於世俗之人。五慾熾然。六淫迭至。詎可窮年卒歲。久餌偏燥之物乎。【明】李士材本草圖解論苣蒲曰。苣蒲辛溫。心肝藥也。開心竅。消伏梁。除痰

嗽。通九竅。明耳目。出音聲。散風溼。止心痛。殺諸蟲。辟鬼邪。理惡瘡。按仙經歷稱苣蒲爲水草之精英。神仙之靈藥。然石磧水生。莖細節密。不沾土者。方爲上種。銅刀刮去粗皮。米泔浸之。飯上蒸之。藉穀氣而臻於中和。真有殊常之效。【清】黃宮繡本草求真論苣蒲曰。苣蒲辛苦而溫。香芳而散。諸書尙論未透。惟張騷發揮本經最明。指此實爲心氣不足要劑。其言能補五臟。以心爲君主。五臟係焉。首言治寒溼痺。是取其辛溫開發脚氣之力。治咳逆上氣者。痰溼壅滯之喘咳。非故宜搜滌。若肺胃虛燥之喘咳。非苣蒲可治也。其開心孔。利九竅。明耳目。出聲音。總取辛溫利竅之力。心孔開。九竅利。則癰瘡之毒可解。腸胃喜溫惡寒。腸胃既溫。則膀胱之虛寒。小便不禁。自止。久服輕身者。除溼之驗也。不忘不惑。延年益智。高壽不老。皆補五臟。通九竅氣之力也。其釋本經如此。又言能主肝虛心腹痛。霍亂轉筋。消伏梁癰。癰喜通心脾痰溼。可知千金治胎動不安。牛產漏下。或搶心下血。及

產後崩中不止。並以苣蒲一味煎服。皆取辛能開竅。血氣安養之意。觀此苣蒲。實爲宣氣通竅之劑。故在楊士瀛亦謂噤口下痢。可用石苣蒲。加於參耆白朮散內。以開其胸。則其義亦著。但陽亢陰虛。發覺失合者。禁用。以其能動心胞之火耳。取一寸九節。紫花根瘦者佳。去皮微炒用。

國外學說 日本學說謂苣蒲之有效成分。名曰「アコリン」之一種苦味質。及獨逸局方收載之一種揮發油。即苣蒲油是也。シヨチアルマン氏之說云。「アコリン」及苣蒲油之外。尙含有安息香酸。澱粉。苣蒲根殊無嫌忌。其服用者。小兒亦然。對於弛緩性之消化不良。及胃加答兒。最有效驗。故用爲清涼健胃藥。殊有驅風之效。用量以苣蒲根。〇・五至二・

〇・(一回)爲內用粉劑。或以之爲浸劑。(一分與十分之比例)。又酒精製或糖藏苣蒲根。亦爲消化藥。苣蒲丁幾一回十五滴至五。〇英美學說謂水苣蒲又名白苣。產中國印度歐羅巴及北亞美利

加等處。該草每滋生水溼之處。其根本可藥。其根頭大約五分長。約數尺。形狀似分數截。而實則相連。由根頭發生直立之莖。該莖闊約八分。長約二三尺。英國昔時亦以此草之根作藥品。近已廢棄。而不用。水苣蒲頗爲通行之藥。恒以別藥相合。而作補劑。其功用能補身。開胃暖胃。止肚疼。治氣鬱。兼治飯不消化。作膏酒等服之。卅量。每服一分半至三分。研末服之。

近人學說 張山雷曰。本經之苣蒲。卽今之石苣蒲根也。御覽引

經有石生上及一寸九節云云。是其明證。且本經上品別有香蒲。云生池澤。是石苣蒲與池沼之香蒲。截然不同。則吾吳土語。亦名池沼中之香蒲爲苣蒲者。非是。苣蒲芳香。清冽。以氣用事。故能振動清陽。而辟除四時穢濁不正之氣。但香蒲者之氣味。情性。殊與苣蒲相近。故本經必以生石上及一寸九節別之。味辛氣溫。故主風寒溼邪之痺。著治咳逆上氣者。以寒飲溼痰之壅塞隔上。氣塞不通者言之。辛能開泄。溫勝溼寒。凡停痰積飲。溼

邊。

主治 功同人參。力較遜。

【菊花露】即甘菊花露之處方用名。詳「甘菊花露」條。

【菊婢子】即鳳仙子之古籍別名。詳「鳳仙子」條。

【蘭芝】即荔枝之古籍別名。典見和漢藥考。詳「荔枝」條。

【菖蒲】 命名 本品乃蒲類之昌盛者。故名。方士隱爲水劍草者。因葉形也。

處方用名 石菖蒲。鮮菖蒲。乾菖蒲。九節菖蒲。菖蒲根。

古籍別名 昌陽。別錄「堯韭」。

（吳普）水劍草。（隱名）菖白。菖昌。本昌。羊。宅。護。泥。莖。莖。蒲。紫耳。溪。菖。菖。蒲。石。上。草。松。衣。介。望。見。消。陽。春。雪。蘭。蓀。芷。綠。劍。真。人。（和漢藥考）

外國名詞 Calamus

基本 屬天南星科之宿根草本。爲 Acorus calamus 之根。

產地 陳仁山藥物生產辨云。菖蒲以產四川者爲最。節密身結而清香。又廣東產者。清遠。三坑。石潭等處多出。近水者名水菖蒲。大條身鬆浮。節疎味香帶悶。近山上

出者名石菖蒲。質結節密細條。氣味清香。與川菖蒲不差上下。西藥名劍草。又有一種名外菖蒲者。即九節小菖蒲。味略辛而不甚香。嚼之有辛辣味。產陝西漢中河南禹州。

形態 石菖蒲。屬天南星科。入藥用地下莖爲多年生草本。自生於溪澗之濱。葉爲劍狀。雖有並行脈。無中肋線。長約尺許。至夏葉間抽出花梗。開綠褐色細花。排列而爲圓柱狀之肉穗花序。後結綠果。往往盆種。用作玩品。以變種矮小者爲貴。其根莖匍匐。似蜈蚣背者。入藥用。從前以一寸九節者爲良品。又水菖蒲溪蓀。乃生於溪澗。葉瘦。根亦高二三尺者。



菖 蒲

種類 ①石菖蒲乃生水石之間。葉有劍脊。瘦根。節密。高尺餘者。②泥菖蒲白菖乃生於池澤。葉肥。根高二三尺者。③水菖蒲溪蓀乃

生於溪澗。葉瘦。根亦高二三尺者。種植 恒用瓦石器以砂土移栽於盆中。至春剪洗。愈剪愈細。高四五寸。葉如韭。根如匙柄粗者。甚則根長二三分。葉長寸許。謂之錢蒲。亦堪服食入藥。

採取 五月十二月採取陰乾。用鮮者隨時採。

製法 雷斅曰。凡使菖蒲。勿用泥菖。夏菖二件如竹根鞭形黑氣穢味腥。惟石上生者。根條嫩黃緊硬節稠。一寸九節者是眞也。採得以銅刀刮去黃黑硬節皮一重。以嫩桑枝條相拌。蒸熟曝乾。則用。

性質 辛溫無毒。

成分 西洋產菖蒲之根中。除含多量之澱粉外。尚有揮發油。樹脂及一種苦味之亞哥寧（Acopinin）。日本產菖蒲。含有揮發油。澱粉。奇烈芳香味之樹脂。極微之鞣酸。鐵性物質。亞哥寧及一種亞爾加羅伊特。即加拉明（Calamin）。

惟石菖根之成分。尙未詳悉。效能 辟穢。開竅。宣氣。逐痰。又治神經衰弱之消化不良症。

作用 入胃即能刺激胃神經。

使其分泌增加。消化力加大。且一部由腸壁吸入血中。微有興奮精神之能。

主治 風寒溼痺。咳逆上氣。開心孔。補五臟。通九竅。明耳目。出音聲。主耳聾。癱瘓。溫腸胃。止小便利。久服輕身。不忘不迷惑。延年益心。智高志不老。（本經）四肢溼痺。不得屈伸。小兒溫癰。身積熱不解。可作浴湯。（別錄）

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論菖蒲曰。治耳鳴頭風。淚下鬼氣。殺諸蟲。惡瘡疥癬等。【宋】大明日華諸家本草論菖蒲曰。除風下氣。丈夫水臟。女人血海。冷敗多忘。除煩悶。止心腹痛。霍亂轉筋。及耳痛者。作末炒。乘熱裹其聽。

【元】王好古湯液本草論菖蒲曰。心積伏梁。【明】李時珍本草綱目論菖蒲曰。治中惡卒死。客忤癰腫。下血崩中。安胎漏。散腫。腫。搗汁服。解巴豆大戟毒。【明】經希雅本草經疏論菖蒲曰。菖蒲味苦辛。其氣大溫。陽精芳草。故無毒。陽氣開發。外充百骸。辛能四達。以散邪結。此通利心脾二經之要藥也。蓋苦可

十二畫 菊 茵 菖

七壯。并服此酒及散永瘥。其法春末夏初。收白菊。輒苗陰乾。搗末。空腹取一方寸匕。和無灰酒服之。日再服。漸加三方寸匕。若不飲酒者。但和羹粥汁服亦得。秋八月合花。收曝乾。初取三大斤。以生絹袋盛。貯三大斗酒中。經七日服之。日三次。常令酒氣相續爲佳。(圖經方)

②治風熱頭痛。菊花、白膏川芎各三錢。爲末。每服一錢半。茶調下。(簡便方)

③治膝風疼痛。菊花、陳艾葉作護膝。久則自除也。(吳曼扶壽方)

④治癰疽入目。生翳障。用白菊花。數精草。綠豆皮等分。爲末。每用一錢。以乾柿餅一枚。粟米泔一盞。同煮。候泔盡。食柿。日食三枚。淺者五七日。遠者半月見效。(仁齋直指方)

⑤治病後生翳。白菊花、蟬脫等分。爲散。每用二三錢。入蜜少許。水煎服。大人小兒皆宜。屢驗。(急救方)

⑥治疔腫垂死。菊花一握。搗汁一升。入口即活。此神驗方也。冬月採根。(肘後方)

⑦治女人陰腫。甘菊苗搗爛煎湯。先熏後洗。(危氏得效方)

⑧治酒醉不醒。九月九日。眞菊花爲末。飲服方寸匕。(外臺祕要方)

⑨治眼目昏花。雙美丸。用甘菊花一斤。紅椒去目六兩。爲末。用新地黃汁和丸。梧子大。每服五十丸。臨臥茶清下。(瑞竹堂方)

⑩用薑 錢半至三錢

⑪施用宜忌 忌火。尤及枸杞根、桑根。白皮爲之使。

⑫參攷資料 菊苗可蔬。葉可啜。花可餌。根實可藥。蘊之可枕。釀之可飲。自本至末。罔不有功。宜乎前賢比之君子。神農列之上品。隱士探入酒罍。騷人餐其落英。賈長房言。九日飲菊酒。可以辟不祥。神仙傳言。康風子朱孺子。皆以服菊花成仙。荊州記言。湖廣久病風羸。飲菊潭水多壽。菊之貴重如此。是豈羣芳可伍哉。西京雜記言。採菊花莖葉。雜秫米釀酒。至次年九月始熟用之。(李時珍)

⑬菊有兩種。一種莖紫氣香而味甘。葉可作羹。食者爲眞菊。一種青莖而大。作蒿

艾氣。味苦不堪食者。名苦蕒。非眞菊也。葉正相似。惟以甘苦別之。南陽酃縣最多。今近道處處有之。取種便得。又有白菊。莖葉都相似。惟花自五月取之。仙經以菊爲妙用。但難多得。宜常服之。(陶弘景)

⑭菊之品凡百種。宿根自生莖葉。花

色品不同。宋人劉蒙泉。范至能。史正志。皆有菊譜。亦不能盡載也。其莖有株莖紫赤青綠之殊。其葉有大小厚薄尖禿之異。其花有千葉單葉。有心無心。有子無子。黃白紅紫間色。深淺大小之別。其味有甘苦辛之辨。又有夏菊。秋菊。冬菊之別。大抵惟以單葉者。味甘。入藥菊譜所載。甘菊。鄧州黃。鄧州白者。是矣。甘菊始生於山野。今則人皆栽植之。其花細碎。品不甚高。蕊如蜂窠者。中有細子。亦可採種。嫩葉及花皆可採食。白菊花稍大。味不甚甘。亦秋月採之。菊之無子者。謂之牡菊。燒灰撒地中。能死鼯鼠。說固出自周禮也。(李時珍)

⑮本經言菊花味苦。別錄言菊花味甘。諸家以甘者爲菊。苦者爲苦蕒。惟取甘者入藥。謹按張華博物志言。菊

有兩種。苗花如一。惟味小異。苦者不中食。范至能譜序言。惟甘菊一種可食。仍入藥餌。其餘黃白二花。皆味苦。雖不可餌。皆可入藥。其治頭風。則白者尤良。據此二說。則是菊類自有甘苦二種。食品須用甘菊。入藥則諸菊皆可。但不得用野菊。名苦蕒者。爾故景煥牧豎閑談云。眞菊延齡。野菊泄人。正如黃精益壽。鈎吻殺人。之意。(李時珍)

⑯菊葉泄風。祛熱。與花略同。而苦降有餘。清芬不及。肝膽火旺者。可入煎劑。泄降內蘊之風。火力量尤勝於花。輕用一錢。重用亦可至二三錢。不拘何種菊葉。功用大略相似。而滁洲白菊之葉尤良。惟野菊葉其苦尤甚。則止可搗敷熱毒癰腫。丁瘡。不入煎劑。(張山雷)

⑰【菊花酒】 製法 用菊花煎汁。同麴米釀酒。飲或加地黃。當歸。枸杞諸藥亦佳。

⑱主治 頭風。明目。去癢。瘰。消百病。

⑲【菊花參】 命名 因其葉似菊。花故名。

⑳產地 雲南東川府巧家。汎江

者其採法先剪枝連花帶葉倒掛簷下陰乾後再摘花故氣味更足其花瓣細軟千層花蕊小嫩黃色花蒂綠尖小而平氣芬芳味先微苦後微甘口含後香氣甚久不散爲最佳出浙江德清縣者花瓣闊而蕊心微黃蒂大柄臍凹陷氣味香不濃爲略次白菊河南出者爲毫菊蒂綠千瓣細軟無心蕊氣清香味苦微甘爲最佳蘇州潯墅關出爲杜菊色白味甘又出單瓣亦佳海寧出者名白茶菊色白瓣粗心蕊黃味甜多茶葉店買亦佳江西南昌府出名淮菊朵小色白帶紅味苦氣濁梗多亦次廈門出者曰洋菊朵大而扁心亦大氣濁味甘更次

近人學說 張山雷曰菊在古時似止有黃華一種而近則園林之薛載千紅萬紫色相最多可謂百卉中絕無僅有之奇品蓋自經騷人韻士矜賞孤芳而拏接之法最多遂覺變化離奇不可方物其實則花色雖殊而氣味性情亦尙無甚大別(吾嘉藕菊自明季以來頗有研究流風遺韻至今猶存

十二畫 菊

其以極大花朵養之極老終冬不剪聽其自乾明年即以此枯花播種亦苗新芽是爲子種兩三年後方能著花則形色必與老花不同以此知菊之花色最多殆古人即以此法造成也惟正名定分仍當屬之黃華而現今藥物恒用之品則以杭產之黃色小花爲正而杭產色白之小花其氣醇靜味最甘緩清香幽韻尤爲過之若白色大花之產於古毫者氣味殊覺辛烈則功力亦未免不純是在用之者量能器使必不可作一例觀也此外更有野菊一種花尤小而氣尤烈味尤苦葉瘦而老僅可作藥科敷藥白榆以下殊不足道雖亦是晚節之附庸然韓學夫人終不脫小家伎倆者也又曰菊之花色最多種以百計然古稱鞠有黃華則黃者其正色也今之雜色奇花蓋皆後人拏接所變化入藥亦亦有數種黃者味甘白者味苦惟滁菊白茶菊味甘而清芬撲鼻沁人心脾尤爲上品其他雜色味俱苦烈不入藥用野菊尤苦古名苦蕒祇可裝入枕蓆功能清腦明目經

久彌佳黃甘菊白茶菊滁菊三種以滁菊爲尤良凡清芬之藥氣輕而升多能治頭目之疾但香氣勝者無不辛燥惟菊花稟秋金肅降之氣清芬不濁絕無燥烈之弊故治頭目疏風清泄抑降肝膽木火炎上之病尤爲剛良

配合應用 ①甘菊花爲祛風要藥風木通肝肝開竅於目故爲明目之主同地黃黃蘗枸杞子白蒺藜五味子山茱萸當歸羚羊角羊肝治肝腎俱虛目痛如決明子木賊草穀精草柴胡可以去外翳

②治風熱目痛菊花黃連玄參甘草生地黃荊芥穗決明子連翹桔梗柴胡川芎羌活童便

③治血虛頭痛菊花川芎細辛黨參當歸生地黃天麥門冬白芍藥甘草童便亦主頭眩暈因痰結而作者無痰藥不效

④與枸杞子相對蜜丸久服則終身無目疾兼不中風及生疔疽

⑤治疔瘡菊花連根生用紫花地丁益母草金銀花牛枝連貝母連翹生地黃枳椇根白芷白及蒼耳子夏枯草甚者以醃臘丸發汗

大便閉者汗後以玉樞丹下之如無玉樞丹以大戟加晝休棗肉丸服三錢必下矣忌甘草犯之則死爲有大戟故也

⑥服食甘菊王子喬變白增年方用甘菊三月上寅日採苗名曰玉英六月上寅日採葉名曰容成九月上寅日採花名曰金精十二月上寅日採根莖名曰長生四物並陰乾五日取等分以成日合搗杵爲末每酒服一錢匕或以蜜丸梧子大酒服七丸一日三服百日輕潤一年髮白變黑服之二年齒落再生五年八十歲老翁變爲兒童也孟詵云正月採葉五月五日採莖九月九日採花(玉函方)

⑦服食白菊引九月九日白菊花二斤茯苓一斤並搗羅爲末每服二錢溫酒調下日三服或以凍過松脂和丸雞子大每服一丸主頭眩久服令人好顏色不老(太清靈寶方)

⑧白菊花酒天寶單方治丈夫婦人久患頭風眩暈頭髮乾落胸中痰壅每發即頭旋眼昏不覺欲倒者是其候也先灸兩風池各二

十二畫 菊

痛淚出。是以清肺熱須用黃甘菊。古來未悉此義予姑訂之以俟同志辨正。

國外學說 古方藥品考曰菊

花有數百種。唯稱甘菊者堪入藥。其花黃色。長瓣。味微苦者真。宜自製。市中販者多偽品。須選用。又陳久者亦不堪用。更有野菊一名苦蕒。花亦作黃色。惟瓣短小。且味苦氣香。此與甘菊功用不同。甘菊冬日生苗。葉如艾。葉色綠。夏秋漸高二三尺。秋深開黃花。瓣長而無心。採之曬乾。又用藥須知曰。菊花有白紅黃三種。俱入藥。而以色黃味甘者爲上。若辣者不用。一種千瓣小朵。味甚甘。尤稱佳品。蓋珠子菊之類也。單瓣味苦者乃野菊之屬。厥名苦蕒。實雜菊也。更有冒菊之名而實非菊者。或則以野菊充菊。此皆市販貪得以欺人也。又本草辨疑曰。菊有數種。藥舖所出售者。形雖極似。實是野菊。味苦不堪入藥。山中自出之菊。小而味甘者。眞有黃白二種。俱可用。又本草綱目啓蒙曰。菊花種類極多。大率可分爲二。一入藥用者。一供賞玩者。

藥用之菊。祇甘菊一種。本草所說蓋專指此。甘菊不論黃白。味甘者皆可用。但現今所種者。均係黃色。九月開花。大寸許。或寸半。瓣如常。菊作細筒子。其末五出。瓣多重心。變爲闊瓣。則黃色略淡。中有小心。此種花與藥均無苦味。故可作藥料。今藥肆所賣。乃臬州仙露出產之尋常黃菊。味苦入藥非宜。至供賞玩之菊。則有春夏秋冬之分。皆以花開時爲名。冬菊即寒菊。漏蘆條內有單葉寒菊之名。秋後花葉澆酒。再一經霜。則盡變紅紫色。鮮豔奪目。餘詳見范成大劉蒙泉史正志等之菊譜。及花史佐編羣芳譜。祕傳花鏡及日本之菊經。又從前日本醫家。每製爲菊酒或菊油用之。菊酒昔人謂有養脾胃之效。製法有數種。茲記其一。法以乾菊。花四兩。熟地黃二兩。人參末一錢。冰糖屑四兩。入燒酒一斤中。密封瓶口。經七十日。漉去渣。即成菊油。出日本之薩摩。遐邇馳名。製造此油。乃不用家菊。而用野菊。立冬前後。入山採摘野菊。曬乾。用水蒸氣。薰留之。使成揮發油。質透映帶綠。

色。爲有野菊香之液體。味微苦。比重約〇・九三三。酒精伊打等不拘多少。能溶解之。有衝動鎮痛之效。世稱薩摩菊油。醫治功用極多。頭痛。塗擦頭部。仍服用。眩暈。塗擦頭部及胸脛。仍服用。齒痛。塗擦痛處。腹痛。下瀉。塗擦腹部。仍服用。眼病。和水傳之。金瘡。湯火傷。塗傷等。各塗擦傷口。淋痛。尿道閉塞。塗布尿道孔。仍服用。陰風。塗毛上。虱盡死。用量內服。大人每次三滴至五滴。入開水中。攪和。服。又一本堂藥選菊花條。有辨論藥用甘菊之謬曰。菊花之味本苦。神農本草已言之。自名醫別錄出。始曰味甘。陶弘景且以甘者爲真。菊苦者爲苦蕒。按菊之專尙甘者。乃道家勸誘之故技。以其帶甘易餌。故爾。方士炫人。醫家亦爲所惑。遂有輕身耐老延年好顏色。服之成仙。髮白變黑。齒落再生等語。放誕不經。殊爲可笑。醫人又主張甘補脾胃。苦寒瀉泄之說。皆以甘者爲良。其誤益甚。殊不知菊花之苦。此其本味。其帶甘者。乃肥養之所變。非天性也。豈入藥用哉。

一三五〇

辨偽 鄧寶巖曰。黃菊即黃色之茶菊。較家菊小。心多而色紫。杭州錢塘所屬各鄉。多種菊爲藥。九月取花。挑入城市。以售。有高脚黃等名。色味苦微甘。性平而香。去風除熱。明目疎肝。能清眩暈。頭風。其浙省城頭一帶所產名城頭菊。皆野生。城上石縫中。至秋開花。花小。如茶菊。香氣沁脾。點茶更佳。聞有以本地園中所種之陶愛一名滿天星。僞充形。雖似而性不同。且少香味。又安能療病乎。曹炳章曰。按菊花種類甚雜。惟黃菊產杭州海寧等處。味苦。兼甜。香氣甚雅。有蒸曬二種。蒸菊將鮮菊入蒸籠內。先蒸爛。再曬。烘焙至燥。其色老黃。收藏。蒸菊不乾。曬菊以鮮花烈日曬乾。其色嫩黃。蒸花瀉易散。皆道地。城頭菊野生。城牆陰處。色黃。朵較小。浙名野菊花。亦蒸曬爲善。味苦。性涼。香氣亦佳。以散風。清火。解毒。消腫。凡生危險。疔毒。用野菊搗汁。一大碗飲之。可免毒氣攻心。以煙花作枕。永免頭風。瘡癤。其他如滁菊。白菊。眞質關係較黃菊猶重。白滁菊出安徽滁州。

冬日生苗。葉如艾葉。色綠。夏秋漸高至二三尺。秋深開黃花。瓣長而無心。味微苦者真。



(二) 花 菊

採取 正月採根。三月採葉。五月採莖。九月採花。十一月採實。俱陰乾用。

製法 採摘花瓣曬乾。或陰乾。其新鮮者尤良。

性質 苦平無毒。

效能 疏風熱清頭目。用作驅風解熱藥。又爲眼科藥。

主治 諸風頭眩腫痛。目欲脫。淚出皮膚死肌。惡風溼痺。久服利血氣。輕身耐老。延年(本經)療腰痛去來陶陶。除胸中煩熱。安腸胃。利五脈。調四肢(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥

性本草論甘菊曰。治頭目風熱。風旋倒地。腦骨疼痛。身上一切游風。令消散。利血脈。並無所忌。【宋】大明諸家本草論甘菊曰。作枕明目。

十二 薑 菊

藥亦明目。生熟並可食。【金】張元素珍珠養論甘菊曰。養目血。去翳膜。【元】王好古湯液本草論甘菊曰。主肝氣不足。【明】繆希雍本草經疏論甘菊曰。菊花爲去風之要藥。苦可泄熱。甘能益血。甘可解毒。平則兼辛。故亦散結。苦入心小腸。甘入脾胃。平辛走肝膽。兼入肺與大腸。其主風頭眩腫痛。目欲脫。淚出。皮膚死肌。惡風溼痺者。諸風掉眩。皆屬肝木風藥。先入肝。肝開竅於目。風爲陽邪。勢必走上。血虛則熱。熱則生風。風火相搏。故也。腰痛去來陶陶者。乃血虛氣滯之候。苦以泄滯。結甘以益血脈。辛平以散虛熱也。其除胸中煩熱者。心主血。虛則病煩。陰虛則熱。收於內。故熱在胸中。血益則陰生。陰生則煩止。苦辛能泄熱。故煩熱並解。安腸胃。利五脈。調四肢。利血氣者。即除熱祛風。益血入心入脾入肝之驗也。久服輕身耐老。延年者。物久則力專。力專則氣化。化則變常。其釀酒延齡和藥變白。皆服餌專氣之功。故亦爲仙經所錄矣。【明】李士材本草圖解論甘菊曰。甘菊花味甘。

性平。入肺腎兩經。清頭目風熱。定風虛眩暈。利血脈。安腸胃。悅皮膚。止腰痛。翳膜遮睛。冷淚流溢。珍爲要品。鍾會贊菊有五美云。圓花高懸。準天極也。純黃不雜。合土色也。早植晚發。君子德也。冒霜吐英。象貞實也。味和體輕。神仙食也。甘者功用弘多。苦者但可理癰。白者入氣。赤者行血。神而明之。存乎其人耳。忌火去蒂。漿過曬乾。乘燥入甕。【清】黃宮繡本草求真論甘菊曰。甘菊生於春。長於夏。秀於秋。得天地之清芳。稟金精之正氣。其味辛。故能祛風而明目。其味甘。故能保肺以滋水。其味苦。故能解熱以除燥。凡風熱內熾。而致眼目失養。翳膜遮睛。與頭眩暈。風浮溼痺等症。服此甘和輕劑。以平木。制火。養肺。滋腎。俾木平則風熄。火除則熱除。而病無不愈矣。是以除目翳膜。有同枸杞相對蜜丸。久服永無目疾。以單瓣味甘者入藥。黃入陰分。白入陽分。紫入血分。【清】徐洄溪本草經百種錄論甘菊曰。凡芳香之物。皆治頭目肌表之疾。但香則無不辛燥者。惟菊花不甚燥烈。故於

頭目風火之疾尤相宜焉。【清】黃元御玉楸象解論甘菊曰。甘菊花清利頭目。治疼痛眩暈之證。庸工凡治頭目無不用之。今古相承。不見其效。不知頭目眩暈。由溼盛上逆。濁氣充塞。相火失根。升浮旋轉而成。愚妄以爲頭風。而用發散之藥。此千試不靈之方也。【清】王士雄隨息居飲食譜論甘菊曰。甜菊花甘涼。清利頭目。養血息風。消疔腫。點茶蒸露。釀酒皆佳。苦者勿用。餘如野薔薇。金銀花功用略同。可類推也。【清】賈九如辨藥指南論甘菊曰。甘菊得秋氣之深。應候而開。受金正氣。秋金本白。故取白色者。其體輕味微苦。性氣和平。至清之品。經曰。治溫以清。凡病熱退其氣尚溫。以此同桑皮。理頭痛。除餘邪。佐黃芪。治眼昏。去翳障。助沙參。療腸紅。止下血。鎮石斛。扁菊。明目。聰耳。調達四肢。是以肺氣虛。須用白甘菊。如黃色者。其味苦重。氣香散。主清肺火。凡頭風眩暈。鼻塞熱。壅肌。膚溼痺。四肢遊風。肩背疼痛。皆歸肺氣熱。以此清順肺金。且清金則肝木有制。又治暴赤眼腫。目

十二畫 莽 蒟 菁 菅 菴 菴 菊

⑤ 治療癰結核。用菴草一兩爲末。雞子白調塗帛上貼之。日二易。取效止。亦治癰瘡未潰。得痛爲良。(聖惠方)

⑥ 治乳腫不消。莽草、小豆等分爲末。苦酒和傅之。(衛生易簡方)

⑦ 治狗咬昏悶。浸椒水。調莽草末傅之。(便民圖纂方)

用量 錢半至三錢
施用宜忌 凡癰瘍已潰者禁

參攷資料 ① 古方治風毒瘰癧。諸酒皆用菴草。今醫家取葉煎湯熱含。少頃吐之。治牙齒風蟲及喉痺甚效。(蘇頌) ② 濃煎湯淋滯皮膚麻痺。周禮煎氏掌除蠹物。以菴草熏之則死。(寇宗奭) ③ 古方治小兒傷寒。有莽草湯。又瑣碎錄云。思村王氏之子。生七日而兩腎縮入。二醫云。此受寒氣而然也。以硫黃、茱萸、大蒜研塗其腹。以菴草蛇床子燒烟熏其下部而愈也。(李時珍) ④ 莽草制雌黃雄黃而有毒。誤食害人。惟紫河車磨水服及黑豆煮汁服可解。豆汁澆其根即爛。性相制也。(李時珍)

【莽草子油】即八角油之別名。詳「八角油」條。

【菴】即蓮肉之古籍別名。典見爾雅。詳「蓮肉」條。

【菴菴】即蓮肉之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蓮肉」條。

【菁茅】即香茅之古籍別名。典見別錄。詳「香茅」條。

【菅松】即天門冬之古籍別名。典見抱朴子。詳「天門冬」條。

【菅茅】即白茅之一種。葉細長而尖。有並行脈。如白茅。秋開青白花。成穗。殼有長芒。實尖而黑。長分許。常黏人衣。根短硬如細竹。無節。味微甘。效能與白茅同。參見「白茅」條。

【菅根】即地筋之古籍別名。典見別錄。詳「地筋」條。

【菴菴】即菴菴之古籍別名。典見廣韻。詳「菴菴」條。

【菴竹】即菴草之古籍別名。典見詩經小雅。詳「菴草」條。

【菴豆】即綠豆之處方用名。詳「綠豆」條。

【菴筍】基本 本品係用茅竹筍淡煮曬乾者。

古籍別名 草鞋底。蝴蝶尖。玉版。關絲。泥裏黃。(綱目拾遺)

產地 浙、閩、江西諸省多有之。性質 甘平。無毒。

主治 利水消水腫。豁痰。平實喘。意歷九用之。

【菴蓐】即菴草之古籍別名。典見唐本草。詳「菴草」條。

【菊】即菊花。詳「菊花」條。

【菊米】命名 本品即野菊之蕊。如米狀者故名。

產地 出浙江遂昌縣石練山中。形態 菊米爲野生之菊蕊。乾之大如半粒綠豆。輕圓黃亮而有香氣。可供藥用。

主治 去風。清火。明目。敗毒。散疔。

【菊花】命名 菊本作鞠。鞠。猶華事至此而窮。故名。

也。月令九月菊有黃華。

處方用名 杭菊花。白菊花。白菊瓣。野菊花。滁菊花。甘菊花。甜菊花。黃菊花。池菊花。

古籍別名 節華。(本經)女節。女華。女莖。日精。更生。傳延年。陰成。

形態 菊花爲多年生草本。本品類不一。形色不同。茲以甘菊而實。



(一) 花 菊

周盈。(別錄)治瀉。(爾雅)金蕊。牡菊。(綱目)女花。(和漢藥考)

外國名詞 Chrysanthemum Sinese, Seb.

基本 屬菊科。爲甘菊之花。

產地 陳仁山藥物生產辨云。菊花有黃白之分。白者以產安徽亳州爲最。其次河南懷慶府。又其次則產廣東潮州。色黑味苦。又有一種白杭菊。產浙江杭州府。合藥用少。茶用居多。又有一種黃杭菊。亦產浙江杭州府。又有一種大菊。名黃菊王。亦產浙江杭州府。黃菊近日廣東小欖有種。花瓣略大。色黃而帶紅。味不香。杭州產者色黃而帶青。味溫香。大有可別。白菊再有一種名綠帶菊。產安徽滁州。又名滁州菊。味最清涼。不甜不苦。白菊之中。以此味合藥爲適當。

採取 五月至七月間採葉陰乾。

製法 雷斅曰凡使葉勿用尖及孳生者取葉細剉以生甘草水煮二味同盛入生稀絹袋中甑中蒸一日去二件熬乾用。

用法 恒作外治藥用或煎湯以含漱及薰洗或剉末以塗傳及摩擦。

性質 辛溫有毒。

成分 爲揮發油脂肪油樹脂單寧糖質等。

效能 治癰腫理疳疔瘻用爲消散瘡瘍疥癬藥及爲殺蟲藥。

主治 風頭癰腫乳癰疳瘻除結氣疥癩殺蟲魚(本經)療喉痺不通乳難頭風癢可用沐勿令入眼(別錄)

歷代記述攷證

【唐】甄權藥

性本草論葬草曰治風疽疔氣腫墜凝血治癰癭除溼風不入湯服主頭瘡白癩殺蟲與白欬赤小豆爲末雞子白調如糊燒毒腫乾更易上【宋】大明諸家本草論葬草曰治皮膚麻痺煎濃湯淋風蟲牙痛。

十二畫 葬

國外學說 日本和漢藥考曰。日本或書作櫛蓋因日俗用其枝葉供佛前或墓前之故。葉曬乾爲抹香或爲製造線香原料。子實中含有一種揮發油香氣類華澄茄。歐美諸國用以製造香油。日本每年輸出額達五十萬斤云。又舊

東京大學教師愛曼氏嘗從葬草實中發見一種毒性結晶物名之爲西基民(Glennin)又云子實含有揮發油一%其中又含有名「沙夫洛爾」(Santon)之芳香性化合物云。又相川藥學士蒸溜葬草油之實驗云將葬草葉與水蒸氣一同蒸溜初得較水爲輕氣味類似線香而極毒之油質吸收此油之蒸氣則致發嘔極感不快惟此極易揮發置空氣中其臭氣須臾即行消失。此物殆即愛曼氏所言葬草實中之毒物歟。繼上述有毒性揮發油而來者爲一種較水爲重之揮發油不易逸散此物殆即愛曼氏所言之沙夫洛爾歟。又關於葬草實之效能已故理學博士伊藤圭介翁所著小石川植物園草木圖說述之頗爲詳盡今摘錄於左。中國賈人近亦於崎陽多購此實去或云用以溜製香水和方書之記葬草實藥效者頗多如狐臭用此葉濃煎時時洗之金創打撲用此葉與大黃小麥粉和飯研和貼之鼠咬將此花燒爲霜貼之或將葉陰乾爲末摻之婦人乳腫用此葉末與蕎麥粉調水貼之瘰癧用此葉末調紫纈汁貼之丹毒用此葉煎服齒齦腫用抹香貼之又洗眼水方於爐甘石加葬草實煎用之有效云又述櫛之功用曰櫛之香氣清淨可供神佛除不淨臺上插櫛則獸懼近山田園恐園中物爲猪猡所竊多植櫛以懼之掘出之芋折櫛枝覆之則獸不敢取此外尚多功用去眼病熱取落於墓上水中腐爛之櫛露點之立愈煎櫛葉用之亦佳櫛有去眼熱功用爲眼科良醫齋藤祐仙所經驗確係有效人之往禱於本法寺境內熊谷氏之墓取其墓水治眼病即霍然愈者蓋亦由櫛之功用耳本法寺在本願寺前寺町有熊谷稻荷社大咬名灸爲病犬所咬立於創口置櫛葉從

其土灸之則有水自創口出灸至水出而後已甚爲奇妙此法用於鼠咬亦佳。

配合應用 治賊風腫痛風入五臟恍惚宜葬草膏主之葬草一斤烏頭附子獨活各二兩切以水和醋一升漬一宿猪脂一斤煎三上三下絞如滓向火以手摩病上三百度應手即瘥若耳鼻疾可以綿裹塞之疥癬雜瘡並宜摩之(肘後方)

治小兒風痛 擊瘕戴眼極者日數十發又治大人賊風葬草雷丸各一雞子黃大化猪脂一斤煎七沸去滓摩痛處勿近目及陰日凡三四次(外臺秘要方)

治頭風久痛 葬草煎湯沐之勿令入目(聖惠方)

治風蟲牙痛 用葬草煎湯熱漱冷吐一加山椒皮一加獨活一加郁李仁一加芫花一加川椒細辛各等分煎湯熱漱冷吐(肘後方)又用葬草半兩皂角三挺去皮子漢椒七粒爲末棗肉爲丸芥子大每以一九塞孔中吐涎取效(聖惠方)

十二畫 絲

絳 脾 脛 腠 腎 舒 舜 莽

一三四六

尺。深綠色。有皺點。瓜頭如鬚。嫩時去皮。可烹可曝。點茶充蔬。老則大如杵。筋絡纏組如織成。經霜乃枯。惟可藉韌履澁釜器。故村人呼為洗鍋羅。瓜內有隔子。在隔中。狀如苦蕒子。黑色而扁。其花苞及嫩葉卷鬚皆可食也。(李時珍)

多用鹽水浸。剝去蛹而採其綿。曝乾用。尤為便利。

種類 未經用者為新綿。已經用者為故綿。其燒灰者為綿灰。

參攷資料 古之綿絮乃繭絲。經延不可紡織者。今之綿絮則多木棉也。入藥仍用絲綿。(李時珍)

綿 綿之舒長者。典見綱目。

絳 絳之舒長者。典見綱目。

絳 絳之舒長者。典見綱目。

絳 絳之舒長者。典見綱目。

絳 絳之舒長者。典見綱目。

絳 絳之舒長者。典見綱目。

絳 絳之舒長者。典見綱目。

絳 絳之舒長者。典見綱目。

絳 絳之舒長者。典見綱目。

絳 絳之舒長者。典見綱目。

絳 絳之舒長者。典見綱目。

絳 絳之舒長者。典見綱目。

絳 絳之舒長者。典見綱目。

絳 絳之舒長者。典見綱目。

絳 絳之舒長者。典見綱目。

絳 絳之舒長者。典見綱目。

絳 絳之舒長者。典見綱目。

絳 絳之舒長者。典見綱目。

絳 絳之舒長者。典見綱目。

絳 絳之舒長者。典見綱目。

絳 絳之舒長者。典見綱目。

絳 絳之舒長者。典見綱目。

典見和漢藥考。詳「莧麻子」條。

產地 生山谷中。

形體 腰為雜草類之一種。色白理順。可供藥用。

性質 甘無毒。

主治 益氣延年。

產地 出嶺南。

形體 出嶺南。

形體 出嶺南。

形體 出嶺南。

形體 出嶺南。

形體 出嶺南。

形體 出嶺南。

形體 出嶺南。

形體 出嶺南。

形體 出嶺南。

形體 出嶺南。

形體 出嶺南。

形體 出嶺南。

形體 出嶺南。

形體 出嶺南。

形體 出嶺南。

形體 出嶺南。

形體 出嶺南。

形體 出嶺南。

形體 出嶺南。

形體 出嶺南。

本品有毒。食之令人迷罔。故名。

古籍別名 芒草。(山海經)鼠莽。(綱目)石柱。茵草。船荷香。(和漢藥考)茴香八角球。

基本 屬木蘭科樹樹之葉。

產地 凡山谷原野間恒多生焉。和漢藥考曰。日本各地產之。伊豆地方尤多。

形體 標為暖地山中自生之常綠喬木。亦有為灌木者。高丈餘。枝葉互生。葉長三寸許。作長橢圓形。前端尖。作革質。厚而有光澤。初夏葉腋開黃白色小連花。後結實。枝葉根子實俱有毒。其子實有覆果七八個集合。連於中心之短軸。作車輻狀。每覆果頂端。尖銳彎曲。中藏扁圓形黃褐色有光澤之種子。皮脆弱。胚乳含油氣。芳香有甘味。

草

莽

草

莽

草

莽

草

莽

草

莽

草

莽

草

莽

草

莽

草

莽

草

莽

草



草 莽

毒。

絲瓜藤及根

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

絲瓜

本草曰：絲瓜功用極多。本草附方可見。葉與藤根皆有效用。無遺屏棄者。又草木育種曰四月初下種。蒔竹便纏繞以人糞魚腥汁河泥等培養其根。大絲瓜切段入水煎汁作祛痰藥甚有效。

配合應用 ①治痘瘡不快。初出或未出。多者令少。少者令稀。老絲瓜近蒂三寸。連皮燒存性。研末砂糖水服。(直指方)

②治癰疽不斂。瘡口太深。用絲瓜搗汁頻抹之。(直指方)

③治風熱腮腫。絲瓜燒存性。研末水調搽之。(嚴月軒方)

④治肺熱面瘡。苦絲瓜牙皂灰並燒灰等分油調搽。(摘玄方)

⑤治玉莖瘡。絲瓜連子搗汁和五倍子末頻搽之。(丹溪方)

⑥治坐板瘡。絲瓜皮焙乾爲末。燒酒調搽之。(攝生衆妙方)

⑦治天泡瘡。絲瓜汁調辰粉頻搽之。

⑧治手足凍瘡。老絲瓜燒存性和臘猪脂塗之。(海上方)

⑨治肛門酒痔。絲瓜燒存性。研末酒服二錢。(嚴月軒方)

⑩治痔漏脫肛。絲瓜燒灰。多年石灰雄黃各五錢爲末。以猪膽雞子清及香油和調貼之。收上乃止。(孫氏集效力)

⑪治腸風下血。經霜後乾絲瓜燒存性爲末。空心酒服二錢。一名蠻瓜。一名天羅。一名天絲瓜是矣。(許叔微本事方)

⑫治下血危篤不可救者。絲瓜即天羅一個燒存性。槐花減半爲末。每空心米飲服二錢。(普濟方)

⑬治酒痢便血腹痛。或如魚腦五色者。乾絲瓜一枚連皮燒研。空心酒服二錢。一方煨食之。俗名魚鱗是也。(經驗良方)

⑭治血崩不止。老絲瓜燒灰。棕櫚燒灰等分。鹽酒或鹽湯服。(奇效良方)

⑮治經脈不通。乾絲瓜一個爲末。用白鴿血調成餅。日乾研末。每服二錢。空心酒下。先服四物湯三服。(海上名方)

⑯治乳汁不通。絲瓜連子燒存性。研酒服一二錢。被覆取汗即通。(簡便單方)

⑰治乾血氣痛。婦人血氣不行。

上衝心膈。變爲乾血氣者。用絲瓜一枚燒存性。空心溫酒服。(壽域神方)

⑱治小腸氣痛。繞臍衝心。連蒂老絲瓜燒存性。研末。每服三錢。熱酒調下。甚者不過二三服即消。

⑲治卵腫偏墜。絲瓜架上初結者。留下待瓜結盡。葉落取下。燒存性爲末。煉蜜調成膏。每晚好酒服一匙。如在左左睡在右右睡。(劉松石保壽堂方)

⑳治喉閉腫痛。天羅瓜研汁灌之。(普濟方)

㉑治化痰止咳。天羅即絲瓜。燒存性爲末。蜜肉和丸。彈子大。每服一丸。溫酒化下。(攝生妙用方)

㉒治風蟲牙痛。經霜乾絲瓜燒存性。爲末擦之。(直指方)

㉓治風氣牙痛。百藥不效者。用此大能去風。惟蛀牙不效。天羅即生絲瓜一個。擦曬火燒存性。研末。頻擦。涎盡即愈。膠腫以水調貼之。

㉔治食積黃疸。絲瓜連子燒存性。爲末。每服二錢。因麵得病。麵湯下。因酒得病。溫酒下。連進數服。愈。(衛生易簡方)

㉕治小兒浮腫。天羅、燈草、葱白等分煎濃汁服。并洗之。(普濟方)

㉖治水蠱腹脹。老絲瓜去皮一枚。剪碎。巴豆十四粒。同炒豆黃。去豆。以瓜同陳倉米再炒熟。去瓜研米爲末。糊丸。梧子大。每服百丸。白湯下。蓋米收胃氣。巴豆逐水。絲瓜象人脈絡。借其氣以引之也。此乃元時杭州名醫宋會之方。(鮮于樞鉤玄方)

用蠶 錢半至三錢。

施用宜忌 凡血虛液涸而絡不利者禁用。

參攷資料 ①絲瓜本草諸書無考。惟痘瘡及腳癰方中燒灰用之。亦取其性冷解毒耳。(王穎)

②絲瓜老者筋絡貫串房隔。屬肺。故能通人脈絡。臟腑而去風解毒。消腫化痰。祛腐殺蟲。及治諸血病也。(李時珍)

③絲瓜唐末以前無聞。今南北皆有之。以爲常蔬。二三月下種。生苗引蔓。延樹竹或作棚架。其葉大如蜀葵。而多子。尖有細毛。刺取汁可染絲。其莖有稜。六七月開黃花。五出。微似胡瓜。花蕊瓣俱黃。其瓜大寸許。長一二尺。甚則三四

十二畫 絡 給 統 絲

包絡石旁。花白子黑。(韓保昇) ① 絡石性質耐冬。氣味平和。神農列之上品。李當之稱爲藥中之君。其功主筋骨。關節。風熱。癰腫。變白。耐老。即醫家少知用者。豈以其近賤而忽之耶。服之當浸酒耳。(李時珍) ② 所在有之。生木石間。凌冬不凋。葉似細楠。莖節著處。卽生根鬚。包絡石旁。花白子黑。六七月採莖葉。日乾。(韓保昇) ③ 絡石貼石而生。其蔓折之有白汁。其葉小於指頭。厚實木強。面背背淡。澹而不光。有尖葉圓葉兩種。功用相同。蓋不一物也。(李時珍)

【給石籐】卽絡石之處方用名。詳「絡石」條。

【給容橙】卽金橘之古籍別名。典見花木志。詳「金橘」條。

【給敦羅】卽羊刺蜜之古籍別名。典見綱目。詳「羊刺蜜」條。

【統草】卽甘草之細者之別名。詳「甘草」條。

【統青蒿】卽青蒿之處方用名。詳「青蒿」條。

【絲瓜】 命名 本品老則筋絲羅織象人經絡故名。

處方用名 絲瓜絡。
古籍別名 魚鱗(綱目)天絲瓜。變瓜。本事。天羅布瓜。(事類合璧)天羅勒。洗鍋羅瓜。(和漢藥考)烏牛子。(綱目拾遺)

基本 屬葫蘆科瓠果類。爲絲瓜之筋膜。其藤根葉詳見各條。

產地 陳仁山藥物生產辨云。絲瓜絡產廣東各屬有出。各省均有出。但江浙來者。去淨外衣。作洗身用。此種俱水瓜絡。公司有沾

瓜 絲



形態 絲瓜爲圓圍栽種之一年生蔓草。莖有細長之刺毛。白葉間生出卷鬚。分岐而纏繞他物。攀登而上。可及丈餘。葉爲心臟形。有五裂至七裂。狀如掌。周圍有鋸齒。葉間有刺毛。夏日開五瓣黃花。其狀如鐘。皆單性。雌雄同株而生。果實爲細長之瓜長可二尺餘。迨成熟已久。遂生強韌如網之纖維。嫩時多取供食用。熟而生出之纖維。謂之絲瓜絡。可以代海綿。入藥。取老絲瓜燒焦。謂之絲瓜絡。

採取 九十月經霜乃枯採之。製法 凡入藥用老者。去外皮。取筋膜用。尤以潔白者佳。

用法 與他藥水煎。或煨焦剉末用。

性質 甘平。無毒。

效能 涼血解毒。通經絡。行血脈。用爲痘瘡之要藥。又作祛痰瀉痛通乳藥。

主治 痘瘡不快。枯者燒存性。入硃砂研末。蜜水調服。甚妙。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論絲瓜絡曰。絲瓜煮食除熱利腸。老者燒存性服。去風化痰。涼血解毒。殺蟲通經。絡行血脈。下乳汁。治大小便下血痔漏。崩中黃積。疳痛。卵腫。血氣作痛。癰疽瘡腫。齒齬。痘疹胎毒。【明】李士材本草圖解論絲瓜絡曰。絲瓜性冷解毒多食敗陽。【清】黃宮繡本草求真論絲瓜絡曰。絲瓜性屬寒物。味甘體滑。其瓜經絡貫穿。風隔連屬。凡人風痰淫熱。癰毒血積。留滯經絡。發爲癰疽瘡瘍。崩漏腸風。水腫

等症者。服之立能奏效。以其通經達絡。無處不至。小兒痘出不快。用此近蒂三寸。連皮燒灰存性。爲末。沙糖水調服。並可以敷腫。鼻淵時流濁水。用此瓜藤近根三寸。燒灰存性。爲末。酒服方寸匕。亦效。小兒預防出痘。於立冬後。用小絲瓜煨入硃砂服之。亦應。皆以借其寒滑通達之性耳。但過服亦能滑腸作泄。故書有言。此屬菜中不足食之。當視臟氣以爲可否也。葉搗汁生服。可解一切蛇傷之毒。津敷患處亦佳。【清】王士雄隨息居飲食譜論絲瓜絡曰。絲瓜(一名天羅)甘涼清熱解毒安胎。行乳調營。補陽通絡。殺蟲理疳。消腫化痰。痼者爲看。宜輩宜老。老者入藥。能補能通。化滯除黃。息風止血。

圖學外說 日本一本藥選曰。選絲瓜。須以全熟者爲佳。勿用未熟者。臨採時。卽剉細曬乾。收貯聽用。久懸風處。則輕虛枯瘦。性味俱脫。不堪用。子燒焦存性。不如生用。近得異種。呼長絲瓜。始自琉球來。其長三倍於尋常絲瓜。此品入藥最覺有力。俗呼盤索末。又大人和

在石上者良。①石血葉尖。一頭赤色。絡石葉圓正。青有謂石血。即絡石之小者云。②絡石帖石而生。其莖折之有白汁。其葉小於指頭。厚實木強。而青背淡。濇而不光。然有尖葉圓葉兩種。惟功用相同耳。

採取 每年六七月間採其莖葉日乾。

製法 雷斅曰。凡採得用粗布揩去毛子。以熱甘草水浸一伏時。切曬用。

性質 苦。溫。無毒。

效能 通經絡。利關節。治痺痛。療癰毒。用作強壯藥。

主治 風熱死肌。癰傷。口乾。舌焦。癰腫不消。喉舌腫閉。水漿不下等。〔本經〕大驚入腹。除邪氣。養腎主腰。饒痛。堅筋。利關節。久服輕身。明目。潤澤好顏色。不老延年。通神。〔別錄〕

歷代記述攷證 〔唐〕陳藏器本草拾遺論絡石曰。主一切風。變白宜老。〔唐〕蘇恭新修本草論絡石曰。蝮蛇瘡毒。心悶服汁。并洗之。刀斧傷瘡。傅之立瘳。〔明〕繆希雍本草經疏論絡石曰。絡石稟少陽

之令。兼得地之陰氣。其味苦。其氣溫。微寒而無毒。入足陽明。手足少陰。足厥陰。少陽經。故主風熱。死肌。癰傷。口乾。舌焦。癰腫不消。喉舌腫。水漿不下。皆苦溫通氣。血屬陰。陰寒入血。而除熱之效也。又能除邪氣。養腎。主腰。饒痛。堅筋。骨利。關節。療蛇毒。心悶。刀斧傷。瘡。封立差。皆涼血除熱之功也。本經久服。輕身。明目。潤澤好顏色。不老延年。陳藏器以爲能變白。亦指益陰涼血而言也。生石上者良。

近人學說 張山雷曰。絡石氣味。本經謂之苦溫。蓋以隆冬不調。而功能通經絡。活血言之。故以爲溫。然本經主治。純是熱症。則非溫熱可知。故別錄改作微寒。而御覽引李當之說。且以爲大寒也。此物蔓生而甚堅。節節生根。故善走經脈。通達肢節。本經主風熱死肌。別錄養腎。主腰。饒痛。堅筋。利關節。皆卽此義。其治癰腫。喉舌腫。口乾。舌焦。皆苦寒泄降之功用也。別錄謂其除邪氣。則以邪熱而言。凡本經別錄。邪氣二字。所賅最廣。其實各有所主。並非泛辭。讀者當以意

逆之。自能悟到。不可混作一例看。惟大驚入腹四字。則不甚可解。當付闕疑。又曰。蘇恭謂療產後血結大良。蓋以瘀露不通而言。苦泄破瘀。且善通絡。是以主之。又謂主蝮蛇瘡毒。心悶。則清熱泄降。固解毒之良藥。又謂刀斧傷瘡。傳之立瘳。則又外治活血之神丹矣。藏器謂主一切風。卽本經治風熱死肌。別錄利關節之義。今用以舒筋活絡。宜通痺痛。甚驗。

配合應用 ①治小便白濁。緣

心腎不濟。或由酒色。遂至已甚。謂之上淫。蓋有虛熱而腎不足。故土邪干水。史載之言。夏則土燥水濁。冬則土堅水清。卽此理也。醫者往往峻補。其疾反甚。惟服博金散。則水火既濟。源潔而流清矣。用絡石人參。茯苓各二兩。龍骨煨一兩。爲末。每服二錢。空心米飲下。日二服。〔仁存堂方〕

②治發背癰疽。用絡石搗汁。入諸解毒藥。神效。

③治喉痺喘急不通。須臾欲絕。以絡石一兩。水一升。煎取一大盞。去滓。細細喫。須臾卽通。〔外臺祕

要方〕

④治癰疽瘰癧。止痛癰癧。寶散。用鬼繫藤。生竹離陰。溼石岸間。絡石而生者好。絡木者無用。其藤柔細。兩葉相對。形生三角。用莖葉一兩。洗曬。勿見火。早荻刺一兩。新瓦炒。黃甘草節半兩。大栝樓一箇。取仁炒香。乳香沒藥各三錢。每服二錢。水一盞。酒半盞。慢火煎至一盞。溫服。〔外科精要方〕

用量 一錢至四錢。

施用宜忌 陽虛畏寒。及脾虛

易泄者。禁用。惡鐵落。畏貝母。菖蒲。殺殷。蘼毒。杜仲。丹皮爲之使。

著名方劑 博金散。治心腎不濟。或酒色過度。腎不足。而有虛熱。小便不清。遺精白濁等症。〔仁存堂方〕。絡石人參。茯苓各二兩。煨龍骨一兩。共研末。每服二錢。空心米飲下。日二服。

參攷資料 ①絡石在木者。隨

木性。功與薛荔相似。更有石血。地錦等。十餘種。藤並是其類。大略皆主風血。暖腰膝。變白不老。〔陳藏器〕。②絡石生木石間。淺冬不凋。葉似細橘。葉莖節者地卽生根。聚

十二畫 粟 藥 結 絡

者滯氣。隔食生蟲。(寇宗奭) ⑤與杏仁同食。令人吐瀉。雁食粟。足重不能飛。(吳瑞) ⑥粟古文作。象穗在禾上之形。而春秋題辭云。粟乃金所立。米爲陽之精。故西字合米爲粟。此說也。許慎云。粟之爲言續也。續於穀也。古者以粟爲黍稷粟秬之總稱。而今之粟在古但呼爲粟。後人乃專以粟之細者名粟。故唐孟詵本草言人不識粟。而近世皆不識粟也。大抵黏者爲秬。不黏者爲粟。故呼此爲秬粟。以別秬而配秬。北人謂之小米也。(李時珍) ⑦粟。卽粱也。穗大而毛長。粒粗者爲粱。穗小而毛短。粒細者爲粟。苗俱似茅。種類凡數十。有青赤黃白黑諸色。或因姓氏地名。或因形似時令。隨義賦名。故早則有趕麥黃。百日糧之類。中則有八月黃。老軍頭之類。晚則有雁頭青。寒露粟之類。按賈思勰齊民要術云。粟之成熟有早晚。苗稈有高低。收實有息耗。質性有強弱。米味有美惡。山澤有異宜。順天時。量地利。則用力少而成功多。任性返道。勞而無獲。大抵早粟皮薄米寬。晚粟皮

厚米小。(李時珍)

【粟米粥】 性質 甘。溫。平。無毒。主治 利小便。止煩渴。養腸胃。

【粟泔汁】 基本 本品卽淘洗粟米之泔水。主治 霍亂卒熱。心煩渴。飲數升立瘥。臭泔止消渴尤良。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論粟泔汁曰。酸泔及濕洗皮膚瘡疥殺蟲。飲之主五疳和臭。糲皮煎服。治小兒疳痢。

【粟芽】 原名 粟米。古籍別名 粟藥。(綱目)

性質 苦。溫。無毒。主治 寒中下氣。除熱。

歷代記述攷證 【南北朝】陶弘景本草集註論粟芽曰。爲末和脂傅面。令皮膚悅澤。【宋】日華諸家本草論粟芽曰。除煩消宿食。開胃。

參攷資料 ①粟黍穀麥豆諸藥。皆以水浸脹。候生芽。曬乾用。其功皆主消導。(李時珍) ②粟芽穀神散中用之。性溫於麥藥。(寇宗

奭)

【粟殼】 卽粟殼殼之古籍別名。典見和漢藥考。詳「粟殼殼」條。

【粟糠】 基本 本品卽粟米之糠皮。

主治 痔漏脫肛。和諸藥蒸之。【粟藥】 卽粟芽之古籍別名。典見綱目。詳「粟芽」條。

【藥】 卽稷米之古籍別名。典見綱目。詳「稷米」條。

【結瓜子】 卽冬瓜子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「冬瓜子」條。

【結紅花】 卽紅花之處方用名。詳「紅花」條。

【結殺】 產地 出西域諸地。基本 結殺爲香木類之一種。花極馨香。熬之成膏。可供藥用。

主治 去頭風白屑。同胡桃仁和香油塗之。

【結留子】 卽棋榧子之古籍別名。典見綱目。詳「棋榧子」條。

【絡石】 命名 本品耐冬而包絡石木而生。故名。

處方用名 絡石藤。古籍別名 石饒。饒石。雲花。雲

英。雲丹。吳萸。石龍藤。明石。石壁。懸石。(別錄) 石血。耐冬。(蘇恭) 絡石。領石。雲珠。(和漢藥考) 鬼繫腰。(外科精要)

外國名詞 Trachelospermum jasminoides, Lemaire.

基本 保屬夾竹桃科。爲絡石之莖葉。

產地 絡石生山谷間之數石上。或陰溼處之樹木上。

形態 絡石爲山野自生之常綠蔓草。莖作木質狀。葉對生。作長橢圓形。質強韌。有光澤。入冬變紅紫色。花爲乳白色。合瓣花冠。上緣五裂。各片作回旋狀。以聚繖花序排列。實爲細長莢果。長五六寸。

石 絡

種類 ①絡石與薔薇極相似。但薔薇附木而生。且其狀亦大於絡石。②絡石莖於石上者。葉細厚而圓。繞於樹上者。葉大而薄。但

石 絡

石 絡

石 絡

石 絡

石 絡

石 絡

石 絡



惡鬼氣注刺痛。霍亂蟲毒。暴下血。瀉服。

歷代記述攷證

【宋】蘇頌圖經本草論筋子根曰。主心中結塊

久積氣。攻臍下痛。

【筋根】即旋花之古籍別名。典見本經詳「旋花」條。

【筋骨草】即夏枯草之古籍別名。典見和漢藥考。詳「夏枯草」條。

【筋退】即人爪甲之古籍別名。典見綱目。詳「人爪甲」條。

【筒桂】即筒桂之古籍別名。典見唐本草。詳「肉桂」條。

【賃柳】即水楊之古籍別名。典見和漢藥考。詳「水楊」條。

【答刺不花】即土撥鼠之古籍別名。典見飲膳正要。詳「土撥鼠」條。

【答選果】即倒吊果之古籍別名。典見張揖廣雅。詳「倒吊果」條。

【粟奴】本品即粟穗成熟時所生之黑微。故名。

主治 利小腸。除煩瀼。

原名 粟。

命名 粟者。續也。謂續於穀。故名。

古籍別名 中熟者名八月黃。

十二畫筋

筒 答 粟

答 粟

答 粟

答 粟

答 粟

答 粟

小米。寒露粟。綱目。趕麥黃。柚粟。別錄。

基本 係禾本科粟屬。爲粟之子實。

形態 粟爲穀類之一。年生草本。高四五尺。莢長與玉蜀黍之葉相類。而較狹。花小而密集。作圓錐花序。果實爲穎果。小粒狀。帶有黃色。

採取 孟秋及初冬採之。

製法 採得曝乾。杵去殼用。

用法 水煮。或磨粉和藥。

性質 鹹微寒。無毒。

效能 清熱。解毒。補脾腎。和腸胃。用作滋養藥。

主治 養腎氣。去脾胃中熱。益氣。陳者苦寒。治胃熱。消渴。利小便。

歷代記述攷證

【唐】孟詵食療本草論粟米曰。止痢。壓丹石熱。

【唐】陳藏器本草拾遺論粟米曰。水煮服。治熱腹痛。及鼻衄。爲粉和。

水澹汁。解諸毒。治霍亂及轉筋入腹。又治卒得鬼打。【唐】陳士良食性本草論粟米曰。解小麥毒發熱。

性本草論粟米曰。解小麥毒發熱。

【明】李時珍本草綱目論粟米曰。治反胃熱痢。養弱食。益丹田。補虛損。開腸胃。【清】王士雄隨息居飲食譜論粟米曰。粟米功用與粳米二米略同。而性較涼。病人食之爲宜。稷者亦名。杜汪謝城曰。稷之黏者固可稱稷。而實非治不寐之稷。

近人學說 丁福保曰。粟於穀類中養分最富。爲人生所必需。其成分含有蛋白質。澱粉。糖分。脂肪等。就中植物纖維。鹽分尤多。其他含幾分之水。其味微酸。而爲無毒性之食品。

配合應用 一治胃熱消渴。以陳粟米炊飯乾食之良。【醫方心鏡方】

一治反胃吐食。脾胃氣弱。食不消化。湯飲不下。用粟半升。杵粉。水。

丸。梧子大。七枚。煮熱。入少鹽。空心。

和汁吞下。或云納醋中吞之。得下便已。【醫方心鏡方】

一治鼻衄不止。粟米粉水煮服。

之。【普濟方】

一治嬰孩初生七日。助穀神以導達腸胃。研粟米煮粥。如飴。每日哺少許。【姚和衆方】

一治孩子赤丹。嚼粟米以傳之。【兵部手集方】

一治小兒重舌。嚼粟米以哺之。【子母秘錄方】

一治雜物眯目不出。用生粟米七粒。嚼爛。取汁洗之。即出。【聖濟總錄方】

一治湯火灼傷。粟米炒焦。投水澄取汁。煎稠如糖。頻傳之。能止痛滅癢。痕。一方生牛半炒。研末酒調傳之。【崔行功纂要方】

一治熊虎爪傷。嚼粟米以塗之。【葛氏方】

用量 三錢至四錢。

施用宜忌 凡胃寒者禁用。

參攷資料 一陳粟及三五年尤解煩。開胃。食家亦將食之。【陶弘景】

一粟米利小便。故能益脾胃。【寇宗奭】

一粟之味鹹淡。氣寒下。養腎之穀也。腎病宜食之。虛熱消渴。洩瀉。皆腎病也。滲利小便。所以洩腎邪也。降胃火而脾胃之病宜食之。【李時珍】

一一生者難化。熟

一三三一

①治瘡癰諸瘡。無論新久。童便一升入白蜜三匙。攪去白沫。頓服。取吐碧綠痰出爲妙。若不然。終不除也。(聖惠方)

②治中喝昏悶。夏月人在途中熱死。急移陰處。就拘道上熱土。擁臍上作窩。令人溺滿。暖氣透臍。卽醒。乃服地漿蒜水等藥。(仲景方)

③治中惡不醒。令人尿其面上。卽醒。此扁鵲法也。(肘後方)

④治三十年癰。一切氣塊。宿冷惡病。苦參二斤。童子小便一斗二升。煎取六升。和糯米及麴如常法作酒服。但腹中諸疾皆治。酒放二三年不壞。多作救人神效。(聖惠方)

⑤治金瘡中風。自己小便。日洗二三次。不妨入水。(聖惠方)

⑥治金瘡血出不止。飲人尿五升。(千金方)

⑦治打傷瘀血攻心者。人尿煎服一升。日一服。(蘇恭本草方)

⑧治折傷跌撲。童便入少酒飲之。推陳致新。其功甚大。薛已云。余在居庸。見覆車被傷七人。仆地呻吟。俱令灌此。皆得無事。凡一切傷

損。不問壯弱。及有無瘀血。俱宜服此。若腸脹或作痛。或發熱煩躁口渴。惟服此一甌。勝似他藥。他藥雖效。恐無瘀血。反致誤人。童便不動臟腑。不傷氣血。萬無一失。軍中多用此。屢試有驗。(外科發揮方)

⑨治杖瘡腫毒。服童便良。(千金方)

⑩治火燒闊絕。不省人事者。新尿頓服二三升良。(千金方)

⑪治刺在肉中。用溫小便漬之。(千金方)

⑫治人咬手指。瓶盛熱尿浸一夜卽愈。(通變要法方)

⑬治蛇犬咬傷。以熱尿淋患處。(日華子)

⑭治蛇傷人。令婦人尿於瘡上。最妙法。(千金方)

⑮治蛇經人足。就令尿之便解。(肘後方)

⑯治蜂螫螫毒。人尿洗之。(肘後方)

⑰治蜘蛛咬毒。久臭人溺。於大甕中坐浸。仍取烏雞屎炒浸酒服之。不爾恐毒殺人。(陳藏器本草方)

⑱治百蟲入耳。小便少少滴入。

(聖惠方)

①治勞傷已久。童子小便。乘熱少少頻滴之。(聖惠方)

②治赤目腫痛。自己小便。乘熱抹洗。卽閉目少頃。此以真氣退去邪熱也。(普濟方)

③治腋下狐臭。用自己小便乘熱洗兩腋下。日洗數次。久則自愈。(集簡方)

④治傷胎血結。心腹痛。取童子小便。日服二升良。(楊氏產乳方)

⑤治于死腹中。以夫尿二升煮沸飲之。(千金方)

⑥治中土菌毒。合口椒毒。人尿飲之。(肘後方)

⑦解諸菜毒。小兒尿和乳汁服二升。(海上方)

⑧治催生下胞。用人溺一升。入葱薑各一分。煎二三沸。熱飲便下。(日華本草方)

⑨治痔瘡腫毒。用熱童尿入礬三分洗之一。日二三次效。(救急方)

用量 一盞或一杯。
施用宜忌 凡脾腎虛寒而無火者禁用。

著名方劑 白通加人尿猪膽

汁湯。治傷寒少陰下痢。服白通湯後。利不止。汗出而厥逆。無脈。乾嘔而煩者。此方主之。服後脈暴出者。微續者生。(傷寒論) 蔥白四莖。乾姜一兩。附子一朮。(生用。去皮破八片)。上三味。以水三升。煮取一升。去滓。納入人尿五合。猪膽汁一合。分溫再服。

【童桑葉】卽嫩桑葉之處方用名。詳【桑葉】條。

【童腸】卽紫參之古籍別名。典見別錄。詳【紫參】條。

【筆竹茹】 主治 勞熱。
【筆管菜】卽黃精之俗名。詳【黃精】條。卽魚腥草之古籍別名。典見和漢藥考。詳【魚腥草】條。

【筋子】 藏器)
產地 生山野間。
形態 筋子爲雜草類之一種。莖高尺餘。葉圓厚光潤。凌冬不凋。其根大如指。可供藥用。

性質 苦溫。無毒。
主治 心腹痛。不問冷熱遠近。

陰虛之症。必以此至陽之物助之。使衛逆於上者。得鹹寒之味而順下。妄行於下者。亦得純陽之氣以相依。其在男子陰虛不足者。與之便以滋陰。陽虛不足者。與之便以壯陽。即嘔吐咯衄之症。亦用便以止之。血虛勞熱之症。亦用便以和之。是皆即降火散血之理。而神明其用者也。而究其能散之故。其何道以致此哉。夫飲入於胃。遊溢精氣。上輸於脾。脾氣散精。上歸於肺。通調水道。下輸膀胱。膀胱乃便之舊路也。故能治肺病。引火下行。此其病降火之道也。凡人精氣清者。為氣濁者。為血濁之清者。為津液清之濁者。為小便。小便與血同類也。故其味鹹而走血。治諸血病。此其為散血之道也。昔褚澄書論咳血症云。惟飲溲溺百不一死。若服寒涼百不一生。見道之言。真百試而百驗者歟。人中白。即便之下凝乾久者。故降火消血之用。大略相同。本草以治傳屍勞熱。止肺癰吐血。瀉肝火。三焦火。并膀胱火。從小便而出。其義亦不甚遠也。特其既經火煨。則稍除寒氣。而乾久則效。

十二畫 童

亦稍緩。故熱則用便。緩則用白。秋石即便之依法。以秋露斬其滓穢。經陰陽二煉而成為者。也得日精火煨之氣。已變寒而為溫。況其物本出心腎水火二臟而流於小腸。而又假天地之水。火。凝而為體。又名還元丹。能滋腎水。反本還元。養丹田。歸根復命。安五臟。潤三焦。消痰咳。退骨蒸。轉堅塊。明目清心。延年益壽。其法空心服。陽煉日午服。陰煉久服。去百病。強骨髓。補神血。開心益智。補樓下元。悅色進食。則臍下嘗如火暖。諸般冷疾。久年冷勞。虛癯者皆愈。所以人部中稱人乳汁。紫河車。併斯三者。均為接命之至寶。良不誣也。而瑣碎錄乃云。秋石味鹹走血。使水不勝火。久服令人成渴疾者。必是淫慾之人。藉此放肆。甚或加以陽藥。助其邪火。所主耳。若謂秋石本有此害。豈知秋石哉。

配合應用 ①治陰虛咳嗽聲啞。喉間血腥氣。用童便。枇杷葉。天門冬。麥門冬。蘇子。桑白皮。沙參。五味子。生地黃。款冬花。百部。

②治內傷吐血。或瘀血停留作

痛。用童便。蘇木。番降香。續斷。牛膝。牡丹皮。蒲黃。

③治產後血暈。童便。澤蘭。荊芥。白芷。續斷。延胡索。牛膝。蘇木。黑豆。虛者加人參。凡產後溫飲一盃。可免血暈。至三日後止之。

④治中噤昏倒。以熱小便灌之。即活。

⑤治頭痛至極。童便一盞。歧心半合。同煎至五分溫服。(聖濟總錄方)

⑥治熱病咽痛。童便三合。含之即止。(聖惠方)

⑦治骨蒸發熱。三歲童便五升。煎取一升。以蜜三匙和之。每服二碗。半日更服。此後常取自己小便。服之。輕者二十日。重者五十日。選二十日後。當有蟲如蚰蜒。在身常出。十步內聞病人小便臭者。瘞也。(孟詵必效方)

⑧治男婦怯證。男用童女便。女用童男便。斬頭去尾。日進二次。乾燒餅壓之。月餘全愈矣。(聖惠方)

⑨治久嗽涕唾。肺痿。時時寒熱。煩赤氣急。用童便去頭尾少許。五合。取大粉甘草一寸。四破浸之。露

一夜。去甘草。平日頓服。或入甘草末一錢。同服亦可。一日一劑。童子忌食五辛熱物。(姚僧垣集驗方)

⑩治肺痿咳嗽。鬼氣疰病。停久臭溺。日日溫服之。(集驗方)

⑪治吐血鼻衄。人溺薑汁和勻服一升。(日華本草方)

⑫治菌經吐血。童便溫熱。含之立止。(聖惠方)

⑬治消渴重者。衆人溺坑中水。取一盞服之。勿令病人知。三度瘥。(聖惠方)

⑭治癥積滿腹。諸藥不瘥者。人溺一服。一升下血片塊。二十日即出也。(蘇恭本草方)

⑮治絞腸痧痛。童子小便。服之即止。(聖惠方)

⑯治卒然腹痛。令人騎其腹。溺臍中。(肘後方)

⑰治下痢休息。杏仁去皮。細炒研。以豬肝一具。切片。水洗血淨。置淨鍋中。一重肝。一重杏仁。鋪盡。以童便二升。同煎乾。放冷。任意食之。(聖惠方)

⑱治癰疾渴甚。童便和蜜煎沸頓服。(簡便方)

【童便】

原名 人尿。 命名 本品係取十二歲以下之男童小便故名。

古籍別名 溲小便（素問）輪迴酒還元湯（綱目）還魂酒（和漢藥考）

基本 係取十二歲以下無病童男，不茹葷辛者之小便。

形態 清微如水者入藥用。

採取 取時去其頭尾，以中間一段清微者佳。

用法 取得乘熱飲，冬則隔湯燉溫服，或和湯藥下。

性質 鹹寒，無毒。

效能 滋陰降火，用爲止血消瘀藥。

主治 寒熱頭痛，溫氣，童男者尤良。

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新

修本草論人尿曰：主久嗽上氣失聲，及癥積滿腹。【唐】陳藏器本草拾遺論人尿曰：明目益聲，潤肌膚，利大腸，推陳致新，去咳嗽肺癰，鬼氣瘕病，停久者服之佳。恐冷則和熱湯服。【宋】大明日華諸家本草論人尿曰：止勞渴，潤心肺，療血悶。

熱狂，撲損瘀血在內，單絕止吐血鼻衄，皮膚皴裂，難產，胎衣不下，蛇犬咬。【元】朱丹溪本草衍義補遺論人尿曰：滋陰降火甚速。【明】李時珍本草綱目論人尿曰：殺蟲解毒，療瘡中喝。【明】繆希雍本草經疏論人尿曰：人溺乃津液之濁者，滲入膀胱而出，其味鹹寒，無毒，爲除勞熱骨蒸咳嗽吐血及婦人產後血暈悶絕之聖藥。晉精澄勞極論云：降火甚速，降血甚神。飲溲溺百不一死。服涼藥百不一生，言其功力之優勝也。經云：飲入於胃，游溢精氣，上輸於脾，脾氣散精，上歸於肺，通調水道，下輸膀胱，故人服小便入胃，亦隨脾之氣上歸於肺，下通水道，而入膀胱，乃循其舊路也。故能治肺病，引火下行，凡人精氣清者爲氣濁者爲血濁之清者爲津液清之濁者爲小便與血同類也。故其味鹹而走血，鹹寒能伏虛熱，使火不上炎而血不妄溢，是以能療諸血證也。蘇恭主久嗽上氣失聲，及日華子止勞渴潤心肺，療血悶熱狂，撲損瘀血在內，單絕止吐血鼻衄，皮膚皴裂，難產，胞

衣不下諸證，悉由此故。本經主寒熱頭疼溫氣者，鹹寒能除邪熱故耳。法當熱飲，熱則於中尙有真氣存在，其行自速，冷則惟存鹹味寒性矣。【明】李士材本草圖解論人尿曰：小便鹹寒，滋陰降火，止血和經，去瘀養新，定嗽消痰，童便尤良。【清】黃宮繡本草求真論人尿曰：童便係孩童津液濁氣，滲入膀胱而出，味鹹寒，無毒，爲除勞熱骨蒸咳嗽吐血，婦人產後血暈悶絕之聖藥。精澄遺書云：降火甚速，降血甚神。飲溲溺百不一死，非真不死，甚言功力之優也。經云：飲入於胃，游溢精氣，上輸於脾，脾氣散精，上歸於肺，通調水道，下輸膀胱，故人服小便入胃，亦隨脾之氣上歸於肺，下通水道，而入膀胱，乃尋其舊路也。故能治肺病，引火下行，凡人精氣清者爲氣濁者爲血濁之清者爲津液清之濁者爲小便與血同類也。故味鹹而走血，鹹寒能伏虛熱，使火不上炎，血不妄溢，是以能療諸血證也。凡人久嗽失音，勞渴煩躁，吐衄損傷，皮膚皴裂，人咬火燒，絞腸痧痛，難產，胞衣不

下。法當乘熱飲之，蓋熱則尙存真氣，其行自速，冷則惟有鹹味寒性矣。若救陰却癆，必以童便爲優，蓋取混元之氣，清純而不淆雜耳。今人類用秋石，雖亦能入腎除熱，但經水澄火煉，真元之氣全失，其功不及童便多矣。況多服久服，則鹹能走血，令血凝氣滯，爲病矧有陽氣素虛，食少腸滑者，其可用之爲治乎？取童子十歲以下，相火未動，不食葷腥酸鹹者佳。去頭尾，取中間一節，清微如水者用。痰用薑汁，瘀用薑汁，冬月用湯溫之。

近人學說

閻立陞曰：童便味鹹寒，無毒，純陽之物也，爲降相火之要藥，消瘀血之神品。本草治勞渴潤心肺，療陰虛火動熱，蒸如燎，久嗽失聲，及治虛中渴洗暴發赤眼，潤口舌生瘡，是降火之用也。

療血悶，熱狂，撲損瘀血在內，單絕止吐血鼻血，難產，胞衣不下，血凝頭痛，蛇犬咬，是散血之用也。故婦人臨產之時，血上搶心，惡心煩悶者，已產之後，去血過多，陰無所附者，產內血閉，惡露不行者，或呵欠頓悶，或嘔逆不止，或白汗多來，皆

【見別錄】詳『鍾乳石』條。

【留行子】即王不留行之處方用名。詳『王不留行』條。

【留求子】即使君子之古籍別名。典見綱目。詳『使君子』條。

【雷軍待】產地 生山谷中。形態 留軍待爲雜木類之一種。其葉似楮而細長。可供藥用。

性實 辛溫。無毒。

主治 肢節風痛。折傷瘀血。擊痛。

【雷師】即竹蜂之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『竹蜂』條。

【雷師蜜】即竹蜂蜜之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『竹蜂』條。

【雷黃】即石硫黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳『石硫黃』條。

【疏趾】即雄之古籍別名。典見綱目。詳『雄』條。

【痛痛草】即毒麻之日本別名。詳『毒麻』條。

【登相子】即東廬之古籍別名。典見保德州志。詳『東廬』條。

【登粟】即登相子之別名。詳『東廬』條。

【登相子】即登相子之別名。詳『東廬』條。

【登慈子】即萊服子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『萊服子』條。

【發狂草】即莨菪子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『莨菪子』條。

【發里里安】即甘松之西名。詳『甘松』條。

【被皮】即荔枝之古籍別名。典見和漢藥考。詳『荔枝』條。

【盛樓】即旋覆花之古籍別名。典見和漢藥考。詳『旋覆花』條。

【盜庚】即旋覆之古籍別名。典見爾雅。詳『旋覆花』條。

【短狐】即溪鬼蟲之古籍別名。典見廣雅。詳『溪鬼蟲』條。

【短青】即羅漢松之短者。典見綱目拾遺。詳『羅漢松』條。

【短脚三郎】產地 生南安。形態 高五六寸。橫根稍色。叢發。結莖葉生梢頭。秋結圓實。下垂。生青熟紅。與小青相類。可供藥用。



短脚三郎

性實 熱。

主治 跌打損傷。風痛。

【硝石】即消石之古籍別名。典見和漢藥考。詳『消石』條。

【硝石朴】即朴硝之原名。詳『朴硝』條。

【硝黃半夏麴】原名 硝黃。採取 以陳久者良。

製法 用半夏入芒硝三分之一。煮透。與大黃膏和成。草廬七日。待生黃衣。懸掛風乾。入藥用。

主治 中風卒厥。傷寒熱狂。由於痰濁者。

【硝黃麴】即硝黃半夏麴之原名。詳『硝黃半夏麴』條。

【硝礬】即礬砂之古籍別名。典見和漢藥考。詳『礬砂』條。

【礬整】即車螯之別名。詳『車螯』條。

【礬礪】即車渠之別名。詳『車渠』條。

【硫黃】即石硫黃之古籍別名。典見吳普本草。詳『石硫黃』條。

【硫黃油】即石腦油之古籍別名。典見綱目。詳『石腦油』條。

【硫黃油】即石腦油之古籍別名。典見綱目。詳『石腦油』條。

【硫黃盆】即石硫黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳『石硫黃』條。

【硫黃香】命名 本品形如硫黃。而氣香故名。

性實 辛溫。無毒。

主治 去惡氣。殺蟲。

【硫黃香】即石硫黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳『石硫黃』條。

【硫礬】即石硫黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳『石硫黃』條。

【根】即狼尾草之古籍別名。典見爾雅。詳『狼尾草』條。

【程】即豹之古籍別名。典見列子。詳『豹』條。

【稌】即糯米之古籍別名。典見綱目。詳『糯米』條。

【耐瓜】即越瓜之古籍別名。典見食物本草。詳『越瓜』條。

【硬石膏】即長石之古籍別名。典見綱目。詳『長石』條。

【硬飯】即土茯苓之古籍別名。典見綱目。詳『土茯苓』條。

【硬穠】即土茯苓之古籍別名。典見和漢藥考。詳『土茯苓』條。

【稌米】即稌米之古籍別名。典見綱目。詳『稌米』條。

不能容者。卽爲游藤。宜剪去之。及掘根時。捲去藤蔓。俱可飼牛羊。豕或曬乾。冬月餵皆能令肥。脂。二三月種者。每株用地方二步有半。而卵偏焉。每官畝約用薯三十六株。四五月種者。地方二步而卵偏焉。畝約六十株。六月種者。地方一步有半。而卵偏焉。約一百六株有奇。七月種者。地方三尺以內。得卵細小矣。畝約九百六十株。種種疎密。略以此準之。九月畦種生卵如薯。如棗。擬作種。此松江法也。金氏曰。薯苗入地卽活。東西南北無地不宜。得沙土高地結尤多。天時早澇。俱能有秋。養苗地宜鬆。耕過須起。町高四五寸。春分後取薯種。科置町內。發土薄蓋。縱橫相去尺許。半月卽發芽。日漸蔓長。一丈或五六尺。割七八寸爲一莖。勿割盡。留半寸許。當割處復發。生生不息。若養薯作苗。須用稍長尺許。密密栽。豎如養葱蒜法。栽莖使牛耕町。寬二丈許。高五六寸。將莖斜插町心。約以七分在町內。三分在町外。町內者結實。町外者滋蔓。每莖相去一尺餘。十餘日町兩旁使牛耕開。令

曬。又七八日。以糞壅之。仍使牛培上。每町可得薯三四觔。若雨多。須將蔓撥町上。毋令浮根。匝地然實。結地內。蟲不能災。葉如食盡。亦能復發。早栽宜稀。晚栽宜密。三四月栽者。實粗大。七八月栽者。實細小。秋末實始加大。冬至前當掘盡。不掘盡亦不能大。熟時須先割蔓。置町下。俟乾捲起。冬月割饌牲畜。若北地早寒。則遲一個月栽。早一個月掘。宜遲宜早。亦看天氣冷暖。耳。甘薯疏云。江南田汙下者不宜薯。若高仰之地。平時種藍。種豆者。易以種薯。有數倍之獲。大江以北。土更高地更廣。卽其利百倍不啻矣。倘慮天旱。則此種畝收十石數口之家。止種一畝。縱旱甚而汲井灌漑。一至成熟。終歲足食。又何不可取種之法。羣芳譜云。九月十月間掘薯。卽近根先生者。勿令損傷。用輾草包裹。掛通風處陰乾。一法於八月申揀近根老藤。剪七八寸長。每七八根作一小束。耕地作畦。將藤束栽。卽栽韭法。過月餘。每條下生小卵如蒜頭狀。冬月畏寒。稍用草蓋。覆至來春分種。一法霜降前

取近根卵稍堅實者。陰乾。以輾草作棚。另以輾草裹之。置無風和暖不近霜雪。不受冰凍處。一法霜降前收取根藤。曬令乾。於簷下掘窖。約深一尺五六寸。先用稻糠三四寸。次置種其上。更加稻糠三四寸。以土蓋之一法。七八月取老藤。種入木桶或磁瓦器中。至霜降前置草窩中。以稻糠覆置向陽近火處。至春分後。依前法種。金氏曰。存薯之法不一。在人變通。或存木斛草。陶磁藥竹籠中俱可。但性畏寒。又畏熱。置避風和暖處。用草浮蓋。俾通氣。若封固則發熱壞爛。敏前在東甌玉環。見其島民。少穀食。多以茹爲糧。彼土有地率多種茹。土人云。其利十倍於穀。以茹糧多者爲富。其收茹之法。多曝乾切條。以竹席圍如圍籬之。久亦不蛀。用則以水煮代飯。食之多力。鮮病。蓋其味甘。能補脾土故也。金氏曰。薯初結卽可食。味淡多汁。及時則甜。煨食。煮食。燻食。蒸食。亦可生食。切片曝乾。碾作饅頭。磨作粉。餌滾水。灼可作丸。拌麵可作酒。吞細水瀝去渣。澄曬成粉。其葉可作蔬。范咸臺

灣府志。長而色白者。是舊種。圓而黃赤者。出自文來。國金姓者。攜回故名金薯。諸羅縣志。他物下種。必用子用仁。或原物根芽。獨薯不然。取一條。片片切之。只留皮一面。種之發根。〔綱目拾遺〕甘薯俗傳能發諸病。患痔者。愈後食之。復發。以性能下行而滯氣故也。〔趙學敏〕

【番羅葡子】卽胡盧巴之古籍別名。典見和漢藥考。詳「胡盧巴」條。

【畫石】卽滑石之古籍別名。典見本草衍義。詳「滑石」條。

【畫眉石】卽黑石脂之古籍別名。典見綱目。詳「黑石脂」條。

【畫粉】卽白粟之古籍別名。典見綱目。詳「白粟」條。

【異草】產地 生籬木間。形體 異草爲雜草類之一種。附木而生。葉如葵。莖旁有角折斷有白汁。可供藥用。性質 甘無毒。主治 癰疽寒熱。去濕。祛風。

【異翹】卽連翹之古籍別名。典見爾雅。詳「連翹」條。

【閬公乳】卽鍾乳石之古籍別名。

虛稱其陰。氣滯順其氣。其有不宜辛燥寒涼。而宜於清和者。用此薯蓣。旋類服。調養其脾。使脾健生化。經期自定。

●治小兒疳疾。疳者乾也。在小兒爲五疳。在成人爲五勞。其病由於哺食乾燥之品。嗜啖肥厚之物。妄服峻利之藥。以致津液乾涸。延而成疳。此薯最潤燥生津。安神養胃。使常服之。則舊積化而疳愈矣。

參攷資料

●按陳祈暢異物志云。甘藷出交廣。南方民家。以二月種。十月收之。其根似芋。亦有巨魁。大者如鵝卵。小者如雞鴨卵。剝去紫皮。肌肉正白如肌。南人用當米穀。果實蒸炙。皆香美。初時甚甜。經久得風稍淡也。又按舊含草木狀云。甘藷薯蓣之類。或云芋類也。根葉亦如芋根。大如拳。顯蒸食之。味同薯蓣。性不甚冷。珠庄之不一業耕者。惟種此。蒸切曬收。以充糧。稷名藷糧。海中之人多壽。亦由不食五穀而食甘藷故也。(李時珍) ●甘藷即薯蓣之屬。見於陳祈暢異物志。舊含南方草木狀。中土之

有此物。其來舊矣。第不甚貴重。栽植者少。明季有閩人陳經綸。復自呂宋移其種歸。巡撫金公學曾勸民樹藝。閩人德之。號爲金薯。然自是長樂謝肇淩。浙黃州李時珍。新城王象晉。各有論述。皆不及經綸事。而其裔孫世元父子。復爲金薯傳習錄。盛侈其先世傳自呂宋之功。一似中國素非所產者。此考證之疎也。夫以一物之微。足以備荒療疾。不費功力。其爲功於民食。實不淺矣。前任布政使李公渭。嘗舉以教山東之民。其性又喜沙土高地。於山海之區尤屬相宜。五雜俎百穀之外。有可以當穀者。芋也。薯蓣也。而閩中有番薯。似山藥而肥白。過之種沙地易生。而極蕃衍。饑饉之民。多賴全活。此物北方亦可種也。羣芳譜朱薯一名番薯。大者名玉枕。薯形圓而長。本末皆銳。皮紫肉白。質理膩潤。與芋及薯蓣自是各種。氣香。生時似桂花。熟者似薔薇。露撲地纏生。一莖蔓延數十百莖。節節生根。一畝種數十石。勝種穀二十倍。閩廣人以當米穀。有謂性冷者。非二三月及七八月俱可

種。但卵有大小耳。卵八九月始生。冬至乃止。生便可食。若未大者勿頓掘。令居土中。日漸大。到冬至須盡掘出。否則敗爛。金氏學曾曰。薯蓣外番。因名番薯。形如王瓜。藕臂如拳。如指。如卵。如棗。大小不一。實同種。別皮有紫有白。有深淺紅。有濃淡黃。肉亦如之。蒸熟勻膩。如脂。甘平。益胃。性同薯蓣。海隅人以供饗。爐蔓延極速。節節有根。入地即結。每畝可得數千斤。勝種五穀幾倍。徐氏元冠曰。昔人謂蔓薯有六。利市有七。絕子謂甘薯有十二。勝收入多一也。白色味甘。諸土種中特爲寬絕。二也。益人與薯蓣同功。三也。偏地傳生。剪莖作種。今歲一莖。次年便可種數十畝。四也。枝葉附地。隨節生根。風雨不能侵損。五也可當米。凶歲不能災。六也可充簞食。七也可釀酒。八也。乾久收藏。屑之旋作餅餌。勝用錫蜜。九也。生熟皆可食。十也。用地少。易於灌漑。十一也。春夏下種。初冬收入。植葉極盛。草穢不容。但須壅培。不用鋤耘。不妨農。十二也。陸公薯錄有澁種。藏製諸法。雖無關於藥病。而有

濟於備荒。故併錄之。種薯宜高地。沙地。起骨尺餘。種在脊上。遇旱可汲井澆灌。即遇澇年。若水退。在七月中氣候。既不及藝五穀。即可剪藤種薯。至於蝗蝻爲害。草禾蕩盡。惟薯根在地。薦食不及。縱令莖葉皆盡。尚能發生。若蝗信到時。急令人發土。偏壅。蝗去之後。滋生更易。是天災物害。皆不能爲之損。人家凡有隙地。但只數尺。仰見天日。便可種得石許。此救荒第一義也。歲前深耕。以大糞壅之。春分後下種。若地非沙土。先用柴灰或牛馬糞和土中。便土脈散緩。與沙土同可行。根重耕起要極深。將薯根每段截三四寸長。覆土深半寸許。每株相去縱七八尺。橫二三尺。俟蔓生既盛。苗長一丈。留二尺。作老根。餘剪三葉爲一段。插入土中。每栽苗相去一尺。大約二分入土。一分在外。即又生薯。隨長隨剪。隨種隨生。蔓延與原種者不異。凡栽薯須順栽。若倒栽則不生。節在土上則生。枝在土下則生。明約各節生根。即從其連綴處斷之。令各成根苗。每節可得卵三五枚。凡藤蔓已遍地。

作用

旃那葉之作用較諸大黃少強。內服小量（二分六釐至五分）約間五六小時。則始呈其作用。起初放矢。以後不腹痛而起排泄。形似粥糜狀之糞便。內服大量（二錢至一錢三分）約間三小時後。則發嘔氣嘔吐。雷鳴腹痛。利下瀉薄。且損食氣。增加痔瘡及子宮之出血。甚之有致流產者。故於妊婦不宜服此。但能亢進大腸之蠕動。刺戟腸之管壁。較諸他種瀉下藥。則一時雖為微弱。而於腸管有炎之症。則頗增劇。極易誘起腸黏膜炎。故有此症時。最宜忌之。

主治 心腹脹滿。便秘積滯。并治膨脹水腫。屢試輒驗。多服令人肚疼反胃。宜佐香味藥同服。

辨偽 旃那葉銳尖形。質薄。黃綠色者。堪稱道地。如葉尖圓而厚。味獨苦而不甘者。則屬贗品。不入藥用。

用法 泡服。或作散末服。或為丸劑。浸劑均可。

用量 小量二分半至五分。中量一錢至一錢半。大量二錢至三四錢。

參攷資料

服大量之旃那葉後。有惹起惡心嘔吐等症狀。此為含有樹脂樣之物質也。預以酒精浸製。除去其樹脂樣之物質。毫無逗留。使無損發性之油脂存在。則仍不減瀉下之效。而可免惡心嘔吐之不快。（華實孚）

【番薯】

原名 甘藷。

古籍別名 朱薯。（綱目拾遺）紅藷（植物學大辭典）薩摩薯。琉球薯。唐薯（日本山芋番薯。番薯。番茹（俗名）金第。金薯。外國名詞 Ipomoea batatas, Lam. (拉丁)

基本 係旋花科牽牛子屬甘藷類。

產地 產自南洋羣島。及暖地原野。多有出。



(一) 薯 番

形體 甘藷為菜類之多年生草本。莖細長。匍匐地上。葉卵形。或心臟形。有長葉柄。互生。花作合瓣。

花冠紫色。如漏斗狀。二三月及七八月間。均可下種。大抵春種者塊根大。秋種者塊根小。其皮色有紫有白。有深淺紅。有濃淡黃。肉亦如之。要之紅皮者。心黃而味甜。白皮者。心白而味淡。其實理賦潤如脂。可供食與藥用。



(二) 薯 番

性質 甘平。無毒。

主治 補虛乏。益氣力。健脾胃。強腎陰。功同薯蕷。

歷代記述攷證 【清】趙學敏

本草綱目拾遺論番薯曰。補中和血。暖胃。肥五臟。白皮白肉者。益肺氣。生津。中滿者。不宜多食。能壅氣。煮時加生薑一片。調中與薑棗同功。紅花煮食。可理脾血。使不外洩也。

配合應用

① 治痢疾下血。痢疾之起。多因脾胃先虛。而後積滯成痢。其有脾氣虛甚。欲健中焦者。必宜甘溫之藥。其有命門不暖。欲

實下焦者。必宜純熱之藥。至若濕熱所致。煩熱口渴。腹痛純紅。小水黃赤。以及下血者。用此薯蕷熟。以芍藥湯類。頻服。或薯粉調冬蜜服。亦愈。（傳習錄方）

② 治酒積熱瀉。泄瀉之症。不一。或水土相亂。併歸大腸而瀉。或土不制水。清濁不分而瀉。或小腸受傷。氣化無權而瀉。或真陰虧損。元陽枯涸而瀉者。此皆各從其類治之。若酒滲入脾。因而發泄者。用此薯蕷熟食。（傳習錄方）

③ 治溼熱黃疸。黃疸之症。有四。一曰陰黃。由氣血敗也。一曰表邪發黃。即傷寒症也。一曰膽黃。驚恐所致也。更有陽黃一症。或風溼外感。或酒食內傷。因溼成熱。因熱成黃者。用此薯蕷食。其黃自退。

④ 治遺精淋濁。遺精與淋濁症不同。故治亦不同。然大要實在心脾。腎故凡遇此症。無論有夢無夢。有火無火。或氣淋。血淋。膏淋。勞淋。總宜調養心脾。每早晚用此粉調服。大有奇功。

⑤ 治血虛經亂。婦人血虛。或遲或早。經多不定。故陽虛補其陽。陰



番紅花

性質 甘平。無毒。

主治 心憂鬱積。氣悶不散。活血。久服令人心喜。又治驚悸。

參攷資料 ①番紅花元時以入食饌用。李時珍②番紅花西醫視為開胃行經之品。又可為著色之用。(醫學大辭典)

【番苦荬】即番慈茹之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「番慈茹」條。

【番茄】即茄子之古籍別名。典見綱目。詳「茄子」條。

【番茹】即番藟之俗名。詳「番藟」條。

【番國米】即西國米之古籍別名。典見和漢藥考。詳「西國米」條。

【番荷】即薄荷之古籍別名。典見千金方。詳「薄荷」條。

【番麥】即玉蜀黍之古籍別名。典見綱目。詳「玉蜀黍」條。

【番棗】即無漏子之古籍別名。典見嶺表異錄。詳「無漏子」條。

【番椒】即辣茄參見「番椒」條。

【番蒜】一種。其外形似木瓜。中形似柿。可供藥用。

參攷資料 昔有浮山張氏。宣於閩。一婢食龍肉後。誤食莧。遂病面黃腹脹。破碗欲死者。數矣。半載後。有饋番蒜者。婢偶食之。遂大瀉。有物如小鼈者。數十。頃刻爽然。其疾若失。方知番蒜可治龍毒也。(趙學敏)

主治 消龍瘕。解毒水毒。

參攷資料 昔有浮山張氏。宣於閩。一婢食龍肉後。誤食莧。遂病面黃腹脹。破碗欲死者。數矣。半載後。有饋番蒜者。婢偶食之。遂大瀉。有物如小鼈者。數十。頃刻爽然。其疾若失。方知番蒜可治龍毒也。(趙學敏)

【番蕉】即無漏子之樹名。典見和漢藥考。詳「無漏子」條。②即鳳尾蕉之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「鳳尾蕉」條。

【番慈茹】心痛草(綱目拾遺) 古籍別名 番苦荬。

產地 種出荷蘭。

形態 番慈茹為雜草類之一種。其葉秀嫩如雲板。曬乾則香結子青紅色。可供藥用。

主治 一切心氣痛。

【番薑】即辣茄之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「番椒」條。

【番薑】即辣茄之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「番椒」條。

【番薑】即辣茄之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「番椒」條。

【番薑】即辣茄之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「番椒」條。

【番薑】即辣茄之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「番椒」條。

【番薑】即辣茄之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「番椒」條。

【番薑】即辣茄之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「番椒」條。

【番薑】即辣茄之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「番椒」條。

【番薑】即辣茄之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「番椒」條。

【番瀉葉】原名 旃那。處方用名 洋瀉葉。

古籍別名 新拿。辛黎。辛那。辛拿。藥物大成。

外國名詞 Cassia acutifolia Del. (拉丁) ヤハナ (日本)

基本 係豆科決明屬 (Cassia alpinaceae) (亦作山扁豆屬)

為亞歷山旃那 (Cassia acutifolia Delile) 支內威黎旃那 (Cassia anystifolia Vahl)

等樹葉之乾燥者。

產地 為熱帶地方亞非利加之埃及。印度之替納勿里。與中國南部。

形態 旃那為灌木狀之植物。樹幹高約二三尺。葉偶數羽狀複葉。葉小長卵形而銳尖。似小刀狀。葉體扁平。而不反曲。質堅強而薄。帶黃綠色。葉柄甚短。邊緣平坦。全

無毛茸。或惟於葉脈上少許有之。花雷五瓣。稍不整齊。花色嫩黃。果實反莢。形狀扁平。厚而灰黯。密數硬毛。採其葉用於下劑。最著效果。

性質 甘苦。大寒。兼有毒臭。

成分 旃那葉之主要成分。為加答爾精酸 (Katharineinsaur)

為無晶形黑褐色之物質。此外另含有加答爾滿尼篤 (Kathar-tomanin 糖質) 佩利沙列精 (Chrysoretin 黃色素) 旃那必

佩林 (Sennapizin 苦味質) 及植物鹽。加答爾精酸。被吸收於血液。中。後由部分泌而排泄。故婦人內服本品後之乳汁。小兒飲之。亦能起同樣性之下利。而旃那中之黃色素。於十五分時。已現於尿中。尿亦被染為黃褐色。

效能 旃那葉之瀉下效力。頗為確實。故於一時性之便秘服之。即可以促進腸之排泄。如服小量 (二分六釐) 並可消化積食。增加食慾。如服適量 (五分至一錢) 功能緩下。欲其大瀉。則服二錢至三錢之浸劑。不問數小時。即起效用而瀉瀉也。

【番薑】即辣茄之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「番椒」條。

【番薑】即辣茄之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「番椒」條。

【番薑】即辣茄之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「番椒」條。

【番薑】即辣茄之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「番椒」條。

【番薑】即辣茄之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「番椒」條。

【番薑】即辣茄之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「番椒」條。

【番薑】即辣茄之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「番椒」條。

【番薑】即辣茄之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「番椒」條。

【番薑】即辣茄之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「番椒」條。

【番薑】即辣茄之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「番椒」條。



番瀉葉

出西番南番。乃楓木津液多年所

化。色黃而明瑩者名蠟珀。色若松

香。紅而且黃者名明珀。有香者名

香珀。出高麗倭國者。色深紅。有蜂

蟻松枝香尤好。(李時珍)

【琥珀】即松脂之古籍別名。典

見和漢藥考。詳「松脂」條。

【琥珀屑】即琥珀之處方用名。詳

「琥珀」條。

【琥珀香】即伽楠香之古籍別名。

典見綱目拾遺。詳「伽楠香」條。

【番木鱉】古籍別名。馬錢子。

苦實把豆。火失刻把

都。(綱目)

外國名詞 Semen Strychni

基本 屬馬錢科之常綠樹。爲

番木鱉之種子。

產地 原產印度。今西藏亦有

產焉。



番 木 鱉

形體 番木鱉形扁。圓者略曲。色灰黃。直徑二十耗。厚四耗。表面

生毛茸。胚堅硬如角質。藏於七耗

長之芽苞內。但核小於木鱉。而色

白味苦。

採取 八九月採實取仁用。

用法 恒以搗到。和作外治藥。

性質 苦寒。無毒。

成分 主要素爲 Strychnine

($C_{21}H_{22}N_2O_8$) Brucine ($C_{28}H_{44}N_2O_8$) Iguanurine Loganine

作用 入胃時。無任何變化。至

腸能刺激腸壁神經。使腸之蠕動

增劇。而令大便祕結。一部分仍由

大便排出一部分由腸壁吸入而

達血中。略能阻止血球氮化。及排

出二氮化炭之功。然最顯著之作

用。即由神經而達腦部。使腦神經

特別興奮。且能延長數日之久。若

服大量則腦神經反被麻醉。全身

血液因氣分而停止流動。甚至呼

吸弛緩。四肢痙攣而死。

主治 傷寒熱病咽喉痺痛。消

痞塊。並含之嚙汁。或磨水嚙嚙。及

治神經衰弱症。腦貧血。

配合應用 治喉痺作痛。番

木鱉青木香山豆根等分爲末。吹

之。(楊琪醫方摘要)

治經喉風腫。番木鱉仁一個。

木香三分。同礬水調熊膽三分。膽

礬五分。以雞毛掃患處取效。(唐

璠經驗方)

治斑瘡入目。苦實把豆兒。即

馬錢子半個。輕粉水花。銀珠各五

分。片腦麝香。枯礬少許。爲末。左目

吹右耳。右目吹左耳。日二次。(田

日華飛鴻集方)

治病欲去胎。苦實把豆兒研

膏。納入牝戶三寸。(集簡方)

參攷資料 番木鱉狀似馬

之連錢。故名馬錢。(李時珍) 番

木鱉生回回國。今西土印州諸處

皆有之。蔓生。夏開黃花。七八月結

實如栝樓。生青熟赤。亦如木鱉。其

核小於木鱉。而色白。彼人言治一

百二十種病。每證各有湯引。或云

以豆腐製過用之良。或云能毒狗

(西藥略釋)

【番石】即滑石之古籍別名。典見

別錄。詳「滑石」條。

【番豆】即落花生之古籍別名。典

見物理小識。詳「落花生」條。

【番南瓜】即南瓜之古籍別名。典

見和漢藥考。詳「南瓜」條。

【番姜】即蕃椒之古籍別名。典見

范成台灣府志。詳「蕃椒」條。

【番紅花】命 本品爲紅藍

花之出於番地者。故

名。

古籍別名 泊夫藍。撒法郎。(

綱目)

外國名詞 Crocus Sativus,

工(拉丁)サフラン(日本)

基本 係鳶尾科番紅花屬。爲

番紅花之花。

產地 生西番回國諸地。

形體 番紅花爲澤草類之多

年生草本。高四五寸。地下莖與水

仙之鱗莖相似。葉較水仙細長。亦

叢生。有並行脈。夏秋間花自莖叢

中出。花蓋六片。青綠色。或白色。或

淡紫色。有香氣。雄蕊三。雌蕊一。其

花可供藥用。

腹痛寒熱等證極效。

①琥珀和大黃、鼈甲作散子。酒下方寸匕。下婦人腹內惡血。

②琥珀同鼈甲、京三稜各一兩。

③延胡索各半兩、大黃六銖。熬搗爲散。空心酒服三錢。治婦人癥瘕氣塊及產後血暈。閉經。見枕痛甚虛極者。減大黃。

④琥珀同丹砂、滑石、竹葉、麥冬、木通。治心家有熱。小腸受之。因之小水不利立效。

⑤琥珀同人爪、珍珠、瑪瑙、珊瑚。除目翳赤障。

⑥琥珀得丹砂、犀角、羚羊角、天竺黃、遠志、茯神、鎮驚、小諸癰。

⑦治小兒胎驚。琥珀防風各一錢。丹砂半錢爲末。豬乳調一字入口中。最妙。(直指方)

⑧治小兒胎癰。琥珀、丹砂各少許。全蠍一枚爲末。麥門冬湯調一服。(直指方)

⑨治小兒轉胞。真琥珀一兩爲末。用水四升。葱白十莖。麥汁三升。入琥珀末二錢。溫服。砂石諸淋。三服皆效。(聖惠方)

⑩治小便淋瀝。琥珀爲末二錢。

麝香少許。白湯服之。或莖草煎湯服。老人虛人。以人參湯下。亦可蜜丸。以赤茯苓湯下。(普濟方)

⑪治從高墜下。有瘀血在內。刮琥珀屑。酒服方寸匕。或入蒲黃二

三匙。日服四五次。(外臺祕要方)

⑫治金瘡。閉絕不識人。琥珀研粉。童子小便調一錢。三服瘥。(鬼遺方)

⑬治小便尿血。琥珀爲末。每服二錢。燈芯湯下。(直指方)

⑭治魚骨哽咽。六七日不出。用塊琥珀珠一串。推入咽所。牽引之。即出其骨。(外臺祕要方)

⑮用量 三分至八分

⑯施用宜忌 凡陰虛內熱。水虧火旺者禁用。

⑰著名方劑 ①琥珀散。止生血

肌。鎮心明目。破癥瘕氣塊。產後血暈。閉絕。兒枕痛。並主之。(海藥本草方)

②琥珀、鼈甲、京三稜各一兩。延胡索半兩。沒藥半兩。大黃六銖。共研末。爲散。空心酒服三錢。七日再服。神驗。莫及。產後減大黃。③神效琥珀散。治石淋水道澀痛。頻下沙石。(醫宗必讀方)

④琥珀桂心

(去皮)滑石(水飛)大黃、葵子、膩粉、木通、香磁石(煨酒淬七次研)各等分。共研細末。每服二錢。燈芯葱白煎湯調服。

⑤參攷資料 ①古方用爲利小便。以燥脾土有功。脾能運化。肺氣下降。故小便可通。若血少不利者。反致其燥急之苦。(朱震亨)②俗

中多帶之脾惡。甜削服療瘀血至驗。仙經無正用。(陶弘景)③和大黃、鼈甲作散。酒下方寸匕。惡血婦人腹內血盡。卽止。宋高祖時。寧州貢琥珀枕。碎以賜軍士。用傳金甌

(陳藏器)④舊說松脂淪入地千年所化。今燒之亦作松氣。亦有中

有一峰形色如生者。博物志乃云。燒蜂窠所作。恐非實也。此或蜂爲松脂所沾。因墜地淪沒爾。亦有煮

蠟雞子及青魚鮓作者。並非真。惟以手心摩熱。拾芥爲真。今並從外國來。而出茯苓處。並無不知出琥珀處。復有茯苓否也。(陶弘景)

⑤琥珀是海松木中津液。初若桃膠。後乃凝結。復有南珀。不及舶上來者。(李珣)⑥諸家所說茯苓琥珀

雖有小異。同皆云松脂所化。但茯苓

者。茯神乃大松摧折。或斫伐而根癯不朽。津液下流而結成。故治心腎通津液也。若琥珀乃是松樹枝節榮盛時。爲炎日所灼。流脂出樹身外。日漸厚大。因墜土中。津潤歲

久爲土所滲漚。而光瑩之體獨存。今可拾芥。尚有黏性。故其蟲蟻之類。乃木入土時所黏者。二物皆自松出。而所聚各異。茯苓生於陰而

成於陽。琥珀生於陽而成於陰。故皆治營安心而利水也。(陳承)⑦

凡用須分紅松脂、石珀、水珀、花珀、物象珀、鹽珀、琥珀。其紅松脂如琥珀。只是潤大膽文。水珀多無紅

色。如淺黃多皺文。石珀如石重。色黃不瑩。用花珀文如新馬尾松心

文一路。赤一路黃。物象珀其內自有物。命人用神妙。鹽珀是象珀之

長。琥珀如血色。以布拭熱。吸得芥子者。真也。(雷敩)⑧琥珀拾芥。乃草芥卽不草也。雷氏言拾芥于誤

矣。唐書載西域康干河松木。入水一二年。化爲石。正與松楓諸木潛入土化珀同一理也。今金齒麗江

亦有之。其茯苓千年化琥珀之說。亦誤傳也。按曹昭格古論云。琥珀

十二畫 琥

辨偽 ①鄭省廬曰。琥珀出西番南番。及松樹楓木津液墜地。多年所化。色黃而明瑩者。名蠟珀。色若松香。紅而且黃者。名明珀。有香者。名香珀。出高麗。日本者。色深紅。凡中有蜂蟻松枝。形色如生者。尤好。當以手心摩熱。拾芥爲真。氣味甘平無毒。能安五臟。定魂魄。消痰血。通五淋。近有以松脂偽造。混售。松脂氣味苦溫。性不同。則功自別。②曹炳章曰。按南蠻記云。寧州有折腰峯。岸崩則蜂出。土人燒治。以爲琥珀。常見琥珀中有物如蜂形。此說亦難憑。信列仙傳云。松柏脂入地千年。成爲茯苓。茯苓化爲琥珀。今泰山出茯苓。而無琥珀。益州永昌出琥珀。而無茯苓。亦無實據。或言龍血入地爲琥珀。或言虎死時目光淪入地生琥珀。故又名虎魄。此屬無稽神話。更無價值可言。元中記言。松脂入地爲琥珀。廣志云。哀牢縣生有琥珀。生地中。其土及旁不草。深者八九尺。大者如斛。削去外皮。中成琥珀。初如桃膠凝結成也。滇志云。雲南麗江出者。其產地旁不生草木。深八九尺。大者

如斗。削去外皮。中成琥珀。紅大明透者。爲血珀。最佳。黃嫩者。力薄。爲金珀。次之。今蠻地莫對江猛拱地產此。夷民皆鑿山而得。與開礦無異。滇南雜誌云。琥珀產緬蠻諸西夷地。以火珀及杏紅血珀爲上。金珀次之。蠟珀最下。供藥餌而已。又云。珀根有黑有白。有如雀腦。據諸家所說。是屬礦物質無疑。化學易知云。琥珀爲地內變化之松香。內含數種松香之質。史廷鵬說。琥珀云。琥珀爲松柏等脂液。埋置土內。日久遂成化石。雖云礦物。仍胚胎於植物者也。其成分純屬有機化。合平均百分中含炭素七八·九四。水素一〇·五三。酸素一〇·五三。又往往有小蟲肢體混含其內。是必當時蟲類飛行。適觸流動狀之脂液中。陷入不復得脫。(南蠻記所說。或此類歟。)遂併而爲一焉。色黃而赤。又有呈褐色者。豐紅與黑。殆所罕見。則體爲不規則狀。多小顆。德國柏林博物館所藏重量達十八磅。洵世界最大之產物也。性脆爲半透明體。重量極低。與水相若。倘置於一零五一零九

之海水中。則浮而不沉。硬度二乃至二五。較石膏猶過之。以銅片擦之。則易損傷。以布摩之。生強電氣。能引紙片毛髮等。但傳熱極鈍。加熱至攝氏百五十度而始柔軟。二百度至三百度而始溶解。若投於火。最易燃燒。放黃燄與香氣。其殘餘之灰燼。適如海綿狀之炭物質。亦一奇觀也。其生產地。在北德之波羅的海濱。就中摩麥且澤岡。產額最多。其狀態可分爲二。其一屬第三紀之下部。漸新統與褐炭層俱現。爲母床。其二遇海波之衝擊。及風雨冰雪之作用。離母床。離海沙而漂積。其產於海濱者。稱海琥珀。質純而均。歷久不變色。比之山產。實遠過之。一千八百六十年頃。撒謨蘭島發見琥珀母床。後其坑道近傍。常有天然露出者。與前紀之海濱產。同爲北德之特色。此係德國產之琥珀。科學之研究也。更據中國產之琥珀。以藥用者之鑑別。以深紅明透質鬆脆者。爲血珀。最佳。廣西產者。色紅明亮。爲西珀。亦佳。黃嫩者。次之。金珀更次。廈門產者。色淡黃。有松香氣。爲洋珀。更

次。他如雲貴邊省人死。以松香槨。填材底。伏土深久。松香由黃轉黑。土人名曰老材香。以充琥珀。年久古墓中。往往發見之。然神色黑。無神光。仍含松香氣。爲最次。不入藥用。欲辨真偽。試將琥珀摩擦之。能發電氣。拾芥者。眞。偽者不發電氣。放樟腦氣。置酒精中。最易浸入。以刀削之。不能粉末。而爲小片。其硬度比天然產。爲高。皆爲偽品。眞者刀刮。鬆脆。成粉。凡安心神。定魂魄。宜生用。與燈芯同研。去燈芯。眼科宜入豆腐內煮用。③柯等和曰。琥珀以產自雲貴者。爲佳。其色紫紅。明亮。名雲珀。陝西產者。名西珀。以能吸芥者。爲眞。所謂磁石引針。琥珀拾芥者也。微光者。名光珀。但充器皿。不入藥用。產於廈門。及東洋者。皆不可用。作偽者。以松香煎煉而成。形色與眞者無異。然以火燒之。有松香氣。不可用。

配合應用 ①用琥珀。沒藥。乳香。延胡索。乾漆。醋中爲散。治產後血暈有神。佐以人參。益母草。澤蘭。生地。牛膝。當歸。蘇木。作湯。送前藥。則治見枕痛。惡露下不盡。腹痛。少

國外學說
日本學說曰。琥珀

者漢醫用爲利尿通經藥。用量一・二至四・〇。琥珀之成分爲「スクシニン」。或名爲琥珀燃

土之黃色華爾斯琥珀酸及少量之揮發油據扶氏之藥物書云琥珀者專供熏燭之用其熏燭之目的在得爽快之氣又於儂腐質斯應用之（此目的祇在導其蒸氣於患部或以木棉飽和之貼於患部）或如「コロフォニウム」用爲撒布末然依和漢藥考亦用爲通經及利尿藥又和漢藥考曰日本進口之琥珀皆透明作深紅色國人稱爲血透亦名金珀此爲上品其色稍淡者名銀珀次之淡黃色者名蠟珀又次之帶黑者爲下品凡日本產皆重濁不透明不堪入藥又遠西醫方名物考曰以琥珀末加香竄之蒸餾油如迷迭香油刺豎燈兒油等入玻璃瓶中時時搖盪之則逐漸溶化或以此末加松節油或骨拜波拔爾撒一偪入玻璃瓶中密封文火煮八日許其末亦盡溶化而成紅色於此

十一畫 琥

依前法加杏仁油煮之則變紫紅色。加橄欖油或胡桃油煮之則變美麗之紅色。加罌粟子油煮之則變紅黃色。加扁桃油或亞麻油煮之則變黃色。又東京獸醫新報曰：琥珀油爲殺鼠藥。最有功效。其有效成分。即在琥珀酸法以琥珀酸與牛膽。并鼠喜食之蕎麥粉。三者相和製成九子。鼠食之立即暈身毛戴。煩渴欲死。得水則飲。愈飲愈渴。漸漸動作遲鈍。自食後三時半至二十七時內。無不倒斃。平均十一時卽死。此雖係牛膽之苦味酸。刺戟其胃而然。而其主要之作用。實由於琥珀酸也。所用琥珀酸之量。每一丸含○。一用○。三至○。五。已足殺一鼠。又遠西醫方名物考曰：琥珀中所含之油氣。鹽氣。能利小便。通經水。又患瘡癰。瘰癧。諸症。或昏睡。眩暈。癰症。子宮病。脾病。用此俱有效。此因琥珀中所含。蠶透揮發之油鹽。有關達腦神經之效也。此外更能治下利。尿多。遺精。淋病。白帶下。吐血等症。蓋性能收斂耳。琥珀爲未服其煎汁。或和雞子黃。或製爲丸。或作葯藥均

可服量自一分至一錢爲未。搽皮膚破裂及小瘡。乾即愈。其製法以乾鹼琥珀而得之餾液。分爲二層。上層爲油。即琥珀油也。下層爲水中含琥珀酸。故可從此中製出琥珀酸。琥珀油爲褐色油狀之液體。臭味俱似拔爾撒謨。比重〇・九二至〇・九七。濃酒精能溶解之。遇碘則立即爆發。成分爲一種炭化水素 $C_{10}H_8$ 。是名琥珀腦。入藥須用其精製者。謂之精製琥珀油。是爲無色或微黃之液體。有拔爾撒謨之臭氣。溶解於十分至十二分之酒精。此精製琥珀油。有衝動、鎮痙、發汗、利尿之效。每服五滴至十五滴。一日數次。或製爲丸劑、乳劑、酒精溶液等。皆可。用於風溼痛、癱瘓、舞蹈病、百日咳、小兒痙攣、諸症。又商痛、風溼痛、麻痺等多配合他種刺戟藥。以之外用。又袖珍藥說述其性能曰。衝動、鎮痙、利尿。外用引赤。專治患歇斯的里、癲癇、月經不足者。均宜用之。外用治局部麻痺及慢性關節風溼痛。俱極著效。此外尚可治面部神經痛法。以琥珀油一分。阿片酒半份。攪和。

時時塗擦痛處。卽愈用法。內用每服五滴至十五滴。和護謨漿用之。又袖珍藥說曰。製法以琥珀油一盎斯。入玻璃器。取硝酸三盎斯。徐徐滴入。用玻璃棒攪拌。靜置三十六小時。分取上面之樹脂狀物。乃先洗以冷水。再洗以熱水。大約數次。至其水毫不帶酸味而止。主治性質極似麝香。可代用之。英美學說曰。琥珀係松香入地年久變成。內含數種松香類質。在古時希臘人。知以琥珀擦之。卽能吸輕體。殆因其生電氣之故。尋常所得之琥珀。則係海邊礫石內。隨海水飄至岸邊者。至英國所用之琥珀。其大半得之於波羅的海邊。或印度海邊。地學家謂琥珀爲松樹類所產之松香。常有人在內地挖起變成石形之松木。又如木煤層內所遇見之琥珀。常見有微蟲或植物微迹。雜於其內。其常見者。爲參差形脆塊。其色黃或黃紅。似松香。能透光。無臭。亦無味。其功用能行氣。解轉筋。生津液。利小便。治經脈不調。羊癲風。牙關緊閉。哮喘。嗽抽風。配酒油用之。今內服者少。

見綱目。詳「鹿角菜」條。

【猴蒜】即毛茛之古籍別名。典見綱目。詳「毛茛」條。

【猴瘡】即山查之古籍別名。典見危氏得效方。詳「山查」條。

【猴薑】即骨碎補之原名。詳「骨碎補」條。

【猴藥】即南天燭之古籍別名。典見登真隱訣。詳「南天燭」條。

【猴蘭子】（綱目拾遺）古籍別名。仙茅果。

產地 出臨海深山中。

形態 猴蘭爲莢果類之一種。

秋生冬實。大如指頭。其子可供藥用。

性質 苦溫。無毒。

主治 暖丹田。益五臟。健脾。增氣力。

參攷資料 猴蘭子樵人採食。并可磨粉。其性溫補。然城市亦無食之者。綱目有猴蘭子。形與此別。

又臨海出猴總子一名土柿。每年九十日間。生形與紅柿同。皆非一物。綱目拾遺。

【編】即水獺肝之古籍別名。典見綱目。詳「水獺肝」條。

【琥珀】命名 虎死則精魄入地。化爲石。本品形狀似之。故謂虎魄。俗文從玉。以其類玉也。

處方用名 血珀。毛珀。光珀。西血珀。紅琥珀。琥珀屑。西雲珀。

古籍別名 明珀。蠟珀。香珀。江珠。（綱目）阿溼摩揭婆（梵書）丹珀。南珀。紅珠。虎魄。大蟲珀。（和漢藥考）紅松脂。鑿珀。花珀。水珀。石珀。物象珀（炮炙論）

外國名詞 Succinum（拉丁）Bernstein（德）Suoinite, Amber（英）

基本 屬松柏科植物之樹脂。埋沒地中。歷久而化爲石。即琥珀。

產地 和漢藥考曰。琥珀產於東洋之海岸各地。及俄德波蘭瑞典丹麥等國之沙中。或海水中。日本不產真琥珀。僅陸前。陸中能登石狩等處。產類似之物。

形態 琥珀爲扁平。或不正圓形之塊。色淡黃或淡白。質透明。有類似松脂之光澤。但頗脆弱。破碎面作貝殼狀。有時含有無血蟲或水泡等物。比重一・〇至一・一。

八。硬度二・五。熱至二百十五度則變軟。熱至二百八十七度則融解。遇酒精伊打。松節油等。俱稍溶解。摩擦之則發生電氣。燃以火則膨脹而發白煙。氣芳香。乾餾之則可得琥珀油。

種類 ①鑿珀即衆珀之長者。②蠟珀即色黃而明。鑿者。③香珀即有香氣者。④水珀即色淡黃無紅而多皺紋者。⑤石珀即重如石而色黃者（不堪用）⑥花珀即文如新馬尾。松中心文。色紅黃相間者。⑦物象珀即中含有昆蟲等物者。⑧黃白者曰明珀。⑨淡白者曰金珀。又曰香珀。⑩日本奥州所產之蘇陸者。乃木脂之別名。非琥珀也。⑪紅松脂者。似琥珀。但濁而且脆。其文橫爲別耳。

採取 採掘無時。

製法 雷數曰。凡使琥珀入藥。用水調。側柏子末。安磁鍋中。置琥珀於內。煮之。從已至申。當有異光。搗粉篩用。今人有用乳製者。

用法 剉末和作丸散。或水煎或沖服。

性質 甘。平。無毒。

成分 爲樹脂。揮發油。琥珀酸。斯可金。涅。及硫黃等。

效能 利水。散瘀。通淋。安神。用作利尿及通經藥。

主治 安五臟。定魂魄。殺精魅。邪鬼。消痰。血通五淋。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論琥珀曰。止血生肌。合金瘡。【宋】大明日華諸家本草論琥珀曰。壯心明目。磨翳。止心痛。頭邪。療癰毒。破結癥。治產後血枕痛。

【金】張元素珍珠璣論琥珀曰。清肺。利小腸。【清】黃宮繡本草求真論琥珀曰。琥珀甘淡。性平。按書雖曰。脂入土而成。實合以鎮墜等藥。則能安魂。定魄。色赤。能入心。肝。二經。血分。合以辛溫等藥。則能消瘀。破癥。生肌。合口。其味甘淡。上行。合以滲利等藥。則能治淋。通便。燥脾補土。且能明目。退翳。逐風。殺蟲。謂是水去熱除安鎮之意。但此性屬消靡。則於真氣無補。氣屬滲利。則於本源有耗。此惟水盛火衰者。用之得宜。若其火盛水涸。用之不能無慮。松脂入土。年久結成。或楓脂結成。以膠熱拾芥者。真用柏子仁。

名。典見物理小識。詳「雷公藤」條。

【犂頭草】

產地 在閩粵諸縣境內。

形態

本品爲雜草類之一種。係一年生草本。形似犂頭。三四月出新採之可供藥用。

效能

去腐生新。活血止痛。

主治

治火瘡惡毒。魚口便毒。

【獼猴頭】即體腸之古籍別名。典見本草必用詳「體腸」條。

【獼猴頭草】即地錦草之古籍別名。典見綱目詳「地錦草」條。

【援】即水獺肝之古籍別名。典見綱目詳「水獺肝」條。

【猩紅】即銀朱之古籍別名。典見綱目詳「銀朱」條。

【猩猩】

外國名詞 Simia satyrus 或 Pitheous satyrus (拉) (Orangoutang) (英)

基本 係脊椎動物。哺乳類。有胎盤類。靈長類。猿類。狒狒類。猿科之猩猩。

產地 出蘇門答臘及婆羅洲諸地。海岸沼澤之森林中。亦出非洲。有大猩猩。黑猩猩等種。

形態 猩猩爲獸類之一種。面部裸出。呈鉛黑色。額略圓而高。眼大口突出。唇薄。頤部之皮弛緩。忿怒或悅樂時。則生皺紋。無頰。喉門大。白三種齒俱備。壯者頰下生長鬚。軀幹肥大。四肢較短。無尾。臂毛逆立。無臂疣。毛長。色赤褐。前肢長。可達握拇指短。趾皆長。筋骨十二對。體長四尺餘。不善行立。其肉可供藥用。



猩猩

性質 甘。溫。無毒。

主治 食之不味。不飢。令人善走。窮年無厭。可以辟穀。

參攷資料 逸書言猩猩肉食之令人不味。其猩猩可知矣。古人以爲珍味。故荀子言猩猩能言笑。二足無毛。而人啖其羹。食其肉。呂氏春秋云。肉之美者。猩猩之唇。攢攢之炙是矣。(李時珍)

【猩猩皮】即刺蝟皮之古籍別名。典見本經。詳「刺蝟皮」條。

【猿】即猿之古籍別名。典見綱目。詳「猿」條。

【猿子棗】即猴棗之別名。典見藥物生產詳「猴棗」條。

【猴丹】即猴棗之別名。詳「猴棗」條。

【猴桃】即辛亥之古籍別名。典見和漢藥考。詳「辛亥」條。

【猴梨】即山查之古籍別名。典見和漢藥考。詳「山查」條。

【猴棗】古籍別名 猴子棗。羊棗。猴丹。(藥商隱名)

產地 多在南洋星加坡諸海島及西藏印度等處。

形態 猴棗係屬礦物質。爲石種類。形如鵝卵。大小不一。似石而懸脆。擊之易碎。色黯黃而微白。其理層層疊疊而生。內有核仁。性極堅硬。印產者大如雞卵。色純青。藏產者顆粒甚小。色青黑。光瑩耀目。類如寶石。質地尤爲堅實。效力差弱。

性質 微鹹。兼苦。寒。平。無毒。

效能 平虛喘。鎮肝魂。定痼厥。止瘧疾。開痰閉。清痰熱。

主治 驚癇。痰厥。癰疽。瘰癧。痰核。橫痃。

配合應用 治痰熱壅塞。喘逆聲嘶。猴棗竹瀝。遠志。天竺黃。蒲貝。母。膽。星。半。夏。

治癰疽瘰癧。猴棗醋摩塗。

用量 輕則一分。重則二三分。

參攷資料 猴棗生於老猿猴之胃及肝膽間。緣猿猴常食各種山菓。積年累月。其精液所結成爲石者。形如棗。猶如牛之生黃。狗之生寶。馬之生墨。鹿之生玉。諸獸之生鮮。皆此皆物之爲病。而人得之以爲寶。故功能有如此其捷。而治效亦相類也。

猴棗爲治熱痰最靈捷之聖藥。較之西黃八寶散。暨諸祛熱痰藥。不啻功勝百倍。

猴棗以產於沙喇滑者爲正道。地坤甸產者。亦入上品。近日多出南洋羣島。由板嶼石叻運來者多。該地土人呼之爲羊腸棗。未必無因。好格物者。其細思之。(藥物生產詳)

【猴棗草】即南天燭之古籍別名。典見登真隱訣。詳「南天燭」條。

【猴葵】即鹿角菜之古籍別名。典見本草必用詳「鹿角菜」條。

最大之羽狀複葉。質硬而有光澤。其小葉作細長形。在暖地則開花。爲單性花。雌雄異株。雌花叢生。狀如火焰。全面有淡褐色長毛。雄花作松毬狀。子實至秋季成熟。其子實爲類桃實而稍扁平之子。實外面有赤色薄皮。皺而有光澤。內部有白色厚皮。內有白仁。

採取 七八月間採之。

用法 生食或煮汁。

性質 甘溫無毒。

效能 消痰止咳。用作通經收斂藥。

主治 補中益氣。除痰嗽。補虛損。好顏色。令人肥健。

歷代記述攷證 【唐】李珣海藥本草論無漏子曰。消食止咳。治虛羸。悅人。久服無損。

配合應用 蘇鐵澱粉。有治痢疾功效。又治呃逆。(和漢藥考方)

治刀傷用蘇鐵葉燒焦豚脂煉合塗之。(和漢藥考方)

用量 一錢至三錢。

參攷資料 無漏名義未詳。

千年萬歲言其樹性耐久也。曰海

焦。曰波斯。曰番棗。言其種自外國來也。金果貴之也。曰棧。曰蕉。象其幹葉之形也。番人名其木曰蕉。莽名其實曰苦魯麻。苦魯麻。皆音相近也。李時珍。樹若栗木。其實若棧子。有三角。(李珣)

按劉恂嶺表錄云。廣州有一種波斯棗木。無旁枝。直聳三四丈。至巔四向。共生十餘枝。葉如櫻欄。彼土人呼爲海棗木。三五年一着子。每朵約三二十顆。都類北方青棗。但小爾。舶商亦有攜本國者。至中國色類沙糖。皮肉軟爛。味極甘。似北地天蕉。而其核全別。兩頭不尖。雙卷而圓。如小塊紫礪。種之不生。蓋蒸熟者也。(蘇頌)千年棗雖有棗名。別是一物。南番諸國皆有之。即杜甫所賦海棗也。按段成式西陽雜俎云。波斯棗生波斯國。彼人呼爲蕉莽樹。長三四丈。圍五六尺。葉似土藤。不凋。二月生花。狀如蕉花。有兩脚。漸漸開。中有十餘房子。長二寸。黃白色。狀如棧子。有核。六七月熟。則子黑。狀類乾棗。食之味甘。如飴也。又陶九成輟耕錄云。四川成都。有金果樹六株。相傳

漢時物也。高五六十丈。圍三四尋。挺直如矢。木無枝柯。頂上有葉如櫻欄。皮如龍鱗。葉如鳳尾。實如棗而大。每歲仲冬。有司具祭。收採。令醫工以刀割去青皮。石灰湯瀹。過入冷熟蜜浸。換四次。瓶封進獻。不如此法。則生澀不可食。番人名爲苦魯麻。葉蓋鳳尾。焦也。一名萬歲棗。泉州有萬年棗。即此物也。又替含草木狀云。海棗大如杯碗。以比安期海上如瓜之棗。似未得其詳也。巴旦杏亦名忽鹿麻。另是一物也。(李時珍)

【無漏子】即海棗實之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「海棗子」條。

【無漏果】即海棗子之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「海棗子」條。

【無節竹】即通竹之古籍別名。典見綱目。詳「竹」條。

【無蔓屬】即枇杷葉之古籍別名。典見和漢藥考。詳「枇杷葉」條。

【無聲虎】即大黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳「大黃」條。

【無類】即薇衛之古籍別名。典見吳普本草。詳「薇衛」條。

【無類草】即鹿御草之古籍別名。典見吳普本草。詳「鹿御草」條。

【焦山查】即山查焙炒成者之處方用名。詳「山查」條。

【焦山梔】即山梔子焙炒成者之處方用名。詳「山梔子」條。

【焦六貓】即神麴焙成焦色者之處方用名。詳「神麴」條。

【焦朮】即白朮炒焦者之處方用名。詳「白朮」條。

【焦冬朮】即白朮炒焦者之處方用名。詳「白朮」條。

【焦白芍】即白芍炒焦者之處方用名。詳「白芍」條。

【焦石】即石炭之古籍別名。典見綱目。詳「石炭」條。

【焦豆】即石硫黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳「石硫黃」條。

【焰消】即消石之古籍別名。典見土宿本草。詳「消石」條。

【爲猴】即獼猴之古籍別名。典見說文。詳「獼猴」條。

【犂尖草】即雷公藤之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「雷公藤」條。

【犂食】即芍藥之古籍別名。典見別錄。詳「芍藥」條。

【犂頭刺藤】即雷公藤之古籍別

形體 無根草爲蔓草類藤屬之一種。莖細色赤。無根無葉。祇有青色細葉附於莖際。蔓延極長。繞於草木而生。有花有子。其苗可供藥用。子詳見該條。

採取 三月四月間採之。尤以色黃而細如線者爲真。

性質 苦。微甘寒。無毒。

主治 利水去溼熱。涼血。消癰疽。上吐衄。下血。解諸藥毒。及辟瘴癘。搗傳痔腫。惡瘡。淋濁。帶下。黃疸。並小便不通。狐臭。腫氣。和韭根煎湯洗。

【無根草子】

主治 活血。解毒。癰疽。癰毒。癰難產。酒煎服。

【無根藤】 卽菟絲子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『菟絲子』條。

【無骨芋麻】

古籍別名 玉接骨。血見愁。金不換。玉錢草。玉梗。草麒麟。玉連環。玉盤龍。玉梗半枝蓮。〔綱目拾遺〕
產地 多生陰溼諸地。

形體 無骨芋麻爲接骨草類之一種。立夏時發苗。莖節則粗。高尺許。葉尖而長。形似芋麻而薄小。

背不白。莖如筋。色明透。至九月間莖白。明如水。晶上有細紅點。子其花白色。結子青色。至十月草枯而子紅熟。每顆有一二百子。其根蔓延白色多粗節。類竹根。中有黏液。種於鬆土。極易繁衍。其根可供藥用。

採取 九月採之。

性質 甘涼。無毒。

主治 續筋骨。療折傷。理氣開胃。止吐衄。腸紅下血。

參攷資料 無骨芋麻能入肺經血分。行肺經惡血。引良血歸經。大有功效。〔綱目拾遺〕

【無患子】

古籍別名 桓。檉婁。油珠子。菩提子。鬼見愁。〔綱目〕
外國名詞 Sapindus Muls-
brook Gaertn. (拉丁) ムクロ

基本 係無患子科無患子屬。爲無患子之核外肉。

產地 生山野間。

形體 無患子爲落葉喬木類。高二丈餘。葉互生。作偶數羽狀複葉。小葉長卵形。夏月開小花。帶黃

色。雄花八蕊。雌花子房三室。圓錐花序。結實略似球形。徑六七分。果深堅硬。熟時黃茶色。皺裂甚多。內含一種子。形圓色黑。質亦堅。可作念珠。其核外肉可供藥用。



無患子

採取 十月間採之。

性質 微苦。平。有小毒。

主治 磨垢去面黥。喉痺。研納喉中。立開。又主飛尸。

【無患子仁】

性質 辛。平。無毒。

主治 燒之辟邪惡氣。

歷代記述攷證 〔明〕李時珍本草綱目論無患子仁曰。煨食辟惡。去口臭。

【無情子】 卽硝砂之古籍別名。典見和漢藥考。詳『硝砂』條。

【無殼月拔伊】 卽蛞蝓之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蛞蝓』條。

【無殼蝸蠃】 卽蛞蝓之古籍別名。

典見爾雅。詳『蛞蝓』條。

【無義草】 卽山慈姑之古籍別名。典見綱目。詳『山慈姑』條。

【無腸公子】 卽蟹之古籍別名。典見抱朴子。詳『蟹』條。

【無實子】 卽鼠李子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『鼠李子』條。

【無漏子】 命名和漢藥考一名蘇鐵。謂其將枯死時。打入鐵釘則復蘇。故名。無漏子殆係番音。

處方用名 千年棗。

古籍別名 波斯棗。〔拾遺〕千年棗。開寶萬歲棗。〔一統志〕海棗。〔草木狀〕番棗。〔嶺表錄異〕金果。〔輟耕錄〕木名海櫻。鳳尾蕉。〔綱目〕火蕉。番蕉。鳳尾松。蘇鐵。〔和漢藥考〕窟弄樹。〔酉陽雜俎〕

基本 屬蘇鐵科蘇鐵之子實。

產地 原產波斯國。彼人呼爲窟弄樹。和漢藥考曰。爲暖國植物。琉球薩摩日向等產此。台灣亦有。

形體 蘇鐵爲自生之常綠樹。高達一丈餘。莖多直立。全面爲鱗片狀葉痕所掩。葉叢生於莖頂。爲

茶澤。蒲盧子。(綱目)摩澤樹。拔壓子。(西陽雜俎)

基本 係喬木類。爲無食樹之子實。

產地 陳仁山藥物生產辨云。產自印度波斯屬。來自喀味。

形態 無食樹高六七丈。葉似桃葉而長。間歲互生一根。春開白花。心微紅。其子實圓如彈丸。生青熟黃。可供食。蟲蛀有孔者並可充藥用。

採取 秋月採之。

製法 雷斅曰。凡使勿犯銅鐵并被火驚。用顆小無炊米者妙。用漿水於砂盆中。研令盡。焙乾再研。如烏犀色。入藥。

性質 苦。溫。無毒。

效能 瀉精。欬腸。專作收攝藥。

主治 赤白痢。腸滑。生肌肉。

歷代記述攷證 【唐】李珣海

藥本草論無食子曰。腸虛冷痢。益

血生精和氣安神。烏髭髮。治陰毒

瘰癧。灰用【宋】馬志新詳定本草

論無食子曰。溫中。治陰瘡。陰汗。小

兒疳。羸。冷滑不禁。【清】黃宮繡本

草求真論無食子曰。沒石子味苦

性溫色黑。功詣入腎固氣。凡夢遺精滑。陰痿齒痛。腹冷泄瀉。瘡口不收。陰汗不止。一切虛火上浮。腎氣

不固者。取其苦以堅腎溫以煖胃健脾。黑以入腎益氣。補精神氣。接

納丹田。不爲走泄。則諸病自能克愈矣。至書所云安神定魄。亦是神

氣既收。不爲外浮之意。他如燒黑灰煎湯。以治陰濕。合他藥以染鬚

髮。爲末以擦牙齒。皆是賴其收瀉之力。以爲保護無他道也。但味苦

性降。多用恐氣過下。不可不慎。出

外番。顆小紋細者佳。炒研用。蟲蝕成孔者揀去。忌銅鐵。

配合應用 ①治血痢不止。沒

石子一兩爲末。飯丸小豆大。每食前米飲下五十丸。(普濟方)

②治小兒久痢。沒石子二箇。熬

黃研末。作餵飽食之。(宮氣方)

③治產後下痢。沒石子一箇。燒

存性。研末。酒服。熱即飲下。日二。

(子母祕錄方)

④治牙齒疼痛。綿裹無食子末

一錢。咬之。涎出吐去。(濟聖總錄

方)

⑤治鼻面酒皰。用南方沒石子

有孔者。水磨成膏。夜夜塗之。甚妙。(危氏得效方)

①治口鼻急疳。沒石子末吹下部即瘥。(千金方)

②治大小口瘡。沒石子泡三分甘草一分。研末。搽之。月內小兒生

者少許置乳上吮之。入口即啼。不過三次。(聖惠方)

③治足趾肉刺。無食子三枚。肥皂焚一挺。燒存性。爲末。醋和傅之。立效。(奇效方)

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡有實邪者禁用。

參攷資料 ①沒石子合他藥

染鬚造墨家亦用之。(寇宗奭) ②波斯人每食以代果。故番胡呼爲

沒石子。梵書無與沒同音。今人呼

爲墨石。沒石轉傳訛矣。張仲景用

治陰汗。燒灰。先以湯浴了。布裹灰

撲之。甚良。(李珣) ③無食子生西

戎沙磧間。樹似檉。劉禹錫曰。按段

成式西陽雜俎云。無食子生波斯

國。呼爲摩澤樹。高六七丈。圍八九

尺。葉似桃而長。三月開花。白色。心

微紅。子圓如彈丸。初青熟乃黃白。蟲蝕成孔者入藥用。其樹一年生

無食子。一年生拔壓子。大如指。長三寸。上有殷中仁。如栗黃。亦可噉。

(蘇恭) ④按方輿志云。大食國有樹。一年生如栗子而長。名曰蒲盧

子。可食。次年則生麻茶澤。即沒石子也。間歲互生。一根異產。如此一

統志云。沒石子出大食諸番。樹如樟。實如中國李。栗。(李時珍) ⑤此

樹中國印度俱有。用是果入藥。能收欬止血。咳血。瀉血。大小腸血痔

瘡。白帶俱宜之。法用沒石子一兩。搗爛。水一斤。半煎至一斤。每服一

兩。日服二三次。或研細作散。每服一分。半至三分。日服二次。喉嚨弱

者。用沒石子水漱之。外用能止肛

門痔瘡。痛。法用沒石子一錢。研極

細末。鴉片膏半錢。豬油八錢。攪和

作膏。每用半錢。搽患處。腳脣有血

亦可。用此油搽。(內科新說)

【無核李】即徐李之古籍別名。與

見綱目詳【李】條

【無根金絲草】即無根草之古籍

別名。典見百草鏡詳【無根草】條

【無根草】古鑑別名。無根金

絲草。火絨草。(百草鏡) 豆馬黃。(李氏草經)

作用 入胃後與胃液混和。協力助消化之不足。一部分至腸而後吸入血中。一部分仍向大便排出。入血後能促進血液之氣化。使細胞之新陳代謝增力。

主治 開胃止泄痢。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論無花果曰。治五痔咽喉痛。【清】王士雄隨息居飲食諸論無花果曰。無花果甘寒清熱。療痔潤腸。上利咽喉。中寒者忌食。

國外學說 荷蘭藥鏡曰。乾實

（蒸熟而曝乾者）含有甘味黏液。頗有緩和功效。故能解胃寒傷冷。毒酷厲液。凡咳嗽聲啞。咽喉刺痛。喉痛。肺癰。胸脇痛。或疝痛。淋疾。疥癩等。一切適用。緩和咽喉諸症。水煎用之。有殊效。咽喉口中癢痛等。加入漱劑。爲甘和止痛良藥。肺癰衝胸脇痛諸症。乾咳久嗽勞咳等。劇病多服下方有奇效。【一】潤解和胸飲。無花果（剉）乾葡萄（剉）各二盞。斯甘草（剉）四錢。大麥煎（次出）二斤。蒸溜水一斤。上用文火煮至二斤。飲服。【二】大麥煎。精大麥二盞。沸湯五斤。上先用冷

水。細將大麥洗淨。加水半斤。煮一二沸。去其汚色。湯取大麥。加沸湯五斤。煮減半。應用。【初煮一二沸。去汚色。湯則無臭味。患者易服。】

用此作嗽衝熱等飲料。有止渴潤燥之效。或加橙汁少許。尤佳。將乾實置熱灰煨。貼腫瘍。善能化膿。貼痔痛。疼痛速消。用舊布貼之。尤佳。潰爛貼之。有排膿之效。生實煮澁。含有醋腐乳狀汁。故用以磨擦疣贅魚目等。屢能消散。或用其汁和豚脂擦之。或用其樹葉摩擦之。亦皆有效。痔血閉止。用此樹葉。類擦肛門。則潰破。瘀血通泄。英美學說謂無花果。英俗名非格。各國皆產。其產土耳其者。最爲上品。自古以來。即用爲食物與藥品。此樹原產於亞細亞。後移植於歐羅巴各處。其樹身與枝。多含銻味。而如乳之汁。其未熟時。亦生此汁。比將熟時。則漸生膠質與糖質。此樹而如得合宜之水。土與地氣。則所產之無花果。必多汁而輟。有最佳之味。

須於將熟時。滴下乾之。今歐羅巴南邊。所產甚多。而亞細亞各處。所產亦復不少。有數處以無花果爲

最大貿易之物。如阿富汗與波斯國之所產者。多運至印度國出售。而英國出售之無花果。則從土麥拿運來。可作食物之藥。未食慣者。食之有微利性。其功用能作潤劑。養生。治便秘。藥品中用之。大半爲潤皮藥。將熟者加熱時。開則能作軟布膏之用。治瘡子。痔。

用量 八分至錢半。

參攷資料 ①無花果凡數種。此乃映日果也。即廣中所謂優曇鉢。及波斯所謂阿蘭也。【李時珍】

②無花果出揚州及雲南。今吳楚閩越人家。亦或折枝插成。枝柯如枇杷樹。三月發葉。如花。構葉五月內不花而實。實出枝間。狀如木饅頭。其內虛。輒採以鹽漬。壓實。令扁。日乾。克果食。熟則紫色。輒爛。甘味如柿。而無核也。按方輿志云。廣西優曇鉢。不花而實。狀如枇杷。又段成式酉陽雜俎云。阿蘭出波斯。拂林人呼爲底珍。樹長丈餘。枝葉繁茂。有子如薤。麻。無花而實。色赤。類棗。柿。一月而熟。味亦如柿。二書所說。皆即此果也。又有文光果。天仙果。古度子。皆無花之果。【李時珍】

【無花果葉】 性質 甘。微辛。平。有小毒。

主治 五痔腫痛。煎湯類熏洗之效。

【無重砂】 即硃砂之古籍別名。典見新修本草圖經。詳【硃砂】條。

【無風獨搖草】 命名 本品人自動。故名。

古籍別名 荒夫草。【郭璞】

產地 生山野間。

形態 無風獨搖草爲雜草類之一種。頭若彈子。尾若鳥尾。開花黃色。結實如花絲子。可供藥用。

採取 五月五日採之。

性質 溫平。無毒。

主治 頭骨遊風。遍體搔痒。煮汁淋洗。

參攷資料 ①羌活。天麻。鬼臼。藤御四者。皆名無風獨搖草。而物異不同。【李時珍】 ②無風獨搖草。帶之令夫婦相愛。【陳藏器】

【無食子】 命名 本品波斯人無不食。以代果。故名。

處方用名 沒食子。沒石子。

古籍別名 墨石子。【炮炙】麻

癰疽。脚氣。腫瘡之類。此物善收濕氣。調漆煉油。其乾甚速。至燥之品。

配合應用 治打傷腫痛。無名異為末。酒服。起下。四肢之末血皆散矣。(集驗方)

治損傷接骨。無名異。甜瓜子各一兩。乳香。沒藥。各一錢。為末。每服五錢。熱酒調服。小兒三錢。服畢。以黃米粥塗紙上。摻左順牡蠣末。裹之。竹篾夾住。(多能鄙事方)

治臨杖預報。無名異。末。臨時溫服三五錢。則杖不甚痛。亦不甚傷。談藝齋試效方)

治赤瘡丹毒。無名異。末。葱汁調塗立消。(簡便方)

治痔漏腫痛。無名異。炭火煨紅。米醋淬七次。為細末。以溫水洗瘡。綿裹筋頭。填末入瘡口。數次愈。(簡便方)

治天泡溼瘡。無名異。末。井華水調服之。(普濟方)

治腫潰潰爛。無名異。號丹細研。清油調塗。溼則乾擦之。(濟急方)

治股陰瘰癧。無名異。二錢。麝

香一字。研。酒半碗。午後空腹服。立效。(多能鄙事方)

治拳毛倒睫。無名異。末。紙卷作捻。點燈吹殺。熏之。睫自起。(保命集方)

治消渴引飲。無名異。一兩。黃連二兩。為末。蒸餅丸。綠豆大。每服百丸。以茄根煎兩煎湯送下。(聖濟總錄方)

治脚氣痛楚。無名異。末。化牛皮膠調塗之。類換。衛生簡易方)

用量 八分至錢半

參攷資料 崔昉外丹本草云。無名異。陽石也。昔人見山雞被網。損其足。脫去。啣一石。摩其損處。遂愈而去。乃取其石。理傷折大效。人因傳之。(李時珍)

無名異。氣味鹹寒。伏硫黃。(蘇頌) 無名異。出大食國。生於石上。狀如黑石。灰。番人以油鍊如鑿石。嚼之如飴也。(馬志)

今廣州山石中及宜州八星龍濟山中亦有之。黑褐色。大者如彈丸。小者如黑石子。採無時。(蘇頌) 生川廣深山中。而桂林極多。一包數百枚。小黑石子也。似蛇黃而色黑。近處山中亦時有之。

用以煮蟹。殺腥氣。煎煉桐油。收水氣。塗剪剪燈。則燈自斷也。(李時珍) 無名異。產中國河南。陝西。廣東諸省。日本。遠江。石見。隱岐。伊豆。土佐等處亦產之。(和漢藥考)

【無灰木】即不灰木之古籍別名。典見綱目。詳「不灰木」條。

【無耳聞雪】即芭蕉之古籍別名。典見和漢藥考。詳「芭蕉」條。

【無姑仁】即蕪荑之古籍別名。典見本經。詳「蕪荑」條。

【無花果】 命名 和漢藥考云。其果一月而成熟。昔時誤為無花而結果。遂命之曰無花果。

古籍別名 映日果。(便民圖纂) 優鉢鉢。(廣州志) 阿阻。(綱目) 底珍。(西陽雜俎) 唐柿。蜜果。映日紅。王孫皮。枝仙桃。青桃。(和漢藥考)

外國名詞 Ficus Carica, L. (拉丁)

屬桑科無花果之實。產地 陳仁山藥物生產辨云。無花果各國均有出。廣東廣西各屬均有。土耳其產者均同一體。

形體 無花果種類甚多。為人工栽植之奇木。高達丈餘。葉形大。為單葉。有裂三至五邊。綠有鋸齒。有毛茸。質粗澀。切傷之有白汁流出。花生於花托。花托作壺狀。其上面生雄花。下面生雌花。花後。花托漸次膨脹。變成倒卵圓形之果肉。氣候寒冷。則其表面被有白色粉霜。有特異氣味。及良好甘味。長約二寸。闊三寸許。作倒卵圓形之果實。外部生時作綠色。熟則變紫褐色。或黃褐色。內部為紫色。或紅色。此果實在未熟時。滲出辛味乳液。及漸成熟。則漸減少。增加甘味。藥用採此乾燥之。



無花果

採取 六七月間。實熟時採之。

用法 水煎或生搗用。

性質 甘平。無毒。成分 含有葡萄糖。膠質。脂肪。效能 清熱潤腸。用作緩和和滋養藥。又治痔疾及消化不良症。

【湖廣朮】即白朮之處方用名。詳

【白朮】條。

【湖蕪珠】即眞珠之處方用名。詳

【眞珠】條。

【湖雞腿】即翻白草之古籍別名。

典見綱目。詳『翻白草』條。

【湖潭茶】即安代茶之古籍別名。

典見綱目拾遺。詳『安代茶』條。

【湖蓮】即蓮肉之處方用名。詳『

蓮肉』條。

【湖蓮肉】即蓮肉之處方用名。詳

【蓮肉】條。

【湯主】即山茶黃之古籍別名。典

見和漢藥考。詳『山茶黃』條。

【湯參】即人參之古籍別名。典見

綱目。詳『人參』條。

【涅石】即涅石參見『明礬』條。

【無不愈】即天門冬之古籍別名。

典見嘉祐本草。詳『天門冬』條。

【無心草】

產地 出河南諸地。

形態 無心草爲溼

草類之一種。三月開花五月結實。

其根苗可供藥用。

採取 六七月間採之陰乾用。

性質 溫無毒。

主治 化積血。逐氣塊。益筋節。

補虛損。潤顏色。療辟洩腹痛。

參攷資料 鹿銜一名無心草。

此草功用與之相近。其圖形亦相

近。恐即一物也。鼠耳草亦名無心

與此不同。(李時珍)

【無心草】●即鼠耳草之古籍別

名。典見別錄。詳『鼠耳草』條。●即

鹿御草之古籍別名。典見吳普本

草。詳『鹿御草』條。

【無名子】

古籍別名 阿月渾

產地 生山谷中。

形態 無名子爲果類之一種。

結實狀如榛子中有仁。可供藥用。

其木皮詳見該條。

性質 辛溫。瀉。無毒。

主治 諸痢去冷氣。令人肥健。

歷代記述攷證 【唐】李珣海

藥本草論無名子曰。治腰冷。陰腎

虛痿弱。房中術多用之。得木香山

菜黃良。【清】趙學敏本草綱目拾

遺論無名子曰。與榛子同類。性更

溫良。能止痢。煖腎開胃。除腸積。

得木香山黃能與陽。

【無名木皮】

性質 辛。大溫。

無毒。

主治 陰腎萎弱。囊下溼癢。並

蘸汁小浴。極妙。

【無名印】即地榆之古籍別名。典

見和漢藥考。詳『地榆』條。

【無名異】命名 無名異。庚詞

也。

古籍別名 黑石子。(俗名)土

子。(和漢藥考)

外國名詞 Limonite。(拉

丁)(英)

產地 陳仁山藥物生產辨云。

無名異產廣西陝西兩省。此藥雜

有鐵質。內含鐵養益養等。

形態 係附著石上有光澤黑

褐色之球圓形塊。其大小不一。大

者亦僅一分餘。小者如黍粟粒。磨

成粉末。則作茶褐色。

採取 採無時。

用法 剉細水飛。和作丸散。

性質 甘平。無毒。

成分 含水養化鐵。

效能 末服治折傷。醋塗消腫。

腫。用作止血和血藥。

主治 金瘡折傷。內損止痛。生

肌肉。

歷代記述攷證 【宋】蘇頌嘉

祐圖經本草論無名異曰。消腫毒

佳。癰疽。醋摩傳之。【明】李時珍本

草綱目論無名異曰。收溼氣。【明】

繆希雍本草經疏論無名異曰。無

名異異地中陰水之氣。以生。本經

味甘。氣平。無毒。蘇頌。鹹寒。鹹能入

血。甘能補血。寒能除熱。故主金瘡

折傷。內損。及止痛。生肌肉也。蘇頌

醋摩傳腫毒癰疽者。亦取其活血

涼血之功耳。【明】李士材本草圖

解論無名異曰。無名異甘平。無毒。

主金瘡折傷。內損。止痛。生肌肉。收

溼氣。除折傷腫毒外。無他用。【清】

黃宮繡本草求真論無名異曰。無

名異。即俗所名乾子者是也。味甘

而鹹。微寒。無毒。諸書皆言能治癰

腫。損傷接骨。金瘡合口。其義何居

以其鹹有入血之能。甘有補血之

力。寒能勝熱之義者。故耳。是以人

於受杖時。每服三五錢。其於傷處

不甚覺痛。用醋磨塗腫處。即消。要

皆外治之品。而非內服之味也。生

川廣小黑石子也。一包約數百枚。

【清】黃元御玉楸葉解論無名異

曰。無名異燥溼行瘀。消腫止痛。治

金瘡打損。筋斷骨折。癰疽楊梅痔

十二畫 款

殘穀渠渡渤渴游漢瀟湖

11110

雖曰瀟肺而寒能抑塞。惟肺家燥烈爲宜。斷非外有寒邪者所可妄試。若去桑皮而易以紫苑。則幾矣。

配合應用 ①款冬花。雖畏貝

母。然得貝母。桑根白皮。紫苑。枇杷。葉。栝樓。根。百部。天麥門冬。杏仁。治喘逆及咳嗽反良。物有相制故也。如半夏畏生薑得之則制其毒而愈能奏效也。

②款冬得麻黃。杏仁。桑根白皮。甘草。治風寒鬱實熱於上焦肺分作喘。其效甚速。

③款冬一味燒烟吸之。治喘嗽。具如本草注中所載。

④治痰嗽帶血。款冬花。百合。蒸焙。等分爲末。蜜丸。龍眼大。每臥時嚼一丸。薄荷湯下。(濟生方)

⑤治口中疳瘡。款冬。黃連。等分爲細末。用唾津調成餅子。先以蛇牀子煎湯漱口。乃以餅子傳之。少頃確住。其瘡立消也。(楊誠經驗方)

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡火熱利金。肺陰不足者禁用。惡皂莢。消石。玄參。畏貝母。辛夷。麻黃。黃耆。黃芩。連翹。青

箱。杏仁爲之使。得紫苑良。參攷資料 ①本經主咳逆。古

方用爲溫肺治嗽之最。惟知悌療久咳。蜜法。每旦取款冬花如雞子許。少蜜拌花使潤。納一升鐵鑊中。又用一瓦盤鑽一孔。孔內安一小筆管。以麝泥縫。勿令漏氣。鑊下着炭火。少時烟從筒出。以口含吸。嚙之。如胸中少悶。須舉頭。即將指頭按住筒口。勿使漏。至煙盡乃止。如是五日。一爲之。待至六日。飽食羊肉。餽飪一頓。永瘳矣。(蘇頌)

②按述征記云。溶水至歲末凝膚時。款冬生於草水之中。則顯凍之名。以此而得。後人誤爲款冬。即款凍爾。(李時珍)

③百草中惟此不願冰雪。最先春也。故世謂之鑽凍。雖在冰雪之下。至時亦生芽。春時人採以代蔬。入藥須微見花者良。如已芬芳。則都無氣力。今人多使如筋頭者。恐未有花也。(寇宗奭)

④第一出河北。其形如宿蓴。未舒者住。其腹裏有絲。次出高麗。百濟。其花乃似大菊花。次亦出蜀北。部宕昌。而並不如。其冬月在冰下生。十二月正月旦取之。(陶弘景)

⑤今出

雍州南山溪水及華州山谷間。葉似葵而大。叢生。花出根下。(蘇恭)

⑥今關中亦有之。根紫色。葉似葦葶。十二月開花。黃青紫。萼去土一二寸。初出如菊花。萼通直而肥實。無子。則陶氏所謂出高麗百濟者。近此類也。又有紅花者。葉如荷而斗直。大者容一升。小者容數合。俗呼爲蜂斗葉。又名水斗葉。則蘇氏所謂大如葵而叢生者是也。

傳咸款冬賦序云。予曾逐禽登於北山。於時仲冬之月。冰凌盈谷。積雪被屋。顧見款冬。燦然始敷。華豔是也。(蘇頌)

【款冬】即款冬花之古籍別名。典見和漢藥考。詳「款冬花」條。

【殘竹草】即扁蓄之古籍別名。典見藥物生產辨。詳「扁蓄」條。

【殘菜】即淡菜之古籍別名。典見綱目。詳「淡菜」條。

【穀薶】即白豆薶之古籍別名。典見綱目。詳「白豆薶」條。

【渠】即蟬蛻之古籍別名。典見綱目。詳「蟬蛻」條。

【渤海茄】即茄子之古籍別名。典見綱目。詳「茄子」條。

【渴旦】即寒號蟲之古籍別名。典見唐詩。詳「寒號蟲」條。

【渴砂】即全蠍之古籍別名。典見和漢藥考。詳「全蠍」條。

【渴裏】即血竭之古籍別名。典見和漢藥考。詳「血竭」條。

【游冬】即苦菜之古籍別名。典見別錄。詳「苦菜」條。

【游冬藏母】即貝母之古籍別名。典見和漢藥考。詳「貝母」條。

【游波】即燕之古籍別名。典見炮炙論。詳「燕」條。

【游龍】即紅草之古籍別名。典見詩經。詳「紅草」條。

【漢阪魚】命名 本品爲魚之產於陝西省郿縣之漢阪地方。故名。

主治 痔疾。

【蒲胡】即前胡之原名。詳「前胡」條。

【湖丹皮】即牡丹皮之處方用名。詳「牡丹皮」條。

【湖目】即蓮肉之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蓮肉」條。

【明】李士材本草圖解論款冬花曰款冬花辛而微溫肺經藥也潤肺消痰止咳定喘清喉痺理肺痿肺癰古人治久款冬花一兩蜂窠并入茶壺中以麪固其蓋勿令漏氣壺下着炭火待烟從壺口出口含吸喉烟盡乃止數日必效按傳咸款冬花賦有云冰凌盈谷雪積被崖顧見款冬煒然華艷則其純陽之性可知雖具新溫却不燥熱故能輕揚上達至高之府贊相傳而奏功勳也蜜水拌微火炒【清】黃宮繡本草求真論款冬花曰款冬花按書既載辛溫純陽又載瀉熱消痰煩定驚明目治咳逆上氣喘渴聲喉痺肺痿肺癰咳吐血等症其藥似屬兩歧詎知所謂純陽者因其氣味上達入陽而不入陰且經當雪而秀故謂其氣純陽所謂能治咳逆者因其咳因寒入得此溫緩以爲疏滯則寒自順而下矣所謂能除熱痰而嗽者亦是熱因寒入痰因熱成除寒而熱可清除熱而寒自解所謂能治肺痿肺癰咳吐血者亦是肺虛得此以爲溫潤故能服之即止

若使血因實致則此斷屬難投況此雖云純陽於火更不克助故辛溫之內仍有和緩之意是以書載可爲寒熱虛實通用生河北關中者良揀淨花甘草水浸曝用【清】鄒澍本經疏證論款冬曰千金外臺凡治咳逆久咳並用紫苑款冬者十方而九然二物者一則開結使中焦之陰化血一則吸陰下歸先之功力略同而其異在千金外臺亦約略可見蓋凡唾膿血失音者及風寒水氣盛者多不甚用款冬但用紫苑款冬則每同溫劑補助用者爲多是不可得其大旨哉【清】賈九如辨藥指南論款冬花曰冬花用葶藶乃養生之品含蓄未放生於冬而耐寒得一陽初動之氣開發生機且喜其味苦主降氣香主散一物而兩用兼備故用入肺部順肺中之氣又清肺中之血專治咳逆上氣煩熱喘促痰涎稠黏涕唾腥臭爲諸證之要劑如久嗽肺虛尤不可缺

辨偽 鄭有巖曰款冬花爲治嗽要藥十一月開花如黃菊雪積冰堅之時款花偏覽想見其純陽之品故一名款凍生河北關中微見花未舒放者良近今市肆多以枇杷花蔕僞充雖無大害然性不同則功自異耳曹炳章曰按冬花九月出新山西太原者色紫紅無梗爲手瓣冬花最佳有梗者曰上冬花次之梗多色黑紫者曰中冬花亦次亳州出者更次考冬花花瓣色紅紫光潔枇杷花色黃紫有茸毛形態不同最易鑒別

近人學說 張山雷曰款冬嚴寒着花其性微辛是以性溫而花本輕揚故主肺病能開泄鬱結定逆止喘專主咳嗽性質功用皆與紫苑絕似所以本經主治亦復多同於寒束肺金之飲邪喘嗽最宜然氣味雖溫而生於水中亦潤而不燥則溫熱之邪鬱於肺經而不得疏泄者亦能治之又如紫苑開肺寒熱皆宜之例特比之紫苑究是辛溫一籌則火邪鬱結如肺癰成膿痰紅臭穢之候自當有所顧忌顧權竟謂其主肺痿肺癰而景岳石頑從而和之殊是未妥且石頑亦謂陰虛勞嗽忌之以其性溫也何獨於肺癰而不畏其溫是知有二十五而不知有一十矣要之其功用大綱多似紫苑上文紫苑條中論之已詳茲亦不贅試參考之亦可觸類而旁通也繆氏經疏有一方用款冬花合貝母桑根白皮紫苑枇杷葉天花粉百部天冬麥冬杏仁謂治喘逆咳嗽則喘逆咳嗽四字之中有寒有熱有實有虛證情病態萬有不齊豈有羅列幾味治肺之藥而謂可以通治寒熱虛實之理且所集諸藥寒者溫者開者膩者疏通者閉塞者渾鎔於一爐之中縱有幾味對證亦已多所牽制何由奏效此類成方貌視之頗似親切病情無甚悖謬實則龐雜已極必無偶爾得中之理且開泄與遏抑並用則紫苑款冬百部之最能疏化肺鬱者已爲二冬之黏滯束縛不靈况再加以桑皮苦寒抑降閉而塞之更是落阱下石之手段惟恐其肺家鬱塞稍得疏通而不知賦之塞之以速其斃製方之意不知是何居心又繆氏更有一方以款冬麻黃杏仁桑白皮甘草治風寒鬱實作喘則寒邪外來開肺宜也但桑白皮遏抑神氣

矣。又道書云。常含棗核。治氣令口
行津液。嗽之佳。謝承後漢書亦云。
孟節能含棗核不食。可至十年也。
此皆藉棗以生津受氣而嗽之。又
能達黃宮以交離坎之義耳。(李
時珍)

【棗脯】即大棗之古籍別名。典見
和漢藥考。詳「大棗」條。

【棗棘】即蛇牀子之古籍別名。典
見本經。詳「蛇牀子」條。

【棗葉】性質 甘溫。微毒。
主治 覆麻黃。能令出
汗。(本經)和葛粉搗熱。瘡瘻良
(別錄)

歷代記述攷證 【宋】大明諸
家本草論棗葉曰。治小兒壯熱煎
湯浴之。

參攷資料 棗葉作散服之。使
人瘦。久則嘔吐。(別錄)

【棗實】即海欖子之古籍別名。典
見綱目拾遺。詳「海欖子」條。

【棗膏】即大棗之古籍別名。典見
和漢藥考。詳「大棗」條。

【棗樹皮】主治 同老桑樹皮
並取北向者等分燒
研。每用一合。井水煎澄取清。洗目。

一月三洗。昏者復明。忌重酒房事。

【棗樹根】主治 小兒赤丹。從
脚趺起。煎湯頻浴之。

【棗貓】產地 生棗樹間。
形態 棗貓爲卵生蟲
類之一種。即棗樹上之飛蟲。大如
棗子。色青灰。有兩角。採得陰乾。可
供藥用。

主治 小兒疳風。
參攷資料 按方廣云。小兒初
生。以綿裹臍帶。離臍五六寸。扎定
咬斷。以鷄翎筒送藥一二分。入臍
大孔。輕輕揉散。以艾柱灸臍頭三
壯。結住勿打動。候其自落。永無臍
風之患。萬不失一。臍硬者用之。軟
者無病。不必用也。其法用陰乾棗
貓兒研末三箇。真珠珀研四十九
粒。炒黃丹五分。白枯礬。蛤粉。血竭
各五分。研勻如上法用。臍有三孔
一大二小也。

【棗蠹屎】基本 本品即棗樹
上之蠹蟲屎。
主治 聾耳。出膿水。研末。同麝
香少許吹之。

【棘竹】即竹之別名。詳「竹」條。
【棘刺】即白棘之古籍別名。典見

別錄。詳「白棘」條。

【棘狗】即枳椇子之古籍別名。典
見和漢藥考。詳「枳椇子」條。

【棘枸子】即枳椇子之古籍別名。
典見綱目。詳「枳椇子」條。

【棘剛子】即雀甕之古籍別名。典
見本草衍義。詳「雀甕」條。

【棘苑】即遠志之古籍別名。典見
本經。詳「遠志」條。

【棘實】即酸棗之小者。典見新修
本草圖經。詳「酸棗」條。

【棘鍼】即白棘之古籍別名。典見
別錄。詳「白棘」條。

【棘桂】即肉桂之古籍別名。典見
和漢藥考。詳「肉桂」條。

【棠楸子】即山查之古籍別名。典
見圖經本草。詳「山查」條。

【棠梨】古籍別名 野梨。(綱
目)

基本 係薔薇科棠梨屬。爲棠
梨之子實。其枝葉花詳見各該條。

產地 在山林間。
形態 棠梨爲梨之一種。落葉
亞喬木。枝幹如梨。葉作卵形。有鋸
齒。黯白色。春初開小白花。結實如
小棗子。霜後可食。與供藥用。

性質 酸。甘。溫。寒。無毒。
主治 燒食止滑痢。

【棠梨枝葉】性質 酸。甘。溫。
無毒。

主治 霍亂吐瀉不止。轉筋腹
痛。取一握。同木瓜二兩煎汁細呷
之。

【棠梨花】主治 濟飢。燂食。或
曬乾磨粉食。

【棠棗】即大棗之古籍別名。典見
和漢藥考。詳「大棗」條。

【棠楸仁】即郁李仁之古籍別名。
典見爾雅。詳「郁李仁」條。

【棧香】即伽楠香之別名。典見乘
雅詳「伽楠香」條。

【接蘆李】即麥李之別名。典見郭
璞註爾雅。詳「李子」條。

【楸仁】即郁李仁之古籍別名。典
見和漢藥考。詳「郁李仁」條。

【楸仁】即薤仁之古籍別名。典見
爾雅。詳「薤仁」條。

【椅桐】即桐之古籍別名。典見本
草集註。詳「桐」條。

【拼桐】即櫻桐之古籍別名。典見
綱目。詳「櫻桐」條。

【柳仁】即柏子仁之古籍別名。典

洗去心五兩。共爲細末。煉蜜爲丸。三錢。早晚酒水任意送下。(臥雲山人傳方)

⑤種子方。棉子仁淨肉四兩。燒酒拌曬三次。熟地二兩。枸杞一兩。菟絲子。破故紙。茯苓。山藥。陳皮。五味子。連翹。何首烏。各一兩。蜜丸。鹽湯空心服四錢。(集聽方)

⑥治痔漏管。棉花子仁炒。急性子炒。草麻子仁炒。各等分爲末。每服三錢。空心好酒下。輕者半月。重者一月。管自退。(周氏家寶方)

⑦治出血不止。棉花子燒灰存性。爲末敷之。(家寶方)

⑧治崩帶。陳蓮蓬燒灰存性。五錢。棉花子肉燒灰存性。三錢。共一服。無灰酒調下。(家寶方)

⑨治腸風下血。生柿子二個。竹刀切去蒂核。以棉花子塞入柿內。仍蓋好。瓦上煨存性。研細末。米飲熱調服。重者三服全愈。(不藥良方)

⑩治穀道生瘡。俗呼偷窺老鼠。用棉花子炒去殼。磨粉。每早中晚三次。打糊服。一碗。半月全愈。(不藥良方)

⑪治腎子大小偏墜。回生集。用棉子煮湯入麪。將腎囊坐入。口候湯冷止。一二次。散其冷氣自愈。(不藥良方)

⑫治陽痿不起。棉花子水浸曬乾。燒酒拌炒去殼。用仁牛筋。破故紙。鹽水炒。韭菜子炒。各二兩。爲末。葱汁爲丸。梧子大。每服二錢。空心酒下。(祝氏效方)

⑬治痢疾。棉花子仁。新瓦炒去油。焦研細。每服二錢。紅用燈心湯下。白用好陳酒下。(救生苦海方)

⑭治癰瘡。棉花瘡。用棉花子一斗。燒酒拌和。炒燥去灰。再拌再炒。以黑爲度。去殼再炒。搗爲末。用砂糖調和。每服三錢。服過一升許。即愈。(集驗方)

【棉花】①即杜仲之古籍別名。典見和漢藥考。詳「杜仲」條。②即草棉花之俗名。詳「草棉」條。

【棉花葵】即黃蜀葵之古籍別名。典見植物圖考。詳「黃蜀葵」條。

【槌子】即枳椇子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「枳椇子」條。

【探子】產地 生山野間。形態 探爲果類之一。

種。三月開花。結實如梨。七八月成熟。色黃。味甘。酢。而核甚堅。可供藥用。

性質 甘。澀。平。無毒。

主治 生食之。止水痢。熱和蜜食之。去嗽。

【棒槌草】即龍鬚草之別名。詳「龍鬚草」條。

【棒雞草】即龍鬚草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「龍鬚草」條。

【棒蘭】即釵子股之古籍別名。典見海藥。詳「釵子股」條。

【棕心草】即龍常草之古籍別名。典見綱目。詳「龍常草」條。

【棕枹】即棧欄之俗名。詳「棧欄」條。

【棕欄】即棧欄之俗名。詳「棧欄」條。

【棕欄皮】即棧欄之處方用名。詳「棧欄」條。

【棕欄炭】即棧欄炒黑者之處方用名。詳「棧欄」條。

【棕欄草】即藜蘆之古籍別名。典見和漢藥考。詳「藜蘆」條。

【棗】即大棗之原名。詳「大棗」條。

【棗木心】性質 甘。澀。溫。有小毒。

主治 中熱腹痛。面目青黃。淋露骨立。到取一斛。水淹三寸。煮至二斗。澄清煎五升。日服五合。取吐即愈。又煎紅水服之。能通經脈。

【棗杞】即枸杞子之處方用名。詳「枸杞子」條。

【棗兒橫】即橫榔之處方用名。詳「橫榔」條。

【棗油】即大棗之古籍別名。典見和漢藥考。詳「大棗」條。

【棗核仁】原名 陳棗核仁。性質 燂之苦平。無毒。

主治 腹痛邪氣。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論棗核仁曰。惡氣。卒疰忤。

【明】李時珍本草綱目論棗核仁曰。核燒研。搽瘰癧良。

參攷資料 按劉根別傳云。道士陳孜如癡人。江夏袁仲陽敬事之。孜曰。今春當有疾。可服棗核仁。

仁二十七枚。後果大病。服之而愈。又云。常服棗仁。百邪不復干也。仲陽服之有效。則棗果有治邪之說。

陽服之有效。則棗果有治邪之說。

人言梨皆以常山、真定、山陽、鉅野、梁國、睢陽、齊國、臨淄、鉅鹿、弘農、京兆、鄆都、洛陽爲稱。蓋好梨多產於北土。南方惟宣城者爲勝。故司馬遷史記云：「淮北榮南河濟之間，千株梨，其人與千戶侯等也。」又魏文帝詔云：「真定御梨，大如拳，甘如蜜，脆如菱，可以解煩釋情。」辛氏三秦記云：「含消梨，大如五升器，墜地則破，須以囊承取之。漢武帝嘗種於上苑，此又梨之奇品也。物類相感，志言梨與蘿蔔相間收藏，或削梨蒂種於蘿蔔上，藏之，皆可經年不爛。今北人每於樹上包裹，過冬乃摘，亦妙。李時珍：『梨不論形色，總以心小肉細，嚼之無渣，而味純甘者爲佳。凡丹石煙火、煤火酒毒，一切熱藥爲患者，啖之立解。溫熱虛病及陰虛火熾、津液燄涸者，搗汁飲之立效。此果中之甘露子。藥中之聖醍醐也。』（王秉衡）『凡人有痛處，口渴脈數，此癰疽將成之候。惟晝夜食梨，可轉重爲輕。青梨之家，厚味醇酒，縱恣無節，必多痰火，猝中癰疽之病，能常食梨可免。』（顧松園）

【梨子皮】即梨之處方用名。詳「梨」條。

【梨木皮】主治 解傷寒時氣。

【梨汁】即梨之處方用名。詳「梨」條。

【梨尖草】即牛蒡之別名。詳「牛蒡」條。

【梨花】主治 去面黑粉滓。

【梨花春】即米酒之古籍別名。典見和漢藥考。詳「米酒」條。

【梨食】即白芍之古籍別名。典見別錄。詳「白芍」條。

【梨棗樹】即枳椇子之古籍別名。典見綱目。詳「枳椇子」條。

【梨葉】主治 霍亂吐利不止。黃汁服，作煎治風。

歷代記述攷證 【宋】蘇頌圖經本草論梨葉曰：「治小兒寒疝。」

【明】吳瑞日用本草論梨葉曰：「搗汁服，解中菌毒。」

【梨葉】即芥之古籍別名。典見別錄。詳「芥」條。

【梨蓋】即防葵之古籍別名。典見本經。詳「防葵」條。

【梨鬆】產地 出臺灣海島中。形態 梨鬆爲雜草類之一種。其果實如肥皂，可供藥用。

主治 磨瘡疔瘡。

【梨鷀】即鷀鴒之古籍別名。典見綱目。詳「鷀鴒」條。

【葉枝草】即淫羊藿之古籍別名。典見諸家本草。詳「淫羊藿」條。

【葉枝草】即淫羊藿之古籍別名。典見和漢藥考。詳「淫羊藿」條。

【檜】即釣樟之古籍別名。典見本草集註。詳「烏樟」條。

【檜草】即烏樟之古籍別名。典見綱目。詳「烏樟」條。

【棉子】基本 本品係草棉之性質 辛熱。

主治 補虛煖腰，治損，油毒，昏目，塗癬疥等。

配合應用 ①治痰火後牛身不遂，筋骨疼痛，核桃仁、棉花子仁、杜仲炒、巴戟、砂仁、骨碎、補骨、杜仲、牛膝各二兩，大蝦米四兩，菟絲餅四兩，用燒酒二十觔煮服。如

年高者加附子、肉桂各一兩。酒服完，將渣曬乾爲細末，煉蜜爲丸，每

服二錢，酒送下。

②長春丸治腎虛精冷之症。魚膠一觔，蛤粉炒成珠，梅焦、棉花子取淨仁一觔，去油，淨酒蒸白蓮鬚八兩，金櫻子去仁毛淨一觔，金銀石斛八兩，炒炭、藜蘆四兩，枸杞子四兩，五味子四兩，炒鹿角五觔，鯢鱗片河水煮三晝夜，去角，取汁熬膏和藥末爲丸。梧桐子大，每服三錢（集驗良方）

③健步方。棉花子仁一觔，淨肉用燒酒三觔炒乾，枸杞子四兩，酒浸，杜仲四兩，鹽酒煮炒，葛絲子四兩，酒炒，歸身二兩，破故紙四兩，酒洗炒，胡桃仁四兩，共爲末，煉蜜爲丸，桐子大，每服三錢，空心滾湯下（凌雲集方）

十二畫 梨

藥 榆 棉

陰濡燥。散結通腸。消癰疽。止煩渴。解丹石烟煤。灰燼。有藥。藥諸毒。治中風。不語。痰厥。驚狂。溫暑。等疴。並絞汁服。名天生甘露飲。以皮薄心小肉細無渣。略無酸味者良。北產尤佳。切片貼湯火傷。止痛不爛。中虛寒瀉。乳婦金瘡。忌之。新產及病後須蒸熟食之。與蘆根相間收。藏則不爛。可搗汁熬膏。亦可醬食。

配合應用 ①治消渴飲水。用香水梨。或鵝梨。或江南雪梨。皆可取汁。以蜜湯熬成膏。用瓶收。以熱水或冷水調服。愈乃止。(普濟方)

②治卒得咳嗽。用好梨去核。搗汁一碗。入椒四十粒。煎一沸。去滓。納黑錫一大兩。消訖。細細含嚥。立定。(海上方) 又用梨一顆。刺五十孔。每孔納椒一粒。麵裹。灰火煨熟。停冷。去椒食之。又方去核。納酥蜜。麵裹。燒熟。冷食。又方切片。酥煎食之。又方搗汁一升。入酥蜜各一兩。地黃汁一升。煎成含嚥。凡治嗽。須喘急定時。冷食之。若熱食。反傷肺。令嗽更劇。不可救也。若反。可作羊肉湯。飽食之。即佳。(孟詵方)

③治痰喘氣急。梨剉空。納小黑豆令滿。留蓋合住。鑿定。燉火煨熟。搗作餅。每日食之。至效。(摘玄方)

④治暗風失音。生梨搗汁一盞。飲之日再服。(食療本草方)

⑤治小兒風熱。昏憒。躁悶。不能食。用消梨三枚。切破。以水二升。煮取汁一升。入粳米一合。煮粥食之。(聖惠方)

⑥治赤目。弩肉。日夜痛者。取好梨一顆。搗絞汁。以絲裹黃連片一錢。浸汁。仰臥點之。(圖經方)

⑦治赤眼腫痛。鵝梨一枚。搗汁。黃連末半兩。膩粉一字。和勻。絲裹浸梨汁中。日點之。(聖惠方)

⑧治反胃轉食。藥物不下。用大雪梨一箇。以丁香十五粒。刺入梨內。澄紙包四重。煨熟食之。(聖濟總錄方)

用量 錢半至四錢。

施用宜忌 凡胃寒便滑。及無熱邪者禁用。

參攷資料 ①梨多食動脾。少則不及。病用梨者。當斟酌之。惟病酒煩渴。人食之甚佳。終不能卻疾。(慈崇爽)

②孫光憲北夢瑣言云。有一朝士見奉御梁新診之曰。風

疾已深。請速歸去。復見鄆州馬醫趙郭診之。言與梁同。但請多喫消梨。咀齧不及。絞汁而飲。到家旬日。惟喫消梨。頓爽也。(唐慎微)

③按類編云。一士人狀若有疾。厭厭無聊。往楊吉老診之。楊曰。君熱證已極。氣血消燬。此去三年。當以疽死。士人不樂而去。開茅山有道士。醫術通神。而不欲自鳴。乃衣僕衣。詣山拜之。願執薪水之役。道士留置弟子中。久之。以實告道士。道士診之。笑曰。汝便下山。但日日喫好梨一顆。如生梨已盡。則取乾者。泡湯食。滓飲汁。疾自當平。士人如其戒。

經一歲。復見吉老。見其顏貌腴澤。脈息和平。驚曰。君必遇異人。不然豈有痊理。士人備告吉老。吉老具衣冠。望茅山設拜。自告其學之未至此。與瑣言之說。彷彿。觀夫二條。則梨之功。豈小補哉。然惟梨。梨鵝梨。消梨。可食。餘梨。則亦不能去病也。(李時珍)

④梨處處皆有。而種類殊別。醫方相承。用乳梨。鵝梨。乳梨。出宣城。皮厚而肉實。其味極長。鵝梨。河之南北。州郡皆有之。皮薄而漿多。味差短。其香則過之。其餘

水梨。消梨。紫栗梨。赤梨。青梨。茅梨。甘棠梨。藥兒梨之類甚多。俱不入藥也。一種藥梨。惟堪蜜食。之。止口乾。生食不益人。冷中又有紫花梨。療心熱。唐武宗有此疾。百藥不效。青城山那道士。以此梨絞汁。進之。帝疾遂愈。復求之。不可得。常山郡忽有一株。因緘封以進。帝多食之。解煩燥。殊效。歲久木枯。不復有種。今人不得而用之矣。(蘇頌)

⑤梨樹高二三丈。尖葉光潤。有細齒。二月開白花。如雪。六出。上已無風。則結實必嘉。故古語云。上已有風。梨有蠹。中秋無月。蚌無胎。買思鰓言梨核每顆有十餘子。種之。惟一。二子生梨。餘皆生杜。此亦一異也。杜即棠梨也。梨品甚多。必須棠梨。桑樹接過者。則結子早。而佳梨有青黃紅紫四色。乳梨。即鵝梨。鵝梨。即錦梨。消梨。即香水梨也。俱為上品。可以治病。藥兒梨。即玉乳梨之訛。或云藥兒一作語兒。地名也在蘇州嘉興縣。見漢書注。其他青皮。早穀。半斤。沙蘆諸梨。皆粗澁不堪。止可煮羹。及切烘為脯爾。一種醋梨。易水煮熟。則甜美。不損人也。昔

一三一四

父。禦兒梨(綱目)綿梨(綱目)乳梨。鵝梨(嘉祐圖經本草)

外國名詞 *Pirus sinensis*, *Lindl.* (拉丁) ナシ アリノミ

(日本)

基本 係薔薇科梨屬。爲梨之果實。

產地 陳仁山藥物生產辨云。產山東平原縣等處。醫學辭典曰。以產直隸之河間。山東之萊陽者爲佳。

形態 梨爲山果類之落葉喬木。高二三丈。惟爲採果之便。常彎屈其枝。或剪除之。變爲灌木形。葉作卵圓形。有尖端。邊緣生細微之鋸齒。如毛狀。葉柄長。互生。春月隨新葉而開花。花五瓣。白色。雄蕊甚多。葯黑褐色。雌蕊五。秋結果爲漿果。表皮有小斑點。中有子十餘粒。呈黑色。其花實葉等。俱可供藥用。



(一) 梨



(二) 梨

種植 山野園圃間有栽植者。以梨子十餘粒下種。惟一子生。梨。餘皆生杜。須以棠梨或桑樹接過。則結實早而佳。

採取 秋月成熟時採之。

製法 梨與蘿蔔相間收藏。或削梨蒂。種於蘿蔔上藏之。皆可經年不爛不壞。

用法 恒以去皮生食。入藥連皮水煎。或搗汁和用。

性質 甘微酸。寒。無毒。

效能 瀉熱。養陰。用作清涼劑。

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新修本草論梨曰。熱嗽。止渴。切片貼湯火傷。止痛不爛。【唐】孟詵食療本草論梨曰。卒暗風不語者。生搗汁。頻服。胸中痞塞。熱結者。宜多食之。【宋】開寶重定新本草論梨曰。治客熱中風。不語。治傷寒熱發。解丹石熱氣。驚邪。利大小便。【宋】大

明諸家本草論梨曰。除賊風。止心煩氣喘。熱狂。作漿吐風痰。【明】李時珍本草綱目論梨曰。潤肺涼心。消痰降火。解瘡毒。酒毒。【明】繆希雍本草經疏論梨曰。梨味甘微酸。氣寒無毒。入手太陰。兼入足陽明。經。別錄著梨。止言其害。不敘其功。陶隱居言梨不入藥。蓋古人論病。多主於風寒外邪。以溫熱爲補。藥多桂附。凡冷利之物。輟而不用也。不知時運迭降。稟受迥殊。今時之人。火病熱病。痰病。往往皆是。梨能潤肺消痰。降火除熱。故蘇恭主熱嗽。止渴。貼湯火傷。治客熱。中風。不語。傷寒寒熱。解丹石熱氣。驚邪。利大小便。大明主賊風。心煩。氣喘。熱狂。孟詵主胸中痞塞。熱結等。誠不可闕者也。本經言多食令人寒中者。以其過於冷利也。乳婦金瘡不可食者。以血得寒則凝。而成癰爲病也。凡人有痛處。脈數無力。或發渴。此癰疽將成之候。惟晝夜食梨。可轉重爲輕。膏粱之家。厚味醴酒。縱恣無節。必多痰火。卒中癰疽之病。數食梨。可變危爲安。功難盡述。【明】李士材本草圖解論梨曰。梨

味甘寒。潤肺涼心。消痰降火。止嗽除渴。生者清六腑之熱。熟者滋五臟之陰。【清】黃宮繡本草求真論梨曰。梨成於秋。花皆白。得西方金氣之最。味苦微酸。氣寒無毒。功喘入肺與胃。凡胸中熱結熱嗽。痰咳便秘。狂煩咽乾。喉痛。中風。因溼反胃。不食。並湯火傷。瘰癧。目障。丹石熱氣。一切屬於熱成者。惟食梨數枚。即能轉重爲輕。消弭於無事。然必元氣素實。大便素堅。方可與之。若使元氣虛弱。誤啖多致寒中。蓋梨是冷利之物。服之中益寒冷。金瘡乳婦。亦忌投服。恐血得寒益凝。豈可概謂能食。而不審而別之乎。搗汁熬膏。良。煮汁蜜製。清痰止咳。用藥煎與梨相間收藏。則不爛。【清】黃元御玉楸藥解論梨曰。梨甘寒。清利。涼心。肺熱。熱滋。臟腑燥渴。洗滌。凝痰。疏通。鬱塞。滋水。清風。泄火。敗毒。治風。淫熱。鬱。欲作癰疽。癰疽之病。陰旺。上濕者。忌之。泄胃滯腸。不可恣食。上熱者。取汁溫服。點眼病。亦腫。腎肉。【清】王士雄隨息居飲食譜論梨曰。梨甘涼。潤肺。清胃。涼心。滌熱。息風。化痰。已嗽。養

害。

配合應用 ①治驚風煩熱懷

火草煎水浴之。(普濟方)

②治小兒中風汗出中風一日

頭項腰熱二日手足不屈用懷火

草乾者半兩麻黃丹麥白朮三錢

半爲末每服半錢漿水調服三四

歲服一錢。(聖濟總錄方)

③治嬰穉風疹在皮膚不出及

瘡毒取懷火苗葉五大兩和鹽三

大兩同研絞汁以熱手摩塗日再

上之(圖經方)

④治熱毒丹瘡懷火草搗汁拭

之日夜拭一二十遍一方苦酒搗

泥塗之(千金方)治烟火丹毒從

兩股兩脇起赤如火景天草真珠

末一兩搗如泥塗之乾則易。(楊

氏產乳方)

⑤治漆瘡作痒接懷火草塗之

(外臺祕要方)

⑥治眼生花翳澀痛難開景天

搗汁日點三五次(聖惠方)

⑦治產後陰脫懷火草一斤陰

乾酒五升煮汁一升分四服(子

母祕錄方)

用量 八分至錢半。

施用宜忌 凡病屬於虛寒者

禁服。

參攷資料 ①景天氣味寒有

小毒可煨礱砂(大明)②今南北

皆有之人家種於中庭或盆置屋

上春生苗葉似馬齒莧而大作層

而上莖極脆弱夏中開紅紫碎花

秋後枯死亦有宿根者苗葉花並

可用(蘇頌)③景天人多栽於石

山上二月生苗脆嫩微帶赤黃色

高一二尺折之有汁葉淡綠色光

澤柔厚狀似長匙頭及胡豆葉而

不尖夏開小白花結實如連翹而

小中有黑子如粟粒其葉味微甘

苦煉熱水淘可食(李時珍)④景

天似佛甲草而大折取之倒懸簷

下經日不凋復栽於地仍能生活

勝馬齒莧(和漢藥考)⑤日俗多

以之治腫瘍取新鮮葉火炙剝去

葉皮貼敷患處膿自吸出腫瘍遂

愈(和漢藥考)

【景天】即螢火之古籍別名。典見

吳普本草。詳「螢火」條。

【曾青】 命名 本品層層而生。

實。故名。 其生從實至空從空至

產地 生銅礦中。

形體 曾青爲石類之一種。其

色青。年久形如黃連相織。或以蚯

蚓尿方礱式擊之如金聲者爲真。

以之塗鐵。色赤如銅。可供藥用。

製法 雷穀曰。凡使勿用夾石

及銅青。每一兩要紫背天葵甘草

青芝草三件。乾溼各一盞。細到。放

瓷鍋內。安青於中。東流水二盞。緩

緩煮之。五晝夜。勿令水火失時。取

出。以東流水浴過。研乳如粉用。

性質 酸小寒。無毒。

主治 目痛止淚。出風痺。利關

節。通九竅。破癥堅積聚。(本經)養

肝膽。除寒熱。殺白蟲。療頭風。腦中

寒。止煩渴。補不足。盛陰氣。(別錄)

施用宜忌 畏菟絲子。

參攷資料 ①曾青住火成膏。

可結求。制丹砂。蓋含金氣所生也。

須酒醋漬煮用。(獨孤酒)②曾青

治目義同空青。古方辟邪太乙神

精丹用之。扁鵲治積聚留飲。有曾

青丸。並見古今錄驗方(李時珍)。

對節生枝。長葉如柳。可供藥用。

一三二



柱一天朝

效能 升氣補虛。

主治 無名腫毒。蛇咬。

【朝天蓮花】即辛夷之古籍別

名。典見和漢藥考。詳「辛夷」條。

【朝天蓮】即辛夷之古籍別名。典

見和漢藥考。詳「辛夷」條。

【朝生】即鬼蓋之古籍別名。典見

本草集註。詳「鬼蓋」條。

【朝開暮落花】即木槿之古籍別

名。典見綱目。詳「木槿」條。

【朝腦】即樟腦之古籍別名。典見

和漢藥考。詳「樟腦」條。

【朝鮮松】即海松子之日本名。詳

「海松子」條。

【朝鮮參】即高麗參之別名。詳「

高麗參」條。

【黎】 命名 本品性善下行而

流利。故名。

處方用名 雅梨。梨汁。梨子皮。

古籍別名 快果。果宗。玉乳。蜜

攻毒是矣。楊登甫云。癰癤之毒。莫
不有根。大抵以斑蝥地膽爲主。制
度如法。能使其根從小便中出。或
如粉片。或如血塊。或如爛肉。皆其
驗也。但毒之行。小便必澀痛不可
當。以水通滑石燈心輩道之。又葛
洪肘後方云。席辯刺史傳云。凡中
蠱毒。用斑蝥蟲四枚。去翅足。炙熱。
桃皮五月初五日採取。去黑皮。陰
乾。大戟去骨。各爲末。如斑蝥一分。
二味。各用二分。合和棗核大。以米
清服之。必吐出蟲。一服不瘥。十日
更服。(李時珍) ⑤斑貓芫青亭長
地膽之毒。酸汁黃連黑豆葱茶皆
能解之。(李時珍)

【普陀茶】
產地 定海之普陀山。

主治 血痢肺癰。

【普洱茶】即普洱茶之古籍別名。
典見物理小識。詳「普洱茶」條。

【普洱茶】
古籍別名 普洱茶。
(物理小識)

產地 雲南普洱府。

性質 苦澀。

主治 逐痰下氣。刮腸通泄。

參攷資料 按普洱茶大者一

團五觔。如人頭式。名人頭茶。每年
入貢。民間不易得也。有僞作者。名
川茶。乃川省與滇南交界處土人
所造。其餅不堅。色亦黃。不如普洱
清香。獨絕也。普洱茶膏黑如漆。醒
酒第一。綠色者更佳。消食化痰。清
胃生津。功力尤大也。物理小識。普
雨茶蒸之成團。西番市之最。能化
物。與六安同。普洱茶膏。能治百病。
如肚脹受寒。用薑湯發散。出汗即
愈。口破喉癰。受熱疼痛。用五分噙
口。過夜即愈。受暑擦破皮血者。研
敷之。

【普賢線】
古籍別名 仙人綰。
羅漢條。(綱目拾遺)

產地 出四川峨嵋山及湖南

衡山。

形態 普賢線爲蔓草類之一

種。有二。其出峨眉山者。乃樹上

苔蘚蔓引而生。長達數尺。或謂在

深谷中有尋丈。其出衡山者。生石

上。與苔同種。色多鮮翠。長二三尺。

叢垂若綫。無根蒂。狀如同心帶。三

股。色綠。俱可供藥用。

採取 以石生者入藥。採取

曬乾用。

主治 胃脘心氣疼痛。煎服之。
古籍別名 慎火。戒火。
(本經) 救火。據火。火母。
(別錄) 護火。辟火。(綱目) 五花龍
錢草。辨慶草。(和漢藥考)

外國名詞 Sedum Purpure-

um, Link. (拉丁)

基本 屬景天科。爲景天之葉。

產地 多在山野川谷之石間。

或有栽生於庭園中。亦有盆種於
屋上者。謂能辟火之災云。



景天

形態 景天爲多年生草本。自

生於高山之上。園圃種植者亦多。

莖圓。高一二尺。葉色白綠。作長卵

圓或長橢圓形。略如匙頭。無柄。厚

而帶肉質。且含漿液。邊緣有細鋸

齒。彼此互生。夏秋歧生分枝。梢端

開五瓣之花。色白。而有紅叢。簇生

如繖。間有開黃花或綠色花者。子

黑。似栗粒。此草性極強健。試折取

一莖。棄置數日後。再插入地上。仍

能發生細根。由漸成長。

採取 四月七月間。採葉陰乾。

用法 恒以和入外治藥劑。或

煎水薰浴。或生搗塗敷。

性質 苦。平。無毒。

效能 解熱毒。治丹瘡。用治湯

腫解毒藥。

主治 太熱火瘡。身熱煩邪。惡

氣。諸蟲毒。痈疔。寒熱。風痺。諸不足

歷代記述攷證 【南北朝】

陶弘景本草集註論景天曰。療金

瘡。止血。煎水浴小兒。去煩熱。驚氣。

【唐】甄權藥性本草論景天曰。風

疹惡痒。小兒丹毒及發熱。【宋】大

明諸家本草論景天曰。熱狂赤眼。

頭痛寒熱。遊風。女人帶下。【明】繆

希雍本草經疏論景天曰。景天即

慎火草也。味苦平。別錄酸無毒。性

能涼血解毒。故主大熱火瘡。身熱

煩邪。惡氣。諸蟲毒。痈疔。寒熱。風痺。

諸不足。熱解則毒散。血涼。血則則

陰生。故也。【清】吳儀洛本草從新

論景天曰。景天一名慎火草。渴熱

解毒。苦酸而寒。乃純陰之品。獨入

離宮。專清熱毒。療諸瘡。火丹。一切

杯煎。連渣服之。不拘帖數。至大小便不見惡物爲度。幾經醫人試用。功效非常。昭著。據發明者經過。

係就被瘋犬嚙死之耕牛。剖腹察視。見腹中有斗大紫黑色血塊。擾之蠕蠕動。因悟出傷寒論中太陽病。其人發狂者。爲熱在下焦蓄血之證。其人如狂者。血證諦也。下血乃愈。於是師着仲景之意。立此治法。真是探本窮原。勝過古人萬倍。古人對於此證內容。皆不能十分明瞭。但從毒氣與平常大畜之性質上着想。所以外治法用砂酒壺吸毒。及追風如聖散內治法用救生散扶危散木鼈杏仁。此類藥物皆非適當。救生扶危二散皆以斑蝥爲主藥。雖能逐惡物血塊由小便出。但內臟也難免並受損傷。腹中血塊。既然斗大。欲從很小之溺孔中盡逐去病根。決不可能。因爲斑蝥用量。雖極強壯之人。亦不能耐過三劑以上。而劉大毒。至少亦須十餘劑。方能見效。我恐如服斑蝥三四次。已早將小腸膜和尿管管蝕化。豈尚有生命存留。所有受瘋犬傷者。與患癰癰之人。甚不

相宜。總之斑蝥除外治爲追蝕惡肉與生髮以外。決無一毫價值可言。

配合應用 ①內消癰癰。不拘大人小兒。用斑蝥一個。去翅足。以粟一升同炒。米焦去米。不用入薄荷。四兩爲末。烏雞子清丸。如菉豆大。空心臘茶下三九。加至五九。却每日減一丸。減至一丸後。每日五丸。以消爲度。〔經驗方〕又癰癰經久不癒。用斑蝥一枚。去翅足。微炙。以漿水一盞。空腹吞之。用蜜水亦可。重者不過七枚。瘰癧也。〔廣利方〕

②治瘰癧。瘰癧有蟲。八月中多取斑蝥。以苦酒浸半日。曬乾。每用五個。銅器炒熟爲末。巴豆一粒。黃大背上毛二七根。炒研。硃砂五分。同和苦酒。頓服。其蟲當盡出也。

③治癰疽拔膿。癰疽不破。或破而腫硬無膿。斑蝥爲末。以蒜搗膏。和水一豆許。貼之。少頃膿出。即去藥。〔直指方〕

④治疔腫拔根。斑蝥一枚。捻破。以鍼割瘡上。作米字形。模封之。即出根也。〔外臺祕要方〕

⑤治血疽便毒。不拘已成未成。

隨即消散。斑蝥三個。去翅足。炒。滑石三錢。同研。分作三服。空心白湯下。日一服。毒從小便出。如痛。以車前木通。澤瀉。猪苓。煎飲。名破毒散。甚效。〔東垣方〕

⑥治積年癰瘡。用斑蝥半兩。微炒爲末。蜜調傅之。〔外臺祕要方〕又用斑蝥七個。醋浸。置一夜。擦之。〔永類鈴方〕

⑦治面上瘡癰。大風。面上有紫瘡。癰未消。用乾斑蝥末。以生油調。傅約半日。瘡癰脹起。以軟帛拭去。藥以棘鍼挑破。近下令水出。乾。不得剝其瘡皮。及不可以藥近口眼。若是尖瘡。癰子。即勿用此。別用騰礬末。合藥以治之。〔聖濟總錄方〕

⑧治疣痣。黑子。斑蝥三個人言少許。以糯米五錢。炒黃。去米入蒜一個。搗爛點之。

⑨治瘋狗咬傷。此乃九死一生之病。急用斑蝥七枚。以糯米炒黃。去米爲末。酒一盞。煎半盞。空心溫服。取下小肉狗三四十枚。爲盡。如數少。數日再服。七次無狗形。永不再發也。累試屢驗。〔衛生易簡方〕又用大斑蝥三七枚。去頭翅足。用糯米一盞。略炒過。去斑蝥。別以七枚。如前炒。色變復去之。別以七枚。如前至青。煙爲度。去蜜。只以米爲粉。用冷水入清油少許。空心調服。須臾再進一服。以小便利下。瘡物爲度。如不利。再進。利後肚疼。急用冷水調青。酸服之。以解其毒。否則有傷。黃連水亦可解之。但不宜服一切熱物也。〔醫方大成方〕

⑩治中沙虱毒。斑蝥二枚。一枚末服。一枚燒至烟盡。研末。傅瘡中立瘻。〔肘後方〕

⑪治寒耳治聾。斑蝥炒二枚。生巴豆去皮。心二枚。杵丸。棗核大。綿裹塞之。〔聖惠方〕

⑫治妊娠胎死。斑蝥一枚。燒研。水服。即下。〔廣利方〕

用量 三只至七只。

施用宜忌 凡非氣壯毒盛者。禁用。畏巴豆。丹參。青。惡腐青。甘草。豆花。

參攷資料 ①斑蝥人獲得之。尾後惡氣射出。臭不可聞。故其入藥。亦專主走下竅。直至精溺之處。蝕下敗物。痛不可當。葛氏云。凡用斑蝥。取其利小便。引藥行氣。以毒

香豬油煎煉然後將斑蝥末加入以搗至凝結爲度。此膏用布開調或用紙亦可。貼此膏約三四點鐘或五六點鐘。令其略起水泡。宜隨即撤去。再敷以麥糠甘菊。或敷以爛飯。但貼此膏。其症之輕重。亦須分辨。其在重症。則刺破其水泡後。並須將其皮揭去而復貼以松香黃膏。令其膿盡發。庶易獲效。其在輕症。則俟其起水泡後。隨即刺穿。另用白藥膏以潤之。至小兒貼此膏。須將白藥膏加入。令勿過烈。如臍脂發炎。須俟其稍退。貼此膏令引炎外出。又如頭腦積血伏熱等症。須先用藥以清其熱。次以此膏貼頭後及小腿裏。又如眼內久患熱症。以此膏貼太陽穴及貼頭後耳後等處。其翳膜自可免生。又如肺內熱症已退。仍覺痛而未愈。以此膏貼胸前。又如腦筋作疼。以此膏貼患處。若骨銳發腫。以此膏貼數次。自能獲效。此膏有三妙用。其一能引炎外出。其二能令熱消散而免生翳膜。其三能行氣血。(斑蝥用膏方)又斑蝥十二分極細末。黃蠟七分半。煉羊油七分半。洋

十二畫 斑

松香三分。煉豬油六分。除斑蝥。餘共入燙鍋鎔化。再加斑蝥調勻。至涼爲度。能引症外出。起水泡用。(臨時用攤布上。以樟腦細末撒膏面上。可免小便熱。外蒙亮砂一層。貼患處。俟起水泡。即行揭去。)(斑蝥貼膏方)附錄斑蝥生八日至九日即死。活時發一大臭。最爲可憎。捕取斑蝥之法。必在早起時。以布蓋護其手與面。後將其樹搖動。令斑蝥落下。或置醋內。或置篩內。令過醋。則斑蝥已死。或在日光內曬之。或在暖房內晾乾。置瓶內。恐有他蟲蝕之。務宜密塞爲要。

近人學說 楊贊民曰。斑蝥一名斑貓。有作盤蝥。身業綠色。兼金屬之光澤。因有斑文。(本草作有黃黑色斑文)故曰斑蝥。長約五六分。以至寸許。多生在葉上。捕生蟲做食料。很有功於農人。但性辛寒。有大毒。在醫藥上本無足取。世人偏用之入藥。甚爲不解。茲將主治證候列下。以證明其不該入藥之原因。於下。斑蝥最重要之主治。(一)瘰癧。(二)獐犬傷。瘰癧名號甚多。凡十餘種。然究其病理原因。

不外痰溼風熱氣毒結聚而成。有急性慢性二種分別。急性者暴然而發。但容易潰破。所以治法不難。至於慢性瘰癧。來勢很緩。漸漸發作。結核腫痛。堅硬難消。經了一年半載。漸化膿潰爛。或竟變成危險證候。所以不容易治療。普通治法不外消痰解毒清毒行氣去結散核和活血絡。用藥如海菜丸。消核散。屠黃丸。控涎丹。消風化痰湯。內消瘰癧丸。紫雲膏。皆可隨證選用。原不必專倚賴斑蝥一物。自楊登甫創立瘰癧之毒。以斑蝥地膽爲主。製治如法。能使其從小便出。如粉片血塊爛肉。此其驗也。於是法製瘰癧蛋。與楊氏家藏治瘰癧方。此等方藥。竟爲瘰癧證之主治。真是萬分荒謬。須知瘰癧證之發生。雖有許多原因。但無非是身體血液。中缺乏碘質。不能爲此。所以療治瘰癧方法。必須含有碘質者。方能奏效。自然界中含碘最富者。首推生存海中之動植物。(晉醫康說頭顱險而瘰。便是離海太遠。缺乏碘質之故。)海藻海帶昆布。何以爲瘰癧之重要藥。卽爲含有碘

量之故。牡蠣何以有消堅軟核之功用。亦爲含碘甚富之故。試問斑蝥有甚關係。有甚能力。可以療治瘰癧。就使誤食蟲蟻鼠蟻陳水宿茶等。發生瘰癧。當然毒氣是聚在發生之部位。但斑蝥入腸。便肆其攻竄之性。直達下部精溺之處。如須使之轉上行。以攻去病根。斷無此事。有人問患瘰癧者。一吃斑蝥以後。確能尿出如粉片血塊爛肉等物。豈非明驗。不知服斑蝥者。所以尿出之粉片血塊爛肉。完全由斑蝥造成。因其性質非常毒厲。將其汁染在肌肉上。可以使肌肉即時潰爛。可知服後所經過之地點。焉得不起潰爛作用。所以服斑蝥者。一定腹中便溺之處。痛不可當。求生不能。求死不得。十分苦慘。豈非內臟破損之特徵耶。斑蝥第二項主治。是獐犬傷。古人有言。國狗之癩。無不噬也。可見是甚厲毒。但因無妥當之治法。至民國十一年。方有人提倡用仲景傷寒論中之抵當湯。加減施治。(原方係用生川軍二錢。桃仁七粒。去皮尖。地龍五七隻。炒去足。加白蜜三錢。酒一

十二畫 斑

數少。再服七枚。若愈後忌聞鐘聲。復發則不可治矣。去頭足糯米炒熟。生用則吐瀉人亦有。用米取氣不取質者。

國文學說

日本學說謂日本之斑貓醫者亦夙知其有藥效。謂能治蠱毒。爛惡肉。腐瘡毒。利水道。蓋含一種刺戟性之物質。明甚。其刺戟性物質為何。猪子氏以爲卽係羯答利斯。故我國之豆斑貓。與泰西之芫菁。有相同之效。分製造含羯答利斯劑。及羯答利斯用之。最爲適宜。依丹波鈴木成島諸氏之實驗云。羯答利斯之含量爲百分之三。優勝於芫菁者。幾至三倍。(藥學雜誌第百三號)又謂羯答利斯酸鹽於治療上大得聲譽。瘰癧頭結核尤稱有效。其結節能褪色。縮小。壞瘍漸見治愈。亦有全治愈者。其用量以羯答利斯〇・一至〇・二密瓦。隔日注射之。副作用中最當注意者。爲刺戟腎臟。卽患蛋白尿及腎炎是也。故投藥時。常宜檢查病者之尿。斑貓之種類。有如下述。①豆斑貓(黃上亭長)日本各地產。此上總地方尤多。爲

甲翼蟲 (*Epicauta gonhami*, mats.) 七八月間最多。豈科植物及馬鈴薯葉等。均受巨害。人若觸葉。立即伴死。墜地。外觀斑點。長五分許。作圓筒狀。頭部作赤褐色。心臟形。觸角頗長。甲翼作黑色。其兩側中央有類黃色之線。腹部作黑色。有黃色輪四五條。俱爲黃色毛所成。有一種特異臭氣。味如灼。②青斑貓(芫菁) (*Lytta vassicatoria* Fab.) 產歐洲南部。尤以西班牙。意大利。法國南部等爲最多。有西班牙蠅。發泡蠅等別名。食白楊。接骨木。槐木等葉而生。長。捕此之法。可於早晨敷布樹下。蒙面罩。御手套。用棒擊樹。卽紛紛墮下。集之。置入薄醋中。或用煮醋蒸氣。燻殺之。使充分乾燥。其形態類豆斑貓。而稍大。長六七分。全體有金綠色。光澤。具六脚。有觸角。頭部作心臟形。呈赤色。甲翼作四角形。翅爲淡褐色。氣味俱與豆斑貓同。③日本斑貓(路敦) (*Mylabris cichorii*, Fabbr.) 棲息於日本各處沙地。長七八分。全身黑色。有黃紅斑點。頗爲美觀。腳頗長。晴天盛暑

之日。止於道旁。路人行近。則急起飛行。數十步而復止。其狀恰如教人路徑。故日本有路敦之稱。其意猶言引路也。④漢產斑貓 (*Mylabris cichorii*, m. *Psulata m. rubripennis*) 產中國山西。山東。湖南。湖北。安徽諸省。全身黑色。長寸許。甲翅有黑褐色線一條至三條。秋季捕集。曬乾。供藥用。⑤土斑貓(地膽) (*Meloe corvinus*) 棲息於山野土石之間。長寸許。闊三四分。全身碧黑色。前翅短。無後翅。故祇能匍匐地上。採集之。亦供藥用。⑥羯答利斯 (*Cantharidin*, $C_{10}H_{16}O_4$) 爲光耀。無色。無氣味。稜柱狀。或葉狀之結晶體。於二百十八度融解。不溶於冷水及溫湯。對於各種溶解劑。則善能溶解。有酸類之性。與鹽基化合。構成鹽類。羯答利斯之製劑有酒。軟膏。硬膏。油劑。鈣劑等。羯答利斯之一回服量爲〇・〇一至〇・〇五瓦。英美學說謂斑蜜又名發泡斑蜜。又名發泡甲蟲。產中國。西班牙。法國。俄羅斯等處。係豆莢上飛蟲。生暖處。並日光多處。爲最堅壯。中國所

十一畫 斑

產之斑蜜。其形狀雖與西國有別。而其功力則同。內含一精。卽甘道殿。取以研末。作藥。殊多功效。其作用爲辟性毒藥。又爲引炎。惹皮膚藥。又爲行氣藥。利小便藥。治久癰病類。久白濁。便澀。陽痿。痼能令生溺器具生炎。如久涎流白帶白濁等症。用之最有益。但此藥之尋常用處。爲用炎令皮膚成泡。約六點鐘至十二點鐘。卽成。然間能成溺淋。務宜慎用。又如起水泡。能引病外出。治肺體生炎。心胞絡生炎。肺胞膜生炎。照胸前部位擦之。至解藥之解此毒。須先服吐劑。或用抽水節。後服蓖麻油。與鴉片。其處方以斑蜜一分。粗末。淡酒八十分。共入有蓋器內。浸七天。間時搖動。濾渣。用絞盤絞之。過淋紙。再加酒。仍足八十分爲度。治下癰。小便淋瀝。每服八釐七毫。半至三分半。(斑蜜酒方) 又斑蜜一錢。芥末四錢。胡椒四錢。樟腦四錢。蒜頭一顆。白醋四兩。八錢。火酒十兩。零八分。和勻。同浸七天。濾淨。搽風濕症甚效。(同上) 又斑蜜一斤。末黃蠟八兩。松香八兩。猪油八兩。先將黃蠟松

氏謂斑鳩補腎。故能明目。竊謂鳩能益氣。則能明目矣。不獨補腎已爾。古者仲春羅氏獻鳩以養國老。仲秋授年老者以鳩杖。云鳩性不噉食之。且復助氣也。(李時珍)

【斑鳩血】
主治 熱飲及解蟲毒。

【斑鳩屎】
主治 治痔耳出膿。疼痛及耳中生疔。尋同夜明沙末等分吹之。

【斑穀】
即椿實子之古籍別名。典見唐本草。詳「椿實子」條。

【斑節相思】
形態 斑節相思為雜草類之一種。枝葉類似薄荷而大。其味如艾。可供藥用。

主治 解毒。

【斑蝥】
即斑蝥之原名。詳「斑蝥」條。

【斑龍】
即鹿茸之古籍別名。典見綱目。詳「鹿茸」條。

【斑龍角】
即鹿角之古籍別名。典見和漢藥考。詳「鹿角」條。

【斑貓】
原名 斑蝥。
命名 斑言其色。蚤言其毒如矛刺。故名。後俗訛為斑貓。

也。

古籍別名 蟬蛻蟲(拾遺) 龍蛇(綱目) 斑蝥(晏青) 赤頭龍蛇(和漢藥考) 斑蝥(吳普) 體髮豆斑貓(新本草)

外國名詞 Cicindela chinensis, Deg. (拉丁) Blister-fly.

基本 斑蝥為屬甲翼類之昆蟲。

產地 陳仁山藥物生產辨云。斑蝥各省均有出。廣東以清遠石角北江、惠州均有出。

形態 斑蝥為大豆葉上之甲蟲。長五六分。黃黑斑紋。烏腹尖喙。其體有一種臭氣。

採取 八九月間。就莖葉上捕取。陰乾。

製法 雷斅曰。凡斑蝥。芫青。亭長。地膽。修事並漬糯米小麻子相拌炒至米黃黑色。取出。去頭足兩翅。以血餘裹懸東牆角上。一夜用之。則毒去也。大明曰。入藥須去翅足。糯米炒熟。不可生用。即吐瀉人。李時珍曰。一法用麩炒過醋煮用之也。

用法 僅以剉末。和入外傳藥間。有和作丸散。

性質 辛寒有毒。

成分 斑蝥之主成分為葐葐利斯。此外含有芳香性揮發油及脂肪質。惟其含量由種類產地等而異。

效能 治疥癬。消癰瘰。用作發泡藥。及生毛藥。間有作為利尿藥者。

主治 寒熱。鬼疰。蟲毒。鼠瘻。瘡疽。蝕死肌。破石癰。本經曰。血積傷人。肌治疥癬。墮胎(別錄)。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論斑蝥曰。治癰瘰。通利水道。【宋】大明曰。華諸家本草論斑蝥曰。療淋疾。傳惡瘡。癰爛。【明】李時珍本草綱目論斑蝥曰。治疔瘰。解疔毒。剉大毒。沙蟲毒。蟲毒。輕粉毒。【明】經希雅本草經疏論斑蝥曰。斑蝥味辛氣寒。扁鵲云。有大毒。近人肌肉則潰爛。毒可知矣。入手陽明手太陽經。性能傷肌肉。蝕死肌。故主鼠瘻。疔瘡。疥癬。辛寒能走散下泄。故主破石癰。血積及墮胎也。至於鬼疰蟲毒。必非極辛大毒

之藥所能療。此本經之誤。甄權主癰瘰。通利水道。以其能追逐腸胃垢膩。復能破結走下竅也。【明】李士材本草圖解論斑蝥曰。斑蝥攻血積。利水道。治疔瘰。解疔毒。剉大毒。蟲毒。輕粉毒。治癰瘰。墮胎。按斑蝥專主走下竅。直至精溺之處。蝕下敗物。但痛不可當。虛者大禁。麩炒醋炙。清。黃宮繡本草求真論斑蝥曰。斑蝥最屬惡物。聞人捕捉。即於尾尾射出惡氣。令人臭不可聞。近人肌肉則潰入胎。則墮。其毒概可知矣。其味辛其氣寒。其性下走而不上。故書言外用。止可以蝕死肌。數疥癬。惡瘡。內治止可以破石癰。拔癰瘰。疔腫。下大腸惡毒而已。取其以毒攻毒也。然惟實者可用。其拔癰瘰者。則以斑蝥法製。使令毒根從便出。如粉片血塊。爛肉之形。次以水通滑石。燈心草。輩道之。但下大毒之初。先於患人頭上拔去血髮二三莖。以斑蝥七枚去翅足。炙黃。用蠟蟬搗汁服之。瘡口於無風處。搽去血。蠶小便洗淨。髮灸敷之。服後小便當有瘀毒泄去。三四日常有狗肉三四十枚為盡。如

【惡士獲勝】即蜀醬苗之古籍別名。典見綱目。詳『蜀醬』條。

【惡客】即曼陀羅之古籍別名。典見姚伯聲花品評。詳『曼陀羅』條。

【惡思佛】即眞珠之古籍別名。典見和漢藥考。詳『眞珠』條。

【惡疾】即牛蒡子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『牛蒡子』條。

【惡草羅】即藜藿之古籍別名。典見莊漫錄。詳『藜藿』條。

【惡實】即牛蒡子之原名。詳『牛蒡子』條。

【惡實子】即牛蒡子之古籍別名。典見綱目。詳『牛蒡子』條。

【提天冬】即天門冬之處方用名。詳『天門冬』條。

【插田蘆子】即覆盆子之古籍別名。典見綱目。詳『覆盆子』條。

【揚泛水】即甘瀾水之古籍別名。典見綱目。詳『流水』條。

【揚搖】產地 閩粵及熱帶諸地有之。

形態 揚搖爲夷果類之一種。其子生皮中長四五寸。有七脊。色黃無核。可供藥用。

性質 甘無毒。

主治 通百脈。強筋骨。和中益氣。潤肌膚。好顏色。

【握雪礬石】基本 本品爲礬石之出於金穴者。

古籍別名 公石(唐本草)化公石(圖經本草)。

性質 甘溫無毒。

主治 痼冷積聚。輕身延年。多食令人熱。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論握雪礬石曰。療大風瘡。

【揭拉婆】即車渠之古籍別名。典見梵書。詳『車渠』條。

【揭羅闍】即鵲之古籍別名。典見梵書。詳『鵲』條。

【散血丹】即小將軍之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『小將軍』條。

【散紅花】即紅花之處方用名。詳『紅花』條。

【散鹽】即末鹽之古籍別名。典見周禮。詳『食鹽』條。

【斑石】即滑石之古籍別名。典見和漢藥考。詳『滑石』條。

【斑尾】即斑貓之古籍別名。典見綱目。詳『斑貓』條。

【斑希】即玳瑁之古籍別名。典見和漢藥考。詳『玳瑁』條。

【斑杖】即虎杖之古籍別名。典見日華諸家本草。詳『虎杖』條。

即攀倒甌之古籍別名。典見綱目。詳『攀倒甌』條。

【斑枝花】即木棉之古籍別名。典見綱目。詳『木棉』條。

【斑斑】即斑斑之古籍別名。典見范汪方。詳『斑斑』條。

【斑斑】即斑斑之古籍別名。典見綱目。詳『斑斑』條。

【斑犀】即兕犀之古籍別名。典見唐本草。詳『兕犀』條。

【斑菌】即斑貓之古籍別名。典見吳普本草。詳『斑貓』條。

【斑鳩】命名 鳩鵲也。言其聲斑。斑也。言其色故名。

古籍別名 錦鳩。斑佳。(范汪方) 鵲鳩。(左傳) 祝鳩。鵲鳩。楚鳩。役鳩。鵲鳩。即鵲。辟。小。而無斑者名佳。其子名鵲鳩。(綱目)

外國名詞 Tureur nisorius L. (Indiandone) (拉丁) シラコバト或シユズカケバト(日

本)

基本 係脊椎動物鳥類鳩鵲類鳩鵲科之斑鳩。

產地 在山林原野間。

形態 斑鳩爲原禽類鳩鵲之一種。體比雉鳩略小。頭頸及下面概灰白色。稍帶赤色。脊背至尾色近灰褐。鵲羽黑褐。外側之尾羽根黑端白。頸部之背面有黑色之半環形輪。餘呈淡白色。其肉可供食與藥用。



鳩 斑

性質 甘。平。無毒。

主治 明目多食。益氣。助陰陽。

歷代記述攷證 【宋】寇宗奭本草衍義論斑鳩肉曰。久病虛損人食之補氣。【明】李時珍本草綱目論斑鳩肉曰。食之令人不噎。

參攷資料 范汪方治目有斑鳩。總錄治目有斑鳩丸。倪惟賢

石方解石(李時珍)●凝水石色如雲母可折者鹽之精也生常山山谷中水縣及邯鄲(別錄)●常山即恒山屬并川中水屬河間邯鄲屬趙郡此處地皆鹹鹼故云鹽精而碎之亦似朴硝此石末置水中夏月能爲冰者佳(陶弘景)●別錄言凝水鹽之精也陶氏亦云鹼地所生碎之似朴硝范子計然云出河東河東南地也獨孤酒丹房鑑源云鹽精出鹽池狀如水晶據此諸說則凝水即鹽精石也一名泥精昔人謂之鹽枕今人謂之鹽根生於鹼地積鹽之下精液滲入土中久至泉結而成石大塊有齒稜如馬牙消清瑩如水精亦有帶青黑色者皆至暑月回潤入水浸久亦化蘇頌注玄精石謂解池有鹽精石味更鹹苦乃玄精之類又注食鹽謂鹽枕作精塊有孔竅者蜂窠可緘封爲禮寶者皆此物也唐宋諸醫不識此石而以石膏方解石爲注誤矣(李時珍)

【寒瓜】即西瓜瓢之古籍別名典見和漢藥考詳「西瓜瓢」條
【寒石】即鹵鹼之古籍別名典見

吳普本草詳「鹵鹼」條

【寒具】
命名 本品冬春可留數月及供寒食禁烟之用故名
古籍別名 捻頭(錢乙)環餅(要術)饊(綱目)

製法 用糯粉和麴搗成細繩盤曲如環形入油煎之而成可經久藏
性質 甘。鹹。溫。無毒
主治 利大小便潤腸溫中益氣

【寒欣】即蚯蚓之古籍別名典見和漢藥考詳「蚯蚓」條

【寒花】即露花之古籍別名典見綱目拾遺詳「露花」條

【寒莓】即蓬蘽之古籍別名典見本草會編詳「蓬蘽」條

【寒食粥】
命名 本品於寒食日用杏仁和諸花煮成之粥故名
主治 咳嗽下血氣調中

【寒皋】即鸚鵡之古籍別名典見萬畢術詳「鸚鵡」條

【寒蚓】即蚯蚓之古籍別名典見吳普本草詳「蚯蚓」條

【寒菜】即雲臺子之古籍別名典見胡居士百病方詳「雲臺子」條

【寒號蟲】即五靈脂之原名詳「五靈脂」條

【寒蕒草】即玉蕒之古籍別名典見綱目詳「香蕒」條

【寒鴉】即慈烏之古籍別名典見綱目詳「慈烏」條

【寒粟】即粟米之古籍別名典見綱目詳「粟米」條

【寒蠶】即蠶之古籍別名典見吳普本草詳「蠶」條

【富木】即桑寄生之古籍別名典見本草詳「桑寄生」條

【富水】即米酒之古籍別名典見和漢藥考詳「米酒」條

【尋風藤】即清風藤之古籍別名典見綱目詳「清風藤」條

【就葛】即黃環之古籍別名典見唐本草詳「黃環」條

向從少至長次第飲之藥滓還投井中歲飲此水一世無病

主治 辟疫癘一切不正之氣
【帽子花】即鴨跖草之日本別名詳「鴨跖草」條

【豬肉】即豬肉之古籍別名典見綱目詳「豬肉」條

【菰椒】即蔓椒之古籍別名典見別錄詳「蔓椒」條

【蕤顚】即天名精之古籍別名典見別錄詳「天名精」條

【彭侯】
形體 彭侯爲獸類之一種狀如黑狗無尾可烹食味如狗其肉可供藥用
性質 甘。酸。溫。無毒
主治 辟邪氣令志壯

【彭根】即石龍芮之古籍別名典見吳普本草詳「石龍芮」條

【復犀】即魁蛤之古籍別名典見綱目詳「魁蛤」條

【關石】即明礬之古籍別名典見和漢藥考詳「明礬」條

【閼陀羅華】即曼陀羅之古籍別名典見和漢藥考詳「曼陀羅」條
【惠貝】即貝子之古籍別名典見和漢藥考詳「貝子」條

十二畫 寒

寓富尋就屠帽

處彭復閱惠

主治 利水道。

歷代記述攷證 【唐】孫思邈

千金翼論壺蘆曰。消渴。惡瘡。鼻口
中肉爛痛。【唐】孟詵食療本草論

壺蘆曰。消熱。服丹石人宜之。【宋】

大明諸家本草論壺蘆曰。除煩。治

心熱。利小腸。潤心肺。治石淋。

參攷資料 名醫錄云。浙人食

匏瓜多吐瀉。謂之發暴。蓋此物以
暑月壅成故也。惟與香薷同食則

可免。【李時珍】

【壺蘆子】 主治 齒斷。或腫。或

同牛膝四兩。每服五錢。煎水含漱。

日三四次。

【壺蘆葉】 性質 甘平。無毒。

主治 耐飢作菜茹。

【壺蘆蔓鬚及花】 主治 解

【寒不凋】 卽密蒙花之古籍別名。

典見和漢藥考。詳「密蒙花」條。

【寒水石】 卽石膏之古籍別名。典

見綱目。詳「石膏」條。

【寒水石】 原名 凝水石。

命名 本品折片投
水。水能凝動。故名寒水石。亦本其義

也。寒

古籍別名 白水石。【本經】凌

水石。【別錄】鹽精石。泥精。鹽枕。鹽

根。【綱目】白水石。冷油石。冷石

【和漢藥考】

外國名詞 Calcareous Spar.

基本 屬方解石。或載石類中

之一種。鑛石。

產地 凡鹵地積鹽之下。恒有

生焉。

形態 寒水石爲鹽之精液。滲

出土中。年久結成清瑩有稜之石

塊。其狀爲白色。或透明堅硬之固

塊。或爲粗。糙細粒。種類甚多。

製法 需數日。凡使須用生薑

自然汁。煮乾研粉用。每十兩用生

薑一盞。

性質 辛寒。無毒。

成分 由結晶性碳酸鈣而成。

效能 瀉熱降火。利水明目。用

作解熱配合眼藥。又昔時亦用作

牙粉原料。

主治 身熱。腹中積聚。邪氣。皮

中如火燒。煩滿。水飲之久。服不飢。

【本經】又除時氣熱盛。五臟伏熱。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥

性本草論寒水石曰。壓丹石毒風

解傷寒勞復。【明】李時珍本草綱

目論寒水石曰。治小便白。內痔。涼

血降火。止牙疼。堅牙明目。【明】繆

希雍本草經疏論寒水石曰。凝水

石生於鹵地。稟積陰之氣而成。本

經味辛氣寒。別錄加甘。大寒無毒。

經曰。小熱之氣。涼以和之。大熱之

氣。寒以取之。又曰。熱淫於內。治以

鹹寒。大寒微燥之性。故主身熱邪

氣。皮中如火燒。煩滿。及時氣熱盛。

五臟伏熱。胃中熱也。易飢作渴。亦

胃中伏火也。甘寒除陽明之邪熱。

故能止渴不飢。水腫者。溼熱也。小

便多不利。以致水氣上溢於腹。而

成腹痺。辛鹹走散之性。故能除熱

利竅消腫也。療腹中積聚者。亦取

其辛散鹹輭之功耳。【清】黃宮繡

本草求真論寒水石曰。寒水石。又

名凝水石。又名白水石。生於鹵地。

因鹽精滲入土中。年久積聚。清瑩

有稜而成也。味辛而鹹。氣寒無毒。

書載能治時行大熱。口渴水腫。益

以性稟純陰故也。經曰。熱淫於內。

之大熱之氣。寒以收之。服此治熱

利水。適相宜耳。然此止可暫治有

餘之邪。及數湯火水傷。若虛人熱

浮。其切忌焉。豈白舍之卽化者。眞

否卽是偽。但眞者絕少。

配合應用 ①治男女轉脰。不

得小便。寒水石二兩。滑石一兩。葵

子一合。爲末。水一斗。煮五升。時服

一升。卽利。【永類鈴方】

②治牙齦出血有瘀。寒水石粉

三兩。朱砂二錢。甘草腦子一字。爲

末。乾搗。【普濟方】

③治湯火傷灼。寒水石燒研傳

之。【衛生易簡方】

④治小兒丹毒。皮膚熱赤。寒水

石半兩。白土一分。爲末。米醋調塗

之。【經驗方】

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡脾胃虛寒及無

實熱者禁用。畏地榆。制丹砂。伏元

精。

參攷資料 ①凝水石稟積陰

之氣而成。其氣大寒。其味辛鹹。入

腎走血。除熱之功。同於諸鹽。古方

所用寒水石。是此石。唐宋諸方寒

【割田蕪】即蓬蘽之古籍別名。典見綱目。詳「蓬蘽」條。

【割孤露澤】即胡黃連之古籍別名。典見和漢藥考。詳「胡黃連」條。

【勝光子】即雞脚草之子。典見綱目拾遺。詳「雞脚草」條。

【勝志】即龍窩石之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「龍窩石」條。

【勝春】即月季花之古籍別名。典見綱目。詳「月季花」條。

【勝馬】即車前草之古籍別名。典見和漢藥考。詳「車前草」條。

【勝寫】即車前草之古籍別名。典見和漢藥考。詳「車前草」條。

【勞水】即流水之古籍別名。典見綱目。詳「流水」條。

【勞水】即流水之古籍別名。典見綱目。詳「流水」條。

【勞水】即流水之古籍別名。典見綱目。詳「流水」條。

【勞豆】即野毛豆之古籍別名。詳「野毛豆」條。

【勞鐵】基本 本品爲鋼鐵之一種。可供藥用。

【勞鐵】基本 本品爲鋼鐵之一種。可供藥用。

【勞鐵】基本 本品爲鋼鐵之一種。可供藥用。

【博邪】即屋遊之古籍別名。典見綱目。詳「屋遊」條。

【博帶】即雌蠶之古籍別名。典見

綱目。詳「蠶」條。

【博勞】即伯勞之古籍別名。典見陸機詩疏。詳「伯勞」條。

【博落迴】古籍別名。落迴。勒回。號筒草。拾遺。

外國名詞 Macleaya cordata, R. Br. (拉丁) チャンバギク

基本 保嬰粟科博落迴屬。產地 生山谷原野間。

形態 博落迴爲毒草類之多年生草本。形如荳麻。莖中空。吹之作聲。折斷莖中有毒汁。帶黃褐色。高五六尺。葉大而卵圓。基脚作心臟形。邊緣多缺刻。葉背有白粉。葉柄長。互生。秋月莖頭分枝着花。圓錐花序。花小。白色。萼二片。無花瓣。花後結小莢。採得可供藥用。



博落迴

性質 大毒。主治 殺精魅。治溪毒。蟲毒。消

癰瘤瘡瘻。痘肉。療白癰風。及諸惡瘡。

參攷資料 博落迴祇可外用。不可內服。內服致人立死。故勿輕以入口。(綱目)

【厥蘼】即菱之古籍別名。典見爾雅。詳「菱」條。

【善朮】即獅子朮之古籍別名。典見清吳錄。詳「於朮」條。

【喀提求】即孩兒茶之西藥名。詳「孩兒茶」條。

【喜鵲】即鵲之古籍別名。典見食療本草。詳「鵲」條。

【喝起草子】即蒼耳子之古籍別名。典見綱目。詳「蒼耳子」條。

【單母】即馬刀之古籍別名。典見綱目。詳「馬刀」條。

【單桃仁】即桃仁之處方用名。詳「桃仁」條。

【莢韭】即菖蒲之古籍別名。典見吳普本草。詳「菖蒲」條。

【報春花】即辛夷之古籍別名。典見和漢藥考。詳「辛夷」條。

【報喜蘭】即催生蘭之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「催生蘭」條。

【壺柑】即橘之古籍別名。典見唐

本草。詳「橘」條。

【壺峰】即大黃蜂之古籍別名。典見綱目。詳「大黃蜂」條。

【壺蘆】命名 壺器也。蘆。飲器也。本品各象其形。又可爲酒飯之器。故名。

處方用名 陳蒲葢。葫蘆殼。古籍別名 瓠瓜。說文。匏。瓜。葫蘆。蒲蘆。(綱目)懸瓠。(莊子)

形態 壺蘆爲菜類之一年蔓生草本。圍圍多植之。莖細長。以卷鬚絡於他物。葉圓心臟形。有軟毛。夏初開白花。夕開朝萎。至秋實熟。如大小二種。重疊狀。可供藥用。其莢與花葉實中子。詳見各該條。



(一) 蘆壺



(二) 蘆壺

性質 甘。平。滑。無毒。

用麻黃者。皆不達可晒也。凡用散者。惟斯爲最。然柴胡。麻黃。俱爲散邪要藥。但陽邪宜柴胡。陰邪宜麻黃。不可不察也。(張景岳)

【麻黃根】 性質 甘平。無毒。至治 止汗。夏月雜粉撲之。

配合應用 治盜汗陰汗。麻黃根。牡蠣粉。爲末撲之。

治盜汗不止。麻黃根。椒目等分。爲末。每末一錢。無灰酒下。外以麻黃根。故蒲扇。爲末撲之。(奇效良方)

治小兒盜汗。麻黃根三分。故蒲扇灰一分。爲末。以乳服三分。日服三次。仍以乾薑三分。同爲末。三分撲之。(古今錄驗方)

治諸虛自汗。夜臥即甚。久則枯瘦。黃芪。麻黃根各一兩。牡蠣米泔浸洗。煨過。爲散。每服五錢。水二盞。小麥百粒煎服。(和濟局方)

治虛汗無度。麻黃根。黃芪等分。爲末。飛麴糊作丸。梧子大。每用浮麥湯下百丸。以止爲度。(談楚翁試驗方)

治產後虛汗。黃芪。當歸各一

兩。麻黃根二兩。每服一兩。煎湯下。

治陰囊濕癢。腎有勞熱。麻黃根。石硫黃各一兩。再用米粉一合。爲末。傳之。(千金方)

治內外障翳。麻黃根一兩。當歸身一錢。同炒黑色。入麝香少許。爲末。噓鼻。頻用。此南京相國寺東黑孩兒方也。(普濟方)

參攷資料 麻黃根節止汗。以故竹扇杵末同撲之。又牡蠣粉。粟粉。并麻黃根等分。爲末。生絹袋盛貯。盜汗出。即撲。手摩之。(甄權)

麻黃發汗之氣。駛不能禦。而根節止汗。效如影響。物理之妙。不可測度。如此。自汗有風溼。傷風。風溫。氣虛。血虛。脾虛。陰虛。胃熱。痰飲。中暑。亡陽。柔痙諸證。皆可隨證加而用之。當歸六黃湯加麻黃根。治盜汗尤捷。蓋其性能行周身肌表。故能引諸藥外至。衛分而固膜理也。本草但知撲之之法。而不知服餌之功尤良也。(李時珍)

麻黃發汗。而其根專於止汗。昔人每謂爲物理之奇異。不知麻黃輕揚。故走表而發汗。其根則深入土中。自不能同其升發之性。況苗則輕揚。根

則重墜。一升一降。理有固然。然正惟其同是一本。則輕揚走表之性。猶存。所以能從表分而收其散越。斂其輕浮。以遂歸於裏。是固根莖收束之本性。則不特不能發汗。而并能使外發之汗。斂而不出。此則麻黃根所以有止汗之功力。投之輒效者也。凡止汗如糯稻根。馬桃乾。小麥。棗仁之類。皆取其堅凝定靜之意。以收散失之氣。其旨皆同。夫豈麻黃與根。同出一本。而其性顯乃背道相馳耶。防風發汗。其根止汗。亦是此義。(張山雷)

【麻葉香】係沈香之另一種者。性質功能。仍與沈香同。參詳「沈香」條。

【麻葉接骨】即紫接骨之古籍別名。典見綱目。詳「紫接骨」條。

【麻楷】即胡麻莖之原名。詳「胡麻莖」條。

【麻廣】即胡麻廣之古籍別名。典見綱目。詳「胡麻廣」條。

【麻廣豆粉】即胡麻子粉之古籍別名。典見綱目。詳「胡麻廣」條。

【麻刺香】即乳香之古籍別名。典見和漢藥考。詳「乳香」條。

見和漢藥考。詳「乳香」條。

【麻實】即大麻花之原名。綱目謂爲麻子者非也。詳「大麻花」條。

【麻藻萍】即蜈蚣藻之古籍別名。典見綱目。拾遺詳「蜈蚣藻」條。

【麻蟲】即黃麻梗蟲之古籍別名。典見綱目。詳「黃麻梗蟲」條。

【麻藍】即大麻子之古籍別名。典見綱目。詳「大麻仁」條。

【麻羅】即百合之古籍別名。典見和漢藥考。詳「百合」條。

【麻羅春】即百合之古籍別名。典見和漢藥考。詳「百合」條。

【麻羅】即百合之古籍別名。典見和漢藥考。詳「百合」條。

十二畫

【傅延年】即菊花之古籍別名。典見別錄。詳「菊花」條。

【傅致膠】即阿膠之原名。詳「阿膠」條。

【傘子鹽】即井鹽之古籍別名。典見綱目。詳「食鹽」條。

【備身弩】即羌花之古籍別名。典見和漢藥考。詳「羌花」條。

取汗。熱時要動擾。勿令着底。恐焦。
(宣明方)

用量 五分至錢半。

施用宜忌 凡氣虛自汗。肺熱喘嗽等症。禁用。惡辛夷。石葦。忌鐵厚朴。白藜爲之使。

著名方劑 麻黃湯。治太陽中寒。頭身俱痛。發熱無汗。惡風而喘。(傷寒論)麻黃三兩。(去節)桂枝二兩。(去皮)炙甘草一兩。杏仁七十個。(去皮尖)上四味。以水九升。先煮麻黃減二升。去上沫。納諸藥。煮取二升半。去滓溫服。合覆取微汗。不須啜粥。餘如桂枝法。將息。

參攷資料 ①張仲景治傷寒

有麻黃湯。及葛根湯。大小青龍湯。皆用麻黃。治肺癰上氣。有射干麻黃。厚朴麻黃湯。皆大方也。(蘇頌)②麻黃乃肺經專藥。故治肺病多用之。張仲景治傷寒。無汗用麻黃。有汗用桂枝。歷代明醫解釋。皆隨文傳會。未有究其精微者。時珍常釋思之。似有一得。與昔人所解不同。云津液爲汗。汗即血也。在營則爲血。在衛則爲汗。夫傷寒傷營。血內滯。不能外通於衛。衛氣閉固。津

液不行。故無汗發熱而憎寒。風傷衛。衛氣外泄。不能內護於營。營氣虛弱。津液不固。故有汗發熱而惡風。然風寒之邪。皆由皮毛而入。皮毛者。肺之合也。肺主衛氣。包羅一身天象。也是證時雖屬乎太陽。而肺實受邪氣。其證兼面赤。喘咳。嗽有痰喘。而胸滿諸證者。非肺病乎。蓋皮毛外閉。則邪熱內攻。而肺氣膈鬱。故用麻黃甘草同桂枝。引出營分之邪。達之肌表。佐以杏仁。泄肺而利氣。汗後無大熱而喘者。加以石膏。朱肱活人書。夏至後加石膏知母。皆是泄肺火之藥。是麻黃湯雖太陽發汗重劑。實爲發散肺經火鬱之藥也。腠理不密。則津液外泄。而肺氣自虛。虛則補其母。故用桂枝同甘草。外散風邪。以救表。內伐肝木。以防脾。佐以芍藥。泄水而固脾。泄東所以補西也。使以薑棗行脾之津液。而和營衛也。下後微喘者。加厚朴杏仁。以利肺氣也。汗後脈沉遲者。加人參以益肺氣也。朱肱加黃芩爲陽旦湯。以瀉肺熱也。皆是脾肺之藥。是則桂枝雖太陽解肌輕劑。實爲理脾救肺

之藥也。此千古未發之祕旨。愚因表而出之。又少陰病發熱脈沉。有麻黃附子細辛湯。麻黃附子甘草湯。少陰與太陽爲表裏。乃趙嗣其所謂熟附配麻黃。補中有發也。一錦衣夏月飲酒達旦。病水泄數日不止。水穀直出。服分利消導升提諸藥。則反劇。時珍診之。脈浮而緩。大腸下弩。復發痔血。此因肉食生冷。水過難抑。遏陽氣在下。木盛土衰。素間所謂久風成癘。泄也。法當升之。揚之。遂以小續命湯投之。一服而愈。昔仲景治傷寒六七日。大下後。脈沉遲。手足厥逆。咽喉不利。睡膿血。泄利不止者。用麻黃湯。平其肝肺。兼升發之。卽斯理也。如能神而明之。則此類是者也。(李時珍)

色青而多沫。蜀中亦有不好。(陶弘景)⑤鄭州鹿臺及閩中沙苑。河旁沙洲上最多。同州沙苑亦多。其青徐者。亦不復用。(蘇恭)⑥按段成式西陽雜俎云。麻黃莖頭開。花小而黃。護生子如覆盆子。可食。(掌禹錫)⑦今近汴京多有之。以榮陽中牟者爲勝。春生苗。至夏五月則長及一尺以來。梢上有黃花。結實如百合瓣。而小。又似皂莢子。味甜。微有麻黃氣。外皮紅。裏仁子黑。根赤。俗說有雌雄二種。雌者於三月四月之內開花。六月內結子。雄者無花。不結子。至立秋以後。收採莖陰乾。(蘇頌)⑧麻黃出鄭州者佳。剪去節半兩。以蜜一匙。同炒良久。以水半升。煎俟沸。去上沫。再煎去三分之一。不用滓。病瘡炮制。醫黑者。乘熱盡服之。避風。伺其瘡復出一法。用無灰酒煎。但小兒不能飲酒者。雖服然其效更速。以此知此藥入表也。(寇宗奭)⑨本經治中風。是主緩風。癱瘓而言。云溫瘧。保瘧。癰。乃傳寫之誤。(張石頑)⑩今人多有畏之爲毒藥。而不敢用。又有謂夏月不宜

之藥也。此千古未發之祕旨。愚因表而出之。又少陰病發熱脈沉。有麻黃附子細辛湯。麻黃附子甘草湯。少陰與太陽爲表裏。乃趙嗣其所謂熟附配麻黃。補中有發也。一錦衣夏月飲酒達旦。病水泄數日不止。水穀直出。服分利消導升提諸藥。則反劇。時珍診之。脈浮而緩。大腸下弩。復發痔血。此因肉食生冷。水過難抑。遏陽氣在下。木盛土衰。素間所謂久風成癘。泄也。法當升之。揚之。遂以小續命湯投之。一服而愈。昔仲景治傷寒六七日。大下後。脈沉遲。手足厥逆。咽喉不利。睡膿血。泄利不止者。用麻黃湯。平其肝肺。兼升發之。卽斯理也。如能神而明之。則此類是者也。(李時珍)

①麻黃微苦而辛。性熱而輕。楊僧繼洪云。中牟有麻黃之地。冬不積雪。爲泄內陽也。故過用則洩真氣。觀此則性熱可知矣。服麻黃自汗不止者。以冷水浸頭髮。仍用撲法。卽止。凡服麻黃藥。須避風。一日。不爾。病恐復作也。凡用須佐以黃芩。則無赤眼之患。(李時珍)②今青州。彭城。榮陽。中牟者爲勝。

③麻黃微苦而辛。性熱而輕。楊僧繼洪云。中牟有麻黃之地。冬不積雪。爲泄內陽也。故過用則洩真氣。觀此則性熱可知矣。服麻黃自汗不止者。以冷水浸頭髮。仍用撲法。卽止。凡服麻黃藥。須避風。一日。不爾。病恐復作也。凡用須佐以黃芩。則無赤眼之患。(李時珍)④今青州。彭城。榮陽。中牟者爲勝。

大熱而喘者。則加石膏。朱肱活人書有云。夏至後加以石膏。知母。是皆泄肺火之藥。則麻黃湯雖曰太陽發汗重劑。而實爲發散肺金火鬱之藥。其說極是。於此可見麻黃湯之發汗。更重在桂枝。而麻黃之治。則其主在肺。而不在表。尤彰彰明矣。又曰。麻黃性質最輕。氣味又淡。本草雖曰苦溫。亦因其功用而懸擬之。不過言其溫和升發之義耳。乃流俗畏之。幾以爲大溫大熱之藥。則李瀕湖綱目性熱一言誤之也。甚且謂其出產之地。冬不積雪。而繆氏經疏。更爲過甚之詞。竟有氣味大辛大熱之說。又謂自春深以至初秋。法所同禁。今試取麻黃而細嚼之。辛味何在。考古今各家本草別錄。謂微溫。則輕浮體質。必稟春升溫和之氣。最爲有據。惟張潔古稱其性溫味苦甘辛。然亦謂其氣味俱薄。不知繆氏何忽一變而爲大辛。且加以大熱二字。似此危詞聳聽。最是駭人。實屬荒謬已極。而俗人聞聲却步。大率爲此謬說所累。不知麻黃發汗。必熱服溫覆。乃始得汗。不加溫覆。並不作

汗。此則治驗以來。鑿鑿可據者。且亦惟寒邪在表。乃宜少少取汗。以解表邪之寒熱。若用以泄肺開喘。亦且無取乎得汗。而奏效甚捷。何況輕揚之性。一過無餘。亦必不能大汗頻仍。留戀藥力。釀爲巨患。景岳已謂今人畏爲毒藥。而不敢用。又有謂夏月不宜用麻黃者。皆可晒也。瀕湖又謂凡服麻黃藥。須避風。一日。不則病恐復作。亦是臆說。不足徵也。

配合應用 治天行熱病。初起一二日者。麻黃一大兩。去節。以水四升。煮去沫。取二升。去滓。着米一點。及破。爲稀粥。先以湯浴後。乃食粥。厚覆取汗。即愈。(必用方)

治傷寒。發熱。麻黃十斤。(去節) 杏仁四升。(去皮熬) 大黃一斤十二兩。先以雪水五石四斗。漬麻黃於東向竈釜中。三宿。後納大黃。攪勻。桑薪煮至二石。去滓。納杏仁同煮。至六七斗。絞去其滓。置銅器中。更以雪水三斗合煎。令得二斗四升。藥成。丸如彈子。大有病者。以沸白湯五合。研一丸服之。立汗。出不愈。再服一丸。封藥。勿令洩氣。

(千金方)

治傷寒。黃疸。表熱者。麻黃醇酒湯主之。麻黃一把。去節。綿裹。美酒五升。煮取半升。頓服。取小汗。春日用水煮。(千金方)

治寒水黃腫。張仲景云。一身面目黃腫。其脈沉。小便不利。甘草麻黃湯主之。麻黃四兩。水五斗。煮去沫。入甘草二兩。煮取三升。每服一升。重覆汗出。不汗。再服。慎風寒。有患氣。急久不瘥。變成水病。從腰以上腫者。是宜以此發汗。(千金方)

治水腫。脈沉。屬少陰。其脈浮者。爲氣虛。脹者。爲氣非水者。也。麻黃附子湯汗之。麻黃三兩。水七升。煮去沫。入甘草二兩。附子炮一枚。煮取二升。半服。八分。日三服汗。(金匱方)

治風痺。冷痛。麻黃去根。五兩。桂心二兩。爲末。酒二升。慢火熬。如傷。每服一匙。熱酒調下。至汗出。爲度。避風。(聖惠方)

治小兒慢脾風。因吐瀉後而成。麻黃長五寸十箇。去節。白朮指面大二塊。全蠍二箇。生薄荷葉包。煨爲末。二歲以下一錢。三歲以上半錢。薄荷湯下。(聖惠方)

治戶咽痛。瘰。語聲不出。麻黃以青布裹之。燒烟筒中熏之。(聖惠方)

治產後腹痛。血下不盡。麻黃去節。爲末。酒服。方寸匕。一日二三服。血下盡。即止。(子母祕錄方)

治心下悸病。半夏麻黃丸用。半夏麻黃等分。末之。煉蜜丸。小豆大。每飲服三九。日三服。(金匱方)

治瘰癧。倒靨。寇宗奭曰。鄭州麻黃去節。半兩。以蜜一匙。同炒良久。以水半升。煎數沸。去沫。再煎。去三分之一。去滓。藥熱服之。避風。其瘰癧復出也。一法用無灰酒煎。其效更速。仙源縣筆工李用之。子病斑瘡。風寒倒靨。已困。用此。一服。便出如神。

治中風諸病。麻黃一種。去根。以東流水三石三斗。以淨鎔盛五七斗。先煮五沸。掠去沫。逐漸添水。盡至三五斗。澆去麻黃。澄定。澆去滓。取清再熬。至一斗。再澄。再濾。取汁。再熬。至升半。爲度。密封。收之一二年。不妨。每服一二匙。熱湯化下。

ctria對血行之作用雖不如Adrenalin之強烈。然其血壓上昇作用富於持久性。故其效力能少持久。亦不難推想之理也。喘息之原因雖有種種。然不論其原因如何。主症候終不外乎氣管支節之痙攣。故能作用於其末梢使之弛緩之物質。即使其作用屬一時的。對治療上亦應有若干之效果。喘息症如因肺循環鬱血。氣管枝黏膜充血等之血行障礙時。則不但使氣管支節弛緩。即因其血壓作用亦能除去其血行障礙。此是吾國數千年經驗之麻黃為喘息症要藥之實驗的根據。亦屬實驗藥物學上有興味之事實也。●張澤霖曰。考麻黃一物。本草均謂主治傷寒喘咳等症。功能發汗。並未有利尿之說。然則古人豈不如此。而讓西人來發明哉。蓋亦有意焉。夫汗者液也。小便亦液也。麻黃能發汗。其作用為排泄液體於外。使炭氣不致逗留體溫適其常度。故我國醫以之為肺病要藥。實其利尿之作用。亦如此也。設若單純小便癱閉。則麻黃非但不能治。且可以增

病。何則。小便不利。其原因多端。大都由於溼熱下注膀胱所致。若不知而治以辛溫之麻黃。其不償事者幾希。必也審詳其誘因。參合其脈症。知其小便不利。確由汗孔閉塞。肺之治節不行。斯時與麻黃治之則效如桴鼓矣。西人謂有刺戟腎臟血管之功用。增加尿量之排泄。實則知其然而不知所以然之說也。●張山雷曰。麻黃質輕而空疏。氣味俱薄。雖曰性溫。然淡泊殊甚。故輕浮上升。專走氣分。凡風寒溫熱之邪。自外感而來。初在氣分者。無不治之。雖古今皆以為發表之藥。仲景列之於太陽篇中。然表即皮毛之部。而皮毛即合於肺。總之外來之邪。皆自外入。傷於皮毛。則曰表病。觸於口鼻。則曰氣病。而皮毛合於肺。口鼻通於肺。肺又專主氣之出納。故外感之第一步。皆氣分先受其病。無論風寒溫熱之邪。肺家首當其衝。表病即氣病。氣病即肺病。寒邪則鼻塞身重。凜寒發熱。溫邪則鼻燥氣濁。肌膚灼熱。且必多兼咳嗽。寒邪則咳聲不揚。溫邪則咳嗽不滑。又皆感邪犯肺

傷氣之明證。是以治外感之病。第一要者。即在輕泄肺邪。疏達氣分。無不立解。惟麻黃輕清上浮。專疏肺鬱。宣泄氣機。是為治感第一要藥。雖曰解表。實為開肺。雖曰散寒。實為泄邪。風寒固得之而外散。即溫熱亦無不賴之以宣通。觀於本草經主中風傷寒。去邪熱氣。除寒熱之說。及後人并治風熱斑疹。熱痺不仁。溫瘧風痺。其旨可見。而俗人猶以為專主表寒之猛劑者。誤矣。且仲景麻黃湯之專主太陽病寒傷營者。以麻黃與桂枝並行。乃為散寒之用。若不與桂枝同行。即不專主散寒發汗矣。抑麻黃之泄肺。亦不獨疏散外來之邪也。苟為肺氣鬱塞。治節無權。即當藉其輕揚。以開痺者。如仲景甘草麻黃湯之治裏水黃腫。千金麻黃醇酒湯之表熱黃疸。後人以麻黃治水腫氣喘。小便不利諸法。雖曰皆取解表。然以開在內之閉寒。非以逐在外之感邪也。又凡寒邪鬱肺。而鼻塞音啞。熱邪壅肺。而為濁涕鼻淵。水飲漬肺。而為面浮喘促。火氣灼肺。而為氣熱息粗。以及燥火內

燔。新涼外束。乾咳嗆燥等證。無不特以為疏達肺金。保全清肅之要務。較之杏貝苦降。桑皮杷葉等之遏抑閉塞者。功罪大是不侔。而庸俗畏之。幾如蛇蝎。豈真古今人之不相及耶。蓋皆耳食之誤。而未嘗體驗之耳。李瀾湖本草綱目。麻黃發明一條。極言其為肺金喜藥。申明仲景麻黃湯之功用。本不專為散寒發汗。而設謂傷寒無汗之用。麻黃湯雖治太陽。實即治肺。蓋汗為津液所化。汗即血也。其在營則為血。在衛則為汗。寒邪傷營。則營血內滯。而氣不能外通於衛。衛氣閉塞。津液不行。故無汗發熱而憎寒。風邪傷衛。則衛氣外泄。而不能內護其營。營氣虛弱。津液不固。故有汗發熱而惡風。然風寒之邪。皆由皮毛而入。皮毛者。肺之合也。肺主衛氣。包羅一身。是其證雖屬太陽。而肺實受其病。其症必兼面赤。拂鬱咳嗽。有痰喘而胸滿。非皆肺病之明驗乎。蓋皮毛外閉。而邪熱內攻。則肺氣膹鬱。故以麻黃甘草同桂枝引出營分之邪。達之肌表。佐以杏仁泄肺。而利其氣。汗後氣

(101100) 用於慢性腎臟炎時有著明之利尿作用。麻黃有利尿作用否。果著有利尿作用是依如何之藥理而起。至今日尙未有實驗的研究報告。按麻黃有血壓上升作用。在一定之時間內。流通腎臟血管內之血液量亦當增加。故謂有利尿作用。非不可能之事也。然依大津及久保田氏之實驗。麻黃有效成分 Ephedrin 之血壓上升作用。由收縮末梢血管而起。然在大之腎臟血管通流試驗時。Ephedrin 反收縮腎臟血管。果如上述。則其有利尿作用。不得不旁求解說。麻黃中含有之 Ephedrin 及其他以外之物質。有能刺激腎臟血管之作用歟。但以麻黃製成藥劑或其他之藥形服用時。多攝取液體能增各腺之分泌及利尿與其他一般藥劑相同。(四)麻黃之與瞳孔散大作用。麻黃之有效成分 Ephedrin 有散瞳作用。夙爲三浦博士所報告。據博士之研究。謂 Ephedrin 散瞳作用於短時間內即能消散。決不似 Atropin 劑點眼時綿長數

日。且在此時決無侵犯眼調節筋之害。故用於眼底檢查時。定優於 Homatropin。而其散瞳作用。又非動眼神經及瞳孔收縮之麻痺。專基於眼交感神經末梢之刺激。長井博士在人工的合成 Ephedrin 之時。得一種比 Ephedrin 少 1 Methyl 基之新 Alkaloid。因命其硫酸鹽謂 Mydratin

$$\begin{array}{c} \text{C}_6\text{H}_5-\text{CH}-\text{CH}-\text{CH}_3 \\ | \quad | \\ \text{OH} \quad \text{NH}-\text{OH} \end{array}$$

Ephedrin

$$\begin{array}{c} (\text{C}_6\text{H}_5-\text{CH}-\text{CH}-\text{CH}_3) \\ | \quad | \\ \text{OH} \quad \text{NH}_2 \end{array} \quad \text{HSCl}$$

Mydratin

而此物據三浦博士之研究。謂比 Ephedrin 之瞳孔散大作用強大。今以其 1% 液點眼時。二十分後起瞳孔散大作用五十分其作用達至極點。至五時間則漸次恢復。二十—三十時間後則可完全復舊。如斯 Mydratin 之散瞳作用。其恢復容易與 Humatropin 異。不起眼調節筋之麻痺作用。故在點眼後亦不起不快感及羞明等徵候。又水尾博士亦推獎 Mydratin 爲卓越之瞳孔散大藥。然 Mydratin 在現今眼科界中有不歡迎者何故。非其在臨牀上有劣於其他之散瞳藥者乎。(五)麻黃之鎮咳祛痰作用。麻黃主治肺氣佛鬱。咳嗽痰喘。胸滿等。皆爲古醫聖所倡之學說。也。古醫家多記麻黃湯、青龍湯、麻黃甘石湯等。以麻黃做主藥之藥劑。皆有祛痰鎮咳之效。近年日本石野寬吉氏應用左記處方之麻黃劑於喘息症。常得佳良之結果。處方。麻黃(10.0) 100.0。稀鹽酸五滴。單含利別六.0。上一日量四回分服。然麻黃非有根治喘息之效。麻黃之主要成分 Ephedrin 與 Adrenalin 相同。對喘息恐係屬對症的作用。溯 Adrenalin 有治氣管支喘息之特效。初依卡氏及汲氏等之提倡。此後東西多數之學者。臨牀家多確認其作用。雖屬一過性。然有著效。而關於藥理雖有多數之實驗。要之皆由 Adrenalin 作用於

氣管枝筋使之弛緩。故其腔徑亦開大。在氣管支筋痙攣時。微量之 Adrenalin 亦容易奏效。此顯然之理也。又 Adrenalin 能對抗肺循環之鬱血。即左心房內瘀之增加。又氣管支黏膜中血管收縮等。亦屬不可爭之事實也。而麻黃中含有構造及作用。皆與 Adrenalin 相類似之 Ephedrin。故麻黃即 Ephedrin。應如 Adrenalin 對於氣管支喘息有效力。此極顯著之理也。曩依大津及久保田氏之動物實驗。得有極富興味之成績。即先將家兔用寶雷斯方法測定其呼吸量。再注射 Muskarin Pilocarpin Wutepepton 等痙攣毒於家兔。使起氣管支痙攣。後再注射麻黃之主成分 Ephedrin 於家兔時。雖在注射痙攣毒途中亦能除去痙攣。使呼吸漸次恢復。又將牛之氣管支筋摘出。接於 Finger Sche Isog 中。作用 Ephedrin 常見現弛緩作用。然在先用痙攣毒使之起痙攣。後再作用 Ephedrin 於該管。其鎮痙作用愈顯著。又檢 Eph-

認有能排多量之水分於體外。然同書後段謂麻黃氣藥之驗達也。然前人單爲發汗之藥。余謹考之。非有發汗之能矣。張仲景曰。發汗後不可更行桂皮湯汗出而喘無大熱者。麻黃甘石湯主之。可以徵也不認麻黃有發汗作用。麻黃古來吾漢方醫家常用做發汗劑。而近年日本西尾重研究麻黃醇之發汗作用。似有所得。今試介紹於下。在就寢前用麻黃之一定量。後將全身少溫覆之。則初覺全身溫暖。次則發汗所要之時間與服其他之發汗劑無甚大差。其發汗量關係於麻黃醇服用量之多寡。然其發汗量多而且確實等。則勞靠於 *Pilocarpin* 及 *Sabodandia* 葉等。當服麻黃醇感全身溫暖之時。有心悸亢進脈搏增加等症候。至發汗終時則復舊態。其副作用似少有侵害眼之調節機能。此在發汗後二十四時間覺閱細字書籍時。每覺多疲勞感。然此時不認有瞳孔散大作用。由此西尾氏常用麻黃醇於急性鼻炎。急性咽喉炎。急性氣管支炎。傷風質斯。急性

腎臟炎等。認有確實之發汗作用。藉此可證數千年來經驗古醫方之不謬矣。如上述多數之漢醫家。雖認麻黃在臨牀上有發汗作用。然在近代之實驗藥物學上。果有發汗作用與否。未聞有一定之研究成績報告。最近早川氏曾在南滿醫學會雜誌第十一卷第七號上就麻黃及其有效成分 *Ephedrin* 與發汗作用之關係有所報告。同時多依歐哥民方氏將貓足部密閉於硝子筒內。流通乾燥空氣於此筒內。將皮膚放散之水分悉導之於鹽酸鈣內。再稱量之。與適用試驗液前之水分放散量比較測定之。而檢其成績時。注鹽酸 *Ephedrin* 〇・〇五以下於靜脈內時。全不起發汗作用。用〇・〇七瓦以上時。每回雖能證明發汗。然依詳細之實驗觀察時。此亦是大量之 *Ephedrin* 刺激中樞神經之一徵候。麻黃或 *Ephedrin* 似無有令汗腺或汗腺神經使之起發汗作用。從來關於汗腺之分泌。有種種之異說。蘭氏主張汗腺分泌神經只存於交感

神經內。武藤氏諾依滿氏等則主張交感神經與副交感神經之二重分布說。然在實驗藥物學上。汗腺分泌神經對於毒藥之關係。全與一般交感神經之關係相異。對於副腎素 (*Adrenalin*) 不起何等之刺激徵候。而對於副交感神經毒之 *Pilocarpin atropin* 等則起作用。在多數報告例中。因 *Adrenalin* 之注射。勿論動物或是人類皆有發汗之例。特別吾人感有興味的爲武藤氏之實驗。氏謂注射 *Adrenalin* 於羊馬等時。皆起甚劇烈之發汗。而 *Ephedrin* 之化學構造及藥物學上的作用均近似於 *Adrenalin*。故如早川氏之所說。謂麻黃與 *Ephedrin* 雖難認有特發性的發汗作用。然在一定之病的條件之下。特先將麻黃製爲浸劑或煎劑。與多量之液體一同服用時。始得認其發汗現象。亦非難想事也。如此以麻黃爲優勢發汗劑之諸醫家之貴重經驗與麻黃及 *Ephedrin* 雖認有特發的發汗作用。二者之孰是孰非。尙待今後之研究。

本草有麻黃根氣味甘平無害。止汗夏月雜粉撲之。又曰麻黃根節甘平能止汗。效如影響。蓋發汗氣融不能禦。物理之妙。不可測度如此。由是麻黃根應用於盜汗及虛汗等。其作用正與麻黃相反。麻黃自根而生。其作用相反。亦屬有興味之事也。關於麻黃根尙未有詳細之藥物學的研究報告。今試製麻黃根之浸液。注於動物血管內時。能使血壓下降。其作用正與麻黃相反。再依麻黃根浸所行之試驗成績判斷時。麻黃根除對於血壓之作用外。大多數皆與麻黃相等。無此根中含有之血壓下降物質比較的。依簡單之藥物的操作。即可變爲血壓上升性質。故其有效成分。亦屬與 *Ephedrin* 相近似之 *Alkaloid* 類。暫記於此。以待後之研究。(三) 麻黃與利尿作用。麻黃於發汗作用之外。古書多記載其有利尿作用。服用時能增尿之排泄。有治水腫及浮腫之效。西尼氏言尿之分泌。依麻黃確實能增加排泄。有麻黃臭之尿。佐藤勳也博士報告。以麻黃之煎劑

十一 薑 麻

屬木賊科之節節菜 (Equisetum longisternum, Willd.) 也。又古方藥品考曰。麻黃來自外國者祇一種。其莖堅緻。色淡綠。氣味瀟數。咀之舌上覺麻痺者為上品。又有和麻黃者。似麻黃而輕虛。味淡薄。非真品也。松玄達云。麻黃日本亦有之。然功能不同。當價貴時。藥商每每到和麻黃及燈心草。摻和雜賣。甚難辨認。


辨偽 鄧有慶曰。麻黃始出晉地。今榮陽。汴州。彭城諸處皆有之。氣味苦溫無毒。春生苗纖勁直。外黃內赤。中空有節。如竹形宛似毛孔。故為發表出汗聖藥。市肆有以蘆草偽充。氣味既別。力量毫無重症用之不免貽誤。曹炳章曰。按麻黃九十月出新山西大同府代州邊城出者肥大外青黃而內赤。色為道地。太原陵圪縣及五台山出者次之。陝西出者較細。四川滑州出者黃嫩。皆略次。山東河南出者亦次。惟關東出者細硬。蘆多不入藥。若蘆草偽充。更為害人矣。

近人學說 袁淑範曰。麻黃亦名龍沙。又名卑相。卑鹽。狗骨。赤

根。產自歐洲。印度。及我國為特多。野生於蒙古地方。屬麻黃科植物 Ephedra Vulg. Aris. Rich. Far. Helberica Hook. et Thoms 之莖。形甚細小呈鱗狀。有收斂性之味。與一種麻醇性之香氣。麻黃古來在吾皇漢醫界為用作發汗之要藥。張仲景治傷寒有麻黃湯。葛根湯及大小青龍湯皆用麻黃。治肺癆上氣有射干麻黃湯。厚朴麻黃湯皆重方也。麻黃湯。麻黃二錢。桂枝一錢三分。甘草六分。杏仁十個。葛根湯。葛根一錢半。桂枝。甘草。芍藥各七分半。麻黃一錢。小青龍湯。麻黃。芍藥。細辛。乾薑。甘草。桂皮各一錢半。五味子。半夏各二錢。大青龍湯。麻黃五錢。桂皮。甘草。杏仁。石膏三錢。近年來在新醫界中皆用含有麻黃之製劑為鎮咳。祛痰及喘息治療藥。其聲價愈增高。茲者余以關於麻黃從來之實驗藥學的研究為基礎。少述麻黃之醫治效用及其藥理。幸而為臨床醫家用藥上之參考資料。抑或得為關於麻黃治驗知識之交換。並吾國已得有數千年來之經驗。

而有大效之漢藥研究上苟有所裨益。則我國之古文明藉此可以發揚。國粹因之而得保存。此著者之期望也。麻黃藥用之起源。雖遠在四五千年前之神農本草經。然其科學的研究。則為近來之發見。即距今三十餘年前日本長井義博士。先梅氏及史氏等。自麻黃中分離一種植物鹽。基鹽命名為 Ephedrin。此即今日所謂麻黃之有效成分也。其化學的性狀。亦依長井博士及泰西諸大家等研究證明矣。即其藥物學的作用。亦由高橋三浦兩博士。廣瀨。天津。久保田。杜氏等研究闡明無遺矣。(一)麻黃之有效成分。麻黃中約含有 0.31—0.5% 之 Ephedrin。其製法。先將麻黃用鹽酸性水浸出之。後濃縮其浸出液。再加以石灰使之乾燥成粉末。用酒精浸出時 Ephedrin 即移行於此。浸出液中矣。再依普通之植物鹽分離法處置之。其鹽基鹽現為無水透映針狀之結晶形。依長井博士之研究。謂 Ephedrin 之藥學的構造。類似副腎素 (Adrenalin)。

一二 九 六



其藥物學的作用二者亦甚相似。據久保田。天津等之研究。謂其注 Ephedrin 於靜脈內時。因末梢血管之收縮。起血壓之上升。其作用雖不及 Adrenalin 之強。然富於持久性。又作用 Ephedrin 於氣管支筋。腸管等時。由交感神經末梢之刺激及肌肉之麻痺起弛緩散大。又以此點。眼時。刺戟眼交感神經。使瞳孔放大。此外對於骨骼筋及心臟等。亦有相當之使用。而其對於金線蛙及家兔之致死量。為對體重一坵 0.4—0.5 瓦。(二)麻黃與發汗作用。麻黃古來即用作發汗之主藥。神農本草經謂麻黃苦無毒。主治傷風。傷寒。頭痛。溫病。發表發汗。去熱邪。氣止咳。逆上。氣喘。寒熱。又大明謂麻黃通九竅。調血脈。開毛孔。皮膚。古方藥品考謂麻黃解寒溼。逐除痰。離

從來爲發汗劑。所常用之藥品也。明治十八年之頃。長井博士用析之。發見一種類鹽基。名曰「エドリン」。化學的記號爲「 $C_{10}H_{15}NO$ 」。以濃厚鹽酸處理之。則分解而生「ベンチールメチールケトン」及「メチールアミン」。夫「エドリン」之主作用。在散大瞳孔。此爲高橋三浦兩氏所確定。緒子氏亦參預其實驗者也。其作用因刺激瞳孔散大神經（頸部交感神經）之末端。或瞳孔開大筋。緒子氏與高橋氏共施行之於動物試驗云。投小量之「エドリン」則散大瞳孔之外。不見特殊之作用。然與大量。則發全身之痙攣。此時血壓大高。但「エドリン」與「アトロピン」等相反。其毒性極少。故點眼之際。無中毒之虞。因「エドリン」而瞳孔散大。不能長久。故可以之檢查眼底。通常以二%至四%之鹽酸「エドリン」溶液。爲點眼用。至「エドリン」與汗液分泌之關係。緒子氏嘗與

高橋氏共施行試驗一二次。然未能詳悉。麻黃中。殆更有促發汗之成分歟。（和漢藥論）麻黃越幾斯者。中外醫事新報第三百五十二號有西尾重氏所記述。今摘記其要云。麻黃爲古方葛根湯中之主藥。其發汗之效。全歸麻黃。此世人所共知也。長井氏云。自麻黃中發見一種類鹽基。其成分爲「エドリン」（中略）故余發一思想。自麻黃製出麻黃越幾斯。以供藥用。卽於麻黃二三〇・〇加水。凡三時許。用強火煮沸之。至其水量之半。而濾過之。又於其殘渣加水。煮沸而濾過之。混和此濾液於前液。在文火上使之蒸發。至得適宜之調度而止。則可得有第二稠度之越幾斯凡五〇・〇。此越幾斯。極富於黏稠性。其色爲黑褐色。味苦。有顯著之麻黃香味。其性爲弱酸性。服用時。爲丸藥用之尤便。凡疾病要發汗者。如因感冒而發之急性鼻加答兒。急性咽喉加答兒。急性氣管支加答兒。復麻質斯。急性腎臟炎等。最宜用之。服用此藥之一定量。就發汗。蓋被稍溫。則

始覺全身溫暖。顏面及耳之邊緣。尤覺溫暖。次卽發汗。其發汗所需之時間。與服他種發汗劑時。無大差異。同時唾液之分泌。亦若稍過於平時。但不甚顯著。又尿之分泌。亦大增加。尿有麻黃臭。此尿至少至二十四時許。尙有特別之臭氣。又汗中亦有麻黃之臭氣。發汗之多少。關係於服用麻黃越幾斯之多少。固已。然有極確實之結果者。服之覺全身溫暖。此時心臟之機能亢進。脈搏之數增加。至發汗既終。則復如故。其副作用之可記者。如高橋三浦兩氏所研究。若稍侵害眼之調節作用。發汗後凡二十四時許。閱覽細字書籍。覺眼之疲勞殊甚。然檢眼之瞳孔。不見特別散瞳。此外別無副作用。試執些少麻黃越幾斯。插入貓之眼結膜內。自眼瞼上按摸之。經過數十分時。則顯見瞳孔散大。此當爲麻黃越幾斯中之「エドリン」作用於瞳孔者。而麻黃越幾斯發汗之效。與別種發汗劑。如水楊酸。曹達「ヒロカルピン」「ヤボランジ」葉互相比較。其發汗之多量。確與

「ヒロカルピン」及「ヤボランジ」葉相髣髴。然「ヒロカルピン」及「ヤボランジ」葉之副作用。能令人嘔吐。及唾液之分泌過多。尿道痙攣等。致覺不快。又水楊酸曹達。其發汗不及「ヒロカルピン」之確實。且發汗後致耳鳴。故對於副作用。以麻黃越幾斯爲佳。然其作用於心臟機能。若用大量。則比「ヒロカルピン」危險之度爲幾何。非更研究與實驗。不易判明。用通常量。不致有他危險。而發汗之效甚確實。古方之用麻黃。已數千年。良有以也。故余勸人自麻黃製出麻黃越幾斯。而廣供藥用。並望日本藥局方中。後來宜將此藥加入之。余製出之麻黃越幾斯。通常量一回一〇・〇至二〇・〇。比麻黃原品。爲與五・〇至一〇・〇相當。若與更大量。則發汗過多。非體格強壯偉大者。不可使用也。又和漢藥考曰。日本不產此物。皆自外國輸進。武藏國豐島郡之水邊沙地。產有一種類似麻黃之物。根似細節。具有黑色紋理。莖似木賊。自來代麻黃用之。實則恐係

氣在上而喘者。此湯主之也。外臺祕要特云吐瀉。而不舉其證。茫乎如舟行無津涯矣。(以上二方。麻黃皆用一兩。)⑤葛根湯證曰。無汗惡風。⑥小青龍湯證曰。心下有水氣。咳而微喘。⑦烏頭湯證曰。歷節疼痛。(以上三方。麻黃皆三兩)⑧麻黃附子甘草湯證。⑨麻黃附子細辛湯證。(麻黃附子甘草湯。麻黃附子細辛湯二方。其條所謂少陰病者惡寒甚也。而有無汗之證。故用麻黃也。)(上二方。麻黃皆用二兩。)歷觀此數方。麻黃主治喘咳水氣也。明矣。故其證而惡風惡寒。無汗身疼。骨節痛。一身黃腫者。用麻黃皆治也。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論麻黃曰。治身上毒風。癰痺。皮肉不仁。主壯熱溫疫。山嵐瘴氣。【宋】大明諸家本草論麻黃曰。通九竅。調血脈。開毛孔。皮膚。【金】張元素珍珠囊論麻黃曰。去營中寒邪。洩衛中風熱。【明】李時珍本草綱目論麻黃曰。散赤目腫痛。水腫風腫。產後血滯。【明】繆希雍本草經疏論麻黃曰。麻黃。療傷寒爲

解肌第一。專主中風傷寒。頭痛溫癰。發表出汗。去邪熱氣者。蓋以風寒溼之外邪。客於陽分皮毛之間。則腠理閉拒。榮衛氣血不能運行。故謂之實。此藥輕清成象。故能去其壅實。使邪從表散也。咳逆上氣者。風寒鬱於手太陰也。寒熱者。邪在表也。五臟邪氣緩急者。五緩六急也。風脇痛者。風邪客於脇下也。斯皆衛實之病也。衛中風寒之邪。既散。則上來諸證自除矣。其曰消赤黑斑毒者。若在春夏非所宜也。破癥堅積聚。亦非發表所能。潔古云。營中寒邪。洩衛中風熱。乃確論也。多服令人虛。走散真元之氣。故也。【明】李士材本草圖解論麻黃曰。麻黃辛甘而溫。氣味俱薄。輕清上浮。入手太陰。足太陽二經。去營中寒邪。泄衛中風熱。通利九竅。宣達皮毛。消癰毒。破凝結。止咳逆。散腫脹。按麻黃輕可去實。爲發表第一藥。惟當冬令在表。真有寒邪者。始爲相宜。雖發熱惡寒。苟不頭疼身痛。拘急。脈不浮緊者。不可用也。雖可汗之症。亦當察病之重輕。人之虛實。不得多服。蓋汗乃心之

液。若不可汗而誤汗。雖可汗而過汗。則心血爲之動搖。或亡陽。或血溢。而成壞症。可不兢兢致謹哉。服麻黃而汗不止者。以水浸髮。仍用撲法即止。凡服麻黃。須謹避風寒。不爾復發難療。去根節。煮數沸。掠去上沫。沫令人煩。節根能止汗。故也。【清】黃宮繡本草求真論麻黃曰。麻黃辛溫微苦。中空而浮。入足太陽膀胱。兼入手太陰肺。仲景用此。以治寒入太陽無汗。其意甚深。蓋緣津液爲汗。汗卽血也。在營則爲血。在衛則爲汗。寒傷營。營血內滯。不能外通於衛。衛氣固密。津液不行。故無汗。發熱而惡寒。方用麻黃甘草同桂枝。引出營分之邪。達之肌表。佐以杏仁泄肺而利氣。是麻黃雖太陽發汗重劑。實散肺經火鬱之邪。其在十劑。有曰輕可去實。葛根麻黃之屬是也。但桂枝則解太陽風邪。傷衛。葛根則解陽明肌熱口渴。柴胡則發少陽陽邪。寒熱往來。此則能發太陽陰邪。傷營。不可不細辨也。發汗用葦去節。止汗須用葦節。並蛤粉粟米等分爲末。袋盛撲之。【清】賈九如辨寒指

南論麻黃曰。麻黃枝條繁細。細主性銳。形體中空。空通腠理。性味辛溫。辛能發散。溫可去寒。故發汗解表。莫過於此。屬足太陽膀胱經藥。治傷寒初起。皮毛腠理寒邪壅遏。營衛不得宣行。惡寒拘急。身熱躁盛。及頭腦煩頂。頸項脊中。腰背遍體。無不疼痛。開通腠理。爲發表散邪之主藥。但元氣虛弱。及勞力感寒。或表虛者。斷不可用。倘誤用之。自汗不止。筋惕肉瞤。爲亡陽難救。以救治至若春分前後。後玄府易開。如患足太陽經症。彼時寒變爲溫。病量爲減。用入六神通解散。通解表裏之邪。則營衛和暢。若夏至前後。陽氣浮於外。膚腠開泄。人皆氣虛。如患足太陽經症。寒又變熱。病不可太發汗。使真氣先泄。故少用四五分。入雙解散。微解肌表。大清其裏。此二者。乃劉河間玄機之法。卓越千古。若四時暴感風寒。閉塞肺氣。爲咳嗽聲啞。或鼻塞胸滿。或喘急痰多。用入三拗湯。以發散肺邪。奏功甚捷。若小兒疹子。當解散熱邪。以此同杏仁。麥冬。清肺。大有神效。

胡麻子油」條。

【麻油半夏麴】原名 麻油麴。本品爲半夏麴之一種。

製法 用半夏入麻油。浸三五日。炒乾爲末。和麴草。置七日。待生黃衣。懸掛風乾。入藥用。

採取 以陳久者良。

主治 虛咳內熱。勞嗽之痰。

【麻油麴】即麻油半夏麴之原名。

【麻勃】即大麻花之原名。詳「大麻花」條。

【麻枯餅】即胡麻之古籍別名。典見綱目。詳「胡麻」條。

【麻帆】即胡麻枯餅之古籍別名。典見綱目。詳「胡麻枯餅」條。

【麻紙】命名 本品係用麻製成之紙。故名。

主治 止諸血。燒灰用。餘與楮紙同。

【麻茶澤】即無食子之古籍別名。典見綱目。詳「無食子」條。

【麻果】即豌豆之古籍別名。典見綱目。詳「豌豆」條。

【麻雀】即雀之老而斑者。典見綱目。詳「雀」條。

【麻黃】命名 本品味麻色黃。故名。

處方用名 炙麻黃。

古籍別名 龍沙（本經）卑相卑鹽（別錄）赤根。狗骨。中央節。土中黃節。土（和漢藥考）豆欄草（日本）。

外國名國 Ephedra vulgaris, Rich. var. helvetica, H. et T. (拉丁)。

基本 屬麻黃科。爲麻黃之莖。

產地 陳仁山藥物生產辨云。麻黃產北口八達嶺一帶。山上野生。三伏時採掘。和漢藥考曰。產中國印度。西伯利亞。南非洲等處。



黃 麻

形態 麻黃狀如木賊。莖高二三尺。莖間有節。有細小之鱗。自枝分出。夏日莖梢開黃色之單性花。結實如百合。瓣似皂莢子。味甜。外

皮紅。裏仁黑。其根作紫赤色。長者近尺。似木質。粗約如指。其莖似木賊而細。其色淡綠。內部空虛。亦有稍充實者。味有收斂性。令舌稍麻。

採取 立秋或三伏中採莖陰乾。令青。

製法 陶弘景曰。凡用麻黃。折去節根。水煮十餘沸。以竹片掠去上沫。令人煩。根節能止汗。故也。

性質 苦溫。無毒。

成分 藥理學博士長井長義曾見麻黃中含有一種植物鹽。基名之曰愛泛特林 (Ephedrin, C₁₀H₁₅NO)。

效能 開腠理發汗。利小便。行水。用爲止痢之收斂藥。近時用爲麻痺性之鎮咳祛痰藥。又治急性氣枝管炎。

作用 在胃腸中能收縮胃腸之血管。以阻止其蠕動。入血中能致血壓增高。心跳加速。內臟之血管均被激而收縮。惟以腎臟之血管收縮爲最甚。而外部皮下之微血管。因強心增其鼓出之力。使血液自然轉運於外。故外部皮下之微血管反被激而放大。而汗腺之

分泌遂此增多。氣枝管之抽搖。亦被激而鬆弛。故能平喘治咳。

主治 中風傷寒頭痛。溫瘧。發表出汗。去邪熱。氣逆。止咳。除寒熱。破癥堅積聚（本經）五臟邪氣緩急。風。脇痛。字乳除疾。止好睡。通腠理。解肌洩邪。惡氣。消赤黑斑。毒。不可多服。令人虛（別錄）。

張仲景之發明 麻黃一味。經張仲景之實驗。認爲主治喘咳水氣也。旁治惡風。惡寒。無汗。身疼。骨節痛。一身黃腫。茲考徵如下。

節痛。一身黃腫。茲考徵如下。①麻黃湯證曰。身疼。腰痛。骨節疼痛。惡風。無汗而喘。②甘草麻黃湯證曰。裏水。③麻黃醇酒湯證曰。黃疸。④以上三方。麻黃四兩或三兩。而爲君藥。⑤大青龍湯證曰。惡寒。身疼。痛。不汗出而煩躁。⑥越婢湯證曰。惡風。一身悉腫。⑦越婢加朮湯證曰。一身面目黃腫。⑧越婢加半夏湯證曰。其人喘。目如脫狀。（以上四方。麻黃皆六兩。）⑨麻黃杏仁甘草石膏湯證曰。汗出而喘。⑩牡蠣湯證（牡蠣。即甘草麻黃湯。而加牡蠣。蜀漆方也。牡蠣治動氣。蜀漆主逐水。然則世所謂癰疾。動

十一 麥 麻

參攷資料 大凡石類多主癰疽。

世傳麥飯石膏治發背瘡甚效。乃中岳山人呂子華祕方。裴員外嗜之。以名第河南尹。膏之以重刑。呂寧絕榮望。守死不傳其方。取此石碎如碁子。炭火燒赤。投米醋中浸之。如此十次。研末篩細入乳鉢。內用數人更碾五七日。要細膩如麵。四兩鹿角一具。要生取連腦骨者。其自脫者不堪用。每二三寸截之。炭火燒令烟盡。即止。爲末。研細二兩。白斂生研末二兩。用三年米醋入銀石器內煎。令魚目沸。旋旋入藥在內。竹杖子不住攪熬。一二時久。稀稠得所。傾在盆內待冷。以紙蓋收。勿令塵入。用時以鵝翎拂膏於腫上。四圍赤處盡塗之。中留錢大洩氣。如未有膿。即內消。已作頭。即搗小已潰。即排膿。如潰水。若病久肌肉爛落。見出筋骨者。即塗細布上貼之。乾。即易。逐日瘡口收斂。但中膈不穴者。即無不差。已潰者。用時先以豬蹄湯洗去膿血。故帛搥乾。乃用藥。其瘡切忌手觸動。嫩肉。仍不可以口氣吹風。及腋氣。月經有孕人見之。合藥亦忌此等。

初時一日一洗一換。十日後可二日一換。此藥要研極細。方有效。若不細塗之。即極痛也。此方採真人千金月令已有之。但不及此詳悉耳。又北齊馬嗣明治楊遵彥背瘡。取粗黃石如鵝卵大者。猛火燒赤。納濃醋中。當有屑落。醋中再燒。再滓。俟石至盡。取屑日乾。搗篩極細。未和醋塗之。立愈。劉禹錫傳信方謂之煉石法。用敷瘡腫。無不應驗。

〔蘇頌〕

〔麥麩〕 原名 麩。

〔麥麩〕 原名 本品係麥炒成者。故名。

古籍別名 糲。〔綱目〕

性質 甘苦。微寒。無毒。

主治 和水服。解煩熱。止洩。實大腸。

歷代記述攷證 〔宋〕蘇頌嘉祐圖經本草論麥麩曰。治寒中除熱。渴消石氣。

〔麥雞〕 即雞雞之古籍別名。典見綱目。詳〔雞雞〕條。

〔麥藍子〕 即王不留行之古籍別名。典見和漢藥考。詳〔王不留行〕條。

〔麥櫻〕 即山櫻桃之古籍別名。典見吳普本草。詳〔山櫻桃〕條。

〔麥蘗〕 即麥芽之古籍別名。典見和漢藥考。詳〔麥芽〕條。

〔麥蘗冬〕 即麥門冬之原名。詳〔麥門冬〕條。

〔麥麩〕 即小麥麩之古籍別名。典見綱目。詳〔麥麩〕條。

〔麥蘗〕 係香蘗之一種。多生溪邊沙壤中。味鮮美適口。形狀頗類薔薇。性質功能。亦與香蘗同。參見〔香蘗〕條。

〔麥蘗〕 即吐鐵之古籍別名。典見綱目拾遺。詳〔吐鐵〕條。

〔麥蘗〕 即茶之最嫩者。性質功能。與尋常茶同。參見〔茶〕條。

〔麻〕 即大麻之原名。詳〔大麻仁〕條。

〔麻子仁〕 即大麻仁之處方用名。詳〔大麻仁〕條。

〔麻尼〕 即真珠之古籍別名。典見和漢藥考。詳〔真珠〕條。

〔麻衣接骨〕 產地 多生山背陰地及山麓山溪間。

形態 麻衣接骨爲接骨草類。

一二九二

之一種。形似土牛膝。數年後發苗。葉似苧麻。而背不白。對節生。節下則粗如鶴膝。作紫黯色。甚脆。折之從粗節處視之。紫透中心。可供藥用。

性質 溫。

主治 行血。跌打損傷。

參攷資料 接骨草數種。俱產深山淵隴旁。近地罕得。人家間有種之者。然麻衣接骨。每不易得。玉節骨性涼味甘。而補能和中。調血生髓益津。其功不僅專治折損。麻衣接骨性溫而行血。惟專治折損。故人多不傳其種。〔趙學敏〕

〔麻伯〕 古籍別名 君莒衍草。道止自死。〔別錄〕

產地 出陝西諸地。

形態 麻伯爲芳草類之一種。狀如蘭。其葉厚而黑。內白。莖實皆赤黑色。其根可供藥用。

採取 九月採之。

性質 酸。無毒。

主治 益氣止汗。

〔麻沸湯〕 即熱湯之古籍別名。典見仲景全書。詳〔熱湯〕條。

〔麻油〕 即胡麻子油之簡稱。詳〔胡麻子〕條。

蜜丸梧子大。每服二十九。麥門冬湯下。(並濟方)

●治乳汁不下。麥門冬去心。焙爲末。每用三錢。酒磨犀角約一錢許。溫熱調下。不過二服便下。(熊氏補遺方)

●治下痢口渴。引飲無度。用麥門冬去心三兩。烏梅肉二十個。細剉。以水一升。煮取七合。細細呷之。(必效方)

●治金石藥發。用麥門冬六兩。人參四兩。甘草炙二兩爲末。蜜丸梧子大。每服五十丸。飲下。日再服。(本草圖經方)

●治男女血虛。麥門冬三斤。取汁熬成膏。生地黃三斤。取汁熬成膏等分。一處濾過。入蜜四之一。再熬成瓶收。每日白湯點服。忌鐵器。(醫方摘要方)

●用蠶 錢半至三錢。
●施用宜忌 凡脾胃虛寒而大便清瀉者禁用。惡款冬、苦瓠、苦芙、苦參、青蘘、木耳、伏石、鍾乳、地黃、車前爲之使。

●著名方劑 麥門冬湯。治上焦傷風。開其腠理。上焦之氣。慄慄滑

十一 薑 麥

疾。遇開即出。經氣失道。邪氣內著。故成漏氣之症。漏氣卽漏風。俗名熱籠頭。(三因方) 麥冬、生薑、根竹茹、白朮各五兩。炙草、茯苓各二兩。人參、陳皮、葶藶各三兩。上九味。每服四錢。薑五片。陳米一撮。煎熱服。

●麥冬湯。治火逆上氣。咽喉不利。止逆下氣。此湯主之。(金匱方) 麥冬一升。半夏七升。人參、甘草各二兩。粳米三合。大棗十二枚。上六味。以水一斗二升。煮取六升。溫服一升。日三夜一服。

參攷資料 ●麥門冬治肺熱之功爲多。其味苦但專泄而不專收。寒多人禁服。治心肺虛熱及虛勞。與地黃、阿膠、麻仁同爲潤經益血。復脈通心之劑。與五味子、枸杞子同爲生脈之劑。(金匱要略) ●六月間溼熱方旺。人病骨之無力。身重氣短。頭眩眼黑。甚則癱軟。故孫真人以生脈散補其天元真氣。脈者人之元氣也。人參之甘寒。瀉熱火而益元氣。麥門冬之苦寒。滋燥金而清水源。五味子之酸溫。瀉丙火而補庚金。兼益五臟之氣也。(李杲) ●按趙繼宗儒醫精要云。

麥門冬以地黃爲使。服之令人頭不白。補髓通腎氣。定喘促。令人肌體滑澤。除身上一切惡氣不潔之疾。蓋有君而有使也。若有君無使。是獨行無功矣。此方惟火盛氣壯之人服之相宜。若氣弱胃寒者。必不可餌也。(李時珍) ●麥門冬葉如韭。冬夏長生。生函谷川谷及隄坂。肥土石間久廢處。二月八月十月採根陰乾。(別錄) ●出江寧者小潤。出新安者大白。其苗大者如鹿蔥。小者如韭。葉大小有三四種。功用相似。其子圓碧。(陳藏器) ●所在有之。葉青似莎草。長及尺餘。四季不凋。根黃白色。有鬚在根。如連珠形。四月開淡紅花。如紅薔花。實碧而圓如珠。江南出者葉大。或云吳地者尤勝。(蘇頌) ●潤肺除熱清心。爲心肺虛熱之神品。以甘

先入脾胃。故又爲陽明之正藥。本經謂其主羸弱者。胃病則脾無所稟。而肌肉不生。別錄謂其療身腫目黃。心下支滿。能消穀調中者。蓋脾胃之熱去。則溼除而諸症愈。脾胃安而能食肥健矣。(顧松園) ●【麥門冬】卽麥門冬之古籍別名。

典見和漢藥考。詳「麥門冬」條。
【麥斛】 ●卽石斛之古籍別名。典見和漢藥考。詳「石斛」條。●卽白茅根之古籍別名。典見新中藥。詳「白茅根」條。

【麥黃】 ●卽黃熟麴之古籍別名。典見綱目。詳「黃熟麴」條。

【麥裏藤】 ●產地 麥地間。多有之。
●形態 麥裏藤爲蔓草類之一種。形似神仙對坐草。莖蔓麥上。葉對生而尖微有毛。莖有大小兩種。以莖細節微紫而葉小者可供藥用。

●採取 四月採之。
●主治 跌撲損傷。乾者酒煎服。
●命名 本品狀如握拳。一團麥飯。故名。

【麥飯石】 ●外國名詞 Maifanshi
●產地 生溪中麻石間。
●形態 麥飯石爲石類之一種。其形大小不等。或如拳。或如鵝卵。或如盤。或如餅。有粒點如豆。如米色。黃白。採取可併藥用。

●性質 甘溫。無毒。
●主治 一切癰疽。發背。

咳嗽之藥。本經別錄。鑿鑿可據。自日華有止咳一說。而景岳亦謂其治肺乾咳嗽。推其用意。亦謂乾咳無痰。則爲氣火刑金。麥冬滋潤退熱。夫豈不可特咳嗽一證。雖有虛實寒熱之分。而挾痰挾滯者。十恒八九。乾咳無痰者。十不一二。即使本是无痰。而誤投滋膩。則氣火交結。痰濁遂滋。適以助其黏膩。而邪無從泄。凡屬痰病。必肺氣鬱塞。不能宣通。因而作聲。以求開泄。止宜順其機以導之。用輕揚疏達之品。如桑葉。痰藜。兜鈴。木蝴蝶之類。助其開展。則咳嗽聲暢。達痰吐滑。利其勢。即解誤。與滋膩。則痰邪爲其閉塞。昔賢比之如油入麵。不可復出。最是確論。張石頑亦謂陰虛羸瘦。喘嗽上氣。失音失血。及風寒暴嗽。大非所宜。正是此旨。蓋痰濁得其滋。則無論爲風爲寒。爲外來之邪。爲內蘊之熱。皆膠黏固結。牢不可破。永永閉於肺中。後雖欲開泄之。而不可得。遂致釀成癆結之根。時時震撼。試問肺葉嬌嫩。而能堪此日常之激動乎。勞瘵之由。強半在此。石頑又謂麻疹咳嗽。亦不

可用此。因性寒助陰。適以固斂。陽邪不能發越。尤爲割切。且該病荷服麥冬。必致音暗。是其陰寒斂邪入肺之明證。所以凡有咳嗽。麥冬等味。真是鴆毒。徐靈胎嘗大聲疾呼。而人多不覺。近世名醫如葉天士。費伯雄。皆犯此禁。未始不誤於日華止咳之一說。而陳藏器且以此物爲下痰飲。景岳亦更有消痰一說。則尤爲殺人之利刃。今之俗醫。又誤於葉氏指南。費氏醫醇等書。恒以製造勞瘵爲事。所見治咳一方。踵此弊者。比比而是。甚矣醫學之不昌。雖曰自昔已然。未免於今爲烈。易禁感慨。係之日華。又謂麥冬治五勞七傷。蓋亦本經主傷中之意。養胃滋陰。生津益血。夫孰非調和五臟之正治。然以爲服食之品。調養於未病之先。則可。若曰勞傷已成。而以陰柔之藥治之。又非陽生陰長之旨。且勞損之病。雖曰內熱。然亦是陰虛而陽無所附。補脾之氣。助其健運。尙能擊其中堅。而首尾皆應。徒事滋潤養陰。則陰寒用事。而脾陽必敗。不食泄瀉等證。必不可操券以俟。越人所謂

過中不治之病。又皆陰柔之藥。有以釀成之矣。

配合應用 ①麥冬、人參、五味子爲生脈散。能復脈通心。夏月暑傷氣服之。良。酒後飲之。解酒毒。肺熱者。去人參。加甘枸杞子作飲。治一切虛勞客熱。

②麥冬、五味子、枸杞、地黃、牛膝、鼈甲、酸棗仁、天冬。治五勞七傷。胃強者可加當歸。火盛者可入黃蘗、砂仁、甘草三物。俱減減。

③治陽明瘧大渴引飲。煩躁或嘔吐。麥門冬、石膏、知母、竹葉各數兩。病人虛者。加人參兩許。痰多者。加貝母、橘紅各兩許。

④藥性論云。麥門冬止煩渴。主大水。面目肢節浮腫。下水治肺痿吐膿。宜同天門冬、薏苡仁、黃蘗、芍藥、茯苓、石斛、桑根白皮、五味子、牛膝煮飲。爛佳。止泄精。宜兼覆盆、葵、藜、黃蘗、五味子。同茯苓、車前、黃連、石斛、豬苓、澤瀉。療心腹結氣。身重目黃。

⑤日華子治五勞七傷。安魂定魄。止渴肥人。時疾熱狂。頭痛止嗽。故同石膏、知母、竹葉、粳米。專療時

氣頭痛。大渴煩躁及發狂。甚者須各數兩。濃煎頓飲。乃佳。虛羸人因作勞內傷而發者。可量加人參。名人參白虎湯。有肺熱者。勿入人參。⑥麥冬黃連治消渴。崔元亮海上方。

⑦治心虛肺虛。虛勞客熱。入沙參、五味子、同青蒿、鼈甲、牛膝、地黃、芍藥、天門冬、枸杞子、五味子、胡黃連、山藥、茯苓、山藥、黃連、丸。治骨蒸勞熱。〔衍義方〕

⑧治勞氣欲絕。用麥門冬一兩。甘草炙二兩。糯米半合。棗二枚。竹葉十五片。水二升。煎一升。分三服。〔南陽活人方〕

⑨治吐血衄血。諸方不效者。麥門冬去心一斤。搗取白然汁入蜜二合。分作二服。即止。〔活人心鏡方〕

⑩治衄血不止。麥門冬去心。生地黃各五錢。水煎服立止。〔保命集方〕

⑪治齒縫出血。麥門冬煎湯漱之。〔蘭室寶鑑方〕

⑫治咽喉生瘡。脾肺虛熱上攻也。麥門冬一兩。黃連半兩。爲末。煉

不潤。長生之物。同小荷。錢清養肺。以佐少陽生氣。入固本丸。以滋陰血。使心火下降。腎水上升。成坎離既濟。心腎相交之義。

國外學說

日本學說謂為肺臟各病之解熱藥。和漢藥考曰。宇田川榛齋翁譯荷蘭藥鏡第十五卷沙列布條。載有麥門冬之性質效能。略似沙列布。可以代用云。英美學說謂麥門冬產中國之兩江等處。以其根似糖麥。故名麥門冬。其根可為藥品。其功用能化痰止咳。與天門冬同。

辨偽

鄭肯巖曰。偽名洋麥。冬色極白。味苦不甜。按麥冬古時野生。凌冬青翠。宛如麥粒。故名麥冬。今江浙多蒔植之。根色黃白。氣味甘平。質性滋潤。稟少陰冬水之精。上與陽明胃土相合。為上品服食要藥。奚容僞物混充。而誤人不少乎。曹炳章曰。按麥門冬出杭州笕橋者。色白有神。體輕性糯。細長皮光潔。心細味甜。為最佳。安徽寧國七寶浙江餘姚出者。名花園子。肥短體重。心粗色白帶黃。略次。近時市用。以此種最多。四川出者。

色白短實。質重性輕。亦次。湖南衡州耒陽縣等處亦出名。採陽子中勻。形似川子。亦不道地。大者曰提青。中者曰青提。小者曰蘇大。曰紹大等名目。以枝頭分大小耳。

近人學說

張山雷曰。麥冬產於西北土脈深厚之地。入土深遠。其味甘甘。得坤土之正。而膏脂濃郁。故專補胃陰。滋津液。本是甘藥。補益之上品。凡胃火偏盛。陰液漸枯。及熱病傷陰。病後虛羸。津液未復。或炎暑燥津。短氣倦怠。秋燥逼人。肺胃液耗等證。麥冬寒潤補陰解渴。皆為必用之藥。但稟西北嚴肅之氣。偏於陰寒。則惟熱熾液枯者。最為恰當。而脾胃虛寒。清陽不振者。亦非陰柔之品。所能助其發育。生長。況復膏澤厚膩。荷脾運不旺。反以礙其轉輸。而有餘。由滯阻痰凝。寒飲停滯者。固無論矣。本經別錄主治多就養胃一層立論。必當識得此旨。方能洞達。此中利弊。不然者。拘執傷飽支滿。身重目黃等說。一概亂投。自謂此亦古人精義所在。豈不益增其困。別錄又以麥冬主癰厥者。正是內經治癰。

取陽明之意。胃主肌肉。而陽明之經。又是足而上。陽明經熱。則經脈弛緩而不收。胃液乾枯。則絡脈失潤。而不利。補胃之津。而養陽明之液。是為治癰起廢之舉。但亦有溼流關節。而足廢不用者。則宜先理其溼。又與滋潤一法。遙遙相對。不知辨別。其誤尤大。別錄又謂其定肺氣。而後人遂以麥冬為補肺主藥。蓋以肺家有火。則滋胃之陰。以生肺金。亦是正法。麥冬散一方。固為養胃保肺。無上妙品。然肺為貯痰之器。乾燥者少。溼濁者多。設使痰氣未清。而即投黏膩。其害已不可勝言。而麥冬又滋膩隊中之上將。或更以沙參玉竹二母等柔潤甘寒之物。輔之。則盤踞不行。闢為窟宅。而清肅之肺金。遂為痰飲之淵藪矣。麥冬本為補益胃津之專品。乃今人多以為補肺之藥。雖曰補土生金。無甚悖謬。究之。其所以專主者。固在胃而不在肺。寇宗奭謂治肺熱。亦就肺家有火者言之。柔潤滋液。以療肺熱。葉焦。亦無不可。日華謂主肺癰。固亦以肺火熾盛者言之也。然又繼之曰吐膿。則

係肺癰矣。究之肺癰肺癰。一虛一實。虛者乾痿。實者痰火。麥冬潤而且膩。可以治火燥之痿。不可治痰塞之癰。景岳和之。遂以肺癰肺痿併作一氣。則虛實之不分。豈非大謬。且肺癰為痰濁與氣火交結。咯吐臭穢。或多膿血。宜清宜降。萬無投以滋膩之理。即使如法清理。火息痰清。咳吐大減。肺氣已呈虛弱之象。猶必以清潤為治。誤與膩補。痰咳即盛。餘焰復張。又臨證以來之歷歷可據者。而肺痿為肺熱葉焦之病。若但冒理法。自必以補肺為先務。然氣虛必咳。咳必迫火上升。而胃中水穀之液。即因而亦化為痰濁。故肺雖痿矣。亦必痰咳頻仍。咯吐不已。惟所吐者。多涎沫。而非穢濁之膿痰。是亦止宜清養肺氣。漸理其熾金之火。使但知為虛。而即與黏膩滋補。則虛者未必得其補益。而痰火即得所憑依。反致愈咳愈盛。必至碎金不鳴。而不復可救。此沙參玉竹。麥冬。知母等味。固不獨療肺癰所大忌。即稀痰之肺痿。亦必有不可誤與者。皆俗醫之所不知者也。又麥冬本非治

滿。虛勞客熱。口乾燥渴。止嘔吐。愈
痿。強陰益精。消穀調中。保神定
肺氣。安五臟。令人肥健。美顏色。有
子。〔別錄〕

歷代記述攷證 【南北朝】陶

弘景本草集註論麥冬曰。斷穀爲
要藥。〔唐〕陳藏器本草拾遺論麥

冬曰。去心熱。止煩熱。寒熱。體勞。下
痰。飲。久服。輕身。明目。和車前地黃

丸服。去溼。痺。癰。白。夜視有光。〔唐〕

甄權藥性本草論麥冬曰。治熱毒
大水面目肢節浮腫。下水。主泄精。

【宋】大明諸家本草論麥冬曰。治

五勞七傷。安魂定魄。止嗽。定肺痿
吐膿。時疾。熱狂。頭痛。〔金〕張元素

珍珠囊論麥冬曰。治肺中伏火。補
心氣不足。主血妄行。及經水枯。乳

汁不下。〔明〕繆希雍本草經疏論
麥冬曰。麥門冬。本經甘平。平者。冲

和而淡也。別錄微寒。入足陽明。衆
入手少陰。太陰。實陽明之正藥。主

心腹結氣者。邪熱之氣。結於心腹
間也。以其清和微寒而平緩。故能

散熱結而下行。氣也。傷中傷飽。以
致胃絡脈絕者。脾主肌肉。五臟之
氣皆稟於胃。胃病則脾無所稟。故

羸瘦而短氣也。身重目黃者。脾胃
溼熱也。心下支滿者。脾虛而溼滯
中焦也。虛勞客熱。口乾燥渴者。因
虛勞而熱。客中焦。故口乾而燥渴。

陽明之熱上衝。則兼嘔吐也。痿厥
者。陽明溼熱病也。陽明溼熱盛。則

上熏蒸於肺。而爲痿厥。治痿獨取
陽明。治本之道也。陰精生於五味。

五味先入脾胃。脾胃得所養。則能
散精於各臟。而陰精充滿。故能強

陰益精也。中焦者。脾胃之所治也。
脾胃安。則中焦治。故能消穀而調

中也。保神定肺氣。則兼潤乎心肺
矣。胃氣盛。則五臟之氣皆有所稟

而安。脾胃俱實。則能食而肥健。脾
統血。心主血。五臟之英華。皆見於

面。血充臟安。則華彩外發。而顏色
美矣。脾胃強。則後天之元氣日盛。

下氣。則陽交於陰。交則虛勞愈。而
內熱不生。內熱去。則陰精日盛。故

有子。斷穀固著於仙經。卻乃已疾
之良藥。故久服延年。輕身不老。不

飢也。〔明〕李士材本草圖解論麥
冬曰。麥門冬。甘而微寒。肺經藥也。

清肺中伏火。定心。驚悸。理癆瘵
骨蒸。止血熱妄行。理經枯乳閉。療

肺痿吐膿。潤燥乾煩渴。主用殊多。
要不越清肺之功。夏令溼熱。人病

困倦無力。身重氣短。孫真人立生
脈散。補天元真氣。人參甘溫。瀉熱

火而益元氣。麥冬甘寒。滋燥金而
清水源。五味子之酸溫。瀉丙丁而

補庚金。殊有妙用。然胃寒者不敢
餌也。去心用。若入丸劑。湯酒搗膏。

畏其寒者。酒浸搗。〔清〕黃宮繡本
草求真論麥冬曰。麥冬有類天冬。

然麥冬甘味。甚多。寒性差少。天冬
所主在肺。而麥冬所主。則更在肺

而在心。是以書載功能。消痰止咳。
解熱除煩。去癰除嘔。而又載同人

參。則能復脈生津。非合心肺而皆
治乎。蓋肺朝於百脈。脈屬心。心燥

則肺失養。而脈絕。心清則氣即充
而脈復。麥冬氣稟清肅。能於心中

除煩。譬如人當盛暑。則燥灼不寧。
若值秋風。一至。則炎熱頓解。而無

燥鬱不堪之候矣。至於乳汁不開。
用此則能通活。熱血妄行。用此則

能即止。他如腸上之稠痰。得此則
消。心下之支滿。得此則除。脾有積

梁。清心之指南也。但氣寒而虛人
禁用。肥大者良。去心用。入滋補藥

酒浸。〔清〕楊時泰本草述鉤元論
麥冬曰。虛勞以二冬爲治。肺要藥。

他如黃連清心。黃芩清肺。尤不得
與麥冬之治虛勞等功。凡病惟上

焦陽盛之熱。以芩連直折之。而陰
自復。若本至陰之虛。以致陽元而

復投芩連。則不能和其陽之無依。
而反絕其陰之化原。惟此味以清

和之性。潤膩之質。回陰燥而透脈
枯。使元陽得以依於陰而不僭。乃

爲中的也。雖然。溼潤者。第與燥氣
對。柔膩者。第與元氣對。若有胃熱

而兼溼滯。抑或陽氣居於卑弱。亦
不可施。〔清〕賈九如辨藥指南論

麥冬曰。麥冬色白體濡。主潤肺味
甘性涼。主清肺。蓋肺苦氣上逆。潤

之清之。肺氣得保。若咳嗽連聲。若
客熱虛勞。若煩渴。若促痰。皆屬肺

熱。無不悉愈。同生地令心肺清。則
氣順。結氣自釋。治虛人元氣不運。

胸腹虛氣痞滿。及女人經水枯。乳
不下。皆宜用之。同黃芩扶金制木。

治臟腑浮腫。同山梔清金利水。治
支滿黃疸。又取其四時葉青。浸冬

蒼朮。

①快膈進食。麥芽四兩。神麴二兩。白朮橘皮各一兩。爲末。蒸餅丸。梧子大。每人參湯下三五十丸。

②治產後腹脹不通。轉氣急。坐臥不安。以麥藥一合爲末。和酒服。良久通轉。神驗。(李絳兵部手集方)

③治產後青腫。乃血水漬也。乾漆。大麥蘖等分。爲末。新瓦中鋪漆一層。藥一層。重重令滿。鹽泥固濟。煨赤研末。熱酒調服二錢。產後諸疾並宜。(婦人經驗方)

④治產後回乳。產婦無子食乳。乳不消。令人發熱惡寒。用大麥蘖二兩。炒爲末。每服五錢。白湯下。甚良。(丹溪方)

⑤治穀勞嗜臥。飽食便臥。得穀勞病。令人四肢煩重。嘔噦欲臥。食畢輒甚。用大麥蘖一升。椒一兩。並炒乾。薑三兩。搗末。每服方寸匕。白湯下。日三。(肘後方)

⑥治腹中虛冷。食輒不消。羸瘦弱乏。因生百疾。大麥蘖五升。小麥麵半斤。鼓五合。杏仁二升。皆熬黃。香搗篩。糊丸。彈子大。每服一丸。白

湯下。(肘後方)

⑦治產後祕塞。五七日不通。不宜妄服藥丸。宜用大麥芽。炒黃爲末。每服三錢。沸湯調下。與粥間服。(婦人良方)

⑧治妊娠欲去胎。麥藥一升。蜜一升。服之。卽下。又小品用大麥芽一升。水三升。煮二升。分三服。神效。(外臺祕要方)

用量 三錢至四錢。
施用宜忌 凡脾腎虛而無積者禁用。

參攷資料 麥藥、穀芽、粟藥皆能消導米麵諸果食積。觀造餉者用之。可以類推矣。但有積者能消化。無積而久服。則消人元氣。也不可不知。若久服者。須同白朮諸藥兼用。則無害也矣。(李時珍)

【麥門】卽麥門冬之古籍別名。典見和漢藥考。詳「麥門冬」條。

【麥芽橘餅】卽橘餅之出於閩中漳泉者。典見綱目拾遺。詳「橘餅」條。

【麥門冬】 原名 麥蘖冬。

命名 麥蘖曰蘖。本品根似麥而有鬚。如韭而凌冬

不凋。故名。後人簡寫爲麥門冬。

處方用名 麥冬。寸麥冬。芡冬。大麥冬。辰麥冬。

古醫別名 覆冬。秦名烏韭。齊名愛韭。楚名馬韭。越名羊韭。禹餘糧。(別錄)禹韭忍冬。忍凌。隨脂。僕。是不死草。(吳普)麥文。麥門。門冬。山管。麥門。東。雄骨。木。階前草。(本草綱目)香墩草。不死藥。雄烏老草。沙草。秀根。冬兒沙里。安神隊枝。(和漢藥考)瓜黃。蘇冬。(俗名)

外國名詞 Ophiopogon japonicus

基本 屬百合科。小葉麥門冬(沿階草)及大葉麥門冬之根。

產地 陳仁山藥物生產辨云。麥門冬產四川錦州者。俗名瓜黃。產浙江杭州者。名蘇冬。清明出新。兩相比較。以蘇冬味爲濃厚。

形態 小葉麥門冬爲山野自生之常綠草。人家階前亦多種之。故有沿階草之稱。形如小蘭。葉作細長形。長尺許。初夏於葉間抽出高四五寸之花軸。開淡紫色六片穗狀花。果實作球形。呈鮮紫色。大葉麥門冬。生於陰溼之地。其形酷

似前者。葉長一二尺。花軸至一尺以上。開淡紫色粗大穗狀花。果實作紫黑色。其根爲黃白色。有鬚根。作連珠形。中貯滋養質。柔潤而有橫皺紋。

種植 園圃田野恒有栽之。其法四月初採根於黑壤肥沙地栽植。每年六月九月十一月中施用肥料一次。及灌漑之。或種其子亦可。但生成較爲遲慢耳。

採取 二月八月十月間。採根陰乾。

製法 陶弘景曰。凡使麥門冬。須用肥大者。湯澤抽去心。不爾令人煩。李時珍曰。凡入湯液。以滾水潤淨。少頃。抽去心。或以瓦焙軟。乘熱去心。若入丸散。須瓦焙熱。卽於風中吹冷。如此三四次。卽易燥。且不損藥力。或以湯浸搗背和藥亦可。滋補藥以酒浸搗之。

性質 甘平。無毒。

效能 補肺。養胃。瀉火。生津。用作祛痰藥。及爲和緩滋養藥。

主治 心腹結氣。傷中傷飽。胃絡脈絕。羸瘦短氣。久服輕身。不老不饑。(本經)療身重目黃。心下支

十一 鹿 麥

【鹿藿】即砂之古籍別名。典見圖經本草。詳【砂】條。

【鹿蘆】即木藜蘆之古籍別名。典見綱目。詳【木藜蘆】條。

【鹿髓】製法 煉淨入藥用。性質 甘溫無毒。

主治 丈夫女子傷中絕脈。筋急痛。咳逆。以酒和服之良。

歷代記述攷證 【明】日華諸

家本草論鹿髓曰同蜜炙服。壯陽道。令有子。同地黃汁煎膏服。境骨髓。壯筋骨。治嘔吐。【明】李時珍本草綱目論鹿髓曰補陰強陽。生精益髓。潤燥澤肌。

參攷資料 ●鹿髓可作酒。唐

方多有其法。【蘇頌】●鹿髓近方稀用者。刪繁方。治肺虛毛悴。酥髓湯用之。御藥院方滋補藥用其膏髓和酒熬膏丸藥。甚為有理。白飛霞鹽通云。取鹿腦及豬骨髓。煉成膏。每一兩加煉蜜二兩。鍊勻。瓷器密封。用和滋補丸藥。剉妙。凡腰痛屬腎虛寒者。以和古方摩腰膏。薑汁化一粒。擦腎堂。則暖氣透入丹田。如火。大補元陽。此法甚佳。人鮮知之。【李時珍】

【鹿脂】主治 氣癰。以酒漬炙乾。再浸酒中。含嗽。汁味盡。更易十具乃愈。

【鹿髓根】即漏蘆之古籍別名。典見和漢藥考。詳【漏蘆】條。

【麥文】即麥門冬之古籍別名。典見和漢藥考。詳【麥門冬】條。

【麥冬】即麥門冬之處方用名。詳【麥門冬】條。

【麥句薑】即天名精之古籍別名。典見本經。詳【天名精】條。

【麥曲】即神麴之古籍別名。典見和漢藥考。詳【神麴】條。

【麥李子】即李實之與麥同熟。上有凹痕者。惟核仁性劣。不入藥用。功能參詳【李子】條。

【麥芽】原名 積麥蘖。命名 本品乃麥子製令萌出嫩芽曬乾者故名。

處方用名 生麥芽。炒麥芽。古籍別名 麥蘖（和漢藥考）

楚麥芽（新本草）外國名詞 Malt (英) Maltz (德)

基本 係禾本科植物大麥之實。

產地 陳仁山藥物生產辨云。麥芽各省均有出。

製法 麥芽用大麥浸水。至已柔順。先去水。復乾其水氣。乃堆置五六日。則漸變熟。而生幼根及芽。此謂之麥蘖。曬乾。炒之。搽去其皮。以供藥用。

性質 鹹。溫。無毒。

效能 消食下氣。溫中除滿。為助消化之滋養藥。

主治 消食和中。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論麥芽曰破冷氣。去心腹脹滿。【宋】日華諸家本草論麥芽曰溫中下氣。開胃止霍亂。除煩悶。消痰飲。破癥結。能催生落胎。【金】張元素珍珠養論麥芽曰補脾胃。虛寬腸下氣。腹鳴者用之。【明】李時珍本草綱目論麥芽曰消化一切米麵諸果食積。【明】繆希雍本草經疏論麥芽曰麥蘖以水漬大麥而成。其味鹹。氣溫。無毒。功用與米蘖相同。而此消化之力更緊。鹹能順堅。溫主通行。其發生之氣。又能助胃氣上升。行陽道而資健運。故主開胃補脾。消化水穀。及一切

結積冷氣脹滿。如上所言等證也。好古曰。麥芽神麴二藥。胃氣虛人宜服。【清】賈九如辨藥指南論麥芽曰大麥為五穀之長。甘溫入脾。以此發芽。取其體輕性銳。輕可去實。銳能消散。炒香開胃。以除煩悶。生用力猛。主治麥麵食積。癥瘕氣結。胸膈脹滿。鬱結痰涎。小兒傷乳。又能行上焦滯血。若女人氣血壯盛。或產後無兒。飲乳。乳房脹痛。丹溪用此二兩。炒香搗去皮。為末。分作四服。立消。其性氣之銳。散血行氣。迅速如此。勿輕視之。凡痰火哮喘及孕婦。切不可用。

一二八六

國外學說 英美藥說謂大麥芽即萌芽之大麥。烤乾而成。其功用能作潤腸。養生。配麥芽膏用之。處方以大麥芽百分粗末。水酌用。先用涼水一百分。浸六點鐘。再用熱至八十六度之熱水四百分。漸加熱。不過一百三十一度。浸一點鐘。濾渣。扭汁。入燙鍋。復加熱。不過一百三十一度。散氣成膏。如蜜形。為度。每服一錢至四錢。

配合應用 ●消食積。用麥蘖。同山查。紅麴。橘皮。草果。砂仁。厚朴。

Nutt.

基本 屬鹿蹄草科。一藥草之葉莖。

產地 凡山野平原及寺院荒處恒多生焉。

形態 一藥草為多年生常綠草。自生於山野。葉有長葉柄。自地上叢生。作深綠色之橢圓形。大四寸許。脈絡頗深。經冬不凋。夏月抽長七八寸之花莖。於上部開白色或紫色之六瓣總狀花。多下向。



草 蹄 鹿

用法 搗塗。或揉生葉外貼。效能 用作止血收斂藥。

主治 金瘡出血。搗塗即止。又塗一切蛇蟲大咬毒。

國外學說 和漢藥考曰。其屬鹿蹄草科之冬青 (Glinophila umbellata, Nutt.) 有譯作鹿蹄草者。但與一藥草實非同物。冬青英名為 Winter green. 或

十一畫 鹿

Pimpinella 為常綠草。葉作尖卵

圓形。大二寸許。邊緣有鋸齒。表面作深綠色。裏面稍作青白色。搗碎

新藥。有一種臭氣。中含苦味。越幾斯 (Chinaphila) 單等。此物

在歐美。用作強壯收斂藥。治腺病。使麻質斯等。由此葉採取之揮發

油。謂之冬青油。無色。或帶紅色。有芳香。味甘。觸舌有溫感。比重為一

· 一七至一· 一八。沸點為百度。專用於香料。

參攷資料 按軒轅述寶藏論云。鹿蹄多生江廣平陸。及寺院

荒處。淮北絕少。川陝亦有。苗似蓬萊。而葉頗大。背紫色。春生紫花。結

青實。如天茄子。可用制雌黃丹砂 (李時珍) 抹生葉貼創口。可止

血。或毒蟲螫傷。毒蛇咬傷。痛甚者貼之。即止痛 (和漢藥考)。

【鹿頭肉】 主治 消渴。夜夢鬼物。煎汁服。作膠。爛善

參攷資料 鹿頭可釀酒。須於作藥時稍益葱椒 (寇宗奭)

【鹿頭酒】 製法 用鹿頭煮爛。搗成泥。連汁和麴米釀酒飲。少入葱椒。

主治 虛勞不足。消渴。夜夢鬼物。補益精氣。

【鹿糞】 主治 經日不產。乾溼各三錢。研末。薑湯服立效。

【鹿膽】 性質 苦寒。無毒。主治 消腫散毒。

【鹿茸】 即鹿茸之古籍別名。典見和漢藥考。詳「鹿茸」條。

【鹿藥】 命名 本品根莖。鹿好食之。故名。

產地 出甘肅武陵縣。

形態 鹿藥為山草類之一種。其苗與根皆似黃精。可供藥用。

性質 甘溫。無毒。主治 療風血。去諸冷。益老起陽。酒浸服。

參攷資料 鹿食九種解毒之草。此其一也 (李時珍)。

【鹿藿】 命名 豆葉為藿。鹿喜食之。故名。

古籍別名 草藿 (爾雅) 鹿豆 (郭璞) 豇豆。野綠豆 (綱目) 俄馬黃 (俗名) 痰切豆。金雀豆。狐豆 (日本)。

外國名詞 Rhynchosia vol-

ubilis, Lour. (拉丁) クンキリ

マメ キンチャクマメ (日本) 基本 係豆科鹿藿屬。為鹿藿之苗葉。

產地 生山野及田澤間。

形態 鹿藿為菜類之多年生蔓草。本其莖細長。常卷絡於他物之上。葉有三小葉。葉柄甚長。夏月

葉腋着以數花。短總狀花序。蝶形花冠。淡紫色。實為莢果。長五六分

闊三分。常含二扁圓種子。色黑可磨粉蒸食。



藿 鹿

採取 五月六月採苗。日乾用。性質 苦平。無毒。

主治 蟲毒。女子腰腹痛不樂。腸癰。瘰癧。瘡氣。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論鹿藿曰。止頭痛。

【鹿藿】即葛根之古籍別名。典見別錄。詳「葛根」條。

翁。其葉有毛。赤莖。又有大小二種。楚人謂大者爲大吳風草。小者爲小吳風草。(蘇恭)

【鹿麻】卽五母麻之古籍別名。典見別錄。詳「五母麻」條。

【鹿梨】 古籍別名 鼠梨。(詩疏) 山梨。(毛詩) 陽橙。(爾雅) 羅。樹梨。赤羅。野梨。(綱目) 大梨。(日本)

外國名詞 Pinus calleryana, Done (拉丁) イスナシ ヤ

ナシ(日本)

基本 係薔薇科梨屬。爲鹿梨之果實。其根皮詳見該條。

產地 生山野間

形態 鹿梨爲果類之落葉喬木。乃梨之原種。高二三丈。木有紋如羅。赤者紋愈白者紋緩。枝有針葉。大橢圓形。或卵形。邊緣有微細鋸齒。葉柄及葉背。密生輻毛。春日枝梢葉腋。攢簇白色之花。與梨花相似。結實呈球狀如杏。其實可供藥用。

採取 八月採之。

性質 酸澀。寒。無毒。

主治 煨食治痢。

【鹿梨根皮】 性質 酸澀。寒。無毒。

主治 療瘡疥。煎汁洗之。

【鹿陽生】卽玄參之古籍別名。典見和漢藥考。詳「玄參」條。

【鹿筋】 古籍別名 勞損續經。

李時珍本草綱目論鹿筋曰。塵沙目昧者。嚼爛。接入目中。則黏出。

【鹿腎】 性質 甘平。無毒。

歷代記述攷證 【宋】日華諸家本草論鹿腎曰。補中安五臟。壯陽氣。作酒及煮粥食之。

【鹿腎粥】 主治 補腎虛諸疾。

【鹿腎膠】 基本 係鹿腎所熬之膠。

性質 甘平。無毒。

主治 婦人血淋。帶下。腰膝痠痛。不能受孕。與阿膠攝入服之。餘與鹿腎同。

【鹿跑草】 卽龍鬚草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「龍鬚草」條。

①卽鹿銜草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「鹿銜草」條。

目拾遺詳「鹿銜草」條。

【鹿腦】 主治 刺入肉。不出。傳之自出。並入面脂。令肌膚悅澤。

【鹿腸】 卽敗醬之古籍別名。典見本經。詳「敗醬」條。②卽玄參之古籍別名。典見吳普本草。詳「玄參」條。

【鹿葱】 卽葦草之古籍別名。典見嘉祐補註本草。詳「葦草」條。③卽藜蘆之古籍別名。典見綱目。詳「藜蘆」條。

【鹿精】 古籍別名 峻。(韓悉醫通)

主治 補虛羸勞損。

參攷資料 王師授予鹿峻丸方云。鹿稟純陽而峻者。天地初分之氣。牝牡相感之精也。醫書稱鹿茸角血髓有大補益。而此峻則入神矣。其法用初生牡鹿三五隻。苑圃馴養。每日以人參煎湯。同一切草藥。任其飲食。久之。以硫黃細末和入。從少至多。燥則漸減。周而復始。大約三年之內。一旦毛脫。筋露。氣盛陽極。却以牝鹿隔苑誘之。欲交不得。則精洩於外。或令其一交。卽設法取其精。瓦器收之。香黏如

餵。是爲峻也。用和鹿角霜一味。爲丸。空心鹽酒下。大起胎氣。虛癆危疾。凡服滋補丸藥。用此入煉蜜和。劑絕妙。(韓悉)

【鹿銜】卽薇銜之古籍別名。典見綱目。詳「薇銜」條。

【鹿蒲】卽參果根之古籍別名。典見別錄。詳「參果根」條。

【鹿劍】卽葦草之古籍別名。典見土宿本草。詳「葦草」條。

【鹿蕪】卽蕪產於鹿體者。性質功能。與牛蕪同。參見「牛蕪」條。

【鹿飽草】卽鹿蹄草之古籍別名。典見和漢藥考。詳「鹿蹄草」條。

【鹿齒】 主治 鼠瘻。留血。心腹

痛。不可近丈夫陰。

【鹿蹄肉】 主治 諸風。脚膝骨中疼痛。不能踐地。同

豉汁五味煮食。

【鹿蹄草】 命名 本品葉象鹿蹄。故名。能合金瘡。又

名試劍草。

古籍別名 小秦王草。山慈姑。秦王試劍草。(綱目) 鹿飽草。(和漢藥考)

外國名詞 Phlora elipicea,

子) 茸最難得不破及不出却血者。蓋其力盡在血中故也。此以如紫茹者爲上。名茄子茸。取其難得耳。然此大嫩。血氣未具。其實少力。堅者又大老。惟長四五寸。形如分歧馬鞍。茸端如瑪瑙紅玉。破之肌如朽木者。最善。人亦將麋角僞爲之。不可不察。(急宗爽) 鹿字篆文象其頭角身足之形。爾雅云。鹿牡曰鹿。音加。牝曰鹿。音攸。其子曰麋。音迷。絕有力曰麋。音堅。斑龍名出澹寮方。按乾寧記云。鹿與遊龍相戲。必生異角。則鹿得稱龍。或以此與梵書謂之密利迦羅。(李時珍)

鹿處山林中有之。馬身羊尾。頭側而長。脚高而行速。牡者有角。夏至則解。大如小馬。黃質白斑。俗稱馬鹿。牝者無角。小而無斑。毛雜黃白色。俗稱鹿。鹿孕十月而生。子鹿性淫。一牡常交數牝。謂之聚鹿。性喜食龜。能別良草。食則相呼。行則同族。居則環角外向。以防害。臥則口朝尾闕。以通督脉。殷仲堪云。鹿以白色爲正。述異記云。鹿千歲爲蒼。又五百歲爲白。又五百歲爲玄。玄鹿骨亦黑。爲脯食之。

十一畫 鹿

可長生也。埤雅云。鹿乃仙獸。自能樂性。六十年必懷瑤於角下。斑痕紫色。行則有迹。不復急走。故曰鹿戴玉而角斑。魚懷珠而鱗紫。沈存中筆談云。北狄有駝鹿。極大而色蒼黃。無斑。角大而有文。堅瑩如玉。茸亦可用。名苑云。鹿之大者曰麋。羣鹿隨之。視其尾爲準。其尾能辟塵。拂拭則不蠹。置西帛中。歲久紅色不黯也。(李時珍)

【鹿茸酒】 製法。用鹿茸。山藥。浸酒服。

主治 陽虛痿弱。小便頻數。勞損諸虛。

【鹿骨】 性質 甘。微熱。無毒。

主治 安胎下氣。殺鬼精物。久服耐老。可酒浸服之。

歷代記述攷證 【唐】孫思邈千金翼論鹿骨曰。作酒主內虛。續絕傷。補骨除風。【明】李時珍本草綱目論鹿骨曰。燒灰水服。治小兒洞疳下痢。

【鹿啣草】 產地 九江建昌山中有之。

形態 綠葉紫背。鋪地而生。面有白橫。略似莢葉。而微長。根亦紫。

可供藥用。

性質 溫。無毒。

效能 入肝腎二經。強筋健骨。補腰腎。生精液。

主治 浸酒治吐血。通經。

【鹿脰骨】 製法 取脰骨。溼紙包裹。灰火煨之。以黃

胞可研爲度。若焦黑者。爲過性。勿用。

主治 生肌收口。爲末搽之。

【鹿御草】 命名 本品鹿銜之則病癒。故名。

古籍別名 薇御草。鹿御草。(本經) 承膏草。(別錄) 吳風草。(唐本) 無心草。無顏草。承臙草。(吳普)

基本 爲鹿御草之莖葉。

產地 凡原野川澤均有出。

形態 鹿御草爲溼草類之野

生草。本莖赤色。有風不偃。無風獨

搖。葉大如荳。麋生。面綠背青。有

毛。花黃色。花後結子。根如黃連。盤

屈而生。赤黑色。其子與莖葉俱可供藥用。

性質 苦。平。無毒。

主治 風溼痺。歷節痛。驚癇吐

舌。悸氣。賊風。鼠瘻。癰腫。(本經)

暴瀝。逐水。療瘕。癰。久服輕身。明目。

(別錄)

歷代記述攷證 【唐】陳藏器

本草拾遺論鹿御草曰。婦人服之。

絕產無子。【明】李時珍本草綱目

論鹿御草曰。煎水洗。瘰癧。甲疽。惡

瘡。

參攷資料 鹿銜乃素問所

用。治風病。自汗藥。而後世不知用

之。誠缺略也。素問黃帝曰。有病身

熱。解情汗出。知浴。惡風。少氣。此爲

何病。岐伯曰。病名酒風。治之以澤

瀉。尤各三五分。麋銜五分。合以三

指撮。爲飯後。飯後者。先服藥也。(

李時珍) 南人謂之吳風草。一

名鹿銜草。言鹿有疾。銜此草即瘳

也。(蘇恭) 據蘇說。則薇銜。麋銜

當作鹿銜也。鹿麋一類。按鄧道元

水經注云。魏興錫山。多生麋銜草。

有風不偃。無風獨搖。則吳風亦當

作無風乃通。李時珍) 一名無心草。非草之無心者。方藥少用。(陳藏器) 薇銜生漢中川澤。及宛句。邯鄲。七月採莖葉。陰乾。(別錄) 此草叢生。似荳。莖及白頭

十一畫 鹿

沒里洞等處所產。身皮毛色皆不相上下。所差無幾。總之南洋各地所產之茸。身直無彎。皮色老而有光。紋深盤大。珠點凸起。身光少毛。身小短。重至斤者絕少。即有亦老不堪用矣。十五。高低吧實。宋卡。大年。六坤。萬那。老蒲。那老。勿各。卑。概深水地所產之茸。身長者尺五六至二尺者亦百無二。皮色如烏。聚毛鳥中帶些白黃。盡皆連盤漸落。並無單取茸尾者。身材同坤甸等處所產相彷彿。認真此道者。甚難分別。惟深水地之茸。味淡而氣香。因此多蛙。不能貯久。其血頂如暹茸。所有南洋之茸。血頂皆同。鹿茸之功。全在其血中之燐質。確實。故能補陽。以前製此藥。往往用火烘酥。或隔水蒸脆。而後爲末。不知此質一經見火。即行飛散。功力已去八九。此皆不明化學之故。若以之鋸成寸段。而劈碎之。置於石灰缸中。收燥後。生碾爲末。則原質全在其功力必大不同。但茸不得留過三年。惟此品以關東產者爲最。即家畜者價已不貲。若得野生者。更爲可寶。否則用川雲所產者。名曰鹿茸。照此製法。亦有功力。而價較廉也。

配合應用 ①治腎虛腰痛。及陰痿不起。鹿茸。牛膝。杜仲。地黃。山茱萸。補骨脂。巴戟天。山藥。肉蓯蓉。菟絲子。

②鹿茸丸。治諸虛。用鹿茸酥炙。或酒炙亦可。鹿角膠炒成珠。鹿角霜。陽起石煨紅酒淬。肉蓯蓉酒浸。酸棗仁。柏子仁。黃芪。蜜炙。各一兩。當歸。黑附子。泡。地黃。九蒸。九焙。各八錢。辰砂。砂半錢。各爲末。酒糊丸。如梧子大。每空心溫酒下五十丸。

(濟察方)

③鹿茸酒。治陽事虛痿。小便頻數。面色無光。用嫩鹿茸一兩。去毛切片。山藥末一兩。絹袋裹。置酒罈中。七日。開瓶。日飲三盞。將茸焙作丸服。普濟方。

④治陰虛腰痛。不能反側。鹿茸炙。菟絲子各一兩。舶茴香半兩。爲末。以羊腎兩對。去酒煮爛。搗泥和丸。梧子大。陰乾。每服三十五丸。溫酒下。日三服。(本事方)

⑤治精血耗涸。耳聾口渴。腰痛白濁。上燥下寒。不受峻補者。鹿茸

酒煮。當歸浸酒。各一兩。焙爲末。烏梅肉。麝香。搗丸。梧子大。每米飲服五十丸。(濟生方)

⑥治腰膝疼痛。傷敗者。鹿茸塗酥炙。紫爲末。每服酒服一錢。(續千金方)

⑦治小便頻數。用鹿茸一對。酥炙爲末。每服二錢。溫酒下。日三服。(鄭氏家傳方)

⑧治虛病危困。因血氣衰弱。鹿茸酥炙一兩。爲末。入麝香五分。以燈心。麝香。肉和丸。梧子大。每空心米飲下三五十丸。(濟生方)

⑨治飲酒成泄。骨立不能食。但飲酒即泄。用嫩鹿茸酥炙。肉蓯蓉煨一兩。生麝香五分。爲末。陳白米飯丸。梧子大。每米飲下五十丸。名香茸丸。普濟方。

⑩治室女白帶。因衝任虛寒者。鹿茸酒蒸焙二兩。金毛狗脊。白斂各一兩。爲末。用艾葉醋打糯米糊丸。梧子大。每溫酒下五十丸。日二。(濟生方)

用量 八分至錢半。

施用宜忌 凡非虛寒者禁用。麻勃爲之使。

一二八二

著名方劑 鹿茸丸。治腎臟真陽久虛。下體痿弱。疼痛。喘嗽。水泛爲痰。濟生方。鹿茸(酒炙)。牛膝(鹽酒炒)。五味子。各二兩。川棟肉(酒蒸)。山藥。肉桂。杜仲。鹽酒炒。澤瀉。鹽水炒。各一兩。沉香(研)五錢。上研末。酒和丸。梧子大。每服七十九丸。清晨溫酒下。

參攷資料 ①按濟察方云。昔西蜀市中。嘗有一道人。貨斑龍丸。一名茸珠丹。每大醉高歌曰。尾閭不禁。滄海竭。九轉靈丹。都慢說。惟有斑龍頂上珠。能補玉堂閣下穴。朝野遍傳之。其方蓋用鹿茸。鹿角膠。鹿角霜也。又戴原禮證治要。誤治頭眩暈。甚則屋轉眼黑。或如物飛。或見一爲二。用茸珠丹其效。或用鹿茸甚效。無灰酒三盞。煎一盞。入麝香少許。溫服亦效。云茸生於頭。類之相從也。(李時珍) ②鹿茸夏收之陰乾。百不收一。且易臭。惟破之火乾。乾大好。蘇恭。③南山多鹿。每一雄遊。牝百數。至春羸瘦。入夏惟食。莖葉。即肥。當角解之時。其茸甚痛。獵人得之。以索繫住。取茸。然後斃鹿。茸之血未散也。(抱朴

數兩。凡骨之生。無速於此。雖草木易生長。亦不及之。此骨之至強者。所以能補骨血。堅陽道。益精血也。頭者諸陽之會。上鍾於茸角。豈可與凡血爲比哉。李時珍曰。鹿之茸角補陽。右腎精氣不足者宜之。藥之茸角補陰。左腎血液不足者宜之。此乃千古之微祕。前人方法雖具。而義理未盡闡發。故論者紛紜。如楊氏家藏方治虛損有二至丸。兩角並用。其藥性過溫。止宜於陽虛寒溼血痺諸症。於左腎無與焉。孫思邈千金方。言藥角丸一百一十方。惟容成子羔所服者。特出衆方之外。子羔服之羽化。今觀其方。比二至丸似可常服。何心得曰。茸爲國藥重要補品。習用已久。一至冬令。天序告藏。宜以服食。補益精血。行銷頗廣。價值低昂。以種類異。本國產物。大抵以北地爲上。而山門亦多。非精於其業者。不能辨。有藥有鹿。性狀各別。麋鹿皆山獸。凡大山多有此物。滇蜀閩廣。及國外之暹羅安南。南洋英荷各屬。島俱有出產。顧不能與國產比。緯度四十以上。氣候嚴重。其茸壯而

有力。南洋熱帶。多在緯線三五度之地。氣候宜發。其茸力薄。惟市上出售之茸。各產皆有。不可不辨。茲以素所考驗者。彙而記之。得其大略。服茸者。若得吾說。而參考之。亦不爲無益云爾。(一)北鹿茸。身圓毛黃。身分二又。亦有三四又者。每年夏至一陰生。則脫換一次。其又之多者。因年而增。既老則止。盤以上至少二寸分。又若僅寸外者。則非正北鹿。皮淡黃帶白。淡黑者。亦有之。頂圓而豐滿。左右相相對。盤上珠點分明。門角窄。頂骨薄。肉如蘆花色。功用則取紫潤圓短肥嫩者爲佳。否則鹿老而力遜。(二)北藥茸。身壯。毛帶紫黑色。身分三又。一寸外便開。又每年冬至一陽生。則脫換一次。年增一枝。其末分簇。則與鹿同。頂圓而豐滿。皮淺黑色。多茸毛。其肉色似桃花。其頂色則似柿葉。其色如朱。故北人名爲血柿茸。(三)關東之鹿茸。身比北鹿壯些。皮黃有光。毛白如蘆花。身有紋透頂。深而且現。少血頂。無脚珠。肉紫青色。通身至合頂處。有小孔如木通狀。(四)三姓所產之茸。甚

難分辨。似鹿非鹿。似麋非麋。身肥瘦皆同。北鹿皮紫黑色。毛薄黃色。肉白而淡。青少。血頂。角門闊。頂骨厚。老嫩亦審其珠點之深淺。(五)關西之茸。身壯。皮紫黑帶黃。紋淺。毛粗而白。且皺。珠點凸起。多帶黑色。頭骨肥壯。不長。附枝亞於正身之壯。頂尖有血皮薄。而肉切開。其色則赤而帶黑。性鬆不黏。(六)家園茸。禿頂光頭。皮黑帶黃。珠盤極其分明。其紋淺而不現。少血頂。肉色淡如枯骨。性硬。毛茸中帶粗。身瘦不壯。(七)雲南所產之茸。身長瘦弱。皮黑紋深。皮面如漆之光。少毛。珠盤下方有粗毛。土黃色。味鹹。皮肉不相黏。肉鬆而不結。其色如老糠。食之無益。(八)關地所產之茸。身如蕨乾。炊之輒如棉絮。皮色黑。肉多血色。切片有弦紋。方而不圓。如金狗脊之形。味香。食之亦稍有功力。利男子。少婦恐妨礙胎。老媼合宜。出在建寧台灣等處。所產不多。故此少見。(九)海南瓊州內山所產之茸。其身壯大。形體甚異。附枝多至四五枝。毛片細幼如棉。其形不潔。毛色紫黑。如艾絨帶黑。

頂上豐滿。少血。皮黑。有些淡黃。其肉切開。色如死灰。性如烘火。味微鹹。食之有損無益。(十)安南所產之茸。嫩則身壯。骨硬。皮醬紅。間帶黑色。頂皺小。身材直而不曲。老則身瘦。皮轉黑色。性溫味辛。肉色白。中有帶黑處。皮薄。珠盤高。甚少毛。有之亦盤面上些小而已。其色淡黃。其骨色如蜡玉。(十一)暹羅所產之茸。毛片皮肉。其色皆同。安南之茸。惟安南之茸。身材老而且粗。還產則身壯。幼。其中亦有血頂者。切片之時。雖分南北。其色皆紅。惟收貯三五日。其色即退如蜡。北茸之色不變。其中貴賤。即此便可見。(十二)仰光之茸。身瘦長。毛黃粗。皮烏黃色。頂少尖者。多結血頂。盤下大過盤面三分之一。肉色淡黃。皮薄。味微鹹。切開皮肉脫而不相連者。亦有。(十三)西川所產之茸。毛幼而黃。身瘦。附枝甚長。頂角帶青。盤面即開。又多連頂角。肉色同北藥味淡。皮色微黃帶烏。(十五)坤甸之茸。皮黑而薄。毛烏黃而少。身直。肉色土白。味鹹。紋深且長。血者亦少。而不多。實勝越山口洋。

十一畫 鹿

之白如蠟。油潤如脂。名之曰蠟片。次層白中兼黃。純係血液貫注其中。故名曰血片。再次層片有蜂巢色。紫黑透孔。名曰風片。俗云木通片。如木通之空通也。最次則與骨毗連。同角相仿。名曰骨片。效力更薄矣。凡辨原架鹿茸之法。須顏色紫紅明潤有神。頂圓如饅頭式者佳。如色帶黃黑。頂上凹陷者。次東三省及青海新疆產均佳。浙江衢州金華出亦佳。僞者以鹿茸架用豬血麵粉釀成。

近人學說

●丁福保曰。鹿茸

爲峻補之藥。因其中有阿摩尼亞。峻補之功力。不在鹿茸。而在阿摩尼亞。阿摩尼亞得火則飛。故服鹿茸之法。應切片浸服。若不知此理。以火煎煮。阿摩尼亞得火飛去。則無功力。且鹿茸價甚昂貴。真者難得。西國近年不用鹿茸。專用阿摩尼亞。以其功力同而價甚賤。平人不難常食。●曹炳章曰。鹿茸補精填髓之功效。雖甚偉。服食不善。往往發生吐血。衄血。尿血。目赤。頭暈。中風。昏厥等症。考其原因。其人平時多陽旺。液燥。貧血。虧精。氣血乏

運。苟服食參茸。能用份少。服日多。則助氣養血。有益無損。雖有餘熱。亦不爲害。若陽虛陰燥之人。再驟服大劑。以致有助燥燄陰之弊。蓋茸爲骨血之精。通腎脈而上衝於腦。其上升之性。故如上述之病生焉。余每遇當用鹿茸之症。有一釐漸增至數分數錢。每獲安效。此即大虛緩補之義也。近有富室大老。日以煙霞爲友。更有嬌妻美妾。爲樂。不知煙色消精。燄氣血亦隨之枯竭。陽越陰涸。百骸亦因而空虛。再妄服鹿茸。欲藉其補髓添精。以助慾。不知茸爲腦之精華。專注於上。而遇身敗血。亦皆上迫於頭。以致頭痛。昏暈。諸症生焉。即西醫所謂腦溢血。實即內經所謂氣血併走於上。則爲大厥是也。總之煙色虧敗之身。精血枯竭之體。再妄啖鹿茸。行血上竄之峻補。是無異抱薪救火。安有不戕生傷命者耶。鹿茸東三省皆產。要色紫紅明潤。頂圓如饅頭形者佳。色帶黃黑。頂凹陷者。略次。新疆雜記云。藥鹿北疆皆產之。其角於小滿後。馬蘭花開時。角根發癢。以頭相觸。角卽脫

落。堆於一處。獵者於深山中。有一獲數百對者。脫角後。越五六日。新茸卽生。此時最爲貴重。產於拜城之額什克巴什山。漢騰格里山。若焉耆之納喇特嶺。俗稱之曰鹿圈。言其產鹿之多也。卽品質言。尤以產於伊犁之果子溝者爲最佳。行銷於內地各業行。羌海雜誌云。鹿茸一種。天下盛稱關東其製法。以北產爲良。品質實不及西產之厚也。其他如湖廣經縣出亦略次。海南丹山出無杈枝。亦次。外洋淡水處出一種沙鹿。乃鯊魚所變。其色枯白。而大杈枝多。不能取茸。爲最次。他如福建。陝西。衢州皆出。皆能取茸。亦稱道地。日本產者曰洋茸。爲最次。不入藥用。鹿爲仙獸。其足甚捷。行走如飛。故獵者多苦之。每逐一鹿。須費數日之辛勞。倘遇之。則遣人四週堵擊。而以首領之人。迎頭猛擊。預伏數人於叢草中。以俟擊倒時。急持其角。否則鹿仆而茸角自毀矣。必須先取其茸。然後斃鹿。使鹿茸之血不散。蓋其力盡在血中也。故茸最難得不破及不出血。以如紫茄者爲上。名茄子

茸。太嫩則血氣未具。其實力少。太老則血液乾枯。亦力薄。惟長四五寸。形如分歧馬鞍。茸端如瑪瑙紅玉。破之肌如朽木者。最善。此關東野鹿。獵獲時取茸之法也。孟詵又云。鹿茸不可以鼻嗅之。其中有小白蟲。肉眼視之。不見。入人鼻中。必爲蟲藥。不及救也。據西醫化學試驗之結果。亦云內含微生菌。實不宜於肉體。亦無若何功效云。按鹿茸補精填髓。確有實據。其性質亦與西醫以肉補肉。以血補血之功同。卽內經精不足者補之以味是也。大抵鹿茸之發生。小白蟲微生菌者。率多洋茸及陳久次貨。其中含有多數雜質。不無微菌夾雜。其內。間或有之。可指普通鹿茸皆如是也。沈存中筆談補云。今人以藥鹿茸作一種者。誤矣。或刺藥鹿以代茸用云。茸亦血。更大誤矣。藥鹿利補陰。鹿茸利補陽。須以他藥佐之。則有功力。凡含血氣之動物。肉差易長。筋次之。骨最難長。故人自胚胎至成人。至二十歲。骨體方堅。惟藥鹿二角。自生至堅。無二三月之久。大者至二十餘觔。一日夜須生

鹿茸與麋茸。世罕能辨。大抵其實粗壯。腦骨堅厚。毛色蒼黑。而雜白毛者。則爲麋茸。形質差瘦。腦骨差薄。毛色黃澤。而兼白毛者。則爲鹿茸。麋鹿雖分有二。然總不外填精補髓。堅強筋骨。長養氣血。而爲補肝滋腎之要藥也。鹿角初生長二三寸。分岐如戟。紅如瑪瑙。破之如朽木者。良。酥塗微炙。用茸有小白蟲。視之不見。鼻嗅恐蟲入鼻。【清】陳修園本草經讀論鹿茸曰。鹿爲仙獸。而多壽。其臥則口鼻對尾間。以通督脈。督脈爲通身骨節之主。腎主骨。故又能補腎。腎得其補。則志強而齒固。以志藏於腎。齒爲骨餘也。督得其補。則大氣升舉。惡血不漏。以督脈爲陽氣之總督也。然角中皆血所貫。衝爲血海。其大補衝脈可知也。凡驚癇之病。皆挾衝脈而作。陰氣虛。不能寧謐於內。則附陽而上升。故上熱而下寒。陽氣虛。不能周衛於身。則隨陰而下陷。故下熱而上寒。鹿茸入衝脈而大補其血。所以能治寒熱驚癇也。至於長而爲角。別錄謂其主惡瘡。逐惡氣。以一點貼血發洩已盡。只有

拓毒消散之功也。【清】徐洄溪本草經百種錄論鹿茸曰。鹿茸之中。惟一點胚血。不數日而即成角。此血中有真陽一點。通督脈。貫腎水。乃至靈至旺之物也。故入於人身。爲峻補陽血之要藥。又其物流動生發。故又能逐瘀通血也。鹿茸氣體全而未發洩。故補陽益血之功多。鹿角則透發已盡。故拓毒消散之功勝。先後遲速之間。功效輒異。非明乎造化之機者。不能測度也。【清】閻立陞本草選旨論鹿茸曰。鹿茸味甘鹹。又云苦辛。氣溫無毒。麻勃爲使。合鹿之精髓骨血而成。故能治精髓骨血之病。本草主漏下惡血洩精。弱血破瘀血。在腹散石淋。癰腫。補男子腰腎虛冷。脚膝無力。夜夢鬼交。精溢自出。女人崩中漏血。赤白帶下。能健骨。能生齒。能益氣。強志。及一切虛損耳聾。目暗眩暈。虛利。功用雖多。總不出此意耳。

辨僞 ●鄭肖巖曰。鹿茸頂尖帶血者。謂之血柿茸。價值甚昂。聞射利之徒。或用豬尾。或用小腸。和以豬血。攪以雜藥。假造僞充。外形與真無二。及煎熬之後。則糜爛臭穢。可驗而知之。若研末入丸藥。甚難辨識。按鹿茸氣味甘溫無毒。主治漏下惡血。寒熱驚癇。益氣強志。生齒不老。爲補腎血益精髓之要藥。麋茸尙不可用。又安用此假柿茸耶。若遇危險重症。服之則貽誤必多矣。●曹炳章曰。按茸者。如草芽初生之狀。麋鹿雌者無角。雄者之角。年解年生。乘其初生含血未成骨時。取以爲補精血藥。因其狀命名也。惟採茸之法。貴乎始生含血者。漸長則成角。不適用。故云宜如茹之小者。分岐則大而不取。此舉茸生初久。形分大小而言。非可指爲鹿之大小解也。凡其氣血者。幼則弱。老則衰。惟壯大者則強。是藥鹿之茸。正當取於壯大之麋鹿。爲貴。當取其頭骨大。而茸豐肥。如馬鞍形。驢形者爲最。至茄茸則太嫩。而小。寇宗奭已論之矣。再論採取之法。羌海雜誌云。茸鹿一種。天下盛稱關東。其實製法。以西產爲良。品質亦不及西產之厚也。然西產製法。亦未嘗不佳。最上者亦曰旋茸。其法得一生鹿。閉於柵。聚圍

之而呼噪。鹿性躁驚。距奮擲足。無停蹄。其體純陽。兩角更甚。約數小時。其熱度達於極點。有力者。猶入以利刃。斷其首。長杆丈餘。上穿鐵環。綴八尺之鐵鏈。而以鹿角繫其端。極力搖而旋轉之。甲疲乙易。乙疲丙易。不知其數千萬轉。其精血靈活和勻。無孔不入。無竅不通。稍停。則精血凝聚之處。易生微蟲。精血不到之處。元氣不足。非全材矣。此青海採製鹿茸之法也。此指家畜而言。如過野山之鹿。即隨時又獲取茸。功效尤偉。李春芝云。麋鹿俗呼梅鹿。尤有馬鹿之分。二鹿均能生茸。皆有蠟血片。大抵麋鹿解角後。其新茸芽生之際。初起如銀杏狀。漸成梨形。及核桃形。名曰血包。此爲第一期。再則支生兩凸。如茄子形。或如鞍子形。名曰屋子。鞍子稍養數日。急宜取用。此爲第二期。倘逾此期。即爲又子。此爲第三期。即毛角也。血液枯燥。功效已薄。上述麋鹿生茸。關於時際之遲早。以區別其形狀之良窳。再別其每架鹿茸切片時。復有蠟片血片。風片骨片之分。如茸之頂尖。最首層

十一 鹿

(北音) 蠟片。血片。風片。骨片。(花名)

外國名詞 Young harts-horn (英)

基本 爲單蹄類牡鹿於夏至脫去舊角初生之新角。

產地 陳仁山藥物生產辨云。鹿茸產中國邊境以長白山爲最好。關東亦佳。俄屬海參威等處次之。六月見新。

形態 鹿茸爲蒙有毛皮之初生嫩角。柔輭作茄子狀。類蕈菌。故名鹿茸。外面呈紫褐色。有光澤。中有血管。其在春末解角生茸之際。初起如銀杏狀。漸成梨形及核桃形。北人名曰血包。此爲第一期。再則支生兩凸如茄子形。或如鞍子形。北人名曰匾子。至鞍子形。再養數日。急宜取用。此爲第二期。惟此指家畜者而言。如山野者則隨後取茸。效力更偉。若逾此期。卽爲又子。或曰毛角。而爲第三期。血液枯燥。功力亦薄。

種類 ①茸之頂尖最首層。瑩白如蠟。油潤如脂者。名曰蠟片。②次層白中兼黃。純係血液貫注其

中者。名曰血片。③再次層片有蜂窩色。紫黑透孔者。名曰風片。④最次層與骨毗連。同角相仿者。名曰骨片。

採取 每年於四五月間解角後。採截陰乾。

製法 雷獸曰。凡使鹿茸。用黃精自然汁浸兩日夜。漉出切焙。搗用免渴人也。又法以鹿茸鋸作片。每五兩用羊脂三兩。拌天蠶蓋末塗之。慢火炙。令內外黃脆。以鹿皮裹之。安室中一宿。則藥魂歸矣。乃慢火焙乾。搗末用。日華曰。只用酥炙炒研。寇宗奭曰。茸上毛。先以酥薄塗勻。於烈焰中灼之。候毛盡微炙。不如此。則火焰傷茸矣。李時珍曰。清寒濟生諸方有用酥炙酒炙及酒蒸焙用者。當各隨本方。

用法 與他藥水煎或酒浸。或剉末和作丸劑。

性質 甘溫。無毒。

效能 補元陽。治虛勞。填精血。療痿痺。用作滋補強壯藥。

主治 漏下惡血。寒熱驚癇。益氣強志。生齒不老。(本經)療虛勞。酒酒如癰。羸瘦四肢酸疼。腰脊痛。

小便數利。鴻精溺血。破瘀血在腹。散石淋。癰腫。骨中熱疽癰。安胎下氣。殺鬼精物。久服耐老。不可近丈夫陰。令痿。(別錄)

歷代記述攷證 【宋】日華諸家本草論鹿茸曰。補男子腰腎虛冷。脚膝無力。夜夢鬼交。精溢自出。女人崩中漏血。赤白帶下。炙末。空心酒服。方寸匕。壯筋骨。【明】李時珍本草綱目論鹿茸曰。生精補髓。養血益陽。強筋健骨。治一切虛損。耳聾目暗。眩暈虛痢。【明】繆希雍本草經疏論鹿茸曰。鹿茸稟純陽之質。含生發之氣。故其味甘氣溫。別錄言酸微溫。氣薄味厚。陰中之陽也。入手厥陰少陰。足少陰厥陰。經。婦人衝任脈虛。則爲漏下。惡血或瘀血在腹。或爲石淋。男子肝腎不足。則爲寒熱驚癇。或虛勞。酒酒如癰。或羸瘦。四肢酸疼。腰脊痛。或小便數利。洩精溺血。此藥走命門。心包絡及腎肝之陰分。補下元真陽。故能主如上諸證。及益氣強志。生齒不老也。癰疽疔毒。皆營氣不從所致。甘溫能通血脈和腠理。故亦主之。【明】李士材本草圖解論

鹿茸曰。鹿茸鹹溫。腎經藥也。補火助陽。生精益髓。強筋健骨。暖腰壯膝。固精攝便。安胎殺鬼。鹿稟天地純陽之氣。氣化濃密。其角自生。至室。無兩月之久。大者至二十餘觔。凡物之生。無速於此。故能強陽補骨。非他藥可比也。長大爲角。與茸同功。力少遜耳。【清】黃宮繡本草求真論鹿茸曰。鹿茸甘鹹氣溫。稟純陽之質。含發生之氣。號爲山獸性淫而遊山。夏至得陰氣而角解。陰生陽退之象也。至於大於鹿者。爲麋。麋是澤獸。居陰。性淫而遊澤。冬至得陽氣而角解。陽生陰退之象也。陰陽相反。如斯。故鹿氣味純陽。其茸故於右腎。補其精氣不足。大爲補精。緩血之劑。是以書載能補髓養血。強筋健骨。凡腰腎虛冷。遺精崩帶等症。服皆有效。雖雖屬陰。而茸又屬陰中之陽。故能入於左腎。補其血液不足。且諸茸皆發督脈之背。督爲腎臟外垣。外垣既固。腎氣內充。命門相火不致妄動。血氣精津得以凝聚。故鹿茸又云能補督脈之真陽。藥茸能補督脈陰中之陽。不可不細爲明辨耳。但

子、巴戟天、蓮鬚。加入當歸、紫石英。治婦人血閉。子宮冷。服之受孕。

③治虛勞尿精。白膠二兩。炙為末。酒二升和溫服。〔外臺祕要方〕

④治虛損尿血。白膠三兩。炙。水二升。煮一升。四合。分服。〔外臺祕要方〕

⑤治湯火灼瘡。白膠水煎令稠。待冷塗之。〔斗門方〕

用薑 錢半至三錢。

施用宜忌 凡陰虛陽盛。及有實火者禁用。畏大黃。得火良。

著名方劑 斑龍二至百補丸。

大補虛損。壯陽治痿。〔青囊方〕鹿角、黃精、杞子、熟地、菟絲子、金櫻子、天冬、麥冬、牛膝、椿實子、龍眼肉。共熬成膏。加入煉蜜。調入後藥末。杵合為丸。鹿角霜、人參、黃耆、芡實、茯苓、山藥、知母、熟地、黃肉、五味子十味共研細末。和前膏為丸。

鹿角膠入粥 ①治 助元陽治諸虛。

鹿角膠 古籍別名 白毛刺。不薪木。〔綱目拾遺〕

形態 鹿角膠為藤屬之一種。木本藤生。有長刺而氣臭。能傷人。

十一畫 鹿

鹿角膠入粥 ①治 助元陽治諸虛。

鹿角膠 古籍別名 白毛刺。不薪木。〔綱目拾遺〕

形態 鹿角膠為藤屬之一種。木本藤生。有長刺而氣臭。能傷人。

十一畫 鹿

鹿角膠入粥 ①治 助元陽治諸虛。

鹿角膠 古籍別名 白毛刺。不薪木。〔綱目拾遺〕

形態 鹿角膠為藤屬之一種。木本藤生。有長刺而氣臭。能傷人。

十一畫 鹿

鹿角膠入粥 ①治 助元陽治諸虛。

鹿角膠 古籍別名 白毛刺。不薪木。〔綱目拾遺〕

形態 鹿角膠為藤屬之一種。木本藤生。有長刺而氣臭。能傷人。

十一畫 鹿

皮肉。腫痛不休。其根可供藥用。子葉詳見各該條。

性質 大熱。

主治 和香糟搗爛。卷風氣。消痞積。

鹿角藤子 ①治 食之大能醉人。

鹿角藤葉 ①治 蒸酒服。續筋透骨。

鹿豆 ①即鹿藿之古籍別名。典見郭璞賦。詳「鹿藿」條。②即葛根之古籍別名。典見和漢藥考。詳「葛根」條。

鹿豆忠 ①即葛根之古籍別名。典見和漢藥考。詳「葛根」條。

鹿乳餅 ①腹中之乳餅。本品係幼鹿乳汁在幼鹿腹內結成餅塊。大如雲南棋子。色微黃。乾者老黃色。其氣甚腥。可供藥用。

形態 鹿乳餅為母鹿飼子之乳汁在幼鹿腹內結成餅塊。大如雲南棋子。色微黃。乾者老黃色。其氣甚腥。可供藥用。

採取 候鹿產子時。輒於夜半伺其洞側。鹿乳子必五更乳畢出洞。至暮方歸。每日祇乳小鹿一次。食乳於腹。結十二小餅。每一時即消一餅。土人候母鹿出洞。即將乳鹿抱歸剖腹取之。

主治 益命門。強陰氣。理怯弱。虛損。發痘漿。治女子乾血勞。

鹿胎 ①基本 本品為牝鹿之胎。入藥以真者。酥炙黃用。

製法 甘溫無毒。

性質 補養下元。虛寒不足。辨偽 張璠曰。胎中鹿。其嘴、尾、蹄、胎與生鹿無異者為真。其色淡形瘦者為鹿胎。若色深形肥者為藥胎。慎勿誤用。能損真陽。又獐胎與鹿胎相類。但色皎白。且其下脣不若鹿之長於上脣也。其他雜獸之胎。與鹿胎總不相似也。

參攷資料 鹿性補陽益精。男子真元不足者宜之。不特茸角莖胎入藥。而全鹿丸合大劑參耆歸附。大壯元陽。其胎純陽未散。宜為補養。天真滋益少火之良劑。然須參耆河車輩佐之。又為得力。如平素虛寒下元不足者。入六味丸中為溫補精之要藥。而無桂附辛熱傷陰之患。但慎勿誤用藥胎。反傷天元陽氣也。〔趙學敏〕

鹿胎 ①即慈白之古籍別名。典見

網目。詳「慈白」條。

鹿胎養 ①參攷資料 鹿食藥草。其胎中寢養。可療毒也。〔時珍〕

鹿虵 ①即虵蟲之古籍別名。典見綱目。詳「虵蟲」條。

鹿神 ①即商陸之古籍別名。典見和漢藥考。詳「商陸」條。

鹿英 ①即英草花之古籍別名。典見別錄。詳「英草花」條。

鹿韭皮 ①即牡丹皮之古籍別名。典見本經。詳「牡丹皮」條。

鹿首 ①即敗醬之古籍別名。典見別錄。詳「敗醬」條。

鹿脂 ①治 癰腫死肌。溫中四肢不隨。頭風。通腰理。不可近陰。

鹿茸 ①命名 本品即鹿角之初生者。含血未成骨時。如草之嫩芽。故名。處方用名 關鹿茸。血蠟鹿茸。關茸。毛角。古籍別名 斑龍。〔綱目〕鹿蟲。袋角。甕角。茄子茸。九女春。冲天室。嫩鹿茸。和漢藥考。北蒼及花名 血包。廬子。叉子。

十一 鹿

中勞絕。腰痛羸瘦。補中益氣。婦人血閉無子。止痛安胎。市肆有以牛皮煮膠。偽充一層白色。俗名白頭。氣味腥臭黏濁。服之有害。曹炳章曰。按鹿之種類有三。陸佃云。鹿之大者名曰麋。羣鹿以其尾爲趨向。其尾可作拂塵。今北人呼爲大尾鹿者是也。李瀕湖以麋似鹿而色青黑。大如小牛肉。蹄其目下有二竅。爲夜眼之說。證之似略有據。然未曾實指其角解於冬也。清高宗帝有鹿角記言之詳矣。因二物俱解角於夏。乾隆丁亥。長至。齋宿南郊。命侍臣詣南苑。聚木蘭之鹿。吉林之麋。大尾之麋。監視之。及五時而麋之角解。麋鹿皆不解。隨傳旨歛天監。改月令之。麋角解爲麋角解。此經顯示天下。而人民所共知者也是。麋之尾與麋鹿殊。而角解於長至。地學雜誌云。麋俗稱爲四不像。蓋其形似鹿。而牛身馬尾羊蹄。特其首類鹿耳。故得此名。稱。清聖祖嘗在靈園中實驗此物。而改夏小正鹿角解之說。若麋與鹿。則李瀕湖所言麋肉蹄四眼之說。亦猶牛黃之於水牛。形稍殊而

其實一物也。且朱子之註孟子。亦曰麋鹿之大者。未嘗分爲二也。李春芝云。麋鹿俗名梅花鹿。尤有馬鹿之分。亦屬同類異種耳。新疆雜記云。麋鹿北疆概產之。每冬季多狩獵者。其角於小滿節後。角根發癢。以頭相觸。角即脫落。堆於一處。獵者於深山中。有一獲數百對者。脫角後。越五六日。新茸即生。此時最爲貴重。產於拜城之額什克巴什山。漢勝格里山。若焉耆之納刺達嶺。俗稱之曰鹿鬚。言其產鹿之多也。即品質言。尤以產於伊犁之果子溝者爲最佳。行銷於內地各藥行。大抵關東出者。其角外皮黃黑色。內白色。有神光爲最佳。湖廣經縣出亦佳。福建陝西出有雙角單角之分。雙角老者亦佳。單角爲次。海南丹山出者。無杈枝亦次。又外洋淡水中出魚角。又名沙角。爲鯨魚所變。其色枯白而大。杈枝甚多。爲最次。其他煎膠之法。用正鹿角鋸斷。每段約二寸零。通淨角內灰質洗淨。煎七晝夜停火。取出骨渣。候冷濾淨。再熬至滴水成珠。取起入方錫盤中。候凝結成塊。取出

以刀切塊。貯藏三年發售。名鹿角膠是也。

近人學說 徐仁仁曰。今之談

軟骨病者。鮮不以維他命D爲治療之要素。且爲最新之聖劑。而孰知吾華夏天然之產物。其成效實有遠超於此者乎。即鹿角膠是。請假一事以徵之。余同鄉有許祀者。忽得脚軟不能行。乞余往診。余診其脈。沉濡而細。周身肥白。飲食如常。惟下肢軟弱。跬步不能。毛竅豎起。冷汗時出。按之肌肉。且失溫度。余斷爲腎陽虛衰。氣化失周。即唐韓昌黎所謂軟脚病也。爲疏金匱腎氣湯十劑。并囑續服鹿角膠。當自效。許依法施治。月餘。果獲全痊。迨十七年春。而舊恙復發。兩足軟冷如故。憶余前次爲其治愈之方。雖已忘卻。尙記有鹿角膠一物。遂購服試之。詎服未一月。竟日臻痊愈。按鹿角膠鹹溫無毒。神農本草經名曰膠。李時珍謂其純陽。能通督脈。別錄主腰脊痛折傷。日華主脚膝無力。孟詵主強骨髓。益陽道。蓋腎主骨。骨爲幹。腎藏精。精生髓。以其有強壯腎命之功。故皆主之也。

一二七六

又嘗考其成分。內含燐質。石灰質。膠質。軟骨素等。大燐質爲人身之要素。尤爲骨質中運用之靈魂。鹿角膠有增進燐質之功能。又能使石灰質之運化健全。故於軟骨症有特效也。且據近年西人之研究。謂軟骨症之發生。除食料偏乏。維他命外。而悶居幽暗之處。亦爲一大原因。嘗實驗之於動物。如將該動物飼於暗處。雖食料如常。亦能使生硬骨之病。再次如用充足光線。施於動物之身。則雖常飼以完全不含維他命之食物。該動物亦不至生軟骨之病。其尤奇者。但須將飼養該動物之食料。暴於日光中。即該動物不受日光。亦不至發生軟骨病云云。由此言之。益信軟骨病爲陽虛之症。而日光非陽氣之精英乎。鹿角膠非補陽精之藥乎。

配合應用

治勞傷吐血。鹿

角膠。牛膝。牡丹皮。麥門冬。地黃。眞蘇子。鬱金。白芍藥。當歸。童便。續斷。○治腎虛陽痿。精寒無子。鹿角膠。山茱萸。枸杞子。鹿茸。地黃。麥冬。杜仲。補骨脂。懷山藥。車前子。五味

安胎去冷。治漏下赤白。【明】李時珍本草綱目論鹿角膠曰。炙搗酒服。補虛勞。長肌益髓。令人肥健。悅顏色。又治勞嗽。尿精。尿血。瘡瘍腫毒。【明】繆希雍本草經疏論鹿角膠曰。白膠是熬鹿角而成。故其味甘氣平。別錄謂溫無毒。氣薄味厚。入足厥陰少陰。手足陰脈。經曰。勞則喘且汗出。內外皆越。中氣耗矣。故凡勞費之人。中氣傷絕。四肢作痛。多汗或吐血。下血。皆肝心受病。此藥味甘氣溫。入二經而能補益中氣。則絕傷和四肢利。血自止。汗自斂。也。折跌傷損。則血瘀而成病。甘溫入血。通行又兼補益。故折跌傷損。自愈。婦人血閉無子。及崩中淋露。胎前不安。腰痛羸瘦者。皆血虛肝腎不足之候。溫肝補腎益血。則諸證自退。而胎自得所養也。血氣生。真陽足。故久服能輕身延年耳。更治尿血。溺精。瘡瘍腫毒。及漏下赤白。婦人久服能令有子。【清】黃宮繡本草求真論鹿角膠曰。鹿膠由角煎熬。書載補陽益陰。強精活血。總不出通脈補命門之用。但其性力緩味甘。不能如茸之

力甚峻。蓋茸有通交陽維之功。膠有緣合衝脈之任。膠非藉桂同用。以通其陽。則不能除寒熱驚癇。膠非假龜膠同用。不能達任而治羸瘦腰痛。膠非假地黃當歸同投。不得引入衝脈。而治婦人血閉胎漏。至若膠治傷中絕勞。即茸所謂能主漏下惡下也。膠之能以補中益氣。即茸所謂能益氣強志也。膠之能以輕身延年。即茸所謂能以生齒不老也。然惟平臟服之得宜。若使純陰無陽。服此反能泥膈。先不免有腹脹飽滿之弊矣。生角味鹹氣溫。生能散熱行血。消腫辟惡。熱能益腎補虛。強精活血。角霜連汁煎乾。書載能治脾胃虛寒便泄。取其溫而不滯。若以煎過膠者代充。其膠既去。服之奚益。鹿胎鹿肉鹿筋力能補陽。若麋胎麋筋麋肉。則反損陽而傷陰矣。不可不慎。鹿胎須以色淡形瘦者為是。若色深形肥。則為麋胎矣。若色皎白。其胎下唇不若鹿之長於上。則為麋胎。其他獸胎。總與鹿胎不侔。鹿筋亦須辨骨細者為是。粗即是麋筋。不可妄用。【清】張隱菴本草崇原論鹿

角膠曰。鹿茸形如萌果。有初陽方生之意。鹿角形如劍戟。具陽剛堅銳之體。水熬成膠。故氣味甘平。不若鹿茸之甘溫也。主治傷中勞絕者。中氣因七情而傷。經脈因勞頓而絕。鹿膠甘平滋潤。故能治也。治腰痛羸瘦者。鹿運督脈。則腰痛可治矣。膠能益髓。則羸瘦可治矣。補中者。補中焦。益氣者。益腎氣也。治婦人血閉無子者。鹿性純陽。角具堅剛。膠質潤下。故能啓生陽。行瘀積。和經脈。而孕子也。止痛安胎者。更和經脈而生子也。久服則益陰助陽。故輕身延年。【清】陳修園本草經讀論鹿角膠曰。白膠。即鹿角煎熬成膠。何以本經自膠列為上品。鹿茸列為中品。乎蓋鹿茸溫補過峻。不如白膠之甘平足貴也。功用略同。不必再釋。其主婦人血閉止痛安胎者。皆補衝脈血海之功也。輕身延年者。精足血滿之效也。【清】賈九如辨藥指南論鹿角膠曰。鹿角膠性氣與味甚厚。濁入腎肝兩經。鹿乃純陽之物。其頭常向尾。善通督脈。其精華在角。以此煎膠。氣味濃厚。精血有力。莫過於此。

非尋常草類所可比。故能補精氣。助火衰。興陽道。健腰膝。為壯腎扶肝。捷勝之神物也。蓋阿膠補陰。鹿角膠補陽。功效各奏。

國外學說

日本和漢藥考曰。鹿角膠之製法。將鹿角屑入磁鍋。加清水燒熬。至角質柔軟。從火撤下。濾過。將其濾液。移於別器。用微火煎熬。至已成飴狀。乃放冷。待其凝固。切斷曬乾。又竊篤兒藥性口。鹿角膠性易消化。有滋養功效。尤以患熱病者。胃腸感動。欲嘔吐。下痢。腹痛等。最有神效。為暴瀉或失血太過。致精力虛損者之要藥。又醫方名物考曰。鹿角膠滋養潤補。易消化。治熱病類之胃腸感觸。特甚。不勝飲食等症。或兼有嘔吐。下痢腹痛等症。或失血過多。所致之虛脫症。或加砂糖。枸櫞汁。列印散酒等。使味美。

辨偽

偽藥條辨云。鹿角膠原名白膠。以鹿角寸截。米泔浸七日。令軟。再入急流中。浸七日。刮去粗皮。以東流水桑柴火煮七日。頻頻添水。取汁漚淨。加無灰酒熬成膏。冷則膠成矣。氣味甘平。主治傷

十一 鹿

海錯。以水洗醋拌。則脹起。如新味極滑美。若久浸則化如膠狀。女人用以梳髮。黏而不亂。③石花菜生海中沙石間。高二三寸。狀如珊瑚。有紅白二種。洗去沙土。煮化凝成膏。糟醬俱佳。又有細如牛毛者。呼牛毛石花。味稍劣。郭璞海賦。所謂土肉石華是也。(朱排山柑園小識)④龍鬚菜生於東南海邊。石上叢生。狀如柳根。長者至尺餘。白色。以醋浸食。亦佳蔬也。土人呼爲麒麟菜。出金州海邊。鹿角菜生東南海中大如鐵線。分丫如鹿角。紫色。乾之爲海錯。水洗醋拌。則如新味。今金州海邊有之。據志則似一類二種也。(盛京志)⑤石花膏。毛世洪養生集。治辛苦勞碌之人。或嗜酒多慾。忽生外痔。發作疼痛。步履難移。服此或大便瀉一遍。或不瀉。亦即止痛。可以行走。再用搽洗等藥。自能斷根。用麒麟菜洗去灰一兩。用天泉水煮烱。和白糖五錢食之。此方乃李治運臬司傳靈隱寺僧。杭人蕭成子患此症。僧往候。授以此方。服之隨愈。予記之後。治數人多效。

【鹿角膏】即愛飯石膏之別名。係石膏之一種。功能較遜尋常石膏。參詳「石膏」條。

【鹿角膠】 命名 本品係用鹿角熬成之膠。故名。

古籍別名 白膠(本經)食膠。(和漢藥考)

外國名詞 Gelatina cornu cervi (拉丁) Gelatin of Hartshorn (英) Gelatin von Hirsch horn (德)

基本 屬單蹄類爲牡鹿頭角所製成之膠。

形態 鹿角膠爲無色透明或半透明無氣味之薄片。劣品有腥臭。逢冷水則吸收而膨脹。入熱湯中易溶化。冷之則凝固。再熱之則融化。次分解發惡臭。

採取 七月間採截。

製法 蘇頌曰。凡使鹿角膠。七月採角。以鹿年久者。其角更好。煮以爲膠。入藥彌佳。別錄曰。白鹿生雲中。煮鹿角作之。陶弘景曰。今人少復煮作。惟合角弓用之。其法先以米泔汁漬七日。令軟。煮煎如阿膠法耳。又法到角令細。入乾牛

皮一片。即易消爛。不爾雖百年無一熟也。蘇恭曰。鹿角藥角。但煮濃汁重煎。即爲膠矣。何必使爛。欲求爛亦不難。陶未見耳。孟詵曰。作膠法。須細破寸截。以河水浸七日。令軟。方煮之。雷敩曰。採全角鋸開。並長三寸。以物盛於急水中。浸一百日。取出。刀刮去黃皮。拭淨。以鹼醋煮七日。旋添醋。勿令少歇。成時不用着火。只從子至戌。一日足。角軟如粉。搗爛。每一兩入無灰酒一鉢。煮成膠。陰乾研篩用。李時珍曰。今人呼煮爛成粉者爲鹿角霜。取粉熬成膠。或只以濃汁熬成膏者。爲鹿角膠。按胡璣衛生方云。以米泔浸鹿角七日。令軟。入急流水中浸七日。去麋皮。以東流水桑柴火煮七日。旋添添水。入醋少許。搗成霜。用其汁加無灰酒熬成膠。用又韓愈醫通云。用新角寸截。蘊盛於長流水中浸七日。以瓦缶入水。桑柴火煮。每一斤入黃醋半斤。以壺掩住。水少旋添。其角軟。以竹刀刮淨。搗爲霜。用孟詵曰。凡用鹿角藥角。並截段錯屑。以蜜浸過。微火焙令小變色。曬乾搗篩爲末。或燒飛

一二七四

爲丹服之至妙。以角寸截。泥裹於器中。大火燒一日。如玉粉也。李時珍曰。按權行功要纂方。鹿角粉法。以鹿角寸截。炭火燒過。搗末。水和成團。以絹袋三五重盛之。再煨再和。如此五度。以牛乳和。再燒過。研用。

用法 水化或酒化。或和他藥水煎或溶化。和作丸劑。

性質 甘。平。無毒。

成分 爲膠素(Gelatin)軟骨素(Chondrin)等。

效能 溫補肝腎。滋養精血。用作滋補神經衰弱之強壯藥。又治貧血略血。

作用 入胃即與胃酸化合。而凝固。至腸復分解。而被腸壁吸入血中。頗有增加血液之凝固力。

主治 傷中勞絕。腰痠。羸瘦。補中益氣。婦人血閉。無子。止痛安胎。療吐血。下血。崩中。不止。四肢作痛。多汗淋瀝。折跌傷損。久服。輕身延年。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論鹿角膠曰。男子損臟氣。氣弱勞損。吐血。婦人服之。令有子。

養靈鼓湯和服。立出。(百一選方)

①治隨胎血瘀不下。狂悶寒熱。用鹿角屑一兩爲末。鼓湯服一錢。三日。須臾血下。(聖惠方)

②治胞衣不下。鹿角屑三分爲末。薑湯調下。(產乳方)

③治產後血暈。用鹿角一段。燒存性。出火毒爲末。酒調灌下。卽醒。(楊供醫方摘要方)

④治婦人白濁。滑數虛冷者。鹿角屑炒黃爲末。酒服二錢。(婦人良方)

⑤治筋骨疼痛。鹿角燒存性爲末。酒服一錢。日二。

⑥治食後喜嘔。鹿角燒末二兩人參一兩爲末。薑湯服方寸匕。日三。(肘後方)

⑦治小兒疳疾。鹿角粉。大豆末等分相和。乳調塗乳上飲之。(古今錄驗方)

⑧治小兒瘧疾。鹿角生研爲末。先發時。以乳調一字服。(千金方)

⑨治小兒滯下赤白者。用鹿角灰髮灰等分。水服三錢。日二。(千金方)

⑩治小兒重舌。鹿角末塗舌下。

日三。(姚和衆方)

①治小兒流涎。脾熱也。鹿角屑末。米飲服一字。(普濟方)

②治面上肝皰。鹿角尖磨濃汁厚塗之。(神效方)

③治面上風瘡。鹿角尖磨酒塗之。(聖惠方)

④治咽喉骨硬。鹿角爲末含之。嚥津。(斗門方)

⑤治蹉跌損傷。血瘀骨痛。鹿角末酒服方寸匕。日三。(千金方)

⑥治竹木入肉不出者。鹿角燒末。水和塗上。立出。久者不過一夕。(千金方)

⑦治蠅螬尿瘡。鹿角燒末。苦酒調服。(外臺祕要方)

⑧治五色丹毒。鹿角燒末。豬脂和敷。(肘後方)

⑨治發背初起。鹿角燒灰。醋和塗之。日五六易。(千金方)

⑩治乳發初起。不治殺人。鹿角磨濃汁塗之。并令人啣去黃水。隨手卽散。(梅師方)

⑪治吹奶掀痛。鹿角屑爲末。炒黃。酒服二錢。仍以梳梳之。(唐氏經驗方)

①治下注脚瘡。鹿角燒存性。入輕粉同研。油調塗之。(集要方)

②治癰毒腫毒。鹿角尖磨濃汁塗之。甚妙。(瀕湖方)

③治癰疽有蟲。鹿角燒末。苦酒和塗。磨汁亦可。

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 杜仲爲之使。

著名方劑 斑龍丸。治虛損。理百病。(青囊方) 鹿角膠。鹿角霜。熟地黃。菟絲子。栢子仁等分。共研末。酒化膠和爲丸。

參攷資料 ①鹿角生用則散熱行血消腫辟邪。熟用則益腎補虛。強精活血。鍊霜熬膏。則專於滋補矣。(李時珍) ②鹿角堅而麋角鬆。鹿角小而麋角大。鹿角單而麋角雙。小者曰鹿。大者曰麋。羊之大小卽以此別。麋牡者有角而無齒。此指上齧齒也。若下齧齒則牝牡咸有其無角有齒者。牝也。(楊時泰)

【鹿角片】卽鹿角之處方用名。詳『鹿角』條。

【鹿角菜】 命名 本品形似鹿角故名。

古籍別名 土肉。石華。(郭璞海賦) 龍鬚菜。(盛京志) 猴髮。(綱目) 麒麟菜。石花菜。細如牛毛者。名牛毛石花菜。(綱目拾遺)

外國名詞 Chondrus ocellatus Holmes (拉丁) 〆 〆 〆 (日本)

基本 係紅藻類杉海苔族鹿角菜屬之鹿角菜。

產地 生海濱沙石間。

形態 鹿角菜爲水菜類之一種。有紅白二色。紅者長四寸。分歧如叉。本細而末闊。末端純圓。作紫黃色。全形略似鹿角。及珊瑚白者。根叢生。長約尺餘。狀如柳而色白。質皆酥脆。可供藥用。

性質 甘。大寒。滑。無毒。

主治 下熱風氣。療小兒骨蒸熱勞。服丹石人食之。能下石力。

歷代記述攷證 【清】趙學敏本草綱目拾遺論鹿角菜曰。消痰如神。治一切痞積痔毒。

參攷資料 ①鹿角菜微毒。丈夫不可久食。久食發癩疾。損腰腎。經絡血氣。能令人脚冷痺少顏色。

(孟詵) ②鹿角菜土人採曝。貨爲

來去自如。此角極堅強。力能撲狼。頸極短。體又甚高。故不便俯首食地面雜草。常至叢林中。食樹皮樹葉及嫩芽等。性怯弱。喜孤立。不成羣。馳走迅速。亦能游泳。夏日爲防蠅類刺螫。則浸入池中。僅露頭面。其蹄較大。故行軟泥地及雪上。無傾陷之患。牝者每次產二子。肉可食。產中國西北各山林中。及俄國那威。瑞典及北美洲之北方。博物志云。麋生南方。恒千百爲羣。食澤草。其踐處成泥。名曰麋陵。種稻可收百倍方旭云。狀與鹿無異。但目下有兩孔。能夜視。其毛帶青黑色。牡者亦有兩角。夏至解角。(一)麋北山經云。倫山有獸曰麋。狀似麋而竅在尾上。此與熊屬之麋不同者。(二)麋胡東山經云。戶胡山有獸曰麋。狀如麋而魚目。鳴自呼。(四)麋西域記云。麋似麋而大。前昂後低。毛多而長。爲裘甚暖。角扁而厚。爲模甚良。(丙)鹿形異獸。當分爲四種。分別於后。(一)麋係一種奇異之鹿類。頭似鹿。脚似牛。尾似麋。背似駱駝。從全體觀之。無一所以故。此人俗呼四不像。體大如

小牛。毛淡褐。背稍濃。腹漸淡。角質堅。表面有凸凹。角甚基厚。從幹分二。又一向後。一向向外。向後者有並行之類。小彎直伸而出。向外者甚彎曲。未端復分歧。足頗大。蹄較小。體長(除尾)七尺三寸。肩出約四尺。性似鹿。食植物。常慢走。馳驅時比馬尤速。每年五月間產子。孕期八箇月。稚獸毛濃黃兼褐色。有白色大斑。生後三箇月。斑即消失。牡者生後二年。角始分叉。角至冬至時則脫落。或謂此獸爲我國固有之動物也。地學雜誌云。額爾古納河右岸。鄂倫春所使者。彼名曰沃利恩。吾國名曰麋。俗名四不像。角有數歧。似鹿。蹄分兩歧。似牛。身長色灰似驢。其頭則似鹿。非鹿。似牛。非牛。寬額而長。喙毛甚豐。能負重百餘斤。鄂倫春俄人馴畜之用。時以木擊樹。或吹木器。聞聲即來。飼以苔。用畢則縱之去。即遊行山中。廣輿記云。麋產陝西終南山。六書故云。麋似鹿而大。長尾可爲拂塵。解角於長至節。名苑云。鹿之大者曰麋。羣鹿隨之。視其尾爲準。其尾能辟塵。拂塵則不蛀。置茜帛中能

歲久紅色不退云。(二)麋正字通云。鹿狀似麋。但角不歧。毛不斑耳。爾雅謂牛尾一角誤。(三)麋說文麋。聲也。六書故云。麋之脂黃。亦謂黃羊。談薈云。麋無脂。堪雅云。麋性怯。飲水見影。即奔。本草綱目云。麋秋冬居山。春夏居澤。其狀似鹿而小。無角。毛黃黑色。牡者口外有兩牙。甚長。俗呼牙麋。白者曰銀麋。孟詵曰。麋肉八月至十一月可食。餘日動氣。(四)方輝格致鏡原云。弦超入泰山。見一物似麋。而頭似婦人髮髻。管耳悉具。歸告瓊智。瓊智曰。此方輝也。五百年一見。見者必壽。後弦超果二百餘歲。綜觀以上鹿類二十二種。麋類四種。鹿形異獸四種。計三十種。其間有同種異形者。有同形異種者。其角可入遂取茸者。不及六七種。錄之以備鑑別參考耳。

配合應用 ①服鹿角法。鹿角屑十兩。生附子三兩。去皮臍爲末。每服二錢。空心溫酒下。令人少睡。益氣力。通神明。(彭祖方) ②治腎消尿數。鹿角一具。炙。搗篩。溫酒每服方寸匕。日二。(外臺) 祕要方) ③治腎虛勞極。而腫垢黑。骨痛不能久立。血氣衰。髮落齒枯。甚則喜唾。用尾角二兩。牛膝酒浸焙。一兩半。爲末。煉蜜丸。梧子大。每服五十丸。空心鹽酒下。(濟生方) ④治腎虛腰痛。如錐刺。不能動搖。鹿角屑三兩。炒黃研末。空心溫酒服方寸匕。日三。(肘後方) ⑤治卒腰痛。不能轉側。鹿角五寸。燒赤。投二升酒中。浸一宿。飲。(梅師方) ⑥治婦人腰痛。鹿角屑。炒黃。研酒服方寸匕。日五六服。(楊氏產乳方) ⑦治妊娠腰痛。鹿角裁五寸。長燒赤。投一升酒中。又燒又浸。如此數次。細研。空心酒服方寸匕。(產寶方) ⑧治產後腹痛。血不盡者。產後燒研。豉汁服方寸匕。日二。(子母祕錄方) ⑨治妊娠下血不止。鹿角屑。當歸各二兩。水三盞。煎減半。頓服。不過二服。(普濟方) ⑩治胎死腹中。鹿角屑三寸匕。

臺鹿。體形似鹿有斑點。產於臺灣。

(八)鳥鹿。形性似臺鹿。產馬來、菲律賓。

(九)馴鹿。產於亞歐美三洲之北極地。體軀之大小。隨產地而異。大概棲地愈北者則較大。頸短。

頸下有長毛。四肢強健。第二第五趾與第三第四趾踏地。蹄廣而分裂。踏雪而行。不致陷入。產於美洲者體最大。長大之牡。肩高達四尺許。重約四百磅。夏季毛色概暗褐。

頸鼻腹及後肢皆白。至冬季毛捲縮。色淡帶灰。牝牡皆有角。出胎數月間即生。牡角大長達五尺許。角基圓長。角頂擴大。生枝。枝端扁平如劍。牝角較小。而分枝亦少。馴鹿原係野生。夏季出山林遊於山地。入秋再返舊地。其去森林爲避蚊羣之刺整故也。至冬日積雪滿地。善用其吻端角蹄。掘食雪下之地衣類。

(十)長頸鹿。形略似鹿。頸甚長。故名。頭頂至趾高一丈八尺。爲動物中之最高者。頭小眼大。鼻孔能開閉。耳殼小。脰長而薄。上頸無門牙及大齒。但上下顎之血齒強大。舌細長。具鈎曲之刀。牝牡皆有短角一對。牡者雖長。不似鹿角之

年交脫。角形如截木。外被皮膚。尖端簇生短毛。頸盛長。頸骨祇有七節。與他獸同。頸上具短鬚。胸部小。四肢長。前肢尤長。肩高九尺。尾細長。尖端有叢毛。全體毛色橙赤。散列暗黑色之圓斑。腹及腋下色較淡。體長丈六乃至丈九。牝者較短。多產於非洲。性溫順。食草木之嫩芽。以四肢及頸俱長。亦適於食喬木之葉。步行甚速。

(十一)馬鹿。雅翼云。晉楚有鹿似馬。當解角時與馬無異。故名馬鹿。

(十二)麀鹿。雅云。北狄有麀鹿。極大。而色蒼黃無斑。角大而有紋。堅瑩如玉。茸亦可用。

(十三)天鹿。瑞應圖云。天鹿神獸也。狀如牛。身披五色。而肉甲方旭蟲。晉云。天鹿或作天碌。孟康西域傳注云。符拔一角爲天碌。兩角爲辟邪。伏似虎。正黃色。有茸而尾有茸毛。大如牛。蠕蠕云。天鹿野馬也。一角如茸。青色。其肉落地不沾泥沙。謂之靈獸。

(十四)靈鹿。粵述云。梧州火山靈鹿三足。

(十五)兩頭鹿。南中志云。兩頭鹿。產雲南。一身兩頭。食毒草。又名食毒鹿。張華博物志名茶首機。出永昌郡。是

兩頭鹿名也。似鹿兩頭。其胎中屎以四月取之。段成式酉陽雜俎云。雙頭鹿。失名。耶希夷人謂鹿爲耶。謂屎爲希。按唐韻。屎字音都。即此義也。陳藏器以胎中屎散惡瘡。乃

蛙。惡毒。范曄後漢書云。雲陽縣有神鹿兩頭。能食毒草。華陽國志云。此鹿出雲陽南郡熊舍山。荊州記云。式陵郡。雲陽山。點蒼山。產兩頭鹿。獸似鹿。前後有頭。一頭食。一頭

行。山人時或見之。

(十六)鯨魚。澤史紀餘云。鯨魚南海鯨魚所化。其色較鹿稍赤。本草明辨云。外洋淡水處出鯨魚。乃鯨魚所變。其角曰魚角。其色枯白。沒枝最多。不能取茸。

(十七)飛孩獸。洞冥記。翁韓國獻飛孩獸。似鹿。青色。帝以乘青之絲爲繩繫之。及死掛於苑門。皮毛皆朽。而骨猶存。人知其靈異。更以他繩繫其足。明日往視。唯繫處存餘骨飛去。

(十八)把雞爾。坤輿外紀云。渤泥產把雞爾。狀似鹿。腹生一石。可療百病。國王甚重之。方旭云。把雞爾。八絃澤史作把雞爾。出西南大海中。渤泥國。

(十九)狸如。西山經云。皋塗山有獸曰狸如。狀如鹿。而有四角。白尾。其前足如人手。而後足如馬蹄。

(二十)夫諸。中山經云。敖岸山有獸曰夫諸。狀如白鹿。而四角。

(廿一)無損。騶雅云。豕頭而牙爲無損。訓纂云。南方有獸。似鹿而豕頭。有牙。善依人求食。穀食之名無損。

(廿二)角端。廣輿紀云。角端產韃靼。角可爲弓。隴蜀餘聞云。角端產瓦屋山。能食虎豹。不傷人。談書云。角端鹿形。馬尾。獨角。生鼻上。日行萬八千里。能曉四夷之語。張尙瑗石里石識云。國朝崇德二年。蒙古貢齊希特。能解人語。蓋角端之屬。然則元時所見。或亦齊希達乎。元史太祖至西印度見角端能言。

(乙)麋類異種。當分爲四種。條舉列后。

(一)麋。形體甚大。重一千四百磅。高約七尺。四肢較長。全體暗赤褐色。眼小耳闊。頸有短鬚。胸部及喉下。密生長毛。向下垂。牡體生後九月而生角。逐年增枝。枝短而粗。角之全部成鐵形。從左右兩旁向內部彎曲。其中央略成凹形。角之大者。重達七百兩以上。每行深林中。必將其角向後橫臥。故能不與樹枝相抵觸。而

十一畫 鹿

近人學說 曹炳章曰鹿常棲

於西北山林中。善別良草。常食菴葉。鹿葱。白蒿。水芹。甘草。蒼耳。薺。柏。樺。櫟之芽。蘗及樹皮果實等植物。夏期入深山。至冬出遊於山麓。性溫順。常驚駭。善走。啼聲悲慘。喜羣居。分背而食。食則相呼。行則同旅。居則環角向外以防患。臥則口朝尾關以通督脈。常以一牡多牝而成羣。交尾期在秋季。一牡常交百數牝。謂之聚麀。至春初羸瘦。入夏得菴蒲食之而肥。孕於仲秋。生於仲春。六月而生。每胎一子。初生鼻邊有缺者爲雄。雄者毛黃色。有白斑。有角。雌者無角。毛雜黃白。色無斑。鹿至六十歲必懷羣。於角下有斑痕紫色。行則流涎。不復急走。故曰鹿戴玉而角斑。羣範云。鹿千歲色蒼。一千五百歲色白。二千歲色元。隴蜀餘聞云。明正統十五年。洋縣橫溪獲一白鹿。項有銅牌。上有鐫刻皆漫滅。惟唐字可辨。其在千年以上者無疑。鹿之嗅覺甚敏。銳荷上風。有獵犬及人能嗅得之。又能辨微聲。故不易獵獲。今之獵者每當秋季。吹鹿笛誘出。而鎗

殺之。鹿體羸弱。四肢細長。前二趾踏地有蹄。尾短。眼耳皆大。耳壳能轉動。牡者有枝形角一對。牝者無之。毛色至夏赤褐。有淡色白斑。是謂鹿斑。至冬概灰褐。體長四尺餘。角不空。由皮膚下層（即真皮）所變化而發達者。初爲瘤狀。呈紫褐色。微褐色密毛。是爲鹿茸。富有血管。附之甚溫。迨鹿茸漸長。乃磨於樹幹。脫去皮毛。此時其營養盛。而血管破裂流血。乃見眞角。鹿角原質與尋常各獸角不同。因牛羊等角有心。其原料與結成之阿勒約門質相類。鹿角至春日則脫。自第一年至第五年。逐年加大。過第五年則漸減少。當年初生者無角。頭上祇有兩凸處。至第二年則生出無枝之角。第三年則生叉形之角。第四年則生兩叉之角。第五年則生四叉之角。第六年則生五叉之角。第七年則生四叉之角。以後各年之形。無大變化。惟逐年減少。其原質與骨大同小異。鹿茸乃鹿解角後。新生含血之芽。角漸長。則成毛角。再大則謂鹿角。故云宜如茹之小者。分歧具大而不取。此舉

茸生初久。形分大小而言。未可指爲鹿之大小解也。凡具氣者。幼則弱。老則衰。惟壯健者則強。是麀鹿之茸。皆當取於壯大之爲貴。乃今以小而毛黃爲鹿大。而毛青爲麀。致購茸之競爭小者。其惑甚矣。不知鹿之種類甚夥。古書誤解亦甚多。茲再詳細辨正之。鹿有同類異種。同種異形。其各種形態習性。分條辨列如下。（甲）鹿類異種。當分爲二十二種。列舉於后。（一）羌鹿。體小而輕健。肩高約二尺。體重約三十斤。毛角赤黃褐色。頗美麗。角小而形簡。由前頭骨所生之長骨軸支之。角上有毛。牡者角長三寸至四寸餘。眼下有斜走之隆起。二上顎之犬牙甚發達。爲防敵之用。叫聲如狐。性能怯弱。善馳。產於中國。日本。蘇門答臘。爪哇。菲律賓等處。（二）麀鹿。爲鹿類中之巨大者。長成之牡鹿。高達五尺半以上。體重約千磅。角又分十二至十四吋。達二十吋。長達五尺。多棲於美洲落磯山脈附近。能泳水。亦善馳。北美洲土人蒙之使曳橈或荷物。肉味頗美。（三）赤鹿。寰中記云。南山

一二七〇

有赤鹿。足短。而身大如牛。肉千斤。毛皮冬夏異色。夏毛帶赤褐色。冬毛帶灰色。角如枝狀。長成者之角長約三尺。有二十餘尖。有時達四十餘尖。當年之稚鹿無角。產子期在六月間。每產不過二子。稚鹿之背部及體旁有白斑。產於歐亞之北方。（四）麀鹿。體比赤鹿大而強壯。相等。毛色煤褐。眼上具黃褐斑紋。角有三叉。枝枝向前彎。而超過頭頂。尖端爲簡式之分叉。沿其曲線而直計之。長達四尺。（五）黠鹿。形似赤鹿。而略小。成長之牡。肩高約三尺。體重約二百磅。毛色概黃褐。或帶赤褐。有明顯之白斑紋。又有多數白線紋。至冬季毛色增灰。至夏則常帶黑褐色。角之上部邊平。或爲掌狀。無枝。略向前尾略長。性溫順。經三年而長成。可飼養之。爲園中玩賞品。亞歐洲洲皆產之。（六）麀鹿。體小形美。肩高二尺三寸許。體長三尺三寸許。角小。長約七寸至一吋七分。分三枝。全體色暗赤。毛粗。臀部近旁有白斑。無尾。眼之肉皆無四窩。常獨居。產於歐洲之暖地。及亞洲等處。（七）

惟牡骨有白毛斑點。牝則雜有白毛。牝無角。牡有角。由年數而增加枝數。夏季樹水而脫落。此角謂之鹿角。供藥用。其角係作枝狀分岐之堅實角質。長有達三尺者。外面呈白色或淡褐色。處處疣起。下部斷面。有無數鬆孔。是乃血管穿過角質中之癭痕。

種類 ●鹿角有頭骨皮毛毗連者爲生角。●鹿角無頭骨皮毛毗連者爲解角。

採取 每年七月間採截其老角。須以鹿年久者佳。煮以爲膠。入藥更佳。尤要黃色緊重尖者之角。以此鹿食靈草。故異於衆鹿也。

製法 孟詵曰。凡用鹿角。藥角並截段錯屑。以蜜浸過。微火焙令小變色。曝乾。搗篩爲末。或燒飛爲丹服之。至妙。以角寸截。泥裹於器中。大火燒一日。如玉粉也。李時珍曰。按崔行功要纂方。鹿角粉法。以鹿角寸截。炭火燒過。搗末水和成團。以絹袋三五重盛之。再煨再和。如此五度。以牛乳和。再燒過。研用。**用法** 與他藥水煎。或酒浸。或剉末和作丸劑。

十一 鹿

性質 鹹。溫。無毒。
成分 爲磷化鈣、炭酸鈣、膠質、軟骨等。

效能 散瘀活血。治瘡瘍腫毒。益氣補虛。治五勞七傷。用作溫補強壯藥。又治遺精。腎孟炎。

主治 惡瘡癰腫。逐邪惡氣。留血在陰中。除少腹血痛。腰脊痛。折傷惡血。益氣。

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新修本草論鹿角曰。貓鬼中惡心腹疼痛。【唐】孟詵食療本草論鹿角曰。蜜炙研末。酒服。輕身強骨髓。補陽道絕傷。又治婦人夢與鬼交者。清酒服一握。即出鬼精。燒灰治婦人胞中餘血不盡。欲死。以酒服方寸匕。日三基妙。【宋】日華諸家本草論鹿角曰。水磨汁服。治脫精尿血。夜夢鬼交。醋磨汁塗瘡瘍癰腫。熱毒火炎。熱熨小兒重舌。口瘡。【明】繆希雍本草經疏論鹿角曰。藥茸補陰。鹿茸補陽。角亦如之。凡角初生。軟嫩者爲茸。稟壯健之性。故能峻補腎家真陽之氣。熬成白膠。則氣味甘緩。能通周身之血脈。生角則味鹹氣溫。惟散熱。行血消

腫。辟惡氣而已。鹹能入血。軟堅。溫能通行散邪。故主惡瘡癰腫。逐邪惡氣。及留血在陰中。少腹血急痛。折傷惡血等證也。肝腎虛。則爲腰脊痛。鹹溫入腎。補肝。故主腰脊痛。氣屬陽。補陽故又能益氣也。【清】張隱菴本草崇原論鹿角曰。鹿角功力與茸角相等。而攻毒破洩。行瘀逐邪之功。居多。較茸膠又稍銳焉。【清】徐洄溪本草經百種錄論鹿角曰。鹿之精氣全在於角。角本下連督脈。鹿之角於諸獸爲最大。則鹿之督脈最盛可知。故能補人身之督脈。督脈爲周身骨節之主。腎主骨。故又能補腎角之中皆貫以血。衝爲血海。故能補衝脈。衝督盛而腎氣強。則諸效自臻矣。【清】關立陞本草選旨論鹿角曰。鹿角有生用熟用兩法。生能散熱。行血消腫。辟邪。熟能益腎。補虛。強精。活血。故本草治惡瘡癰疽。逐邪惡氣。夜夢鬼交。留血在陰中。除少腹血痛。折傷惡血等症。服用水磨。塗用醋磨。所謂生用也。又強骨髓。補陽道。絕傷脫精。尿血。腰脊痛。又婦人夢與鬼交。及婦人胞中餘血不盡。

欲死。蜜炙酒服。或燒灰研服。所謂熟用也。

國外學說 英美學說謂鹿角係牡鹿之角。並其磅下之角。在古人常用之爲藥品。鹿角至春時則解。自第一年至第五年。逐年加大。過五年則漸減小。如將鹿角燒之所成之灰。可以作炭養燐養(五)之用。所以鹿角之功用。如取鹿角磅下之花。合於水沸之。則成無色膠類質。有養身之性。可代魚肝等膠類性質。又有鹿角精與鹿角油。鹿角鹽。皆有祛痰發汗興奮之效。而鹿角膠則爲補藥。又日本和漢藥考曰。鹿畏人。惟日本大和國奈良及安藝國宮島之馴鹿。則爲人狎。生後一年之牡鹿。鹿角二年乃生角。但無枝。三年生一枝。四年生二枝。六年生四枝。六年以上。增加未有一定。昔時歐洲亦有以鹿角供藥用。並有鹿角所製之鹿角油。(Oleum animal raspatum)。鹿角炭(Cornu cervi nigrum)。鹿角鹽(Sol. volatile cornu cervi)。鹿角灰。(Cornu cervi album)。等製劑。

十一 鹿 齒

秋間皆生。齒望之如水。近之如積雪。刮而熬之。遂成爲齒。微有蒼黃者。卽齒也。爾雅所謂天生曰齒。人生曰齲者是。可供藥用。

性質 苦寒。無毒。

主治 大熱消渴。狂煩除邪。及下蟲毒。柔肌膚。本經去五臟腸胃留熱。結氣。心下堅。食已嘔逆。喘滿。明目。目痛。別錄。

參攷資料 齒制四黃。作鉅藥用。確砂礬鐵。一時卽軟。獨孤酒。凡鹽未經滴去苦水。則不堪食。苦水卽齒水也。齒水之下澄鹽。凝結如石者。卽齒也。丹溪所謂石齒者。乃灰齒也。見土類。吳普本草。謂齒一名齒鹽者。指齒水之鹽。非齒地之鹽也。不妨同名。李時珍。

齒綱目詳。齒鹽條。

齒綱目詳。齒鹽條。

齒綱目詳。齒鹽條。

齒綱目詳。齒鹽條。

齒綱目詳。齒鹽條。

齒綱目詳。齒鹽條。

齒綱目詳。齒鹽條。

齒綱目詳。齒鹽條。

齒綱目詳。齒鹽條。

齒綱目詳。齒鹽條。

齒綱目詳。齒鹽條。

齒綱目詳。齒鹽條。

齒綱目詳。齒鹽條。

齒綱目詳。齒鹽條。

齒綱目詳。齒鹽條。

愈乃止。

鹿白 卽苦參之古籍別名。典見和漢藥考。詳苦參條。

鹿列 卽知母之古籍別名。典見別錄。詳知母條。

鹿竹 卽黃精之古籍別名。典見別錄。詳黃精條。

鹿肉 性質 甘溫。無毒。

主治 補中益氣。力強五臟。生者療中風口僻。割片薄之。歷代記述攷證 唐孟詵食療本草論鹿肉曰。補虛瘦弱。調血脈。明李時珍本草綱目論鹿肉曰。養血生容。治產後風虛邪僻。

參攷資料 九月後。正月前。可以食。他月不可食。發冷痛。白臚者。豹文者。並不可食。鹿內臚炙之。不動及見水而動。或曝之不燥者。並能殺人。不可與雉肉。薄白鮑魚。蝦同食。發惡瘡。禮記云。食鹿去胃。孟詵 中風口偏者。以生肉同生椒搗貼。正卽除之。華陀 蠶居士言。鹿性多髯。烈能別良草。止食葛花。葛葉。鹿葱。鹿藥。白蒿。水芹。甘草。薺菜。齊頭。蒿山。蒼耳。他草不食。處必山岡。故產則歸下澤。饗神

鹿沙 卽沙魚之背有珠文如鹿斑。長至八九尺者。性質功能參詳時珍。

鹿沙 卽沙魚之背有珠文如鹿斑。長至八九尺者。性質功能參詳時珍。

鹿沙 卽沙魚之背有珠文如鹿斑。長至八九尺者。性質功能參詳時珍。

鹿沙 卽沙魚之背有珠文如鹿斑。長至八九尺者。性質功能參詳時珍。

鹿沙 卽沙魚之背有珠文如鹿斑。長至八九尺者。性質功能參詳時珍。

鹿沙 卽沙魚之背有珠文如鹿斑。長至八九尺者。性質功能參詳時珍。

鹿沙 卽沙魚之背有珠文如鹿斑。長至八九尺者。性質功能參詳時珍。

鹿沙 卽沙魚之背有珠文如鹿斑。長至八九尺者。性質功能參詳時珍。

鹿沙 卽沙魚之背有珠文如鹿斑。長至八九尺者。性質功能參詳時珍。

鹿沙 卽沙魚之背有珠文如鹿斑。長至八九尺者。性質功能參詳時珍。

鹿沙 卽沙魚之背有珠文如鹿斑。長至八九尺者。性質功能參詳時珍。

鹿沙 卽沙魚之背有珠文如鹿斑。長至八九尺者。性質功能參詳時珍。

鹿沙 卽沙魚之背有珠文如鹿斑。長至八九尺者。性質功能參詳時珍。

鹿沙 卽沙魚之背有珠文如鹿斑。長至八九尺者。性質功能參詳時珍。

鹿沙 卽沙魚之背有珠文如鹿斑。長至八九尺者。性質功能參詳時珍。

鹿沙 卽沙魚之背有珠文如鹿斑。長至八九尺者。性質功能參詳時珍。

鹿沙 卽沙魚之背有珠文如鹿斑。長至八九尺者。性質功能參詳時珍。

一二六八

絞條。

鹿良 基本 鹿良爲雜草類之一種。可供藥用。

採取 五月採之。

性質 鹹臭。

主治 小兒驚癇。賁豚癰癰。大人瘰癧。

鹿角 命名 本品乃鹿之頭角。處方用名 鹿角片。鹿角屑。生鹿角。毛鹿角。古籍別名 鎮山威。斑龍角。和漢藥考 外國名詞 Cornu Cervi (拉丁) Harts horn (英) Hirschhorn (德) 基本 屬單蹄類。爲牡鹿之頭角。產地 陳仁山藥物生產辨云。鹿角產於長白山。關東。海參威。黑河。桂花城。西口。三姓等處。和漢藥考曰。非洲海洋洲均不產此。產於其他三大洲。形鑑 鹿爲棲息山中。性喜羣居之獸。以植物爲食料。體軀肥滿。四肢細長。牝牡之毛。俱作黃褐色。

鹿角 命名 本品乃鹿之頭角。處方用名 鹿角片。鹿角屑。生鹿角。毛鹿角。古籍別名 鎮山威。斑龍角。和漢藥考 外國名詞 Cornu Cervi (拉丁) Harts horn (英) Hirschhorn (德) 基本 屬單蹄類。爲牡鹿之頭角。產地 陳仁山藥物生產辨云。鹿角產於長白山。關東。海參威。黑河。桂花城。西口。三姓等處。和漢藥考曰。非洲海洋洲均不產此。產於其他三大洲。形鑑 鹿爲棲息山中。性喜羣居之獸。以植物爲食料。體軀肥滿。四肢細長。牝牡之毛。俱作黃褐色。

鹿角 命名 本品乃鹿之頭角。處方用名 鹿角片。鹿角屑。生鹿角。毛鹿角。古籍別名 鎮山威。斑龍角。和漢藥考 外國名詞 Cornu Cervi (拉丁) Harts horn (英) Hirschhorn (德) 基本 屬單蹄類。爲牡鹿之頭角。產地 陳仁山藥物生產辨云。鹿角產於長白山。關東。海參威。黑河。桂花城。西口。三姓等處。和漢藥考曰。非洲海洋洲均不產此。產於其他三大洲。形鑑 鹿爲棲息山中。性喜羣居之獸。以植物爲食料。體軀肥滿。四肢細長。牝牡之毛。俱作黃褐色。

鹿角 命名 本品乃鹿之頭角。處方用名 鹿角片。鹿角屑。生鹿角。毛鹿角。古籍別名 鎮山威。斑龍角。和漢藥考 外國名詞 Cornu Cervi (拉丁) Harts horn (英) Hirschhorn (德) 基本 屬單蹄類。爲牡鹿之頭角。產地 陳仁山藥物生產辨云。鹿角產於長白山。關東。海參威。黑河。桂花城。西口。三姓等處。和漢藥考曰。非洲海洋洲均不產此。產於其他三大洲。形鑑 鹿爲棲息山中。性喜羣居之獸。以植物爲食料。體軀肥滿。四肢細長。牝牡之毛。俱作黃褐色。

鹿角 命名 本品乃鹿之頭角。處方用名 鹿角片。鹿角屑。生鹿角。毛鹿角。古籍別名 鎮山威。斑龍角。和漢藥考 外國名詞 Cornu Cervi (拉丁) Harts horn (英) Hirschhorn (德) 基本 屬單蹄類。爲牡鹿之頭角。產地 陳仁山藥物生產辨云。鹿角產於長白山。關東。海參威。黑河。桂花城。西口。三姓等處。和漢藥考曰。非洲海洋洲均不產此。產於其他三大洲。形鑑 鹿爲棲息山中。性喜羣居之獸。以植物爲食料。體軀肥滿。四肢細長。牝牡之毛。俱作黃褐色。

鹿角 命名 本品乃鹿之頭角。處方用名 鹿角片。鹿角屑。生鹿角。毛鹿角。古籍別名 鎮山威。斑龍角。和漢藥考 外國名詞 Cornu Cervi (拉丁) Harts horn (英) Hirschhorn (德) 基本 屬單蹄類。爲牡鹿之頭角。產地 陳仁山藥物生產辨云。鹿角產於長白山。關東。海參威。黑河。桂花城。西口。三姓等處。和漢藥考曰。非洲海洋洲均不產此。產於其他三大洲。形鑑 鹿爲棲息山中。性喜羣居之獸。以植物爲食料。體軀肥滿。四肢細長。牝牡之毛。俱作黃褐色。

鹿角 命名 本品乃鹿之頭角。處方用名 鹿角片。鹿角屑。生鹿角。毛鹿角。古籍別名 鎮山威。斑龍角。和漢藥考 外國名詞 Cornu Cervi (拉丁) Harts horn (英) Hirschhorn (德) 基本 屬單蹄類。爲牡鹿之頭角。產地 陳仁山藥物生產辨云。鹿角產於長白山。關東。海參威。黑河。桂花城。西口。三姓等處。和漢藥考曰。非洲海洋洲均不產此。產於其他三大洲。形鑑 鹿爲棲息山中。性喜羣居之獸。以植物爲食料。體軀肥滿。四肢細長。牝牡之毛。俱作黃褐色。

鹿角 命名 本品乃鹿之頭角。處方用名 鹿角片。鹿角屑。生鹿角。毛鹿角。古籍別名 鎮山威。斑龍角。和漢藥考 外國名詞 Cornu Cervi (拉丁) Harts horn (英) Hirschhorn (德) 基本 屬單蹄類。爲牡鹿之頭角。產地 陳仁山藥物生產辨云。鹿角產於長白山。關東。海參威。黑河。桂花城。西口。三姓等處。和漢藥考曰。非洲海洋洲均不產此。產於其他三大洲。形鑑 鹿爲棲息山中。性喜羣居之獸。以植物爲食料。體軀肥滿。四肢細長。牝牡之毛。俱作黃褐色。

鹿角 命名 本品乃鹿之頭角。處方用名 鹿角片。鹿角屑。生鹿角。毛鹿角。古籍別名 鎮山威。斑龍角。和漢藥考 外國名詞 Cornu Cervi (拉丁) Harts horn (英) Hirschhorn (德) 基本 屬單蹄類。爲牡鹿之頭角。產地 陳仁山藥物生產辨云。鹿角產於長白山。關東。海參威。黑河。桂花城。西口。三姓等處。和漢藥考曰。非洲海洋洲均不產此。產於其他三大洲。形鑑 鹿爲棲息山中。性喜羣居之獸。以植物爲食料。體軀肥滿。四肢細長。牝牡之毛。俱作黃褐色。

鹿角 命名 本品乃鹿之頭角。處方用名 鹿角片。鹿角屑。生鹿角。毛鹿角。古籍別名 鎮山威。斑龍角。和漢藥考 外國名詞 Cornu Cervi (拉丁) Harts horn (英) Hirschhorn (德) 基本 屬單蹄類。爲牡鹿之頭角。產地 陳仁山藥物生產辨云。鹿角產於長白山。關東。海參威。黑河。桂花城。西口。三姓等處。和漢藥考曰。非洲海洋洲均不產此。產於其他三大洲。形鑑 鹿爲棲息山中。性喜羣居之獸。以植物爲食料。體軀肥滿。四肢細長。牝牡之毛。俱作黃褐色。

鹿角 命名 本品乃鹿之頭角。處方用名 鹿角片。鹿角屑。生鹿角。毛鹿角。古籍別名 鎮山威。斑龍角。和漢藥考 外國名詞 Cornu Cervi (拉丁) Harts horn (英) Hirschhorn (德) 基本 屬單蹄類。爲牡鹿之頭角。產地 陳仁山藥物生產辨云。鹿角產於長白山。關東。海參威。黑河。桂花城。西口。三姓等處。和漢藥考曰。非洲海洋洲均不產此。產於其他三大洲。形鑑 鹿爲棲息山中。性喜羣居之獸。以植物爲食料。體軀肥滿。四肢細長。牝牡之毛。俱作黃褐色。

鹿角 命名 本品乃鹿之頭角。處方用名 鹿角片。鹿角屑。生鹿角。毛鹿角。古籍別名 鎮山威。斑龍角。和漢藥考 外國名詞 Cornu Cervi (拉丁) Harts horn (英) Hirschhorn (德) 基本 屬單蹄類。爲牡鹿之頭角。產地 陳仁山藥物生產辨云。鹿角產於長白山。關東。海參威。黑河。桂花城。西口。三姓等處。和漢藥考曰。非洲海洋洲均不產此。產於其他三大洲。形鑑 鹿爲棲息山中。性喜羣居之獸。以植物爲食料。體軀肥滿。四肢細長。牝牡之毛。俱作黃褐色。

鹿角 命名 本品乃鹿之頭角。處方用名 鹿角片。鹿角屑。生鹿角。毛鹿角。古籍別名 鎮山威。斑龍角。和漢藥考 外國名詞 Cornu Cervi (拉丁) Harts horn (英) Hirschhorn (德) 基本 屬單蹄類。爲牡鹿之頭角。產地 陳仁山藥物生產辨云。鹿角產於長白山。關東。海參威。黑河。桂花城。西口。三姓等處。和漢藥考曰。非洲海洋洲均不產此。產於其他三大洲。形鑑 鹿爲棲息山中。性喜羣居之獸。以植物爲食料。體軀肥滿。四肢細長。牝牡之毛。俱作黃褐色。

鹿角 命名 本品乃鹿之頭角。處方用名 鹿角片。鹿角屑。生鹿角。毛鹿角。古籍別名 鎮山威。斑龍角。和漢藥考 外國名詞 Cornu Cervi (拉丁) Harts horn (英) Hirschhorn (德) 基本 屬單蹄類。爲牡鹿之頭角。產地 陳仁山藥物生產辨云。鹿角產於長白山。關東。海參威。黑河。桂花城。西口。三姓等處。和漢藥考曰。非洲海洋洲均不產此。產於其他三大洲。形鑑 鹿爲棲息山中。性喜羣居之獸。以植物爲食料。體軀肥滿。四肢細長。牝牡之毛。俱作黃褐色。

鹿角 命名 本品乃鹿之頭角。處方用名 鹿角片。鹿角屑。生鹿角。毛鹿角。古籍別名 鎮山威。斑龍角。和漢藥考 外國名詞 Cornu Cervi (拉丁) Harts horn (英) Hirschhorn (德) 基本 屬單蹄類。爲牡鹿之頭角。產地 陳仁山藥物生產辨云。鹿角產於長白山。關東。海參威。黑河。桂花城。西口。三姓等處。和漢藥考曰。非洲海洋洲均不產此。產於其他三大洲。形鑑 鹿爲棲息山中。性喜羣居之獸。以植物爲食料。體軀肥滿。四肢細長。牝牡之毛。俱作黃褐色。

鹿角 命名 本品乃鹿之頭角。處方用名 鹿角片。鹿角屑。生鹿角。毛鹿角。古籍別名 鎮山威。斑龍角。和漢藥考 外國名詞 Cornu Cervi (拉丁) Harts horn (英) Hirschhorn (德) 基本 屬單蹄類。爲牡鹿之頭角。產地 陳仁山藥物生產辨云。鹿角產於長白山。關東。海參威。黑河。桂花城。西口。三姓等處。和漢藥考曰。非洲海洋洲均不產此。產於其他三大洲。形鑑 鹿爲棲息山中。性喜羣居之獸。以植物爲食料。體軀肥滿。四肢細長。牝牡之毛。俱作黃褐色。

鹿角 命名 本品乃鹿之頭角。處方用名 鹿角片。鹿角屑。生鹿角。毛鹿角。古籍別名 鎮山威。斑龍角。和漢藥考 外國名詞 Cornu Cervi (拉丁) Harts horn (英) Hirschhorn (德) 基本 屬單蹄類。爲牡鹿之頭角。產地 陳仁山藥物生產辨云。鹿角產於長白山。關東。海參威。黑河。桂花城。西口。三姓等處。和漢藥考曰。非洲海洋洲均不產此。產於其他三大洲。形鑑 鹿爲棲息山中。性喜羣居之獸。以植物爲食料。體軀肥滿。四肢細長。牝牡之毛。俱作黃褐色。

鹿角 命名 本品乃鹿之頭角。處方用名 鹿角片。鹿角屑。生鹿角。毛鹿角。古籍別名 鎮山威。斑龍角。和漢藥考 外國名詞 Cornu Cervi (拉丁) Harts horn (英) Hirschhorn (德) 基本 屬單蹄類。爲牡鹿之頭角。產地 陳仁山藥物生產辨云。鹿角產於長白山。關東。海參威。黑河。桂花城。西口。三姓等處。和漢藥考曰。非洲海洋洲均不產此。產於其他三大洲。形鑑 鹿爲棲息山中。性喜羣居之獸。以植物爲食料。體軀肥滿。四肢細長。牝牡之毛。俱作黃褐色。

鹿角 命名 本品乃鹿之頭角。處方用名 鹿角片。鹿角屑。生鹿角。毛鹿角。古籍別名 鎮山威。斑龍角。和漢藥考 外國名詞 Cornu Cervi (拉丁) Harts horn (英) Hirschhorn (德) 基本 屬單蹄類。爲牡鹿之頭角。產地 陳仁山藥物生產辨云。鹿角產於長白山。關東。海參威。黑河。桂花城。西口。三姓等處。和漢藥考曰。非洲海洋洲均不產此。產於其他三大洲。形鑑 鹿爲棲息山中。性喜羣居之獸。以植物爲食料。體軀肥滿。四肢細長。牝牡之毛。俱作黃褐色。

鹿角 命名 本品乃鹿之頭角。處方用名 鹿角片。鹿角屑。生鹿角。毛鹿角。古籍別名 鎮山威。斑龍角。和漢藥考 外國名詞 Cornu Cervi (拉丁) Harts horn (英) Hirschhorn (德) 基本 屬單蹄類。爲牡鹿之頭角。產地 陳仁山藥物生產辨云。鹿角產於長白山。關東。海參威。黑河。桂花城。西口。三姓等處。和漢藥考曰。非洲海洋洲均不產此。產於其他三大洲。形鑑 鹿爲棲息山中。性喜羣居之獸。以植物爲食料。體軀肥滿。四肢細長。牝牡之毛。俱作黃褐色。

鱗者。則甚稀。今所謂無鱗魚者。實鱗之細微者居多爾(醫學辭典)。
【魚鷹】即鵰之古籍別名。典見食經。詳「鵰」條。

【魚鱗】**命名** 本品以魚剖切成故名。凡諸魚之鮮活者。薄切洗淨血髓。沃以蒜薑薑醋五味食之。皆謂之鱗。

古籍別名 魚生(綱目)
性質 甘溫無毒

主治 去冷氣滯痺。除膀胱水。腹內伏梁。氣塊冷痞。結癖疝氣。喉中氣結。心下酸水。開胃口。利大小腸。補腰脚。起陽道。

歷代記述攷證 【唐】孫思邈千金翼論魚鱗曰。宜脚氣風氣人。治上氣喘咳。【唐】孟詵食療本草論魚鱗曰。鱗鮠主久痢腸辟痔疾。大人小兒丹毒風眩。

參攷資料 ①魚鱗辛辣。有劫病之功。予在蒼梧。見一婦人。病吞酸。諸藥不效。偶食魚鱗。其疾遂愈。蓋此意也。(汪穎) ②近夜勿食不消成積。勿飲冷水。生蟲時。行病後食之。胃弱。勿同乳酪食。令人霍亂。不可同瓜食。(陳藏器) ③按食治

云。凡殺物命既虧仁愛。且肉未停冷。動性猶存。旋烹不熟。食猶害人。况魚鱗肉生。損人尤甚。為癰瘻。為痼疾。為奇病。不可不知。昔有食魚生而生病者。用葉下出已變蟲形。鱗縷尚存有食鱗肉而成積者。用藥下出。已成動物。而能行。皆可驗也。(李時珍)

【魚鱗金星】**命名** 以其葉葉面又起金點如星故名。

產地 浙江西子湖飛來峯之絕頂。以及其他背陰山石間。

形態 魚鱗金星為植物雜草類之一種。立夏後發苗。根細如纖線。蔓延石上。葉不對節。一長一圓。長者為魚。圓者為鱗。葉經霜則老。背起金星。惟鱗葉無。葉可供藥用。

性質 涼
主治 治膨脹。癰瘻。火毒症。

【鳥不宿】**命名** 本品枝梗有刺。鳥不能棲宿。故名。
古籍別名 晚娘棒(綱目)老

虎草。昏樹晚娘棒。鳥不踏。刺根白皮。石米刺(綱目拾遺)鳥不宿刺(汪連仕採藥書)茨梧桐。

產地 多生山場間。
形態 鳥不宿為灌木類之一種。枝赤色。長三四尺。皮色如桑。細者如大指。老者如甘蔗。葉如杏葉。開黃花成穗。其根白皮可供藥用。

性質 溫
主治 透骨追風。行血定痛。療風毒流注。跌打損傷。催生下胎。雙單喉蛾。紫雲風。大麻風。筋骨疼痛。並治虛勞如神。

【鳥不宿根下蟲】**主治** 風毒流注。神效。

【鳥不宿莖葉】**主治** 難產。同甘草和酒水煎服。

【鳥不踏】即鳥不宿之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「鳥不宿」條。

【鳥木羊】即拂拂之古籍別名。典見山海經。詳「拂拂」條。

【鳥栗】即九熟草之古籍別名。典見別錄。詳「九熟草」條。
【鳥岡子】即鼠李子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「鼠李子」條。
【鳥葵】即相鳥之古籍別名。典見綱目。詳「相鳥」條。
【鳥龍尾】即梁上塵之古籍別名。典見綱目。詳「梁上塵」條。
古籍別名 苦鹵。(綱目拾遺)
性質 苦。鹹。無毒。
主治 治大熱消渴。去煩除邪。下蟲毒。柔肌膚。去溼熱。消痰。磨積塊。洗垢膩。多服損人。
參攷資料 有鹽鹵水。乃已燒成鹽。復漚下之。苦鹵一名鹵水。此乃取於鹵地。漚以燒鹽之用。與鹽鹵水不同。(趙恕軒)

【鹵鹼】**原名** 鹵鹼。
命名 本品乃土中所含一種質料。性滑而味鹹。可用以浣衣。去垢者。就土性而曰鹵。取而用之。則曰鹼。故名。

古籍別名 鹵鹽。寒石。(吳普)石鹼。補遺。鹵鹼。凝結如石者。名石鹼。(綱目)

產地 出山西諸縣平野。及太谷榆次等處。高亢地。
形態 鹵鹼為鹵石類之一種。

十一畫 魚

熱。據傳惡瘡白禿。【明】李時珍本草綱目論魚腥草曰散熱毒癰腫瘡痔脫肛斷疔疾解蝨毒。【明】繆希雍本草經疏論魚腥草曰載生於下澤之地味辛氣溫能治痰熱壅肺發為肺癰吐膿血之要藥辛溫主散故能治蠅蝨溺瘡肺主氣辛溫能散氣故多食令人氣喘肺與大腸為表裏大腸溼熱盛則為痔瘡得辛溫之氣則大腸清寧故又為痔瘡必須之藥。

配合應用 ①單用搗汁入年久芥菜酒飲之治肺癰有神。

②治背瘡熱腫莖菜搗汁塗之留孔以洩熱毒冷即易之（經驗方）。

③治痔瘡腫痛魚腥草一握煎湯熏洗仍以草抱痔即愈。一方洗後以枯礬入片腦少許傳之（救急方）。

④治疔瘡作痛魚腥草搗爛傳之痛一二時不可去草痛後一二日即愈（陸氏積德堂方）。

⑤治小兒脫肛魚腥草搗如泥先以朴硝水洗過用芭蕉葉托住藥坐之自愈（永類鈴方）。

⑥治蟲牙作痛魚腥草花椒菜子油等分搗勻入泥少許和作小丸如豆大隨牙左右塞耳內兩邊輪換不可一齊用恐閉耳氣塞一日夜取看有細蟲為效（簡便方）。

⑦斷截癰疾紫莖一握搗爛絹包周身摩擦得睡有汗即愈臨發前一時作之（救急易方）。

⑧治惡蛇蟲傷魚腥草鐵面草槐樹葉草決明一處杆爛傳之甚效（救急易方）。

用置 錢半至三錢。

施用宜忌 凡無溼熱瘡毒者禁用。

參攷資料 ①莖字段公路北戶錄作蕊音。秦人謂之菹子菹莖音相近也其葉腥氣故俗呼為魚腥草。李時珍 ②莖菜生溼地山谷陰處亦能蔓生葉似蕎麥而肥莖紫赤色山南江左人好生食之園中謂之菹菜（蘇恭） ③案趙叔文醫方云魚腥草即紫莖葉似苻其狀三角一邊紅一邊青可以養豬又有五莖即五毒草花葉相似但根似狗脊骨（李時珍） ④俗傳食莖不利人脚恐由閉氣故也。

今小兒食之便覺脚痛（陶弘景）。

⑤小兒食之三歲不行久食發虛弱損腸氣消精髓（孟詵） ⑥莖菜又名十葉氣甚臭村民每取其根飯上蒸熟食之據云味甚甘本草以此列入柔滑菜類然實不可食且有小毒日俗馬醫用以飼馬謂有十種藥之功能故號稱十葉云（大和本草）。

【魚膏】即鱖膠之古籍別名。典見綱目詳「鱖膠」條。

【魚鮓】 命名 本品即諸魚之腦骨猶枕也故名。

主治 能消毒。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論魚鮓骨曰解蠱毒作器盛飲食遇蠱輒裂破也。

【魚鮮】 命名 鮮者醃也諸魚皆可為之魚以鹽醃醃醃而成者故名。

古籍別名 小者名鱖（綱目）。

性質 甘鹹平無毒。

主治 癰瘡和柳葉搗碎炙熱傳之取酸臭者連糝和屋上塵傳蟲瘡及馬癰瘡。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論魚鮮曰治痔耳痔瘡諸瘡有蟲療白臛代指病主下痢膿血。

參攷資料 ①凡鮮皆發瘡疥鮮內有髮害人（陳藏器） ②鮮不熟者損人脾胃反至疾也（吳瑞） ③諸鮮皆不可合生胡荽藥菜豆醬麥醬蜂蜜而食令人消渴及霍亂凡諸無鱗魚鮮食之尤不益人（李時珍）。

【魚子蘭】即珠蘭之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「珠蘭」條。

【魚父】即青蚨之古籍別名。典見綱目。詳「青蚨」條。

【魚生】即魚鱸之古籍別名。典見綱目。詳「魚鱸」條。

【魚目青】即白青之古籍別名。典見綱目。詳「白青」條。

【魚伯】即青蚨之古籍別名。典見綱目。詳「青蚨」條。

【魚尾花】即雷公藤之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「雷公藤」條。

【魚尾草】即醉魚草之古籍別名。典見綱目。詳「醉魚草」條。

【魚油】即魚脂之古籍別名。典見綱目。詳「魚脂」條。

【魚狗】**命名** 本品能在水面捕食小魚如獵狗然。故名。

古籍別名 鰐。天狗。水狗。(爾雅) 魚虎。魚師。(禽經) 翠碧鳥。(綱目)

外國名詞 Alcedo bengalensis Gm Kingfisher Elisvogel (拉丁) カワセミ或シヨウビン或カハセビ(日本)

基本 保有椎動物鳥類鳴禽類魚狗科。

產地 在水涯廢穴間。

形態 魚狗爲水禽類鳥族之一種。大如燕。形似杜鵑。嘴長而強直。有角稜。末端尖銳。體之下面。概青綠色。頭部濃橄欖色。有青綠色斑紋。眼下亦有一青綠紋。眼後具強光澤之橙褐色。頤及喉部黃白色。胸腹橙褐色。尾短足亦短。小色赤褐。常在水畔掘穴營巢而居。其肉可供藥用。

性質 鹹平。無毒。

主治 魚哽及魚骨入肉不出。痛甚者。燒研飲服。或煮汁飲亦佳。

參攷資料 今人治魚骨哽。取得去腸。用陰陽瓦泥固煨存性。入藥用蓋。取其相制之意。(李時珍)

魚狗舌 **原名** 翠鳥舌。

製法 用魚狗舌。以桐油浸晒乾。再浸再晒。使硬如三稜鍼用。

主治 頭風。於頭上鍼之。即愈。

【魚食】即浮萍之古籍別名。典見和漢藥考。詳「浮萍」條。

【魚虎】即魚狗之古籍別名。典見

禽經。詳「魚狗」條。

【魚津草】即水英之古籍別名。典見綱目。詳「水英」條。

【魚師】即魚狗之古籍別名。典見食經。詳「魚狗」條。

【魚草】即車前草之古籍別名。典見和漢藥考。詳「車前草」條。

【魚脂】**命名** 本品即魚之脂肪。脂者旨也。其味甘旨。故名。

古籍別名 魚油。(綱目)

性質 甘溫。有小毒。

主治 瘰癧。用和石灰泥船。魚脂腥臭者二斤。安銅器內。燃火柱令暖。隔紙熨瘰上。晝夜勿息火。又塗牛狗芥立愈。

參攷資料 魚脂點燈治盲人。

日。

【魚腥草】**命名** 本品莖葉紫赤。有魚腥臭氣。故名。

處方用名 蕺菜。魚腥草。紫蕺。蕺菜。蕺菜。十葉。半葉。蕺菜。孟娘菜。筆管菜。龍鬚菜。(和漢藥考)

基本 屬三白草科。爲紫莖之葉與莖根。

產地 多在山谷原野之陰溼地方。

形態 蕺菜爲多年生草本。高自七八寸至尺餘。莖細長。色紅紫。葉爲心臟形。末端尖銳。似甘藷葉及蕎麥葉。葉與莖俱有一種不快之惡臭。初夏梢上歧生分枝。而於其頂端開淡黃色之小花。花皆裸出。無花被。連續而爲穗狀花序。花序之下。具有類似花瓣之苞四瓣。色白。果實爲蒴果。小而作球形。圓形。戴三花柱。中藏多數種子。

採製 夏秋間採之。

製法 採得葉及莖根陰乾用。

用法 水煎或生搗。

性質 辛微溫。有小毒。

效能 瀉熱解毒。用作瘡瘍藥。

主治 蚊蠅尿瘡。

歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草論魚腥草曰。淡竹筒內煨



魚腥草

十一畫 雪 頂 釘 魚

產地 出深谷中。

形態 雪裏開爲雜草類之一種。苗甚短小。如六月雪狀。高僅二寸許。每雪時開白花如豆大。其花可供藥用。根詳見該條。

主治 痔瘡爲未傳之乾者麻油調搽。

【雪腹】 卽茯苓之古籍別名。典見和漢藥考。詳「茯苓」條。

【雪蓮】 卽雪荷之原名。詳「雪荷」條。

【雪蓮花】 產地 本品生於溫帶之地。如雲南邊陲諸境。

效能 性極熱。浸酒爲補劑。多血熱妄行。或用合媚藥其禍尤烈。

【雪蝦蟆】 產地 巴里坤之雪山中。

形態 雪蝦蟆爲溼生蟲類之一種。遍身有金線紋。其形絕似可供藥用。

性質 大熱。微辛。

主治 補命門。益丹田。壯陽卻冷。陰痿能興。

配合應用 內造伏虎丹。與陽種子強腎助神。用真川貝母四兩。

須四製。第一次用大附子一個。童便一湯碗。蒸乾。切細。燒酒三湯碗。非藥汁三湯碗。同入砂鍋。將貝母煮乾。去附子不用。第二次用雪蝦蟆一兩。無則以大蛤蚧一對代之。用石敲碎。亦用燒酒非汁各三碗。同貝母煮乾。去蛤蚧不用。第三次用吳茱萸一兩。亦用酒非汁各三碗。同貝母煮乾。去茱萸不用。第四次用公丁香五錢。亦用酒非汁各三碗。同貝母煮乾。去丁香不用。製完其貝母爛如泥。置石臼中舂。再入真阿芙蓉一錢。乳製蟾酥三錢。麝香五分。拌勻作條。焙乾收貯。用時唾津磨搽。

施用宜忌 凡火盛者。禁用。

參攷資料 雪蝦蟆能回已絕之陽。功兼參附。故爲性命根源之藥。(趙學敏)

【雪齡】 命名 本品屬冬而肥。故名。

產地 廣東諸地之池澤間多有之。

形態 雪齡爲魚類之一種。形似鱧而稍短。性喜游泳波上。得濟流則跳躍尋丈。其味美。作膾尤佳。

可供藥用。

主治 益氣力。健筋骨。活血行氣。逐水利溼。

參攷資料 雪齡粵中池塘多蓄之。以魚秧長成。與鯽性相反。鯽屬土。其性沈。常潛水中。給鰾水。其性浮。常躍水上。鯽食之可以實腸。給食之可以行氣。鰾守而給行。性各不同如此。(趙學敏)

【雪雞】 產地 出西陲諸地。

形態 雪雞爲原禽類。雞屬之一種。千百成羣。棲止雪中。可供食與藥用。

採取 以雄者入藥良。

主治 暖丹田。壯元陽。除一切積冷陰寒。痼癖諸疾。較雪蓮尤效。

參攷資料 雪雞肥美。可以爲食。惟性燥耳。(綱目拾遺)

【雪蠶】 命名 本品生積雪中。而狀似蠶。故名。

性質 甘寒。無毒。

主治 解內熱。渴疾。

參攷資料 王季年拾遺記云。員嶠之山有冰蠶。長六七寸。黑色有鱗角。以霜雪覆之。則作繭。長一尺。抽五色絲。織爲文錦。入水不濡。投火不燬。幾時海人獻之。其質輕暖柔滑。按此亦雪蠶之類也。(李時珍)

【頂生地】 卽大生地之處方用名。詳「大生地」條。

【頂黃王】 卽枸杞子之處方用名。詳「枸杞子」條。

【釘坐真人】 卽荔枝之古籍別名。典見和漢藥考。詳「荔枝」條。

【魚丁】 卽魚鮓之古籍別名。典見綱目。詳「魚鮓」條。

【魚子】 命名 本品卽魚腹中之子。故名。

古籍別名 鮓。鱖。(綱目)

形態 凡魚皆於冬月孕子。至春末夏初。則於渾水草間生子。有牡魚隨之。洒白越數日。則化生。魚子可供藥用。

採取 以青魚鱖之屬者用。

主治 目中翳障。

色潔白如雪珠者。參見『石膏』條。

【雪花菜】即豆腐渣之古籍別名。典見慈航活人書。詳『豆腐渣』條。

【雪客】①即驚蟄之古籍別名。典見綱目。詳『驚蟄』條。②即野薔薇之古籍別名。典見花鏡。詳『野薔薇』條。

【雪眉同氣】即白扁豆之古籍別名。典見和漢藥考。詳『白扁豆』條。

【雪茶】高山積雪之處。入夏不消。而形似茶。其色又白故名。

古鑑別名 白茶(大觀) 白葉茶(東溪)

產地 出滇南麗江府屬山中雪地。

形態 色白。久則微黃。形似蓮心。

性質 甘。苦。溫。

主治 祛寒。治胃氣積痛。及痢疾。

參攷資料 ①此茶本非茶類。乃天生一種草芽。土人採得炒焙。已亥臘。過餘杭。往訪劉挹清少府。發雪茶。云帶自雲南。茶片皆作筒子。如蜜筒菊。瓣樣。詢所主治。

因言此茶大能暖胃。凡嚴寒冰凍時。啜一盞。滿腹如火。若患癆損及失血過多之人。腹胃必寒。最忌食茶。惟此茶不忌。乃相與烹飪食之。果入腹溫暖。味亦苦冽香美。較他茶更厚。②大觀茶論。白茶自爲一種。與常茶不同。其條數闊。其葉瑩薄。崖林之間。偶然生出。非人力所可致。有者四五家。生者不過一二株。所造止於二三銖而已。芽英不多。尤難蒸焙。湯火一失。則已變而爲常品。須製造精微。運度得宜。則表裏昭澈。如玉之在璞。他無與論也。③東溪試茶錄。白葉茶於近歲園培時有之。地不以山川遠近。發不以社之先芽。葉如紙。民間以爲茶瑞。(趙恕軒)

【雪荷】原名 雪蓮。本品生於雪中。形如蓮。故名。

產地 出伊犁西北。及金川大寒諸地。

形態 雪荷爲雜草類之一種。高可丈許。獨莖亭亭。葉如雞冠花。長尺許。雌雄並生。雌者花圓雄者花尖。色深紅。瓣薄而狹。長可三四

寸。狀類筆頭。其花可供藥用。性質 大熱。無毒。

主治 除冷痰。助陽道。及小兒疳瘡不起。

參攷資料 雪荷花功同仙茅。枸杞。據言其地有天山。冬夏雪。中有蓮。以產天山峯頂者爲第一。然不可得。山腰次之。其生也有雌雄。土人採乾之。成對以市。性大熱。能補陰益陽。老人陽絕者。浸酒服。能令有子。潯陽銷夏錄。塞外有雪蓮。生崇山積雪中。狀如今之洋菊。名以蓮耳。其生必雙。雄者大。雌者小。然不並生。亦不同根。相去必一兩丈。見其一。再覓其一。無不得者。蓋如菟絲。茯苓。一氣所化。氣相屬也。(綱目拾遺)

【雪蛆】即雪蠶之古籍別名。典見綱目。詳『雪蠶』條。

【雪裏青】古鑑別名 土犀角。過冬青。(綱目拾遺)

產地 生田隙間。

形態 雪裏青爲雜草類之一種。形如天名精。布地而生。無枝梗。葉有細白毛。四時不凋。雪天開小白花。亦有於三月間起莖。開白花。

性質 苦。大寒。無毒。

主治 咽喉卒閉。搗汁灌之。咳血同豬肉蒸食。散風火。消腫毒。結滯。肺痿肺癰。齒痛痔疾。搗汁服。

【雪裏青】即荔枝草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『荔枝草』條。

【雪裏青葉】主治 單蛾雙蛾。同根及木蓮。蓬搗汁。米醋滾過。沖和含漱之。

【雪裏花】耐寒。均可勝梅。於隆冬冰雪之中。開花。故名。

產地 浙之鎮海。蘇之招寶山。龍潭旁。環堵均有出之。

形態 雪裏花係雜草類之一種。苗短小。狀如六月雪。高不過二寸。每於嚴寒冰雪之際。開白色鮮花。大如豆形。採得曬乾。可供藥用。

性質 辛涼。無毒。

主治 痔疾。以本品爲末。澀者乾。溼者乾。乾者麻油調搽一二度。痔即消縮。

【雪裏開】命名 本品隆冬嚴寒。雪中開花。故名。

【雪裏青】命名 本品性堅與

【雪裏花】命名 本品性堅與

【雪裏青】命名 本品性堅與

【雪裏花】命名 本品性堅與

【雪裏青】命名 本品性堅與

【雪裏花】命名 本品性堅與

【雪裏青】命名 本品性堅與

【雪裏花】命名 本品性堅與

【雪裏青】命名 本品性堅與

【雪裏花】命名 本品性堅與

十一畫 雀 蛾 雪

食其糞中子故名。

古鑑別名 蛭蟲窠。躁舍。(本經)

天漿子 (圖經) 棘剛子 (衍義) 紅姑娘窠 (綱目)

產地 凡樹枝間處處有之。

形態 雀蟲大如巴豆。形如桑蠅。上有蓋。

採取 八月採蒸之。尤宜採榴棘上者。內有蛹。正如蠅蛹之宜採桑上者用。

性質 甘平。無毒。

主治 寒熱結氣。蠱毒鬼疰。小兒驚痛。

近人學說 尤學周曰。治熱壅肺。開氣急目定。有驚風傾向者。用天漿壳及麻黃等品。師徒相傳。天漿壳旁必註一包字。而藥店所用天漿壳為研合子。俗名婆婆針線包。此物雖內如飛絮。煎時無包之必要。且此種平淡之品。有何功能。敢與麻黃同伍。其必為本品之壳。無異醫不識藥。肆妄作主張。以羊易牛。而復以訛傳訛。不加更正。良足惋嘆。

參攷資料 ●今醫家治小兒

慢驚。用天漿子有蟲者。日晷蠶。乾蠟。三物。各三枚。微炒搗末。煎麻黃湯調服一字。日三服。加減大有效也。

蘇頌 雀蟲打破。取汁。與小兒飲。令無疾。小兒病。撮口者。漸漸口撮。不得飲乳。但先將口傍見血。以麴研汁塗之。或同鼠婦生搗塗之。(陳藏器)

【雀翹】 (別錄) **古鑑別名** 去母。更生。

產地 生藍中。

形態 雀翹為溼草類之一種。葉細黃。莖亦有刺。四月結實。銳黃中黑。可供藥用。

採取 五月採。陰乾用。

性質 鹹。無毒。

主治 益氣明目。

【雀醫草】 (別錄) **古鑑別名** 白氣。

形態 雀醫草為雜草類之一種。春生莖葉。秋開白花。冬結黑實。可供藥用。

性質 苦。無毒。

主治 洗爛瘡。療風水。益氣。輕身。

【雀鶴】 即甘露之古鑑別名。典見

杜鎬。詳「甘露」條。

【雀婢射】 即石斛莖。如雀婢葉生莖端者。詳「石斛」條。

【雀蘇】 即白丁香之古鑑別名。典見炮炙論。詳「白丁香」條。

【雀癰】 即雀癰之古鑑別名。典見綱目拾遺。詳「雀癰」條。

【雀鷹】 即鷓鴣之古鑑別名。典見陸璣詩疏。詳「鷓鴣」條。

【牻牛兒】 (別錄) **古鑑別名** 門牛兒。風露草。神輿草。(和漢藥考)

外國名詞 Herba Geranii (Herb. Germ. (拉))

基本 屬牻牛兒科。為牻牛兒之莖葉。



牻牛兒

形態 牻牛兒蔓生地上。莖帶茸毛。經冬不枯。初年莖細軟。至二年則粗硬。葉對生。大寸許。作掌狀。分裂。邊緣有鋸齒。葉面生有紫黑

斑點。夏日於葉間開略似梅花之花。色有白紅及淡紅等。花後結莢。實熟則縱裂為五。散布種子。其狀如神輿之歲。故一名神輿草。

一二六二

成分 此草含右萘蒽為加煙。休酸及普通資加煙質。

效能 為民間藥。濃煎。用治痢。

【雪朮】 即玉朮之別名。為朮種之最上品。性質功能。較尋常之朮尤勝。參見「白朮」條。

【雪如來】 即白芨之古鑑別名。典見和漢藥考。詳「白芨」條。

【雪芝】 **基本** 本品芝之為冰雪所結。歲久蒸積而成者。

產地 多生陰崖絕壁間。及衡岳諸地。

形態 雪芝為芝類之一種。晶瑩如玉。懸挂峻坡。非攀蘿捫級不可擷取。取得可供藥用。

主治 療肺疾。降火清心。

【雪花】 即瑞雪花之古鑑別名。典見綱目拾遺。詳「瑞雪花」條。

【雪花石羔】 即石膏之細粒相集

〔綱目拾遺〕

產地 生海中石間。

形態 雀梅爲雜草類之一種。葉似薔薇。實如梅而小。其有樹生者。枝不蔓曲。高大而不結。名山雀梅。其葉均可供藥用。

二三花成。有長芒。其葉細長而尖。有平行脈。葉柄作鞘狀。結實亦成穗。細長而疏。其子實可供藥用。

性質 酸寒。有毒。

主治 蝕惡瘡。治癰腫。濕熱解毒。療便毒。乳癰。

雀梅子 卽郁李仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳「郁李仁」條。

雀梅仁 卽郁李仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳「郁李仁」條。

雀麥 本品乃野麥爲燕雀所食。故名。

雀麥 卽郁李仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳「郁李仁」條。

雀麥 卽郁李仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳「郁李仁」條。

雀麥 卽郁李仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳「郁李仁」條。

雀麥 卽郁李仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳「郁李仁」條。

雀麥 卽郁李仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳「郁李仁」條。

雀麥 卽郁李仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳「郁李仁」條。

雀麥 卽郁李仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳「郁李仁」條。

雀麥 卽郁李仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳「郁李仁」條。

雀麥 卽郁李仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳「郁李仁」條。

雀麥 卽郁李仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳「郁李仁」條。

雀麥 卽郁李仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳「郁李仁」條。

雀麥 卽郁李仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳「郁李仁」條。

雀麥 卽郁李仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳「郁李仁」條。

雀麥 卽郁李仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳「郁李仁」條。



雀麥

性質 甘平。無毒。

主治 充饑。滑腸。

雀麥 卽郁李仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳「郁李仁」條。

雀麥 卽郁李仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳「郁李仁」條。

雀麥 卽郁李仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳「郁李仁」條。

雀麥 卽郁李仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳「郁李仁」條。

雀麥 卽郁李仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳「郁李仁」條。

雀麥 卽郁李仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳「郁李仁」條。

雀麥 卽郁李仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳「郁李仁」條。

雀麥 卽郁李仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳「郁李仁」條。

雀麥 卽郁李仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳「郁李仁」條。

雀麥 卽郁李仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳「郁李仁」條。

雀麥 卽郁李仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳「郁李仁」條。

雀麥 卽郁李仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳「郁李仁」條。

雀麥 卽郁李仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳「郁李仁」條。

雀麥 卽郁李仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳「郁李仁」條。

用一具。煮汁服。或燒灰米飲調服。

雀麥苗 性質 甘平。無毒。

主治 難產。胎死腹中。胞衣不下。煮汁飲之。

雀粟 卽九熟草之古籍別名。典見別錄。詳「九熟草」條。

雀脾斛 卽石斛之古籍別名。典見和漢藥考。詳「石斛」條。

雀腦 主治 綿裹塞耳。治聾。

雀腦 燒灰。油塗凍瘡。

雀腦香 卽香附子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「香附子」條。

雀鼠 卽鼯鼠之古籍別名。典見埤雅。詳「鼯鼠」條。

雀煤 卽郁李仁之古籍別名。典見陸璣詩疏。詳「郁李仁」條。

雀瓢 卽羅摩質之古籍別名。典見陸璣詩疏。詳「羅摩」條。

女青之古籍別名。典見本經。詳「女青」條。

雀頭血 主治 雀盲。以血點之。

雀頭香 卽香附子之古籍別名。典見唐本草。詳「香附子」條。

雀虱 本品卽毛蟲所作之繭。形如蠶而雀喜

故月事衰少不來。治之以烏鰂魚骨。蘭茹二物。并合之。丸以雀卵。大如小豆。以五丸爲後飯飲鮑魚汁。以利腸中。及傷肝也。飯後藥先爲後飯。本草三藥。並不治血枯。而經法用之。是攻其所生所起耳。〔蘇頌〕

今人知雀卵。能益男子陽虛。不知能治女子血枯。蓋雀卵益精血耳。〔李時珍〕

雀肝 主治 腎虛。陽弱。

雀角花 卽雀麥之古籍別名。典見綱目。詳「雀麥」條。

雀兒臥草 卽地錦草之古籍別名。典見綱目。詳「地錦草」條。

雀兒酥 卽胡頹子之古籍別名。典見雷公炮炙論。詳「胡頹子」條。

雀兒銀錢 卽雀麥之古籍別名。典見蜀本草。詳「雀麥」條。

雀兒酸 卽酢漿草之古籍別名。典見綱目。詳「酢漿草」條。

雀林草 卽酢漿草之古籍別名。典見綱目。詳「酢漿草」條。

雀梅 命名 本品實形如梅。故名。

雀梅別名 千雀。〔別錄〕爵梅。

十一畫 雀

雀麥 卽郁李仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳「郁李仁」條。

雀麥 卽郁李仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳「郁李仁」條。

雀麥 卽郁李仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳「郁李仁」條。

雀麥 卽郁李仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳「郁李仁」條。

雀麥 卽郁李仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳「郁李仁」條。

雀麥 卽郁李仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳「郁李仁」條。

雀麥 卽郁李仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳「郁李仁」條。

雀麥 卽郁李仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳「郁李仁」條。

雀麥 卽郁李仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳「郁李仁」條。

雀麥 卽郁李仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳「郁李仁」條。

雀麥 卽郁李仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳「郁李仁」條。

雀麥 卽郁李仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳「郁李仁」條。

雀麥 卽郁李仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳「郁李仁」條。

【陸虎遺生】即龍骨之古籍別名。典見和漢藥考。詳「龍骨」條。

古籍別名 華草（別錄）榮（不榮而實者）

秀榮。榮而不實者。英（爾雅）基本。係忍冬科接骨木屬。爲陸英之根葉。

產地 熊耳川谷。及宛句諸田野間均有出之。

形態 陸英爲藤草類之一種。春生莖有節節間生枝葉大似水芹。花形如薔薇園中植者莖高大而色赤。立秋前後採其枝葉可供藥用。

性質 苦寒。無毒。

效能 除煩解悶。降濁開鬱。利尿消腫。祛溼療風。

主治 骨間諸痺。四肢拘攣。膝寒酸痛。陰痿腳腫。短氣不足。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論陸英曰。陸英能解風毒。及脚氣上衝。心煩悶絕。水氣虛腫。風癰皮肌惡痒等症。煎湯入少酒浴之妙。

參攷資料 陸英即薔薇也。古方無薔薇。惟言陸英。後人不識。

浪出薔薇條。此葉似芹。又似接骨花。三物亦同爲一類。故芹名水英。此名陸英。接骨名木英。此三英也。

花葉並相似。蘇恭。蘇恭以陸英薔薇爲一物。今詳陸英味苦寒無毒。薔薇味酸溫有毒。既此不同。難爲一種。蓋其類爾（馬志）。薔薇與陸英。性味及出產皆不同。治療又各有分別。自是二物。斷無可疑（寇宗奭）

【雀】 命名 雀字從小從隹。隹音錐。短尾也。蓋謂短尾小鳥故名。


古籍別名 瓦雀。資雀。老而有斑紋者名麻雀。小而黃口者名黃雀。嘉賓（綱目）

外國名詞 Passer mon-fanus Inn（拉丁）Sparrow 或 Tree-sparrow（英）Spelling（德）

基本 係有椎動物鳥類鳴禽類雀科。

產地 穴居樹洞。及屋簷瓦隙間處處有之。

形態 雀爲原禽類鳥屬之一種。頭圓尾短。嘴爲圓錐狀。色黑。頭頂及頸。都爲胡桃色。兼褐色。頸之兩旁白色。中央有大黑斑。背面概褐色。多黑褐斑。下面除喉部黑色。外概灰色。翼基緣有黑斑。每足四趾。前三後一。能跳行地上。體長二三寸。性狡猾。所產之卵有花斑。其肉可供藥用。



雀

頂及頸。都爲胡桃色。兼褐色。頸之兩旁白色。中央有大黑斑。背面概褐色。多黑褐斑。下面除喉部黑色。外概灰色。翼基緣有黑斑。每足四趾。前三後一。能跳行地上。體長二三寸。性狡猾。所產之卵有花斑。其肉可供藥用。

性質 甘。溫。無毒。

主治 冬三月食之。起陽道。令人有子。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論雀肉曰。益精髓。縮五臟。氣不足宜常食之。不可停輟。宋日華諸家本草論雀肉曰。壯陽益氣。暖腰膝。縮小便。治血崩帶下。

參攷資料 正月以前十月以後。宜食之。取其陰陽靜定未泄也。故卵亦取第一番者（寇宗奭）

今人取雀肉。和蛇牀子熬膏。和藥丸服。補下有效。謂之驛馬丸。此法起於唐世。云明皇常服之。有驗（蘇頌）。聖濟總錄治虛寒雀附丸。用肥雀肉三四十枚。同附子熬膏。丸藥亦祖此意也（李時珍）。雀肉不可合李食。及與諸肝食。妊婦食雀肉飲酒。令子多淫。食雀肉豆醬。令子面黧。凡服白朮人忌之（陶弘景）

【雀卵】 採取 五月採之。

性質 酸。溫。無毒。

主治 下氣。男子陰痿不起。強之令熱。多精有子。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論雀卵曰。和天雄莧絲子末爲丸。空心酒下。五丸。治男子陰痿不起。女子帶下。便溺不利。除疝瘕。

參攷資料 雀利陰陽。故卵亦然。術云。雀卵和天雄服之。令莖不衰（陶弘景）。按素問云。胸脇支滿者。妨於食。病至則先開膈。臭出清液。先唾血。四肢清。目眩時時前後血病。名血枯。得之年少時有所大脫血。若醉入房中。氣竭肝傷。

參攷資料 雀利陰陽。故卵亦然。術云。雀卵和天雄服之。令莖不衰（陶弘景）。按素問云。胸脇支滿者。妨於食。病至則先開膈。臭出清液。先唾血。四肢清。目眩時時前後血病。名血枯。得之年少時有所大脫血。若醉入房中。氣竭肝傷。

參攷資料 雀利陰陽。故卵亦然。術云。雀卵和天雄服之。令莖不衰（陶弘景）。按素問云。胸脇支滿者。妨於食。病至則先開膈。臭出清液。先唾血。四肢清。目眩時時前後血病。名血枯。得之年少時有所大脫血。若醉入房中。氣竭肝傷。

養成之飯。少黏力。味淡白。易消化。恐非由糊精增加所致云。又和漢藥考曰。將寒製餅貯藏水中。(時時換水)謂之水餅。患痢疾時。煮食之有奇效云。又東京市淺草區須賀町之須賀神社。每年大祭。製有小團子。置竹篋。供神前後分配於市民。夏日有吐瀉者。煮晒乾之。笹園子食之則愈云。此等物之功效。或與陳廩米相同云。

配合應用 ①治霍亂大渴能殺人。以黃倉米三升。水一斗。煮汁澄清飲良。(永類鈴方)

②治反胃膈氣不下食者。大倉散。用倉米或白米。日西時以水微拌。漚自想日氣如在米中。次日晒乾。袋盛掛風處。每以一撮水煎和汁飲之。即時便下。又方。陳倉米炊飯焙研。每五兩入沉香末半兩。和勻。每米飲服二三錢。(普濟方)

③治諸積聚。太倉丸。治脾胃饑飽。不時生病。及諸般積聚。百物所傷。陳倉米四兩。以巴豆二十一粒。去皮同炒。至米香豆黑。勿令米焦。擇去豆不用。入去白橘皮四兩。爲末。糊丸。梧子大。每薑湯服五丸。日

二服。(百一選方)

④治暑月吐瀉。陳倉米二升。麥芽四兩。黃連四兩。切同蒸熟。焙研爲末。水丸。梧子大。每服百丸。白湯送下。

用量 三錢至五錢。

參攷資料 ①貝原益軒翁有

用新米變陳米法。法將粳米浸水一日取出。晒一日。如是七八次。則成陳米云。②陳倉米煮汁不渾。初時氣味俱盡。故沖淡可以養胃。古人多以煮汁煎藥。亦取其調腸胃利小便去溼熱之功也。千金方治洞注下利。炒此米研末飲服者。亦取此義。日華子謂其瀉腸胃。寇氏謂其冷利。皆非中論(李時珍)③有屋曰廩。無屋曰倉。皆宜積也。方曰倉。圓曰困。皆私積也。老亦陳也。火米有三。有火蒸治成者。有火燒治成者。又有畚田火米。與此不同。(李時珍)④陳廩米即粳米久入倉陳赤者。以廩軍人。故曰廩。爾方中多用之人。以作醋。勝於新粳米也。(陶弘景)⑤廩米北人多用。粟南人多用。粳及秬並水浸蒸晒爲之。亦有火燒過治成者。入倉陳久

皆氣過色變。故古人謂之紅粟。紅廩。陳陳相因也。(李時珍)⑥朱公米。南中紀聞。靖州南二十里飛山。岩相傳爲元末朱都督屯兵之所。牆壁時有米粒色微黑而不腐。云是朱公所遺兵糧。游客謁神祠取輒得之。至今尙存。療脾疾。(趙學敏)

【陳麴】即神麴之俗名。詳「神麴」條。

【陳膽星】即天南星之處方用名。詳「天南星」條。

【陵石】 基本 陵石爲石類之一種。可供藥用。

性質 甘。無毒。

主治 益氣耐寒。久服輕身長年。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論陵石曰。治汗後耳聾。取有竅如銀眼者。爲末冷水服。

【陵石】即路石之古籍別名。典見別錄。詳「路石」條。

【陵君花】即凌霄花之古籍別名。典見本經。詳「凌霄花」條。

【陵耶】即苦參之古籍別名。典見和漢藥考。詳「苦參」條。

【陵時花】即凌霄花之古籍別名。典見山海經。詳「凌霄花」條。

【陵馬】即車前草之古籍別名。典見和漢藥考。詳「車前草」條。

【陵渴】即赤舉之古籍別名。典見別錄。詳「赤舉」條。

【陵游】即龍膽之古籍別名。典見本經。詳「龍膽」條。

【陵澤】即甘遂之古籍別名。典見別錄。詳「甘遂」條。

【陵龜】即攝龜之古籍別名。典見郭璞賦。詳「攝龜」條。

【陵蕓】即甘遂之古籍別名。典見吳普本草。詳「甘遂」條。

【陵鯉甲】即穿山甲之古籍別名。典見和漢藥考。詳「穿山甲」條。

【陵蠶】即蛭蟪之古籍別名。典見本經。詳「蛭蟪」條。

【陵蕓】即蓬蘽之古籍別名。典見別錄。詳「蓬蘽」條。

【陵公英】即蒲公英之古籍別名。典見別錄。詳「蒲公英」條。

【陵荊子】即覆盆子之古籍別名。典見綱目。詳「覆盆子」條。

【陵續丸】即蔓荊子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蔓荊子」條。

【陳棗核仁】

性實 燂之苦。平。無毒。

主治 腹痛邪氣。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食

療本草論陳棗核仁曰惡氣卒注

竹【明】李時珍本草綱目論陳棗

核仁曰核燒研搗壓瘡良

參攷資料 按劉根別傳云道

士陳孜如痴人江夏袁仲陽敬事

之效曰今春嘗有疾可服棗核中

仁二十七枚後果大病服之而愈

又云常服棗仁百邪不復干也仲

陽服之有效則棗果有治邪之說

矣又道書云常含棗核治氣令口

行津液嚙之佳謝承後漢書亦云

孟節能含棗核不食可至十年也

此皆藉棗以生津受氣而嚙之又

能達黃宮以交離坎之義耳（李

時珍）

【陳蒨殼】即蜜盧之處方用名。詳

『蜜盧』條。

【陳墨】即墨之處方用名。詳『墨

條。

【陳廣皮】即橘皮之處方用名。詳

『橘皮』條。

【陳橘皮】即橘皮之處方用名。詳

『橘皮』條。

【陳廩米】

原名 陳倉米。命名 本品係粳米

久入倉中而又陳赤者故名。

處方用名 陳米。

古籍別名 老米。火米。紅粟。（

綱目）

外國名詞 Old rice.（英）

基本 係貯藏倉中十年以上

之粳米。

形態 陳倉米爲入倉之粳米。

北人有用粟者陳久則氣味變而

色亦不潔澤與新米大相懸殊

製法 生研或微炒用。

性質 鹹酸溫無毒。

效能 補腸胃止洩痢。

主治 下氣除煩渴調胃止洩。

歷代記述攷證 【唐】陳士良

食性本草論陳倉米曰暖脾去饑

氣宜作湯食【唐】孟詵食療本草

論陳倉米曰炊飯食止痢補中益

氣堅筋骨通血脈起陽道以飯和

酢搗封毒腫惡瘡立瘳北人以飯

置甕中水浸令酸食之暖五臟六

腑之氣研米服去卒心痛【宋】大

明日華諸家本草論陳倉米曰補

五臟瀝腸胃【明】李時珍本草綱

目論陳倉米曰調腸胃利小便止

渴除熱【清】黃宮繡本草求真論

陳倉米曰陳倉米即米多年陳積

於倉而未用者也凡米存積未久

則性仍在未革煮汁則膠黏不爽

食亦壅滯不消至於熱痢將愈胃

氣未復猶忌食物戀膈熱與食鬱

而煩以生必得沖淡甘平以爲調

劑則胃乃通陳米津液既枯氣味

亦變服之正能養胃除熱祛煩是

以古人載此既有煮汁養胃之功

復有祛滯除煩之力一切惡瘡百

藥不效者用此作飯成團火煨存

性麻油膩粉調敷可知沖淡和平

力雖稍遜而功則大未可忽也若

無病之時用此日爲飽飯則又未

見其克合也【清】寧原食鑑本草

論陳倉米曰寬中消食多食易饑

【清】楊時泰本草述鈞元論陳倉

米曰陳廩米氣味俱盡還歸於淡

淡能滲瀉爲五味主可以養胃氣

且化滯熱又可以裕脾陰方書主

治瀉利居多以下多則亡陰而茲

味不越於養脾胃之陰而已如治

吐利後大渴不止固於脾胃之陰

氣兼裨矣。至如倉廩湯主療痢下

瘳此因胃氣虛而熱藥之故用

麥苓乃以羌獨柴胡升達其胃氣

并散其毒氣必入陳倉米以養脾

陰使不爲熱毒所并也又如滑瀉

豆蔻飲用陳米爲君而肉蔻五味

赤脂止半之又如脾胃氣弱受寒

注瀉水穀不分或冷熱不調下利

膿血更如魚腦腸滑下數腹痛脹

滿方用木香肉蔻藥穀薑甘補脾

胃正氣而固滑卻必入陳米過倍

以大養陰氣始能奏功至於桃花

湯治霍亂後熱結下焦下利膿血

既用赤脂烏梅化血分之邪而收

脫仍以白朮炮薑升麻正脾胃之

氣亦必佐以陳米合於杏仁養脾

胃之陰而散其留熱不令其下結

也合觀數證之用豈得泛然止言

其養胃哉。

國外學說 日本明治二十五

年東京衛生試驗所以村井純之

助氏爲主任試驗陳米公表其成

續陳久之米除香味色澤發生變

化外並稍減少脂肪但其他成分

則與新米似無大差陳米來質之

變化甚爲顯著脂肪之減少亦甚

名。典見綱目。詳「玄精石」條。①

「菩薩石」之古籍別名。典見綱目。詳

「菩薩石」條。

【陰諧】即雌鳩之別名。典見綱目。詳「鳩」條。

【陰龍膏】即豬脂之古籍別名。典見和漢藥考。詳「豬脂」條。

【陰獸當門】即牛膽之古籍別名。典見和漢別考。詳「牛膽」條。

【陰藥】即蓬蘽之古籍別名。典見別錄詳「蓬蘽」條。

【陳小麥】即小麥之處方用名。詳「小麥」條。

【陳火腿骨】

性質 鹹寒。
效能 祛熱蕩

積。

主治 諸痢。腸澼。霍亂。宿積。

配合應用 ①治食積及痢取本品煨黑研用。(百草鏡方)

②治諸痢用陳火腿骨二根。炭火煨灰。篩過。加上白糖一兩。米湯飲。或滾水或酒調服。無不效。(救

生苦海方)

③治赤白痢。用陳火腿骨灰。陳皮。炙草各一兩。爲末。蜜丸。如葶豆大。空心服一錢。白痢用薑。赤痢用

白湯送下。

④又用生火腿骨。焙燥研極細末。無灰酒送下。即止(神錦方)

⑤用陳火腿骨煨灰六兩。飯鍋巴煨灰五兩。砂仁炒三兩。南山查炒五兩。共爲末。每服三錢。久痢人參湯下。紅痢紅糖湯下。白痢白糖湯下。薰痢炒焦白朮三錢。煎湯服。霍亂吐瀉。薑香湯下。(集祕方)

⑥治噤口痢。火腿骨煨一兩。蓮肉二兩。木香七錢。烏梅三錢。醋糊爲丸。桐子大。每服七丸。蠶絲湯下。(筆珠萃方)

⑦陳年火腿骨。煨黑色。研末三錢。用火肉一斤。煮熟。去汁上肥油。取清湯一碗。又將此末送下。(不藥良方)

⑧治小兒臘梨瘡。陳火腿骨燒灰。如瘡加礬少許。麻油調敷。不生髮。用老薑擦。(販翁醫要方)

【陳元參】即玄參之處方用名。詳「玄參」條。

【陳玄】即墨之古籍別名。典見綱目。詳「墨」條。

【陳皮】即橘皮之處方用名。詳「橘皮」條。

②即橙皮之古籍別名。

典見新中藥。詳「橙皮」條。

【陳平珍果】即胡桃之古籍別名。典見和漢藥考。詳「胡桃」條。

【陳米】即陳廩米之處方用名。詳「陳廩米」條。

【陳艾絨】即艾葉之處方用名。詳「艾葉」條。

【陳阿膠】即阿膠陳久之處方用名。詳「阿膠」條。

【陳芫花】即芫花之處方用名。詳「芫花」條。

【陳知白】即何首烏之古籍別名。典見開寶本草。詳「何首烏」條。

【陳青黛】即青黛之處方用名。詳「青黛」條。

【陳思炭】古醫別名 石黃香。千金藤(綱目拾遺)

產地 生嶺南山野間。

形態 陳思炭爲蔓草類之一種。莖蔓生。如小豆根及葉氣甚辛香。其根可供藥用。

性質 辛平。無毒。

主治 解諸藥毒。熱毒。丹毒。癰腫瘡毒。壯熱喉痺。蟲毒。磨汁服。亦塗瘡腫。

歷代記述攷證 【唐】李珣海

藥本草論陳思炭曰。祛風。補益輕身。酒浸服。

【陳家白藥】 形態 陳家白藥爲蔓草類之一種。相傳謂蒼梧爲陳家所植。蔓似土瓜。葉如錢。其根似防己。可供藥用。

採取 以緊小者良。

性質 苦寒。無毒。

主治 解諸藥毒。水研服。必吐。未盡再服。並去心胸煩熱。天行瘟瘧。

參攷資料 ①陳家白藥。與婆羅門白藥。及赤藥功用相似。(陳藏器) ②陳家白藥。善解毒。爲諸藥所不及。(李時珍)

【陳香薷】即香薷之處方用名。詳「香薷」條。

【陳枳殼】即枳殼之處方用名。詳「枳殼」條。

【陳枳實】即枳實之處方用名。詳「枳實」條。

【陳倉米】即陳廩米之原名。詳「陳廩米」條。

【陳黃肉】即山茱萸之處方用名。詳「山茱萸」條。

十一 壹 陰 陳

一二五七

十一畫 野

釣 釣 陰

【野薑】即蔞參之古籍別名。典見蔞參新研究。詳「蔞參」條。

【野蘭】即漏蘆之古籍別名。典見本經詳「漏蘆」條。

【野蘭根】形態 野蘭爲石草類之一種。高二尺有餘。四時有葉無花。其根可供藥用。

性質 微苦。溫。無毒。

主治 功同崖樓根。

【野蘿蔔】原命 野萊菔。古籍別名 紫金皮。

巴壁虎。山蘿蔔。(綱目拾遺)

形態 野蘿蔔爲萊菔之一種。苗葉根形與家種者無異。惟肉雖白。而皮則帶黃爲不同。其根可供藥用。



野 蘿 萄

性質 寒。無毒。

主治 肺癰。搗汁服。並療癰疽。渣薄亦可。

【野薑豆】即翹搖之古籍別名。典見綱目。詳「翹搖」條。

【釣樟】即烏樟之原名。詳「烏樟」條。

【釣瓢】即王瓜之古籍別名。典見和漢藥考。詳「王瓜」條。

【釣藤鈎】即鈎藤之古籍別名。典見和漢藥考。詳「鈎藤」條。

【釵子股】命名 石斛名金釵。花本品狀似之。故名。

古籍別名 金釵股。棒蘭。(海藥)三十根。(綱目)

外國名詞 *Luizia terree*, *巴(拉丁)* *パウラン* *イッラン* (日本)

基本 係蘭科釵子股屬。爲 *Orchidaceae* 之根。

產地 凡熱帶地方川粵諸省之山野均有出。

形態 釵子股爲山草類之寄生老樹上常綠草本。莖高至尺餘。葉形如筍。夏月葉腋開花。淡黃綠色。有暗紅色之斑點。其根每莖有三四十根。形如細辛。採得可供藥用。

性質 苦。平。無毒。

主治 解毒。癰疽神驗。以水煎服。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論釵子股曰。解諸藥毒。煮汁服。亦生研。更烈。必大吐下。如無毒。亦吐去熱痰癰瘡。天行蟲毒喉痺。

參攷資料 ①忠州。萬州者亦佳。草莖功力相似。綠嶺南多毒。家貯之。(李珣) ②按嶺表錄云。廣中多蟲毒。彼人以草藥金釵股治之。十救七八。其狀如石斛也。又忍冬藤解毒。亦號金釵股。與此同名云。(李時珍)

【陰土鹽】即戎鹽之古籍別名。典見綱目。詳「戎鹽」條。

【陰地蕨】古籍別名 花蕨。(植物學大辭典)

外國名詞 *Botrychium terreeatum*, *Sw. (拉丁)* *ハナワラ* *ヒフコノハナワラビ* *フコワラビ* *ヒカゲワラビ* *トコワラビ* (日本)

基本 係瓶爾小草科。爲陰地蕨屬之根苗。

產地 多產山野間。

形態 陰地蕨爲溼草類之多。年宿根草本。高五六寸。葉數回羽狀分裂。呈黃綠色。每一葉則抽一穗。若生多數之子囊。根如細辛。苗與葉俱可供藥用。

性質 甘。苦。微寒。無毒。

主治 腫毒風熱。

參攷資料 ①生鄧州順陽縣內鄉山谷。葉似青蒿。葉青紫色。花作小穗。微黃。根似細辛。七月採根用。(蘇頌) ②江浙亦有之。外家採制丹砂硫黃。(李時珍) ③男女吐血後胸膈虛熱。陰地蕨。紫荷草。貫衆。甘草各半兩。水煎服。每服三錢。(聖濟總錄方)

【陰成】即菊花之古籍別名。典見別錄。詳「菊花」條。

【陰成砂】即磁砂之古籍別名。典見雷公炮炙論。詳「磁砂」條。

【陰澤】即雞澤之古籍別名。典見別錄。詳「雞澤」條。

【陰飛】即姑獲鳥之古籍別名。典見玄中記。詳「姑獲鳥」條。

【陰陽水】即生熟水之古籍別名。典見綱目。詳「生熟水」條。

【陰陽草】即眞珠草之古籍別名。典見綱目。詳「眞珠草」條。

【陰精石】①即玄精石之古籍別名。狀分裂。呈黃綠色。每一葉則抽一穗。若生多數之子囊。根如細辛。苗與葉俱可供藥用。

性質 甘。苦。微寒。無毒。

主治 腫毒風熱。

參攷資料 ①生鄧州順陽縣內鄉山谷。葉似青蒿。葉青紫色。花作小穗。微黃。根似細辛。七月採根用。(蘇頌) ②江浙亦有之。外家採制丹砂硫黃。(李時珍) ③男女吐血後胸膈虛熱。陰地蕨。紫荷草。貫衆。甘草各半兩。水煎服。每服三錢。(聖濟總錄方)

【野豬尾】 產地 生山野間。形態 野豬尾爲蔓草類藤屬之一種。莖繞木上。四時不凋。有葉無花。莖根可供藥用。

性質 苦澆涼。無毒。
主治 心氣痛。解熱毒。同百藥頭等分焙研爲末。每酒服二錢。

【野豬脂】 採取 臘月採煉。服之。
主治 鍊淨和酒日三服。令婦人多乳。十日後可供三四兒。素無乳者亦下。

歷代記述攷證 【宋】日華諸家本草論野豬脂曰。悅色。除風腫毒。治疥癬。

【野豬陰卵】 即野豬外腎之原名。詳「野豬外腎」條。

【野豬黃】 性質 甘平。無毒。
主治 金瘡止血。生肉。療癰疽。水研如棗核許。服之日二服效。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論野豬黃曰。研水服治血痢。症病。【宋】日華諸家本草論野豬黃曰。治惡毒風。小兒肝氣客忤。天甲。

【野豬齒】 主治 燒灰水服。治蛇咬毒。
主治 邪癰。及積年下血。

【野豬頭骨】 主治 惡熱毒氣。
歷代記述攷證

【野豬膽】 主治 惡熱毒氣。
歷代記述攷證

【明】李時珍本草綱目論野豬膽曰。治鬼疰。癰疽。小兒諸疳。水研棗裹服。

【野靛青】 古籍別名 鴨青。形態 如莧菜。葉尖中心有青暈。
主治 結熱黃疸。定瘡毒疼痛。

生肌長肉。
【野貓】 即貓狸之古籍別名。典見綱目。詳「貓狸」條。

【野鴨】 即鴨之古籍別名。典見陸機詩疏。詳「鴨」條。

【野樸】 即厚樸之處方用名。詳「厚樸」條。

【野薔薇】 命名 本品爲薔薇之野生者。故名。
古籍別名 石珊瑚。

產地 山野及籬落間有之。
形態 野薔薇爲薔薇類之一種。其葉細而花小。莖本蔓生多刺。

花有粉紅純白純紅等色。皆單瓣。氣香而甜。似玫瑰。其花可供藥用。根。枝。子。花。露。詳見各該條。



(一) 薔薇



(二) 薔薇

主治 瘰癧。以白色含蕊者并茶煎服。又治婦人鬱結吐血。
參攷資料 薔薇花香烈。大耗真氣。虛人忌之。(綱目拾遺)

【野薔薇子】 主治 產後瘕瘕。

【野薔薇枝】 主治 婦人禿髮。以嫩枝同猴薑煎汁刷之。

【野薔薇花露】 基本 本品即川野薔薇花蒸取之露。

主治 散風熱。利溼濁。醒胃悅脾。療口疳口糜。止消渴牙痛。並治腫毒瘡癰。

【野薔薇根】 主治 肺癰吐。膿痰。酒煎服口瘡煎湯漱之。

【野螺螄】 即蝸牛之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蝸牛」條。

【野鴿】 形態 係鴿之原種。全體毛色。較尋常家鴿稍爲暗褐。惟背之中央爲灰白。頭及胸有紫綠色之光澤。羣棲於山野森林之中。出食田禾。爲農家之害鳥。

效能 性質功能。較家鴿略遜。參詳「鴿」條。

【野雞斑】 即杉材之古籍別名。典見綱目。詳「杉材」條。

【野雞】 即雉之古籍別名。典見綱目。詳「雉」條。

【野雞冠子】 即青葙子之古籍別名。典見綱目。詳「青葙子」條。

【野雞頭子】 即青葙子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「青葙子」條。

【野鷄】 即鷄之古籍別名。典見陸機詩疏。詳「鷄」條。

【朱實亭】◎慈乃蓮子之心。此物

味苦似之。故與之同名。(李時珍)

◎苦慈生於澤畔。莖如馬蘭。花如

菊。菊甘而慈苦。語曰。苦如慈是也。

(陳藏器)◎苦慈原野極多。與菊

無異。但葉薄小。而多尖。花小而莖

多如峰窠狀。氣味苦辛。慘烈。(李

時珍)

【野菊根】

主治 善利水。通經

閉。搗汁和酒服。癰癰

【野菊根葉】

主治 癰腫疔

毒。爲外科要藥。

配合應用 治癰癰未破。用

野菊花根煎酒熱服。以渣敷貼自

消。(經驗方)

治癰腫疔毒。用野菊花連根

帶葉搗爛煎酒熱服。取汗。以渣敷

貼。或用蒼耳同入(孫氏治毒方)

【野萊菔】即野蘿蔔之原名。詳『

野蘿蔔』條。

【野雁】即鵠之別名。典見動物學

大辭典。詳『鵠』條。

【野園葵】即石胡荽之古籍別名。

典見綱目。詳『石胡荽』條。

詳『野菊花』條。

【野黃楊】即接骨木之古籍別名。

典見和漢藥考。詳『接骨木』條。

【野萱花】即射干之古籍別名。典

見綱目。詳『射干』條。

【野葛】即鉤吻之古籍別名。典見

本經。詳『鉤吻』條。

【野葡萄】即蔓莖之俗名。詳『蔓

莖』條。

【野葱】即沙葱之古籍別名。典見

綱目拾遺。詳『沙葱』條。

【野葵】即紫給之古籍別名。典見

別錄。詳『紫給』條。

【野落蘇】即蒼耳子之古籍別名。

典見和漢藥考。詳『蒼耳子』條。

【野慈姑】即澤瀉之古籍別名。典

見綱目。詳『澤瀉』條。

【野槐】即苦參之古籍別名。典見

綱目。詳『苦參』條。

【野蒜】即山蒜之古籍別名。典見

和漢藥考。詳『山蒜』條。

【野管根】即白茅根之古籍別名。

典見和漢藥考。詳『白茅根』條。

【野綠豆】即鹿藿之古籍別名。典

見綱目。詳『鹿藿』條。

別錄。詳『知母』條。

【野菱】即菱之結實。最小角形。極

鉅者。性質功能較尋常菱爲遜。詳

『菱』條。

【野薤】即薤之俗名。詳『薤』條。

【野豌豆】即薇之古籍別名。典見

綱目。詳『薇』條。

【野蕎麥】即金鎖銀開之古籍別

名。典見李氏草祕。詳『金鎖銀開』

條。

【野豬】 命名 本品即豬之野

生者故名。

外國名詞 Sus leucomystax

Temm. (Wild boar) (拉丁)

イノシシ或井ノシシ(日本)

基本 係脊椎動物哺乳類有

胎盤類有蹄類不反芻偶蹄類野

豬科

產地 出山林中。原野亦有之。

形態 野豬爲獸類家畜豬之

原種。其體肥大而強壯。前部尤健。

頭部爲楔狀。頸部不顯。不能回顧。

面部長吻。端有鼻孔。耳短小直立。

能動。齒有門。犬。臼三種。犬牙甚發

達在上顎者。向下鈎曲。在下顎者

被黑色粗毛。堅硬如針。四肢短。各

有四趾。尾短小。生叢毛。體長四五

尺。晝伏夜出。覓食。其肉可供食與

藥用。

性質 甘。平。無毒。

主治 癰癰補肌膚。益五臟。令

人虛肥。不發風虛氣。

歷代記述攷證 【宋】日華諸

家本草論野豬肉曰。炙食治腸風

瀉血。不過十頓。

參攷資料 野豬肉微動風。

(寇宗奭) 野豬肉不發病。即減

藥力。與家豬肉不同。但青蹄者不

可食。微動風。(孟詵) 野豬虎處

深山中。有之。惟關西者。時或有黃

其形似豬而大。牙出口外。如獠牙

其肉有至二三百斤者。能與虎鬪

或云能掠松脂。曳沙泥。塗身以禦

矢也。最害田稼。亦咬蛇。凡服巴

豆藥者忌之。(李時珍)

【野豬皮】 主治 燒灰。塗風瘡

惡瘡。

原名 野豬陰

卵。 主治 連皮燒存性。研米飲服。

治崩中帶下及腸風瀉血血痢。

將藥入砂鍋煎至二十兩。以細絹濾去渣。用大銀碗一個。盛藥碗下。以磚三塊。放定碗底。將燈盞注麻油。用燈草七根。燃燈熏碗底。內煎藥成膏。滴水成珠。每膏一兩。用野葶薺粉五錢。多些亦不妨。冰片三分。和勻作錠。如多年厚腎。每兩加水飛過。輝退未五分。須要去頭足泥沙。水洗曬乾。爲末。水飛三次。用。明目去翳秘方。又方。野葶薺粉。豬胰各等分。搗和。用雞子殼半個。放藥在內。臨臥合印堂上。俟水流入目中。腎隨淚出。二十日即愈。并治田螺頭眼。

配合宜忌 忌鐵器。

參攷資料 野葶薺較產池澤者力尤峻利。故點眼。去翳障如神。(趙學敏)

【野薺】係薺之野生者。柔莖細葉。生即結子。作菜食。味比家薺更勝。性質功能。與薺菜同。參詳「薺」條。【野麥】即雀麥之古籍別名。與見綱目詳「雀麥」條。

【野梨】●即棠梨之古籍別名。與見綱目詳「棠梨」條。●即啞梨之古籍別名。與見綱目詳「鹿梨」條。

十一 薑 野

【野椒】即崖椒之古籍別名。與見綱目詳「崖椒」條。

【野薺】即薺之別名。管薺係白茅之一種。性質功能。參詳「白茅」條。

【野菊】即野菊花之處方用名。詳「野菊花」條。

命名 本品自生於原野。而形似菊。故名。

處方用名 野菊。野薺。黃菊。黃菊。

古籍別名 苦薺。(綱目) 油菊。(日本)

外國名詞 Chrysanthemum indicum, L. (拉丁) アブラ

キク (日本)

基本 係菊科菊屬。爲野菊之花。

產地 多在山野平原間。



(一) 花 菊 野

形態 野菊爲濕草類之多年生草本。莖多分枝。高三四尺。葉與

菊相似。但花較小。其葉有深缺刻及細鋸齒等。則與菊不同。晚秋。枝梢間花作頭狀花序。花黃色。外圍之花。作舌狀花冠。中部之花。作筒狀花冠。其舌狀花冠。較花柱長數倍。果實無冠毛。其花莖葉根。俱可供藥用。



(二) 花 菊 野

性質 苦。辛。溫。有小毒。

主治 調中止洩。破血。婦人腹內宿血宜之。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論野菊花曰。治癰腫疔毒。瘰癧眼。疔。【清】黃宮繡本草求真論野菊花曰。野菊花一名苦薺。爲外科癰腫藥也。其味辛。而且苦。大能散火。散氣。故凡癰毒疔腫。癰眼。目熱。疳婦人瘀血等症。無不得此則治。以辛能散氣。苦能散火。者是也。但胃氣虛弱。切勿妄投。

近人學說 祝天一曰。菊種衆多。種類顏色各殊。多瓣者供人玩賞。單瓣者俗名滿天星。雖列爲單菊之點綴。人多賤之。又有九月間挺秀於籬叢水陰之間。開黃花大如鵝眼者。名野薺。野薺者。謂其生於原野。不受人工之栽培。而榮枯於自然也。古之菊本無家。野花都黃色。晉陶潛傷時世之不淑。棄官歸隱。見籬畔黃菊。芳香孤立。不長嚴霜。不伍衆草。慨然自比。爲之移植三徑。後人有慕逸士之風。爲蒔之於園圃。加之修剪。移灌。滋接。植諸法。於是菊之變種百出。各呈其秀。以媚主人。菊性亦遷矣。維單瓣黃菊。猶存其舊。故入藥。取單瓣黃菊。李時珍本草綱目。混苦薺爲野薺。疎矣。苦薺生澤畔間。花莖葉一如蒿薺。故鄉人呼爲野薺蒿。四五月至八九月。開黃花。形似單瓣菊。氣味辛香。揉之作膏。氣不若菊之沁芳。悅人也。味辛。苦而澀。咀之令人作嘔。不若菊之辛芳快胃也。苦薺蒿屬也。非菊類也。前人誤指爲野薺。果非。而時珍竟混其名者。更不當也。

參攷資料 ●野菊花生於山野間者。味苦。莖青。服之大傷胃氣。

十一畫 野

名精。綱目拾遺)

產地 山麓溪澗河壑岸旁土隙間多有產之。

形態 野苧麻爲麻類之一種。形狀頗似地菰立春後生苗長約尺許葉圓而尖如卵形。結子細碎根肥白無筋。搗之有滑涎可供藥用。

性質 甘涼。無毒。

效能 發散風毒。活血。止血。治渴。安胎。

主治 小兒丹毒。蟲脹崩淋。哮喘白濁。疔瘡發背。跌撲折傷。蟲螫蛇傷。

配合應用 ①教師白字亮傳。

大鱖魚一尾。獨核肥皂一個。胡椒七粒。黃梔子九個。老薑一片。蔥頭三個。野苧麻根一段。乾麵一撮。香糟一團。紹酒隨數。用同前藥合搗如泥。炒熱熨敷患處。外用布包紮。緊次日背出即愈。(跌打閃挫方)。

②徐若寧云。看咬傷處。有竅是雄蛇。無竅是雌蛇。以針挑破傷處。成竅。然後取野苧麻嫩頭搗汁。和酒服三盞。絞刺渣敷傷口。能令毒從竅中出。立愈。將渣焚去。永不復發。

發。(趙恕軒蛇咬傷方)

③治癰疽發背對口一切無名腫毒。野苧麻搗汁用無灰酒沖下。渣敷患處。露頭蓋被出汗。即出膿水全愈。(一切腫毒方)。

④日取野苧葉陰乾。曬燥搗熟。取白絨收藏。夏月遇有金刃傷者。敷之即止血。且不作膿。(救生苦海方)。

古籍別名 龍鬚草。

【野苧草】 (綱目拾遺)

產地 多生山澤水旁間。

形態 野苧草爲澤草類之一種。較席草稍細而短。清明後生苗。小滿時開花細小。其根類似竹根而黑色。可供藥用。

主治 利溼熱。治癰淋精濁。崩中淫瘕。鼻衄。疔腫。目赤。疔痛。口咽諸毒。火症。鶴膝風。齒牙疼痛。欲脫者煎飲之。

【野烏頭】 卽草烏頭野生者之別名。典見綱目。詳「草烏頭」條。

【野脂麻】 卽玄參之古籍別名。典見綱目。詳「玄參」條。

【野茴香】 卽馬薊之古籍別名。典見綱目。詳「馬薊」條。

【野馬】 **產地** 出甘肅及遼東山野中。

形態 野馬爲獸類野馬類之一種。其形似馬而小。皮可爲裘。肉可供藥用。其餘詳見該條。

性質 甘平。無毒。

主治 人病馬廂。筋脈不能自收。周痺肌肉不仁。用肉一斤。豉汁煮熟。入五味。葱白。作醃臘及羹粥。類食之。白煮亦可。

【野馬陰莖】 **性質** 酸。溫。無毒。

主治 男子陰痿。縮少。精竭。

【野馬蘭】 **命名** 本品功同馬蘭。因其野生故名。

形態 野馬蘭係蘭之一種。形似馬蘭。惟馬蘭氣味芳香。可佐蔬食。此蘭氣臭。味劣。不堪供食。三月發苗。莖赤而粗。秋開白花。成簇細碎。莖葉俱入藥用。

採取 三四月採。陰乾。

性質 寒涼。

效能 清血。

主治 溼熱蛇咬。小兒疳疔。

【野甜菜】 卽車前草之古籍別名。典見和漢藥考。詳「車前草」條。

產地 生山野土中。

【野苧薺】 **形態** 野苧薺爲苧薺之一種。春日生苗。葉三出似韭。而細。葉上有光。根如豆。入年久則愈大。性喜燥。其生必在高原。若移植園圃。一經汗溼。根即朽爛。而其生亦不易長。雖至百年。猶如錢大。其根可供藥用。

製法 採得磨粉。水中濾過。曬乾用。

主治 去目星。銘肉。面黧。斑痣。消痞。

配合應用 ①磨光散。點眼神藥。用野苧薺粉洗淨。去皮。石臼搗爛。密絹絞汁。如做藕粉法。再用清井水飛。曬乾。鹽甘石用黃連。黃柏。黃芩。甘草。薄荷。煎水。飛。更用童便煅一次。將藥水飛。曬乾。珍珠入豆腐內。煮過。研細水飛。每茶匙乾粉一兩。配製過甘石五錢。珠末三錢。各將磁瓶收貯。臨用漸漸配和。加冰片少許點之。(極靈方)。

②錦紋大黃一兩。北細辛四兩。將二味用上高泉水一百二十兩。

【野毛豆】 古籍別名 勞豆。
產地 生田藤園園間。

形態 野毛豆。爲菜類豆屬之一種。其莖葉與莢較家種者爲細小。引蔓而生。枝細弱。葉細尖。兩兩排枝對生。初生苗時。絕似金鳳花之葉狀。清明後。開灰紫細花。結莢實如毛豆。又似角蒿。中有二子。圓小。若莢豆。至小滿前後。則老黑枯落。採得可供藥用。

採取 立夏後採之。
性質 微寒。無毒。

主治 平肝火。能發汗。療目疾。小兒疳疾。黃白痘。及肝疳初起。取鮮者同雞肝煮食。解痘毒。懷存性麻油調傳。

【野朮】 卽朮之野生而非由人工栽種者。入藥最良。參詳「白朮」條。
【野生薑】 卽黃精之古籍別名。典見本草蒙生詳「黃精」條。

【野羊】 卽山羊之古籍別名。典見圖經本草。詳「山羊」條。
【野百合】 卽百合之處方用名。詳「百合」條。

【野老】 卽草薺之古籍別名。典見

和漢藥考。詳「草薺」條。
【野延胡】 卽一粒金丹之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「一粒金丹」條。

【野赤豆】 卽赤小豆之處方用名。詳「赤小豆」條。

【野李】 卽李實之味苦者。性質功能。較尋常李爲遜。參詳「李實」條。
【野杉】 卽榧實之古籍別名。典見綱目。詳「榧實」條。

【野芝麻】 卽玄參之古籍別名。典見和漢藥考。詳「玄參」條。

【野芋】 卽芋子之古籍別名。典見新修本草圖經。詳「芋子」條。

【野芋芳】 基本 本品卽芋之野生者。或謂種芋三年不收。卽成野芋。



野芋芳

性質 滑。有大毒。

主治 跌打損傷。痔漏麻風。合麻藥用。消腫毒。止痛。療瘡癰。蛇傷。搗傳。婦人乳癰。和香糟搗傳。

參攷資料 野芋性滑。下石毒。服食皆忌。祇可外用。其中毒者。令人戰慄。音啞。煩悶。垂死。以大豆漿。薑汁解之。薑汁亦可（趙學敏）。

【野芋頭】 形態 野芋頭爲野芋之一種。葉較小而略似茨菇。葉有尖端與草木。形如鞋底者不同。亦可供藥用。

主治 諸物食積。已成痞塊。磨爛和糯米粉煮粥淡食之。

【野芍草】 基本 野芍草爲雜用。草類之一種。可供藥用。

主治 治瘡滿用五斤。以一半安烏盆內。置雞子十箇在草上。以草一半蓋之。米醋浸二宿。雞子殼。輾乃取於飯上蒸熟。頓食之。塊漸消也。

【野豆】 卽野毛豆之簡稱。詳「野毛豆」條。

【野油花】 卽旋覆花之古籍別名。典見綱目。詳「旋覆花」條。

【野油菊】 卽旋覆花之古籍別名。典見總微論。詳「旋覆花」條。

【野芥子】 卽苦菜之日本名。詳「苦菜」條。

【野金錢】 卽旋覆花之古籍別名。典見和漢藥考。詳「旋覆花」條。
【野於朮】 卽白朮之處方用名。詳「白朮」條。

【野狐絲】 卽兔絲子之古籍別名。典見綱目。詳「兔絲子」條。

【野狐鼻涕】 卽螳螂之古籍別名。典見西陽雜俎。詳「螳螂」條。
【野孤鼻涕】 卽桑螵蛸之古籍別名。典見和漢藥考。詳「桑螵蛸」條。

【野紅花】 卽大薊之古籍別名。典見綱目。詳「大薊」條。

【野胡蘿蔔】 係胡蘿蔔之一種。其莖葉花實。皆與胡蘿蔔同。惟根細小。味甘。生食熟食。皆宜。性質功能。與胡蘿蔔無異。參見「胡蘿蔔」條。

【野首楷】 卽首楷之野生者。詳「首楷」條。

【野苗】 卽何首烏之古籍別名。典見和漢藥考。詳「何首烏」條。

【野茄】 卽蒼耳子之古籍別名。典見綱目。詳「蒼耳子」條。

【野芋】 卽芋麻之古籍別名。典見綱目。詳「芋麻」條。

【野芋麻】 古醫別名 天青地白草。川綿銀。銀芋。天

十一畫連途郭都野

一二五〇

葉狹長如榆葉水蘇輩。莖赤色。高三四尺。獨莖梢間開花。黃色。秋結實似蓮。內作房瓣根黃如蒿根。八月採房。其小翅生岡原之上。花葉實皆似大翅而細。南方生者葉狹而小。莖短。纔高一二尺。花亦黃。實房黃黑。內含黑子如粟粒。亦名旱蓮。南人用花葉。今南方醫家說云。連翅有兩種。一種似椿實之未開者。殼小堅而外完。無跗萼。剖之則中解。氣甚芳。履其實纔乾。振之皆落。不着莖也。一種乃如薔薇。柔外有跗萼抱之。而無解脈。亦無香氣。乾之雖久。着莖不脫。此甚相異。此種江南下澤間極多。如椿實者乃自蜀中來。入用勝似江南者。據本草則亦以蜀中為勝。然未見其莖葉也。〔蘇頌〕④治膽熱氣分用連翅。血分用柴胡。〔劉潛江〕

歷代記述攷證 〔明〕李時珍本草綱目論連翅根曰。治傷寒癆熱欲發黃。

參攷資料 ①翅根氣味。神農雷公甘有毒。李當之苦。吳普②翅根氣味苦寒。〔王好古〕③翅根生嵩高平澤。二月八月採。〔本經〕④方藥不用。人無識者。〔陶弘景〕⑤此即連翅根也。能下熱氣。故張仲景治傷寒癆熱在裏。麻黃連軹赤小豆湯用之。注云。即連翅根也。〔王好古〕

〔連翅根〕 性實 甘寒。平。有小毒。

〔連翅莖葉〕 熱 主治 心肺積熱

〔連翅心〕即連翅中心之處方用名。詳〔連翅〕條。

〔連翅殼〕即連翅之處方用名。詳〔連翅〕條。

〔連翅〕 性實 甘寒。平。有小毒。

〔連翅〕 性實 甘寒。平。有小毒。

〔連翅〕 性實 甘寒。平。有小毒。

〔連翅〕 性實 甘寒。平。有小毒。

〔連翅〕 性實 甘寒。平。有小毒。

〔連翅〕 性實 甘寒。平。有小毒。

〔連翅〕 性實 甘寒。平。有小毒。

〔連翅〕 性實 甘寒。平。有小毒。

〔連翅〕 性實 甘寒。平。有小毒。

〔連翅〕 性實 甘寒。平。有小毒。

〔連翅〕 性實 甘寒。平。有小毒。

〔連翅〕 性實 甘寒。平。有小毒。

〔郭公刺葉〕 主治 哮喘。到水煎服。即止。 主治 傳天泡瘡。搗細。油調擦之。

〔郭索〕即蟹之古籍別名。典見揚雄方言。詳〔蟹〕條。

〔都乙羅叱〕即桔梗之古籍別名。典見和漢藥考。詳〔桔梗〕條。

〔都念子〕即倒捻子之古籍別名。典見綱目。詳〔倒捻子〕條。

〔都草〕即百脈根之日本名。詳〔百脈根〕條。

〔都梁香〕即草蘭之古籍別名。典見李氏藥錄。詳〔草蘭〕條。

〔都淋藤〕即青木香之古籍別名。典見肘後方。詳〔青木香〕條。

〔都羅木〕即天麻之古籍別名。典見和漢藥考。詳〔天麻〕條。

〔野人〕即狒狒之古籍別名。典見綱目。詳〔狒狒〕條。

〔野丈人〕 形態 野丈人為雜草類之一種。葉似芍藥。花似木槿。有白毛。長寸餘。按下如白頭翁。可供藥用。

〔野丈人〕 主治 去腸垢。消積滯。

〔野丈人〕 即白頭翁之古籍別名。

〔野丈人〕 即白頭翁之古籍別名。

〔野丈人〕 即白頭翁之古籍別名。

〔野丈人〕 即白頭翁之古籍別名。

〔野丈人〕 即白頭翁之古籍別名。

〔野丈人〕 即白頭翁之古籍別名。

〔野丈人〕 即白頭翁之古籍別名。

〔野丈人〕 即白頭翁之古籍別名。

〔野丈人〕 即白頭翁之古籍別名。

〔野丈人〕 即白頭翁之古籍別名。

典見本經。詳〔白頭翁〕條。

〔野三七〕即瓊州三七之別名。詳〔山漆〕條。

〔野山漆〕即三七之別名。詳〔山七〕條。

〔野山參〕即人參之處方用名。詳〔人參〕條。

〔野山菊〕 產地 南嶺山中多有之。

形態 叢生。花葉抱莖。如苦蕒而歧齒不尖。莖瘦無汗。梢端發杈。秋開花如寒菊。其根葉可供藥用。



野山菊

主治 搗敷瘡毒。

〔野天冬〕即百部之處方用名。詳〔百部〕條。

〔野天門冬〕即百部之古籍別名。典見綱目。詳〔百部〕條。

〔野天麻〕即赤箭天麻之一種別名。詳〔天麻〕條。⑤即益母草之古籍別名。典見本草會編。詳〔益母草〕條。

症百出。是以癰毒五淋。寒熱鼠疫。癰癰惡瘡。熱結蟲毒等症。書載皆能以治。且經有言諸痛瘡瘍。皆屬心火。連翹實爲瘡家聖藥也。然多用胃虛食少。脾胃不足者慎之。況清而無補。癰疽潰後勿服。火熱由於虛者忌投。【清】鄒澍本經疏證論連翹曰。虛子錄曰。本經所列連翹主治。合陰陽內外而言。誠開閤之樞紐也。故主熱結在中爲寒熱。風癰瘰癧。其本在臟。其末在頸腋間也。若蟲毒則但沈於臟。癰瘰癧腫則但浮於腑。咸屬寒熱爲病因。熱結爲形證者也。其功力與夏枯草相等。但夏枯草偏於從本。乘寒水化令。故上徹巔頂。下及跌踵。連翹偏於從末。乘容平氣味。故外爾膚腠。內徧五中。至解邪熱結於心。理則一矣。連翹赤莖。獨上秋來結莖莖端。花後分瓣作房。中含黑子。乾則振之皆落。而不著莖。其房剖之。卽解片片相比。氣甚清微。當夫溽暑之候。諸氣懈弛。血脈憤滯。懈弛者多顛。顛憤滯者易墮。墮僻仄。徑折。最善顛頤之所也。故鼠瘻癰癰。氣多於血之候。恒生於頸腋平

原曠蕩。尤善墮淤之地也。故癰腫惡瘡。血多於氣之候。恒生於背腹。及夫結爲癰。漫爲瘡。又何莫非氣遭炎燄。而顛墮墮。迨至涼颺。候動萬象。清明。庶類遂剝落紛紜。頓然改舊。故草凋於土。葉辭於樹。水潤於澤。與連翹之治寒熱瘰癧。何以異哉。【清】賈九如辨寒熱指兩論連翹曰。連翹氣味輕清。體浮性涼。浮可去實。涼可勝熱。總治三焦諸經之火。心肺居上。脾居中。肝膽居下。一切血結氣聚。無不調達而通暢也。但連翹治血分功多。柴胡治氣分功多。同牛蒡子善療瘰癧。解毒尤不可缺。

近人學說 張山雷曰。連翹味苦。苦能清熱。形圓而尖。中空有房。狀似心臟。故專清心家之熱。此物理自然之性情。非勉強附會之言也。又凡質輕而空鬆者。必有開泄宣通之作用。故亦能散結而泄化絡脈之熱。本經治癰癰瘰癧瘡瘍。瘰癧結熱。蟲毒。固以諸痛痒瘡。皆屬於熱。而疏通之質。非特清熱。亦以散其結滯也。又心與小腸爲表裏。故清心之品。皆通小腸。又能泄

膀胱。利小水。導下焦之溼熱。甄權謂其通利五淋小便不通。除心家客熱。日華謂其治瘡癰。排膿止痛。東垣謂其散諸經血結氣聚。消腫丹溪謂其瀉心火。除脾胃溼熱。石頑謂其輕清而浮。主治諸瘡。爲結者散之之義。繆仲醇謂經主癰癰瘰癧。皆足少陽膽經氣鬱有熱。此藥輕揚清芳之氣。足以散其鬱而清其熱。海藏以主耳聾。亦氣火土壅之症也。又曰。近人有專用連翹心者。卽其房中之質也。細而質輕。故性浮而專清上焦心肺之熱。較之其殼在外。亦能通行經絡。其用固自有別。然雖是心。而亦不堅實。若是竟謂能清心家實火。亦殊未必。

配合應用 ①連翹得貝母、白芷、甘草、金銀花、玄參、薄荷、夏枯草、白薇。能消癰癰。加牡蠣、蠶人、瓜、山豆根、蒲公英、消乳癰。乳癰。

②治癰癰結核。連翹、脂麻等分爲末。時時食之。【簡便方】

③治項邊馬刀。屬少陽經。用連翹二斤。鹽麥一斤。大黃三兩。甘草半兩。每用一兩。以水一盞。煎七分。食後熱服。十餘日後。灸瘡泣穴二七壯。六十日決效。【張潔古活法機要方】

④治痔瘡腫痛。連翹煎湯熏洗。後以刀上飛過絲鑿入麝香貼之。【集驗方】

用量 三錢至四錢。

施用宜忌 凡陰虛內熱及癰毒已潰者禁用。

參攷資料 ①連翹之用有三。瀉心經客熱一也。去上焦諸熱二也。爲瘡家聖藥三也。【張元素】

②十二經瘡藥中不可無此。乃結者散之之義。【李杲】

③手足少陽之藥。治瘡癰瘰癧結核。有神。與柴胡同功。但分氣血之異爾。與鼠黏子同用。治瘡瘍別有神功。【王好古】

④按爾雅云。連異翹則是本名連。又名異翹。人因合稱爲連翹矣。連翹亦作連葇。卽本經下品翹根是也。唐蘇恭新修本草退入有名未用中。今并爲一。早連。乃小翹。人以爲鱧腸者。故同名。【李時珍】

⑤今近汴京及河中。江寧。潤。漣。澤。兗。州。禹。利。諸州。南康軍。皆有之。有大小二種。大翹生下澤地。或山岡上。青

龍愈創瘍。涼解內熱。祛除污液。且利大小便。奏殊效。

參攷資料 連錢草葉圓如錢。

荊楚人謂之地錢草。徐儀藥草圖名曰連錢草。

【連錢草】①即薄荷之古籍別名。

典見天寶單方。詳「薄荷」條。②即積雪草之古籍別名。典見本經。詳「積雪草」條。

【連稈草】即芋子之古籍別名。典見新修本草圖經。詳「芋子」條。

【連翹】 命名 本品實似蓮房。翹出衆草。故名。

處方用名 淨連翹。碌連翹。連翹。連翹心。帶心連翹。圖圖連翹。

古籍別名 連異翹（爾雅）旱蓮子（藥性）蘭華（吳普）三廉竹

根（別錄）根名連翹（傷寒論）折根。黃芩。根。連翹。連異。大翹。連草。蘭華。卑。連。度。厄。錢。連。異。翹。（和漢藥

考）

外國名詞 Forsythia suspense, Vahl. (拉卜)

基本 屬木犀科爲連翹之實。

產地 陳仁山藥物生產辨云

連翹產河南恒慶府。湖北紫荊關

鄧陽府。山東。山西等處均有出產。八月新



(一) 翹 連

形鑑 連翹爲落葉灌木。枝條作蔓狀。葉爲卵圓形複葉。由三葉而成。邊緣有鋸齒。花爲鮮黃色。四裂合瓣花冠。春月先葉而開。六七月間結黃褐色實。本品爲表面暗褐色短小之實。類玉椿實。有稍疣起之黃赤色斑點。其成熟者裂爲二房。中含大如粟粒之種子。有香氣。



(二) 翹 連

種類 ①大翹生下溼地。葉狹長如水蘇。花黃。結子似椿。實之未開者。作房翹出衆草也。②小翹生原岡上。花實皆如大翹而細小色黑耳。

採取 八月採之。

製法 凡使宜以黑而閉口者。良。去蒂根用。

性質 苦平。無毒。

效能 散諸經客熱。治癰腫瘡毒。

主治 寒熱。鼠瘻瘰癧。癰腫。瘡癰。瘰癧。結毒。蟲毒（本經）去白蟲（別錄）

歷代記述攷證

【唐】甄權藥性本草論連翹曰。通利五淋。小便不通。除心家客熱。【宋】大明諸家本草論連翹曰。通小腸。排膿。治瘡。止痛。通月經。【元】李東垣用藥法象論連翹曰。散諸經血結氣聚。消腫。【元】朱丹溪本草衍義補遺論連翹曰。瀉心火。除脾胃滯熱。治中部血證。以爲使。【元】王好古湯液本草論連翹曰。治耳聾。耳痛。耳鳴。【明】繆希雍本草經疏論連翹曰。連翹本經雖云味苦平。無毒。不應作辛。乃爲得之。潔古謂其性涼。味苦。氣味俱薄。入手足少陽手陽明經。亦入手少陰心經。其主寒熱。鼠瘻。瘰癧。瘰癧。結熱者。以上來諸證。皆從足少陽膽經氣鬱有熱而

成。此藥正清膽經之熱。其輕揚芬芳之氣。又足以解足少陽之鬱氣。清其熱。散其鬱。不癰不瘰。癰腫瘰癧。無非營氣壅遏。衛氣鬱滯而成。夫清涼以除熱。芬芳輕揚以散鬱。結則營衛通和而瘡腫消矣。蟲毒非熱。非辛。則不成。熱解則蟲自消。滯熱盛則生蟲。清其熱而苦能洩。蟲得苦即伏。故去白蟲。甄權用以通利五淋。小便不通。除心家客熱。日華子用以通小腸。排膿。治瘡。止痛。通月經。東垣用以散諸經血結氣聚。消腫。丹溪用以瀉心火。除脾胃滯熱。及治中部血證。以爲使。海藏用以治氣秘火炎之耳聾。一皆清熱散結下氣燥滯之功也。【明】李士材本草圖解論連翹曰。連翹苦寒入心。瀉心火。破血結。散氣聚。消腫毒。利小便。諸瘡痛癢。皆屬心火。連翹瀉心。遂爲瘡家要藥。治瘰癧瘡瘍有神。然久服有寒中之患。【清】黃宮繡本草求真論連翹曰。連翹味苦微寒。質輕而浮。書雖載瀉六經鬱火。然其輕清氣浮。實爲瀉心要劑。心爲火主。心清則諸臟與之皆清矣。然淫熱不除。病

日華諸家本草。詳『山丹』條。

【連珠巴戟】即巴戟天之處方用名。詳『巴戟天』條。

【連草】即連翹之古籍別名。典見和漢藥考。詳『連翹』條。

【連異】即連翹之古籍別名。典見和漢藥考。詳『連翹』條。

【連異翹】即連翹之古籍別名。典見和漢藥考。詳『連翹』條。

【連陽八座】即蛇牀子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蛇牀子』條。

【連荷】即連翹之古籍別名。典見和漢藥考。詳『連翹』條。

【連翹】即連翹之古籍別名。典見和漢藥考。詳『連翹』條。

【連翹】即連翹之古籍別名。典見和漢藥考。詳『連翹』條。

【連翹】即連翹之古籍別名。典見和漢藥考。詳『連翹』條。

【連翹】即連翹之古籍別名。典見和漢藥考。詳『連翹』條。

【連翹】即連翹之古籍別名。典見和漢藥考。詳『連翹』條。

【連翹】即連翹之古籍別名。典見和漢藥考。詳『連翹』條。

外國名詞 Hedera Terrestis (拉丁)

諸本 係屬唇形科連錢草之

十一 連

葉莖。

產地 中國南方。如荊楚、江淮、閩、浙等地多出之。



(一) 草錢連

形態 連錢草為原野自生之多年生草。莖方形。帶紫色。蔓延地上。花時直立。高五六寸。花後再偃臥地上。長及丈餘。葉作紫綠色。心臟形。或腎臟形。以長葉柄對生。邊緣有粗鋸齒。葉莖俱生粗毛。茸。葉腋開淡紫色斑點之唇形花。此草氣香而味苦。



(二) 草錢連

種類 蘇恭注薄荷云。有一種蔓生功用相似。圖經云。胡薄荷與薄荷相類。但味少甘。土人恒作茶飲。俗呼為新羅薄荷。即天寶方所

用之連錢草也。據二說。則積雪草即胡薄荷。乃薄荷之蔓生者爾。

採取 每年八九月。採取莖葉。製法 曝乾。或陰乾。

用法 焙燥。研末用。或生搗取汁用。

性質 苦寒。無毒。

成分 連錢草含有揮發油及單寧等。

效能 搗敷瘡毒。消腫止痛。用作強壯藥。民間用治小兒癰。故一名疳切草。

主治 大熱惡瘡。癰疽。浸淫。赤瘰。皮膚赤。身熱。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論連錢草曰。單用治癰。蠱鼠漏。寒熱時節來往。【唐】陳藏器本草拾遺論連錢草曰。主暴熱。小兒寒熱。腹內熱結。搗汁服之。【唐】蘇恭新修本草論連錢草曰。搗敷熱腫。丹徒。【宋】日華諸家本草論連錢草曰。以鹽按貼腫毒。并風癰疥。【明】李時珍本草綱目論連錢草曰。研汁點鼻。赤眼良。

著名方劑 九仙驅紅散。主治男女嘔吐諸血。及便血。溺血。婦人

崩漏。【黃炳集驗方】積雪草五錢。當歸（酒炒）黑山梔。蒲黃炭。黃連。黃芩。生地黃。槐花炭。各一錢。上部加藕節一錢。下部加地榆一錢。牛水煎服。

用量 一錢至三錢。

施用宜忌 凡陰疽諸毒。以及脾弱便薄者。切勿搗服。忌膩子。薤麥。

配合應用 ①疏解內臟壅塞。祛肺腎等污液。

②治胃寒。欬嗽。痰喘。喘喘等肺病。

③用於勞嗽之胸病。治欬嗽肺傷。勞嗽。有殊效。用於肺癆。能除敗液。愈創瘍。加於和胸藥草。或為泡劑。或為煎劑。或為細末用之。或一味為泡劑。和砂糖。或白蠟。使甘美易服。

④乾欬勞嗽。用此藥浸葡萄酒。長服有效。加鰾失刺。獲及洞庭藍。尤佳。

⑤熱病及勞瘵。血中有醋。腐毒。侵刺肺部。欬嗽。往毒不止。或肺癆。欬嗽。呼吸不利等。用後方為佳。此有同於香膏（Balsam）之功效。

一二四七

連類及之。遂亦姑妄言之乎。茲姑依綱目並錄於本通之後。亦以其功用之相類耳。其氣味則李東垣用藥法彙。謂甘淡寒無毒。壽頤案此甘字。非大甜之謂。實即淡字。如泉水食米皆謂味甘之例。此物無氣無味。以淡用事。故能通行經絡。清熱利水。性與木通相似。但無其苦。則泄降之力緩。而無峻厲之弊。雖能通利。不甚傷陰。溼熱之不甚者。宜之而藥過閉結之症。必不能及。木通之捷效。東垣謂利陰竅。治五淋。除水腫。癰亦惟輕症。乃能有功耳。又謂瀉肺利小便。與燈草同功。蓋皆色白而氣味輕清。所以亦能上行。泄肺之熱。閉宜其上竅。則下竅自利。說亦可取。乃又謂宜生用之。則輕清之藥。豈有妙用之策。伯耶汪石山謂明目退熱。亦輕清上行之效。又謂下乳催生。則清淡者能滑利通竅耳。瀨湖謂色白氣寒。味淡體輕。氣寒降也。味淡升也。又曰。白梗通吾吳藥肆有之。不知是何草之梗。其大過於拇指。外皮微黑。中心純白。輕虛之甚。切薄片用之。其色澤頗與白通草相似。但

不如白通草之柔潤。味淡氣清。功用與白通草等。而古今本草皆無此物。姑并錄之。以備藥籠所需。且近時白通草之價漸貴。而梗通尚廉。入藥功力。殊無軒輊。是可取也。

配合應用 治上部內傷。通草。番降香。紅麴。鱧鯉甲。山查。沒藥。
洗頭風痛 新通草瓦上燒存性。研末二錢。熱酒下。牙關緊者。幹口灌之。(百一選方)

用量 八分至錢半。
施用宜忌 凡氣虛及孕婦並無溼熱者禁用。

參攷資料 通草瀉肺利小便。甘平以陰緩血也。與燈草同功。宜生用之。(李杲) 通脫木生山側。葉似薔麻。其莖空心。中有白蠟。輕白可愛。女人取以飾物。俗名通草。陳藏器。郭璞言生江南。高丈許。大葉似荷。而肥莖中飄正白。今園圃亦有種蒔者。或作蜜煎充果食之。甘美。(蘇頌)

通草 即木通之原名。典見本經。惟近世「木通」與「通草」係列為二物。各見本條。
通草子 即木通實之別名。典見

綱目。詳「木通」條。

通草酒 製法 用通草子煎汁。同麴米釀酒飲。

主治 續五臟氣。通十二經脈。利三焦。

通脫木 即通草之原名。詳「通草」條。

通脫木花上粉 主治 諸瘡瘻惡瘡痔疾。納之。

歷代記述攷證 【宋】蘇頌綱經本草論通脫木花上粉曰。療瘰癧及胸中伏氣。攻胃咽。

通漆 即節華之古籍別名。典見別錄。詳「節華」條。

通蠶草 即忍冬藤之古籍別名。典見士宿本草。詳「忍冬藤」條。

速香 即伽楠香之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「伽楠香」條。

速腦 即冰片之古籍別名。典見綱目。詳「冰片」條。

逡巡酒 製法 三月三日。收桃花三兩。三錢。五月五日。收馬蘭花五兩。五錢。六月六日。收脂麻花六兩。六錢。九月九日。收黃甘菊花九兩。九錢。陰乾。十二

月八日。取臘水三斗。待春分。取桃仁四十九枚。好者去皮尖。白麵十斤正。同前花和作麵。紙包四十九日。用時白水瓶。麵一丸。麵一塊。封良久成矣。如淡再加一丸。

主治 補虛益氣。去一切風痺。溼氣。久服益壽。耐老好顏色。

達東根 即知母之古籍別名。典見別錄。詳「知母」條。

連 即連翹之古籍別名。典見爾雅。詳「連翹」條。

連及根 即白芨之古籍別名。典見本經。詳「白芨」條。

連母 即知母之古籍別名。典見本經。詳「知母」條。

連本 即海藥子之古籍別名。典見本經。詳「海藥子」條。

連皮檳 即檳榔之處方用名。詳「檳榔」條。

連蟲陸 即羊蹄之古籍別名。典見本經。詳「羊蹄」條。

連枝草 即苜蓿之古籍別名。典見郭璞賦。詳「苜蓿」條。

連桂 即肉桂之古籍別名。典見和藥漢考。詳「肉桂」條。

連珠 即山丹之古籍別名。典見

愈如痛未痊。用生肌散收口可也。生肌散治諸痔諸瘡腫毒。收口神速。乳香沒藥海螵蛸用三黃湯煮過。寒水石煨過。輕粉龍骨煨赤石脂煨。冰片各等分。共研細末。搽患處。外貼膏藥。

【通香水】

產地 出塞外及內蒙古諸地。

形態 通香水爲灌木類之一種。木長數尺。氣甚芬芳。可供藥用。主治 焚之辟瘴。瘴氣邪祟。並治各種奇疾。

參攷資料 通香水以沸湯沃之。取其汁洗衣服。及灌一切花卉。灑屋宇壁。經年香氣不滅。燒之香氣能達數百里。契丹珍之。(趙學敏)

【通泉草】 卽紅茂草之古籍別名。典見庚辛玉冊詳「紅茂草」條。

【通草】

原名 通脫木。
命名 本品功端通利。

故名。

處方用名 方通草。白通草。絲通草。梗通草。絳通草。花方通。紅通草。

古籍別名 活莖。離南。(爾雅)

寇脫。倚商。(山海經)

外國名詞 Arebia papy-

riana Hook. (拉丁) ツウダツ

ボク(日本)

基本 係五加科繖木屬。爲通

脫木之木髓。

產地 凡暖地山側。及原野間

恒有生長。陳仁山藥物生產辨云。

通草產廣西南寧。百色。



(一) 草通



(二) 草通

形態 通脫木爲落葉灌木。本

高丈餘。莖實不堅。含有白色之大髓。體輕如紙。厚薄平勻。葉爲掌狀。分裂。有長葉柄。集生於莖之上部。花與土當歸之花相似。其莖髓切作薄片。可代紙用。及供製裝飾品。

之料。入藥用者。卽謂之通草。

採取 秋季採之。

製法 採得切片。日乾。用時有

以辰砂拌赤。亦有紅花汁染赤者。

用法 恒以和入他藥水煎服。

性質 淡甘平。無毒。

效能 利水道。清溼熱。催生下

乳。通利五淋。專作利尿藥。

主治 利陰竅。治五淋。除水腫。

癰瀉肺

歷代能述疏證 【宋】蘇頌嘉

祐圖經本草論通草曰。解諸毒蟲

痛。【明】汪機本草會編論通草曰。

明目退熱。下乳催生。【清】黃宮繡

本草求真論通草曰。通草氣味甘

淡。體輕色白。有類燈心。功同入肺

引熱下降。及利小便。通淋治腫。然

燈心質小氣寒。則兼降心火。此則

兼入胃通氣上達。而下乳汁之爲

異耳。況此體大氣輕。滲淡殆甚。能

升能降。既可入肺而清熱。復能上

行而通胃。東垣用此。以治五腫水

腫。癰閉。非取氣寒能降味淡能升

之意乎。仲景用此。合當歸芍藥桂

枝細辛大棗甘草。名爲當歸四逆

以通營衛之意乎。但孕婦勿服。近人學說 張山雷曰。通脫木卽今之所謂白通草也。陳藏器本草云。通脫木生山側。葉似草麻。其莖空心。中有飄輕白可愛。女工取以飾物。俗亦名通草。爾雅所謂離南活脫也。(陳藏器。唐開元時人。爲三原縣尉。著本草拾遺。活脫。今爾雅作活莖。陸氏釋文。莖或作蔬。郭注。草生江南。高丈許。大葉。莖中有氣。正白。爾雅又有倚商活脫。郭注。卽離南也。陳氏本草引爾雅作離南活脫。蓋以莖字罕見。乃合爾雅前後兩條而并言之耳。山海經中山經。其草多寇脫。郭注。寇脫草生南方。高丈許。似荷葉。莖中有飄輕。正白。零桂人植而日灌之。以爲樹。卽此。嘉頌案陳氏說與郭景純合。則唐人所謂通脫木者。卽今之通草無疑。而確非本經之通草。陶注本經。通草繞樹蔭生。而此則是草類。但高大似樹。惟瀾湖綱目亦列於蔓草類中。且釋之曰。蔓生山中。大者圍數寸。殊與郭氏陳氏所說不合。登瀛湖曾見其確是蔓生乎。抑以其性情效力。有似木通。而

用猪板油一斤煉蜜爲丸。梧子大早晚各五錢酒下。腿疼難忍（周氏家方寶）又核桃肉四個酸葡萄七個斑蝥一個錢線透骨草三錢水煎熱服出汗愈不問風溼皆效（醫學指南方）

●治瘡透骨草一味貼患處一炷香或半炷香時即揭去皮上起泡即愈（醫學指南方）

●洗癰瘻秘方蛤蚧一個麻黃川椒透骨草防風大鹽各四兩白花蛇二錢艾一把槐枝一條川烏草烏各二兩紫花地丁一斤用水二桶煎大缸半埋在地入水溫時坐上升再用水二桶煎澄候冷時再入熱水或一日或一夜隨出時用水澆頂心數次再用芥末稀貼患處紙絹裹熱炕上睡汗出盡爲度（醫學指南方）

●參攷資料 透骨草大能驅墜取汁浸龜板能化爲水專主煉膏丹按鳳仙白花者亦名透骨白追風散紅花者名透骨紅破血墮胎亦有透骨之名非一物也
【透骨草】即益母草之古籍別名典見和漢藥考詳益母草條

【透骨將軍】即礪砂之古籍別名典見土宿本草詳礪砂條

【逐折】即厚樸子之原名詳厚樸子條

【逐馬】即玄參之古籍別名典見藥性詳玄參條

【逐馬】即丹參之古籍別名典見本草集註詳丹參條

【通石】即孔公孽之古籍別名典見綱目詳孔公孽條

【通仙草】即石長生之古籍別名典見和漢藥考詳石長生條

【通竹】即竹之空心直上而無節者性質功能與尋常竹同參詳竹條

【通血香】產地 出白西洋及陝西諸地

形態 通血香爲芳草類之一種色如乾薑可供藥用

主治 血症及肝經血氣諸症入藥最良

配合應用 ●治腹脹通血香一錢取取腰葫蘆一個不去子膜入香於內再入酒煮仍以所開之蓋合縫封固以陳酒安鍋內懸葫蘆於酒中揆定勿令傾倒將鍋蓋

煮三炷線香爲度煮時其香透屋牆之外煮完取出葫蘆內子膜并藥烘乾爲末每服一錢空心時酒下間五日再服一錢服盡葫蘆內藥服五六錢即愈此方出廣筆記云治脾虛有濕者（救生苦海方）

●治瘰癧內消方紫背天葵一兩五錢海藻洋帶昆布各一兩海螵蛸五錢貝母桔梗各一兩通血香三錢右藥爲細末酒糊爲丸桐子大每服七十九食後溫黃酒送下（良朋彙集方）

●治痔漏通腸胡連追毒方專治痔漏不拘遠年近日有漏或通腸及汚混孔出者先用此方追盡膿血後服黃連開胃丸取效最穩用胡黃連八錢切薑片汁拌炒刺蠅皮一個切片炒黃爲末通血香八分須用真者研末麝香二分共

和勻碾飯爲丸麻子大每服一錢食前酒下服藥後膿水反多乃藥之功勿懼可也（海藥祕錄方）

●黃連開胃丸胡黃連淨末八錢甲片麻油內燻黃五錢石決明煨過五錢真通血香六分不可少棉花五錢共爲細末蜜丸麻子大

每服一錢空心清米湯下早晚二服重者二十一日收功此方不用針刀挂線之苦誠起廢疾之良方也如漏邊有硬肉突起者加蠶繭二十一箇炒末和入此方及通身諸漏並治屢試屢效

●臟連丸治痔漏無論新久但舉發便下血作痛肛門墜重者膿血不止腫痛難坐者並治胡黃連淨末八兩通血香錢半用雄豬人腸盡頭一段長一尺二寸溫湯洗淨將連末及通血香灌入腸內兩頭以白絲線扎緊者酒二斤半新砂鍋內煮酒將乾爲度取起腸藥各搗如泥倘藥爛曬一時復搗爲丸桐子大每服七十九空心溫酒送下久服除根又名白銀定子治漏有孔者只須半月見功神效

●三品一條槍白芷淨末一兩白礬淨末二兩明雄黃二錢四分通血香八分乳香一錢二分先將礬礬研極細末鐵杓鏟成餅入炭火根煙淨取出火非爲末和入雄黃血香乳香細末作錠子成條插入漏內直透裏痛處爲止每日上三次至七日爲止半月瘡結而

〔聖惠方〕

●快斑散。治痘瘡不快。用貫衆、赤芍藥各一錢。升麻、甘草各五分。入淡竹葉三片。水一盞半。煎七分。溫服。〔王海藏方〕

●治頭瘡白禿。貫衆、白芷爲末。油調塗之。又方貫衆燒末。油調塗。

〔聖惠方〕

●治漆瘡作癢。油調貫衆末塗之。〔千金方〕

●治雞魚骨哽。貫衆、縮砂、甘草等分爲粗末。綿包少許。含之。嚥汁。久則隨痰自出。〔普濟方〕

●解輕粉毒。齒縫出而臭腫。貫衆、黃連各半兩。煎水。入冰片少許。時時漱之。〔陸氏積德堂方〕

●治血痢不止。鳳尾草根。即貫衆五錢。煎酒服。〔集簡方〕

●治便毒腫痛。貫衆酒服二錢良。〔多能鄙事方〕

用量 錢半至三錢。

●施用宜忌 凡脾虛胃寒而無實熱者禁用。驅菌赤小豆爲之使。

●參攷資料 貫衆大治婦人血氣。王海藏治夏月痘出不快快斑散用之云。貫衆有毒而能解腹

中邪熱之毒。病因內感而發之於外者多效。非古法之分經也。又黃山谷黃豆帖。言荒年以黑豆一升。按淨。入貫衆一斤。剉如骰子大。同以水煮。文火斟酌至豆熟。取出。日乾。覆令展盡餘汁。簸去貫衆。每日空心嚼豆五七粒。能食百草木枝葉有味。可飽。又王季羣一選方。言滁州蔣教授。因食鯉魚玉蟬羹。爲肋肉所哽。凡藥皆不效。或令以貫衆濃煎汁一盞。分三服。連進至夜一略而出。亦可爲末。水服一錢。觀此可知其軟堅之功。不但治血治瘡而已也。〔李時珍〕

●苗似狗脊。狀如雉尾。根直多枝。皮黑肉赤。曲者名草頭。頭所在山谷陰處。均有之。〔韓保昇〕

●今陝西河東州郡及荊襄間多有之。而少有花者。春生苗亦葉大如蕨。莖幹三稜。葉綠色。似雞翎。又名鳳尾草。其根紫黑色。形如大瓜。下有一黑鬚毛。又似老鴉。郭璞注爾雅云。葉員銳。莖毛黑。布地冬不死。廣雅謂之貫節是矣。〔蘇頌〕

●多生山陰近水處。數根叢生。一根數莖。莖大如筋。其涎滑。其葉兩兩對生。如狗脊之葉。而無鋸齒。青黃色。面深背淺。其根曲屈而有尖嘴。黑鬚叢簇。亦似狗脊根。而大狀如伏臥。〔李時珍〕

●貫衆有止血驅蟲解毒作用者明矣。古方解輕粉毒或永毒性口腔炎。時多用貫衆黃連各半兩煎水。入冰片少許。時時漱之。謂有特效也。〔袁淑範〕

〔貫衆花〕 主治 惡瘡。令人洩。

〔貫衆根〕 即貫衆之處方用名。詳

〔貫衆〕條。

〔貫節〕 即貫衆之古籍別名。典見本經。詳〔貫衆〕條。

〔貫葉〕 即貫衆之古籍別名。典見本經。詳〔貫衆〕條。

〔貫衆湯〕 即米酒之古籍別名。典見和漢藥考。詳〔米酒〕條。

〔軟葉胡〕 即柴胡之處方用名。詳

〔柴胡〕條。

〔軟葉〕 即君遷子之古籍別名。典見千金食治。詳〔君遷子〕條。

〔軟節〕 即鉛儲之古籍別名。典見和漢藥考。詳〔鉛儲〕條。

〔透石烏〕 即穿山甲之古籍別名。典見和漢藥考。詳〔穿山甲〕條。

〔透百合〕 即山丹之日本名詞。詳

〔山丹〕條。

〔透血紅〕 即山牛膝之古籍別名。典見綱目拾遺。性質功用。詳〔山牛膝〕條。

〔透骨白〕 即鳳仙花之古籍別名。典見綱目拾遺。性質功用。詳〔鳳仙花〕條。

〔透骨消〕 產地 粵南大瀝諸地均有出之。

性質 酸。溫。香。平。

效能 散風除溼。

主治 專治骨痛。理跌打傷。

古醫別名 鐵線透骨草。〔綱目拾遺〕

形態 透骨草爲雜草類之一種。形如牛膝草及馬鞭草。可供藥用。

主治 療熱毒。軟堅。合金瘡。入骨補髓。兼治難產。

配合應用 ●治癰氣疼痛。不拘遠年近日。透骨草二兩。穿山甲二兩。防風二兩。當歸三兩。白蒺藜四兩。白芍三兩。羌活四兩。去莖用藥九蒸九曬。海風藤二兩。生地四兩。廣皮一兩。甘草一兩。已上爲末。

十一 鱧貨 貫

【貨母】即知母之古籍別名。典見本經。詳知母條。

【貫中】即貫衆之古籍別名。典見吳普本草。詳貫衆條。

【貫仲】即貫衆之處方用名。詳貫衆條。

【貫首】即貫衆之古籍別名。典見和漢藥考。詳貫衆條。

【貫筋】即貫衆之古籍別名。典見和漢藥考。詳貫衆條。

【貫衆】即貫衆之古籍別名。典見和漢藥考。詳貫衆條。

【貫衆】原名 鳳尾草。本品莖葉如鳳尾。其根一本而衆枝貫之故名。

【處方用名】貫仲貫衆根管仲古醫別名 貫節貫渠百頭虎卷扁荷(本經)泊萍藥藻草鵝頭(別錄)黑狗脊(綱目)鳳尾草(圖經)貫中(吳氏本草)牛高非溪石頭貫首貫筋(和漢藥考)

【學名】Aspidium Falcatum, Br. Ch.

【基本】屬水龍骨科貫衆之根。產地 凡山野溪谷間之陰溼處。恒有生長。陳仁山藥物生產辨云貫衆產廣東各屬均有出。

【形態】貫衆爲自生山中溪畔

或深林陰處之羊齒類植物。葉叢生於一根作羽狀。稍彎曲。長一二尺。小葉作楔狀。冬日不凋。根稍類烏頭。呈黑褐色。

採取 二月八月間採之。製法 採得洗去土氣。陰乾用。性質 苦微寒。有毒。

效能 清溼熱。止崩帶。解毒。殺蟲。用作婦科藥。又作殺蟲藥。

作用 在胃中能激胃液之分泌。至腸中與蟲蟲遇。即驅殺而混入糞中排出。如服量過多或過久。則惹激中樞神經。而呈中毒現象。

主治 腹中邪熱氣。諸毒殺三蟲(本經)去寸白破癥瘕除頭風止金瘡(別錄)

歷代記述攷證 【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論貫衆曰。爲末水服一錢。止鼻血有效。【明】李時珍本草綱目論貫衆曰。治下血崩中帶下。產後血氣脹痛。斑疹毒。漆毒。骨哽。解諸病。【明】繆希雍本草經疏論貫衆曰。貫衆味苦而微寒。止應云有小毒。以其苦寒。故主腹中邪熱氣。諸毒。三蟲皆由溼熱所生。苦寒除溼熱。則三蟲自死矣。苦以

鴻之。亦兼有散之之義。故破癥瘕。苦寒能除風熱。故止頭風。金瘡出血後。必發熱。鴻熱散結。則金瘡自止。【清】黃宮繡本草求真論貫衆曰。貫衆即俗稱爲管仲者是也。味苦微寒無毒。世遇天時行不正之氣。人多用此置之。水缸。使人食之不潔。且不能獨力能解毒。凡過腸中帶下。並癥瘕斑痘。蟲蟲骨哽。皆可用之。蓋以苦能殺蟲。寒能散熱。故也。昔王繆百一選方。言食鯉魚羹爲骨所哽。百藥不效。或令以貫衆煎汁。連進一咯。而出。可見貫衆之功。其殆若是之神矣。形似狗脊而大。汁能制三黃。化五金。伏鐵乳結。沙制水。解毒。輭堅。

近人學說 張山雷曰。貫衆苦寒。沈降之質。故主邪熱而能止血。并治血痢下血。甚有捷效。苦苦以燥溼。寒以泄熱之功也。然氣亦濃厚。故能解時邪熱結之毒。別錄除頭風。謂指風熱言之。凡大頭疫腫連耳。目用泄散而不遺。應者。但加入貫衆一味。即邪勢透泄而熱解神清。不獨苦寒泄降。亦氣之足以散邪也。故時疫盛行。宜浸入水缸

中。常飲則不傳染。而井中沉一枚。不犯百毒。則解毒之功尤其獨著。不得以輕賤而忽之。

配合應用 ①治鼻衄不止。貫衆根末水服一錢。(普濟方)

②治諸般下血。腸風。酒痢。血痔。鼠痔。下血。黑狗脊黃者不用。須內肉赤色者。即本草貫衆也。去皮毛。剉焙爲末。每服二錢。空心米飲下。或糯米糊丸。梧子大。每米飲下三四十九丸。或燒存性。出火毒爲末。入麝香少許。米飲服二錢。(普濟方)

③治女人血崩。貫衆牛兩煎酒服之。立止。(集簡方)

④治產後亡血過多。心腹微痛者。用貫衆狀如刺蝟者一個。全用不剉。只揉去毛及花。以好醋燻溼。慢火炙令香熟。候冷爲末。米飲空心每服三錢。甚效。婦人良方)

⑤治赤白帶下。年深諸藥不能療者。用上方治之。亦驗名獨聖湯。(婦人良方)

⑥治年深欬嗽。出膿血。用貫衆蘇方木等分。每服三錢。水一盞。生薑三片煎服。日二服。又久欬漸成勞瘵。鳳尾草爲末。用魚肝油食之。

婦藥用。畏磁石及酒。

參攷資料 ●蛇蛻從口退出。

眼睛亦退。今眼藥及去翳膜用之。

取此義也。〔寇宗奭〕●入藥有四

義。一能辟惡。取其變化性靈也。故

治邪僻。鬼魅。蠱瘡諸疾。二能去風

取其屬巽性質也。故治驚癇。驚駭

喉舌諸疾。三能殺蟲。故治惡瘡。痔

漏疥癬諸疾。用其毒也。四有蛻義

故治翳膜。胎產皮膚諸疾。會意從

類也。〔李時珍〕●蛇蛻止癩。正發

日。取寒兩耳。又以手持少許。并服

鹽醋汁令吐。〔陳藏器〕

【蛇滅門草】即望江南之古籍別

名。典見和漢藥考。詳『望江南』條

【蛇銜】即蛇舍之古籍別名。典見

本經。詳『蛇舍』條

【蛇齒】即赤地利之古籍別名。典

見本草拾遺。詳『赤地利』條

【蛇頭抓草】即蛇草之別名。詳『

蛇草』條

【蛇頭草根】即天南星之古籍別

名。典見和漢藥考。詳『天南星』條

【蛇避草】即川芎之古籍別名。典

見和漢藥考。詳『川芎』條

【蛇藍】即曲節草之古籍別名。典

見綱目。詳『曲節草』條

【蛇藍】即六月霜之古籍別名。典

見綱目拾遺。詳『六月霜』條

【蛇蘭草】基本 屬淫草類。爲

主治 蛇虺毒蟲等。敷取根葉

搗傳咬處。當下黃水。

參攷資料 ●生平地。葉似苦

枝而小。節亦可高一二尺。種之辟

蛇。又一種草。莖圓似芋。亦傳蛇毒

〔陳藏器〕●按百一方云。關東有

草。狀如芋。莖方節赤。按傳蛇毒如

搗却然。名蛇蘭草。又有鼠蘭草。即

後莽。〔唐慎微〕

【蛇廬】即蛇莓之古籍別名。典見

本草會編。詳『蛇莓』條

【蛇母】即蟪蛄之古籍別名。典見

綱目。詳『蟪蛄』條

【蛇蟬】即蟪蛄之古籍別名。典見

兩雅。詳『蟪蛄』條

【蛇蟬】即蟪蛄之古籍別名。典見

綱目拾遺。詳『蟪蛄』條

【蛇蛻】即蛇蛻之別名。詳『蛇蛻』

條

【蛇窮】即蛻蟬之古籍別名。典見

和漢藥考。詳『蛻蟬』條

【蛻蟬】即壁蝨之別名。典見動物學

大辭典。詳『壁蝨』條

【蛻母】即知母之原名。詳『知母』

條

【蛻蟬】即蛻蟬之古籍別名。典見

綱目。詳『蛻蟬』條

【蛻蟬膽】即蛻蟬之處方用名。詳

『蛻蟬』條

【蛋結】即大黃之處方用名。詳『

大黃』條

【蛋清】即蛋白之別名。詳『雞子

白』條

【蛋精】即雞子白之別名。典見新

中藥。詳『雞子白』條

【訥會】即蘆薈之古籍別名。典見

本草拾遺。詳『蘆薈』條

【鼓蟲】命名 本品形狀顏色。

略似大豆。故名。

古籍別名 鼓母蟲〔綱目〕

外國名詞 Gyrinus Curtus,

Motsch. (拉丁) ギリスギムシ

(日本) 基本 係節肢動物昆蟲類鞘

翅類鼓蟲科之鼓蟲。

產地 生水澤間。

形態 鼓蟲爲寄生蟲類之一

種。其體形橢圓。色黑或黃。有光澤。

頭頂及前胸背皆光滑。上唇多直

皺。複眼分離計四枚。其中間出觸

角。觸角短形。不正分九節。色黑褐

兩鬚及足。皆赤褐。翅鞘有刻點。所

成之直列。尾端突出。翅端外前肢

長。中後兩肢皆扁而短。附節有五

常集水中。善游泳。食小蟲。夜則飛

於空中。捕得可供藥用。

性質 有毒。

主治 殺禽獸。蝕血肉。傳惡瘡。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論鼓蟲曰。白梅裏含之

除射工毒。

【鼓母蟲】即鼓蟲之古籍別名。典

見綱目。詳『鼓蟲』條

【豚肉】即豬肉之古籍別名。典見

本經。詳『豬肉』條

【豚脂】即豬脂之古籍別名。典見

和漢藥考。詳『豬脂』條

【豚榆係】即地榆之古籍別名。典

見和漢藥考。詳『地榆』條

【豚脂】即豬卵之古籍別名。典見

本經。詳『豬卵』條

【貧報草】即烟草之古籍別名。典

見和漢藥考。詳『烟草』條

十一畫 蛇

蛇曰蛇。蛇之餘性猶存。不以氣

味爲用者。故蛇之性上竄而主風

蛇之用入肝而辟惡。其性一也。小

兒驚癇癰癰。癰疾寒熱。蛇癰弄舌

搖頭。大人五邪言語僻越。皆肝經

爲病。邪惡侵犯也。蛇蛇走竄。能引

諸藥入肝散邪。故主如上等證。善

能殺蟲。故主腸痔蟲毒惡瘡。邪去

木平。故止嘔咳明目。今人亦用以

催生去醫膜者。取其善脫之義也。

【清】黃官繙本草求真論蛇蛇曰

蛇退味甘而鹹。氣平無毒。凡治小

兒驚癇風毒等症。無不用此爲主。

錢方)

①治經喉風疾氣閉者。用蛇蛇

炙。當歸等分。爲末。溫酒一錢。取吐

一方。用蛇皮揉碎。燒烟。竹筒吸入

即破。一方。蛇皮裏白梅一枚。噙嗽

(杜任方)

②治大小口瘡。蛇蛇皮水浸。輕

拭口內一二遍。即愈。仍以藥貼足

心。(嬰孩寶鑑方)

③治小兒木舌。蛇蛇皮灰。灰。乳

和服少許。亦治小兒重舌。(千金

方)

④治小兒重舌。並用蛇蛇灰。醋

調傳之。(聖惠方)

⑤治小兒口緊。不能開口。飲食

不語。即死。用蛇蛇灰。拭淨傳之

(千金方)

⑥治小兒解頤。蛇蛇熬末。以豬

類車髓和塗之。日三四易。(千金

方)

⑦治小兒頭瘡。小兒面瘡。小兒

月蝕。並用蛇蛇灰。臘猪脂和傳

之。(肘後方)

⑧治小兒吐血。蛇蛇灰。乳汁調

服。半錢。(子母祕錄方)

⑨治痘後目昏。小兒痘後障翳。

用蛇蛇一條。洗焙。天花粉五分。爲

末。以羊肝破開。夾藥縛定。米泔水

煮食。子女及甥皆用此得效。真奇

方也。(周密齊東野語方)

⑩治卒生腎膜。用蛇蛇皮一條。

洗。細剪。以白麵和作餅。炙焦。黑

色。爲末。食後溫水服一錢。日二次

(聖惠方)

⑪治小便不通。全蛇蛇一條。燒

存性。研溫酒服。

⑫治胎痛欲產。日月未足者。以

全蛇一條。絹袋盛。遶腰繫之。(千

金方)

⑬治橫生逆生。胞衣不下。蛇蛇

炒焦爲末。向東酒服一刀圭。即順

(千金方)。又用鹽泥固。研二錢。

榆白湯服。(十全轉救方)治逆生

須臾不救。用蛇蛇一具。蠟蛇十四

個。頭髮一握。並燒存性。分二服。酒

下。仍以小針刺兒足心三七下。擦

鹽少許。即生。(濟生祕覽方)

⑭治婦人產難。蛇蛇泡。水。浴產

門自易。(寶鑑方)

⑮治婦人吹乳。蛇皮一尺七寸。

燒末。溫酒一盞服。(產乳方)

⑯治腫毒無頭。蛇蛇灰。猪脂和

塗。肘後方)

⑰治石癰無膿。堅硬如石。用蛇

蛇灰貼之。經宿便愈。(聖濟總錄

方)

⑱治諸漏有膿。蛇蛇灰。水和傳

上。即蟲出。(千金方)

⑲治疔腫魚臍。蛇蛇雞子大。水

四升。煮三四沸。服汁立瘥。(外臺

祕要方)又治魚臍瘡出水。四呷

浮漿。用蛇蛇燒存性。研雞子清和

傳。(直指方)

⑳治惡瘡似癰。十年不瘥者。全

蛇一條。燒灰。猪脂和傳。仍燒一條

溫酒服。(千金方)

㉑治癰風白。蛇蛇皮灰。醋調塗。

(聖惠方)又用蛇蛇數百通。令熱

藥草中。勿回顧。(外臺祕要方)

㉒治陷甲入肉。痛苦。用蛇皮一

具。燒灰。雄黃一彈丸。同研末。先以

溫漿洗。針破貼之。(初虞世方)

㉓治耳忽大痛。如有蟲在內。奔

走。或血水流出。或乾痛。不可忍。者

蛇蛇皮燒存性。研。雞翎吹之。立愈。

經驗祕方也。(楊拱璧方摘要)

用蠟八分至錢半。

施用宜忌 凡無風毒者及孕

久陰溼諸地。及蘆叢水澤旁。

形態 蛇草爲雜草類之一種。形如淡竹葉。背後皆是紅圈。如蛇眼狀。可供藥用。

主治 疔腫痔瘡及一切蛇咬傷。

【蛇符】 卽蛇蛻之古籍別名。典見別錄。詳「蛇蛻」條。

【蛇蛻】 卽蛇蛻之處方用名。詳「蛇蛻」條。

【蛇蛻】 卽蛇蛻之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蛇蛻」條。

【蛇蛋果】 卽蛇莓之古籍別名。典見淮南子。詳「蛇莓」條。

【蛇莆藤】 產地 出福建舊福寧府境。

形態 蛇莆藤爲蔓草類。藤屬之一種。莖細葉如猴耳。可供藥用。

主治 喉齒百病。

【蛇魚】 卽鰕鱧之古籍別名。典見綱目。詳「鰕鱧」條。

【蛇魚草】 基本 蛇魚草爲雜草類之一種。可供藥用。

主治 金瘡血出不止。搗傳之。

【蛇殼】 卽蛇蛻之處方用名。詳「蛇蛻」條。

蛇蛻」條。

【蛇筋】 卽蛇蛻之古籍別名。典見吳普本草。詳「蛇蛻」條。

【蛇粟】 卽蛇牀子之古籍別名。典見本經。詳「蛇牀子」條。

【蛇殘毒】 卽蛇莓之古籍別名。典見日用本草。詳「蛇莓」條。

【蛇黃】 命名 本品生蛇腹中。正如牛黃之意。故名。

產地 出嶺南諸地之蛇腹中。

形態 蛇黃圓重如錫。有黃黑青雜色。或謂大者如鷄子。小者如彈丸。其色紫。可供藥用。

採取 九月間。掘土下七八尺。尋採之。

製法 大明曰。入藥燒赤。醋淬三四次。研末水飛用。

性質 冷無毒。

主治 心痛。疰忤。石淋。小兒驚癇。婦人產難。以水炙研服汁。

歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草論蛇黃曰。鎮心。明李時珍本草綱目論蛇黃曰。磨汁塗腫毒。

【蛇蛻】 命名 蛇字古文象其宛轉盤曲之形。蛻字音

脫音退。有退脫之義。故名。

處方用名 蛇脫。蛇退。龍衣。蛇殼。

古籍別名 龍子衣。弓皮。（本經）龍子皮。蛇符。（別錄）蛇筋。（吳普）蛇皮。（甄權）龍退。（綱目）蛇退皮。局皮。蛇衣。石龍衣。蛇脫皮。（和漢藥考）

外國名詞 Scapellato（英）

基本 屬爬蟲類之蛇族。爲其鱗上退脫之皮膜。

產地 陳仁山藥物生產辨云。龍衣各省均有出。但以江蘇省蘇州府最多。又云。南蛇皮產安南。南洋羣島。暹羅亦有出。但不如安南者佳。二三月出新。

形態 蛇蛻爲如管之皮膜。面有鱗形色銀灰。有光澤。首尾全長數尺。稍帶革質狀。其味鹹。入藥。以不暴於雨露者爲良。

採取 五月五日或十五日取之。良。尤以石上完全者佳。

製法 雷斅曰。凡使勿用青黃蒼色者。只用白色如銀者。先於地下掘坑深一尺二寸。安蛻於中。一宿取出。醋浸炙乾用。李時珍曰。今

人用蛇蛻。先以皂灰水洗淨。經竹上。或酒或醋或蜜浸炙黃用。或燒存性。或鹽泥固煨。各隨方法而不同。

用法 恒以剉末和入丸散用。

性質 鹹。甘平。無毒。

效能 驅風。解毒。辟惡。殺蟲。用作諸瘡解毒藥。

主治 小兒百二十種驚癇。蛇癰。癰疾。癰癰。弄舌。搖頭。寒熱。腸痔。蟲毒。（本經）大人五邪。言語。越止。嘔逆。明目。燒之療諸惡瘡。（別錄）

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論蛇蛻曰。療喉痺。百鬼魅。

【唐】孟詵食療本草論蛇蛻曰。安胎。【唐】陳藏器本草拾遺論蛇蛻曰。止癰。【宋】日華諸家本草論蛇蛻曰。灸用辟惡。止小兒驚悸。客熱。煎汁傳經。白癰。催生。【明】李時珍本草綱目論蛇蛻曰。辟惡去風。殺蟲。燒末服治婦人吹奶。大人喉風。退目。醫消水舌。傳小兒重舌。重齦。唇緊解頰。面瘡。月蝕。天泡瘡。大人疔腫。漏瘡。腫毒。發湯洗諸惡蟲傷。【明】繆希雍本草經疏論蛇

蛻

蛻

蛻

蛻

蛻

蛻

蛻

蛻

蛻

蛻

蛻

蛻

十一畫 蛇

托膨大呈赤色。外形略與和蘭莓之異實相類。



莓

蛇

採取 四五月採子及莖葉與根。

製法 採得陰乾或日乾。
用法 恒以生搗取汁。亦有水煎及剉末用。

性質 甘。酸。大寒。有毒。
效能 瀉熱解毒。

主治 胸腹大熱不止。

歷代記述攷證 【南北朝】陶弘景本草集註論蛇莓曰。治傷寒大熱及溪毒射工毒甚良。【唐】孟詵食療本草論蛇莓曰。主孩子口噤以汁灌之。【宋】大明諸家本草論蛇莓曰。通月經。爛瘡腫。傳蛇傷。

【明】李時珍本草綱目論蛇莓曰。傳湯火傷。痛即止。

配合應用 治口中生瘡。天行熱甚者。蛇莓自然汁半升。稍稍嚥之。【傷寒類要方】

配合應用 治口中生瘡。天行熱甚者。蛇莓自然汁半升。稍稍嚥之。【傷寒類要方】

行熱甚者。蛇莓自然汁半升。稍稍嚥之。【傷寒類要方】

●治傷寒下膿生瘡。以蛇莓汁服二合。日三服。仍水漬烏梅令濃入蜜飲之。【肘後方】

●治水中毒病。蛇莓根搗末服之。并導下部。亦可飲汁一二升。夏月欲入水。先以少末投中流。更無所畏。又辟射工。家中以器貯水浴身。亦宜投少許。【肘後方】

用量 三錢至五錢。

施用宜忌 凡無熱毒者禁用。

參攷資料 ●蠶老時熱紅於地。其中空者為蠶莓。中實極紅者為蛇殘莓。人不取之。恐有蛇殘也。【吳瑞】●所在有之。生下溼地。莖頭三葉。花黃子赤。儼若覆盆子。根似敗醬。四五月採子。二月八月採根。【韓保昇】●蛇莓莖長不盈尺。莖端惟結實二顆小。而光潔。誤食服人。非若覆盆苗長大。而結實數顆。微有黑毛也。【汪機】●此物就地引細蔓。節節生根。每枝三葉。葉有齒刻。四五月開小黃花。五出結實。鮮紅。狀似覆盆。而面與蒂則不同也。其根甚細。本草用汁。當是取其莖葉并根也。仇遠釋史說作蛇繆草。言有五葉七葉者。又言俗

傳食之能殺人亦不然。止發冷涎耳。【李時珍】

蛇草 ●古籍別名 蛇口半枝 蓮落得咬。【綱目拾遺】

產地 生陰溼諸地及古井間。與蘆葦水澤旁。

形態 蛇草為雜草類之一種。形似淡竹。葉背有紅圈。如蛇眼。可供藥用。

主治 一切蛇傷。疔腫痔瘡。連根搗搗。並煎泡酒服。

【蛇草】即蛇眼草之原名。詳「蛇眼草」條。

【蛇蘭】即赤地利之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「赤地利」條。

【蛇退】即蛇蛻之處方用名。詳「蛇蛻」條。

【蛇退皮】即蛇蛻之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蛇蛻」條。

【蛇常】即蛇牀子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蛇牀子」條。

蛇婆 ●古籍別名 海蛇。【動物學大辭典】

外國名詞 Platyrus (Hydrophis) fasciatus Dind 或 P. schisto hynchus Sea Snake

傳食之能殺人亦不然。止發冷涎耳。【李時珍】

【蛇草】即蛇眼草之原名。詳「蛇眼草」條。

【蛇蘭】即赤地利之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「赤地利」條。

【蛇退】即蛇蛻之處方用名。詳「蛇蛻」條。

【蛇退皮】即蛇蛻之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蛇蛻」條。

【蛇常】即蛇牀子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蛇牀子」條。

蛇婆 ●古籍別名 海蛇。【動物學大辭典】

外國名詞 Platyrus (Hydrophis) fasciatus Dind 或 P. schisto hynchus Sea Snake

傳食之能殺人亦不然。止發冷涎耳。【李時珍】

（拉丁）カイジャ或エラブウナギ或ウミヘビ（日本）

基本 係脊椎動物。爬蟲類蛇類。游牙類蛇。藥科為蛇毒蛇之肉。

產地 出南海及南洋諸島中。

形態 蛇婆為蛇屬之一種。與魚類中之海蛇不同。其體長。下半部及尾皆側扁。左右擊水而游泳。頭及眼皆小。鼻孔在頭端。被一種膜。口有毒牙。牙上有溝。鱗呈六角形。相並列。背青綠。腹黃。有白色與黑色環紋。肺甚大。足以減輕體重。以便浮游。長有三四尺。大者六七尺。其肉可供藥用。

性質 鹹。平。無毒。

主治 赤白痢。蠱毒下血。五野雞病。惡瘡。灸食或燒末米飲服。

蛇眼草 ●原名 蛇草。產地 生古井及年

蛇草。生古井及年



蛇婆

此藥獨勝助熱。不顧其本之說有以誤之。是不可以不慎也。惟治外癰。淫熱痛癢。浸淫諸瘡。可作湯洗。可爲末敷。收效甚捷。不得以賤品而忽之。

配合應用 ①治男子陰癰。淫癢。用蛇牀子。巴戟天。遠志。牛膝。何首烏。陽起石。

②治婦人陰中腫痛。用蛇牀子。巴戟天。牛膝。杜仲。續斷。地黃。黃蘗。白膠。

③治一切帶下。用蛇牀子。黃蘗。山藥。黃肉。五味子。茯苓。車前子。香附。川續斷。補骨脂。赤者加白膠。阿膠。

④治陽事不起。蛇牀子。五味子。菟絲子。等分爲末。蜜丸。梧子大。每服三十丸。溫酒下。日三服。(千金方)

⑤治赤白帶下。月水不來。用蛇牀子。枯白礬。等分爲末。醋麴糊丸。彈子大。胭脂爲衣。綿裹納入陰戶。如熱極。再換日一次。(儒門事親方)

⑥蛇牀子散。治子宮寒冷。溫中坐藥。取蛇牀子仁爲末。入白粉少。

許和勻。如粟大。綿裹納之。自然溫也。(金匱玉函方)

⑦治婦人陰癢。蛇牀子一兩。白礬二錢。煎湯頻洗。(集簡方)

⑧治產後陰脫。蛇牀子。熟艾之。又法。蛇牀子五兩。烏梅十四箇。煎水。日洗五六次。亦治婦人陰痛。(千金方)

⑨治男子陰腫脹痛。蛇牀子末。雞子黃調傅之。(永類鈴方)

⑩治大腸脫肛。蛇牀子。甘草各一兩。爲末。每服一錢。白湯下。日三服。并以蛇牀末傅之。(經驗方)

⑪治痔瘡腫痛。不可忍。蛇牀子煎湯熏洗。(簡便方)

⑫治小兒癰瘡。蛇牀子杵末。和豬脂塗之。(千金方)

⑬治小兒疳積。頭面耳邊。連引流水。極癢。久久不愈者。用蛇牀子一兩。輕粉三錢。爲細末。油調擦之。(普濟方)

⑭治耳內癢瘡。蛇牀子。黃連各一錢。輕粉一字。爲末吹之。(全幼心鑑方)

⑮治風蟲牙痛。蛇牀子。燭燼同研塗之。(千金方)又用蛇牀子煎

湯。乘熱漱數次。立止。(集簡方)

⑯治冬月喉痺。腫痛不可下藥者。蛇牀子燒煙於瓶口中。含煙吸煙。其痰自出。(聖惠方)

⑰用蠟一錢至三錢。

⑱施用宜忌 胃中有火。及下部有熱者。禁用。惡牡。丹。貝。母。巴。豆。伏硫黃。

參攷資料 ①蛇牀子。生於海濱。一根簇生數莖。莖初貼地。後漸昂起。高尺許。有線條。葉似鱗。底部重覆。至末則單。色淡綠。面滑澤。開重瓣五瓣之小白花。尖向內卷。子室橢圓。有縱溝。頭有白色二柱。雄蕊五。作淡紫色。大小繖俱有尖細之萼。果實略圓。縱脊大。無毛。長約分許。(增訂草木圖說) ②葉似小葉。莖翦花。白子如黍粒。黃白花。生下溼地。所在皆有。以楊州蘆州者爲良。(韓保昇) ③三月生苗。高三二尺。葉青碎。作叢似荔枝。每枝上有花頭百餘。結同一窠。俱爲芹類。四五月乃開。白色。又似繖狀子黃褐色。如黍米。至輕虛。(蘇頌) ④其花如碎米攢簇。其子兩片成合。似薛荔子而細。亦有細稜。凡花實似

蛇牀者。當歸。芍藥。水芹。薔木。胡蘿蔔是也。李時珍。

【蛇莓】 古籍別名 蛇莓。地莓。殘莓。(日用疔瘡藥。南安) 蛇蛋。果。淮南) 地錦。(江漢)

外國名詞 Duchesnea indica, Fock (拉丁) クイチナ

クテナハイチゴ(日本)

基本 係薔薇科。爲蛇莓屬蛇莓之汁。蛇莓屬爲薔薇科之一屬。其特徵與雄子薔屬相類。似花有萼樣之苞。雌蕊甚多。子房內含一胚珠。果實爲閉果。而其差異如下。雄子薔屬。果實無肉質之花托。苞比萼小而蛇莓屬則果實有肉質之花托。苞比萼大。

產地 多在山野或陰暗卑溼地方。

形態 蛇莓爲多年生草本。莖匍匐臥地。長二三尺。莖有微毛而不滑。葉以三小葉合成。而互生。有長柄。葉邊緣各生粗鋸齒。夏初於葉腋間各生一花。有長花梗。梗外有苞花有五瓣。黃色。雄蕊約二十枚。雌蕊甚多。其果實細小。熟時花

歷代記述攷證【唐】甄權藥

性本草論蛇牀子曰治男子女人虛澤痺毒風痛瘡去男子膝痛浴男子陰去風冷大谷陽事【宋】大明日華諸家本草論蛇牀子曰暖丈夫陽氣女人陰氣治股勝酸疼四肢頑痺縮小便去陰汗淫瀉齒痛赤白帶下小兒驚癇撲損瘀血煎湯浴大風身癢【明】繆希雍本草經疏論蛇牀子曰蛇牀子味苦平別錄辛甘無毒今詳其氣味當必兼溫燥陽也故主婦人陰中腫痛男子陰痿溼癢除痺氣利關節惡瘡別錄溫中下氣令婦人子臟熱男子陰強久服輕身令人有子蓋以苦能除溼溫能散寒辛能潤腎甘能益脾故能除婦人男子一切虛寒溼所生病寒溼既除則病去身輕性能益陽故能已疾而又

有補益也【明】李時珍本草綱目論蛇牀子曰蛇牀乃右腎命門少陽三焦氣分之藥神農列之上品不獨補助男子而又有益婦人世人捨此而求補藥於遠域豈非賤目貴耳乎【清】陳修園本草經證論蛇牀子曰蛇牀子氣味苦辛其性溫熱得少陰君火之氣主治男子陰痿溼癢婦人陰中腫痛裏火氣而下溼其陰寒也除痺氣利關節裏火氣而外通其經脈也心氣虛而寒邪盛則癰痛心氣虛而熱邪盛則生惡瘡蛇牀味苦性溫能助心氣故治癰腫惡瘡久服則火土相生故輕身心氣充盛故好顏色【清】徐洄溪本草經百種錄論蛇牀子曰蛇牀生於陰澤卑下之地而芬芳燥烈不受陰溼之氣故入於人身亦能於下焦陰溼所歸之處逐其邪而補其正也【清】黃宮繡本草求真論蛇牀子曰蛇牀子辛苦性溫功能入腎補命祛風燥溼故凡命門火衰而致風溼內淫病見陰痿溼淫及女子陰戶蟲蝕子臟虛寒產門不開腰膝酸體痺帶下脫肛與夫一切風溼疥疥等症服之則陽莖舉關節利腰背強手足達瘡疥掃至於大瘡身癢難當作湯洗浴產後陰脫不收用此絹袋熨收【清】鄒澍本草疏證論蛇牀子曰六氣惟溼最塞滯惟風最迅疾蛇牀子生陰溼地而得芬芳燥烈之性味是為於溼中鍾

風化能於溼中行風化則向所謂溼者已隨風氣鼓盪而化津液矣男子之陰痿溼癢婦人陰中腫痛何能不已耶至於肌肉中溼化而痺氣除骨節中溼化而關節利膚腠中溼化而惡瘡已皆一以貫之無事更求他義也惟治癰腫一節則似正病平風而更助以風藥者殊不知風因痰生人因風病若變因痰而生之風如溼中所鍾風化能鼓盪溼氣化津液則此痰此風早將變為氣氣流行之生氣尙何癰腫之足虞以是知化病氣為生氣原非臆說也【清】吳儀洛本草從新論蛇牀子曰辛苦而溫強陽補腎散寒祛風燥溼殺蟲治陰痿囊溼女子陰瘡陰癢子臟虛寒產門不閉腎門之病腰膝體痺帶下脫肛及頑癬惡瘡風溼諸病煎湯浴止風癢

近人學說張山雷曰蛇牀子溫燥剛烈之品本經雖稱其苦辛然主治婦人陰中腫痛男子陰痿溼癢則皆主寒溼言之必也腎陽不振寒水瀰漫始可以為內服之品甄權已謂其有毒瀕湖且謂蛇虺喜臥其下食其子蓋虛卑溼汗下之地本係溼熱之氣所鍾其含毒實可知觀雷敷製法以濃藍汁同浸再以生地黃汁拌煎無非監制其燥烈之性其反能治溼熱病者同氣相求以從其類也故近今醫籍絕少用為內服之藥況市肆中以偽贗品皆不炮製而可妄用以入煎劑乎本經又謂除痺氣利關節疏通關節則燥烈之性本能通行經絡疏通關節然非寒溫及未經法製者慎弗輕投本經又主惡瘡則外治之藥也別錄又謂辛甘能溫中下氣令婦人子臟熱男子陰強令人有子則其專溫腎陽更屬彰明較著甄權謂治虛寒溼痺毒風癰痛起腰痛去風冷益陽事日華謂治股勝瘡疔四肢頑痺縮小便去陰汗淫瀉赤白帶下景岳謂逐寒疝起陽痿主陽衰無子皆是強陽主治石頑謂辛香性溫助男子壯火腎火易助陽強不同者弗服甚是正論李瀾湖竟泛泛然謂其補助男子有益婦人則以本經列於上品而過於推崇遂有左道旁門專於興陽而戕人生命者皆

或下溼地。蜀中人家亦種之。辟蛇。一莖五葉。或七葉。有兩種。八月採根陰乾。日華子云。莖葉俱用。五月採之。又曰。紫背龍牙。生蜀中。春夏生葉採無時。(蘇頌)蛇銜。只用葉曬乾。勿犯火。根莖不用。勿誤用。有藥尖葉者。號竟命草。其味酸澀。誤服令人吐血不止。速服知時子解。(雷斅)蛇含根。治產後瀉痢。

【綱目】

【蛇含石】即蛇之於冬蟄時。口中所含之土。至春始吐出。其堅如石。故以爲名。其性質效能。與蛇黃略同。而力遜之。或誤以蛇含石爲蛇黃。不知蛇黃乃蛇腹中多年之結精。此不過蛇口中一季所含之土。故其精氣之厚薄。大有分別。不可同作一物也。

【蛇米】即蛇牀子之古籍別名。典見本經。詳「蛇牀子」條。
【蛇衣】即蛇蛻之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蛇蛻」條。

【蛇角】基本 本品乃大蛇之角。

古籍別名 骨咄犀。骨篤犀犀。(綱目)

產地 出西域諸地。
形態 蛇角色淡如碧玉。稍有黃色。其文理如角。又似象牙。叩之聲清脆。亦如玉磨刮。嗅之有香。燒之不臭。可供藥用。
性質 有毒。
主治 腫毒。解諸毒蟲毒。以毒攻毒也。

【蛇抱勒】產地 粵南大瀝等處多有產之。

性質 瀉酸。
效能 除滋殺蟲。
主治 洗疳痔。治瘰癧。及吐血牙痛。

【蛇牀子】命名 蛇虺喜臥於下。食其子。故有蛇牀。

產地 蛇粟諸名。其葉似藤。故曰牆藤。

古籍別名 蛇粟。蛇米。本經。虺牀。肝。(爾雅)馬牀。廣雅。牆藤。(別錄)老鬼子。(雷公炮炙論)繩毒。桑棘思益。(本經)蛇常。赤木草。赤目草。連陽八座。(和漢藥考)

基本 邇來醫家。多以屬繖形科。漢芹之子。實當之。藥舖所售者。別一種植物之子也。(和名鈔云)

前人誤以爲屬眼子菜科之眼子菜。而卽以其子充之。

產地 陳仁山藥物生產辨云。蛇牀子廣東廣西各屬均有出。以江蘇鎮江爲多。各省所產味同。

形態 東三省所產之蛇牀子。高約四十至七十仙米。莖中空。有縱溝數條。並有稍稍膨出之關節。嫩莖之下部帶紫色。其近根處粗。○·三至○·七仙米。間有至一仙米者。根與莖粗細略同。色白。長約六至十仙米。花爲繖形。作複繖形。花序排列。有大花梗。大花梗上斜生無數之小花梗。向上放射。小花梗上之小葉有毛。繖形花長短略同。花極少。白色五瓣。各瓣爲倒卵圓形。末端尖銳。向內卷曲。其正中有凹溝。以顯微鏡檢之。卽見有繁密之斑點。雄蕊凡五。其粉囊如袋。雌蕊凡二。其尖端交互向外。分裂果二。附於簪柱。卽供藥用之蛇牀子也。各果長約三至三·五密米。外面黃褐色。帶茸毛。其新收採者。頂端尙附有雌蕊之餘基。又有廣皮膜狀(但非翅狀)之肋線五條。果殼現黑褐色。每殼皆有油腺。

其兩分果之接合面。亦有兩油腺。六七月開花。秋間結實。花時點綴原野。甚美觀也。

種植 野生者多。間有生長於園圃者。

採取 五月採實。陰乾。
製法 雷斅曰。凡使須用濃藍汁。并百部草根自然汁。同浸一伏時。漉出日乾。却用生地黃汁相拌。蒸之。從巳至亥。取出日乾。用大明口。凡服食。卽按去皮殼。取仁微炒。殺毒。卽不辣也。作湯洗浴。則生用之。

用法 內服須炒研水煎。外治則生用湯洗。

性質 苦平。無毒。

成分 蛇牀子揮發油中。有左旋性皮敏。左旋性加謨芬。及異性。類草酸薄爾尼愛斯推兒。

效能 溫子臟。逐寒溼。療陰瘡。腫痛。除癰瘻。及婦人陰腫藥。

主治 男子陰痿溼癢。婦人陰中腫痛。除痺氣。利關節。癰漏。惡瘡。久服輕身。好顏色。(本經)又能溫中下氣。令婦人子臟熱。男子陰強。久服令人有子。(別錄)

十一畫 蝮 蛇 蜈 蚣 蛇 蜈 蚣 蛇 蜈 蚣 蛇

【蝮蛇】即蝮之古籍別名。典見楊雄方言。詳『蠍』條。

【蜈蚣】即蜈蚣之古籍別名。典見綱目。詳『蜈蚣』條。

【蜘蛛】即蜘蛛之古籍別名。典見綱目。詳『蜘蛛』條。

【蜈蚣】即蜈蚣之古籍別名。典見莊子。詳『馬陸』條。

【蜈蚣】即蜈蚣之古籍別名。典見綱目。詳『木蠹蟲』條。

【蜈蚣】即蜈蚣之別名。詳『金龜子』條。

【蜈蚣】即蜈蚣之古籍別名。典見綱目。詳『衣魚』條。

【蜈蚣】即蜈蚣之古籍別名。典見蜀本草。詳『雀蠹』條。

【蜈蚣】即蜈蚣之原形。詳『五穀蟲』條。

【蜈蚣】即蜈蚣之古籍別名。典見綱目。詳『馬陸』條。

【蜈蚣】即蜈蚣之古籍別名。典見綱目。詳『蛇草』條。

【蛇皮】即蛇皮之古籍別名。典見藥性本草。詳『蛇蛇』條。

【蛇休草】即川芎之古籍別名。典見

見和漢藥考。詳『川芎』條。

【蛇石】基本 係毒蛇腦中所生之石。

產地 多在南粵桂西。以及南洋羣島。東印度等處。

形體 蛇石。形類圍棋。大如扁豆。有黑白二色。亦有以蛇肉和土磨成者。或謂即大蛇之角。及蛇銜土之類。以置蛇頭上。蛇不敢走。動者爲真。取之可供藥用。

性質 有毒。

主治 治癰疽惡瘡。一切無名腫毒。及蜈蚣毒蟲等傷。

參攷資料 蛇石善於拔除各種毒氣。置患處。能緊黏不脫。毒盡則自落。惟用後必須以乳汁（人乳或牛羊乳均可）或溫水浸。至乳汁略變綠色。或黃黑色。再以清水洗淨。抹乾收貯。否則石必粉裂。不堪再用。

古籍別名 蛇銜（本經）紫背龍牙（綱目）

威蛇（大明）小龍牙（綱目）

外國名詞 Potentilla Klotziana W. et A. (拉丁) ランイナ イチロ オヘイイチロ（日本）

基本 係薔薇科委陵菜屬。爲蛇含之葉。

產地 山野原澤間。

形體 蛇含爲溼草類之多年生草本。莖長而質軟。常伏臥於地上。葉爲掌狀複葉。呈淡綠色。葉柄長在莖之下部者有五小葉。上部者有三小葉。春夏間梢上分歧多數之花梗著以黃色之小瓣花。雄蕊及雌蕊甚多。其根葉俱可供藥用。



蛇含

性質 苦。微寒。無毒。

主治 驚風。寒熱。邪氣。除熱。療金瘡。疔瘡。鼠瘻。瘡。頭瘍（本經）治心腹邪氣。腹痛。溼痺。養胎。利小兒（別錄）

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論蛇含曰。治小兒寒熱。丹

痧。【宋】大明諸家本草論蛇含曰。止血。協風。毒。癰腫。赤眼。汁傳蛇蝎蜂毒。【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論

一二三四

蛇含曰。紫背龍牙。解一切蛇毒。治咽喉中痛。含嚥之便效。

參攷資料 蛇含治蛇咬。今以草納蛇口中。縱傷人亦不能有

毒也。種之亦令無蛇（陳藏器）按葛洪抱朴子云。蛇銜膏。連已斷之指。今考葛洪肘後方。載蛇銜膏云。治癰腫瘰癧。產後積血。耳目諸病。牛領馬鞭瘡。用蛇銜大黃。附子。芍藥。大戟。細辛。獨活。黃芩。當歸。莽草。蜀椒。各一兩。蘼白十四枚。上爲末。以苦酒淹一宿。以猪膏二斤。七星火上煎。沸成膏。收之。每溫酒服一彈丸。日再服。病在外。摩之。傳之。在耳。綿裹塞之。在口。點之。若入龍銜藤一兩。則名龍銜膏也。所謂連斷指者。不知即此膏否（李時珍）

蛇被傷。一蛇銜一草著瘡上。經日傷蛇乃去。田父因取草治蛇瘡。皆驗。遂名曰蛇銜草也。其葉似龍牙而小。青紫色。故俗名小龍牙。又名紫背龍牙（李時珍）蛇銜處。有之。有兩種。並生石上。亦生黃土地。當用細葉有黃花者（陶弘景）

出興州。今近處亦有生。土石上。

●治蝨蟻入耳。用地龍爲末。入葱內。化水點入。則蝨蟻亦化爲水。
(聖惠方)

●治白禿頭瘡。乾地龍爲末。入輕粉麻油調搽。(普濟方)

●治瘰癧潰爛流串者。用荊芥根下段煎湯。溫洗良久。着瘡破紫黑處。以針刺去血。再洗三四次。用韭菜地上蚯蚓一把。五更時收取。炭火上燒紅爲末。每一匙入乳香沒藥。輕粉各半錢。穿山甲九片。炙爲末。油調傳之。如神。此武進朱守仁所傳有驗方。(保命集方)

●治龍經瘡。毒水缸底蚯蚓一條。連泥搗傳即愈。

●治蛛蝎咬瘡。遍身皆有。以葱一枚。去尖頭。將蚯蚓入葉中。緊捏兩頭。勿令洩氣。頻搖動。卽化爲水。以點咬處。甚效。(譚氏小兒方)

●治陽證脫肛。以荊芥、生薑煎湯洗之。地龍蟠如錢樣者。去土一兩。朴硝二錢爲末。油調傳之。(全幼心鑑方)

●治中蠱下血如爛瓜者。以蚯蚓十四枚。苦酒三升。漬至蚓死。服水已死者皆可活。(肘後方)

●治瘡風痛痒。白頭蚯蚓去土。以棗肉同搗丸。梧子大。每美酒下六十九丸。忌薑蒜。(活人心統方)

●治對口毒瘡。已潰出膿。取蛙地蚯蚓搗細涼水調傳。日換三四次。(扶壽方)

●治耳聾氣閉。蚯蚓、川芎、薄荷各兩半爲末。每服二錢。麥門冬湯下。服後低頭伏睡一夜。一服。三夜立效。(聖濟總錄方)

●治口瘡瘰癧。地龍、吳茱萸研末。醋調生麵和塗足心立效。(摘玄方)

●治口瘡瘰癧。地龍、吳茱萸研末。醋調生麵和塗足心立效。(摘玄方)

●治口瘡瘰癧。地龍、吳茱萸研末。醋調生麵和塗足心立效。(摘玄方)

●治口瘡瘰癧。地龍、吳茱萸研末。醋調生麵和塗足心立效。(摘玄方)

●治口瘡瘰癧。地龍、吳茱萸研末。醋調生麵和塗足心立效。(摘玄方)

●治口瘡瘰癧。地龍、吳茱萸研末。醋調生麵和塗足心立效。(摘玄方)

●治口瘡瘰癧。地龍、吳茱萸研末。醋調生麵和塗足心立效。(摘玄方)

●治口瘡瘰癧。地龍、吳茱萸研末。醋調生麵和塗足心立效。(摘玄方)

●治口瘡瘰癧。地龍、吳茱萸研末。醋調生麵和塗足心立效。(摘玄方)

●治口瘡瘰癧。地龍、吳茱萸研末。醋調生麵和塗足心立效。(摘玄方)

或宛轉而蛇行。任性行止。擊物便曲是矣。術家言。蚓可與雲。又如陰晴。故有土龍地龍子之名。其鳴長吟。故曰歌女。(李時珍)●入藥用白頭。是其老者。取得去土。鹽之日曝。須與成水。道術多用其屎。呼爲蚓壤。亦曰六一泥。以其飲細泥。無沙石入合丹泥釜用。(陶弘景)

●今處處平澤膏壤地中有之。孟夏始出。仲冬蟄結。雨則先出。晴則夜鳴。或云結時能化爲百合也。與蟲同穴。爲雌雄。故郭璞贊云。蚯蚓土精。無心之蟲。交不以分。睡於蟲食是矣。今小兒陰腫。多以此物所吹。經驗方云。蚯蚓咬人。形如大風。肩鬚皆落。惟以石灰水浸之。良昔浙江將軍張詠病此。每夕蚯蚓鳴於體中。有僧教以鹽湯浸之。數遍遂瘥。(李時珍)

【蚯蚓泥】古籍別名 蚓壤。六性實 甘。酸寒。無毒。

主治 赤白久熱痢。取一升炒煙盡。沃汁半升。瀘淨飲之。

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新修本草論蚯蚓泥。傳狂大傷。出

大毛神效。【宋】日華諸家本草論蚯蚓泥。曰。小兒陰囊。忍虛熱。腫痛。以生甘草汁入輕粉末調塗之。以鹽研傳瘡。去熱毒。及蛇犬傷。

【蚯蚓糞】卽蚯蚓泥之別名。詳「蚯蚓泥」條。

【蚯蚓】卽蟬之古籍別名。典見本經。詳「蟬」條。

【蟻】卽蟻之古籍別名。典見綱目。詳「蟻」條。

【蛇蟠】卽蛇蟠之古籍別名。典見綱目。詳「蛇蟠」條。

【蛇蟠】卽蛇蟠之古籍別名。典見綱目。詳「蛇蟠」條。

【蛇蟠】卽蛇蟠之古籍別名。典見綱目。詳「蛇蟠」條。

【蛇蟠】卽蛇蟠之古籍別名。典見綱目。詳「蛇蟠」條。

【蛇蟠】卽蛇蟠之古籍別名。典見綱目。詳「蛇蟠」條。

十一 蠶 蚯

①治陽毒結胸。按之極痛。或通而復結。喘促大躁狂亂。取生地龍四條。洗淨。研如泥。入生薑汁少許。蠶一匙。薄荷汁少許。新汲水調服。者熱熾者。加片腦少許。即與揉心下片時。自然汗出而解。不效再服一次。神效。(傷寒總要方)

②治諸瘧煩熱大躁。用上方服之甚效。亦治瘧瘧。(直指方)

③治小便不通。蚯蚓搗爛。浸水濾取濃汁半碗。服立通。(斗門方)

④治老人尿閉。白頭蚯蚓茴香等分。杵汁飲之。即愈。(朱氏集驗方)

⑤治小兒尿閉。乃熱結也。用大地龍數條。去泥。入蜜少許。研傳莖。即仍燒蠶蛻紙。朱砂。龍腦。麝香同研少許。以麥門冬。燈心煎湯調服。(全幼心鑑方)

⑥五福丸。治小兒急驚。用生蚯蚓一條。研爛。入五福化毒丹一丸。同研。以薄荷湯少許化下。

⑦乳香丸。治驚風。小兒慢驚風。心神悶亂。煩燥。筋脉拘急。胃虛。蟲動。反折。啼叫。用乳香半錢。胡粉二錢。研勻。以白頭蚯蚓生搗去

土。搗爛。和丸。麻子大。每服七丸。至十五丸。葱白煎湯下。(普濟方)

⑧治慢驚。虛風。用平正附子。去皮。臍。生研爲末。以白頭蚯蚓於末內滾之。候定。刮上附末。丸黃米大。每服十丸。米飲下。(百一選方)

⑨治急慢驚風。五月五日。取蚯蚓竹刀截作兩段。急跳者作一處。慢跳者作一處。各研爛。入硃砂末。和作丸。記明急驚。用急跳者。慢驚。用慢跳者。每服五七丸。薄荷湯下。(應驗方)

⑩治小兒卵腫。用地龍連土爲末。津調傳之。(錢氏方)

⑪治勞復。卵腫。或縮入腹中。絞痛。身體重。頭不能舉。小腹急熱。拘急欲死。用蚯蚓二十四枚。水一斗。煮取三升。頓服。取汗。或以蚯蚓數升。絞汁服之。並良。(肘後方)

⑫治手足腫痛。欲斷。取蚓三升。以水五升。絞汁。一升半。服之。(肘後方)

⑬治代指。疼痛。用蚯蚓杵傳之。(聖惠方)

⑭治風熱頭痛。地龍炒研。薑汁半夏餅。赤茯苓等分。爲末。一字至

半錢。生薑煎湯下。(普濟方)

⑮龍珠丸。治頭風疼痛。用五月五日。取蚯蚓和腦。磨杵丸。梧子大。每以丸。納鼻中。隨左右先塗薑汁在鼻立愈。(聖濟總錄方)

⑯聖惠龍香散。治偏正頭痛。不可忍。者。用地龍去土。焙。乳香等分。爲末。每以一字。作紙擦。燈上燒烟。以鼻嗅之。(澹寮方)

⑰又方。加人指甲等分。云。澹寮方。又一方。每服一捻。香爐上慢火燒之。以紙筒引烟入鼻。薰之。口噙冷水。有涎吐去。仍以好茶一盞點呷。即愈。(徐介翁方)

⑱治風赤眼痛。地龍十條。炙爲末。茶服三錢。(聖惠方)

⑲治風蟲牙痛。鹽化地龍水。和麵納齒上。又以皂莢去皮。研末。塗上。蟲即出。又同玄胡索。藜蘆末。塞耳。(普濟方)

⑳治牙齒裂痛。死曲蟻爲末。傅之。即止。(千金方)

㉑治齒縫出血不止。用地龍末。枯礬各一錢。麝香少許。研勻。擦之。

㉒治牙齒動搖。及外物傷動。欲

落。調藥不效者。乾地龍炒。五倍子炒等分。共爲末。先以生薑搗牙後。傅擦之。(御藥院方)

㉓治木舌腫滿。不治殺人。用蚯蚓一條。以鹽化水塗之。良久漸消。(聖惠方)

㉔治咽喉卒腫。不下食。地龍十四條。搗碎。喉外。又以一條。香鹽化水入蜜少許。服之。(聖惠方)

㉕治喉痺。塞口。用非地紅。小蚯蚓數條。醋搗取食之。即吐出痰血二三碗。神效。(普濟方)

㉖又用地龍一條。研爛。以雞子白攪和。灌入即通。(聖惠方)

㉗治鼻中瘰肉。地龍炒一分。牙皂一挺。爲末。蜜調塗之。清水滴盡。即除。(聖惠方)

㉘治耳卒聾。閉。蚯蚓入。安。愈。內。化水點之。立效。(勝金方)

㉙治耳耳出膿。生地龍。塗上。蠶生。豬脂等分。研勻。葱汁和。捻。作。挺。子。綿。裹。塞。之。或用地龍爲末。吹之。(聖惠方)

㉚治耳中打。乾。乾。結。不出。用白蚯蚓入。葱葉中。化爲水。滴耳。令滿。不過數度。即易挑出。

產地 各處皆有之。

形態 蚯蚓爲棲息溼地之棲皮狀及圓筒狀蟲類。頭尖。無耳目。鼻有多數環節。腹面有細小短刺。以助前進而防後退。在地中時。肛門向地面。食土壤。攝收滋養料。排泄細土於體外。



採取 二三月採之曝乾。須取白頭。是其老者。或路上踏殺者。名千人踏。更良。

製法 陶弘景曰。凡使蚯蚓。若服乾蚯蚓須熬作屑。雷斅曰。凡收來用糯米泔浸一夜。漉出。以無灰酒浸一日。焙乾切。每一兩以蜀椒糯米各二錢半。同熬至米熟。揀出。用李時珍曰。入藥有爲末或化水或燒灰者。各隨方。

用法 水煎或生搗。或剉末和作丸散。

性質 鹹寒。無毒。

效能 瀉熱行水。用作解熱及

利尿藥。

主治 蛇瘡。去三蟲。伏尸。鬼注。蟲毒長蟲。(本經)化爲水。療傷寒伏熱狂謬。大腹黃疸。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論蚯蚓曰。溫病大熱狂言。飲汁皆瘥。炒作屑去。蛇蟲去泥。鹽化爲水。主天行諸熱。小兒熱病癩癩。塗丹毒。傅漆瘡。【唐】蘇恭新修本草論蚯蚓曰。釐化爲汁。療耳聾。【唐】韓保昇蜀本草論蚯蚓曰。解射罔毒。【唐】甄權藥性本草論蚯蚓曰。炒爲末。主蛇傷毒。【宋】日華諸家本草論蚯蚓曰。治中風癱疾。喉痺。【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論蚯蚓曰。治脚風。【明】李時珍本草綱目論蚯蚓曰。主傷寒瘧疾。大熱狂煩。及大人小兒小便不通。急慢驚風。歷節風痛。腎臟風注。頭風齒痛。風熱赤眼。木舌喉痺。鼻淵痔耳。禿瘡癰癤。卵腫脫肛。解蜘蛛毒。療蛇蟻入耳。【明】繆希雍本草經疏論蚯蚓曰。蚯蚓味鹹寒。無毒。大寒。能祛熱邪。除大熱。故主伏尸。鬼疰。及療傷寒伏熱狂謬。鹹主下走。利小便。故治大腹黃疸。諸蟲癰成。

屬溼熱所成。得鹹寒之氣。則癰自消。蟲自去。而蟲毒之熱亦解矣。昔一道人治熱病發狂。用白頭蚯蚓十數條。同荊芥穗搗汁與飲之。得臭汗而解。其爲治傷寒伏熱狂謬之明驗也。【明】李士材本草圖解論蚯蚓曰。蚯蚓氣大寒。能除有餘邪熱。傷寒非陽明實熱狂躁者不宜用。溫病無壯熱及脾胃素弱者不宜服。黃疸緣大勞腹脹。屬脾胃虛。尸疰因陰虛成勞瘵者。咸不宜服。【清】黃宮繡本草求真論蚯蚓曰。蚯蚓最屬寒味。觀書所載甚明。其言味寒無毒。性鹹。其論所治則云。能主伏屍。鬼疰。傷寒伏熱。狂謬。熱病發狂。血熱。瘡疥。斑多紫黑。癰癤。黃疸。損傷。垂危。癰癤。潰爛。流串。順風脚氣。備極毒熱形症。皆能調治。則其氣味之寒。不待言矣。究其所以致治。則因此物伏處窪處。鑽土飲泉。是其本性。故能除其鬼疰。解其伏熱。且味鹹主下。處溼而以入溼爲功。故於溼熱之病。溼熱之物。遇之則化。停滯蓄水。觸着卽消。而使盡從小便而出。蚯蚓本有鑽土之能。化血之力。而凡跌仆受傷。

血脈經絡。又安有任其停蓄。而不爲之消化乎。但審認不確。妄爲投用。良非所宜。取老蚯蚓白頭者良。搗汁并水調下。久藥。或曬乾爲末。【清】張石頑張氏醫通論蚯蚓曰。蚯蚓體雖卑伏。性善穴竄。專解溼熱。療黃疸利小便。通經絡。故活絡丸以之爲君。溫病大熱狂妄。和人尿搗絞服之。熱毒從小便而出也。

國外學說 遠西名物考曰。蚯蚓油。用蚯蚓洗淨者。半磅。阿利攪油三磅。入玻璃瓶中。置暖處。淹二十一日。絞油貯之。又法。取蚯蚓若干。置磁器中。三日。使吐淨泥土。用溫湯洗淨。布巾拭乾。置磁壺中。加阿利攪油至三指橫徑上。又加葡萄酒少許。固封置暖處三日。乃置入磁鍋內。用文火煮去水氣。布巾包絞。再行濾過。靜置片時。去沉下之渣。入玻璃瓶封固貯之。用以外敷。能緩弛肢節拘攣。神經鬱急。療風痛。打撲傷。神經創。火傷甚有效。

配合應用 治傷寒熱結六七日。狂亂見鬼欲走。以大蚬半斤。去泥。用人溺麥汁飲。或生絞汁亦可。(肘後方)

替三升爲末。以酒一升。漬數日。絞去滓。煎令可丸。如小豆。三九日。三服。當見面念。頭中如有蟲行。額及手足有赤豆處。如此並是瘰癧也。未知再服。取盡神良。(陳延之小品方)

⑤治風痺厥痛。天仙子三錢。炒大草烏頭。甘草半兩。五靈脂一兩。爲末。糊丸。梧子大。以麝香爲衣。每服十九。男子菖蒲酒下。女子芫花湯下。(聖濟總錄方)

⑥治久嗽不止。有濃血。黃荇子五錢。淘去浮者。煮令芽出。炒研。眞酥一雞子大。大棗七枚。同煎。令酥盡。取藥日食三枚。又方。黃荇子三撮。吞之日五六度。(孟詵方)

⑦治年久呶嗽。至三十年者。黃荇子。水香薰黃等分。爲末。以羊脂塗青紙上。撒末於上。卷作筒。燒烟熏吸之。(崔行功纂要方)

⑧治積冷瘕癖。不思飲食。羸困者。黃荇子三分。水淘去浮者。大棗四十九個。水三升。煮乾。只取棗。去皮核。每空心食一個。米飲下。覺熱卽止。(聖濟總錄方)

⑨治水瀉日久。青州乾棗十個。

去核。入黃荇子填滿扎定。燒存性。每粟米飲服一錢。(聖惠方)

⑩治冷瘕痢下。黃荇子爲末。臘猪脂和丸。綿裹。棗許導下。部可因痢出。更納新者。不過三度瘥。(孟詵方)

⑪治赤白下痢。腹痛。腸滑後重。大黃煨半兩。黃荇子炒黑一撮。爲末。每服一錢。米飲下。(普濟方)

⑫治久痢不止。變種種痢。兼脫肛。黃荇丸。用黃荇子一升。淘去浮者。煮令芽出。曬乾。炒黃黑色。青州棗一升。去皮核。鹽醋二升。同煮。搗膏丸。梧子大。每服二十九。食前米飲下。(聖惠方)

⑬治腸風下血。黃荇煎。用黃荇實一升。曝乾。搗篩。生薑半斤。取汁。銀鍋中更以無灰酒二升。漫之。上火煎。如稠餹。卽旋投酒。度用酒可及五升。卽止。慢火煎。令可丸。大如梧子。每日取酒通下三九。增至五七丸止。若丸時黏手。則以菟絲粉欄隔之。火候忌緊。藥焦則失力也。初服微熱勿怪。疾甚者服過三日。當下利。疾去利亦止。絕有效。(饒中方)

⑭治脫肛不收。黃荇子炒研傳之。(聖惠方)

⑮治風牙蟲牙。用天仙子一撮。入小口瓶內。烟燒。竹筒引烟入蟲孔內。熏之。卽死。永不復發。(瑞竹堂方)

⑯又用黃荇子入瓶內。以熱湯淋下。口含瓶口。令氣熏之。冷更作。盡三合乃止。有涎津可去甚效。(普濟方)

⑰又用黃荇子數個。納孔中以蠟封之。亦效。(備急方)

⑱治牙齒宣落。風痛。黃荇子末綿裹咬之。有汁勿嚥。(必效方)

⑲治風毒咽喉腫。嚥水不下。及癰癰。腫水服黃荇子末兩錢。匕神效。(外臺祕要方)

⑳治乳癰堅硬。新黃荇子半匙。清水一盞。服之。不得嚼破。(外臺祕要方)

㉑治石癰堅硬。不作膿者。用黃荇子爲末。醋和傅瘡頭。根卽拔出。(千金方)

㉒治惡瘡似癰。十年不愈者。黃荇子燒研傳之。(千金方)

㉓治打撲折傷。羊脂調黃荇子末傳之。(千金方)

㉔治惡犬咬傷。黃荇子七枚。吞之。日三服。(千金方)

用量 三分至八分。

施用宜忌 凡非氣壯邪實者禁用。

著名方劑 黃荇子散。治五癰。(外臺方)

猪卵一具。陰乾。一百日。黃荇子三斤。牛黃八分。鯉魚膽五分。桂心一兩。(研)上五味。以清酒一升。漬黃荇子。曝令乾。盡酒止。搗合下篩。酒服五分。日再服。不知稍增。

參攷資料 ①以石灰清煮一伏時。淘出去芽。曝乾。以附子乾薑。陳橘皮。桂心。厚朴爲丸。服去一切冷氣。積年氣痢。甚溫暖也。不可生服。傷人。(甄權)

②黃荇之功。卽未見如上所說。而其毒則有甚焉。煮一二日。而芽方生。其爲物可知矣。黃荇。雲實。防葵。赤前陸。皆能令人狂惑。見鬼者。昔人未有發其義者。蓋此類皆有毒。能使痰迷心竅。蔽其神明。以亂其視聽。故耳。唐安祿山誘契丹。飲以黃荇酒。醉而坑之。又嘉靖四十三年二月。有陝西游僧武如香。挾妖術。至昌黎縣民張柱家。見其妻美。設飯間。呼其全家

狂亂奔走。故或呼發狂草、狂奔薯。

採取 六月七月採子日乾。

製法 雷數日。凡使薑黃子十兩。以頭醋一盞。煮乾爲度。却用黃牛乳汁浸一宿。至明日乳汁黑。即是真者。曬乾搗篩用。

用法 恒剉末和入外施瘡科藥中。間有和作內服丸散。

性質 苦寒無毒。

效能 薰蛙牙齒痛。療風癩癩狂。用作鎮痙鎮痛藥。治癩癩發狂及其他神經諸病。亦用於腺腫及癰癤等。又治鴉片中毒胃潰瘍肺結核盜汗。

作用 入胃後。因胃之作用。各質皆行分解。惟以薑黃精之量爲最大。故服後刻許。胃分泌神經被激而減少分泌。口鼻及鼻咽腔之分泌同減少。此品不特能制止胃液之分泌。又能制止脾液之分泌。至少亦能阻止其 secretion 及他種藥物而來之脾液增多。但不能阻礙 Secretion 之作用。又能廢止膽囊及迷走神經管轄下之部份之分泌。至腸能令腸之蠕動弛緩。及制止腸之分泌。由腸壁入

血中。即促進血液之循環。使心跳之速率增加。迷走神經亦受激而麻痺。全身血管收縮。汗液及尿亦同時減少。如服過量。則脈搏速弱。瞳孔縮小而死。

主治 齒痛。出蟲。肉痺拘急。久服輕身。使人健行走及奔馬。並強志益力。通神見鬼。多食令人狂走。(本經)療癩狂風癩。顏倒拘攣。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】陳藏器

本草拾遺論薑黃子曰。安心定志。聰明耳目。除邪逐風。變白。主疥癬。取子洗曬。隔日空腹水下一指搯。亦可小便浸。令泣盡暴乾。如上服。勿令子破。破則令人發狂。【唐】甄權藥性本草論薑黃子曰。炒焦研末。能治下部脫肛。止冷痢。主蛙牙痛。咬之蟲出。【宋】大明諸家本草論薑黃子曰。燒黑蟲牙。及洗陰汗。

【明】李士材本草圖解論薑黃子曰。薑黃子苦辛有毒。一名天仙子。主止搖攞風。甘草升麻。可解其毒。之效分。由理學博士長井長義氏及テシユミート氏。檢明其中含

有亞篤羅必涅及「ヒヨスチアミン」等。與歐洲所產之別刺敦那。同其生理的作用。故可爲別刺敦那之代用品。成供製造亞篤羅必涅及「ヒヨスチアミン」之用。又爲越幾斯。於鎮痙及鎮痛藥用之。我國之薑黃。實爲貴重之藥品。現今日本藥局方亦收載之。其主有效能。爲鎮解鎮痛藥。用於劇甚之咳嗽刺戟。(咯痰甚少。而咳嗽頻發者)例如慢性喉頭及氣管枝加答兒。肺癆喘息。疫咳。胃痛。三又神經痛。坐骨神經痛及痙攣性狹窄。因肛門裂傷之筋收縮。子宮頸收縮。嘔吐。慢性便秘及癰癤。舞蹈病等。均有效。一日二三回。○三至○。二(自七毫八絲至五釐二毫)爲浸劑。散劑。或丸劑。外用則爲細粉。爲輕膏。一回之極量。○。二至○。六(五釐二毫至一分五釐六毫)但此爲薑黃草之量。其根及越幾斯。主治亦同。而根之量爲○。一○。一五至○。七(三毫九絲至一釐八毫二絲)一日二三回爲浸劑。散劑。丸劑。外用則爲粉末。爲輕劑。極量一

回○。○七。(一釐八毫三絲)一日極量○。三。七釐八毫。越幾斯一回之極量○。○。五。(一釐三毫)一日之極量○。二。(五釐二毫)(日本藥局方)英美學說

謂顏產產中國。日本。歐羅巴。及美國等處。與佛茹兒。闊羊花。同類。高約三尺。結實狀如李子。內有多核。此樹全身皆具其力。其花及子。可入藥。而藥品中多用其莖與根。內含一精。即「刀邊精」(亞篤羅必涅)其功力最峻烈。如用其莖。無論鮮乾。皆可配膏酒等。如用其根。則可配貼膏酒膏擦酒等。顏黃爲提神寧睡藥。不宜過服。過服則喉渴目眩。頭昏。如沉醉而易傷命。然如蛤利類及釐劑。能收此藥功力。不可同服。其功用又能止痛發表。解轉筋。利小便。補陽。主治風癩。腦氣筋疼痛。咳嗽。癰癤。癰癤類便秘。遺尿。陽痿。遺精。風溼。至解藥之解此毒。須先用膽礬一分七釐半。以水和服。待吐後。繼服鴉片膏(第鴉片性毒。可按顏黃多少酌用。慎勿妄加)或服綠養冰等。

配合應用 ●治卒發癩狂。真

勿妄加)或服綠養冰等。

療本草論莧菜曰。白莧補氣。除熱。通九竅。【唐】蘇恭新修本草論莧菜曰。赤莧生赤痢。射工沙虱。【唐】陳藏器本草拾遺論莧菜曰。紫莧殺蟲毒。治氣痢。【清】黃宮繡本草求真論莧菜曰。莧菜味甘氣寒性滑。按據諸書。無不皆言其性冷利。能治熱結。血痢。蟲毒之症。即人服之者。亦無不謂其通腸利便。是亦菜中最利最滑之味也。且又戒其多食。則令人動氣煩悶。又曰不可與鯊同食。生鯊癢。試取鯊肉切如豆大。以莧菜封裹。置土坑內。用土掩蓋一宿。盡變成鯊。按此事即未有而其氣味之寒冷。與魚龜鯊同爲一類。故有如此驚規之詞矣。豈止尋常冷利之味哉。然果臟陽不陰。及於暑時。挾有真正熱候。亦又何忌。惟在食之者之能審其所用可耳。中治肝經風熱。上攻眼目赤痛。生翳遮障。不明。青盲赤眼。並宜服之。爲末每服方寸匙。【清】王士雄隨息居飲食譜論莧菜曰。莧甘涼補氣。清熱明目。滑胎利大小腸。種類不一。以肥而柔輒者良。痧脹滑瀉者忌之。尤忌與鼈同食。

十一畫 莧 莧

參攷資料 ①人莧細莧并冷利。赤莧療赤下而不堪食。方用莧菜甚稀。斷穀方中時用之。【陶弘景】②赤莧微寒。故主血痢。紫莧不寒。比諸莧無毒。故主氣痢。【蘇頌】③五月五日。收莧菜和馬齒莧爲細末等分。與妊婦人常服。令易產也。【孟詵】④紅莧入血分善走。故與馬莧同服。能下胎。或麥食之。令人易產。【朱震亨】⑤莧凡六種。赤莧。白莧。人莧。紫莧。五色莧。馬莧也。惟人白二莧實可入藥。用赤莧味辛。別有功用。【韓保昇】⑥莧並三月撒種。六月以後不堪食。老則抽莖如人長。開細花成穗。穗中細子扁而光黑。與青箱子。雞冠子無別。九月收之。細莧即野莧也。北人呼爲糖莧。柔莖細葉。生即結子。味比家莧更勝。俗呼青箱苗爲雞冠莧亦可食。【李時珍】

莧菜根 主治 陰下冷痛。入腹則腫滿殺人。搗爛傳之。

莧菜實 命名 本品乃莧所結之子實。故名。性質 甘。寒。無毒。

主治 青盲明目。除邪。利大小便。去寒熱。久服益氣力。不饑。輕身。【本經】治白。醫殺蛇蟲。【別錄】

歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草論莧菜實曰。益精氣。【明】李時珍本草綱目論莧菜實曰。治肝風客熱。醫目黑花。

參攷資料 莧實與青箱子同類異種。故其治目之功。亦彷彿也。【李時珍】

【莧實】即莧菜之古籍別名。典見別錄。詳「莧菜」條。

【莧陸】即商陸之古籍別名。典見易經。詳「商陸」條。

【莧】即烟草之古籍別名。典見和漢藥考。詳「烟草」條。

【莧碧】即莧碧子之古籍別名。典見本經。詳「莧碧子」條。

莧碧子 命名 本品一作茵瀝放宕。故名。其子服之令人狂。

處方用名 天仙子。

古籍別名 橫唐子。【本經】行唐子。【綱目】行唐子。虎茄。發狂草。狂奔草。狼茄子。牙疼子。破雪草。牛黃。【和漢藥考】顯茄。【新本草】

外國名詞 Scopolia, (拉丁) (英) (德)

基本 屬茄科莧碧之葉。莖。根。種子。

產地 陳仁山藥物生產辨云。天仙子產自安南。西貢。石叻亦有出。但不如安南出者之佳。六七月新。

形態 莧碧爲自生深山幽谷之多年生草。早春雪未融前即行萌芽。故或呼破雪。苗初呈紫黑色。漸長。則莖葉俱變淡綠色。莖高尺餘。葉互生。爲長橢圓形。惟稍帶尖。邊緣有淺鈍鋸齒。枝梢連生大小二葉。花開於葉腋而下垂。爲有梗淡紫色鐘狀之合瓣花冠。上邊五裂。果實爲覆果。熟則上部之周圍作盒狀綻破。中有茶褐色類罌粟子之種子。根爲球莖。稍有彎曲。外面呈灰黃色。皺縮作結節狀。內部類白色。全形類薯蕷。人若誤食。則



莧 碧 子

熱。過飲傷風失聲。瘡毒乾紫。可以起發。

【荻皮】

產地 生江南諸地。
形態 荻皮爲雜木類之一種。形如松葉。有針刺。結實黃赤。其皮可供藥用。



荻皮

採取 十月採之。

性質 苦。

主治 止消渴。益氣。殺白蟲。

【荻梁】即蜀黍之古籍別名。典見廣雅詳。蜀黍條。

【荻葵】即蜀葵之古籍別名。典見和漢藥考詳。蜀葵條。

【荻蔗】即甘蔗之節疎而細者之古籍別名。典見綱目詳。甘蔗條。

【荻】即苦菜之古籍別名。典見本經詳。苦菜條。

【荻苦蒿】即白菊之別名。詳。白菊條。

【荻蕒】即蕒蕒之原名。詳。蕒蕒條。

【荻】即菟葵之古籍別名。典見外丹本草詳。菟葵條。

【荻葵】即菟葵之別名。詳。菟葵條。

【荻葵】即雞頭菜之古籍別名。典見綱目詳。雞頭菜條。

【荻木麵】即西國米之古籍別名。典見和漢藥考詳。西國米條。

【荻根酒】即香附根酒之原名。詳。香附根酒條。

【荻草】即香附子之古籍別名。典見別錄詳。香附子條。

【荻草根】即香附子之原名。詳。香附子條。

【荻婆子】即娑婆子之古籍別名。典見本草綱目詳。娑婆子條。

【荻結】即香附子之古籍別名。典見圖經本草詳。香附子條。

【荻藩】即知母之古籍別名。典見別錄詳。知母條。

【荻】即貝母之古籍別名。典見爾雅詳。貝母條。

【荻勒母】即貝母之古籍別名。典見和漢藥考詳。貝母條。

【荻麻】處方用名。商麻實。古籍別名。白麻。蠶絲。

商麻。綱目。桐麻。日本外國名詞 Abutilon avicennae, Gaerth (拉丁) イチキリアサ (日本)


基本 係錦葵科商麻屬之子實。

產地 原產於熱帶地方。凡原野間處處有出。

形態 商麻爲澤草類之一年生草本。春日下種。生苗莖高五六尺。葉圓心臟形。葉柄長。夏月葉梢之葉腋開花。花小黃色。萼片五。花瓣五。雄蕊多而比花瓣短。雌蕊之柱頭二裂至五裂。果實至成熟後則乾燥而裂開。現出有毛之種子。其莖皮可採纖維。色白光澤。供布與繩料。其實與根可供藥用。

性質 苦。平。無毒。

主治 赤白冷熱痢。炒研爲末。每蜜湯服一錢。離腫無頭者。吞一



商麻

枚。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論商麻曰。生眼翳癰肉。起倒睫。參攷資料

參攷資料 商一作漬。又作簕。種必連項。故謂之漬也。李時珍

珍 商即商麻也。今人取皮作布及索者。實似大麻子。九月十月

採陰乾。蘇恭 商麻今之白麻也。多生卑溼處。人亦種之。葉大如

桐葉。園而有尖。六七月開黃花。結實如半磨形。有齒。嫩青。老黑。中子

扁黑。狀如黃葵子。其莖輕虛。潔白。北人取皮作麻。以莖曬硫黃作燐

燈。引火甚速也。其嫩子見小兒亦食之。李時珍

【商麻根】主治 止痢。古方用

【商麻實】即商麻之處方用名。詳

【商麻】條。

【荻菜】即荻菜之俗名。詳。荻

菜條。

【荻菜】 命名 本品葉頗似杏

故名。

古籍別名 蕒葵。唐本。水葵。

(馬融傳)水鏡草(土宿)楊子菜。

十一畫 葶

古籍別名 烏薺。烏薺。薺。薺。

衍義 黑三稜。(博濟方) 芍地栗。

(鄭樵通志)

外國名詞 Heliocharis

Plantagines, R. Br. (拉一)

葶本 係莎草科植物薺薺之

根。

產地 多生水田沃地間。

形態 薺薺爲多年生草。春季

生葉形似燈心草而粗長三四尺

質軟而內空夏時於莖頂生寸許

類管之穗黑色有白蕊根類似慈

姑大六七分外部有紅有黑內部

則皆白色



薺 薺

種植 恒以栽種於肥田中。三

月下種。待霜後苗枯。冬月掘取。

採取 冬春之間。爲掘取時期。

製法 凡入藥有製成澱粉者。

法取薺薺自然汁曬乾成粉用。

用法 入藥恒用粉末。或搗汁

用。間有整個加入煎劑。

性質 甘。微寒。滑。無毒。

效能 清熱明目。化痰。消積。用

作消解藥。

主治 消濕。痺熱。溫中。益氣。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食

療本草論薺薺曰下丹石。治風毒。

除胸中實熱氣。可作粉食。明耳目。

消黃疸。【宋】日華諸家本草論薺

薺曰開胃下食。【宋】蘇頌嘉祐圖

經本草論薺薺曰作粉食。厚人腸

胃不飢。又能解毒。服金石人宜之。

【明】汪機本草會編論薺薺曰療

五種腸氣。消宿食。飯後宜食之。治

誤吞銅物。【明】李時珍本草綱目

論薺薺曰主血痢下血。血崩。辟蠱

毒。【清】黃宮繡本草求真論薺薺

曰烏薺止一水菓。何書皆言力能

毀銅。破積攻堅。止血。治痢。住崩。療

瘡。解毒發痘。清聲醒酒。其效若是

之多。蓋以味甘性寒。則於在胸實

熱可除。而諸實脹滿可消。體黑則

以力善下行。而諸血痢血毒可祛。

是以冷氣勿食。食則令人每患腳

氣。熱嗽勿用。則於人有集火氣

之爲害耳。【清】王士雄隨息居飲

食譜論薺薺曰甘平明目養胃和

肝。治痢辟蠱。病人可食。

配合應用 ①治腹滿脹大。烏

薺去皮。填入雄豬肚內。線縫。砂器

煮糜食之。勿入鹽。

②善毀銅。銅器中煮之。卽炸。

③誤吞銅物。以烏薺合胡桃食

一二斤許。卽消。

④一味曬乾。爲末服。能辟蠱毒。

⑤大便秘下血。薺薺搗汁大半鍾

入酒少許溫服。三日見效。(神祕

方)

⑥治下痢赤白。午日午時。取完

好薺薺。洗淨拭乾。勿令損破。於瓶

內入好燒酒浸之。黃泥密封收貯。

遇有患者。取二枚細嚼。空心用原

酒送下。(經驗方)

⑦治婦人血崩。烏薺一歲一個。

燒存性。研末酒服之。(李氏方)

⑧治小兒口瘡。用薺薺燒存性。

研末搽之。(簡便方)

⑨用量 二枚至四枚。粉用五分

至一錢。

施用宜忌 凡脾胃虛寒而無

熱者禁用。

參攷資料 ①按王氏博濟方。

治五積冷氣攻心。變爲五臟諸病。

一二二四

金鎖丸中用黑三稜。註云。卽烏薺

乾者。則汪氏所謂消堅之說。蓋本

於此。又黃炳驗方云。地壘曬乾

爲末。白湯每服二錢。能辟蠱毒。傳

聞下蠱之家。知有此物。便不敢下。

此亦前人所未知者也。(李時珍)

⑩烏薺生淺水田中。其苗三四月

出土。一莖直上。無枝葉。狀如龍鬚。

肥田栽者。粗近葱蒲。高二三尺。其

根白。蒔秋後結顆大如山查。栗子

而薺有聚毛。累累下生入泥底。野

生者黑而小。食之多澤。種出者紫

而大。食之多毛。吳人以沃田種之。

三月下種。霜後苗枯。冬月掘收。爲

果。生食煮食皆良。(李時珍)

【薺薺三七】卽昭參之別名。詳

昭參條。

【薺薺山漆】卽昭參之別名。詳

昭參條。

【薺薺粉】古籍別名 烏薺粉。

黑三稜粉。(綱目拾

遺)

製法 與藕粉同。

性質 甘寒無毒。

主治 毀銅銷堅。除腹中瘕積。

丹石蠱毒。清心去翳。除肺胃經滯。

得效。用生荷葉、生艾葉、生柏葉、生地黃等分搗爛。丸雞子大。每服一丸。水三杯。煎一杯。去渣服。(濟生方)

⑦治崩中下血。荷葉燒研半兩。蒲黃、黃芩各一兩。爲末。每空心酒服三錢。

⑧治血痢不止。荷葉蒂水煮汁服之。(活濟方)

⑨治下痢赤白。荷葉燒研。每服二錢。紅痢蜜白痢沙糖湯下。

⑩治脫肛不收。用貼水荷葉。焙研。酒服三錢。仍以荷葉盛末坐之。(經驗良方)

⑪治牙齒疼痛。青荷葉剪取錢蒂七箇。以濃米醋一杯。煎半杯。去滓。熬成膏。時時抹之。妙。(唐氏經驗方)

⑫治赤遊火丹。新生荷葉。搗爛入鹽塗之。(摘玄方)

⑬治漆瘡作痒。乾荷葉煎湯洗之良。集驗方)

⑭治傷身風癰。荷葉三十枚。石灰一斗。淋汁。合煮漬之。半日乃出。數日一作。甚良。(聖惠方)

⑮治偏頭風痛。升麻蒼朮各一

兩。荷葉一個。水二鍾。煎一鍾。食後溫服。或燒荷葉一個爲末。以煎汁調服。(簡便方)

⑯治刀斧傷瘡。荷葉燒研。搽之。(集簡方)

⑰治陰腫痛痒。荷葉、浮萍、蛇牀等分。煎水日洗之。(醫聖元戎方)

用量 錢半至三錢。或用一角。

著名方劑 清震湯治雷頭風。頭面瘡癰。腫痛。憎寒。拘急。發熱。狀如傷寒。東垣方)升麻蒼朮各四錢。荷葉(全者)一個。水煎。食後服。

參攷資料 ①按東垣試效方法。雷頭風證。頭面疔瘡。腫痛。憎寒。發熱。狀如傷寒。病在三陽。不可過用寒藥。重劑。誅伐無過。一人病此。諸藥不效。余處清震湯治之。而愈。

用荷葉一個。升麻蒼朮各五錢。水煎。溫服。蓋震爲雷。而荷葉之形象。震其色。又青。乃涉類象形之義也。又按聞人規。痘疹八十一論云。痘瘡已出。復爲風寒外襲。則竅閉。血凝。其點不長。或變黑色。此爲倒靨。必身痛。四肢微厥。但溫肌散邪。則熱氣復行。而斑白出也。宜紫背荷葉散治之。蓋荷葉能升發陽氣。散

瘀血。留好血。僣靈能解結滯之氣。也。此藥易得。而活人甚多。勝於人牙龍腦也。又戴原禮證治要訣云。荷葉服之。令人瘦劣。單服可以消陽水浮腫之氣。(李時珍) ②荷葉伏白銀。伏硫黃。(李時珍)

【荷葉上露】 性平。無毒。

主治 治一切虛損勞症。

參攷資料 夏日黎明。日將出時。將長杓坐碗於首。向荷池葉上傾瀉之。以伏露爲佳。秋露太寒。花上者。性散。有小毒。勿用。(趙恕軒)

【荷葉燒飯】 基本 本品爲荷葉和粳米燒成之飯。

主治 厚脾胃。通三焦。資助生發之氣。

參攷資料 ①易水張潔古枳朮丸。用荷葉裹燒飯爲丸。蓋荷之爲物。色青中空。爲生化萬物之根蒂。用此物以成其化。胃氣何由不上升乎。更以燒飯和藥。與白朮協力。滋養穀氣。今胃厚不致再傷其利。廣矣大矣。(李杲) ②東南人不識北方炊飯無飯類乎。爲燒如燒

菜之意。遂訛以荷葉包飯。入灰火燒。雖丹溪亦未之辯。但以新荷葉煮湯。入粳米造飯。氣味亦全也。凡粳米造飯。用荷葉湯者。寬中芥葉湯者。豁痰。紫蘇湯者。行氣解肌。薄荷湯者。去熱。淡竹葉湯者。辟暑。皆可類推也。

【荷蒂】 即荷葉之別名。詳「荷葉」條。

【荷葉】 即蓮肉之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蓮肉」條。

【荷鼻】 基本 爲荷葉之蒂。主治 安胎。去惡血。留好血。止血。痢。殺菌。聖藥。並煮水服。

用量 三枚至七枚。

【荷葉】 即荷葉之別名。詳「荷葉」條。

【荷葉】 即荷葉之別名。詳「荷葉」條。

【荷葉】 即荷葉之別名。詳「荷葉」條。

【荷葉】 即荷葉之別名。詳「荷葉」條。

並多用。

用法 水煎或生搗或炙剉。

性質 苦平無毒。

效能 升清散瘀。消暑。化熱。用爲止血及解毒藥。

主治 血脹腹痛產後。胎衣不下。酒煮服之。

歷代記述攷證 【宋】大明日華諸家本草論荷葉曰。止渴。落胞。破血。治產後口乾。心肺燥煩。【明】李時珍本草綱目論荷葉曰。生發元氣。裨助脾胃。澀精液。散瘀血。消水腫。癰腫。發痘瘡。治吐血。咯血。衄血。下血。溺血。血淋。崩中。產後惡血。損傷敗血。【明】李士材本草圖解論荷葉曰。主開胃消食。止血固精。

【清】黃宮繡本草求真論荷葉曰。荷葉其味雖苦。其氣雖平。然生水土之下。污穢之中。挺然獨立。實有長養生發之氣。故昔人謂其色青主屬木。其形仰主上行。其中空主上發。其象震主入膽。爲東方膽木必用之藥。故潔古枳朮丸方。用荷葉燒飯爲丸。取其以能升發脾胃之氣。東垣清靈湯用此以治頭面風痛等症。取其以爲升發風寒之具。聞人規用此以治痘瘡風寒外。翳變黑倒靨。取其以爲溫肌散邪之具。證治要訣用此一味。燒灰單服。以治湯水浮腫。取其溫以行水之意。至入脾胃。須用其蒂。謂之荷鼻。取其味厚獨勝他處。但服荷葉過多。令人瘦劣。非可常用。試觀丹士縮銀。用荷葉同煨。而銀質頓輕。於此可知其概矣。【清】王士雄隨息居飲食譜論荷葉曰。藥功用與房略同。其色青。其象震。故能升發膽中清氣。以達脾氣。凡脾虛氣陷而爲便瀉不運者。可佐入培中之劑。如荷米煎之類是也。古方荷葉燒飯。卽是此義。蓋燒飯卽煎飯。後人拘泥字面。不解方言。入火燒焦。全失清芬氣味矣。凡上焦邪盛。治宜清降者。切不可用。東垣清靈湯之謬。章香雪已力辨其非。試察其能治痘瘡倒陷。則章氏之言益信。痘疹論云。痘瘡倒陷。若由風寒外襲。竅閉血凝。漸變黑色。身痛肢厥者。溫肌散邪。則氣行而痘自起也。用霜後荷葉貼水紫背者。炙乾。自直。僵蠶炒去絲。等分爲末。每服五分。溫酒或茱萸湯調下。蓋荷葉能

升發陽氣。散瘀血。留好血。僵蠶能解結滯之氣。故也。此藥平和。易得而活人甚多。勝於人牙龍腦多矣。名南金散。

配合應用 ①治陽水浮腫。敗荷葉燒存性。研末。每服二錢。米飲調下。日三服。【證治要訣方】

②治腳膝浮腫。荷葉心。蠶本等分。煎湯淋洗之。【水類鈴方】

③治痘瘡倒靨。紫背荷葉。乾。又名南金散。治風寒外襲。倒靨勢危者。萬無一失。用霜後荷葉。貼水紫背者。炙乾。白僵蠶直者。炒去絲。等分爲末。每服半錢。用胡荽湯或溫酒調下。【聞人規痘疹論方】

④治諸般癰腫。拔毒止痛。用荷葉中心蒂。如錢者。不拘多少。煎湯淋洗。拭乾。以飛過寒水石。同臘豬脂塗之。又治癰腫。榨水飲方中用。【本事方】

⑤治打撲損傷。惡血攻心。悶亂疼痛者。以乾荷葉五斤。燒存性。爲末。每服二錢。童子熱尿一盞。食前調下。日三服。利下惡物爲度。【聖惠方】

⑥治產後心痛。惡血不盡也。荷

葉炒香爲末。每服方寸匕。沸湯或童子小便調下。或燒灰或煎汁皆。可。亦治胎衣不下。【救急方】

⑦治傷寒產後血暈欲死。用荷葉。紅花。薑黃等分。炒研末。童子小便調服。二錢。【福安常備藥論方】

⑧治孕婦傷寒。大熱煩渴。恐傷胎氣。用嫩卷荷葉。焙。牛兩。蚌粉二錢。半爲末。每服三錢。新汲水入蜜調服。并塗腹上。名單胎散。【鄭氏方】

⑨治妊娠胎動。已見黃水者。乾荷蒂一枚。炙研爲末。糯米淘汁一鍾。調服卽安。【唐氏經驗方】

⑩治吐血不止。嫩荷葉七箇。搗水服之。甚佳。又方。乾荷葉生蒲黃等分。爲末。每服三錢。桑白皮煎湯調下。用經霜敗荷葉燒存性。研末。新水服二錢。【肘後方】

⑪治吐血咯血。荷葉焙乾爲末。米湯調服。二錢。一日二服。以止爲度。用敗荷葉蒲黃各一兩。爲末。每服二錢。麥門冬湯下。【聖濟總錄方】

⑫治吐血衄血。陽乘於陰。血熱妄行。宜服四生丸。陳日華曰。犀用

【舵菜】 命名 本品係海船舵上所生之蔬菜故名。

性質 味甘寒無毒。

主治 瘰癧結氣痰飲。

【舶茴香】 ①即大茴香之處方用名。詳「大茴香」條。②即莽草之古籍別名。典見和漢藥考。詳「莽草」條。

【船底苔】 基本 本品爲苔之性質 甘冷無毒。

主治 鼻洪吐血淋疾。同炙甘草鼓汁濃煎湯呷之。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論船底苔曰「解天行熱病伏熱頭目不清神志昏雲及諸大毒以五兩和酥餅末一兩半麴糊丸梧子大每溫酒下五十丸」。

參攷資料 按方賢奇效方云。水之精氣漬船板木中累見風日久則變爲青色蓋因太陽晒之中感陰陽之氣故服之能分陰陽去邪熱調臟腑蓋物之氣味所宜也。

（李時珍）

【荷包茄】 即茄子之古籍別名。典見植物學大辭典。詳「茄子」條。

【荷包牡丹】 形態 荷包牡丹爲一年生草。

庭院多栽植之莖高二尺許葉羽狀細裂。春月開紅花成穗狀下垂取根可供藥用。

效能 搗汁和酒沖服。能令人沈醉不醒。

主治 專治金瘡止痛。

【荷包草】 命名 本品葉大中空形如荷包故名。

古藥別名 肉仰匙草。金鎖匙。

（綱目拾遺）

產地 多生寺院牆砌石間。或亂石縫中。

形態 荷包草爲石草類之一種。形似地連錢。十月發苗莖細葉似尖實並有皺紋如腰包。延蔓布地。逐節生根。極易繁衍。至六七月間上面生二子。青翠可愛。採得可供藥用。



荷 包 草

採取 須於四月十月採之。

性質 微寒。

主治 黃白痢。去溼火。同神仙對坐草用。清五臟點熱。止吐血。洗痔瘡。調婦人經期。

配合應用 ①治水腫初起。活

鮑魚大者一尾。用磁片割開。去鱗及腸血。以紙拭淨。勿見水。以荷包草填腹。令滿。甜白酒煮熟。去草食魚。利溼熱。治黃白痢。腹脹。白濁。經閉。搗汁點熱眼。煎湯洗痔瘡。腫痛。

（百草鏡方）

②治疝氣。用荷包草研爛汁。酒送服。此草形似荷包。上面有二子。初生時有葉無子。須至六七月方生。（周氏家寶方）

③治黃疸。荷包草。螺螄三合。同搗汁。澄清。熱服。（家寶方）

④治眼中生疔。用肉仰匙草連根葉和酒漿板搗汁。飲二三次。即愈。（酒漿板。即酒釀糟也。）眼科要覽方。

⑤治蛇咬。鵝頂紅。即灰藕。肉仰匙。野甜菜。三味共搗敷之。（家寶方）

應用宜忌 忌鹽。

【荷花瓣】 即蓮花之處方用名。詳

「蓮花」條。

【荷魚】 即海鰻魚之古籍別名。典見綱目。詳「海鰻魚」條。

原名 荷錢。

命名 藕生水中。其葉曰荷。嫩葉形似錢。故名。

處方用名 青荷葉。鮮荷葉。敗荷葉。

古藥別名 藕荷葉。菱荷葉。

（綱目）

外國名詞 Leaves of Lotus.

（英）

基本 屬睡蓮科。爲蓮之葉。

產地 多生池沼中。

形態 蓮爲多年生草。春季從宿根生新葉。初小。謂之錢葉。（荷錢）稍大。浮水上。謂之水葉。地下莖肥大有節。內有作縱行管狀之多數空隙。此即藕也。可供食用。葉初爲卷葉。後舒張作圓形。柄狀高抽水。上表面滑澤。下面中央有葉柄。初夏開美麗白色或淡紅色大花。子實包藏於倒圓錐形之花托（蓮房）中。狀類椎實。

採取 六七月採。

製法 大明曰。荷葉荷鼻。入藥。

兩角。一角者勝。鈔研極細。或磨用。
 (盧飛鵬) ④按王安石字說云。鹿則比類而羴角外向以自防。羴則獨羴羴角木上以遠害。可謂羴也。故字從鹿從羴。省文。後人作羴。許慎說文云。羴山羊也。大面細角。山海經作羴云。狀如羊而馬尾。費信星槎勝覽云。阿丹國羴羊自胸中至尾垂九塊。名九尾羊。(李時珍) ⑤今出建平宣都諸巒山中及西域多兩角。一角者爲勝。角多節。盛感圓繞。別有山羊角極長。惟二邊有節。節亦疎大。不入藥用。乃爾雅云。羴羊者。羴夷以爲羴羊。能涉峻坂。(陶弘景) ⑥羴羊南山商洛間大有。今出梁州。眞州。洋州亦貢。其角細如人指。長四五寸。而文盛細。山羊或名野羊。大者如牛角。可爲鞍橋。又有山羴。大如鹿。皮可作靴。有兩角。大小如山羊角。俗人亦用之。陶氏所謂一邊有粗文者。是卽山羊也。(蘇頌) ⑦今秦隴龍蜀金山州山中皆有。戎人捕得來貨。其形似羊。青色而大。其角長一二尺。有節如人手。指握痕。又最堅勁。郭璞註爾雅云。羴似羊而大。其角細

而圓銳。好在山崖間。羴似羴羊。其角大而隨。出西方。本草諸註各異。觀今所市者。與爾雅之羴羊。陶註之山羊。蘇註之山羴。大都相似。今人相承用之。以爲羴羊。細角長四五寸者。往往羴中有磨角成痕處。詳諸說。此乃眞羴羊角。而世多不用何也。又閩廣中山出一種野羊。彼人亦謂之羴羊也。⑧羴羊似羊而色青毛粗。兩角短小。羴羊似羴羊。兩角長。大山羴乃羴之身。而羴羊之角。但稍大而節疎慢耳。陶氏言羴羊有一角。而陳氏非之。按羴字志云。安南高山出羴羊。一角極堅。能碎金剛石。則羴固有一角者矣。金剛石出西域。狀如紫石英。百鍊不消。物莫能擊。惟羴羊角扣之。則自然冰泮也。又羴骨僞充佛牙。物亦不能破。用此角擊之。卽碎。皆相畏耳。羴羊皮西人以作座褥。(李時珍) ⑨羴羊角以有掛痕者爲眞。今磨用之角。不見掛痕。已難確定。其眞僞。若羴羊角片。則多以山羊角鑄成。且久煎無味。絕無效力。(孫鳳翔) ⑩羴羊一物。惟溫疫邪毒可以解散。若傷寒表症而誤

用之。則邪反陷矣。(仲氏)

【羴羊肺】 性質 甘平。無毒。
 主治 水腫。臌脹。小便不利。

參攷資料 羴羊肺。本草不收。千金翼載大醫山。連治章司業水腫。黃芩丸用之。蓋取其引藥入肺。以通小便之上源也。其方用羴羊肺一具。沸湯微燻。過曝乾。爲末。黃芩子一升。用三年醋浸。一伏時。煮熱。搗爛。和丸。梧子大。每用四十丸。麥門冬湯。食後服。候口中乾。妄語爲驗。數日小便大利。卽瘥。無羴羊以青羊膽代之。亦可。(李時珍)

【羴羊鼻】 主治 炙研服。療五尸遁尸。邪氣。
 性質 苦寒。無毒。

【羴羊膽】 主治 面下。好醜。如雀卵色。以二升同煮三沸。塗四五次良。

【羴肉】 卽羊肉之古籍別名。典見綱目。詳「羊肉」條。

【羴天子】 卽鬼臼之古籍別名。典見綱目。詳「鬼臼」條。

【羴天花】 卽鬼臼之古籍別名。典見綱目。詳「鬼臼」條。

見綱目。詳「鬼臼」條。

【羴天草】 卽海芋之古籍別名。典見庚辛玉冊。詳「海芋」條。

【羴藥花】 卽鬼臼之古籍別名。典見綱目。詳「鬼臼」條。

【脫毛】 卽白辛之古籍別名。典見別錄。詳「白辛」條。

【脫石】 卽滑石之古籍別名。典見本草集註。詳「滑石」條。

【脫紅換棉】 卽石蒜之古籍別名。典見和漢藥考。詳「石蒜」條。

【脫核仁】 卽桃仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳「桃仁」條。

【脫核嬰兒】 卽桃仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳「桃仁」條。

【春杵頭細糠】 採取 以糠稻聚穢者良。

性質 辛。甘。熱。
 主治 卒噎。刮取含之。亦可煎湯呷之。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論春杵頭細糠。曰。燒研水服。令婦人易產。

參攷資料 春杵頭細糠。治噎病。亦是春搗糞爾。(陶弘景)

【春鋤】 卽鷲鷲之古籍別名。典見綱目。詳「鷲鷲」條。

見綱目。詳「鷲鷲」條。

羊角能降之。詳本經所主。皆取散厥陰血結耳。愚按諸角。皆能入肝散血解毒。而犀角爲之首推。以其出食百草之毒。兼走陽明。力能祛之外出也。故痘瘡之血熱毒盛者。爲之必需。若痘瘡之毒。并在氣分。而正面稠密。不能起發者。又須羚羊角。以分解其勢。使惡血流於他處。此非犀角之所能及也。但知羚羊角能消目翳。定驚癇。而散痘瘡惡血之功。人所共味。獨羊角治青盲目暗。與羚羊角不殊。而辟除邪魅蠱毒。亦相彷彿。惜乎從未之聞。惟消乳癰。丹方用之。白羯羊角。亦能消乳癰。而方家每用琉璃角燈磁片。刮取薄屑。置胸中候脆。杵細酒服。方寸匙。屢效。端取宿腐之味。以消陳積之殆也。其鹿角刮屑。善消虛人乳腫。未潰即消。已潰即斂。卽本經主漏下惡血之治。龍角神魂不寧。功用與龍齒略同。千金方中有齒角并用者。牛角膠。端主閉血血崩。牛之一身。惟此無用。而本經特爲採錄。千金尤爲崩漏要藥。可見天地間無棄物也。

辨僞 ①鄭有鹿曰。羚羊僞者。

十一 畫 羚

用白兕角。及白牛蹄。逐磨僞充。其現切之羚羊絲。尤難辨識。按羚羊產梁州。眞州各處。商洛諸巒山中。及秦隴西域皆有。角長尺餘。有節特起。環繞如人手。指握痕。得二十四節者。尤有神力。今多用尖。取其精銳堅剛之力也。宜揀選地道頂尖。磨水取汁。用之尤靈。②曹炳章曰。羚羊有黑白二種。黑者清胃肝熱。白者清肺熱。熈風近年以白者爲重。故市上僅有白羚羊。黑者多無。詎知近年藥用漸繁。捕獵殆盡。因而價值日昂。且羚羊質性堅硬。刀切不入。我業習俗。以形式相競。鎔片入藥。以求雅觀。查其鎔片之法。先將羚羊水浸七八日。再用滾水泡透。經此手續。化堅爲軟。則鎔之片張闊。大形式雖雅觀。然經水浸洩。汁液盡出。性味已失。反增腥臭惡氣。治病功能已大半消失。嘗考古人修治羚羊之法。先用鐵錐錐細。再搗篩極細。更研萬匝。入藥。免刮黏胃腸。使原質不失效力。完固。法良意美。但一經研末。眞僞莫辨。難免以僞亂眞。則害人更甚。

配合應用 ③治驚邪癡寐。及

癰癩狂亂等疾。羚羊角。犀角。丹砂。牛黃。琥珀。天竺。黃金。箔。茯神。遠志。鉤藤。鈎。竹。瀝。④治肝腎虛而有熱。以致目昏生翳。羚羊角。枸杞子。甘菊花。決明子。穀精草。生地黃。五味子。黃蘗。蜜蒙花。木賊草。女貞實。⑤治噎塞不通。羚羊角爲細末。飲服方寸匕。⑥治產後煩悶汗出。不識人。羚羊角。燒末。東流水服方寸匕。未愈再服。⑦千金方。⑧治噎塞不通。羚羊角爲細末。飲服方寸匕。⑨治產後煩悶汗出。不識人。羚羊角。燒末。東流水服方寸匕。未愈再服。⑩千金方。⑪治噎塞不通。羚羊角爲細末。飲服方寸匕。⑫治產後煩悶汗出。不識人。羚羊角。燒末。東流水服方寸匕。未愈再服。⑬千金方。⑭治噎塞不通。羚羊角爲細末。飲服方寸匕。⑮治產後煩悶汗出。不識人。羚羊角。燒末。東流水服方寸匕。未愈再服。⑯千金方。⑰治噎塞不通。羚羊角爲細末。飲服方寸匕。⑱治產後煩悶汗出。不識人。羚羊角。燒末。東流水服方寸匕。未愈再服。⑲千金方。⑳治噎塞不通。羚羊角爲細末。飲服方寸匕。㉑治產後煩悶汗出。不識人。羚羊角。燒末。東流水服方寸匕。未愈再服。㉒千金方。㉓治噎塞不通。羚羊角爲細末。飲服方寸匕。㉔治產後煩悶汗出。不識人。羚羊角。燒末。東流水服方寸匕。未愈再服。㉕千金方。㉖治噎塞不通。羚羊角爲細末。飲服方寸匕。㉗治產後煩悶汗出。不識人。羚羊角。燒末。東流水服方寸匕。未愈再服。㉘千金方。㉙治噎塞不通。羚羊角爲細末。飲服方寸匕。㉚治產後煩悶汗出。不識人。羚羊角。燒末。東流水服方寸匕。未愈再服。㉛千金方。㉜治噎塞不通。羚羊角爲細末。飲服方寸匕。㉝治產後煩悶汗出。不識人。羚羊角。燒末。東流水服方寸匕。未愈再服。㉞千金方。㉟治噎塞不通。羚羊角爲細末。飲服方寸匕。㊱治產後煩悶汗出。不識人。羚羊角。燒末。東流水服方寸匕。未愈再服。㊲千金方。㊳治噎塞不通。羚羊角爲細末。飲服方寸匕。㊴治產後煩悶汗出。不識人。羚羊角。燒末。東流水服方寸匕。未愈再服。㊵千金方。㊶治噎塞不通。羚羊角爲細末。飲服方寸匕。㊷治產後煩悶汗出。不識人。羚羊角。燒末。東流水服方寸匕。未愈再服。㊸千金方。㊹治噎塞不通。羚羊角爲細末。飲服方寸匕。㊺治產後煩悶汗出。不識人。羚羊角。燒末。東流水服方寸匕。未愈再服。㊻千金方。㊼治噎塞不通。羚羊角爲細末。飲服方寸匕。㊽治產後煩悶汗出。不識人。羚羊角。燒末。東流水服方寸匕。未愈再服。㊾千金方。㊿治噎塞不通。羚羊角爲細末。飲服方寸匕。㊿

兩。犀角三錢。羌活。防風。各一兩。葱。艾仁。③秦艽。各一兩。上爲末。煉蜜丸。④治肝之病。必用羚羊角。亦猶入心之病。必用犀角也。⑤陸九芝云。⑥羊火毒也。而羚羊則屬木。故其角入厥陰肝經。甚捷。同氣相求也。肝主木。開竅於目。其發病也。目暗障翳。而羚羊角能平之。肝主風。在合爲筋。其發也。小兒驚癇。婦人子癰。大人中風。搐搦及經脈緊急。歷節掣痛。而羚羊角能舒之。魂者肝之神也。發病則驚駭不寧。狂越僻謔。癡癲卒死。而羚羊能安之。血者肝之臟也。發病則瘀滯下注。疳積毒痢。瘡腫癰癰。產後血氣。而羚羊角能散之。相火寄於肝膽。在氣爲怒。病則煩懣氣逆。噎塞不通。寒熱及傷寒伏熱。而羚羊角能降之。羚羊之性。靈而筋骨之精。在角故又能辟邪惡。而解毒毒。碎佛牙而燒爛走蛇。魘也。本經別錄。甚著其功。而近俗罕能發揚。惜哉。⑦李時珍云。⑧羚羊出於西域。似羊而大。角有節。最堅勁。能碎金。剛石。與龍骨。夜宿防。患。以角掛樹。而棲。多

呈黃褐色。稍有光澤。末端稍彎曲。有螺旋狀關節。日本產者帶黑色。長五寸餘。基部有橫皺。謂之倭羚。半角。羚羊產於中國西北者爲正地道。值昂而藥效甚著。產於遼、緬、安南者爲南羚。其形態與北羚無異。棲息於多巖石之深山。烏白赤各色俱有。角之烏白隨其毛色爲轉移。有曲輪狀。亦有斜直者。此種南羚有效用與否。尙有待於證驗。唯其價值甚賤。而形質足以正地道者相混。則亟須辨別也。茲舉其相違特徵於下：正羚。角基部橫剖面幾成正規則。南羚。角空擴大。剖面呈橢圓形。正羚。環節動盪。凸突。節目上球結成索結狀。南羚。節目坡斜。光滑。正羚。角長一尺者。角尖常有三四寸。南羚。角尖約二寸左右。但有個共通點。凡角直者。其尖長。曲輪角之角尖常較短。南羚亦有角基部細圓者。唯產量不多。其環節亦坡斜。不能如正羚之凸突。故節目乃固定之特徵。可資鑑別者也。至角質白。尖端有血色。跡均與正羊相同。在出產地土人每對售二三元。基圓白雅者。至市

場值十餘元。嘗有人帶回國。竟以正角價售於市肆。其相似之形狀。概可想見矣。

製法 凡使不可單用。須要折扣。元對繩縛。鐵鏈細。重重密裹。避風。以旋旋取用。搗碎極細。更研萬匝入藥。免刮人腸。不用時密封貯存。隨用則磨末吞服。

用法 水磨服。又與他藥水煎。或到末和作丸散。

性質 鹹。寒。無毒。效驗 平肝。熄風。清熱。安神。用作鎮痙藥。又爲通經藥。

主治 明目。益氣。起陰。去惡血。注下。辟瘴。惡鬼不祥。常不覺寐。傷寒時氣。寒熱。熱在肌膚。溼風注毒。伏在骨間。及食噎不通。久服強筋骨。起陰益氣。利丈夫。別錄。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論羚羊角曰。治驚悸煩悶。心胸惡氣。癰癰瘡。溪毒。唐孟詵食療本草論羚羊角曰。治中風筋攣。附骨疼痛。作末蜜服。治卒熱。及熱毒痢血。疳氣。癰水塗腫毒。唐甄權藥性本草論羚羊角

曰。治一切熱毒風攻症。中惡毒風。卒死。昏亂。不識人。散產後惡血。衝心。煩悶。燒末酒服之。治小兒驚癇。治山瘴。及噎塞。元朱丹溪本草衍義補遺論羚羊角曰。羚羊角味苦。鹹。性寒。無毒。入肝經。主傷寒熱。在肌膚。溫風注伏在骨間。邪氣不祥。驚夢狂越。心神不寧。小兒疳熱。驚搐。產後敗血。沖心。清心解暑。明目。益氣。燒灰。又主食噎不通。其角多倒掛。痕深入者。爲真。羚羊屬木。宜入厥陰。木得其平。而風火諸症。無能乘矣。明李時珍本草綱目論羚羊角曰。平肝舒筋。定風安魂。散血下氣。辟惡解毒。治子癰瘻疾。清黃宮繡本草求真論羚羊角曰。羚羊角苦。鹹。大寒。功端入肝。瀉火。兼入心肺二經。考書所論主治。多屬元統。惟李時珍剖晰甚明。言羊火畜也。而羚羊則屬木。故其角入厥陰。肝經甚捷。同氣相求也。肝主木。開竅於目。其發病也。目暗障翳。而羚羊角能平之。肝主風。在合爲筋。其發病也。小兒驚癇。婦人子癰。大人中氣。搗搗及筋脉。擊急。歷節。攣痛。而羚羊角能舒之。魂者肝

之神也。發病則驚駭不寧。狂越僻謬。癰寐卒死。而羚羊角能安之。血者肝之臟也。發病則瘀滯下注。疳痛。毒痢。瘡腫。癰瘻。產後血氣。而羚羊角能散之。相火寄於肝膽。在氣爲怒。病則煩躁氣逆。噎塞不通。寒熱及傷寒伏熱。而羚羊角能降之。羚羊之性。燥而筋骨之精。在角故又。能辟惡。而解諸毒。碎佛牙而燒煙。走蛇虺也。本經別錄。甚著其功。而近俗罕能發揚。惜哉。時珍之論如此。但此雖能清肺及肝。若使過用。久用。則更有伐生之氣耳。多兩角一。角者勝。劉研極細。或磨用。清驅石頑。張氏醫通論羚羊角曰。羚羊屬木。入足厥陰。伐肝最捷。目暗翳障。而羚羊角能平之。瘡瘡正面稠密。不能起發。而羚羊能分之。小兒驚癇。婦人子癰。大人中風。搗搗及筋寒。歷節痛。而羚羊能舒之。驚駭不寧。狂越僻謬。而羚羊能安之。惡鬼不祥。而羚羊能辟之。惡血注下。癰毒。癰瘻。瘡腫。癰瘻。產後血氣。而羚羊能散之。溼熱留滯。陽氣不振。陰器衰痿。而羚羊角能起之。煩燥氣逆。噎塞不通。鬱爲寒熱。而羚羊

參攷資料

●治頭面風痛。不可缺此。(寇宗奭) ①水停心下不行則腎氣燥宜以辛潤之細辛之辛以行水氣而潤燥(成無己) ②細辛非華陰者不得爲真。若單用末不可過一錢。多則氣悶塞不通者死。雖死無傷。近年開平獄中營治此。不可不記。非本有毒。但不識多寡耳。(陳承) ③小辛少辛。皆細小之義也。按山海經云。浮戲之山。多少辛。管子云。五沃之土。羣藥生少辛。是矣。(李時珍)

【細辛木皮】即秦皮之古籍別名。典見和漢藥考。詳「秦皮」條。

【細亞錫飯】產地 生大庾嶺。

形態 硬莖叢生。葉如柳葉。附莖纏結。長梗小實。嬌紫下垂。可供藥用。

主治 洗瘡毒。

【細青皮】即青皮之處方用名。詳

十一畫 細

紵 紺 終 袋 羚

【細青皮】即青皮之處方用名。詳

十一畫 細

紵 紺 終 袋 羚

【細青皮】即青皮之處方用名。詳

十一畫 細

紵 紺 終 袋 羚

【細青皮】即青皮之處方用名。詳

十一畫 細

紵 紺 終 袋 羚

【細青皮】即青皮之處方用名。詳

十一畫 細

紵 紺 終 袋 羚

【細青皮】即青皮之處方用名。詳

十一畫 細

紵 紺 終 袋 羚

【細青皮】即青皮之處方用名。詳

十一畫 細

紵 紺 終 袋 羚



細亞錫飯

『青皮』條。

【細昆布】即海帶之日本名。詳『海帶』條。

【細草】即遠志之古籍別名。典見本經。詳「遠志」條。

【細茶】即雨前茶之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「雨前茶」條。

【細荔】即龍眼之古籍別名。典見和漢藥考。詳「龍眼」條。

【細理石】即石膏之古籍別名。典見別錄。詳「石膏」條。

【細寬】即野葛之古籍別名。典見別錄。詳「寬」條。

【細連枝】即六安茶之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「六安茶」條。

【細黑豆】即稽豆之古籍別名。典見逢原。詳「稽豆」條。

【細腰蜂】即蠶蛹之古籍別名。典見莊子。詳「蠶蛹」條。

【細葉冬青】即冬青之葉細而木皮可製蠟者。詳「冬青」條。

【細葉菖蒲】即石菖蒲葉較細者之別名。詳「石菖蒲」條。

【細瓊珠】即真珠之處方用名。詳「真珠」條。

【細礪石】即砥石之古籍別名。典

見綱目。詳「砥石」條。

【紵麻】即苧麻。以其皮可績紵。故名。性質功能。參見「苧麻」條。

【紺莖】即馬蘭之日本名。詳「馬蘭」條。

【紺著】即虎杖之古籍別名。典見和漢藥考。詳「虎杖」條。

【紺殼】即荔枝之古籍別名。典見和漢藥考。詳「荔枝」條。

【紺髮】即蜥蜴之大而色玄紺者。性質功能。詳「蜥蜴」條。

【終石】基本 爲石類之一種。可供藥用。

性質 辛。無毒。

主治 療陰癰瘰。益精氣。小便

難。

【袋角】即鹿茸之古籍別名。典見和漢藥考。詳「鹿茸」條。

【羚羊片】即羚羊角之處方用名。詳「羚羊角」條。

性質 甘。平。無毒。

主治 靈瘡。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食

療本草論羚羊肉曰。和五味炒熟。

投酒中。經宿飲之。治筋骨急強中。

風北人恒食南人食之。免蛇蟲傷。

【羚羊角】

命名 本品獨棲。懸

靈也。其字從鹿。從靈。省文。故名。後人簡寫爲羚羊。藥用其角。遂名之曰羚羊角。

處方用名 鎊羚羊。羚羊片。麝

羚羊。

古鑄別名 麝羊角。麝角。九尾

羊角(綱目) 羝角(山海經) 羝角

羝羊角(和漢藥考)

外國名 屬 Nemorhaedus

crispus Temm. (拉丁) Antelope-horn. (英) Hirschziege-

horn (德)

基本 屬鹿草類羚羊之角。

產地 陳仁山藥物生產辨云。

羚羊產中俄交界各地。如西北利

亞及安南等處。採辦者以張家口

牛莊爲聚處。

形態 羚羊體長四尺餘。高半

之。類山羊。毛呈黃褐色。腹部則爲

白色。日本所產優羚羊(麝鹿) A

Capra 亦爲羚羊之一種。其有名

產地爲日本奧州南部地方。體高

二尺餘。毛青灰色。其尖端呈黑

色。其角爲細長角。長尺許。徑寸餘。

一二一七

十一畫 細

又和語本草綱目曰。日本所謂細辛。類杜衡也。杜衡莖葉氣味俱似細辛。時珍曰。杜衡亂細辛。則根苗功用皆彷彿。不可不審。今家園多植之。謂可免雷霆之災。此細辛也。凡類似細辛者。本草多載。常用之可也。又大和本草曰。一說加茂葵爲細辛。其根甚辛。實乃杜衡也。又山野有一種。根味似細辛。俗即謂之細辛。此白薇也。又物類彙編曰。種類頗多。中國產上品。葉圓而厚。日本產上品。葉稍長。南部佐渡產大抵相似。伊豆之天城山產亦上品。讀岐之大川產葉薄。至冬即枯。又用藥須知曰。細辛中日俱有之。形細味辛。習智如蜀椒者爲眞。日本產細辛。尚有優劣。加茂葵味薄。佐渡秋田爲上。葉皆圓。色青。無白斑。視南部所產爲佳。關東及北地產。葉有香氣。又日用藥品考曰。細辛以中國產者爲眞。惟攪雜杜衡。宜選別淨盡。日本產者。藥舖每呼爲眞細辛。其有呼土細辛。近江細辛。伊吹細辛。並杜衡也。杜衡較細辛根粗。辛味少。有臊氣。又藥學士朝比奈泰彥嘗將杜衡及細辛之

原植物。互相研究。記述其關係與區別。又析出杜衡之揮發油。並將油分蒸餾而析出揮發油之主成分。著有記事一篇。錄入明治四十年藥學雜誌第三百〇二號。題曰杜衡之研究及與細辛之關係。摘錄如下。細辛與杜衡。每易混淆。且杜衡之出產。視細辛爲多。故藥舖往往以杜衡代之。本草辨別之法。僅云細辛根細。味初不辛。須臾大辛烈。杜衡根粗。辛味少有。臊氣。頗屬簡陋。難臻完備。余按細辛之葉較薄。形似腎臟而銳尖。花筒內部有類似縱線之突起。杜衡葉厚如草作卵狀心形。又似戟狀心形。多有白斑。花筒內部有縱橫似網之突起。又細辛爲一年生葉。杜衡則爲常綠葉。依此區別。庶不致混亂矣。往年在東京藥舖購得生細辛約三四十斤。皆杜衡也。可知吾國從前在盛行中藥時代。細辛與杜衡常混用矣。此余所以利用此機。即以研究杜衡爲研究細辛之資也。

辨爲 鄭有巖曰。爲名洋細辛。形雖似而無味。按細辛氣味辛

溫。遼東產者名北細辛。可以入藥。南方產者名杜衡。其莖稍粗。辛味稍減。一莖有五七葉。俗名馬蹄香。不堪入藥。北產者其莖極細。其味極辛。若此種粗而無味。先失命名之義。又奚有治病之功乎。曹炳章曰。按細辛六月出新。關東出者爲北細辛。根莖細。清白。氣辛。葉少。梗多爲最佳。江南甯國。涇縣出亦佳。江甯句容。滁州。白陽山等處出。皆次。亳州出者爲馬細辛。山東出爲東細辛。均次。不堪藥用。

配合應用 治陽明火熱上攻。以致齒痛。用細辛。石膏。

通治婦人子宮冷不受孕。用細辛。當歸。芍藥。芎藭。牡丹。蘘本。甘草。白薇。

療目痛。用細辛。鯉魚膽。青羊肝。菊花。決明子。

療傷寒少陰咽痛。用細辛。甘草。

治風頭痛。用細辛。藁本。芎藭。白芷。荊芥。防風。

解利傷風寒鼻塞。用細辛。紫蘇。防風。甘草。桔梗。杏仁。薄荷。桑白皮。

一二一六

治暗風卒倒。不省人事。細辛末吹入鼻中。(危氏得效方)

治虛寒嘔噦。飲食不下。細辛去葉半兩。丁香二錢半。爲末。每服一錢。柿蒂湯下。

治小兒客忤。口不能言。細辛。桂心末等分。以少許含口中。(外臺祕要方)

治小兒口瘡。細辛末醋調。貼臍上。(衛生家寶方)

治口舌生瘡。細辛。黃連等分。爲末。搽之。漱涎甚效。名兼金散。一方用細辛。黃蘗。(三因方)

治口瘡。齒齦。腫痛。細辛。煮濃汁。熱含。冷吐。取瘡。(聖惠方)

治鼻中息肉。細辛末。時時吹之。(聖惠方)

治諸般耳聾。細辛末。溶黃蠟丸。風屎大。綿裹一丸。塞之。一二次。即愈。須戒怒氣。名聰耳丸。(陳氏經驗方)

用薑 三分至八分。

施用宜忌 凡陰虛陽旺。及無風寒實邪者。禁用。惡黃耆。狼毒。萊菔。忌生菜。狸肉。畏消石。滑石。反藜蘆。魯黃。棗根爲之使。

依附津液之風寒。不能使津液復其常。且不能使津液中氣不隨提曳以出。故其治咳。每與五味子。乾薑爲耦。如小青龍湯。真武湯。厚樸麻黃湯是也。若射干麻黃湯。則不用乾薑。用生薑。四逆散。小柴胡湯。則但用乾薑五味子。不用細辛。蓋水氣與風寒相搏。有飲有溼。有水。隨人異。亦隨證異。則兼嘔者有之。兼滿者有之。兼喘者有之。不可但因其咳。混同施治也。特風寒將化。則細辛不可用。小柴胡湯證。半化半未化者。且然。何況全化者耶。四逆散證。雖以四逆係之。少陰。然終外寒內熱。故其治咳。乾薑五味可用。細辛不可用矣。細辛惟治寒。乃爲恰合。惡寒者。寒之方。謂口渴者。寒之已化。腦動者。寒與在上之陽戰。而陽欲伏。下有陳寒。則必惡寒可見矣。曰脇下偏痛發熱。其脈弦緊。此寒也。當以溫藥下之。宜大黃附子湯。曰寒氣厥逆。赤丸主之。二者一溫以附子。下以大黃。一溫以烏頭。利以茯苓。中夏一使其從大便解。一使從小便解。皆以細辛聯絡其間。不然則溫自溫。下自下。利

自利。終不能使寒氣徹底澄清耳。於金匱求大便通利者。有大黃附子湯。於傷寒論求利止者。有烏梅丸。可知細辛能已後陰諸疾矣。至千金治鼻寒耳聾齒痛諸方。用細辛者甚多。至口鼻目病。則幾乎無方不用。豈本經所謂明目利九竅者。誠不必別擇盡可用之耶。然即此亦可窺其嚴於去取之意矣。觀於目病。由勞者。息肉生者。有障翳者。有赤白膜膚者。生珠管者。皆不用。眼暗者。淚出者。皆赤者。多用之。則目病用細辛。有去取矣。鼻病生息肉者。衄血者。皆不用。鼻塞者。鼻鼽者。多用之。則鼻病用細辛。有去取矣。口病。惟口臭齒痛多用之。耳病。惟外治多用之。惟前陰病。則絕無用者。曾謂九竅不利於細辛。毫無別擇哉。素問曰。六經爲川。腸胃爲海。九竅爲水注之氣。細辛雖善治著水之寒。然著於小者。能治之。著於川者。於海則非所長矣。前陰者。汪洋大水之出路。故非細辛所能與也。【清】關立陞本草選旨論細辛曰。細辛味大辛。氣溫。氣厚於味。陽也。升也。無毒。惡黃芪。狼毒。山

茱萸。忌生菜狸肉。畏滑石。硝石。反藜蘆。稟天地陽升之氣。以生入手少陰。太陰經風藥也。風性升。升則上行。辛則橫走。溫則發散。有開通諸竅之功。有除溫散寒之理。故本經主咳逆上氣。頭痛腦動。百節拘攣。風濕痺痛。死肌。別主溫中下氣。破痰利水道。開胸中滯結。除喉痺。塞鼻。不聞香臭。風癰癩疾。下乳結。汗不出。血不行。安五臟。益腦通精氣。且甄權之除齒痛。血閉。弘景以之去口臭。而詳求厥志。其所以治諸風。濕寒風。頭痛。痰飲。胃中滯氣。驚癰。取其辛溫能散也。其治口瘡。口臭。喉痛。齒齦腫痛者。取其能散浮熱也。亦火鬱發之之義。其治風寒咳嗽上氣者。辛能泄肺也。其治膽氣不足。驚癰。眼目諸疾者。辛能補肺也。其通少陰及耳竅便瀟者。辛能潤燥也。故嘗佐以獨活。治少陰頭痛。佐以芎藭。治諸瘧痺。得歸。芍。牡。本。芩。芷。甘草。療婦人血閉。得芩。明。鯉。魚。膽。羊。肝。止風淚。目疼。得麻。附。煎。湯。發寒邪自裏之表。每多得效耳。然其性辛燥發散。故凡病內熱火盛。及氣虛。血虛。陰虛

等症。法並忌之。入風藥。亦不可過五分。若過五分。直有氣塞而死之患。非必有毒。特不識多寡耳。【清】賈九如辨藥指南論細辛曰。細辛味辛性溫。若寒邪入裏。而在陰經者。以此從內托出。佐九味羌活湯。發散寒邪。快捷。因其氣味辛香。故能上升入荳辛湯。療目痛。後差明。畏日。癰。澹。難。閉。合。通。竅。湯。散。肺。氣。而通鼻竅。在清胃湯。祛胃熱。而止牙疼。此熱藥入寒劑。蓋反以佐取之之義也。但少用助火。多用則氣閉不通。每劑止三四分耳。

外學說 日本和漢三才圖會

曰。細辛山谷間處處有之。皆不及華陰高麗者。葉似小葵。莖葉根細而直。色紫。味極辛。嚼之習習如椒。而更甚於椒。大抵能亂細辛者甚多。皆當以根苗色味細辨之。杜衡。鬼督郵。徐長卿。白薇。白前。皆能僞細辛。按細辛中日俱用之。奧州津輕及江州之產良。阿波及豐前小倉之產次之。其葉似小葵而青。有小白點。夏月開小紫花。葉短根直。外黃內白。其氣略如椒。雖辛不甚用。細辛藏人參。則人參不蛀云。

通諸竅之功也。其曰久服明目。利九竅。輕身長。年者必無是理。蓋辛散升發之藥。豈可久服哉。【清】黃宮繡本草求真論細辛曰。細辛味辛而厚。氣溫而烈。爲足少陰腎溫經主藥。凡風寒邪入至陰。而見本經頭痛。腰脊俱強。口瘡喉痺。鼻淵齒齬。水停心下。口吐涎沫。耳聾鼻癢。倒睫便澹者。並宜用此調治。或用獨活爲使。俾在表之陽邪可表。而在裏之伏邪可除。故書載能通關利竅。破痰下乳。行血發汗。且走腎者。必兼肝與膽。膽虛驚癇。及風眼淚下者。得此辛散宣通。而令淚收驚除。至書所云。服能入腎調燥。非是火盛水衰。陰被陽涸而成。實因陰盛陽衰。火風於水而致也。遇此辛以除寒。溫以燥溼。則陰得解。而不凝矣。豈剛燥不撓之謂也乎。世之論藥性者。每鮮如此體會。但知就燥論燥。而致固執不通。獨不思經有云。腎苦燥。急食辛以潤之。平。然味厚性烈。所用止宜數分。過則氣寒命傾。若血虛頭痛者。尤宜戒爲。產華陰者。眞去變藥者。用之。【清】葉天士本草經解論細辛曰。

細辛氣溫。眞天春升之木氣。入足厥陰肝經。味辛無毒。得地西方之金味。入手太陰肺經。氣味俱升。陽也。肺屬金。而主皮毛。形寒飲冷。則傷肺。肺傷則氣不降。而咳逆上氣之症生矣。細辛入肺。溫能散寒。所以主之。風爲陽邪。而傷於上。風氣入腦。則頭痛腦動。風性動也。其主之者。風氣通肝入肝辛散也。地之溼氣。感則害人皮肉筋骨。百節拘攣。溼傷筋骨也。風溼痺痛。溼傷肉也。死肌。溼傷皮也。細辛辛溫。散溼活血。則皮肉筋骨之邪散而愈也。久服辛溫。暢肝。肝開竅於目。五臟津液上奉。故目明。辛溫開發。故利九竅。肝木條暢。以生氣血。所以輕身長年也。【清】徐洄溪本草經百種錄論細辛曰。此以氣爲治也。凡藥香者。皆能疎散風邪。細辛氣盛而味烈。其疎散之力更大。且風必挾寒。以來而又本熱而標寒。細辛性溫。又能驅逐寒氣。故其疎散上下之風邪。能無微不至。【清】黃元御長沙藥解論細辛曰。細辛味辛氣溫。入手太陰肺足少陰腎經。降衝逆而止咳。驅寒溼

而蕩濁。最清氣道。兼通水源。【清】楊時泰本草述鈞元論細辛曰。細辛香味俱細。少陰本藥也。其辛熱能溫足少陰之寒。究溫寒之用。所以致於內外周身。而上行爲最者。非肝不能也。別錄所云。益肝膽通精氣。最爲扼要。其在至陰之分。雖不倫於補陽諸味。却能就陰分而散寒邪。即至陽之分。雖難比於行氣諸劑。却能就陽分而散陰結。陰中陽通。則能資營氣而使暢矣。陽中陰通。則能助風劑而使行矣。總以辛溫達腎肝之氣。而暢陽於下。導陰於上。舒腎陰而升肝陽。最爲有裨於人。而非益氣血之藥也。此味因潔古言諸風通用。而承襲者往往不察所宜。不知風從陽氣言之。有虛有實。如陽壅於下。而爲風。自以達陽爲主。若陽壅於上。而爲風。即宜以和陰爲主。反加辛溫升散。則陽愈壅。而風愈甚矣。細辛治陽鬱之風。不治陽壅之風。投之若誤。爲害滋甚。有中氣虛而時患傷風。竟從補中氣而愈者。不可參此義。以用細辛乎哉。至其能治風溼痺痛。亦由陽虛化風。因之化溼者

也。凡陽虛鬱風者。多化溼。不可不知。【清】鄒樹本經疏證論細辛曰。細辛色紫。紫者赤黑相兼也。亦爲心色。黑爲腎色。心與腎皆屬少陰。兩少陰經皆短而直。細辛一枝直上。體細柔勁。似之少陰者。又皆水火相依。細辛體雖細。味極烈。似之。故凡風寒氣。依於精血津液。便溺涕唾。以爲患者。並能曳而出之。使相離而不相附。則精血津液。便溺涕唾。各復其常。風寒氣。白無所容。如本經所載主治。治逆者。風寒依於胸中之飲。頭痛腦動者。風寒依於骨節。屈伸洩澤之液。風溼痺痛死肌者。風寒依於肌肉中之津。推而廣之。隨地皆有津液。有津液處。風寒皆能依附焉。故在胸爲痰。爲帶結。在喉爲痺。在乳爲結。在鼻爲癰。在心爲癰。在小腸爲水。在氣分爲汗不出。在血分爲血不行。此別錄之與本經一貫不異者也。然須審定風寒果否零亂。細碎倚著於津液者。宜之。若風寒偏被一身。及與營衛相搏者。自有他味爲治。與細辛無預也。細辛能提出

風。綠樹枝聚其脂液而成。其猶冬青樹上之小蟲。能造白蠟者。然明透如琥珀。可以染色與藥用。

性質 甘。鹹。平。有小毒。

主治 五臟邪氣。金瘡。帶下。破積血。生肌止痛。與麒麟竭大同小異。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論紫鑽曰。溼痒瘡疥。宜入膏用。益陽精。去陰滯氣。

參攷資料 紫鑽治痘瘡。有活血起脹之功。無鹹寒作瀉之患。功用倍於紫草（醫學大辭典）

【絲通草】即通草之處方用名。詳

【通草】條。

【細子】即羊桃之古籍別名。典見綱目。詳「羊桃」條。

【細木通】即木通之處方用名。詳

【木通】條。

【細石】即石膏之古籍別名。典見和漢藥考。詳「石膏」條。

【細辛】

命名 本品根細而味極辛故名。

處方用名 北細辛。炙細辛。

古籍別名 小辛。少辛（本經）

玉簪絲。綠鬚。蠶（和漢藥考）山人

參（俗名）

學名 Asarum Sieboldi,

Mig.

基本 屬馬兜鈴科。爲細辛之

鬚根。

產地 陳仁山藥物生產辨云。

細辛產自遼寧吉林兩省五月新

朝鮮亦有出。

形態 細辛爲多年生草本。生

於山野陰地。春日自地下莖發生

新葉。具長葉柄。葉爲心臟形。末端

尖銳。底部凹陷。似杜衡而薄。無光

澤。亦無紋理。花開於新葉之間。緊

接地。上大纔三四分。三瓣。色紫黑。

形似蓮。花朶極小。開則下垂。入秋

則苗葉俱枯。其地下莖之副根。長

三五寸。粗二三分。外淡褐色。內白

色。氣味峻烈。辛若山椒。



細辛

採取 二月八月採根陰乾。

製法 雷斅曰。凡使細辛。切去

頭子。以瓜水浸一宿。曝乾。用須揀

去雙葉者。服之害人。

性質 辛溫。無毒。

效能 通竅。搜風。散寒。行水。用

作面部風痛藥。又爲頭痛咳嗽藥。

主治 咳逆上氣。頭痛。腦動。百

節拘攣。風溼痺痛。死肌。久服明目。

利九竅。輕身。長年（本經）溫中下

氣。破痰利水道。開胸中滯結。除喉

痹。鼻不聞香臭。風癰癩疾。下乳

結。汗不出。血不行。安五臟。益肝膽。

通精氣（別錄）

張仲景之發明 細辛一味。經

張仲景之實驗。認爲主治宿飲停

水。故治水氣在心下而咳滿。或上

逆。或脇痛。茲考徵如下。小青湯證

曰。心下水氣。乾嘔。發熱而咳。苔

甘五味。薑辛湯證曰。咳胸滿（以

上二方細辛皆三兩）麻黃附子

細辛湯證（麻黃附子細辛湯條

特云。少陰病。反發熱而不舉。餘證

爲則按六經也。者是後人之攪入。

而非仲景之古也。所謂少陰病者

雖臥。小便清利也。雖臥者。惡寒甚

也。惡寒者。水病也。仲景氏之治惡

寒也。其用附子者居多。又其言曰。

尤附並走皮中逐水氣也。由是觀

之惡寒。爲水氣也明矣。其喘而

惡寒。有痰飲之變者。此方主之。）

大黃附子湯證曰。脇下偏痛。桂枝

草黃附子湯證曰。心下堅大如

盤。邊如旋杯（以上三方。細辛皆

二兩）

歷代記述攷證 【南北朝】陶

弘景本草集註論細辛曰。含之。去

口臭【唐】甄權藥性本草論細辛

曰。添膽氣治嗽。去皮風。溼痒。風眼

淚下。除齒痛。血閉。婦人血滯。腰痛

【元】王好古湯液本草論細辛曰。

潤肝燥。並治督脈爲病。脊強而厥。

【明】李時珍本草綱目論細辛曰。

治口舌生瘡。大便燥結。起目。中倒

睫【明】經希雍本草經疏論細辛

曰。細辛味辛溫而無毒。入手少陰

太陽經。風藥也。風性升。升則上行

辛則橫走。溫則發散。故主咳逆。頭

痛。胸動。百節拘攣。風溼痺痛。死肌

蓋痺及死肌。皆是感風之濕氣。或

兼風寒所成。風能除溼。溫能散寒

辛能開竅。故療如上諸風寒溼疾

也。別錄又謂溫中下氣。破痰。開胸

除喉痺。鼻下乳結。汗不出。血不

行。益肝膽。通精氣。皆升發辛散。開

十一畫 紫

之。(胃歌) 蘇色紫赤。枝莖空通。其氣朝出暮入。有如經脉之氣。晝行於陽。夜行於陰。是以蘇葉能發表。汗者血液之汗也。易思蘭常用蘇葉通十二經之開竅。治明腦飽悶。通大小便。下利赤白。予亦常用治吐血下血。多奏奇功。夫茜草芎歸之類。皆能引血歸經。然不若紫蘇蓋出夜入之行速耳。(張隱菴) 長沙藥解。金匱半夏厚朴湯。用蘇葉治婦人咽中如有炙轆。以其降濁而散滯也。(黃元御)

【紫蘇子】 蘇方用名。炒蘇子。炙蘇子。家蘇子。杜蘇子。蘇子霜。

基本 屬唇形科。爲紫蘇之子實。

產地 陳仁山藥物生產辨云。蘇子各省均有。出廣東以番禺爲正。清遠大石等處亦多生焉。

形態 蘇子大似芥子。色黃褐。採取 九月間。莖葉枯時收之。

製法 凡使蘇子。以自收者眞。市售者多偽。或焙炒或蜜炙用。

性質 辛溫無毒。效能 開鬱下逆氣。消痰定喘。

咳。用作祛痰鎮咳藥。

主治 下氣除寒。溫中。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論蘇子曰。治上氣咳逆。冷氣腰脚中溼氣。風結氣。研汁煮粥。長食令人肥白身香。宋日華諸家本草論蘇子曰。調中益五臟。止霍亂嘔吐反胃。補虛勞。肥健人。利大小便。破癥結。消五膈。消痰止嗽。潤心肺。宋寇宗奭本草衍義論蘇子曰。治肺氣喘急。明李時珍本草綱目論蘇子曰。治風順氣。利腸寬腸。解魚蟹毒。清汪訥庵本草備要論蘇子曰。蘇子與葉同功。潤心肺。尤能下氣定喘。止嗽消痰。利腸寬腸。溫中開胃。

配合應用 順氣利腸。紫蘇子。麻子仁等分研爛。水濾取汁。同米煎粥食之。(濟生方)

治風順氣。利腸寬中。用紫蘇子一升微炒。杵以生絹袋盛於三斗清酒中。浸宿炒飲之。(聖惠方)

治一切冷氣。紫蘇子高良薑橘皮等分。蜜丸。梧子大。每服十丸。空心酒下。亦治風溼脚氣。(藥性論方)

治風寒濕痺。四肢攣急。脚腫不可踐地。用紫蘇子二兩。杵碎。以水三升。研取汁。煮粳米二合。作粥和葱椒薑鼓食之。(聖惠方)

治消渴變水。服此冷水從小便出。用紫蘇子炒三兩。蘿蔔子炒三兩。爲末。每服二錢。桑根白皮煎湯服。日二次。(聖濟方)

治夢中失精。蘇子一升。熬杵研末。酒服方寸匕。日再服。(外臺祕要方)

治食蠶中毒。紫蘇子煮汁飲之。(金匱方)

治上氣咳逆。紫蘇子入水研。濾汁。同粳米煮粥食。(簡便方)

用量 錢半至三錢。施用宜忌 凡腸滑氣虛者禁用。

著名方劑 蘇子降氣湯。治虛陽上攻。氣不升降。上盛下虛。痰涎壅盛。胸膈噎塞等症。(局方) 蘇子半夏各二錢。牛前胡炙草厚朴陳皮各八分。當歸二錢。沉香七分。薑三片。上藥水煎。不拘時服。若虛冷人加肉桂五分。黃耆一錢。

參攷資料 蘇子下氣。與橘皮相宜。(陶弘景) 蘇子與藥同功。發散風氣。宜用藥。清利上下。則宜用子。(李時珍) 氣虛表虛者。禁用藥。腸潤肺虛者。禁用子。(李士材) 火升作嘔者。不宜用藥。惟可用子。(繆希雍)

一二二

【紫蘭】 卽白芨之古籍別名。典見靈芳譜。詳「白芨」條。

【紫蘭根】 卽白芨之古籍別名。典見和漢藥考。詳「白芨」條。

【紫蘂】 卽荔枝之古籍別名。典見和漢藥考。詳「荔枝」條。

【紫櫻】 卽櫻桃之實。紫色。皮裏有細黃點者。功能與尋常櫻桃同。參見「櫻桃」條。

【紫蠶】 卽石蠅之俗名。典見綱目。詳「石蠅」條。

【紫蠶】 卽石蠅之古籍別名。典見綱目。詳「石蠅」條。

【紫鑽】 原名 紫鑽。本品色赤。狀似鑽石。破開乃紅故名。

古鑑別名 赤膠(蘇恭) 紫梗。

勒佐(綱目)

產地 出南番諸地。形態 紫鑽爲一種細蟲如蠅。

香氣烈。莖幹中空。故能散上徹下。外開皮毛。泄肺氣而通腠理。上則通鼻塞。清頭目。爲風寒外感。藥中則開胸膈。醒脾胃。宣化痰飲。解鬱結。而利氣滯。方書云。舒蘇也。楚通語也。是蘇字有舒散之義。氣疎以達。蘇之得名以此。今人恒以莖葉子三者分主各症。蓋此物產地不同。形狀亦別。多葉者其莖亦細而莖幹大者。則葉又少。故分析辨治。尤爲精切。葉本輕揚。則風寒外感。用之。疏散肺閉。宣通肌表。泄風化邪。最爲敏捷。莖則質堅。雖亦中空。而近根處。偉大豐厚。巨者徑寸。則開泄裏氣。用之。解結止痛。降逆定喘。開胃醒脾。固其開泄。外感之旨不同。而子則滑利直下。降氣消痰。止嗽潤肺。又是別有意味。此今人選藥之密已與宋金元明不同。不可謂非藥物學之進境者。惟其子多油。能泄真氣。石頑謂氣虛久嗽。陰虛喘逆。脾虛泄泄者。皆不可用。

配合應用 ①治感寒上氣。蘇葉三兩。橘皮四兩。酒四升。煮一升。半分再服。(肘後方)

②治傷寒氣喘不止。用赤蘇一把。水三升。煮一升。稍稍飲之。(肘後方)

③治勞復食復欲死者。蘇葉煮汁二升。飲之。亦可入生薑。豆豉。同煮飲。(肘後方)

④治卒喘不止。香蘇湯煮。頓服三升良。(千金方)

⑤治霍亂腹滿。未得吐下。生蘇搗汁飲之。佳。乾蘇煮汁亦可。(肘後方)

⑥治諸失血病。紫蘇不限多少。入大鍋內。水煎令乾。去滓熬膏。以炒熟赤豆爲末。和丸梧子大。每酒下三五十丸。常服之。(斗門方)

⑦治金瘡出血不止。以嫩紫蘇葉。疊葉間搗貼之。(永類鈴方)

⑧治癰撲傷損。紫蘇搗傳之。瘡口自合。談楚翁試驗方)

⑨治傷損出血不止。以陳紫蘇葉。藥所出血。按爛傳之。血不作。膿且愈。後無癢甚妙也。(永類鈴方)

⑩治風狗咬傷。紫蘇葉嚼傳之。(千金方)

⑪治蛇虺傷人。紫蘇葉搗飲之。(千金方)

⑫治食蟹中毒。紫蘇煮汁飲二升。(金匱方)

⑬治飛絲入目。令人舌上生泡。用紫蘇葉嚼爛。白湯嚥之。(危氏得效方)

⑭治乳癰腫痛。紫蘇煎湯頻服。并搗封之。(海上仙方)

⑮治咳逆短氣。紫蘇葉二錢。人參一錢。水一鍾煎服。(普濟方)

⑯用量 錢半至三錢。

⑰施用宜忌 凡氣弱表虛。而無外感風寒者。禁用。忌火。不可與鯉魚食。食之生毒瘡。

⑱著名方劑 紫蘇飲。治妊娠胎氣不和。懷胎近上。脹滿疼痛。謂之子懸。兼治臨產驚恐氣結。連日不安。或二便不利。(嚴氏方)大腹皮人參。川芎。橘皮。芍藥。各五錢。紫蘇一兩。當歸三分。甘草一分。上生薑四片。葱白七寸。水煎服。一方無人參。有香附。名紫蘇和氣飲。

⑲參攷資料 ①紫蘇近世要藥也。其味辛。入氣分。其色紫。入血分。故同橘皮。砂仁。則行氣安胎。同蜜香。烏藥。則溫中止痛。同香附。麻黃。則發汗解肌。同芍藥。當歸。則和血

散血。同木瓜。厚朴。則散溼解暑。治霍亂脚氣。同桔梗。枳殼。則利隔寬腸。同杏仁。萊菔子。則消痰定喘也。(李時珍) ②紫蘇白蘇。皆以二三月下種。或宿子在地自生。其莖方其葉團而有尖。四圍有鉅齒。肥地者面背皆紫。瘠地者面青背紫。其面背皆白者。即白蘇。乃佳也。紫蘇嫩時採。和蔬茹之。或鹽漬。及梅酒作蔬食。甚香。夏月作熱湯飲之。五月六月連根採。收以火烘其根。陰乾。則經久葉不落。八月開細紫花。成穗作房。如荊芥穗。九月半枯時。收子。細如芥子。而色黃赤。亦可取油。如桂油。務本新書云。凡地畔近道。可種蘇。以遞六畜。收子打油。燃燈甚明。或熬之以油器物。丹房鏡源云。蘇子油。能柔五金。八石。沙州記云。乞弗房之地。不種五穀。惟食蘇子。故王禪云。蘇有遮護之功。又有燈油之用。不可闕也。今有一種花紫蘇。其葉細齒。密組如剪成之狀。香色莖子並無異者。人稱回蘇云。李時珍云。薄荷根莖。真似紫蘇。但葉不同。爾薄荷莖。煨紫蘇莖。和入藥。須以刀刮去青薄皮。剉

月之久。即行中耕一次。可毋庸多行也。①除草。宜時時動除之。爲要不可怠忽。又不拘定時期。限定次數也。②收穫。早種於七八月間。可以刈取。中種於八月下旬。亦可刈取。晚種刈取之期。則在九月中旬也。刈取之法。用銳鏟刈之。或者先用小鋤掘鬆土地。而後手捏莖葉中帶根枝拔起之。拔起之後。曝日中二三日。始可乾燥無溼。而後再貯藏於高燥之地上可也。③計算。每畝收穫量。約可得七八百斤。而二三斤者爲最劣。每畝播種之量。點播約需一升四合。條播約需二升六七合。若過少則不能數一畝之用。過多則徒耗其種子也。

採取 七月至九月間採其莖葉日乾。
製法 凡使蘇葉。須用兩面俱紫者。去蛛網蟲子。切剉用。
性質 辛溫。無毒。
效能 發肌表。散風寒。用作下氣藥。又爲殺一切魚肉毒之要藥。
主治 下氣。除寒中。其子尤良。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論紫蘇曰。以葉生食作羹。殺一切魚肉毒。【唐】孟詵食療本草論紫蘇曰。除寒熱。治一切冷氣。【宋】日華諸家本草論紫蘇曰。補中益氣。治心腹脹滿。止霍亂轉筋。開胃下食。止脚氣通大小腸。【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論紫蘇曰。通心經。益脾胃。煮飲尤勝。與橘皮相宜。【明】李時珍本草綱目論紫蘇曰。解肌發表。散風寒。行氣寬中。消痰利肺。和血溫中。止痛定喘。安胎解魚蟹毒。治蛇犬傷。【明】李士材本草圖解論紫蘇曰。紫蘇辛溫。肺家藥也。葉可發散風寒。梗能行氣安胎。子可消痰定喘。解魚蟹毒。治蛇犬傷。按紫蘇以辛散爲功。久服泄人真氣。世俗喜其芳香。愛其達氣。或爲小蔬。或作蜜餞。朝暮用之。甚無益也。古人謂芳草致瘼貴之疾。蓋指此耳。【清】黃宮繡本草求真論紫蘇曰。紫蘇背面俱紫。辛溫香氣五月端午採用。凡風寒偶傷。氣閉不利。心膨氣脹。並暑溼泄瀉。熱閉血衄。崩漏喉腫口臭。俱可用此調治。取其辛能入氣。紫能入血。香能透外。溫可暖中。使其一身舒暢。故命其名曰蘇。是以時珍謂其

同橘皮砂仁。則能行氣安胎。同薑香烏藥。則能快氣止痛。同麻黃葛根。則能發汗解肌。同芍藥當歸。則能和營散血。同木瓜厚朴。則能散溼解暑。同桔梗枳殼。則能利膈寬中。同杏仁。服子。則能消痰定喘。要皆疎肺利氣之品。雖其氣味淺薄。難以奏效。但久服亦能泄人真氣。虛寒泄瀉尤忌。即安胎和胃藥中。用之不過取其辛香。暫調胃寒氣滯之症。豈可概用久用。以陷虛虛之禍耶。梗下氣稍緩。子降氣最速。【清】賈九如辨藥指南論紫蘇曰。蘇葉爲發生之物。辛溫能散。氣薄能通。味薄發泄。專解肌發表。療傷風傷寒。及瘧疾初起。外感鬱亂。溼熱脚氣。凡屬表症。放邪氣出路之要藥也。丹溪治春分後溫熱病。頭痛身熱。脊強目痛。鼻乾口渴。每以此同葛根白芷。入六神通解散。助其威風。發汗解肌。其病如掃。取其辛香。以治抑鬱之氣。停滯胸膈。入心氣。飲開心胸。鬱熱神妙。如寒滯腹痛。火滯痢疾。溼滯泄瀉。少佐二三分從內略爲疏解。最爲妥當。參蘇飲治虛人感冒風寒。方中一補

一散。古人良有深意。如不遵其義。減去人參。或服之不應。或邪氣未散。而正氣先虛。須知用藥得法。全在君臣佐使之間。此獨制魚蝦螃蟹之毒。如過傷其味者解之。
國外學說 古方藥品考曰。紫蘇面背皆紫。其氣芳香者。可用。所謂花紫蘇是也。凡用葉者。須去蛛網蟲子。藥舖出售者。其粗劣。或香氣散失者。亦不可用。面背皆紫者。名片面紫蘇。面背俱不紫者。名野蘇。此二種均不堪入藥。蘇子之功。專在芳香。氣達然。今用其子而去殼。則淡薄而無香氣。故須連子殼用之。乃最有效。又大和本草曰。紫蘇須用紫色者。於近六月。葉不乾時採之。最佳。時珍云。有一種花紫蘇。其葉細齒密細。如剪成之狀。青色。莖子一般。無二人稱回回蘇。按此山野有之。形狀氣味。與紫蘇不異。惟葉莖子俱細耳。若香氣則烈於尋常紫蘇。日本呼爲高麗紫蘇。生葉加入魚膽食之。去魚毒。有香氣。堪和以梅醬煮食。亦可開胃進食。

近人學說 張山雷曰。紫蘇芳

【紫蔞】即蘆葦之未解葉者。功能生肉滅癰。爲治金瘡聖藥。其餘性質與蘆葦同。參見「蘆葦」條。

【紫蘇】原名蘇。蘇從穌。舒暢之謂。本品性能舒暢。功能行血和血。故名。但莖葉色紫者。遂名紫蘇也。

處方用名 蘇葉 蘇梗 帶葉蘇梗。

古籍別名 赤蘇。(肘後)桂枝。(爾雅)香蘇。(千金方)水蘇。山魚蘇。白魚蘇。水狀元。(和漢藥考)

外國名詞 Perilla nankinensis, Done. (拉丁)

基本 屬唇形科。爲紫蘇之葉。其子葉詳見各該條。

產地 凡山野平原間。恒多生焉。陳仁山藥物生產辨云。蘇葉產廣東。以連州清遠爲多出。

形態 紫蘇爲一年生草本。多種於園圃。春下種子。莖高三尺許。其形方。分莖有稜。具外逆之稀毛。葉作卵圓或廣橢圓形。末端帶尖。長二寸內外。邊緣有鋸齒。多皺。葉有柄。皆對生。背面多紫紅色。通體發一種之芳香。八九月間。莖端

葉腋。俱出三四寸長之穗。開或白或淡紫之唇形花。小花綴爲總狀花序。粵五裂。果實爲屬於閉果之瘦果。亦有芳香性。種子黃褐色。如芥子。大其葉可供藥用。



紫蘇

種類 其葉面背皆紫色者。紫蘇也。其葉面背皆白色者。白蘇也。其葉色不紫而氣不香。似往者。野蘇。即往也。其葉細齒密。如剪成之狀。香色。莖子一無稍異於紫蘇。惟其莖葉子實較爲俱細者。即花紫蘇也。亦即所稱回回蘇也。

種植 園圃間恒有栽植。有於二三月間下種者。有由宿子在土。屆春而自生者。茲述其栽培之要點於下。氣候及土質。氣候以溫和者爲最佳。寒冷地方。於其生長有所不適。土地不論黏土。壤土。砂土。園土及石灰土等。栽培之皆能生長。惟其品質上稍有差異。最適

者爲砂土。栽培之可使生長完全而無缺也。次之則園土。栽培之則其品質略有不良。石灰土尚能生長。其品質已劣而不可比。至於黏土。壤土。栽培之能生長者甚少。雖有生長。品質亦劣。且其生產大減。故栽培者。往往有虧資之苦也。產地及種類。產於南省者。如福建。廣東。廣西等是也。產於中省者。如四川。湖北。江西。浙江等是也。產於北省者。如山西。甘肅等是也。南省產出。品質雖爲最佳。其中亦有優劣之分。廣東之產出者。較福建。廣西產出者。爲佳。是其證也。中省產出者。品質雖較南省爲劣。其中有時亦不無反較南省爲優者。如四川有時產出之品質。實優於廣西。福建產出之品質也。北省則不及也。故藥中所用者。皆廣東所產出之品質。而用北省者甚少。其種類亦有早中晚之別。中種最佳。早種次之。晚種不及。惟收量較多。是其長也。治地。先擇適宜之砂土。砂土不得。則以園土代之。於冬季耕鬆土地。或於春季一二月間耕起之。冬耕宜深。春耕宜淺。耕起之

後。將耙打碎土塊。乃可作畦。畦闊約二尺五寸至三尺爲度。高約五六寸。栽中種者。其畦稍可狹小。約闊二尺至二尺五寸。高約三四寸。已足。畦上土面須耙平爲要。時期。栽早種者。於二月下旬至三月上旬。可以栽種於已作畦上也。栽中種者。稍遲二十餘日。於三月中旬至四月上旬。亦可栽種於畦間也。栽晚種者。於四月中旬至四月下旬。即當栽種。不可再遲也。播種。治地既完。時期又擇。於是。可以從而播種也。播種分有二式。一點播。二條播。點播者。用器點穴於畦上。限定若干距離。不可有廣狹之。差。而後將種子投入於畦上之穴間也。條播者。於畦上掘小溝。溝不可斜。當如直線。而後將種子排放其中也。條播與點播。其利益相差無幾。所差者。點播之用種子。較少於條播之種子也。施肥。自播至刈。施二三次之稀薄人糞尿。已足。第一次當於播種後施之。第二次宜在中耕後施之。第三次於除草後。當即施與。或稍遲十餘日後施之。亦無不可。中耕。播種後待二

形態 紫檀爲常綠木本。莖高五六丈。葉爲奇數羽狀複葉。有三小葉。花序總狀。萼有毛。花冠蝶形。呈黃色。果實有翼。其木質新者色紅。舊者色紫。甚堅重。入水沉。既可用作器具及染料。又可充藥用。



紫檀

製法 採得紙封收藏則不泄氣。削片或到末或磨汁用。

性質 鹹。微寒。無毒。

效能 消腫毒。辟惡氣。用作瘡毒藥。

主治 磨塗惡毒風毒。

歷代記述攷證 【南北朝】陶弘景本草集註論紫檀曰。刮末。傳金瘡。止血。止痛。療淋。【宋】大明諸家本草論紫檀曰。醋磨。傳一切卒腫。【明】繆希雍本草經疏論紫檀曰。紫真檀味鹹。氣微寒。性應無毒。其主惡毒風毒者。凡毒必因熱而發。熱甚則生風。而營血受傷。毒乃生焉。此藥鹹能入血。寒能除熱。則

毒自消矣。弘景以之傳金瘡止血止痛者。亦取此意耳。宜與番降真香同爲極細末。傳金瘡良。【清】張石頑張氏醫通論紫檀曰。白檀辛溫。氣分藥也。故能理衛氣而調脾肺。利胸膈。紫檀鹹平。血分藥也。力能和營氣而消腫毒。治金瘡。

用量 五分至一錢。

施用宜忌 紫檀能動火耗氣。若癰腫潰後諸瘡多膿及陰虛火亢者均忌之。

【紫檀片】即紫檀之處方用名。詳

【紫檀】條。

【紫檀木】即紫檀之處方用名。詳

【紫檀】條。

【紫檀香】即紫檀之處方用名。詳

【紫檀】條。

【紫檀】即生薑根之初生嫩芽。尖而微紫者。性質功能與尋常薑同。

詳【生薑】條。

【紫檀檳榔】即馬檳榔之別名。而馬檳榔係大腹子之一種。詳【檳榔】條。

【紫藍】基本 紫藍爲雜草類之一種。可供藥用。

性質 鹹。無毒。

主治 解諸肉毒。

【紫藏】即藏香之紫色者。性質功能與藏香同。詳【藏香】條。

【紫礬石】即礬石紫色者之別名。詳【礬石】條。

【紫羅襪】即石將軍之古籍別名。典見綱目拾遺。詳【石將軍】條。

【紫羅蘭】即紫羅蘭之別名。詳【紫羅蘭】條。

【紫羅襪】條。

【紫羅襪】即爲尾之古籍別名。典見花鏡詳【爲尾】條。

【紫羅襪】產地 生溪洞中或原野間。

形態 紫羅襪爲山草類之一種。葉如箭鏃。質厚密生。白色。毛高二三尺。下部形類灌木。春開紫紅花。其根可供藥用。

採取 以溪澗而白花者爲佳。

主治 臟脹腫滿。清利水道。其土產者。療跌打損傷。搗和酒服。

參攷資料 紫羅襪根不可多服。令人吐瀉。傷胃氣。【趙學敏】

古籍別名 招豆藤。【網目拾遺】

外國名詞 Krauthia floribunda, Taub. (拉丁)フチ

ムラサキフチ(日本)

基本 係豆科。紫藤屬之紫藤。產地 生山野間。

形態 紫藤爲蔓生落葉木本。莖卷絡於他物。葉互生。作奇數羽狀複葉。小葉長卵形。春末隨葉出花。軸下垂。開花蝶形。花冠紫色。或白色。長總狀花序。結實爲長莢。有短毛。密生其皮之纖維可供織物。嫩莢與種子可供食與藥用。

性質 甘。微溫。有小毒。

主治 作煎和糖服。下水。癰病。參攷資料 藤皮者樹從心。重有皮。四月生紫花可愛。長安人亦種飾庭也。江東呼爲招豆藤。其子作角。角中仁。熬香着酒中。令酒不敗。敗酒中用之亦正。【陳藏器】

【紫藤】即省藤之古籍別名。典見植物學大辭典。詳【省藤】條。

【紫藤香】即降真香之古籍別名。典見綱目。詳【降真香】條。



紫藤

食與藥用

採取 三四月間採之。

性質 苦澀。

參攷資料 取汁煮。雌黃。制汞。伏砂。擒三黃(綱目)。

【紫堇花】 古籍別名 水菊菜。(圖經本草)

性質 酸。微溫。無毒。

主治 曝乾研末。塗脫肛。

【紫葳】即大葳之古籍別名。典見和漢藥考。詳「大葳」條。

【紫梢蛇】即弔精之原名。詳「弔精」條。

【紫萍】即浮萍之葉體較大。面青背紫。而多下垂之鬚根者之別名。詳「浮萍」條。

【紫雲英】即翹搖之別名。典見植物學大辭典。詳「翹搖」條。

【紫雲瑤瑤】即瑤瑤之產於安徽和縣者之別名。性質功能。與尋常瑤瑤同。詳「瑤瑤」條。

【紫葛】 外國名詞 Vitis Co-igneticae, Pull. (拉丁) ヤマブドウ ガネブ (日本)

基本 係葡萄科葡萄屬。爲紫

葛之根皮。

產地 生山中及田野間。

形態 紫葛爲藤類之蔓生灌木。葉大而圓。基脚作心臟形。掌狀分裂。痕淺。呈稜角狀。緣邊有不

等之齒牙。上面平滑。下面密生褐色之毛。如綿狀。夏末莖梢著花。圓錐花序。基部有卷鬚。花冠五瓣。黃綠色。結實漿果。熟則紫黑色。味酸。多甘少。可食。其根皮肉紫色。大者徑二三寸。可供藥用。

採取 三月八月間。採根皮曬乾用。

性質 甘。苦。寒。無毒。

主治 癰腫惡瘡。搗末醋和封之。

歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草論紫葛根皮曰主癰瘕緩急并熱痛風。通小腸。燒灰制消石。【明】李時珍本草綱目論紫葛根皮曰生肌散血。

【紫葡萄】即葡萄之紫色者。功能最良。典見綱目。詳「葡萄」條。

【紫葳】即凌霄花之原名。詳「凌霄花」條。

【紫葵】即紫葵之古籍別名。典見

綱目。詳「紫葵」條。

【紫蘇蘇枝】即紫蘇之處方用名。詳「紫蘇」條。

【紫蒂盤桓】即茶菊之紫色者。典見綱目拾遺。詳「茶菊」條。

【紫釧】即紫釧之原名。詳「紫釧」條。

【紫園參】即黨參之產於紫園山紫色稍扁者。性質功能。與尋常黨參無異。參詳「黨參」條。

【紫荷】即紫苑之古籍別名。典見別錄。詳「紫苑」條。

【紫銅鈔】 產地 雲南。主治 鎮心利肺。降氣。除痰。火熨末用。可罷。續筋骨折傷。

參攷資料 金花鈔。錫鈔。主治相同。

【紫膠】即火漆之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「火漆」條。

【紫蔗】即甘蔗之古籍別名。典見綱目。詳「甘蔗」條。

【紫麥】即麥之紫色者。性質功能。詳「麥」條。

【紫蝴蝶】即鳶尾之古籍別名。典見植物圖考。詳「鳶尾」條。即

射干之俗名。詳「射干」條。

【紫葳】即香葳之作。緒紫色者。爲葳中之下品。性質功能。與尋常香葳無異。惟力較遜。參詳「香葳」條。

【紫葳根】即白芨之古籍別名。典見和漢藥考。詳「白芨」條。

【紫鴛鴦】即鸛鴦之古籍別名。典見綱目。詳「鸛鴦」條。

【紫龍鬚】即龍鬚藤之紫色者。詳「龍鬚藤」條。

【紫莖】即魚腥草之處方用名。詳「魚腥草」條。

【紫舊】即紫苑之古籍別名。典見和漢藥考。詳「紫苑」條。

【紫檀】 命名 檀善木。故從檀。宜善也。其色紫者。名紫檀。

處方用名 紫檀香。紫檀木。紫檀片。

古籍別名 赤檀。綱目。

外國名詞 Perocarpus santalinus, L.F. (拉丁) シタム (日本)

基本 係豆科紫檀屬之木質。

產地 東印度爲原產地。今廣東雲南諸省均有出。

1107

配合應用 ①治肺傷咳嗽。紫苑五錢。水一盃。煎七分。溫服。日三次。衛生易簡方。

②治久嗽不瘳。紫苑、款冬花各一兩。白部半兩。搗羅爲末。每服三錢。薑三片。烏梅一個。煎湯調下。日二其佳。圖經本草方。

③治小兒咳嗽聲不出者。紫苑末、杏仁等分。入蜜同研丸。茨子大。每服一丸。五味子湯化下。全幼心鑑方。

④治吐血咳嗽。吐血後咳者。紫苑、五味炒爲末。蜜丸。茨子大。每含化一丸。指南方。

⑤治產後下血。紫苑末。水服五撮。聖惠方。

⑥治經喉風痺不通欲死者。用返魂草根一莖。洗淨。納入喉中。待取惡涎出。卽瘳。神效。更以馬牙消津嗽之。卽絕根本。一名紫苑。南人呼爲夜牽牛。斗門方。

⑦治婦人小便卒不得出者。紫苑爲末。并華水服三撮。卽通。小便血者。服五撮立止。千金方。

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡陰虛肺燥。及有

實熱者禁用。惡天雄、罌麥、蠟本、雷丸、遠志、畏茵陳、款冬爲之使。

著名方劑 紫苑湯治肺傷氣極。勞熱咳嗽。吐痰吐血。肺痿肺癰。

（王海藏方）紫苑、知母、貝母、阿膠各二錢。人參、甘草、桔梗、茯苓各五分。五味子十二粒。上藥水煎服。日二服。一方加蓮肉。

參攷資料 ①形似重臺。根作節。紫色。潤輒者佳。大明。②紫苑連根葉採之。醋浸。入少鹽收藏。作菜辛香。號名仙菜。鹽不宜多。多則腐也。王穎。③按陳自明云。紫苑以牢山所出。根如北細辛者爲良。沂兗以東皆有之。今人多以車前旋覆根赤土染過爲之。紫苑肺病要藥。肺本自亡津液。又服走津液藥。爲害滋甚。不可不慎。李時珍。

④辛溫暫用之品。陰虛肺熱者不宜專用。多用須與二冬之桑皮共之。白者名女苑。入氣分。大泄肺氣。顧松園。

【紫苑茸】卽紫苑之根最柔輒者。典見綱目。詳「紫苑」條。

【紫菊】卽馬蘭之古籍別名。典見綱目。詳「馬蘭」條。

古籍別名 紫葳。綱目。甘海首。日本。

外國名詞 Porphyra tenosa, Kjelma. (拉丁)フサクサノリアマノリ。日本。

基本 係紅藻類紫菜屬之紫菜。

產地 多出閩越諸地之海濱岩石間。

形態 紫菜爲水菜類藻屬之一種。全體扁平。呈廣披針形。或橢圓形。稍稍分歧。有紅紫、綠紫、黑紫等色。長一二寸。闊五六分。採而乾之。可供食與藥用。

採取 冬春間採之。

性質 甘寒。無毒。

主治 熱氣煩塞咽喉。煮汁飲之。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論紫菜曰。病瘰癧肺氣者。宜食之。



紫菜

參攷資料 ①紫菜多食令人腹痛。發氣吐白沫。飲熱醋少許卽消。陳藏器。②凡瘰癧結塊之疾。宜常食紫菜。乃鹹能輒堅之義也。朱丹溪。

古籍別名 蜀芹。楚葵。

【紫莖】 苔菜。圖經。赤芹。水荷菜。綱目。起食菜。寶藏論。

外國名詞 Cordalis incisa, Pers. (拉丁)ムラサキケマン。ヤブケマン。日本。

基本 係罂粟科紫莖屬。爲紫莖之苗葉。

產地 生山野間。

形態 紫莖爲菜類之多年生雜草。莖高二尺。葉二三回分裂。缺刻銳頭。莖碎。稍似胡蘿蔔。又似水莖之葉。有長柄而互生。春夏間開花。總狀花序。花軸上之苞有缺刻。紫紅色。一瓣有距。雄蕊凡六。果實爲蒴。呈線狀。其苗葉可作蔬。



紫莖

臟也。療咳逆。吐膿血。止喘悸者。散肺家之邪也。能安五臟。故治五勞及體虛不足。小兒驚癇。亦虛而有熱故也。熱散則驚癇自止矣。得蜜蒸焙良。明李士材本草圖解論紫苑曰。紫苑辛甘微溫。肺家藥也。益肺調中。消痰定喘。止血療咳。解渴潤肌。補虛辟鬼。辛而不燥。潤而不寒。補而不滯。誠哉金玉君子。然非獨用多用。不能速效也。小便及溺血者。服一兩立效。去鬚洗淨。微火焙之。清黃宮繙本草求真論紫苑曰。紫苑辛苦而溫。色赤。雖入至高之臟。仍兼下降。故書載入肺金血分。能治虛勞咳嗽。驚悸吐衄諸血。又能通調水道。以治溺瀯便血。用此上下皆宜。且此辛而不燥。潤而不滯。於肺實為有益。然疎泄性多培養力少。與桑白皮杏仁同為一類。但桑白皮杏仁則瀉肺經氣分。此則專瀉血經氣分也。故肺虛乾咳禁用。紫色潤輟者良。其藥雖分上中與下。然下疎泄尤甚。蜜炒用。款冬為使。白者為女苑。入氣分。大泄肺氣。肝後方用此三分。鉛丹一分。並酸漿服一刀圭。日進三

十一畫 紫

服。至二十一日。能令面黑轉白。過服不宜。去頭鬚蜜水炒用。清賈九如辨藥指南論紫苑曰。紫苑味甘而帶苦。性涼而潤。恰合肺部血分。主治肺焦葉舉。久嗽痰中帶血。及肺痿痰喘。消渴使肺竅有清涼潤澤之功。因其色紫。類肝。用入肝經。凡勞熱不足。肝之表病也。蓄熱結氣。肝之裏病也。吐血衄血。肝之逆上也。便血溺血。肝之妄下也。無不奏效。因其體潤。善能滋腎。蓋腎主二便。以此潤大便燥結。利小便短赤。開發陰陽。宜通壅滯。大有神功。同生地。麥冬。入心。寧神養血。同丹皮。赤芍。入胃。清熱涼血。其桑皮色白。為肺中氣藥。紫苑色紫。為肺中血藥。宜分別用。

辨偽 鄭肖廬曰。偽名次紫苑。又名硬蘆。紫苑服之。往往愈見咳逆氣結。其害無窮。按紫苑近道處處雖有。出產然色紫味苦。質極柔宛。若此種硬蘆。形質既殊。性味自劣。聞又有以車前及旋覆根。赤土。染過混充者。更奚堪入藥乎。曹炳章曰。按紫苑。鳳陽府亳州龍王廟四鄰出者。鬚根粗。輟糯。色紫紅。硬梗少者佳。河南淮慶府出。枝略細。輟糯。亦可用。湖北出者。性硬根細。泥屑重者。次。偽者浙江尚少。因價賤。出賃亦多。故耳。

近人學說 張山雷曰。紫苑柔潤有餘。雖曰苦辛而溫。非燥烈可比。專能開泄肺鬱。定咳降逆。宜通室滯。其味微辛。則入氣分。其色殷紫。則入血分。故能兼疏肺家氣血。凡風寒外束。肺氣壅塞。咳嗽不爽。喘促哮喘。及氣火燥灼。鬱為肺癰。咳吐膿血。痰臭腥穢。諸證。無不治之。而寒飲蟠踞。濁涎膠固。喉中如水雞聲者。尤為相宜。惟其溫而不熱。潤而不燥。所以寒熱皆宜。無所避忌。景岳謂水虧金燥。咳嗽失血者。非其所宜。石頑謂陰虛肺熱。乾咳者。忌之。蓋恐開泄太過。重傷肺金。又恐辛溫之性。或至助火。要之虛勞作嗽。亦必有濁痰阻塞肺竅。故頻頻作咳。以求其通。不為開之咳。亦不止。以此溫潤之品。泄化垢膩。順調氣機。而不傷於正。不偏於燥。又不犯寒涼遏抑。滋膩戀邪等弊。豈非正治。且柔潤之質。必不偏熱。較之二冬二母。名為滋陰。而羣

陰風濕。阻寒陰道者。相去猶遠。惟實火作咳。及肺癰成膿者。則紫苑雖能泄降。微嫌其近於辛溫。不可重任。然藉為嚮導。以揭穴聲庭。亦無不可。總之肺金寒塞。無論為寒為火。皆有非此不開之勢。而俗子多不知之。但以從事於蘇子之辛溫。桑皮之抑降。此肺勞之人。所以項背相望。而不可救藥也。繆氏經疏反謂其辛散之功甚烈。且謂咳逆喘嗽。皆是陰虛肺熱之證。欲用紫苑。須與二冬桑皮同用。則不獨沒熱肺寒喘嗽一層。且紫苑之功力。惟在開泄。乃以二冬膩之。且以桑皮之大寒苦降者。遏抑之。是惟恐其肺家痰涎濁膩。或有透泄之路。而必欲閉之塞之。乃至於絕也。如此談豈直以殺人為能事。然則今之治嗽。而只知有二冬桑皮者。皆總仲醇作俑之學矣。立言不愜。貽禍無窮。不可不辨。又凡小便不利之候。多有由於氣化不宜者。古人謂之氣癰。不調其氣。但與滲利。亦必不效。惟紫苑疏泄肺氣。則上竅開而下竅亦泄。石頑謂其通調小道。其用在是。非僅以其溫潤也。

【紫接骨】 基本 本品即接骨草之紫色者。

古籍別名 金寶相。鐵皮葱。金鉢盂。(綱目拾遺)

產地 多生山土間。

形態 紫接骨為接骨草之一種。與衣接骨相似。而莖葉俱紫色。葉似蝴蝶花。根形如商陸。可供藥用。

主治 跌打勞損。瘀血。散風透膿。為金瘡之聖藥。

【紫梗】 即紫鑽之古籍別名。與見綱目詳「紫鑽」條。

【紫莧】 基本 屬莧科莧類之紫色植物。

性質 甘。無毒。

主治 治氣痢。殺蟲毒。療諸蛇螫傷。搗汁飲。並以渣敷傷處。

【紫蛙】 即石螭之古籍別名。與見綱目詳「石螭」條。

【紫頂龍芽】 即龍芽草之開紫花者之古籍別名。與見綱目拾遺詳「龍芽草」條。

【紫梢花】 原名 吊精。

性質 甘溫無毒。益陽秘精。療真元虛損。

陰痿遺精。餘瀝白濁如脂。小便不禁。墜下溼癢。女人陰寒冷帶。入丸散及煎湯用。

參攷資料 和劑玉霜丸注云。如無紫梢花。以木賊代之。(綱目)

【紫梢花】 即吊膏之精。典見北夢瑣言。詳「吊脂」條。參考資料二三兩項。

【紫檳榔】 即馬檳榔之古籍別名。典見綱目。詳「馬檳榔」條。

【紫賀石】 即紫佳石之古籍別名。典見本草集註。詳「紫佳石」條。

【紫荷】 即茶之產於浙江吳興縣境者。性質功能參見「茶」條。

【紫給】 古籍別名 野葵。(別錄)

產地 生高陵諸地。

形態 紫給為雜草類之一種。

野生郊外。其根如烏頭。可供藥用。採取 三月三日採之。

性質 鹹。

主治 毒風。洩注頭部。

【紫苑】 命名 本品根色紫而柔苑。故名。

處方用名 紫苑。炙紫苑。古籍別名 青苑。紫脣。(別錄)

返魂草。(綱目)夜牽牛。(斗門方) 莖苑。紫莖。萬金茸。白羊鬚草。(和漢藥考)

外國名詞 Aster tataricus. (拉丁)

基本 屬菊科。為紫苑之根。

產地 陳仁山藥物生產辨云。紫苑產安徽亳州。河南禹州。秋季出新。

形態 紫苑為多年生草本。春苗萌芽。莖互生。直立不倚。高可六七尺。葉大而為長橢圓形。有鋸齒。面粗糙。中秋。莖端及枝梢開花。排列為頭狀花序。在其周圍之花。為淡紫色之舌狀花冠。中央之花。為黃色筒狀花冠。其色美麗。堪供玩賞。其根為一株叢生細長之根。狀似細辛。外面色紅。紫質柔韌。折之不易斷。



紫苑

採取 二三月間採根。陰乾。製法 雷斅曰。凡使紫苑。須去

頭及土。用東流水洗淨。以蜜浸一宿。至明於火上焙乾。用一兩用蜜二分。

性質 苦。溫。無毒。效能 溫肺下氣。化痰。止咳。用治咳逆藥。

主治 咳逆上氣。胸中寒熱結氣。去蟲毒。療癰疽。安五臟。(本經) 療咳唾膿血。止喘悸。五勞七傷。虛補不足。小兒驚癇。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論紫苑曰。治尸疰。補虛下氣。勞氣虛熱。百邪鬼魅。(宋)大明諸家本草論紫苑曰。調中消痰。止渴。潤肌膚。添骨髓。【元】王好古湯液本草論紫苑曰。益肺氣。主息賁。

【明】繆希雍本草經疏論紫苑曰。紫苑味苦。溫。別錄兼辛。無毒。苦以泄之。辛以散之。溫以行之。辛先入肺。肺主諸氣。故主咳逆。上氣。胸中寒熱。結氣。去蟲毒。亦辛之力也。癰疽。癰者。陽明之溼熱。癰者。熱於肺。則肺熱而津液不能下滴。傷其氣化。以困水之上源。故為癰疽。也。肺為五臟之華蓋。而主諸氣。肺安則能朝百脈。散精布液於各臟。故云安五

採取 三月採之。

製法 採得曬乾或火炙。使色紫用。

性實 苦寒。無毒。

效能 破血消癥。治痢。或用作通經藥。

主治 心腹積聚。寒熱邪氣。通九竅。利大小便。(本經)療腸胃大熱。唾血衄血。腸中聚血。癰腫諸瘡。止渴益精。(別錄)

歷代記述攷證

【唐】甄權藥性本草論紫參曰。治心腹堅脹。散瘀血。治婦人血閉不通。【唐】蘇恭新修本草論紫參曰。牡蒙治金瘡。破血生肌肉。止痛。赤白痢。補虛益氣。除脚腫。發陰陽。【元】王好古湯液本草論紫參曰。主狂癪。溫瘧。衄血。汗出。治血痢。【明】繆希雍本草經疏論紫參曰。紫參味苦辛。氣寒而無毒。專入血分。爲除熱散結。逐血之要藥。故主心腹積聚。寒熱邪氣。通九竅。利大小便。略同紫草也。苦以燥溼。洩熱。辛以散結。寒以除邪氣。故療腸胃大熱。唾血衄血。腸中聚血。亦主癰腫諸瘡者。營氣熱則留瘀。而成癰腫。血涼而活。則自

十一畫 紫

散也。能散瘀血。故主婦人血閉不通。癰有血蓄。則狂陽明熱。則衄血。溼熱在腸胃。則血瘀滯而成血痢。除熱活血。故亦主金瘡。【清】黃宮繡本草求真論紫參曰。紫參味苦而辛。氣寒無毒。功詣入肝。逐瘀破血。兼入胃脾膀胱。使血自爲通利。故凡寒熱血痢。癰腫積塊。心腹積聚。因於血瘀阻滯而成者。無不可以調治。以其味苦則泄。味辛入肝。寒則勝熱。而使血從二便出矣。仲景治下痢腹痛。而用紫參湯。以除其瘀。散其積血之意。但世人罕識其真。用以紫莢爲代。雖其寒熱不同。而其疎利則一。【清】張隱菴本草崇原論紫參曰。金匱澤漆湯。方用紫參。本論云。咳而脈沉者。澤漆湯主之。綱目集解云。古方所用牡蒙。皆爲紫參。而陶氏又以王孫爲牡蒙。今用亦希。因金匱方有紫參。故存於此。

近人學說 張山雷曰。紫參味苦性寒。色紫故清熱。而入血分。主心腹積聚。寒熱邪氣者。蓋血熱而瘀結之積聚。與玄參之主腹中寒熱積聚同意。非能治氣滯寒凝之積聚也。別錄主腸中聚血。亦卽此意。通九竅。利二便者。清熱涼血。則九竅自通。二便自利。別錄療腸胃大熱。吐血衄血。癰腫諸瘡。皆苦寒能清血熱之功用。止渴者。熱清而渴自止。益精者。則因其清火而甚言之。邪熱既去。而真陰斯充。究竟陰寒之質。非補益之品也。又曰。紫參苦寒。故專主血熱。而味又微辛。則能散瘀。故又能破逐血積。凡血中鬱熱而成瘀結。如瘰癧癰瘰之屬。皆可治之。惟氣滯寒凝之瘀血。必非其治也。

配合應用 紫參湯治痢下。

紫參半斤。水五升。煎二升。入甘草二兩。煎取半升。分三服。(金匱方)

治吐血不止。紫參人參阿膠炒等分爲末。烏梅湯服一錢。一方去人參。加甘草。以糯米湯服。(聖惠方)

治面上酒刺。五參丸用紫參。丹參人參苦參沙參各一兩。爲末。胡桃仁杵和丸。梧子大。每服三十丸。茶下。(普濟方)

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡無瘀滯及脾胃

虛寒者禁用。畏辛夷。

參攷資料 紫參色紫黑。肝

臟血分藥也。故治諸血病。及寒熱

瘧痢。癰腫積塊之屬。陰虛者。古方

治婦人腸軍病。烏啄丸所用牡蒙

卽此物也。唐蘇恭註王孫引陳延

之小品方。牡蒙所主之證。正是紫

參。若王孫則止治風溼痺證。不治

血病。(李時珍)紫參王孫並有

牡蒙之名。古方所用牡蒙。多是紫

參也。按錢起詩集云。紫參幽芳也

五葩連專。狀如飛禽羽舉。故俗名

五鳥花。(李時珍)紫參一名牡

蒙。生河西或商山。圓聚生根。黃赤

有文。皮黑中紫。五月花紫赤。實黑

大如豆。(吳普)今河中晉解齊

及淮蜀州郡皆有之。苗長一二尺

莖青而細。其葉青似槐葉。亦有似

羊蹄者。五月開花。白色似蔥花。亦

有紅紫而似水荳者。根淡紫黑色

如地黃狀。肉紅白色。肉淺而皮深

三月採根。火炙紫色。又云。六月採

曬乾用。(蘇頌)紫參根。乾紫黑

色。肉帶紅白。狀如小紫草。范子計

然云。紫參出三輔。有三色。以青赤

色爲善。(李時珍)

脾氣虛者反能作瀉。古方惟用茸取其初得陽氣。以類觸類。所以用發痘瘡。今人不達此理。一概用之非矣。李時珍。出襄陽。多從南陽新野來。彼人種之。即是今染紫者。方藥都不復用。博物志云。平氏陽山。紫草特好。魏國者染色殊黑。比年東山亦種之。色小淺於北者。

(陶弘景) ②所在皆有人家或種之。苗似蘭香。莖赤節青。二月開花。紫白色。結實白色。秋月熟。(蘇恭) ③種紫草。三月逐壘下子。九月子熟時刈草。春社前後採根陰乾。其根頭有白毛如茸。未花時採。則根色鮮明。花過時採。則根色黯惡。採時以石壓爛。曝乾。收時忌人溺及驢馬糞。并烟氣。皆令草黃色。(李時珍)

【紫草貝母】即貝母之產於四川東境者。形較川貝稍大。而力稍遜。參見貝母條。

【紫草根】即紫草之處方用名。詳『紫草』條。

【紫草茸】 命名 本品形似紫草。而根柔茸。兼色紫。故名。

產地 康藏。西番。形態 本品鮮時。色淡紅而透明。如琥珀。陳久成塊。形如指形。大色呈深紫。質堅似木。卷形如桂皮。可供藥用。

性質 辛。涼。效能 涼血解毒。散熱催生。主治 痘疹諸腫。一切瘡毒。參攷資料 ①痘學真傳云。紫草。茸。古本不見。近刻但在紫草項下註明。紫草茸。染手者為佳。竟不知別有一種。予幼時見世叔華泓卿家有紫草茸。為發痘神丹。乃其高祖學士鴻山公使外國帶歸者。予取而藏之。每遇血熱毒壅。失血煩悶。頂陷不起。痘疔腫脹。於清解藥中。研加四五分。無不神效。惜乎方書不載。不敢擅增本草。近見神應心書。獨標紫草茸。色澹紅。出鳥思藏。著大樹枝上。如白蠟。其價如千金。不特發痘如神。用酒調服一二錢。能治諸腫毒惡瘡。又云。順手搗一錢酒下。力能催生。此救水譚應夢。屢獲其效。併請正西番真僧之語。至近時亦知茸非紫草之嫩苗。復誤認胭脂。即是紫草茸。此

說更謬。(葉大椿) ②按紫草。本草諸方皆用根。草市獨行方治豌豆瘡。不發。養紫草湯飲後人相承用之。則以之治痘。涼血解毒。自此始也。曾世榮活幼新書云。紫草性寒。小兒脾氣實者。猶可用。脾氣虛者。反能作瀉。古惟用茸。取其初得陽氣。以類觸類。所以用發痘瘡。則用茸亦見於此。而亦未聞有鳥思藏所出。一種據葉所云。又似紫卿。亦無的解。以其親試歷效。故存其說。以俟後之博訪。③痘科釋義云。痘科用紫草。古方惟用其茸。取氣輕味薄。而有清涼發散之功。凡下紫草。必用糯米五十粒。以制其冷性。庶不損胃氣。而致泄瀉。惟大熱便秘者。不必加。(瞿良)

【紫苑】即紫苑之處方用名。詳『紫苑』條。

【紫苑】即紫苑之古籍別名。典見和漢藥考。詳『紫苑』條。

【紫酒】 命名 本品以其色紫。故名。製法 用雞屎白炒焦投酒中。待變紫色。即去滓飲之。主治 卒然中風。口偏不語。角

弓反張。煩亂欲死。及臍脹不消。【紫真香】即降真香之處方用名。詳『降真香』條。

【紫粉霜】即銀朱之古籍別名。典見綱目。詳『銀朱』條。

【紫參】 命名 本品根形似參。而色紫。故名。

外國名詞 Tzu-Shen 學名 Polygonum bistorta, Br.

基本 屬蓼科。紫參屬。藥用紫參之根莖。

產地 凡山野巖谷及溪澗旁。恒有生長。

形態 紫參為多年生草本。自生於深山之陰地。葉形卵圓。大小不一。未端帶尖。生於地下莖之頭端。具長葉柄。葉皆簇生。莖高三四寸。葉叢間抽出鞘狀有托葉之花莖。而於其頂端。春暮開帶紅白色之六瓣小花。連綴而為穗狀。根為形似地黃之地下莖。但稍長。延長約尺餘。根有節。每節約寸餘。即有細條連續之作連珠狀。外面色黑褐。收藏多年者。長約尺許。被以褐色之粉衣。

凍傷、溫疹、水泡疹、及淺在性潰瘍（下腿潰瘍等）試用之曾收偉效。今概括氏之實驗如左：（一）紫膏（氏改稱者）於火傷凍傷、溫疹表在性潰瘍及水泡疹等病的分泌過多之症用之有卓效。（二）爲紫膏主劑之紫根中，殆含收斂性物質，即其種鞣酸（三）該鞣酸爲色素，或爲別物，尚未明瞭。

近人學說 ①祝天曰：草之初生曰茸。紫草茸者，言紫草初生茸亂之嫩苗也。今市上所謂之紫草茸，形如螳螂蝦蛄，色紫，斷之透明，燒之煇作黏液，可黏破損玻璃器，是膠質也。非紫草之嫩苗也。明矣，然不知其爲何物也。遍搜本草，類似蟲部中之紫鑽，今人痘科方多用紫草茸。藥肆即以此物與之。醫家藥家病家皆不知察。人云是我亦云是。余惑之。故拈出與博雅者研幾之。②王治華曰：紫草之嫩苗，即紫草茸也。今市肆所售色紫狀似鑽石，乃係一種細蟲，如蠅虱緣於樹枝，聚其脂液而成。此物本名紫鑽。今人用以治痘瘡，有活血起脹之功，無鹹寒作瀉之患。其功

倍於紫草。故亦以紫草茸呼之。實非紫草同類也。紫草以產於廣西，色深紫而脆者爲上。嫩苗尤良。出貴州。色紫性輭者亦佳。山東出者次之。按紫草入肝經，兼入心包絡。爲涼血宣竅，泄熱解毒之品。日醫石原保秀用，以涼血活血，利大小腸。故於痘疹欲出未出血熱毒盛，大便閉滯者，宜之。已出而紫黑，便閉亦宜之。第已出而紅活，及白陷，大便利者，是當慎用者耳。曾育溪謂紫草性寒，小兒脾氣實者，猶可用。脾氣虛者，反能作瀉。古方惟用茸取其初得陽氣，以發痘疹。今人不達此理，一概用之，則誤矣。③張山雷曰：紫草氣味苦寒，而色紫入血，故清理血分之熱。古以治臟腑之熱結。後人則專治痘瘍，而兼療斑疹。皆涼血清熱之正旨。楊仁齋以治癰瘍之便閉，則凡外瘍家血分實熱者，皆可用之。且一切血熱妄行之實火病，及血痢血痔，瘦血淋血之氣壯邪實者，皆在應用之列。而今人僅以爲痘家專藥，治熱病者，治外瘍者，皆不知有此疏矣。

配合應用 ①治痘瘡深紅色，或紫或黑陷，乾枯便閉，紫草、紅花、子、生地、黃甘、甘草、貝母、牡丹皮、濃煎，加生犀角汁，量見大小，以四十九匙至半匙爲度。神效。若在一朝及二朝內，稍有元氣，雖危可生。痘疹痘毒咸治之。惟痘毒須加黃耆、金銀花、鼠黏子、痘瘡夾斑痧者，加硬石膏、麥冬、知母、竹葉，一二劑即去之。

②消解痘毒。紫草一錢、陳皮五分、葱白三寸，新汲水煎服。（直指方）

③治嬰童疹痘。三四日隱隱將出，未出色，赤便閉者，紫草二兩，剉以百沸湯一盞，泡封，勿泄氣，待溫時服半合。其疹雖出亦輕。大便利者勿用。煎服亦可。（經驗良方）

④治痘毒黑疔。紫草三錢、雄黃一錢，爲末，以胭脂汁調銀簪挑破點之，極妙。（集簡方）

⑤治癰疽便閉。紫草、栝樓實等分，新水煎服。（直指方）

⑥治小兒白禿。紫草煎汁塗之。（聖惠方）

⑦治小便卒淋。紫草一兩，爲末，每食前用井華水服二錢。（千金）

方）亦治產後淋瀝。（產寶方）

①治惡蟲咬人。紫草煎油塗之。（聖惠方）

②治火黃身熱。午後卻涼，身有赤點或黑點者，不可治。宜烙手足心，背心，百會下，廉內服紫草湯。紫草、吳藍一兩，木香、川黃連一兩，水煎服。（三十六黃方）

用量 錢半至三錢。
施用宜忌 凡胃寒脾弱、大便滑泄者禁用。

參攷資料 ①紫草古方稀用。今醫家多用治傷寒時疾，發痘疹不出者，以此作藥，使其發出。章甫獨行方，治豌豆瘡，煮紫草湯飲，後人相承用之，其效尤速。（蘇頌）

②紫草味甘鹹而氣寒，入心包絡及肝經血分。其功長於涼血活血，利大小腸。故痘疹欲出未出，血熱毒盛，大便閉滯者，宜用之。已出而紫黑，便閉者，亦可。若已出而紅活，及白陷，大便利者，切宜忌之。故楊士瀛直指方云：紫草治痘，能導大便，使發出，亦輕得木香、白朮佐之，尤爲有益。又曾世榮活幼新書云：紫草性寒，小兒脾氣實者，猶可用。

苳蕘。廣雅。苳草。貌。爾雅。地血。鴛荷草。吳普。紫果。紫莢。紫荊。瑤茅。和漢藥考。紫莢。芝草。新本草。

學名 Lithospermum officinale, L. var. Erythronum, Clarke.

科。屬紫草科。為 Boraginaceae 之根。

產地 雲南、貴州、山東、陝西、廣西等省之山谷原野間。恒有生長。



紫 草

形態 紫草為山野自生之宿根草。圓莖亦裁種之。莖高一二尺。葉無柄。為廣披針形或長卵圓形。皆互生。莖與葉面皆粗糙。至夏。枝梢開如筒五裂之小白花。底部有似葉之物。包之。果實為小堅果。形圓如球。質平滑。色淡褐。其根頗直。生者作牛蒡臭。氣。皮肉俱有酸味。乾則根屈曲。粗似小指。外作暗紫色。有皺紋。內面為黃白色。質輕虛。

浸以熱水。即成紅色之液。

採取 三月間。採根陰乾。

製法 置數日。凡使每一斤。用蠟二兩。溶水拌煮之。待水乾。取去頭并兩畔。細剉用。

性質 苦寒。無毒。

成分 日本理學博士久原窮。氏曾從其中提煉出一種色素。曰紫草紅 (Lithospermum-rosa)。證其化學式為 $C_{24}H_{20}O_5$ 。

其後理學士黑田氏。又從其中提煉出一種色素。曰紫根仁 (Saffronin)。證其化學式為 $C_{24}H_{20}O_5$ 。並聲明謂其係一酯基化合物。生根有特殊之臭氣。皮肉皆具酸味。粗若小指。外面呈暗紫色。有皺紋。裏面呈黃白色。質則疎鬆。用溫湯浸時。可得紅色之液。昔時在人工染料發明以前。曾用其為紫色染料。綜觀各種書籍。似乎有瀉利作用也。

效能 發痘疹。疹瘡癰。用治惡瘡藥。

主治 心腹邪氣。五疳。補中益氣。利九竅。本經。通水道。療腫膜。滿痛。用以合膏療小兒瘡及面皰。

(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論紫草曰。治惡瘡癰癤等。

【明】李時珍本草綱目論紫草曰。治斑疹。痘毒。活血涼血。及利大腸。

【明】繆希雍本草經疏論紫草曰。紫草味苦氣寒。而無毒。為涼血之聖藥。故主心腹邪熱之氣。五疸者。溼熱在脾胃所成。去溼除熱利竅。其疽自愈。邪熱在內。能損中氣。邪熱散。即能補中益氣矣。苦寒性滑。故利九竅而通利水道也。腹腫脹滿痛者。溼熱瘀滯於脾胃。則中焦受邪。而為是病。溼熱解而從小便出。則前證自除也。合膏藥療小兒痘瘡及面皰。皆涼血之效也。【明】李士材本草圖解論紫草曰。紫草之用。端以涼血為功。疹痘毒盛。則血熱。血熱則乾枯而毒不得越。得紫草涼之。則血行而毒出世。俗未明此旨。誤認為宣發之劑。非矣。其性涼潤。便閉者乃為相宜。若大便利者。不敢多用。嫩而紫色染手者佳。【清】黃宮繡本草求真論紫草曰。紫草甘鹹氣寒。色紫質滑。端入厥陰血分。涼血。血涼則九竅通。二

便利。故凡血熱毒閉。而見心腹急痛。水腫不消。五痛癰癤。惡瘡及痘瘡。血熱毒盛。二便閉澀者。治當用此。俾血得寒而涼。得鹹而降。得滑而通。得紫而入。血涼毒清。而二便因以解矣。奈世誤以為宣發之藥。不論毒閉與否。輒用。殊失用藥意義。矣。瀉者忌服。葷葷得陽氣之早。用宜取其為正酒洗用。

國外學說 和漢藥考曰。紫根之良否。關於產地之寒暖。以寒地產者為良。又紫根有山根。里根之別。山根乃野生之種。推為佳品。里根為栽種品。採取之期。多於莖將枯時。掘取。不用水洗。徑曬乾收藏。勿令受溼。別有藥用。稱紫草茸者。乃其嫩苗之葉也。依醫學傳業士澤田玄弘氏。東北醫學會報第二九號。之實驗云。紫根者。紫草之根。古來為膏藥。於皮膚病等外。用之。華岡青方便覽中有紫雲膏者。其製法如左。紫根二兩。當歸二兩。萬真鹿四錢。黃蠟八兩。胡麻油四合。上五味先煮香油。次煮當歸。萬真鹿。後入紫根。見泡沫消時。去火。且緩時澀之。此膏藥。氏於火傷。

外國名詞 *Cercis chinensis*,

Rege (拉丁) ハナズハウ
ス
ハウバナ ハナジハウ スワ
ウバナ (日本)

基本 係豆科爲荊屬紫荊之
木梗與花皮

產地 凡山野林澤間均有出
形體 紫荊爲落葉灌木。高十
尺有餘。枝節叢生。春月先葉節節
攢簇。生花。花爲蝶形。花冠紅紫色。
數朵一簇。細碎可愛。或生木身之
上。或附根上。枝下無花梗。花罷葉
漸出。葉圓作心臟形而尖。有光澤
而互生。其果實爲莢。扁平。長二寸
餘。闊四五分。



紫荊

採取 春月採花。餘時採皮梗。
其皮以色紫味苦如膽者佳。

性質 苦平無毒。
效能 解熱毒。消癰腫。破癰。活
血。用作外科瘡瘍要藥。

主治 破宿血下五淋。濃麥汁

十一 蠶 紫

服。

歷代記述攷證

【唐】陳藏器

本草拾遺論紫荊曰。解諸毒物。癰
疽。喉痹。飛尸。蠱毒。蛇蝎。蟲蠶。狂大
毒。並煮汁服。亦可以之洗瘡。【宋】

大明諸家本草論紫荊曰。通小腸。

【明】李時珍本草綱目論紫荊曰。
活血行氣。消腫解毒。治婦人血氣
疼痛。經水凝滯。

配合應用 ①治婦人血氣。紫
荊皮爲末。醋糊丸。櫻桃大。每酒化
服一丸。【熊氏補遺方】

②治癰腫風變。紫荊皮三錢。老
酒煎服。日二次。【直指方】

③治傷眼青腫。紫荊皮。小便浸
七日。曬研。用生地黃汁。煮汁調傅。
不腫用葱汁。【永類鈴方】

④治爛犬咬傷。紫荊皮末。沙糖
調塗。留口退腫。口中嚼嚙杏仁去
毒。【仙傳外科方】

⑤治鼻中疳瘡。紫荊花陰乾爲
末。貼之。【衛生易簡方】

⑥治發背初生。一切癰疽。皆治。
單用紫荊皮爲末。酒調。攤住。自然
撮小。不開內服。柞木飲此乃救貧
良劑也。【仙傳外科方】

⑦治癰疽未成。用白芷。紫荊皮
等分爲末。酒調服。外用紫荊皮。木
蠟。赤芍藥等分爲末。酒調作藥。【

仙傳外科方】

⑧治痔瘡腫痛。紫荊皮五錢。新
水食前煎服。【直指方】

⑨治產後諸淋。紫荊皮五錢。牛
酒半水煎溫服。【熊氏補遺方】

用量 錢半至三錢

應用宜忌 凡無癰毒及凝滯
者禁用。

參攷資料 ①楊清史仙傳方。

有仲和膏。以紫荊爲君。其方治一
切癰疽。發背。流注。諸腫毒。冷熱不
明者。紫荊皮炒三兩。獨活去節炒
三兩。赤芍藥炒二兩。生白芷一兩。

木蠟炒一兩。爲末。用葱湯調熱敷。
血得熱則行。癰能散氣。瘡不其熱
者。酒調之。痛甚者。筋不伸者。加乳
香。大抵癰疽流注。皆氣血凝滯所
成。遇溫則散。遇涼則凝。此方溫平。

紫荊皮破血消腫。獨活止風動血。
引拔骨中毒。去痹瀝氣。芍藥生血
止痛。木蠟消腫散血。同獨活能破
石腫。堅硬白芷去風生肌止痛。蓋
血生則不死。血動則流通。肌生則

不爛。痛止則不癢。風去則血自散。
氣破則硬可消。毒自去。【李時珍】

⑩皮梗及花。氣味功用並同。【大
明】 ⑪其皮色紅而消腫。故癰科
呼爲肉紅。又曰內消。與何首烏同
名。【李時珍】 ⑫紫荊處處有之。人
多種於庭院間。木似黃荊。葉小無
極。花深紫可愛。【蘇頌】 ⑬即田氏
之荊也。至秋子熟。正紫。圓如小珠。
名紫珠。江東林澤間尤多。【陳藏
器】

【紫荊木】 即紫荊之處方用名。詳

【紫荊】 條。

【紫荊皮】 即紫荊之處方用名。詳

【紫荊花】 即紫荊之處方用名。詳

【紫荊】 條。

【紫荊桂】 係桂之一種。性質功能
與姚桂同。參見「肉桂」條。

【紫荊梗】 即紫荊之處方用名。詳

【紫荊】 條。

【紫草】 命名 本品花紫根紫。
可以染紫。故名。其根頭
有白毛如茸。又名紫草茸。

處方用名 紫草茸。紫草根。

古鑄別名 紫丹。【別錄】 紫英。

一一九九

【紫奈】①即奈之花青核紫。實大如升。其汁如漆者。性質功能與尋常奈同。詳「奈」條。②即菟葵之古籍別名。典見《山海經》神書。詳「菟葵」條。

【紫背仙橋】即毛葉仙橋葉之有紫背者。詳「毛葉仙橋」條。

【紫背浮萍】即浮萍之有紫背者。詳「浮萍」條。

【紫背金盤】產地 生水石間。

形態 紫背金盤爲石草類之一種。莖高尺許。莖如黃絲。搓之即斷。葉背紫色。無花。其根可供藥用。性質 辛。瀉熱。無毒。

主治 婦人血氣痛。洗焙研末酒服。

施用宜忌 能消胎氣。孕婦禁。用。忌雞魚。羊血。淫蕩。

【紫背草】產地 南贛山坡爲多。



草 背 紫

形態 似蒲公英而紫莖。近根葉又微稀。背俱紫。梢端秋深開紫花。似禿女頭花。不全放。老亦飛絮。其功用與蒲公英同。

【紫背稀奇】產地 多生陰山間。

形態 紫背稀奇爲蔓草類之一種。着地而生。苗葉有兩大兩小。葉面灰色。有直紋。背面微紫。若起心。藤長一二尺。葉尖對生。可供藥用。

主治 痘毒。取鮮者酒煎服。已成速愈。未成立消。

【紫背龍牙】即蛇含之古籍別名。典見《圖經》。詳「蛇含」條。

【紫背蓍】係蓍之一種。產於原野。北方多有植者。莖高尺餘。葉爲複葉。似豌豆而小。開紫花。莢宛轉彎曲。性質功能與蓍同。參詳「蓍」條。

【紫芋】即芋麻之古籍別名。典見《綱目》。詳「芋麻」條。

【紫茄】即茄子之古籍別名。典見《圖經》。詳「茄子」條。

【紫英】即紫草之古籍別名。典見《新本草》。詳「紫草」條。

新本草。詳「紫草」條。

【紫茉莉】古鑑別名 藤脂花。狀元紅。〔草花譜〕

〔花鏡〕夜紫花。〔綱目〕

外國名詞 Mirabilis jalapa,

〔拉丁〕オシロイバナ〔日本〕

基本 係紫茉莉科紫茉莉屬

爲紫茉莉之根。其子詳見該條。

產地 原產西印度。

形態 紫茉莉爲茉莉類之一種。多年生或一年生草本。莖高二三尺。葉卵圓形。或心臟形而尖。葉柄長對生。夏月每月開花。一夜凋落。花有合瓣。萼如漏斗狀。有白紅黃等色。亦有一本五色兼備者。甚美麗。有香氣。結實外有苞。形圓有皺紋。苞內背子成簇。大如豌豆。久乃黑。子內白色。有粉狀之胚乳。可作化粧品。而花可浸酒。其根三年不取。大如牛蒡。味甘如山藥。去其外皮。鹽漬可佐饌食與藥用。



莉 茉 紫

性質 微甘。無毒。

主治 婦人乳癰。男子淋濁。及去風活血。

配合宜忌 忌鐵。

參攷資料 紫茉莉根。性稟純陰。柔中帶剛。久食恐骨軟。故陽虛人尤宜忌之。〔綱目拾遺〕

【紫茉莉子】古鑑別名 土

山奈。〔綱目拾遺〕

性質 寒。

主治 去面上斑痣。粉刺。取粉用。

【紫迷香】即鬱金香之古籍別名。典見《綱目》。詳「鬱金香」條。

【紫桐】即桐之花紫而葉上密生黏毛。實可製蠟者。性質功能與桐同。參見「桐」條。

【紫珠】即紫葳之古籍別名。典見《本草拾遺》。詳「紫葳」條。

命名 本品木似黃莉。而色紫。故名。

【紫荊】處方用名 紫荊皮。紫荊花。紫荊梗。

古鑑別名 紫珠。陳藏器

名肉紅。內消。〔綱目〕滿條紅。〔羣芳譜〕

花蘇芳。蘇芳花。〔日本〕

芳譜〕花蘇芳。蘇芳花。〔日本〕

④治丁癰腫毒。用紫花地丁草搗汁服。雖極者亦效。(千金方)又用紫花地丁草、葱頭、生薑共搗貼之。若癰瘡加新黑牛屎。(楊氏方)⑤治喉痺腫痛。箭頭草葉入醬少許。研膏點入取吐。(普濟方)

用鹽 錢半至三錢

施用宜忌 凡屬虛寒者禁用。

參攷資料 處處有之。其葉似柳而微細。夏開紫花。結角。平地生者。起莖。溝壑邊生者。起蔓。普濟方云。鄉村籬落生者。夏秋開小白花。如鈴兒。倒垂。葉微似木香花之葉。此與紫花者相反。恐是別一種也。(李時珍)

【紫花地丁】①即列當之古籍別名。典見和漢藥考。詳『列當』條。②即肉蓯蓉之古籍別名。典見和漢藥考。詳『肉蓯蓉』條。

【紫花菰】即萊菔之古籍別名。典見爾雅。詳『萊菔』條。

【紫花菰子】即萊菔子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『萊菔子』條。

【紫花桐】即紫桐之古籍別名。典見綱目。詳『桐』條。

【紫花黎】係黎之一種。性質功能。

十一 薑 紫

與尋常梨同。參見『梨』條。

【紫果】即紫草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『紫草』條。

【紫油朴】即厚樸有紫色油光者之處方用名。詳『厚樸』條。

【紫風柳】即瑞香之古籍別名。典見和漢藥考。詳『瑞香』條。

【紫金牛】古籍別名 平地木。

(圖經)石青子。(植物圖考)涼鐵遮金珠。(西俚名)藍柑子。(日本)茶果。小青。矮茶。金牛草。(植物名彙)

外國名詞 Ardisia japonica, Bl. (拉丁) ヤブカウジ ヤ

タチバナ ヤブタチバナ アカダマノキ (日本)

基本 係紫金牛科。爲紫金牛屬 (Myrsinaceae) 之根皮。

形態 紫金牛爲山草類之常綠小灌木。狀如多年草。木高四

寸或八九寸。葉互生。長卵形。有鋸齒。夏月莖梢間開花。花小有花梗。

作合瓣花冠。帶青白色。着以赤色之小點。常二花聚集而生。其果實

小如球形。熟則呈紅色或白色。鮮美可愛。而經久不落。其根與皮可

採供藥用。



紫 金 牛

性質 辛。平。無毒。

主治 時疾。腸氣。去風痰。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論紫金牛曰。解毒。破血。

配合應用 紫金皮散。治打撲。

金瘡。傷處浮腫。方用紫金皮。南星。

草烏。川烏。半夏。川當歸。黃柏。杜當

歸。川芎。烏藥。破故紙。白芷。劉寄奴。

川牛膝。桑白皮。各等分。研爲細末。

生薑薄荷汁調敷。皮熱者加黃柏。

生地。各五錢。有瘡口者勿封。即於

四邊敷之。(證治準繩方)

參攷資料 紫金牛生福州。葉

如茶葉。上緣下紫。結實圓紅色。如

丹朱。根微紫色。八月採根。去心暴

乾。頗似巴戟。(蘇頌)

【紫金牛】即射干之古籍別名。典

見土宿本草。詳『射干』條。

【紫金皮】①即野蘿蔔之古籍別

名。典見綱目拾遺。詳『野蘿蔔』條。

②即紅木香之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『紅木香』條。③即地骨皮之古籍別名。典見和漢藥考。詳『地骨皮』條。

【紫金沙】即露蜂房之古籍別名。典見綱目。詳『露蜂房』條。

【紫金藤】(綱目) 古籍別名 山甘草。

產地 生山野間。

形態 紫金藤爲蔓草類。藤屬

之一種。春生苗葉色青。至冬凋落。

莖如枯條。藤皮可供藥用。

採取 採皮曬乾用。

主治 療丈夫腎氣。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論紫金藤皮曰。消損傷

瘀血。搗傅惡瘡腫毒。

【紫佳石】古籍別名 赤莢石。

血。(別錄) 紫賀石。

(陶弘景)

產地 出直隸。邯鄲縣諸地。

形態 紫佳石爲石類之一種。


狀如爵趾。可供藥用。

採取 二月採之。

性質 酸。無毒。

主治 除痺。活氣血。

氣堅筋骨。好顏色。久服輕身。不老延年。



芝 紫

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論紫芝曰。療虛勞。治痔。

【紫花地丁】

丁草。紫地丁。丁草。紫地丁。

白繖別名 羊角子（秘製）箭頭草。獨行虎。米布袋。（綱目）莖莖菜（植物圖考）

外國名詞 Viola Patinii,

DC. var. chinensis, Ging (拉

丁) スミレ スモトリバナ (日本)

基本 係莖菜科紫花地丁屬。

藥用其莖葉。

產地 凡山野原澤間。恒有生長。陳仁山藥物生產辨云。地丁廣

東各省有出。以北江爲多。廣西各

屬亦有出。以南寧爲多。但上海來

者。與廣東正天葵有八成相像。

形態 紫花地丁爲澤草類之

多年生草本。生平地者起莖。生溝壑者起莖莖高三四寸。葉作長卵形。或長橢圓形。葉柄長而叢生。春夏間花莖自葉叢間抽出。端著一花有五瓣。其瓣大小不齊。中有一瓣有長距。花白者莖紫。花紫者莖白。夏日結角。其實爲蒴果。有銳頭。常裂開而散種子。其根如大枝人參。巨者如萊菔。色白可烹食。其變種之花。有淡紫帶紅白雪白等色。莖葉可供藥用。



丁地花紫

採取 夏季採之。採得陰乾用。

性質 苦。辛寒。無毒。

效能 瀉熱解毒。專作外科瘡瘍藥。

主治 一切癰疽發背。疔腫癰

癰。無名腫毒惡瘡。

歷代記述攷證 【明】李士材

本草圖解論紫地丁曰。紫花地丁

裏地之陰氣入肝胃經。爲瘡證散

結泄熱解毒之要藥。癰疽已潰。及

陰證平塌忌之。【清】黃元御玉楸藥解論紫地丁曰。地丁味苦辛微寒。清毒腫。瘡。行經泄火。散腫消毒。治癰疽瘰癧。疔毒惡瘡。敷食皆佳。紫花地丁更勝。

近人學說 張山雷曰。地丁專

爲癰腫丁毒通用之藥。漸湖綱目

稱其苦辛寒。治一切癰疽發背疔

腫瘰癧。無名腫毒。惡瘡。然辛涼散

腫。長於退熱。惟血熱壅滯。紅腫癰

發之外。癰宜之。若謂通治陰疽發

背寒凝之證。殊是不妥。蓋癰疽發

背。古人多作火毒治者。以六朝隋

唐之世。人多好服金石燥烈之藥。

故病源千金外臺。皆有金石丹毒

發一門。古之癰疽發背。皆是丹藥

熱毒。治宜寒涼。亦固其所。而自宋

金以降。金丹一派。漸以銷沈。蓋亦

久無丹石發之一症。而凡患有癰

背之疽者。純是太陽經寒水爲病。

雖外形亦有紅腫。然熱似實火。

然項背必拘急。不仁。古苦必白潤

垢膩。誤投涼劑。內陷隨之。即平塌

頑水。不可復救。此其病情與古時

熱毒。正相對峙。而外瘍諸書。猶沿

用大寒大涼之法。皆是此症之戈

戟。石頑已謂地丁性寒。不利陰症。漫腫無頭。不赤不高者。禁用地丁之名。以花蕊一莖直上。有似於丁。故蒲公英亦有黃花地丁之稱。而此草又有紫花白地丁二種。向來用者。以紫花爲主。蓋取其色紫。能入

血分。以療血熱。然花雖有二色。而

花紫者。莖白。花白者。莖紫。則固皆

入血分。亦無所用其區別。又有以

治黃疸者。亦清熱利溼之功用也。

配合應用 ①治黃疸內熱地

丁末。酒服三錢。又附芒黏明不得

出者。箭頭草嚼嚥下。又癰癧疔瘡

發背諸腫。紫花地丁根。去粗皮。同

白燕窠爲末。油和塗。神效。（乾坤

祕鑑方）

②治癰疽惡瘡。紫花地丁連根。

同蒼耳葉等分。搗爛。酒一銖。橙汁

服。楊誠經驗方）

③治癰疽發背。無名諸腫。貼之

如神。紫花地丁草三伏時。收以白

麝和成。鹽醋浸一夜。貼之。（孫天

仁集效方）

④治一切惡瘡。紫花地丁根。日

乾。以罐燒。燒燼。對瘡。薰之。出黃水。

取盡愈。（衛生易簡方）

參攷資料

●紫石英明澈如水精。但其色紫而不勻。(寇宗奭)

色淡紫。其實疊蔽。隨其大小。皆有五稜。兩頭如箭鏃。煮水飲之。暖而無毒。比之北中白石英。其力倍矣。(劉禹錫)

『紫草』條。

產地 石瓦間皆有之。

色白如玉。古人作貨幣。畫家以研物。其殼可供藥用。

●紫石英凡虛而驚悸不安者。宜加用之。婦人服之有子。(甄權)

乳石論無單服紫石英者。惟五石散中用之。張文仲備急方有鎮心單服紫石英煮水法。胡演及千金方則多雜諸藥同用。今方治婦人及心病時有使者。(蘇頌)

【紫衣】 基本 紫衣爲苔類之一種。可供藥用。

性實 鹹平。無毒。

●紫石英手少陰足厥陰血分藥也。上能鎮心。重以去怯也。下能益肝。瀝以去枯也。心主血。肝藏血。其性煖而補。故心神不安。肝血不足。及女子血海虛寒。不孕者宜之。別錄言其補心氣。甄權言其養肺者。殊味氣陽血陰。營衛之別。惟本經所言諸症。甚得此理。李時珍

【紫石華】 古籍別名 茈石華。基本 紫石華爲石類之一種。可供藥用。

【紫的】 即蓮肉之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蓮肉』條。

【紫葵】 即紫草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『紫草』條。

●紫石英今第一用太山。石色重。激下有根。次出電零山。亦好。又有南成石。無根。又有青綿石。色亦重。黑明。激又有林色石。腹裏必有一物。如眼。吳興石四面纔有紫色。無光澤。會稽諸暨石。形色如石榴子。先時並雜用。今惟采太山最勝。仙經不正用。而俗方重之。(陶弘景)

【紫地丁】 即紫花地丁之處方用名。詳『紫花地丁』條。

【紫李】 係李之一種。實甘美味。食功能性實。與尋常李同。參見『李』條。惟核仁不入藥用。

【紫貝齒】 即紫貝之古籍別名。典見綱目。詳『紫貝』條。

●紫石英心重以去怯也。下能益肝。瀝以去枯也。心主血。肝藏血。其性煖而補。故心神不安。肝血不足。及女子血海虛寒。不孕者宜之。別錄言其補心氣。甄權言其養肺者。殊味氣陽血陰。營衛之別。惟本經所言諸症。甚得此理。李時珍

【紫石華】 古籍別名 茈石華。基本 紫石華爲石類之一種。可供藥用。

【紫的】 即蓮肉之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蓮肉』條。

【紫葵】 即紫草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『紫草』條。

●紫石英今第一用太山。石色重。激下有根。次出電零山。亦好。又有南成石。無根。又有青綿石。色亦重。黑明。激又有林色石。腹裏必有一物。如眼。吳興石四面纔有紫色。無光澤。會稽諸暨石。形色如石榴子。先時並雜用。今惟采太山最勝。仙經不正用。而俗方重之。(陶弘景)

【紫地丁】 即紫花地丁之處方用名。詳『紫花地丁』條。

【紫李】 係李之一種。實甘美味。食功能性實。與尋常李同。參見『李』條。惟核仁不入藥用。

【紫貝齒】 即紫貝之古籍別名。典見綱目。詳『紫貝』條。

●紫石英心重以去怯也。下能益肝。瀝以去枯也。心主血。肝藏血。其性煖而補。故心神不安。肝血不足。及女子血海虛寒。不孕者宜之。別錄言其補心氣。甄權言其養肺者。殊味氣陽血陰。營衛之別。惟本經所言諸症。甚得此理。李時珍

【紫石華】 古籍別名 茈石華。基本 紫石華爲石類之一種。可供藥用。

【紫的】 即蓮肉之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蓮肉』條。

【紫葵】 即紫草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『紫草』條。

●紫石英今第一用太山。石色重。激下有根。次出電零山。亦好。又有南成石。無根。又有青綿石。色亦重。黑明。激又有林色石。腹裏必有一物。如眼。吳興石四面纔有紫色。無光澤。會稽諸暨石。形色如石榴子。先時並雜用。今惟采太山最勝。仙經不正用。而俗方重之。(陶弘景)

【紫地丁】 即紫花地丁之處方用名。詳『紫花地丁』條。

【紫李】 係李之一種。實甘美味。食功能性實。與尋常李同。參見『李』條。惟核仁不入藥用。

【紫貝齒】 即紫貝之古籍別名。典見綱目。詳『紫貝』條。

●紫石英心重以去怯也。下能益肝。瀝以去枯也。心主血。肝藏血。其性煖而補。故心神不安。肝血不足。及女子血海虛寒。不孕者宜之。別錄言其補心氣。甄權言其養肺者。殊味氣陽血陰。營衛之別。惟本經所言諸症。甚得此理。李時珍

【紫石華】 古籍別名 茈石華。基本 紫石華爲石類之一種。可供藥用。

【紫的】 即蓮肉之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蓮肉』條。

【紫葵】 即紫草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『紫草』條。

●紫石英今第一用太山。石色重。激下有根。次出電零山。亦好。又有南成石。無根。又有青綿石。色亦重。黑明。激又有林色石。腹裏必有一物。如眼。吳興石四面纔有紫色。無光澤。會稽諸暨石。形色如石榴子。先時並雜用。今惟采太山最勝。仙經不正用。而俗方重之。(陶弘景)

【紫地丁】 即紫花地丁之處方用名。詳『紫花地丁』條。

【紫李】 係李之一種。實甘美味。食功能性實。與尋常李同。參見『李』條。惟核仁不入藥用。

【紫貝齒】 即紫貝之古籍別名。典見綱目。詳『紫貝』條。

●紫石英心重以去怯也。下能益肝。瀝以去枯也。心主血。肝藏血。其性煖而補。故心神不安。肝血不足。及女子血海虛寒。不孕者宜之。別錄言其補心氣。甄權言其養肺者。殊味氣陽血陰。營衛之別。惟本經所言諸症。甚得此理。李時珍

【紫石華】 古籍別名 茈石華。基本 紫石華爲石類之一種。可供藥用。

【紫的】 即蓮肉之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蓮肉』條。

【紫葵】 即紫草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『紫草』條。

●紫石英今第一用太山。石色重。激下有根。次出電零山。亦好。又有南成石。無根。又有青綿石。色亦重。黑明。激又有林色石。腹裏必有一物。如眼。吳興石四面纔有紫色。無光澤。會稽諸暨石。形色如石榴子。先時並雜用。今惟采太山最勝。仙經不正用。而俗方重之。(陶弘景)

【紫地丁】 即紫花地丁之處方用名。詳『紫花地丁』條。

【紫李】 係李之一種。實甘美味。食功能性實。與尋常李同。參見『李』條。惟核仁不入藥用。

【紫貝齒】 即紫貝之古籍別名。典見綱目。詳『紫貝』條。

●紫石英心重以去怯也。下能益肝。瀝以去枯也。心主血。肝藏血。其性煖而補。故心神不安。肝血不足。及女子血海虛寒。不孕者宜之。別錄言其補心氣。甄權言其養肺者。殊味氣陽血陰。營衛之別。惟本經所言諸症。甚得此理。李時珍

【紫石華】 古籍別名 茈石華。基本 紫石華爲石類之一種。可供藥用。

【紫的】 即蓮肉之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蓮肉』條。

【紫葵】 即紫草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『紫草』條。

●紫石英今第一用太山。石色重。激下有根。次出電零山。亦好。又有南成石。無根。又有青綿石。色亦重。黑明。激又有林色石。腹裏必有一物。如眼。吳興石四面纔有紫色。無光澤。會稽諸暨石。形色如石榴子。先時並雜用。今惟采太山最勝。仙經不正用。而俗方重之。(陶弘景)

【紫地丁】 即紫花地丁之處方用名。詳『紫花地丁』條。

【紫李】 係李之一種。實甘美味。食功能性實。與尋常李同。參見『李』條。惟核仁不入藥用。

【紫貝齒】 即紫貝之古籍別名。典見綱目。詳『紫貝』條。

見和漢藥考詳「瑞香」條。

【紫丹】即紫草之古籍別名。典見別錄。詳「紫草」條。

【紫丹參】即丹參之處方用名。詳「丹參」條。

【紫玉環】 蔓本 本品即荔枝之產四川瀘縣者。

產地 產於四川瀘縣。

主治 除瘴辟癘。

參攷資料 紫玉環曬乾。啖一枚。早行大霧中。則風風不致侵受。

（趙學敏）

【紫玉簪】 即玉簪花之開紫色花蕾者。詳「玉簪花」條。

【紫石英】 命名 英。亦作瑛。玉光也。五種石英皆似玉之有光瑩。故名。

外國名詞 Anethyst. (英)

（德） 基本 屬礬石。爲石英類之一種。

產地 別錄：紫石英生太山山谷。李時珍曰：自大峴至太山皆有之。烏程縣北壘山亦有出。東莞縣壘山又有出。

形態 紫石英屬於六角系稜

柱狀結晶之鑽石。紫色或青紫。或略帶灰色。惟色之深淺。頗不一定。實透明。有玻璃光澤。硬度七。比重二·五至二·八。諸酸類俱不能溶解之。

製法 李時珍曰：凡入丸散。用火煨。醋淬七次。碾末水飛過。曬乾入藥。

性質 甘溫。無毒。

效能 溫營。鎮心。補肝。又可用爲妊娠藥。

主治 心腹咳逆。邪氣。補不足。女子風寒在子宮。絕孕十年無子。

療上氣。心腹痛。寒熱邪氣。結氣。補心氣不足。定驚悸。安魂魄。填下。止消渴。除胃中久寒。散癰腫。令人悅澤。久服溫中。輕身延年。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論紫石英曰：養肺氣。治驚癇。蝕膜。【明】繆希雍本草經疏論紫石英曰：紫石英。本經味甘氣溫。

無毒。別錄加辛。雷公言大溫。獨李當之言大寒者。是昧其性矣。味厚於氣。入手少陰。手厥陰。足厥陰。經少陰主心。屬陽。而本熱。虛則陽氣衰。而寒邪得以乘之。或爲上氣咳

逆。或爲氣結寒熱。心腹痛。此藥溫能除寒。甘能補中。氣足心得補。諸證無不舉矣。驚悸屬心虛。魂魄不安。亦由心君怯弱。無以鎮壓。諸經。茲得鎮壓之力。而心君有以鎮攝。即重以去怯之義也。其主女子風寒在子宮。絕孕無子者。蓋女子繫胎於腎。及心胞絡。皆陰臟也。虛則風寒乘之。而不孕。非得溫煖之氣。則無以祛風寒。而資化育之妙。此藥填下焦。走腎及心包絡。辛溫能散風寒。邪氣。故爲女子燠子宮之要藥。補中氣。益心肝。通血脈。鎮墜虛火。使之歸元。故又能止消渴。散癰腫。令人悅澤。及久服輕身延年也。凡入丸散。用火煨。醋淬七次。碾末水飛過。曬乾入藥。【清】黃宮繡本草求真論紫石英曰：紫石英即係石英之紫色者。故爾別其名曰紫。性味俱同。而紫即能直入血分。不似白石英因其色白。功尚潤肺。止就肺部之病而言之也。紫能入血治療。凡婦人子月。因於風寒內乘。絕孕。男子寒熱咳嗽。驚悸夢魂不安。服此則能鎮魄安神。爲心肝經溫血要藥。

逆。或爲氣結寒熱。心腹痛。此藥溫能除寒。甘能補中。氣足心得補。諸證無不舉矣。驚悸屬心虛。魂魄不安。亦由心君怯弱。無以鎮壓。諸經。茲得鎮壓之力。而心君有以鎮攝。即重以去怯之義也。其主女子風寒在子宮。絕孕無子者。蓋女子繫胎於腎。及心胞絡。皆陰臟也。虛則風寒乘之。而不孕。非得溫煖之氣。則無以祛風寒。而資化育之妙。此藥填下焦。走腎及心包絡。辛溫能散風寒。邪氣。故爲女子燠子宮之要藥。補中氣。益心肝。通血脈。鎮墜虛火。使之歸元。故又能止消渴。散癰腫。令人悅澤。及久服輕身延年也。凡入丸散。用火煨。醋淬七次。碾末水飛過。曬乾入藥。【清】黃宮繡本草求真論紫石英曰：紫石英即係石英之紫色者。故爾別其名曰紫。性味俱同。而紫即能直入血分。不似白石英因其色白。功尚潤肺。止就肺部之病而言之也。紫能入血治療。凡婦人子月。因於風寒內乘。絕孕。男子寒熱咳嗽。驚悸夢魂不安。服此則能鎮魄安神。爲心肝經溫血要藥。

逆。或爲氣結寒熱。心腹痛。此藥溫能除寒。甘能補中。氣足心得補。諸證無不舉矣。驚悸屬心虛。魂魄不安。亦由心君怯弱。無以鎮壓。諸經。茲得鎮壓之力。而心君有以鎮攝。即重以去怯之義也。其主女子風寒在子宮。絕孕無子者。蓋女子繫胎於腎。及心胞絡。皆陰臟也。虛則風寒乘之。而不孕。非得溫煖之氣。則無以祛風寒。而資化育之妙。此藥填下焦。走腎及心包絡。辛溫能散風寒。邪氣。故爲女子燠子宮之要藥。補中氣。益心肝。通血脈。鎮墜虛火。使之歸元。故又能止消渴。散癰腫。令人悅澤。及久服輕身延年也。凡入丸散。用火煨。醋淬七次。碾末水飛過。曬乾入藥。【清】黃宮繡本草求真論紫石英曰：紫石英即係石英之紫色者。故爾別其名曰紫。性味俱同。而紫即能直入血分。不似白石英因其色白。功尚潤肺。止就肺部之病而言之也。紫能入血治療。凡婦人子月。因於風寒內乘。絕孕。男子寒熱咳嗽。驚悸夢魂不安。服此則能鎮魄安神。爲心肝經溫血要藥。

逆。或爲氣結寒熱。心腹痛。此藥溫能除寒。甘能補中。氣足心得補。諸證無不舉矣。驚悸屬心虛。魂魄不安。亦由心君怯弱。無以鎮壓。諸經。茲得鎮壓之力。而心君有以鎮攝。即重以去怯之義也。其主女子風寒在子宮。絕孕無子者。蓋女子繫胎於腎。及心胞絡。皆陰臟也。虛則風寒乘之。而不孕。非得溫煖之氣。則無以祛風寒。而資化育之妙。此藥填下焦。走腎及心包絡。辛溫能散風寒。邪氣。故爲女子燠子宮之要藥。補中氣。益心肝。通血脈。鎮墜虛火。使之歸元。故又能止消渴。散癰腫。令人悅澤。及久服輕身延年也。凡入丸散。用火煨。醋淬七次。碾末水飛過。曬乾入藥。【清】黃宮繡本草求真論紫石英曰：紫石英即係石英之紫色者。故爾別其名曰紫。性味俱同。而紫即能直入血分。不似白石英因其色白。功尚潤肺。止就肺部之病而言之也。紫能入血治療。凡婦人子月。因於風寒內乘。絕孕。男子寒熱咳嗽。驚悸夢魂不安。服此則能鎮魄安神。爲心肝經溫血要藥。

配合應用 ①治女人子宮虛寒。絕孕無子。用紫石英、白朮、艾葉、白膠、當歸、山茱萸、川芎、香附。

②治虛勞驚悸。補虛止驚。令人能食。紫石英五兩。打如豆大。水淘一遍。以水一斗。煮取三升。細細服。（張文仲備急方）

③療心中結氣。用紫石英、茯苓、人參。

④療霍亂。用紫石英、天雄、黃芩。

⑤治癰腫毒氣。紫石英火燒醋淬。爲末。生薑米醋煎敷之。腫亦得。（日華本草方）

用量 一錢至四錢。

施用宜忌 止可暫用。不宜久服。及婦人絕孕。凡由於陰虛火旺。不能攝受精氣者。兼用長附子。扁青。惡蛇甲。黃連。麥句。薑。長石。爲之使。

著名方劑 風引湯。治風熱癰瘕。及驚癇。巢氏云。脚氣宜用此湯。（金匱方）紫白石英、寒水石、石膏、乾薑、大黃、龍齒、牡蠣、甘草、滑石各等分。咬咀。水一升。煎去三分。食後溫呷。無不效者。一方有桂枝、赤石脂。

風引湯。治風熱癰瘕。及驚癇。巢氏云。脚氣宜用此湯。（金匱方）紫白石英、寒水石、石膏、乾薑、大黃、龍齒、牡蠣、甘草、滑石各等分。咬咀。水一升。煎去三分。食後溫呷。無不效者。一方有桂枝、赤石脂。

可畫色。凡砂之絕好者。爲光明砂。其次謂之顆塊。其次謂之鹿麋。其下謂之末砂。惟光明砂入藥。餘並不用。(蘇頌)曰丹砂以辰錦者爲最。麻陽即古錦州地。佳者爲箭鏤砂。結不實者爲肺砂。細者爲末砂。色紫不染紙者爲舊坑砂。爲上品。色鮮染紙者爲新坑砂。次之。蘇頌陳承所謂隋州金商州砂者。乃陶弘景所謂武都雄黃。非丹砂也。范成大桂海志云。本草以辰砂爲上。宜砂次之。然宜州出砂處。與湖北大牙山相連。北爲辰砂。南爲宜砂。地脈不殊。無甚分別。老者亦出白石牀上。蘇頌乃云宜砂出土石間。非石牀所生。是未識此也。別有一種色紅質嫩者。名土坑砂。乃土石間者。不甚耐火。邕州亦有砂。大者數十百兩。作塊。黑暗。少牆壁。不堪入藥。惟以燒取水銀。蘇頌云。融州亦有今融州無砂。乃邕州之訛也。羅仙庚辛玉冊云。丹砂石以五溪山峒中產者得正南之氣爲上。麻陽諸山與五溪相接者次之。雲南波斯西胡砂並光潔。可用。柳州一種砂。全似辰砂。惟塊圓如皂角。

子不入藥用。商州黔州土丹砂。宜信州砂。皆內含毒氣。及金銀銅鉛氣。不可服。張果丹砂要訣云。丹砂者。萬靈之主。居之南方。或赤龍以建號。或朱鳥以爲名。上品生於辰錦二州石穴。中品生於交桂。下品生於衡邵。名有數種。清濁體異。眞偽不同。辰錦上品砂。生白石牀之上。十二枚爲一座。色如未開蓮花。光明耀日。亦有九枚爲一座。七枚五枚者次之。每座中有大者爲主。四圍小者爲臣。朝護四面。雜砂一二斗抱之中。有芙蓉頭成顆者。亦入上品。又有如馬牙光明者。爲上品。白光若雲母爲中品。又有紫鹽砂。圓長似筍。而紅紫爲上品。石片稜角生青光爲下品。交桂所出。但是座上及打石得。形似芙蓉。頭面光明者。亦入上品。顆粒而通明者。爲中品。片段不明徹者。爲下品。衡邵所出。雖是紫砂。得之砂石中者。亦下品也。有溪砂。生溪州砂石之中。土砂。生土穴之中。土石相雜。故不入上品。不可服。唐李德裕黃治論云。光明砂者。天地自然之寶。在石室之間。生雪牀之上。如初生

芙蓉。紅色未拆。細者環拱。大者處中有辰居之象。有君臣之位。光明外徹。采之者。尋石脈而求。此造化之所歸也。

【硃砂根】 古籍別名 平地木。

根。(植物名彙)萬兩(日本)

外國名詞 Ardisia Crenata, Sims (A. Crenata, A. De.) (拉丁) マンリヤウ (日本)

基本 係紫金牛科紫金牛屬。爲硃砂 (Myrsineaceae) 之根。

產地 凡山野陰地恒多有出。



(一) 根 砂 硃

形態 硃砂根爲山草類之常綠亞灌木。莖高二三尺。在暖地則至七八尺。葉互生。長橢圓形。有尖端。革質厚而光澤。緣邊有鈍鋸齒。

夏。莖梢抽出花梗。花小。作繖形。花序花冠帶白色。有暗色之小點。

五裂。雄蕊與花冠之裂片對生。果

實色赤如球形。大如豌豆。經久不落。果色有白有黃。其根色赤。大如筋。可供藥用。

實色赤如球形。大如豌豆。經久不落。果色有白有黃。其根色赤。大如筋。可供藥用。



(二) 根 砂 硃

性質 苦。涼。無毒。

主治 咽喉腫痛。磨水或醋嚥之。甚良。

參攷資料 硃砂根生深山中。今惟太和山人采之。苗高尺許。葉似冬青。葉背甚赤。夏月長茂。根大如筋。赤色。此與百兩金彷彿。(李時珍)

【硃砂魚】即金魚之古籍別名。典見綱目拾遺詳「金魚」條。

【硃砂銀】基本 本品乃方士用諸藥。合硃砂鍊製而成者。

性質 冷。無毒。

主治 延年益色。鎮心安神。止驚悸。辟邪。治中惡。熱毒。心熱。煎服。

憂忘慮劣。

行並臥。不辨真假者。離魂病也。用辰砂人參。茯苓。濃煎日飲。眞者氣爽。假者化也。類編云。錢不少。鄉夜多惡夢。通宵不寐。自慮非吉。遇鄧州推官胡用之曰。昔常如此。有道士教戴辰砂如箭鏃者。涉旬即驗。四五年不復有夢。因解髻中一絳囊遺之。即夕無夢。神魂安靜。道書謂丹砂辟惡安魂。觀此二事可徵矣。(李時珍)⑤臨沅縣廖氏家。世世壽考。後徙去。子孫多夭折。他人居其故宅。復多壽考。疑其井水赤。乃掘之。得古人埋丹砂數十斛也。飲此水而得壽。况鍊服者乎。(抱朴子)⑥鄭康成註。周禮以丹砂石膽雄黃礬石慈石爲五毒。古人惟以攻瘡瘍。而本經以丹砂爲無毒。故多鍊治服食。鮮有不爲藥患者。豈五毒之說勝乎。宜當以爲戒。(蘇頌)⑦朱砂鍊養心神。但宜生使。若鍊服少有不作疾者。一醫疾服伏火者數粒。一旦大熱。數夕而斃。沈存中云。表兄李勝鍊朱砂爲丹。歲餘沐浴。再入鼎。誤遺一塊。其徒丸服之。遂發憎冒。一夕而斃。夫生砂初生小兒便可服。因火力

所變。遂能殺人。不可不謹。(寇宗奭)⑧葉石林避暑錄載。林彥振謝任伯皆服伏火丹砂。俱病腦疽死。張杲醫說載。張登服食丹砂。病中消數年。發覺疽而死。皆可爲服丹之戒。而周密野語載。臨川周推官平生孱弱。多服丹砂。烏附藥晚年發背疽。醫悉歸罪丹砂。服解毒藥不效。瘍醫老視診脈曰。此乃極陰證。正當多服伏火丹砂及三建湯。乃用小劑試之。復作大劑。三日後用膏敷貼。半月而瘡平。凡服三建湯一百五十服。此又與前諸說異。盡人之臆。膽粟受萬殊。在智者辨其陰陽脈證。不以先入爲主。非妙入精微者不能企此。(李時珍)⑨丹砂卽今朱砂。俗醫別取武都仇池雄黃夾雌黃者名爲丹砂。用之謬矣。符陵是涪州接巴郡南。今無復采者。乃出武陵西川諸蠻夷中。皆通屬巴地。故謂之巴砂。仙經亦用越砂。卽出廣州臨漳者。此二處並好。惟須光明瑩徹爲佳。如雲母片者。謂之雲母砂。如樗砂子。紫石英形者。謂之馬齒砂。亦好。如大小豆及大塊圓滑者。謂之豆砂。細

未碎者。謂之末砂。此二種粗不入藥用。但可靈用爾。朱砂皆鑿坎入數丈許。雖同出一郡縣。亦有好惡。地有水井。勝火井也。仙方煉餌。最爲長生之寶。(陶弘景)⑩丹砂大略二種。有土砂石砂。其土砂復有塊砂末砂。體並重而色黃黑。不任畫用。療瘡疥亦好。但不入心腹之藥。然可燒之出水銀乃多也。其石砂有十數品。最上者爲光明砂云。一類別生一石竈內。大者如雞卵。小者如棗栗。形似芙蓉。破之如雲母。光明照徹。在竈中石臺上生。得此者帶之辟惡爲上。其次或出石中。或出水內。形塊大者如拇指。小者如杏仁。光明無雜名馬牙砂。一名無重砂。入藥及畫俱善。俗間亦少有之。其磨鑿新井。別井冰井火井。芙蓉石末石堆豆末等砂。形類頗相似。入藥及畫當擇去其雜土石。便可用矣。別有越砂。大者如拳。小者如雞鴨卵。形雖大其雜土石不如細而明淨者。經言末之名眞。朱者謬矣。豈有一物以全末殊名乎。(蘇恭)⑪砂凡百等。不可一一論。有妙疏砂。如拳許大。或重一盤。

有十四面。面如鏡。若遇陰沉天雨。卽鏡面上有紅漿汁出。有梅柏砂。如梅子許大。夜有光生。照見一室有白庭砂。如帝珠子許大。面上有小星。現有神座砂。金座砂。玉座砂。不經丹竈服之。而自延壽命。次有白金砂。澄水砂。陰成砂。辰綿砂。芙蓉砂。鏡面砂。箭鏃砂。曹末砂。土砂。金星砂。平面砂。神末砂等。不可一一細述也。(雷斅)⑫今出辰州。宜州。階州。而辰砂爲最。生深山石崖間。土人采之。穴地數十丈。始見其苗。乃白石。謂之朱砂牀。砂生石上。其大塊者如雞子。小者如石榴子。狀若芙蓉頭。箭鏃。連牀者紫黯若鐵色。而光明瑩徹。碎之巖若作牆壁。又似雲母片。可折者眞辰砂也。無石者爛佳。過此皆濁土石中得之。非生於石牀者。宜砂絕有大塊者。碎之亦作牆壁。但罕有類物狀。而色亦深赤。爲用不及辰砂。蓋出土石間。非白石牀所生也。然近宜州隣地。春州。融州。皆有砂。故其水靈亦。每烟霧蒸騰之氣亦赤黃色。士人謂之朱砂氣。尤能作瘴癘爲人患也。階砂又次之。不堪入藥。惟

十一畫 硃

半兩。牛黃一分爲末。每服一字。犀角磨水調下。(普濟方)

⑤治急驚搐搦。用丹砂半兩。天南星一個。一兩重者。炮製酒浸。大蠟三個爲末。每服一字。薄荷湯下。(聖濟總錄方)

⑥治驚忤不語。打撲驚忤。血入心竅。不能言語。朱砂爲末。以雄豬心血和丸。麻子大。每棗湯下七丸。(直指方)

⑦治客忤卒死。真丹方寸匕。蜜三合和灌之。(肘後方)

⑧治癲癩狂亂。歸神丹。治一切驚憂。思慮多忘。及一切心氣不足。癲癩狂亂。獼豬心二個。切入大朱砂二兩。燈心三兩。在內。麻扎石罌。煮一伏時。取砂爲末。以伏神末二兩。酒打薄荷丸。梧子大。每服九丸。至十五丸。至二十五丸。麥門冬湯下。甚者乳香人參湯下。(百一選方)

⑨治產後癲狂。敗血及邪氣入心。如見祟物。顛狂。用汁三四茶匙調。以紫項地龍一條。入藥滾三滾。刮淨。大辰砂一二錢。研細。飛過。用飲兒乳去地龍。不用入無灰酒。

一盞。分作三四次服。(何氏方)

⑩治心虛遺精。豬心一個。切片相連。以飛過朱砂末。摻入線縛白。水煮熟食之。(唐鑑經驗方)

⑪治男婦心痛。朱砂明礬。枯等分。爲末。沸湯調服。(摘玄方)

⑫治心腹宿癥。及卒得癥。用朱砂研細。搜飯。以雄雞一隻。餓二日。以飯飼之。收糞。曝燥。爲末。溫酒服。方寸匕。日三服。服盡更作。愈乃止。(外臺祕要方)

⑬治霍亂轉筋。身冷。心下微溫者。朱砂研二兩。蠟三兩。和丸。著火籠中。熏之。周圍厚覆。勿令烟洩。兼牀下著火。令腹微煖。良久。當汗出而甦。(外臺祕要方)

⑭辟瘴正陽。丹砂三兩。水飛。每服半錢。溫蜜湯下。(普濟方)

⑮治傷寒發汗。傷寒時氣。溫疫頭痛。壯熱脈盛。始得一二日者。取真丹一兩。水一斗。煮一升。頓服。覆被取汗。忌生血物。(外臺祕要方)

⑯用真丹末。酒調。遍身塗之。向火坐。得汗愈。(肘後方)

⑰辟穢溫疫。上品朱砂一兩。細研。蜜和丸。麻子大。常以太歲日平。

旦。一家大小勿食諸物。向東各吞三七丸。勿令近窗。永無溫疫。(外臺祕要方)

⑱治諸般吐血。朱砂。蛤粉等分。爲末。酒服二錢。又方。丹砂半兩。金箔四片。蚯蚓三條。同研丸。小豆大。每冷酒下二丸。(聖濟總錄方)

⑲治妊婦胎動。朱砂末一錢。和雞子白三枚。攪勻。頓服。胎死即出。未死即安。(普濟方)

⑳治子死腹中不出。朱砂一兩。水煮熟。沸爲末。酒服立出。(十全博救方)

㉑治目生障翳。生辰砂一塊。日擦之。自退。王居雲病此。用之如故。(普濟方)

㉒治目膜息肉。丹砂一兩。五月五日研勻。銅器中以水漿一盞。臘水一盞。浸七日。暴乾。銅刀刮下。再研。瓶收。每點少許。背上。(聖濟總錄方)

㉓治目生弩肉及珠。管真丹。貝母等分。爲末。點注。日三四度。(肘後方)

㉔治面上肝癰。雞子一枚。去黃。朱砂末一兩。入雞子內。封固。入白。

一一九〇

伏雌下。抱至雞口。取塗面即去。不過五度。面白如玉。此乃陳胡娘。貴妃常用方。出西王母枕中方。(外臺祕要方)

㉕治沙蜂叮螫。朱砂末。水塗之。(摘玄方)

㉖治水蛭瘡毒。南方多雨。有物曰木蛭。大類鼻涕。生於古木之上。聞人氣則閃閃而動。人過其下。墮人體間。即立成瘡。久則遍體。惟以朱砂麝香塗之。即愈。(張景岳說方)

㉗治產後舌出不收。丹砂傅之。暗擲盆盎。作墮地聲。驚之。即自收。(集簡方)

㉘用量 三分至八分。

㉙施用宜忌 凡無賢熱者。禁用。惡惡石。畏鹹水。忌一切血。

參攷資料 ①同遠志。龍骨之類。則養心氣。同當歸。丹參之類。則養心血。同枸杞。地黃之類。則養腎。同厚朴。川椒之類。則養脾。同南星。川烏之類。則祛風。可以明目。可以安胎。可以解毒。可以發汗。隨佐使而見功。無所往而不可。夏子益奇疾方云。凡人自覺本形作兩。人並。

國外學說 英美學說謂硃砂產中國之廣東、貴州、四川、湖南等處。係自然生成。其配成者。係從汞與硫磺粉製煉。硃砂爲希臘國人所知之藥。在古時埃及國人用之爲顏料。中國與印度國自古以來卽用爲藥品。而中國所產之硃砂在西國久已著名。又日本古方藥品考曰。朱眞卽今辰砂也。以出辰州者爲勝。故名。從前運至日本之辰砂有馬牙砂、箭鏃砂、雲母砂、米粒砂數種。現今運來者皆如豆粒大體重。朱色鮮豔。此爲上品。亦有細砂作黃赤色者。須水飛去黃。取丹砂用。日本產不入藥舖。方書中單稱朱。或單稱丹者。皆指辰砂言。日本呼作丹者卽鉛丹。呼作朱者卽銀朱。以水銀製之。故有毒。與朱砂不同。辰砂生用無毒。若煨煉過則生水銀有毒。故忌火。

辨偽 鄭省巖曰。丹砂始出涪州山谷。今辰州、錦州及雲南、波斯、蠻獠洞中石穴內皆有。而以辰州爲勝。故又名辰砂。大者如芙蓉花。小者如箭鏃。研之明淨鮮紅。斯

十一 蠶 硃

爲上品。近今市肆有以鉛丹攪入硃砂。又用代赭攪入辰砂。貽害多矣。曹炳章曰。按硃砂體質極重。鮮紅。硃紅色至褐紅色之粒塊。亦有成細小透明之斜方之結晶體者。或爲紅色粉末。有時含爲機物。則顏色殆黑不明亮。俗爲陰沙。質內含有銻質或鐵質。銅及各種硫化物。礦相伴。不堪入藥。周去非云。據本草金石部。以湖南辰州所產爲佳。雖今世亦貴之。今辰砂乃出沅州。其色與廣西宜州所產相類。色鮮紅微紫。與宜州砂之深紫微黑者大異。功效亦相懸絕。蓋宜山卽辰山之陽故也。雖然。宜辰硃砂雖良。要非仙藥。嘗聞宜州石江溪峒。歸德州大秀壩。有金縷砂。大如箭鏃。而上有金線縷文。乃眞仙藥。得其道者。可用以變化形質。試取以煉水銀。乃見其異。乃宜州燒水銀。當硃砂十二三斤。可燒成十斤。其良者十斤。眞得十斤。惟金縷砂八斤可得十斤。不知此砂一經火力。形質乃重何也。是砂也。取毫末而齒之。色如鮮血。誠非辰宜可及。惜乎出產不豐。不能分銷全國耳。

今所通行者。皆湖南辰州及雲南貴州出者。皆能片大而薄。如鏡面光亮。色紫紅鮮豔。明透者。爲鏡面砂。亦佳。如整粒者。爲豆砂。能起鏡面光。體亦佳。細如粉屑者。爲米砂。略次。如呆色紫暗不明亮者。卽陰砂。內含銻質或鐵質。爲更次。不宜入藥用。

配合應用 一服食丹砂。三皇

眞人鍊丹方。丹砂一斤。研末重篩。以醇酒沃之。如泥狀。盛以銅盤。置高閣上。機則復以酒沃。令如泥。陰雨疾風。則藏之。盡酒三斗。乃暴之。三百日。當紫色。靜室飯丸。麻子大。常以平旦向日吞三九。一月三蟲出。半年諸病遂。一年鬚髮黑。三年神人至。(太上玄變經方)

二小神丹方。眞丹末三斤。白蜜六斤。攪合日曝。至可丸。凡麻子大。每日服十丸。一年白髮反黑。齒落更生。身體潤澤。老翁成少。(抱朴子內編方)

三明目輕身去三尸除諸癩。美酒五升。浸朱砂五兩。五宿日乾。研末。蜜丸小豆大。每服二十丸。白湯下。久服見效。(衛生易簡方)

四神注丹方。白茯苓四兩。糯米酒煮軟。竹刀切片。陰乾。爲末。入朱砂末二錢。以乳香水打糊。丸梧子大。朱砂末二錢。爲衣。陽日二九。陰日一九。要祕精。新汲水下。要逆氣。過精。溫酒下。並空心。(醫壘元戎方)

五烏髭變白。小雌雞二隻。只與烏油麻一件。同水飼之。放卵時。收取。先放者。打敷。以朱砂末。填入。糊定。同衆卵。抱出。雞取出。其藥。自然結實。研粉。蒸餅和丸。如綠豆大。每酒下五七丸。不惟變白。亦且愈疾。(張澹方)

六小兒初生六日。解胎毒。溫腸胃。壯氣血。朱砂豆大。細研。蜜丸一棗大。調與吮之一日。令盡。(姚和衆至寶方)

七預解毒。初發時。或未出時。以朱砂末半錢。蜜水調服。多者可少。少者可無。重者可輕也。(丹溪方)

八治初生兒驚。月內驚風欲死。朱砂磨新汲水。塗五心最驗。(斗門方)

九治小兒驚熱。夜臥多啼。朱砂

基本 係金岩屬。爲赤礦類之丹砂。

產地 陳仁山藥物生產辨云。硃砂產貴州者以漢口爲上。銅仁次之。大豆砂、鏡砂。均由此篩出。大粒者呼名鏡砂。爲好。豆砂次之。和漢藥考曰。產於西班牙奧大利亞。匈牙利。意大利。祕魯。墨西哥。諸國。中國以產於宣州辰州者爲上。錦州次之。日本則產於阿波。大和。伊勢。肥後。陸前等地。

形態 辰砂之形狀。如板。如絲。如粒。如塊。色紅。或褐紅。或褐黑。有金剛光澤。條痕作緋紅色。硬度二。○至三。五。比重八。○至八。二。熱則發生亞硫酸瓦斯而蒸升水銀。諸酸類不溶解。惟濃硝酸能溶解之。

種類 丹砂品類頗多。以辰州。錦州。出者爲良。如馬牙。光明者爲上品。白光如雲母者爲中品。石片稜角生青光者爲下品。其最佳者名箭簇砂。結而不實者名肺砂。細者名末砂。色紫不染紙者名舊坑砂。色鮮染紙者名新坑砂。

採取 採無時。土人採之穴地。

數十丈。始見其苗。乃白石也。謂之朱砂牀。砂生於石上。其大塊者如雞子。小者如石榴子。十二枚爲一座。其色如未開蓮花。光明耀目。亦有九枚爲一座者。及有七枚五枚者。次之。每座中大者爲主。四圍小者爲臣。朝護四面。雜砂一二斗抱之中。有芙蓉。顯成類者。乃入上品之丹砂也。

製法 雷斅曰。凡修事朱砂。靜室焚香齋沐後。取砂以香水浴過。拭乾。碎搗之。鉢中更研三伏時。取一瓷鍋子。每朱砂一兩。同甘草二兩。紫背天葵一錢。五方草一錢。着砂上。以東流水煮三伏時。勿令水關去藥。以東流水淘淨乾。熬又研如粉。用小瓷瓶入青芝草。山鬚草。牛兩蓋之下。十斤火。煨從巳至午。方歇。候冷。取出。細研用。如要服。則以熬蜜丸。細麻子。大空腹服一丸。李時珍曰。今法惟取好砂研末。以流水飛三次。用其末。砂多雜石末。鐵屑。不堪入藥。又法以絹袋盛砂。用蕎麥灰淋汁。煮三伏時。取出。流水浸洗過。研粉飛晒用。又丹砂以石膽。消石和埋土中。可化爲水。

性質 甘。微寒。無毒。

成分 百分中含水銀八十六。硫黃十四。化學上謂之硫化水銀。口。天產品質中。多夾有土質。

效能 安魂魄。定驚。明目。解毒。用作鎮痙藥。又治初期梅毒。

作用 有直接殺滅微菌之能。惟功效遠不及水銀。

主治 身體五臟百病。養精神。安魂魄。益氣明目。殺精魅邪惡鬼。久服通神明不老。能化爲汞。〔本經〕通血脈。止煩滿。消渴。益精神。悅澤人面。除中惡腹痛。毒氣。疥癬諸瘡。輕身神仙。〔別錄〕

歷代記述攷證 〔唐〕甄權藥性本草論砂曰。鎮心。主尸疰。抽風。〔宋〕大明諸家本草論砂曰。潤心肺。治瘡癰息肉。并塗之。〔明〕李時珍本草綱目論砂曰。治驚癰。解胎毒。痘毒。驅邪。癰發汗。〔明〕繆希雍本草經疏論砂曰。丹砂味甘微寒。而無毒。蓋指生砂而言也。藥性論云。丹砂君爲清鎮少陰。君火之上藥。辟除鬼魅百邪之神物。安定神明。則精氣自固。火不妄炎。則金木得平。而魂魄自定。氣力

自倍。五臟皆安。則精華上發。故明目。心主血脈。心火寧謐。則陰分無熱。而血脈自通。煩滿自止。消渴自除。矣。殺精魅邪惡鬼。除中惡腹痛者。陽明神物。故應辟除不祥。消散陰惡殺厲之氣也。久服通神明不老者。古之真人。飛丹煉石引納清和。配以金鉛。按之法象。自能合丹道而成變化也。〔清〕黃宮繡本草求真論砂曰。辰砂即書所云丹砂。朱砂者是也。因砂出於辰州。故以辰名。體陽性陰。外顯丹色。內含真汞。不熱而寒。離中有坎。也不苦而甘。火中有土也。嬰兒牝女交會於中。故能入心解熱。而神安魄定。是以同滑石甘草則清暑。同遠志龍骨則養心氣。同丹參則養心血。同地黃枸杞則養腎。同厚朴川椒則養脾。同南星川烏之類。則祛風。且以人參茯神濃煎。調入丹則治離魂病。以丹砂末一錢和生雞子黃三枚。攪勻。頓服。則妊娠胎動即安。胎死即出。慎勿經火。及一切烹鍊。則毒等於砒。況此純陰重滯。即未烹鍊。久服痰悶。以其虛靈之氣。被其鎮壓也。辰砂如明箭簇者。

【甜蕎麥】即蕎麥之處方用名。詳「蕎麥」條。

【甜藤】產地 生山野林下。形體 甜藤爲蔓草類之一種。莖如葛。葉尖長氣辛臭。莖可供藥用。其葉詳見該條。

性質 甘寒。無毒。

主治 熱煩解毒。調中氣。令人肥健。止洩。又治刺馬血毒入肉。及狂犬牛馬黃病。蛇咬傷。

【甜藤】①即甘藤之古籍別名。典見補註本草。詳「甘藤」條。②即忍冬藤之古籍別名。典見和漢藥考。詳「忍冬藤」條。

【甜藤葉】性質 辛。臭。主治 搗傳小兒腹中閃癖。瘡滿。

【甜櫛】即櫛之木紋細白而實小者。性質功能。詳「櫛」條。

【甜櫛子】即鈎栗之古籍別名。典見吳瑞本草。詳「鈎栗」條。

【產家大器】即秦九之古籍別名。典見和漢藥考。詳「秦九」條。

【畢石】即騰磬之古籍別名。典見本經。詳「騰磬」條。

【畢豆】即豌豆之古籍別名。典見

廣史。詳「豌豆」條。

【畢勃】即畢茂之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「畢茂」條。

【畢茄煙】即煙草之一種。性質功能。與煙草同。詳「煙草」條。

【畢榜柳子】即覆盆子之古籍別名。典見圖經本草。詳「覆盆子」條。

【畢澄茄】古籍別名 毗陵茄子。華澄茄（綱目）

外國名詞 Piper cubeba, I. H. (拉丁) ヒツチヨウカ (日本)

基本 係胡椒科胡椒屬。爲畢澄茄之果實。

產地 出東印度。及爪哇等處。

形體 畢澄茄爲喬木類之蔓生植物。葉長卵形而尖。開白花。穗狀花序。至夏結實。爲漿果。如豌豆大。呈黑褐色。與胡椒一類。二種其實可供藥用。

採取 八月九月採之。

性質 辛溫。無毒。

製法 雷斂曰。凡採得。去柄及皺皮。用酒浸蒸之。從已至酉。杵細晒乾。入藥用。

主治 下氣消食。去皮腐風。心腹間氣脹。令人能食。療鬼氣。能染髮。及香身。

歷代記述攷證

【宋】大明諸家本草論畢澄茄曰。治一切冷氣。痰瀉。并霍亂吐瀉。肚腹痛。腎氣膀胱冷。【明】李時珍本草綱目論畢澄茄曰。暖脾胃。止嘔吐。噦逆。

【畢蔓】即畢茂之古籍別名。典見大明會典。詳「畢茂」條。

【異翹】即連翹之古籍別名。典見爾雅。詳「連翹」條。

【略石】即略石之古籍別名。典見和漢藥考。詳「略石」條。

【略岑草子】即地膚子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「地膚子」條。

【盜庚】即旋覆花之古籍別名。典見爾雅。詳「旋覆花」條。

【盒子草】即天穗草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「天穗草」條。

【盒兒藤】即天穗草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「天穗草」條。

【衆】即杭之古籍別名。典見唐本草。詳「杭」條。

【衆口芝】即蜂蜜之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蜂蜜」條。

【衆戎】即紫參之古籍別名。典見別錄。詳「紫參」條。

【蛎子】即蛎蚪之古籍別名。典見綱目。詳「蛎蚪」條。

原名 丹砂。從井中一點。象丹在井中之形義。後人以丹爲朱色。遂呼爲朱砂。其出辰州者爲上。故有辰砂之稱也。

處方用名 辰砂。飛辰砂。塊辰砂。洋尖砂。劈砂。豈砂。鏡面砂。

古籍別名 朱砂。肺砂。土坑砂。新坑砂。舊坑砂。綱目 梅柏砂。金星砂。神末砂。平面砂。箭鏃砂。白庭砂。神座砂。妙硫砂。金座砂。玉座砂。白金砂。澄水砂。陰成砂。辰錦砂。芙蓉砂。曹末砂。（雷公炮炙論）巴砂。越砂。雲母砂。馬齒砂。豆砂。末砂。（本草集註）光明砂。馬牙砂。無重砂。（新修本草）圖經 日精真珠仙砂。赤砂。赤帝。太陽。朱鳥。絳珠。朱兒。絳宮。朱兒。赤帝。精赤帝。體朱。雀（石藥附雅）塊砂。階砂。針砂。神砂。溪砂。宣砂。真朱。半面砂。（和漢藥考）順塊。鹿蘇。（圖經本草）

外國名詞 Hydrargyri Sulphidum Rubrum (拉丁) China-barite (英) Zimbar (德)

●治風熱牙痛。用瓜蒂七枚。炒研。麝香少許和之。綿裹咬定。流涎。(聖濟總錄方)

●治雞尿白禿。甜瓜蔓連蒂。不拘多少。以水浸一夜。砂鍋熬取苦汁。去性再熬如饈。盛收。每刺去癩。洗淨。以膏一盞。加半夏末二錢。薑汁一匙。狗膽汁一枚。和勻塗之。不過三上。忌食動風之物。(儒門事親方)

●治胸膈痰氣。苦丁香三箇爲末。水調服。吐痰即止。(朱氏經驗方)

用量 八分至錢半。
●施用宜忌 凡非氣壯邪實者禁用。

著名方劑 瓜蒂散。治太陽痛胸中痞悶。氣上冲胸。不得息。此胸中有寒也。或手足厥冷。脈乍緊。心中煩滿。不能食。病在胸中。並當吐之。瓜蒂。熬赤。小豆各一分。上二味。各別搗篩爲散。已合治之。取一錢匕。以香豉一合。用熱湯七合。煮作稀糜。去滓取汁。和散溫頓服之。不吐者少少加。得快吐乃止。諸亡血虛家不可與之。

參攷資料 ●瓜蒂乃陽明經

除溼熱之藥。故能引去胸膈痰涎。頭目溼氣。皮膚水氣。黃疸溼熱諸證。凡胃弱人及病後產後用吐藥。皆宜加慎。何獨瓜蒂爲然。(李時珍) ●瓜象實在蔓蔓間也。蒂瓜之綴蔓處也。性偏蔓延。未繫於本。故少延輒腐。爾雅曰。其紹蹙。疏云。繼本曰紹。形小曰蹙。故近本之瓜常小。近末之瓜轉大也。凡實之吮抽津液。惟瓜稱最。而吮抽津液之樞。惟蒂是以瓜蒂具微下炎上之用。乃蒂味苦而瓜本甘。以見中樞之所以別於上下內外。誠瀉泄之宣劑通劑也。(盧子由)

【甜瓜葉】 主治 搗汁塗頭生髮。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論甜瓜葉曰。補中。治小兒疳及打傷損折。爲末酒服。去瘀血。

【甜瓜蔓藤】 乾用。 製法 採得蔓子各半兩。甘草六錢爲末。每酒服二錢。

主治 女人月經斷絕。同使君子各半兩。甘草六錢爲末。每酒服二錢。

瓜條。

【甜貝母】即川貝母之古籍別名。典見綱目拾遺。詳川貝母條。

【甜杏仁】 原名 巴旦杏。 命名 本品即杏仁之甜味者。故名。

處方用名 京杏仁。
古籍別名 八擔杏。忽鹿麻。(綱目)把魔杏。

外國名詞 Prunus Amygdalus, Stokes.
產地 出回回舊地。今關西諸處亦有之。

形態 甜杏爲果類之一種。樹如杏而葉差小。實亦尖小而肉薄。核如梅核。殼薄而仁較杏爲大。其味甘美。如榛子。可供茶點與藥用。



甜 杏 仁

性質 甘。平。溫。無毒。

主治 止咳下氣。消心腹逆悶。
【甜陀淳子】即蜜陀僧之古籍別名。典見和漢藥考。詳蜜陀僧條。

【甜柑】即柑實之先霜而黃。每顆八瓣者。性質功能。詳柑條。

【甜桔梗】即桔梗之甜者別名。典見綱目。詳桔梗條。即藤苑之處方用名。典見綱目。詳藤苑條。

【甜消】即芒硝之用蘿蔔同煮。煉去鹹味者。性質功能。參詳芒硝條。即英消製煉之別名。詳英消條。

【甜梅】即杏仁之古籍別名。典見綱目。詳杏仁條。

【甜菓子】即枸杞子之古籍別名。典見圖經本草。詳枸杞子條。

【甜菊花】即菊花之處方用名。詳菊花條。

【甜葡萄酒】 主治 令病人精神速復。

【甜橘紅】即橘紅用糖汁製煉者之別名。詳橘紅條。

【甜薯蕷】即薯蕷之處方用名。詳薯蕷條。

【甜廣皮】即橘皮之處方用名。詳橘皮條。

【甜蕎】即蕎麥之古籍別名。典見綱目。詳蕎麥條。

之義。去鼻中瘰肉者。以其苦寒能除肺家之熱也。日華子治腦熱。鼻不聞香臭。及吐風熱痰涎。風眩頭痛。癰腫喉痺。頭面有瘰氣。傷寒客水胸中。傷食脹滿。下部無脈等證。皆借其宣發滲泄引涎迴渥之功耳。【清】黃宮繡本草求真論瓜蒂曰。甜瓜蒂即俗名苦丁香是也。味苦氣寒有毒。蓋此氣味純陰。功崑涌泄。凡因熱痰聚。臨而見面目浮腫。欬逆上氣。皮膚水氣。黃疸。瘰熱諸症。則當用此調治。或兼他藥同入涌吐。如仲景合赤小豆之酸甘。以吐胸中寒邪。金匱瓜蒂湯。以治中暈無汗之類。若不因其高而越。則爲喘爲嗽。勢所必至。但非實熱實症。不可輕用。

國外學說 日本學說謂昔時用爲催吐藥。然自吐酒石吐根等輸入後。已相形見絀矣。藥用者當甜瓜未熟之時。採其蒂。乾燥之。有催吐之效。尤以新而味苦辛者爲良。經年而失氣味者爲劣。依猪子氏之實驗云。本品之有效成分爲難溶於水而易溶於亞爾個保爾

及依的兒之物質。而非糖原質。或亞爾加魯乙度之類。其作用也。或直達。或間接。刺戟嘔吐中樞。以誘起嘔吐。本藥以日本越前產者。尤有峻烈之性。故病牀上甚宜注意。因曾舉動物試驗之成績而詳論之。和漢藥論。漢醫吐劑之用量。凡〇・四。又和藥漢考曰。蒂之熟者。少苦。味效力薄。日藥舖所售者。爲越前福井所產。鼠瓜（爲甜瓜之一種）之蒂。呼越前瓜蒂。爲良品。據猪子博士言。瓜蒂注意服之。則祇刺戟胃腸而已。并不起吸收作用（即起呼吸障礙等）。故毫無危險。惟服大量。則發急性胃腸炎。故須審慎云。

配合應用 ①治太陽中暈。身熱頭痛而脈微弱。此夏月傷冷水。水行皮中所致。瓜蒂二七箇。水一升。煮五合。頓服。取吐。（金匱方）
②治風涎暴作。氣塞倒仆。用瓜蒂爲末。每用一二錢。膩粉一錢。匕以水中合調。良久。涎自出。不出。含沙糖一塊。下咽。即涎出也。（衍義方）

③治諸風語癰。諸風脇痰。諸癰

涎涌。用瓜蒂炒黃爲末。量人以酸鹽水一盞調下。取吐。風癰加蠟梢半錢。淫氣腫滿加赤小豆末一錢。有蟲加狗油五七點。雄黃一錢。甚則加羌花半錢。立吐蟲出。（活法機要方）

④治風癰喉風。欬嗽及遍身風癰。急中涎潮等證。不拘大人小兒。此藥不大吐逆。只出涎水。瓜蒂爲末。壯年服一字。老少半字。早晨井華水下。一食須含沙糖一塊。良久涎如水出。年深者出墨涎。有塊布水上也。涎盡。食粥一兩日。如吐多人困甚。急以麝香泡湯一盞。飲之。即止。（經驗後方）

⑤治急黃喘急。息上堅硬。欲得水喫者。瓜蒂二小合。赤小豆一合。研末。鹽漿水五合。服方寸匕。一炊久。當吐不吐。再服。吹鼻取水亦可。（傷寒類要方）

⑥治過身如金。瓜蒂四十九枚。丁香四十九枚。甘鍋內燒存性。爲末。每用一字。吹鼻。取出黃水。亦可揩牙追涎。（經驗方）

⑦治熱病發黃。瓜蒂爲末。以大豆許吹鼻中。輕則半日。重則一日。

⑧治黃疸癰黃。並取瓜蒂、丁香、赤小豆各七枚。爲末。吹豆許入鼻。少時黃水流出。隔日一用。瘰乃止。亦治身面浮腫。（孟詵方）

⑨治十種瘰氣。苦丁香爲末。蜜肉和丸。梧子大。每服十三丸。糞湯下。甚效。（瑞竹堂方）

⑩治瀝家頭痛。用瓜蒂末一字。嚥入鼻中。口含冷水。取出黃水。愈。（活人書方）

⑪治癰疾寒熱。瓜蒂二枚。水半盞。浸一宿。頓服。取吐。愈。（千金方）

⑫治發狂欲走。瓜蒂末井水服一錢。取吐。即愈。（聖惠方）

⑬治大便秘不通。瓜蒂七枚。研末。綿裹塞入下部。即通。（必效方）

⑭治鼻中瘰肉。陳瓜蒂末。吹之日三次。瘰乃已。又方。瓜蒂末。白礬末。各半錢。綿裹塞之。或以猪脂和梃子塞之。日一換。又方。香甜瓜蒂二枚。雄黃。麝香。半分。爲末。先抓破後貼之。日三次。（聖惠方）

⑮又用瓜蒂十四枚。丁香一枚。黍米四十九粒。研末。口中含水。嚥鼻。取下。乃止。（湯液方）

十一畫 甜

狸首。羊鹽蜜筒之稱。以色得名。則有烏瓜白圓黃瓜白瓜。小青大斑之別。然其味不出乎甘香而已。廣

志惟以遼東燉煌廬江之瓜爲勝。然瓜州之大瓜。陽城之御瓜。西蜀之溫瓜。永嘉之寒瓜。未可以優劣

論也。甘肅甜瓜。皮瀉皆甘。勝糖蜜。其皮暴甘猶美。浙中一種陰瓜。種

於陰處。熟則色黃如金。膚皮稍厚。藏之至春。食之如新。此皆種藝之

【甜瓜子仁】

製法 雷斅曰。凡收得曝乾。杵

細。馬尾篩過。成粉。以紙三重裹。壓去油用。不去油。其力短也。西瓜

子仁同。

性質 甘寒。無毒。

主治 腹內納聚。破潰膿血。最

爲腸胃脾內壅要藥。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器

本草拾遺論甜瓜子仁。止月經

太過。研末。去油水調服。【唐】孟詵

食療本草論甜瓜子仁。炒食補

中宜人。【明】李時珍本草綱目論

甜瓜子仁。清肺潤腸。和中止渴。

主治 心痛欬逆。

【甜瓜花】

【甜瓜蒂】 ①卽瓜蒂之處。方用名。

詳『瓜蒂』條。②卽瓜蒂之原名。詳

『瓜蒂』條。

【甜瓜蒂】 原名 瓜蒂。本品係甜瓜

之蒂。故名。

古籍別名 瓜丁。千金。苦丁

香。象形。瓜蒂。和漢藥考。基本 屬葫蘆科。甜瓜未熟之

蒂。產地 陳仁山藥物生產辨云。

甜瓜蒂產山東登州府蓬萊縣。八

月新。形態 甜瓜爲栽植園圃之一

年生蔓草。莖有長粗毛。以卷纏纏

繞他物而成。長。葉作心臟圓形。有

淺掌狀分裂。葉柄頗長。花爲單性

爲黃色。合瓣花冠。深作五裂。雌花

未熟瓜之蒂。

採取 六七月間採其青瓜蒂。

陰乾用。

製法 雷斅曰。凡使勿用白瓜

蒂。要取青綠色瓜。氣足時。其蒂自

然落在蔓上。採得繫屋東有風處。

吹乾用。寇宗奭曰。此甜瓜蒂也。去

瓜皮用蒂約半寸許。曝極乾。臨時

研用。李時珍曰。按唐孫云。甜瓜蒂

以團而短。瓜團瓜者良。若香甜瓜

及長如瓠子者。皆供菜之瓜。其蒂

不可用也。

性質 苦寒。無毒。

成分 日本醫學博士猪子吉

人氏。對於其有效成分。名之爲甜

瓜毒素 (Telofoxin)。其後醫學

博士高橋順太郎氏。繼續研究。證

明所謂甜瓜毒素者。實與瑪瑪琪

加 (Momordica) 果實中所含

愛拉鐵林 (Elaeagnol) 爲同一物云。

(見東京醫事新誌

第八百五十七號)

效能 吐熱痰治風癰。用作催

吐藥。

主治 大水面四肢浮腫。下

水殺蟲毒。欬逆上氣。及食諸異病

在胸腹中。皆吐下之。本經去鼻

中瘰肉。療黃疸 (別錄)

張仲景之發明 瓜蒂一味。經

張仲景之實驗。認爲主治胸中有

毒。欲吐而不吐。茲考徵如下。瓜蒂

散證曰。胸中痞硬。氣上冲咽喉。不

得息者。又曰。必中滿而煩。饑而不

能食者。病在胸中。上方用瓜蒂一

分。

歷代記述攷證 【宋】大明諸

家本草論瓜蒂曰。治胸寒熱。嘔

昏吐痰。【元】王好古湯液本草論

瓜蒂曰。得勝香細辛。治鼻不聞香

至治 身熱目赤。以水浸冷熨之。

【琉璃草】 產地 出廣東始興縣玲瓏岩。

形態 琉璃草爲雜草類之一種。莖如芹梗。可供藥用。

主治 風疾。功類風藥。

【瓠瓜】 卽瓠蘆之實。首尾如一者。詳【瓠蘆】條。

【瓠蒂】 卽瓠蘆之別名。詳【胡蘆】條。

【甜勾根】 卽覆盆根之古籍別名。典見綱目。詳【覆盆根】條。

【甜瓜】 命名 本品味甜於諸瓜故名。

古籍別名 甘瓜。(唐本)果瓜。(綱目)眞桑瓜。(日本)

外國名詞 Cucumis Melo, 丁(拉丁)マクハワリ(日本)

基本 係葫蘆科胡瓜屬爲甜瓜之瓜類。

產地 原產亞細亞及亞非利加之熱帶地方。現我國各省均有出。

形態 甜瓜爲果類之一種。蔓生本草。莖細長。有卷鬚纏繞他物。

之上。葉圓作心臟形。掌狀分裂。夏日開花。花單性。雌花與雄花同株。合瓣花冠。色黃。結實爲瓠果。至盛夏成熟。概呈橢圓形。長四寸許。色亦黃。有縱條紋。而無刺。味甘甜。



甜瓜

性質 甘。寒。滑。有小毒。
主治 止渴。除煩熱。利小便。通三焦。開壅塞。氣治口鼻瘡。

歷代記述攷證 【宋】寇宗奭本草衍義論甜瓜曰。暑月食之。永不中暑。【清】黃宮繡本草求真論甜瓜曰。甜瓜。暑月解止渴之品也。味甘性寒。有毒。凡人因於暑月內伏。症見膿血惡痢。痛不可忍。須以水浸甜瓜數枚。食之。卽愈。若瓜經日曝。其寒尤甚。故書有言。瓜寒於曝。油冷於煎。卽是此意。但此陽氣素盛。亦宜少食。若使脾胃素冷。服之。則有癰痢疳黃動氣反胃。陰下生癰生瘡。發熱作脹之變。須用鹽花少許。麝香與酒。則解脚氣癰瘕。

食之。患永不除。瓜蒂端主涌吐。但。有兩鼻兩蒂者。殺人。皮可取。收作藥。或蜜收。晒爲末。【清】王士雄隨息居飲食譜論甜瓜曰。甜瓜。甘寒。滌熱。利便。除煩。解渴。療飢。亦治暑痢。種類匪一。以清香甘脆者勝。多食。每患癰痢。凡虛寒多溼。便滑腹脹。脚氣及產後病後。皆忌之。其子亦可食。

參攷資料

①瓜性最寒。曝而食之。尤冷。故嵇聖臚云。瓜寒於曝。油冷於煎。此物性之異也。王薏洛都賦云。瓜則消暑。滌煩。解渴。療飢。又奇效良方云。昔有男子病膿血惡痢。痛不可忍。以水浸甜瓜。食數枚。卽愈。此亦消暑之驗也。(李時珍) ②多食發黃疸。令人虛羸。多忘。解藥力。病後食多。或反胃。脚氣人食之。患永不除也。(孫思邈) ③多食令人陰下溼痒。生瘡。動宿。令癰瘕。病破腹。發虛熱。令人慢慢氣弱。脚手無力。少食則可。龍魚河圖云。凡瓜有兩鼻兩蒂者。殺人。五月瓜沉水者。食之。得冷病。終身不瘥。九月破霜者。食之。冬病寒熱。與油餅同食。發病。多食瓜作脹者。食鹽

花卽化。(孟詵) ④張華博物志。言人以冷水漬至膝。可頓喉。瓜至數十枚。漬至項。其喉轉多。水皆作瓜氣。則水浸消瓜。亦物性也。瓜最忌麝香與酒。凡食瓜過多。但飲酒及水。服麝香丸。勝於食鹽漬水也。(李時珍) ⑤瓜字篆文。象瓜在鬚蔓間之形。甜瓜之味。甜於諸瓜。故獨得甘甜之稱。舊列菜部。誤矣。按王禎云。瓜類不同。其用有二。供果者爲果瓜。甜瓜西瓜是也。供菜者爲菜瓜。胡瓜越瓜是也。在水曰果。在地曰蔬。大曰瓜。小曰瓠。其肉曰瓠。其堆曰瓠。謂脫花處也。其蒂曰靈。謂繫蔓處也。禮記爲天子削瓜及瓜祭。皆指果瓜也。本草瓜蒂。亦此瓜之蒂也。(李時珍) ⑥甜瓜北土中州。種時甚多。二三月種下。延蔓而生。葉大數寸。五六月花開。黃色。六七月瓜熟。其類最繁。有圓有長。有尖有扁。大或徑尺。小或一拵。其稜或有或無。其色或青或綠。或黃斑。或斑或白。路黃路其。或白或紅。其子或黃或赤。或白或黑。按王禎農書云。瓜品甚多。不可枚舉。以狀得名。則有龍肝虎掌。兔頭

達山。犀有二角。以類上者爲勝。又有通天犀。角上有一白纒。直上至端。夜露不濡。入藥至神驗。或云此是水犀。角出水中。漢書所謂駭雞犀者。置米飼雞。皆驚駭不敢啄。置屋上。鳥雀不敢集。又有特犀。角甚長。文理似犀。不堪入藥。(陶弘景) 犀是雌犀。文理細膩。斑白分明。俗謂斑犀。犀用爲上。入藥不如雄犀。(蘇頌) 犀出西番。南番。滇南。交州諸處。有山犀。水犀。兕犀三種。又有毛犀。似之。山犀諸山林人多得之。水犀出入水中。最爲難得。並有二角。鼻角長而額角短。水犀皮有珠甲。而山犀無之。兕犀即犀之特者。亦曰沙犀。止有一角在頂。文理細膩。斑白分明。不可入藥。蓋牯角文大而特角文細也。洪武初。九真曾貢之。謂之獨角犀是矣。陳藏器謂犀無水陸。郭璣謂犀有三角。蘇頌謂毛犀爲牯犀。皆其訛傳。毛犀即牯牛也。犀角紋如魚子形。謂之粟紋。紋中有眼。謂之粟眼。黑中有黃花者爲正透。黃中有黑花者爲倒透。花中復有花者爲實透。並名通犀。乃上品也。花如椒豆斑者

次之。烏犀純黑。無花者爲下品。其通天夜視有光者。名夜明犀。故能通神開水。飛禽走獸見之皆驚。又山海經有白犀。白色。開元遺事有辟寒犀。其色如金。交趾所貢。冬月暖氣襲人。白孔六帖有辟暑犀。唐文宗得之。夏月能清暑氣。續表錄異有辟塵犀。爲簪梳帶勝。堅不近身。杜陽編有獨忿犀。云爲帶。令人獨去忿怒。此皆希世之珍。故附見之。(李時珍)

【犀角片】即犀角之處方用名。詳

【犀角】條。

【犀角尖】即犀角之處方用名。詳

【犀角】條。

【犀落】(別錄) 古籍別名 犀落。泥落。犀落爲雜草類之一種。

基本 犀落爲雜草類之一種。

可供藥用。

性質 甘。無毒。

主治 癰疾。

【犀鰓】即鰓鰓之原名。詳『鰓鰓』條。

【猛火油】即石腦油之古籍別名。典見康輿之昨夢錄。詳『石腦油』條。

【猪心花】即辛亥之古籍別名。典見和漢藥考。詳『辛亥』條。

【猪牙草】即蕭蕭之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蕭蕭』條。

【猪耳朶】即羊蹄之古籍別名。典見和漢藥考。詳『羊蹄』條。

【猪屎草】即夏枯草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『夏枯草』條。

【裸然】即果然之古籍別名。典見綱目。詳『果然』條。

【理石】命名。本品即石膏之順理而微硬有肌者故名。

古鑑別名 立制石。(本經)肌石。別錄。精理黃石。

外國名詞 Marmer

形態 理石爲石類之一種。即石灰岩之變性。有白色雜色兩種。白者爲火成石灰岩。由粒狀之結晶質。集合而成。可供造像碑坊。其雜色者。爲水成石灰岩。質極緻密。含鐵及黏土等不純物。有黑、黃、青諸彩色。具山川雲物之形狀。可供屏風及嵌桌椅窗壁。但有由人工造成者。其狀頗似其天然生成者。可供藥用。

性質 甘。寒。無毒。

主治 身熱。利胃。解煩。益精明目。破積聚。去三蟲。(本經)除瘧衛中去來大熱。結熱。解煩毒。止消渴及中風痿痺。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新修本草論理石曰。瀝酒服。療癰令入肥悅。

配合宜忌 惡麻黃。滑石爲之使。

【理文石】即蜜陀僧之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蜜陀僧』條。

【琉球石】即番磨之日本名。詳『番磨』條。

【琉球藍】即馬藍之古籍別名。典見和漢藥考。詳『馬藍』條。

【琉璃】即琉璃石之原名。詳『琉璃石』條。

【琉璃石】原名 琉璃。命名 本品漢書作流離。蓋謂其流光陸離也。故名。

古鑑別名 火齊。(綱目)

產地 出高麗諸地。

形態 琉璃石爲石類之一種。色白而堅。厚半寸許。可製爲燈罩。映光較明。採得可供藥用。

Thiomelchsaure之反應。確爲陽性。依此犀角之一種有效成分爲硫化乳酸 **Thiomelchsaure**。於此益可知矣。概括以上實驗之成績而得結論如左。(一)犀角對於由溫刺或由副腎素腦內注射所發之熱。不呈解熱作用。(二)犀角於正常之心臟。不呈作用。然對於能力減弱之心臟。有使心動強盛之效。(三)犀角對於或種毒物有解毒作用。(四)犀角浸出液靜脈內注射能使白血球減少。(五)犀角之加水分解產物中。證明有 **Tyrosin, Zysteinund Thiomelchsaure**等。(六)犀角之浸出之水蒸汽蒸餾液生理的作用。與硫化乳酸 (**Thiomelchsaure**) 之作用完全相同。依以上諸種實驗之成績。使吾人得知犀角之一有效成分。確爲硫化乳酸無疑。

配合應用 ①犀角、鬼臼、麝香、龍齒、茯神、蘇合香、沉香、天靈蓋、丹砂、雄黃、能辟鬼疰邪氣。

②治大人小兒風熱驚癇。用犀角、丹砂、琥珀、金箔、天竺、黃牛黃、麝香、羚羊角、真珠、麝香。

十一 犀

③治瘡瘡血熱。初見點。紅腫。壯熱。口渴。煩躁。狂語。犀角磨汁。同生地黃、紅花子、麥門冬、紫草、白芍藥、鼠黏子。多服。可保無虞。

④治吐血衄血。犀角磨汁。同鬱金、童便、生地黃、麥門冬、炙甘草、白芍藥、紫蘇子、剪草、丹參、白藥子。

⑤犀角地黃湯。治傷寒蓄血發黃。或熱盛吐血。

⑥入紫雪丸。治大人小兒。煩狂。溫疫。癰毒。邪魅。一切煩熱。爲病。

⑦入抱龍丸。治小兒。恍惚驚悸。痰涎壅塞。

⑧入至寶丹。治中風。不語。中惡氣絕。一切神魂恍惚。癲狂。擾亂等證。

⑨治中忤中惡鬼氣。其證或晝夜登廁。或出郊外。蹇然倒地。厥冷握拳。口鼻出清血。須臾不救。似乎尸厥。但腹不鳴。心腹暖耳。勿移動。令人圍繞。燒火打鼓。或燒蘇合香安息香。麝香之類。候醒。乃移動。用犀角五錢。麝香、硃砂各二錢五分。爲末。每水調二錢服。即效。(華陀方)

⑩治臥忽不寤。若以火照之。則

殺人。但睡其面。痛嚼其腫。及大趾甲際。即活。以犀角爲枕。即令不醒。

⑪治瘡瘡稠密。不拘大人小兒。生犀於漂器中。新汲水磨濃汁。冷飲服之。(錢氏小兒方)

⑫治消毒解熱。生犀角尖磨濃汁。煩飲之。(錢氏小兒方)

⑬治癰疽。尿瘡。狀如茱萸。中央白膿。惡寒壯熱。可磨犀角汁塗之。(千金方)

⑭治癰疽。拒毒。喜着十指。狀如代指。根深至肌。能壞筋骨。毒氣入臟。殺人。宜燒鐵烙之。或灸百壯。日飲犀角汁。取瘰。(千金方)

⑮治山嵐瘴氣。犀角磨水服之。良。(集簡方)

用量 三分至八分。

施用宜忌 凡非大熱及無溫毒者。與孕婦。禁用。惡雷丸。烏頭。烏喙。藜蘆。忌鹽。松脂。升麻。爲之使。

著名方劑 犀角地黃湯。治傷寒及溫病。應發汗而不汗。內蓄血者。及鼻血吐血。不盡。內餘瘀血。大便黑。面黃。消瘀血。(千金方) 犀角一兩。生地黃八兩。芍藥三兩。丹皮二兩。上四味。啖咀。以水九升。煮取

三分。分三服。

參攷資料 ①犀角犀之精靈所聚。足陽明藥也。胃爲水穀之海。飲食藥物。必先受之。故犀角能解一切諸毒。五臟六腑。皆稟氣於胃。風邪熱毒。必先干之。故犀角能療諸血及驚狂斑痘之證。抱朴子云。犀食百草之毒。及衆木之蠹。所以能解毒。凡蟲毒之癰。有飲食以此角攪之。有毒則生白沫。無毒則否。以之煮毒藥。則無復毒熱也。北戶錄云。凡中毒箭。以犀角刺瘡中立。愈由犀食百毒。棘刺也。昔溫嶠過武昌。牛渚磯下。多怪物。嶠然犀角照之。而水族見形。淮南子云。犀角置穴。狐不敢歸。則犀之精靈。辟邪不惑於此。益可見矣。(李時珍)

②犀角妊婦勿服。能消胎氣。(雷斅)

③犀字篆文。象形。其特名。兕。亦曰沙犀。爾雅翼云。兕與犀字音相近。猶殺之爲牝也。大抵犀兕是一物。古人多言兕。今人多言犀。北音多言兕。南音多言犀。爲不同耳。梵書謂犀曰竭伽。(李時珍)

④犀出永昌山谷。及益州。永昌即今滇南也。(別錄)

⑤今出武陵。交州。寧州。諸

清潔。喝必擇流水。先以右前足攪之。使沉澱之樹葉雜草。隨水流淨。至澄清見沙石才飲。故右前蹄較光赤為最佳。一蹄三個甲。中甲兜肚狀。外甲略成三角形。甲空之裂痕。蜂窠孔。略如角空一樣。故真蹄角是無物可以混充的。其清熱解毒。治失血發癰諸症。功用與角同。雖效力稍遜。但重用之仍較廉宜。故能暢銷於本地各市場。勢為剛犀之生殖。器短大似驢。副細長如牛。末端分叉。每具值百末。味鹹微甘。溫熱。善發汗。取三錢和生薑煎服。治傷寒感冒。初起惡寒症。有特效。惜常人無病理常識。遇伏暑溫熱。亦作服。服必淋汗。因之灼燥。津液增加。溫熱病至不起者甚多。尿青綠色。味極臭惡。治黃腫下消。小便渾濁症頗有效。純淨者難得。多是獵人割時注尿洗滌其尿胞而已。屎(肚草)有毒。能殺蟲。燃燒薰疥癬疾。煨研擦腫瘍。無名腫毒。其消腫解毒之功甚偉。血療跌打傷。沖溫酒服。其破瘀行血之效。勝山羊血。殺時收血入竹筒內。以草管貫其中。架炭火上。隨灸隨吹。乾結。

後劈竹成片。故有發酵樣的葱孔。齒與蹄甲。磨水服清涼。修治成膏。或以醋磨濃。搽熱毒瘡腫。腫瘍疼痛最有效。肥皮多。創入藥。一斤兌二元餘。為祛濕解毒之要劑。正剛皮一斤值二十元。余在生藥行時。殊罕見賣。特向巴貨商詢問。始知本品為服食上品。如燕窩魚翅。不常入煎劑也。舊以嶺表錄異所載犀之種類最多。但沈莽如劉恂。辨釋種類。都有五通五色花樣。在今日但覺光怪陸離。無從核對。惟通天犀一名。邇地亦有傳說。謂某地有火犀。一頭夜行森林中。火光照耀。如電。靈異通神。獵人伺捕。皆不能銃中。云李時珍云。犀出西南。番滇南交廣諸地。有山水兕三種。避水犀尤難得。地方繁盛。大野獸逐漸滅種。今世殆無避水犀。則上述兩種。在邇地亦已罕見。減少矣。抱朴子云。犀食百草之毒。故能解百毒。凡蟲毒之鄉。於飲食時以角攪之。有毒則生白沫。無毒則否。以之煮毒藥。則無復毒熱。羌海雜誌載皮厚無毛。鼻上生前後兩角。為退熱解毒之特效藥。自能解角脫。

角藏於巖穴中。獵人以其形之木角易之。則次年解角仍存原處。否則更易他處。不復再見矣。陶宏景云。入藥惟取雄犀生者為良。自脫者次之。苦角片及見成器物。已被煮爇。不堪用。李珣有云。當以薄紙裹於懷中。蒸燥。乘熱搗之。應手如粉云。此皆理想之言。一一試之。並未盡然。據獵人說。不曾捕獲無角或新生小角者。從可推知其角之牢固。沒有解換。縱有自脫之死角。亦非偶然所能拾得。故知市肆必無自脫之角。亦無已被煮之現成器。陶氏之言。無須顧慮。只要提防假角耳。在邇地一角值百元至千元。以此為實當交易。亦常發生假角騙案。但正角有直破痕者。最無價值。或竟無人承買。不知何故。俗稱破裂角是死運衰兆。殆因實無錢。故為是言耳。●袁淑範曰。今將依化學的試驗所得之成績。簡略陳之。則如左。一犀角五瓦之熱湯浸出液中。含有〇、〇二二五瓦之乾燥物質。二犀角一瓦中含有〇、〇〇三瓦之灰分。三犀角一瓦中有〇、〇五瓦。即含有五

%之硫黃。四犀角浸出液不呈任何 Alkaloid。反應五犀角之加水分解產物中。得證明約有2%之奇羅達(Tyrosin)及若干之硫化乳酸(Thiomilchsäure)奇士泰(Zystein)等。六犀角之水蒸汽蒸餾液中。含有與水性浸出液呈同樣硫黃臭之揮發成分。由是知犀角之有效成分。吾人不得不先注目於 Zystein 及 Thiomilchsäure。前者據懷氏(Buchstala)之法。以人類之頭髮。用化學的方法處理之。而得 Zystein 之結晶。後者又依雷鳴氏(Levin)之法。從製 Brenztraubensäure 着手。用人工的集成法。可得 Thiomilchsäure 之純品。然後再以之與犀角浸出液行比較的動物實驗。其結果可證明 Thiomilchsäure 稀薄溶液之作用。完全與犀角浸出液之作用相同。Thiomilchsäure 存在於角質之加水分解產物中。早經史氏(Satter)證明確定之事實。今又將犀角水蒸汽蒸餾液用依的兒(Aether)振盪之。再試驗其依的兒殘渣時。

約一百五十餘而已。此種皮角概由香港轉運至上海。犀之種類名釋不一。今分析之。犀較小於象。角生鼻端。其皮皺皺極厚。印度犀一角。非洲犀二角。縱列。前一後角質堅緻。可以製器。可以入藥。見辭源。犀（本經中）奇蹄動物。體較河馬爲重。四肢短。有三蹄。頭上有一角。或二角者。前角在鼻骨處。後角在頭骨。一角者只有前角。產亞非兩大洲。水陸均有之。見中國醫學大辭典。按辭源。醫典所附犀圖相同。均係一角位於鼻尖。端與耳對立。成三角柱形。即一角者只有前角是也。大概兩辭書係取材歐美動物學書。不知該圖採自何地。其兩耳長而聳。豎角甚細。長與耳埒。殊不類犀產的活犀。辭源復謂印度犀一角。其圖殆爲印度產。歟。遲與印度接壤所產亦只有一角（照角不算）。其角却生頭額正中。此距離幾百里。產物之異形。歟。抑辭書之訛誤耶。犀爲食草反芻獸。高如大水牛。體較大。尾短無拂毛。頭肥大。自肩至頭尖突如梭。全頸短硬。不善轉側。耳向兩旁

斜翹。頭尖眼細。角位於耳目之中央。照角生鼻骨端。爲硬革包軟骨質的隆凸形。老兕牯高寸許。如女乳峯。雌者較低平。正火犀則消滅無形。肢肥短。成圓筒狀。蹄擴展。辨其皮角分正副二種。價值相差甚鉅。正金鋼犀。眼晴黃赤。如瑪瑙色。俗稱火犀。皮突起顆粒狀。毛極疎。小生髮痕中。其皺裂成不規則之圓形紋。曰鳳梨皮（即婆羅蜜樣）。厚五六分。以至七八分。以年齡之老幼爲差別。其胎孕十二個月。壽命較長於象。前年每擔皮值千末。現市價報千五六。最近有售得二千餘末者。兕犀（商人簡作廬名。其皮角爲副莊）尾毛似牛。皮略有粗橫紋。或橫直交錯。粗裂如象皮。厚四五分。一擔值百五六末。正鋼角大十三四兩者。長僅五六寸。由角纖維組織而成。附著於頭皮。無角套。基部甚擴大。如竹筍形。層層粗糙。或顆粒如珠。釘蒂。角尖椎鈍。微呈彎斜。向前或向後無定。小角僅隆凸三四寸。如山峯。角基緣伸展四五分。插入皮裏。曰角盤。週圍皺裂成縐線紋。曰干支紋。內緣

壁有柚皮狀的細毛管粒。角空甚淺。反倒頭視之。恰成小髯樣樣的窟凹。底部是海棉狀鬆疏的枯骨孔。固著於頭額特形凸突之硬筋膜。爲血管神經所出入。兕副莊角較細長。外表平。端尖細。略彎曲。角盤無甚擴展。角空成半球圓。干支紋。毛管粒。比較皆糊塗。不能如正莊之顯著。刻下市價較前年漲三分之一。一劬莊。正角售九百末。副五六百末。十二兩以上作劬莊計。算小者較廉。舊說謂牝犀曰兕。無角。但究實牝牝皆有角。牝角恒較小耳。上述兩種皆有其雌雄。據獵人言。食謂犀之生殖力甚衰弱。自和中國交通以來。視爲山林間之活寶。百計謀殺之。故現時森林中之剛犀頗稀少。而山牛却很多。剛犀起羣。尋不遇雄性交媾時。即與山牛交而生變種的兕。雌兕與犀交生犀。與牛交生牛。雄者交犀交牛。皆生兕。變種從雌性化也。此說雖未有憑證。可以證實。我們也無比較真確的證據。可以駁他。只能說犀兕是同類異種。但觀察家作旁證。駱馬與鸚鵡能變種。人類亦

能變種。犀之形態似牛。通稱爲犀牛。特頭尾皮毛蹄角與牛異。兕之皮尾毛類牛。短椎角變爲較細長。而有彎曲。假定爲犀與牛交之變種。其推測却有相當之理由。可信（按商場別稱爲廬。副兕字是我僧加的。此種副莊犀。是否古人稱虎兕之兕。余不敢斷定）。獵人三五成組。帶米與火種入深山。隨地斫竹爲炊器。以藤蘿葉實爲加味。獵取禽獸佐餐。常生活於森林中。犀喜居山坡。扒土窟積水爲住所。常以泥漿塗其身。發見足跡。則隱伏其常行路旁。截橫身射擊之。中彈則一直前走。因其習性罕回頭。傷人可從尾後追趕無危險。垂死時即出尿。獵人備竹筒承之。並割取其珍貴部分。倘淺山距市場較近。及正剛犀則盡取其皮肉。尖噴弄宜。兩府常年獲二三十頭。全西勢當有百幾十頭。其皮角概運銷我國及日本。犀食草薺肉。卻細膩如雞。經過三日。尚未腐敗。可食。味亦甘美適口。除骨肉外。各部分大多收入藥。於治療上有特效者。如角皮齒蹄甲勢尿血等。犀粟性

十一畫 犀

潤者。錯屑入臼。杵細研末。或當面
 鐵粉。或取頂尖磨水取汁尤佳。再
 李珣有云。凡犀角鋸成。當以薄紙
 裹於懷中。蒸燥乘熱擣之。應手如
 粉。此法今人鮮知。故罕用耳。曹
 炳章曰。按嶺表錄異云。犀牛似牛
 形而豬頭。腳似象。蹄有三甲。首有
 兩角。一在額上為兜犀。一在鼻上
 較小為胡帽犀。鼻上者皆窘束而
 花點小。多有奇紋。牯犀亦有兩角
 皆謂毛犀。俱有粟紋。堪為腰帶。千
 里犀中或有通者。花點大小奇異
 固無常定。有編花路通。有頂花大
 而根花小者。謂之倒插通。此二種
 亦五色無常矣。若通處白黑分明
 花點差池。計價巨萬。希世之寶也。
 海島逸志云。犀牛大過於牛皮如
 蕩殼而紋大如錢。背皮如馬鞍以
 覆其項頭似鼠嘴似龜足。臃腫如
 象。好行荊棘中。喜食藤刺。頭一角
 在鼻梁。世所繪其角在額者非也。
 此余所目覩。其行林中。觸樹多折
 此頭一角。或即牯犀也。沈萍如云。
 犀角本草載出西番南番滇南交
 廣諸處。有山水兕三種。山犀易得
 水犀難見。並有兩角。鼻角長而額

角短。水犀皮有珠甲。山犀則無。兕
 即牯犀。止一角在頂。紋理細膩。斑
 白分明。不可合藥。蓋牯角紋大而
 犛角紋細也。其紋如魚子形。謂之
 粟紋。紋中有眼。謂之粟眼。黑中有
 黃花者為正透。黃中有黑花者為
 倒透。花中復有花者名重透。並名
 通犀。乃上品也。花如椒豆斑者次
 之。烏犀純黑。無花者為下品。其通
 天夜視有光者。名夜光犀。能通神
 又有角上有紋直上至端。夜露不
 濡者。名通天犀。羌海雜誌云。犀角
 皮厚而無毛。鼻上生前後兩角。後
 之所產祇有一角。為解熱之特效
 藥。且亦自能解角。角藏於巖穴中
 獵人以知其形。木角易之。則次年
 解角仍藏原處。否則更易他處。不
 復再見矣。今就市上所通行者。惟
 暹邏角為最佳。品其外有槽根盤
 內有峰窠形。中凸出如墩。兩畔陷
 紋粗。削片白多黑少。為上品。交趾
 產者外無槽。內無墩。紋較細者次
 之。又有一種天麻角。性硬。更次。雲
 南產者角尖長。其氣臭。最次。凡犀
 角為熱症中之退熱特效藥。關係
 人命生死。非尋常藥可比。必須採

辦的真暹邏角為要。須看色黑。劈
 開處直紋粗絲者為妙。尖上頭圓
 更佳。試法以真犀角置為酒器。則
 清香為異耳。沈萍如云。犀角以有
 花紋而粗者為貴。今市人多以雲
 貴山中野牛。野羊角偽之。其角黑
 而無花紋。且氣羶耳。此等偽角。害
 人生命不可不慎。
 近人學說 程登瀛曰。犀兕
 之遺產者。其形狀愚曾為文在叻
 坡醫藥月刊發表。並預備拍攝犀
 照。以證歷來角生鼻端說之訛誤。
 惟此項照片不易得。查辭典所收
 圖說。皆係角生鼻端。即洋人所畫
 之獵獸圖。亦係一角生於鼻尖。以
 是疑是各地產物。變形蓋暹地出
 產頗多。獵人每割頭角出市。場犀
 之形狀。固人人知曉也。茲特將暹
 產特徵及近日市價摘錄如下。犀
 之形態似水牛。而體較長大。頭尖
 眼細。頭肥短。不善轉側。腳成筒狀。
 三個蹄趾甚擴展。辨其皮角分正
 副二種。價值相差甚鉅。犀一角生
 頭額中。兕二角。縱列。長角在頭額
 中。短角在鼻端。形如枳壳。重兩許
 高不過一寸。亦稱角餅。蓋扁薄如

一二七八

餅。餌故也。犀角成斜圓錐體。角頭
 徑達四寸。重至二磅者。長僅六七
 寸。平常多隆凸如山峯。兕角長至
 尺許。微彎斜。又犀角表面灰黑而
 角質白。角盤部顆突粗糲。盤緣週
 圍有凹痕。稍腰底部有均勻小溝
 紋。自角壁外通入內。壁成凸凹紋。
 世稱干支紋。兕角。灰黑色。角盤部
 逐漸擴大。成平坡狀。無凹溝。表面
 粗裂如松皮狀。(與正犀之數十
 條角路成組。顆突者不同)犀角
 端鈍圓。角空淺。兕角端微尖。角空
 較深。角空底皆有峰窩孔。犀皮皺
 皺成不規則圓形。大半呈六角形。
 大如細錢。俗稱鳳梨皮。(即暹羅
 蜜皮樣)兕皮皺皺多直紋。亦有
 交錯成小井字形。部位犀毛生皺
 皺中。粗硬而疏短。尾短無拂毛。兕
 尾似牛尾。毛細密。犀腳趾甚擴展
 蹄甲面圓滿。兕趾不甚擴展。蹄甲
 面稍腰。近日兌價。犀角一斤莊
 每斤值七百餘銖。兕角值六百銖
 十二兩以上。作斤莊計算。小角較
 廉。在往時兕角常比犀便宜一半。
 嘗發見以小兕角刻造泥范。正犀
 之糾紛。犀皮每擔值二千銖。兕皮

膠質等。其有效成分爲硫化乳酸。效能。清心胃熱。療傷寒時疫。解溫毒。止吐衄。用作強壯解熱解毒諸藥。

作用 在胃不起作用。至腸略有激腸蠕動之效。入血中能使中樞神經興奮。心跳強盛。血壓增高。同時又能減少白血球。使體溫下降。

主治 百毒鬼疰。邪鬼瘴氣。殺鉤吻。鴆羽蛇毒。除邪不迷惑。驚寢久服輕身(本經)又治傷寒溫疫頭痛寒熱諸毒氣。令人駿健。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論犀角曰。辟中惡毒氣。鎮心神。解大熱。散風毒。治發背。癰疽。瘡腫。化膿作水。療時疾。熱如火。煩毒入心。狂言妄語。【唐】李珣海藥本草論犀角曰。主風毒攻心。耗熱。開赤痢。小兒豉豆。及風熱驚癇。【唐】孟詵食療本草論犀角曰。燒灰水服。治卒中惡。心痛。飲食中毒。藥毒。熱毒。筋骨中風。心風。煩悶。中風失音。皆瘥。以水磨服。治小兒驚熱。山犀水犀功用相同。【宋】日華

諸家本草論犀角曰。治心煩。止驚。鎮肝明目。安五臟。補虛勞。退熱消痰。解山瘴瘴毒。【明】李時珍本草綱目論犀角曰。磨汁治吐血衄血。下血。及傷寒。蓄血。發狂。譫語。發黃。發斑。痘瘡。稠密。內熱。黑陷。或不結痂。瀉肝涼心。清胃解毒。【清】黃宮繡本草求真論犀角曰。犀角苦鹹大寒。功治入胃清熱。及入心涼血。蓋胃爲水穀之海。無物不受。口鼻爲陽明之竅。凡毒邪必先由於口鼻而入。以及於陽明胃腑。犀角爲神靈之獸。食百草之毒。及衆木之棘。角尖精力盡聚。用此苦寒之性。使之崙入陽明。以清諸熱。百毒也。熱邪既去。心經自明。所以狂言妄語。熱毒癰腫。驚煩目赤。吐血衄血。蓄血時疫。斑黃。痘瘡。黑陷等症。無不由於入胃入心。散邪清熱。涼血解毒之功也。然痘瘡心火初用。不無冰伏之虞。後用不無引毒入心之患。故必慎用。始無礙耳。至於蟲毒之鄉。遇有飲食。以犀筋攪之。有毒則生白沫。無毒則無。若云可以發表取汗。則必毒熱閉表。合以升發等味同投。則見魄汗淋漓。若

微毒單用則不及矣。鑄成以熱掌摸之。香者眞。不香者假。成器多被蒸。煮無力。入湯劑磨汁。八九劑。剉細納懷中。待熱搗之立碎。【清】楊時泰本草述鈞元論犀角曰。犀茹百毒。食衆棘。凡毒入此獸之胃而悉化。其角屬陽性。走散。潔古謂爲陽中之陰。大抵入胃而效。心之用者。心爲火主。風逐火。焰火散而風自平。且肝脾之系俱連繫於心。是以風毒風熱。驚癇斑黃。過之而悉癰。至於瘡腫化膿。特療血分熱毒之餘事耳。【清】賈九如辨藥指南論犀角曰。犀角氣香。屬陽。主走散。性涼。屬陰。主湧泄。妙在陰陽並用。善清虛火上炎。致吐衄妄行。肺胃中蓄血凝滯。又取其味苦酸鹹。恰合心神之性。蓋心惡熱。以苦涼之心。苦緩以酸收之心。欲軟以鹹軟之。且清香透心。以此益心神。即能鎮肝氣。一切心經肝膽之熱。必不可缺。若小兒驚癇。疳熱。痘瘡。血熱。尤爲聖藥。

國外學說 日本古方藥品考曰。來自外國之犀角有數種。其角彎曲。黑色。有光澤。長七八寸至尺

許。根部扁闊。徑五六寸。皮極粗糙。色灰白。中心作深黑色者。名烏犀角。爲上品。其白色者爲下品。凡劈之縱理。撫之滑澤者眞。其高二三寸。色黑。形如盆山者。呼倍多利。亦堪用。其形似牛角。長一尺六七寸。根粗三四寸。不扁闊劈之縱理密者爲水犀。不眞。又和漢藥考曰。中國人以犀角製爲酒杯。花瓶等。視爲珍品。酒杯曰兕觥。酒中有如鴆毒。一入此杯。立即沸騰。泛溢。人知此酒有毒。得免於害。試之百不爽一。又犀皮異常堅厚。即鋼刀亦難割。制。銃丸亦不易貫。故印度及非洲土人均以其革製鎗柄。頗重視之。其肉味極美。印度人嗜食之。辨偽 犀角用黑兕角及水牛角。雖形相似。假造混售。鑑便之粉。或鋸便之屑。更難辨別。按李時珍云。犀出西番。南番。滇南。交趾等處。有山犀。水犀。二種。水犀出入水中。尤難得。陶宏景云。入藥惟取雄犀。生者爲佳。若犀片及見成器物。已被蒸煮。不堪用。寇宗奭云。鹿取茸。犀取其精銳之力。盡在是也。用者當選角質烏黑。肌皺折裂。光

十一畫 牽 犀

效驗 祛風溼。解熱毒。

參攷資料 犀皮多側入藥。一斤兌二元餘。爲祛溫解毒之要劑。正剛皮一斤值洋廿元。余在生藥行時。殊罕見賣。特向巴貨商詢問。始知本品爲服食上品。如燕窩魚翅然。不常入煎藥也。(程登瀛)

命名 犀字篆文象形。

犀角 本品即犀牛之角。
犀角方用名 犀角尖。犀角片。烏犀角。黑犀角。磨犀尖。

古籍別名 兕角(綱目)低密(番名)奴角。兕角。吡沙攀。(和漢藥考) 竭伽角(番書)斑角。(唐本草)

外國名詞 Rhinoceros-

horn (英)

基本 屬哺乳動物中之奇蹄類。爲犀之鼻角。

產地 陳仁山藥物生產辨云。犀角產安南金邊龍賴爲最好。近日少出。以暹羅爲上。但其庄頭略劣。反以石叻內半板嶼內半山打根等處莊頭略好。人多悅之。仰光亦有出次之。和漢藥考曰。產於中國暹羅安南蘇門答臘及非洲等處。

處。

形態 犀爲牛類。巨獸也。好棲息於池沼湖澤等陰溼之地。其出也。必數頭爲一羣。體亞於象。肥大而稍黑。皮膚幾於無毛。若裸體然。皮厚而堅。頸肩腰部諸肌極深之皺。鑿俾體之運動可以自如。其足三趾。末端有蹄。頭稍帶三角形。上唇突出下唇之外。無大齒。鼻上之皮膚變而爲尖銳上挺之物。或一或二。謂之犀角。然不如他獸之用以格鬪。僅恃以傷樹木。掘泥土。與投石而已。性愚鈍。然野而難馴。見人即奔竄。若追之過急。則亦反身抗拒。勢不可當。其聽覺嗅覺均極銳敏。惟目力多弱。常以木葉爲食。餌從前歐洲寒地。犀之孽生殊繁。今則已絕其種。僅亞非兩洲之熱帶地方。猶見有棲息者。在亞洲者爲印度犀。體長一丈二尺。高六七尺。鼻上有尖物一。故名一角犀。皮多皺裂。全身有粟瘤。具粟眼。因此所得犀角。又有粟紋角。粟眼角等別名。在非洲者。體長丈餘。高五尺許。鼻上之尖物有二。前一後。但較短。故名二角犀。皮膚之皺裂似

一二七六

甲。其性兇暴。甚於印度犀。其角爲角質狀之一種尖物。微彎曲。有剛毛。大抵牡者爲短。牝者爲長。最長者。可二三尺。尋常多七八寸。或尺許。底部闊五六寸。其色不一。或外面淡褐綠色。內作黃色。中央黑色。或爲黑白二種。或黑色相和。角尖爲勝。入藥以用黑色者爲佳品。故烏犀角之名最著。試以鋸縱解之。見爲粗糙之纖維狀。然稍滑澤。其性質與毛爪相同。

製法 蘇頌曰。凡使犀角。捕得殺死爲上。說角者次之。寇宗奭曰。應取茸。犀取其精銳之力。盡在是也。以西番生犀。麝爲佳。入湯散屑之。雷斅曰。凡使物用奴。犀病水犀。變于犀。無潤。犀惟取烏黑肌。皺折裂光潤者。錯屑入臼。杵細萬匝。乃用。李珣曰。凡犀角。鋸成。費以薄紙。裹於懷中。蒸燥。乘熱搗之。應手如粉。故歸田錄云。翡翠屑。金人麝粉犀。

用法 古法多剉末。或作片用。近則多磨服。

性質 苦。酸。寒。無毒。
成分 含碳酸石灰。磷酸石灰。

【犀牛皮】 基本 此是海犀。其皮可供藥用。
【牽枝牡丹】 即旋花之古籍別名。典見和漢藥考。詳「旋花」條。
主治 治風活血。最效。

華水和丸。綠豆丸。每服十二丸。蘿蔔子煎湯下。(聖濟總錄方)

●治小兒腹脹。水氣流腫。膀胱實熱。小便赤澀。牽牛生研一錢。青皮湯空心下一加木香減半丸服。

(鄭氏小兒方)

●治疳氣浮腫。常服自消。黑牽牛。白牽牛各半生半炒取末。陳皮。青皮等分。爲末。糊丸。綠豆丸。每服三歲兒服二十九丸。米湯下。(鄭氏小兒方)

●治疳氣耳聾。疳氣攻腎。耳聾陰腫。牽牛末一錢。猪腰子半個。去膜薄切。摻入內。加少鹽。溼紙包。煨空心食。(鄭氏小兒方)

●治小兒雀目。牽牛子末。每以一錢。用羊肝一片。同麪作角子。二個。炙熱。食米飲下。(普濟方)

●治風熱赤眼。白牽牛末。以葱白。煮研丸。綠豆大。每服五丸。葱湯下。服訖。睡半時。(衛生家寶方)

●治馬脾風病。小兒急驚。肺脹喘滿。胸高氣急。脇縮鼻張。悶亂。欬嗽。煩渴。痰潮。聲啞。俗名馬脾風。不急治。死在旦夕。用白牽牛半生半炒。黑牽牛半生半炒。大黃煨。檳榔

各取末一錢。每用五分。蜜湯調下。痰盛加輕粉一錢。名牛黃奪命散。(全幼心鑑方)

●治小兒夜啼。黑牽牛末一錢。水調。傳臍上。即止。(生生編方)

●治臨月滑胎。牽牛子一兩。赤土少許。研末。覺胎轉痛時。白榆皮煎湯下一錢。(王袁博濟方)

●治小便血淋。牽牛子二兩。半生半炒。爲末。每服二錢。薑湯下。良久熱茶服之。(經驗方)

●治腸風瀉血。牽牛五兩。牙皂三兩。水浸三日。去皂。以酒一升。煮乾。焙研末。蜜丸。梧子大。每服七丸。空心酒下。日三服。下出黃物。不妨病減。後日服五丸。米飲下。(本事方)

●治痔漏有蟲。黑白牽牛各一兩。炒爲末。以猪肉四兩。切碎。炒熟。蘸末。食盡。以白米飯三匙。壓之。取下白蟲爲效。又方。白牽牛頭末四兩。沒藥一錢。爲細末。欲服藥時。先

日勿夜飲。次早空心。將猪肉四兩。炙切片。蘸末。細細嚼食。取下膿血爲效。量入加減。用忌酒色油膩三日。(儒門事親方)

●治漏瀉水溢。乃腎虛也。牽牛末二錢。牛入切。開猪腎中。竹葉包定。煨熟。空心食。溫酒送下。借腎入腎。一經一橫。兩得其便。惡水既泄。不復淋瀝。(直指方)

●治一切癰疽發背。無名腫毒。年少氣壯者。用黑白牽牛各一合。布包。搗碎。以好醋一盞。熬至八分。露一夜。次日五更溫服。以大便出膿血爲妙。名濟世散。(張三丰仙方)

●治淫熱頭痛。黑牽牛七粒。砂仁一粒。研末。并華水調汁。仰灌鼻中。待涎出即愈。(聖濟總錄方)

●治氣滯腰痛。牽牛不拘多少。以新瓦燒赤。安於上。自然一半生一半熟。不得攪動。取末一兩。入硫黃末二錢。牛同研。勻分作三分。每

分用白麵三匙。水和。捍開。切作菴子。五更初。以水一盞。煮熟。連湯溫下。痛即已。未住。隔日再作。予嘗有此疾。每發。一服痛即止。(本事方)

用薑 八分至錢半

施用宜忌 凡氣虛及溼熱在血分者禁用
著名方劑 舟車神佑丸 治水

腫水脹形氣俱實者(河間方) 黑牽牛四兩。大黃二兩。酒浸。甘遂一兩。麪裹煨。橘紅。大戟。麪裹煨。芫花。醋炒。青皮。炒各一兩。木香五錢。板榔五錢。輕粉一錢。上爲末。水丸。每服五分。五更滾水下。大便利三次爲度。最虛實用之。並忌鹽醬百日。

參攷資料 ●牽牛以氣藥引則入氣。以黃引則入血。利大腸下水。積色白者。瀉氣分。溼熱上攻喘滿。破血中之氣。(王好古)

●牽牛治水氣在脾。喘滿腫脹。下焦鬱遏。腰背脹重。及大腸風。秘氣。祕卓有殊功。但病在血分。及胃脾虛弱而瘡滿者。則不可取快一時。及常服暗傷元氣也。一宗室大人。年幾六十。平生苦腸結。旬日一行。甚

於生產。服養血潤燥藥。則泥膈不快。服消黃通利藥。則若罔知。如此三十餘年矣。時珍診其人。體肥膏

梁而多鬱。日吐酸痰。碗許乃寬。又多火病。此乃三焦之氣壅滯。有升無降。津液皆化爲痰飲。不能下

滋腸肺。非血燥比也。潤燥留滯。消黃徒入血分。不能通氣。俱爲痰阻。

十一畫 牽

卽在此。古方中凡用末子。均稱止用頭末。正以其皮黏韌。不易細碎。祇用頭末。則棄其皮。而可無字蠟之毒。頗有意味。可思。觀別錄主治。專破氣分之壅滯。泄水滯之腫滿。除風利便。固皆以實病言之。此藥功用。固已包舉無遺。甄權中之。則曰治痿痺氣塊。利大小便。東垣謂除氣分滯熱。三焦壅結。瀨湖謂逐痰飲。通大腸氣。祇風祇殺蟲。亦皆主結滯壅塞各論。而甄權乃又謂除虛腫。則誤矣。日華本草謂治腰痛。蓋亦指溼熱阻塞。腰脊不利之症。惟言之殊不分明。究屬非是。

配合應用 ①黑牽牛得白木香。檳榔。使君子。能追蟲取積。

②牛耶丸。治氣築奔衝不可忍。用黑牽牛半兩。檳榔二錢半。爲末。每服一錢。紫蘇湯下。追蟲取積亦可用。(普濟方)

③治面上風刺。黑牽牛酒浸三宿。爲末。先以薑汁擦面。後用藥塗之。(摘玄方)

④治面上粉刺。漏子如米粉。黑牽牛末。對入面粉藥中。日日洗之。(聖惠方)

⑤搜風通滯。風氣所攻。臟腑積滯。用牽牛子以童尿浸一宿。長流水上洗半日。生絹袋盛。掛風處。令乾。每日鹽湯下三十粒。極能搜風。亦消虛腫。久服令人體清瘦。(斗門方)

⑥利膈丸。治三焦壅塞。胸膈不快。頭昏目眩。涕唾痰涎。精神不爽。用牽牛子四兩。半生半炒。不蛀皂莢。酥炙二兩。爲末。生薑自然汁。煮糊丸。梧子大。每服二十九。荊芥湯下。(王褒博濟方)

⑦治一切積氣。宿食不消。黑牽牛頭四兩。爲末。用蘿蔔剉空。安末蓋定。紙封。蒸熟。取出。入白荳蔻末一錢。搗丸。梧子大。每服一二十丸。白湯下。名順氣丸。(普濟方)

⑧治男婦五積。五般積氣成聚。用黑牽牛一斤。生搗末。八兩餘。滓以新瓦炒香。再搗取四兩。煉蜜丸。梧子大。至重者三十五丸。陳橘皮生薑煎湯。臥時服。半夜未動。再服三十丸。當下積聚之物。尋常行氣。每服十九甚妙。(博濟方)

⑨治胸膈食積。牽牛末一兩。巴豆霜三個。研末。水丸。梧子大。每服

二三十丸。食後隨所傷湯下。(儒門事親方)

⑩治腎氣作痛。黑白牽牛等分。炒爲末。每服三錢。用猪腰子切縫。入茴香百粒。川椒五十粒。搽牽牛末入內。扎定。紙包。煨熟。空心食之。酒下。取出。惡物效。(直指方)

⑪治傷寒結胸。心腹硬痛。用牽牛頭末一錢。白糖化湯調下。(鄭氏家藏方)

⑫治大便不通。用牽牛子半生半熟。爲末。每服二錢。薑湯下。未通再以茶服。一方加大黃等分。一方加生檳榔等分。(簡要方)

⑬治大腸風。祕結。瀉牽牛子微炒。搗頭末一兩。桃仁去皮尖。熬炒半兩。爲末。熱蜜丸。梧子大。每湯服三十丸。(衍義方)

⑭治水蠱脹滿。白牽牛。黑牽牛各取頭末二錢。大麴麥四兩。和作燒餅。臥時焙熟。食之。以茶下。降氣爲驗。(宣明方)

⑮治諸水飲病。張子和云。病水之人。如長川泛溢。非盂杓可取。必以神禹決水之法治之。故名禹功散。用黑牽牛頭末四兩。茴香一兩。

一二七四

炒爲末。每服一二錢。以生薑自然汁調下。當轉下氣也。(儒門事親方)

⑯治陰水陽水。黑牽牛頭末三兩。大黃末三兩。陳米飯。餵糕一兩。爲末。糊丸。梧子大。每服五十丸。薑湯下。欲利服百丸。(醫方捷徑方)

⑰治水腫尿瀦。牽牛末。每服方寸匕。以小便利爲度。(千金方)

⑱治溼氣中滿。足腫微腫。小便不利。氣急欬嗽。用黑牽牛末一兩。厚朴製半兩。爲末。每服二錢。薑湯下。或臨時水丸。每薑湯下三十丸。(普濟方)

⑲治水氣浮腫。氣促。坐臥不得。用牽牛子二兩。微炒。搗末。以烏牛尿浸一宿。平旦入葱白一握。煎十餘沸。空心分二服。水從小便中出。(聖惠方)

⑳治風毒脚氣。捻之沒指者。牽牛子搗末。蜜丸。小豆大。每服七丸。生薑湯下。取小便利乃止。亦可吞之。其子黑色。正如棗核小核。(肘後方)

㉑治小兒腫病。大小便不利。黑牽牛。白牽牛各二兩。性取頭末。并

腸。利小便。通大腸。消水腫。逐痰飲。除氣分濕熱。疏三焦壅結。牽牛主脾家水氣。喘滿腫脹。下焦鬱遏。腰背脹重。及大腸風秘。氣祕。卓有殊功。但病在血分。及脾虛痞滿者。不可服也。碾取頭末。去皮麩用。亦有半生半熟用者。皮能滯氣。勿得誤用。【清】黃宮繡本草求真論牽牛子曰。牽牛有白有黑。白者其性入肺。崙於上焦氣分。除其濕熱。故氣逆壅滯。及大腸風秘者。得此以治。黑者其性兼入右腎。能於下焦通其遏鬱。故腫滿脚氣。及大小便祕。俱得以治。但下焦血分溼熱。溼自下受。宜用苦寒以折牽牛氣味。辛辣久嚼。雄烈服之最能泄肺。若以下焦血病而於氣分有損之藥。以爲投治。是以血病瀉氣。不使氣血俱損乎。惟是水氣在肺。喘滿腫脹等症。暫用以爲開泄。俾氣自上達下。而使二便頓開。以快一時。若果下焦虛腫。還當佐以沉香補骨脂等味。以爲調補。俾補瀉兼施。而無偏敗損泄之害矣。取子淘去浮者。春去皮。得木香乾薑良。【清】陳修園本草經讀論牽牛子曰。牽牛子

大毒大破之藥。不堪以療內病。惟楊梅瘡或毒發周身。或結於一處。甚則陰氣刺。鼻柱壞。顛潰不合。其病多從陰氣而入。亦必使之從陰器而出也。法用牽牛研取頭末。以土茯苓自然汁泛丸。又以燒礬散爲衣。每服一錢。生槐藍四錢。以土茯苓湯送下。一日三服。服半月效。【清】楊時泰本草述鈞元論牽牛子曰。牽牛子感熱火之化所生。稟性雄烈。色黑者。先甘後苦。甘少苦多。其力速。色白者。先甘後辛。甘少辛多。其效遲。二者均瀉氣分之溼。故下水積類用之。夫溼屬血病。又有所謂氣分之溼者。此卽血中之氣也。人身元氣不能化溼。積久而蘊隆之氣。滯着填壅。以致喘滿腫脹。或鬱遏下焦。二便不得施化。斯時將從血治乎。將必於血中之氣而實之用。此爲斬關奪門之將。乃有入處而獵。以其泄元氣。遂束手待斃可乎。如邪不至於蘊隆。患不極於填壅。則正氣未併於溼邪。但處其弱而已。弱而投之。能復有存者。寡矣。故臨證投劑。惟審溼邪之盛否。以爲用舍耳。凡人三焦氣壅。

有升無降。津液皆化爲痰飲。不能下滋腸腑。而病腸結。服硝黃徒入血分。必若罔聞。更有必用大黃之證。無牽牛則竟不能入胃口以下者。可知此味爲血中開導之先驅。卽漫然謂其泄氣不可也。大抵牽牛屬陽中之陰。稟性辛烈。故多就陰溼之氣以爲開。非治熱也不論寒溼。溼熱。但其壅結處。卽其奏功處。若寒溼溼熱之痰。上壅下祕。尤其的對。如下焦病於氣壅而實。以致脹痛者。用此能達命門。走精隧。以此病亦本於溼所化也。惟水氣爲患。正當益脾健運。以資氣化。焉用此不能化氣而徒泄氣之味。以致氣化愈窮哉。

國外學說 日本學說謂牽牛子者「アサガホ」之種子。自昔知有下泄之效。故極著名。其用量爲一、二至四、〇。平野一貫氏分析檢得「コンウオルヅリン」猪子氏亦得此成績。故牽牛子之有效分。不外「コンウオルヅリン」。然近時猪子氏供治療用之製劑。非此「コンウオルヅリン」而爲氏所謂牽牛子華爾斯。以其

製法甚簡易。而效用頗確實故也。猪子氏於數多患便秘者。投與此劑。頗得良效。用法大約以〇、五至〇、七爲丸。一回內服之。服後經數時。發下痢。其際雖有腹痛。然通常不劇。牽牛子華爾斯之製法。以牽牛子加亞爾爾個保爾。蒸餾或蒸散後。於殘渣內加溫蒸餾水。頻頻洗滌。至水無色爲度。終以全量於水浴上屢次攪拌之。使乾燥爲度。英美學說謂牽牛子又名二丑。產中國各處。有黑白二種。黑者於野處滋生。尤爲繁多。至白者則多有人種植之。然此輩雖分黑白二種。如用爲藥品。其功力無稍異。

近人學說 張山雷曰。牽牛子善泄溼熱。通利水道。亦走大便。故別錄謂其苦寒。至李氏東垣。以其兼有辛黃氣味。遂謂是辛熱雄烈。壽頤按此物甚滑。通泄是其專長。試細嚼之。惟其皮稍有辛味。古今主治。皆用之於溼熱氣滯。實腫脹滿。二便不通。則東垣以爲辛熱。張石頑和之。亦謂辛溫。皆屬不確。當以別錄之苦寒爲正。又黃氣戟人喉舌。細味之。亦在皮中。所謂有毒蓋

十一畫 清 淺 牽 牽

【日本】

基本 係清風藤科清風藤屬。爲清風藤之莖。

產地 生山野間。浙江天台山有出。

形態 清風藤爲蔓草類之纏繞灌木。嫩莖綠色。葉卵形。尖端草質。滑澤深綠色。秋季脫落。葉柄仍留。爲針狀。三月間花生葉腋。花五瓣。黃色。結實球形。熟則呈深碧色。其莖可供藥用。



清風藤

主治 風痰。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論清風藤曰。治風溼流注。歷節鶴膝。痲痺痿痺。損傷瘡腫。入酒藥中用。

【清涼種】即香薷之古籍別名。與

見和漢藥考。詳「香薷」條。

【清油】即胡麻油之古籍別名。與

見和漢藥考。詳「胡麻油」條。

【淺瓜】即越瓜之日本名。詳「越

瓜」條。

【牽牛】即牛之牝者。見「牛」條。

【牽牛酥】基本 係取香椎動物反芻類。牽牛之乳汁。製煉爲酥。

性質 甘微寒。無毒。

效能 和氣活血。通腸利水。潤肌膚。澤毛髮。

主治 心熱肺痿。胸中客熱。渴

嗽。吐血虛勞。急痛瘰癧口瘡及諸瘡毒。

【牽牛子】命名 本品始出田

野人牽牛謝藥。故以名之。後人隲其爲黑丑白丑者。蓋

丑屬牛也。

處方用名 丑牛。黑丑。白丑。白

牽牛。

古籍別名 益額草。天茄。(綱

目)狗耳草。(救荒)草金鈴。(炮炙)假君子。三白草。(和漢藥考)

外國名詞 Pharbitis hederacea L. (拉丁)

基本 屬旋花科喇叭花牽牛

之種子。

產地 陳仁山藥物生產辨云。

牽牛子產陝西漢中府安徽亳州

縣。

形態 喇叭花爲一年生之纏繞草本。葉皆互生。每葉片各有三

裂。葉面微生細毛。夏日葉腋開合

瓣花。形如喇叭。頗大。朝開夕萎。故

又名朝顏花。果爲蒴果。形圓如球。

中分三室。室藏種子兩粒。此花有

紅。白。紫。藍。雜色等。而花與葉之形

狀。亦殊多變化。種子作三角形。外

面色黑褐。內面色白。



牽牛子

種類 凡開青藍色之花。則

子黑名黑丑。力速。凡開白色之

花。則子白。名白丑。力遲。

採取 八月與九月間採實晒

乾。

製法 雷斅曰。凡採得子晒乾。

水淘去浮者。再晒。并酒蒸。從已至

未。晒乾收之。隨用。晝去黑皮。李時

珍曰。今多只碾取頭末。去皮。蘇不

用。亦有半生半熟用者。

性質 苦寒。有毒。

一一七二

成分 含有主要的昆蘆胡林

(Convolutin C₂₁H₃₅O₁₀)與藥

刺巴根相同。

效能 清溼熱。利二便。用作和

緩下劑。爲便秘與腳氣藥。

主治 下氣。癰腳。滿水腫。除風

毒。利小便。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥

性本草論牽牛子曰。治痰癖氣塊。

利大小便。除虛腫。落胎。【唐】孟詵

食療本草論牽牛子曰。和山藥黃

服。去水病。【宋】大明日華諸家本

草論牽牛子曰。取腰痛。下冷膿。瀉

蟲毒藥。并一切氣壅滯。【元】李東

垣用藥法象論牽牛子曰。除氣分

溼熱。三焦壅結。【明】李時珍本草

綱目論牽牛子曰。逐痰消飲。通大

腸氣。祕風。祕殺蟲。達命門。【明】經

希雍本草經疏論牽牛子曰。牽牛

子本經不載。乃名醫續註。本草謂

爲苦寒有毒。其主下氣者。乃損削

真氣之謂也。痰癰滿水腫。除風毒

利小便。皆相似語。現前病多屬脾

施用宜忌 相火易動陽強易舉夢遺便赤口乾等症禁用。薯蕷紫芝爲之使得酒良。

參攷資料 ①淫羊藿後人因別錄羊食而淫之說遂改爲性熱助陽誤矣。夫羊性喜淫乃其天賦不食此藿也。即謂食之益淫故以命名。然人非羊也食之何必淫蓋體臟既殊不能以一例論也。余謂羊爲火畜藿裏水氣羊果食藿而益淫亦內經陰平陽秘之旨耳。

(王秉衡) ②豆葉曰藿此葉似之故亦名藿。仙靈脾千兩金放杖草則前皆言其功用也。鷄筋黃連祖皆因其根形也。柳子厚文作仙靈毗入譌曰毗此物補下於理尤通。(李時珍) ③淫羊藿江東陝西泰山漢中湖湘間皆有之莖如粟稈葉青如杏葉上有刺根紫色有鬚四月開白花亦有紫花者。碎小獨頭。五月採葉曬乾。湖湘出者葉如小豆枝莖緊細經冬不凋根如黃連。關中呼爲三枝九葉草苗高二二尺許根葉俱堪用。蜀本草言生處不聞水聲者良。(蘇頌) ④淫羊藿生大山中一根數莖莖粗如線。

十一畫 淫

淮 深 混 淫

高一二尺一莖三穗。一穗三葉。葉長二三寸。如杏葉及豆莢。面光背淡黃薄而細齒有微刺。李時珍。

【淫羊藿】即天門冬之古籍別名。典見嘉祐本草。詳「天門冬」條。

【淫小麥】即小麥之處方用名。詳「小麥」條。

【淮山】即山藥之處方用名。詳「山藥」條。

【淮山藥】即山藥之處方用名。詳「山藥」條。

【淮牛膝】即牛膝之處方用名。詳「牛膝」條。

【淮木】古籍別名。百歲城中木。(本經)城裏赤柱。(綱目)

基本 淮木爲維木類之一種。可供藥用。

產地 出山西平陽及河東諸地。或謂即古城中之木材。

性質 苦平無毒。

主治 主久欬上氣。傷中虛羸。寒赤柱。療婦人漏血。白沃陰蝕。淫痺邪氣。補中益氣。(別錄)

參攷資料 淮木煮湯服。主難

產。(杜正論)

【淮豆】即豌豆之古籍別名。典見綱目。詳「豌豆」條。

【淮東子】古籍別名。跳蝦蟲。跳蟲。(綱目拾遺)

產地 多生水旁溼土中。

形態 淮東子爲溼生蟲類。彈尾類昆蟲之一種。形如跳蚤而大逾倍。色如蝦灰黑色。有灰色斑紋。身有細毛。觸角粗短。分四節。頭側各有單眼八。腹部多足如蝦。尾部有附屬物如劍狀。善跳躍。可供藥用。

採取 以器置水中。候其跳入。則不能出而取之。

主治 療風痺。去溼腫。

參攷資料 淮東子秋時闢蟪蟬家多畜之。凡蛩過闢傷及虛羸。必每日以此飼之。云能益盡力也。其性最敏捷。能達透經絡。皮裏膜外。無不行到。(趙學敏)

【淮烏頭】即草烏頭之生於淮城者。詳「草烏頭」條。

【淮鹽】即戎鹽之古籍別名。典見藥物生產辨。詳「戎鹽」條。

【深深奶】即大生地之古籍別名。

典見和漢藥考。詳「大生地」條。

【深黃】即鬱金之古籍別名。典見和漢藥考。詳「鬱金」條。

【混元母】即人胞之古籍別名。典見本草蒙筌。詳「人胞」條。

【混池】即雞卵殼之名。詳「雞卵」條。

【混沌衣】即人胞之古籍別名。典見綱目。詳「人胞」條。

【混沌池】即雞抱出卵殼之別名。典見綱目拾遺。詳「雞抱出卵殼」條。

【混沌蟬蛻】即桑寄生之古籍別名。典見和漢藥考。詳「桑寄生」條。

【清水豆卷】即大豆卷之處方用名。詳「大豆卷」條。

【清阿膠】即阿膠之處方用名。詳「阿膠」條。

【清炙草】即甘草之處方用名。詳「甘草」條。

【清炙者】即黃耆清炙者之處方用名。詳「黃耆」條。

【清風藤】古籍別名。青藤。尋風藤。(綱目)

外國名詞 Sanchi japonica, Maxim. (拉丁)アラカヅラ

陽無子。女人絕陰無子。老人昏耄。中年健忘。一切冷風勞氣。筋骨攣急。四肢不仁。補腰膝。強心力。【明】李時珍本草綱目論淫羊藿曰。淫羊藿味甘氣香。性溫不寒。能益精氣。乃手足陽明三焦命門藥也。真陽不足者宜之。【明】繆希雍本草經疏論淫羊藿曰。淫羊藿味辛甘。其氣溫而無毒。本經言寒者誤也。入手厥陰。爲補命門之要藥。亦入足少陰厥陰。可升可降。陽也。辛以潤腎。甘溫益陽氣。故主陰痿絕陽。益氣力。強志。莖中痛者。肝腎虛也。補益二經。痛自止矣。膀胱者。州都之官。津液藏焉。氣化則能出矣。辛以潤其燥。甘溫益陽氣。以助其化。故利小便也。肝主筋。腎主骨。益腎肝則筋骨自堅矣。辛能散結。甘能緩中。溫能通氣。行血。故主癰癰赤癰。及下部有瘡。洗出蟲。丈夫久服。令人無子者。因陽旺則陽道數舉。頻御女而精耗散。故無子也。一名仙靈脾。柳文作毗。毗者人躋也。躋爲命。故主入命門。修事如雷公法。【明】李士材本草圖解論淫羊藿曰。淫羊藿辛溫無毒。主陰痿絕

陽。莖中痛。利小便。益氣力。強志。堅筋骨。消癰癰赤癰。下部有瘡。洗出蟲。虛陽易舉。夢遺不止。便赤口乾。強陽不痿。并忌之。【清】黃宮繡本草求真論淫羊藿曰。淫羊藿辛香甘溫。諸書皆載能治男子絕陽不興。女子絕陰不產。且能治冷風勞氣。四肢麻木不仁。腰膝無力。蓋因氣味甘溫。則能補火助陽。兼有辛香。則冷可除而風可散耳。且云久服無子。恐陽旺多慾。精氣耗散。無他故也。去枝。羊脂并炒。

近人學說 張山雷曰。淫羊藿稟性辛溫。專壯腎陽。故主陰痿。曰絕傷者。即陽事之絕傷也。莖中痛。亦腎臟之虛寒。利小便者。指老人及虛寒人之陽事不振。小便滴瀝者言之。得其補助。腎陽而小便自利。非溼熱蘊結。水道赤澀者可比。讀書慎弗誤會。益氣力。強志。堅筋骨。皆元陽振作之功。然虛寒者固其所宜。而陰精不充。眞陽不固者。萬不可爲擾固之助長者也。消癰癰赤癰。蓋亦因其溫通氣血。故能消化凝結。然癰瘍之病。由於陰血不肝。陽燔灼。而煎熬津液。凝結

痰濁者爲多。幸勿誤讀古書。反以助其烈燄。陷人於炮烙之酷刑。洗下部之瘡。則辛燥能除溼熱。亦猶蛇牀子之洗瘡殺蟲耳。又曰。日華主丈夫絕陽。女子絕陰。一切冷風勞氣。筋骨攣結。四肢不仁。補腰膝。則辛溫之品。固不獨益腎壯陽。并能通行經絡。祛除風寒溼痺。但日華又謂治老人昏耄。中年健忘。則未免譽之太過。而景岳且謂男子陽衰。女子陰衰之難於子嗣者。皆宜服之。則偏信溫補。其弊滋多。更非中正之道矣。石頑謂一味仙靈脾酒。爲偏風不遂要藥。頗按不遂之病有二。一爲氣血俱虛。不能榮養經絡。或風寒溼邪痺着之病。古之所謂痺症是也。其來也緩。一爲氣血上沖。擾亂腦神經而忽失其運動之病。今之所謂中風。西醫之所謂腦經病是也。其病也暴。仙靈脾酒止可以治風寒溼痺之不遂。并不能治氣血兩虛之不遂。而血冲腦經之不遂。更萬萬不可誤用。

配合應用 ①淫羊藿。陽草也。甘溫益陽。氣辛則走而能補。宜與白茯苓。甘枸杞。肉蓯蓉。五味子。牛膝。山茱萸同用。爲補陽之妙劑。

②漬醇酒飲。益丈夫。興陽道。理腰膝。冷亦治偏風不遂。大約每薑一斤。漬酒十斤。如常法。勿令過醉。修事時忌雞犬婦人見。

③治三焦欬嗽。腹滿不飲食。氣不順。淫羊藿五味子等分爲末。煉蜜丸。如梧子大。每三十九丸。薑茶湯下。

④治目昏生翳。用仙靈脾。生王瓜。即小栝樓紅色者。等分爲末。每服一錢。茶下。日三服。〔聖濟總錄方〕

⑤治病後發育盲目。日近者可治。仙靈脾一兩。淡豆豉一百粒。水一碗。牛煎一碗。頓服即愈。〔百一選方〕

⑥治小兒雀盲。仙靈脾。晚蠶蛾各半兩。炙甘草。射干。各二錢。牛爲末。羊肝一枚。切開。搗藥末二錢。紫定。以黑豆一合。米泔一盞。同煮。熟分二次食。以汁送之。〔普濟方〕

⑦治痘疹入目。用仙靈脾。威靈仙等分爲末。每服五分。米湯下。用量 一錢至三錢。

漿外黑色。背面有白褐色斑紋。殼內真珠色。肉體有前肉柱。小後肉柱大。腳長有溝。多具筋肉。腳之根部有分泌黏液之腺。黏液由腳溝流下。凝爲絲狀物。即爲足絲。爲固着於外物之用。殼長二寸。高四寸。其肉紅紫色。味佳。可供食與藥用。

性質 甘溫無毒。

主治 虛勞傷風。精血衰少。及吐血。久痢。腸鳴。腰痛。疝瘕。婦人帶下。產後痼瘕。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論淡菜曰。產後血結。腹內冷痛。治瘕瘕。潤毛髮。治腸中帶下。燒食一頓。令飽。【宋】日華諸家本草論淡菜曰。煮熟食之。能補五臟。益陽事。理腰腳氣。能消宿食。除腹中冷氣。疝瘕。亦可燒汁。沸出食之。

【明】李時珍本草綱目論淡菜曰。消癭氣。

參攷資料 ●淡菜常時燒食。即苦不宜人。與少米先煮。熱後除去毛。再入蘿蔔。或紫蘇。或冬瓜同煮。即更妙。【孟詵】●淡菜生海藻上。故治瘕與海藻同功。【李時珍】●淡菜不宜多食。多食令人頭目

闕。開得微利。即止。【日華】●淡菜多食。發丹石。令人腸結。久食。脫人髮。【陳藏器】

【淡黃牛】即黃牛之處方用名。詳

【黃牛】條。

【淡銀】即蜜陀僧之古籍別名。典

見藥物生產辨。詳【蜜陀僧】條。

【淡從替】即肉從替之處方用名。

詳【肉從替】條。

【淡龍甲】即龍甲之處方用名。詳

【龍甲】條。

【淨毛燕】即燕窩之處方用名。詳

【燕窩】條。

【淨牛膽汁】即牛膽之處方用名。

詳【牛膽】條。

【淨皮硝】即朴硝之古籍別名。典

見和漢藥考。詳【朴硝】條。

【淨粉】即番薯粉之依法製成者。

詳【甘藷】條。

【淨柴胡】即柴胡之處方用名。詳

【柴胡】條。

【淨骨皮】即地骨皮之處方用名。

詳【地骨皮】條。

【淨連翹】即連翹之處方用名。詳

【連翹】條。

【淨黃連】即黃連之古籍別名。典

見和漢藥考。詳【黃連】條。

【淨銀花】即金銀花之處方用名。

詳【金銀花】條。

【淨蓮鬚】即蓮鬚之處方用名。詳

【蓮鬚】條。

【淨雙鉤】即鉤藤之處方用名。詳

【鉤藤】條。

【淫羊藿】命名 西川北部有

淫羊。一日百遍合。盡

食此藿所致。故名。

古籍別名 剛前。【本經】仙靈

脾。【唐本】三枝九葉草。【圖經】放

杖草。葉杖草。千兩金。乾鷄筋。黃連

祖。【日華】仙靈吐。【柳子厚文】葉

枝草。黃德祖。藥師。葶草。【和

漢藥考】

外國名詞

Barren wort

基本

係小藥科葶草

(Epi-

medium macranthum, Morr.

et Deane) 之葉。

產地 蘇頌圖經本草云。淫羊

藿。江東。陝西。泰山。漢中。湖湘。間皆

有之。陳仁山藥物生產辨云。產廣

東北。江連州屬。

形態 淫羊藿一名葶草。爲宿

根草。自舊根叢生。數細莖。春日生葉。及穗。高一二尺。一柄有三枝。九葉。葉爲卵圓形。大二三寸。類杏葉。邊緣有細鋸齒。夏月莖上開。或白。或黃白。或淡紅。或淡紫色之四瓣花。倒垂。其狀如葶。故名葶草。



淫羊藿

採取 每年五月間採根莖陰乾。

製法 雷斅曰。凡使用淫羊藿。

(時呼靈仙脾)以夾刀夾去葉四

畔花枝。每一筋用羊脂四兩拌炒。

待脂盡爲度。

性質 辛寒。無毒。

效能 補命門。興陽事。治陰痿。

強腰膝。專作強壯藥。

主治 陰痿。絕傷。莖中痛。利小

便。益氣力。強志。【本經】堅筋骨。消

癰。癰赤。癰下部有瘡。洗出蟲。丈夫

久服。令人有子。【別錄】

歷代記述攷證 【宋】大明日

華諸家本草論淫羊藿曰。丈夫經

●治小兒胎毒。淡鼓煎濃汁與三五口。其毒自下又能助脾氣消乳食。(聖惠方)

●治小兒嘔乳。用鹹鼓七箇。去皮。膩粉一錢。同研丸黍米大。每服三五丸。薑香湯下。(全幼心鑑方)

●治小兒丹毒。作瘡出水。鼓炒爛盡。爲末。油調傳之。(姚和衆方)

●治小兒頭瘡。以黃泥裹。煨熟取研。以葶菜油調傳之。(勝金方)

●治發背癰腫。已潰未潰。用香鼓三升。入少水。搗成泥。罨腫處。大小作餅。厚三分。瘡有孔。勿覆孔上。鋪鼓餅。以艾列於上。灸之。但使溫溫。勿令破肉。如熱痛。卽急易之。患當減快。一日二次。灸之。如先有孔。以汁出爲妙。(千金方)

●治一切惡瘡。熬鼓爲末。傳之。不過三四次。(產乳方)

●治陰莖生瘡痛爛者。以鼓一分。蚯蚓溼泥二分。水研和塗上。乾卽易之。禁熱食酒蒜芥菜。(藥性論方)

●治蠅螬尿瘡。件鼓傳之甚良。(千金方)

●治蟲刺螫人。鼓心嚼敷。少頃

見鼓中有毛卽瘡。若不見。再傳。晝夜勿絕。見毛爲度。(外臺祕要方)

●治蹠跌破傷筋骨。用鼓三升。水三升。漬濃汁飲之。止心悶。(千金方)

●治蹠傷瘀聚。腹中悶滿。鼓一升。水三升。煮三沸。分服。不瘥再作。(千金方)

●解蜀椒毒。鼓汁飲之。(千金方)

●治中牛馬毒。鼓汁和人乳類服之。效。(衛生易簡方)

●小蝦蟆有毒。食之令人小便祕澀。臍下悶痛。有至死者。以生鼓一合。投新汲水半碗。浸濃汁。頓飲之。卽愈。(郭奉客語方)

●治中酒成病。鼓煮白各半升。水二升。煎一升。頓服。(千金方)

●治服藥過劑。悶亂者。鼓汁飲之。(千金方)

●治雜物眯目不出。用鼓三七枚。浸水洗目。視之。卽出。(聖濟總錄方)

●治刺在肉中。嚼鼓塗之。(千金方)

●治腫從腳起。鼓汁飲之。以滓

傳之。(肘後方)

用量 三錢至四錢。

施用宜忌 無外感風寒者禁用。

參攷資料 ①古今方書用鼓治病最多。江南人善作鼓。凡得時氣。卽先用葱鼓湯服之。取汗。往往便瘥也。(蘇頌) ②蒲州鼓味鹹。作法與諸鼓不同。其味烈。陝州有鼓汁。經十年不敗。入藥並不如今之鼓。心爲其無鹽故也。(陳藏器) ③陝府鼓汁。甚勝常鼓。其法以大豆爲黃。蒸每一斗加鹽四升。椒四兩。春三日。夏二日。卽成。牛熟加生薑五兩。既潔淨且精也。(孟詵) ④鼓諸大豆皆可爲之。以黑豆者入藥有淡鼓鹹鼓。治病多用淡鼓。汁及鹹者當隨方法。其鼓心乃合鼓時取其中心者。非剥皮取心也。此說見外臺祕要(李時珍)

【淡芭菰】卽烟草之別名。典見植物學大辭典。詳「烟草」條。

【淡吳萸】卽吳茱萸之處方用名。詳「吳茱萸」條。

【淡昆布】卽昆布之處方用名。詳「昆布」條。

【淡秋石】卽秋石之處方用名。詳「秋石」條。

【淡秋冰】卽秋石之處方用名。詳「秋石」條。

【淡海藻】卽海藻之處方用名。詳「海藻」條。

【淡乾薑】卽乾薑之處方用名。詳「乾薑」條。

【淡菜】 命名 本品曬乾時。不加鹽卽可食。故名。

古籍別名 殼菜。本草綱目。海蛸。東海夫人。(綱目)貽貝。(動物學大辭典)

外國名詞 Mytilus Classa. testa liacche Musci Miesmuschel (拉丁)イガイ或イノカヒ或シウリ或セトガヒ(日本)

基本 係軟體動物瓣鰓類無管類異柱類殼菜科爲殼菜之肉。

產地 生海水中。

形態 淡菜爲介類之一種。其殼呈三角形。稍膨大。表皮厚。有輪層。殼頂之銜合部。外面有韌帶。自殼頂延及後方。內面有齒。左殼有主齒一。右殼有主齒二。側齒頗小。

主齒一。右殼有主齒二。側齒頗小。

功。今既製入麻黃。則必有不可同
年而語者。

配合應用

●治傷寒發汗。云

傷寒有數種。庸人卒不能分別者。
今取一藥兼療之。凡初覺頭痛身
熱。脈洪一二日。便以葱鼓湯治之。
用葱白一虎口。鼓一升。綿裹水三
升。煮一升。頓服取汗。更作加葛根
三兩。再不汗。加麻黃三兩。又法。用
葱湯煮米粥。入鹽鼓食之。取汗。又
法。用鼓一升。小男溺三升。煎一升。
分服取汗。(肘後方)

治傷寒不解

已三四日。胸中
悶。惡者。用鼓一升。鹽一合。水四升。
煮取一升半。分服取吐。此祕方也。
(梅師方)

辟除溫疫

鼓和白朮。浸酒常
服之。(梅師方)

治傷寒懷懷

吐下後。心中懷
懷。天下後身熱不去。心中痛者。並
用梔子鼓湯吐之。肥梔子十四枚。
水二盞。煮一盞。入鼓半兩。同煮至
七分。去滓服。得吐止後服。(傷寒
論方)

●治傷寒餘毒。傷寒後毒氣攻
手足及身體虛腫。用鼓五合。微炒。

以酒一升半。同煎五七沸。任性飲
之。簡要濟衆方)

●治傷寒目翳。燒鼓二七枚。研
末吹之。(肘後方)

●治傷寒暴痢。以鼓一升。蘆白
一握。水三升。煮蘆熟。納鼓更煮。色
黑。去鼓。分爲二服。(藥性方)

●治血痢不止。用鼓。大蒜等分。
杵丸。梧子大。每服三十丸。鹽湯下。
(王氏博濟方)

●治血痢如刺。以鼓一升。水漬
相淹。煎兩沸。絞汁。頓服。不瘥。再作
(藥性方)

●治赤白重下。葛氏用豆鼓熬
小焦。搗服一合。日三。或炒焦。以水
浸汁服。亦驗。外臺用鼓。心炒。爲末。
一升。分四服。酒下。入口卽斷也。

●治臟毒下血。烏犀散。用淡鼓
十文。大蒜二枚。煨同搗丸。梧子大。
煎香。菜湯服。二十九日。二服。安乃
止。永絕根本。無所忌。(究原方)

●治小便血條。淡豆鼓一握。煎
湯。空腹飲。或入酒服。(危氏得效
方)

●治瘧疾寒熱。煮鼓湯飲數升。
得大吐卽愈。(肘後方)

●治小兒寒熱。惡氣中人。以溼
鼓研丸。鷄子大。以摩臍上。及手足
心。六七遍。又摩心臍上。旋旋呪之。
上破鼓丸。看有細毛。囊道中。卽便
瘥也。(食醫心鏡方)

●治盜汗不止。以鼓一升。微炒
香。酒漬三升。漬三日。取汁。冷。暖任
服。不瘥。更作三兩劑。卽止。(孟詵
方)

●治胸喘痰積。凡天雨便發。坐
臥不得。飲食不進。乃肺竅久積冷
痰。遇陰氣觸動。則發也。用此。一服
卽愈。服至七八次。卽出惡痰。數升。
藥性亦隨而出。卽斷根矣。用江西
淡豆鼓一兩。蒸搗如泥。入砒霜末
一錢。枯白礬三錢。丸綠豆大。每用
冷茶冷水送下。七丸。甚者九丸。小
兒五丸。卽高枕仰臥。忌食熱物等
皆效。

●治風毒膝臂。骨節痛。用鼓三
五升。九蒸九暴。以酒一斗。浸經宿。
空心隨性溫飲。(食醫心鏡方)

●治手足不隨。破鼓三升。水九升。
煮三分。分三服。又法。鼓一升。微熬。
囊貯。漬三升酒中。三宿。溫服。常令
微醉爲佳。(肘後方)

●治頭風疼痛。鼓湯洗頭。避風
取瘥。(孫真人方)

●治卒不得語。煮鼓汁。加入美
酒服之。(肘後方)

●治喉痺不語。煮鼓汁一升。服。
覆令取汗。仍着桂末於舌下。嚥之。
(千金方)

●治咽生瘻肉。鹽鼓和搗塗之。
先刺破出血。乃用神效。(聖濟總
錄方)

●治口舌生瘡。胸膈疼痛者。用
焦鼓末。含一宿。卽瘥。(聖惠方)

●治舌上血出。如針孔者。用鼓
三升。水三升。煮沸。服一升。日三服。
(葛氏方)

●治墮胎血下。煩滿。用鼓一升。
水三升。煮三分。調鹿角末方寸匕。
(子母祕錄方)

●治妊娠動胎。鼓汁服。(子母
祕錄方)

●治婦人難產。乃兒枕破。與敗
血裏其子也。以勝金散逐其敗血。
卽順矣。用鹽鼓一兩。以蕉青布裹
了。燒赤。乳細入。麝香一錢。爲末。取
秤錘燒紅。洋酒調服一大盞。(郭
稽中方)

甘草、童子小便。張文仲療虛損慘頓不食、四體勞強、時翕翕熱、無氣力、作骨蒸、方用豆豉、梔子、杏仁、童子小便、服後四體益熱、即服豆豉、葱白、生薑、生地、黃連、童子小便、仍不離陽明葱鼓法。刪繁療膽腑實熱、精神不守、渴熱、梔子煎方用豆豉、梔子、甘竹、茹、大青、橘皮、赤蜜、千金療心實熱、或欲吐不出、悶喘急、頭痛、瀉心湯方用豆豉、梔子、小麥、石膏、地骨皮、茯苓、淡竹葉、仍不離太陽陽明梔鼓法。信然。以是類推。則刪繁之以理中、茯苓湯治脈實熱、極血氣傷心、使心好生、赫怒口爲變、赤舌語不快、消熱止血氣、調脈以鼈甲湯治勞熱、四肢腫急、少腹滿痛、顏色黑黃、關格不通者、並用豆豉甚者、千金以豆豉、地黃、二味、搗散酒服。治虛勞冷骨節痛、無力。崔氏枸杞酒、取豆豉以枸杞湯淋、秋麻子粉、麥汁、取半浸麴、取半浸米、和地黃、蒸飯、釀成酒、治五內邪氣、消渴、風溼、下胸脇間氣、頭痛、堅筋、骨強、陰利、大小腸、填骨、髓、長肌、肉、破除結氣、五勞七傷、去胃中宿食、利耳目、鼻衄吐血、內溼風注、補

中逐水、破積、療臌、惡血、石淋、長髮、傷寒、瘧氣、煩躁、滿悶、虛勞、喘吸、逐熱、破血、及腳氣、腫、亦、梧、別、錄、虛勞、喘吸、兩腳、疼、冷、之、旨、矣、【清】閻立、陸、本、草、選、旨、論、香、鼓、曰、淡、豆、豉、味、苦、氣、寒、陰、中、之、陰、無、毒、原、夫、黑、豆、性、平、作、鼓、則、溫、既、經、蒸、審、又、能、升、能、降、本、草、主、治、傷、風、頭、痛、寒、熱、瘴、氣、惡、毒、煩、躁、滿、悶、虛、勞、呼、吸、兩、腳、疼、冷、殺、六、畜、胎、子、諸、毒、故、時、珍、以、之、下、氣、調、中、治、傷、寒、溫、毒、發、斑、瘧、之、症、今、人、佐、以、葱、白、散、寒、熱、頭、痛、助、以、梔、子、除、虛、煩、懊、懣、醇、酒、浸、嘗、治、足、冷、痛、甚、薤、白、煮、服、止、血、痢、多、疼、而、且、佐、鹽、使、之、能、吐、佐、蒜、使、之、止、血、炒、熱、使、之、止、汗、江、南、人、凡、得、時、氣、既、先、用、葱、豆、湯、取、汗、往、往、便、老、皆、竊、取、於、李、氏、之、意、而、推、廣、之、也、若、其、未、經、造、鼓、則、又、有、異、焉、夫、豆、有、五、色、各、治、五、臟、惟、黑、豆、屬、水、性、寒、爲、腎、之、穀、入、腎、居、多、且、走、血、分、而、壯、氣、充、元、與、青、白、豆、動、氣、之、物、不、同、故、以、逐、水、脹、消、腫、除、風、熱、下、結、氣、散、瘀、血、所、謂、同、氣、相、求、昔、陶、華、嘗、以、黑、豆、入、鹽、煮、食、云、能、補、腎、蓋、豆、乃、腎、之、穀、其、形、類、腎、

黑色通腎。又引之以鹽。所以妙也。若其生用。生毒之人。食生豈而不職。服毒之人。食豆查而自吐。此爲解毒之物。又曰豆腐。可以發毒。何也。蓋生毒之人。以實脾爲要。豆腐凡瀉肝之物。恐脾處有傷元氣。而瘡毒難收。故爾云然。豆腐乾之實脾而健胃。因其豆之熟也。豆腐漿之止嗽而治喘。因其豆之液也。豆腐皮之實脾虛。豆腐焦之開胃氣。因解表故而又熟則補也。又曰炒食。則熱。煮食。則寒。牛食之。溫。馬食之。涼。一體之中。功效各殊。

近人學說

張山雷曰。大豆本是堅實補腎之品。惟用以製鼓。則

是堅實補腎之品。惟用以製鼓。則暑而發酵。變堅實而爲空鬆。當其暑時。外必生霉。豆中質液。確已外散。故有表散外邪之性情。葛洪肘後方。葱鼓湯。謂傷寒有數種。此所謂傷寒有數種。蓋即離經所謂傷寒有五之例。凡春溫夏熱。溼溫冬溫等候。古人俱以傷寒二字總稱之。庸人卒不能分別者。今取一藥兼療之。此所謂一藥言一方也。即葱鼓湯。藥止葱白豆豉二物。洵不誣也。但古之豆豉。當汗解肌。散膚表之熱。止取其蒸騰質鬆。輕而能散。而今之江浙市肆中。又以麻黃湯浸過。則發汗之力。乃陡加倍。蓋謂在壬寅秋。仲偶感新涼。微寒發熱。病本不重。惟時雖已習醫。不敢自信。乃延同邑之世醫某君。定方用淡豆豉三錢。初服一二劑。無甚變動。迨服至三劑。則烘熱蒸汗。出如浴。歷三日後。不論瘧疾。淋漓不息。幾致神志迷惑。如在霧中。初時舌有白膩之苦。而大汗之後。頓至光紅如鏡。嗣即繼以大劑清養益津。而一臥三月。久不恢復。當時亦歸咎於醫之冒昧。謂陰液素薄之體。不當運用發散之藥。實則此藥中雖有麻黃。分甚少。何致還有此變。此必市肆中之製法。不善。誤用過量之麻黃所致。然亦可知今之豆豉。已非古書中之豆豉。所可等量齊觀者已。古法仲景梔子豉湯。治吐下後心中懊懣。及大下後身熱不去。心中痛。皆取其質之輕鬆。能宣通胸中鬱窒之義。今則藥質已異。性情不侔。恐亦無此效用。又古以治血痢。刺痛赤白後重。亦皆以宣通結塞爲

得蘇則止血。炒熟又能止汗。是以邪在上。而見煩躁。頭痛滿悶。懊憹不眠。發斑嘔逆者。合於梔子。則能引邪上吐。使不致陷入。而成內結之症也。然必江有製者。方堪入藥。〔清〕鄒澍本經疏證論香薷曰。張隱庵謂豆爲腎穀。色黑性沈。暑熱而成。輕浮主啓陰臟之精上資。故其治煩躁滿悶也。非特由於傷寒頭痛寒熱者可用。卽由於瘴氣惡毒者亦可用也。蓋煩者陽盛躁者陰逆。陽盛而不得下交。陰逆而不能上濟。是以神不安於內。形不安於外。最是仲景形容之妙。曰反覆顛倒。心中懊憹。惟其反覆顛倒。心中懊憹。正可以見上以熱盛不受陰之滋下。因陰逆不受陽之降。治之以不他藥。止以豆豉梔子成湯。以梔子能泄熱下行。卽可知豆豉能散陰上逆矣。曰仲景用豆豉多於汗吐下後何也。曰豆豉之功在除煩躁滿悶。煩躁滿悶非汗吐下後不多見也。雖然汗吐下後兼煩躁兼滿悶者不少矣。於何定其爲梔鼓湯證。夫汗後有亡陽證。則煩躁而不滿悶。有內熱證。有內實證。

則煩而不躁。下後有結胸證。有痞證。則滿悶而不煩躁。吐後有煩滿而無躁。蓋煩躁則非實。滿悶則非虛。惟其虛實之間。斯爲變越洩降所宜用。於此猶不可定豆豉爲開發上焦鬱抑宣導陰濁返遘耶。然則萬雅川取蔥鼓湯治傷寒初起非歟。夫雅川固言之矣。曰凡初覺頭痛身熱脈洪。一二日便以蔥鼓湯治之。則其爲熱邪非寒邪。在陽明不在太陽明甚。何則。寒邪應羅風惡寒。此但言身熱。寒邪當脈數脈緊。此則言脈洪。證之以仲景所謂傷寒三日。陽明脈大者。詎非若合符節。且梔子與葱白一係洩熱一係通陽。洩熱者經通陽者衛。經則能通上下之道。此所以宜於汗吐下後。表邪已減之時。衛則能達外內之情。此所以宜於病初起卒難辨識之際。是在先於後關梔子葱白不關豆豉。又可明矣。曰梔子煎湯證亦未見必有滿悶也。此則論中所載多矣。曰胸中窒。曰心中結痛。非滿悶之謂耶。特按之心下濡。句切宜著眼。究恐煩滿爲實熱證也。若論煩躁則在陰者多。在陽

者少。如少陰有吐利躁煩四逆者。有自利躁煩不得臥者。有吐利手足逆冷煩躁欲死者。厥陰有熱少厥微指頭寒。默默不欲食煩躁者。有脈微手足厥冷煩躁者。皆以有脈微四逆而無滿悶。知其非陽經證。不得治以豆豉矣。然陽經之煩躁。陰經之煩躁。其因究有別也。應如何而審之。夫煩未有非陽盛者。躁無有非陰逆者。特陽經之煩躁。是陰陽相搏。陰經之煩躁。是陰陽相逐。相搏者其力足相敵。而兩不相下。相逐則陽既敗北。陰復迫之。也是故陽經之煩躁。雖輕揚之豆豉散其陰逆有餘。陰經之煩躁。卽沉重之薑附輔其陽弱不足也。雖然豆豉味苦氣寒。本屬陰。以之治陰逆。則寒因熱用。熱因寒用。非歟。夫氣寒氣涼。治以寒涼。行水漬之。此五常政大論文也。注家謂熱湯浸漬。則寒涼之物能治寒涼。試檢傷寒論諸用豆豉湯。皆不以生水煮其者。枳實梔子豉湯。先空煮枳實水。更入枳實梔子。再下豉。僅須五六沸。卽已成湯。如金匱要略梔子大黃湯。以治陽而非治陰。遂入

藥不分先後。是其秉經訓。何如嚴耶。又如瓜蒂散證。在太陽曰胸有寒。在少陰曰手足寒。脈弦遲。在厥陰曰手足厥冷。脈緊。更明明爲寒。非如諸梔子豉湯證之並未言寒也。而瓜蒂苦寒。豆豉又苦寒。亦以熱湯下。散煮汁。和瓜蒂赤小豆末服。正與以寒治寒之旨相符。其證爲邪與痰飲因陰陽相搏而結於胸中。斷可識矣。於此見陰經之所在。卽陽氣之所阻。驅散其陰翳。陽氣自伸。此豆豉之功。陽氣既伸。其實者隨引而越之。使不經無病之所。虛者隨卽抑而下之。使不傷未敗之氣。此瓜蒂與梔子之力。夫故曰胸中實。曰虛煩。而用豆豉可並行不肯也。說者謂仲景之六經。是區分地面。所該者廣。雖以脈爲經紀。凡風寒溼熱內傷外感。自表及裏。寒熱虛實。無乎不包。素問皮部論曰。皮有分部。脈有經紀。其生病各異。別其部分。左右上下。陰陽所在。諸經始終。此其立說之源也。觀於廣濟療骨蒸肺氣。每至日晚。卽惡寒壯熱。顏色微赤。不能下食。日漸羸瘦。方用豆豉葱白生地黃。

【附子】條。

【淡豆豉】 命名 豉者嗜也。功
能調和五味。可甘嗜
也故名。

【方用名】 製豆豉。炒香豉。香

豆豉。 古籍別名 大豆豉（別錄）

【基本】 係黑大豆製成之淡味

【產地】 陶弘景曰。豉出襄陽錢

唐者香美而濃入藥取中心者佳

【形體】 豉色褐而灰質柔輾而

潤其味淡。顆粒則較生豆為小而

【製法】 造淡豉法。用黑大豆

二三斗。六月內淘淨。水浸一宿。瀝

乾。蒸熟。取出攤席上候微溫。蒿覆

每三日一看。候黃衣上遍。不可太

過。取曬乾淨。以水拌乾溼得所。以

寢絲半斤。椒。椒。茴。杏仁并勻入

鹽。上面水浸過一寸。以箬蓋封口

曬一月乃成也。造豉汁法。十月

至正月。用好豉三斗。清麻油熬令

烟斷。以一升拌豉蒸過。攤冷。曬乾

并再蒸。凡三遍。以白鹽一斗。搗和

以湯淋汁。三四斗入淨釜。下椒薑

葱橘絲同煎。三分減一。貯於不津

器中。香美絕勝。也有蘇豉。瓜豉。醬

豉。諸品皆可為之。但充食品。不入

藥用也。

【性質】 苦寒。無毒。

【效能】 解肌表。除煩熱。有發汗

作用。用於感冒及急性傳染病。斑

疹未透而惡寒者。又本品能刺激

胃之知覺神經。間接反射於延髓

之嘔吐中樞。而引起嘔吐。為催吐

藥。須用大量。凡胃不消化。異物積

滯食道內。或病後胃之機能薄弱

以致積滯而引起苦悶欲吐者。均

宜之。並能吐去痰涎及黏液。故兼

有祛痰作用。

【主治】 傷寒頭痛。寒熱。瘴氣。惡

毒。煩躁滿悶。虛勞喘咳。兩腳疼冷

殺六畜胎子諸毒。

【藥量】 香豉一味。經

張仲景之實驗。認為「主治心中

張仲景之實驗。認為「主治心中

懷懷也。旁治心中結痛。及心中滿

而煩也。」茲考徵如下：「枳實梔

子湯。證不具也。（枳實梔子湯

湯條。無心中懷懷證。為則按梔子

大黃豉湯。此枳實梔子湯。而加

大黃者。而其條有心中懷懷之證。

則枳實梔子湯。其脫心中懷

懷之證也。明矣。）「梔子大黃豉

湯。證曰。心中懷懷。（以上二方。香

豉皆一升。）「梔子豉湯。證曰。心

中懷懷。又曰。胸中窒。又曰。心中結

痛。」「梔子甘草豉湯。證不具也。」「

梔子生薑豉湯。證不具也。」「梔子

入腹爲病。成癥瘕者。

歷代記述攷證。【明】李時珍

本草綱目論梳篋曰。主小便淋瀝。

乳汁不通。霍亂轉筋。噎塞。

【硃砂】即石鹼之古籍別名。典見

醫科書。詳「石鹼」條。

【欵冬葉】即欵冬花之古籍別名。

典見和漢藥考。詳「欵冬花」條。

【欵渾】即欵冬花之古籍別名。典

見郭璞賦。詳「欵冬花」條。

【發菜】即淡菜之古籍別名。典見

綱目。詳「淡菜」條。

【液石】即滑石之古籍別名。典見

別錄。詳「滑石」條。

【涼木】即松楊之古籍別名。典見

綱目拾遺。詳「松楊」條。

【涼粉草】即仙人凍之古籍別名。

典見綱目拾遺。詳「仙人凍」條。

【涼織遮金珠】即紫金牛之西俗

名。詳「紫金牛」條。

【浙二泔】即粳米泔水之原名。詳

「粳米泔水」條。

【淘河】即鵜鶘之別名。典見動物

學大辭典。詳「鵜鶘」條。

【淘鷄】即鵜鶘之古籍別名。典見

綱目。詳「鵜鶘」條。

【淡子荖】即黃荖之處方用名。詳

「黃荖」條。

【淡天冬】即天門冬之處方用名。

詳「天門冬」條。

【淡竹花】即小青草之古籍別名。

典見綱目拾遺。詳「小青草」條。

【淡竹茹】即竹茹之原名。詳「竹

茹」條。

【淡竹殼】原名 淡竹籜。

嫩時所苞之籜殼。故名。

主治 去目翳。功同熊膽。拭淨

毛。燒存性。同麝香搗細點之。

原名 鴨跖草。

【淡竹葉】命名 本品莖葉似

竹。故名。

古籍別名 鴨跖草。嘉祐。根

名碎骨子。水竹。時珍。

外國名詞 Lophatherum gra-

cile, Brongn. var. elatum,

Hack.

基本 屬禾本科淡竹 (Loph-

atherum elatum, Zoll.) 之葉。

產地 凡山野道旁。以及車溼

處。恒多生焉。陳仁山藥物生產辨

云。淡竹葉廣東各屬均有產。以花

縣從化下四府爲多出。

形態 淡竹爲生於山野路旁

之草。本植物。春月從宿根生苗。初

時類竹。莖高達二三尺。葉互生。似

竹葉。作廣披針形。前端尖。闊一寸

許。長六七寸。花爲粗大穗狀花。開

於梢上。根爲纖維狀。附生如麥門

冬之堅球根。



淡竹葉

性質 甘。寒。無毒。

功效 澀瀉。清熱。專作利尿藥。

主治 葉去煩熱。利小便。清心。

根能墮胎。催生。

近人學說 張山雷曰。此非竹

類也。生下澤地。細莖綠葉。有似於

竹。故有此名。四五月間。開花如蛾

兩瓣舒展。作翅。栩栩欲飛。深碧可

玩。古書謂之鴨跖草。陳藏器謂味

苦大寒。治寒熱。瘴癘。痰飲。丁腫。小

兒丹毒。發熱狂痢。大腹痞滿。身面

氣腫。熱痢。蛇犬咬。癰腫等毒。日華

謂治淫痺。利小便。瀕湖以消喉痺。

亦清熱解毒。泄火利水之良品也。

用量 三錢。

施用宜忌 凡無濕熱及孕婦

禁用。

參攷資料 ①古方書所載之

淡竹葉係 Yawghoe 之葉 (和

漢藥考) ②竹葉象形。碎骨言其

下胎也。(李時珍) ③淡竹葉處

原野有之。春生苗。高數寸。細莖綠

葉。儼如竹米落地所生細竹之莖

葉。其根一窠數十鬚。鬚上結子。與

麥門冬一樣。但堅硬爾。隨時採之。

八九月抽莖。結小長穗。俚人採其

根苗。搗汁和米。用作酒麴。甚芳烈

(李時珍)

【淡竹葉】即鴨跖草之古籍別名。

典見綱目。詳「鴨跖草」條。

【淡竹瀝】即竹瀝之處方用名。詳

「竹瀝」條。

【淡竹籜】即淡竹殼之原名。詳「

淡竹殼」條。

【淡肉果】即烟草之別名。詳「烟

草」條。

【淡伯】即厚樸之古籍別名。典見

和漢藥考。詳「厚樸」條。

【淡附子】即附子之處方用名。詳

(別錄)

歷代記述攷證

家本草論梓根白皮曰煎湯洗小兒壯熱一切瘡疥皮膚瘙癢【明】李時珍本草綱目論梓根白皮曰治溫病復感寒邪變爲胃嘔黃汁飲之。

梓葉

主治 搗傅豬瘡。飼豬肥大三倍。

歷代記述攷證

【明】李時珍

瘡。本草綱目論梓葉曰。療手足火爛。

【梓藻】即父陞根之古籍別名。典

見別錄詳『父陞根』條

【梔子】即山梔子之原名詳『山梔子』條。

【梔子仁】 卽山梔子仁之別名。詳

『山樞子仁』條

【梔子皮】 卽山梔子皮之別名。詳

『山梔子皮』條。

梗雞

基本梗雞爲溼生蟲類之一種。可供藥用。

性質 甘。無毒。

主治 痺症。

【條】卽柚之古籍別名。典見爾雅。

詳『柚』條。

【條芩】卽黃芩之處方用名詳

黄芩 條

【梟】卽鴞之古籍別名典見本草

綱目詳「鴉」條

【臯羊】卽獬豸之古籍別名典見

山海經詳「狌狌」條

【梟景】卽柳梟之古籍別名典見

別錄註「枋巢」條

【臬騶】卽騶之古籍別名典見爾雅。

有不保者。(遺集)

【梅葉】

性質 酸平。無毒。
主治 休息痢及霍亂。

煮濃汁飲。

參攷資料 ①嵩陽子言。清水

揉梅葉洗煮葛衣。經夏不脆有驗。

(陳藏器) ②夏衣生黴點。梅葉煎

湯洗之。即去甚妙。(李時珍)

【梅精】

即冰片之別名。詳「冰片」條。

【梅實】

古籍別名 生青梅。黃熟梅。

產地 河南湖北、川蜀、江浙諸

省境內均有產之。

基本 屬薔薇科。爲梅樹之果

實。

形態 梅實作球圓形。小如彈

丸。大如杏實。表皮作絨毛。樣之光

芒。於夏日梅雨時節結實。在未熟

期內。色爲翠綠。成熟後。色呈杏黃

稍間紅色。內實鬆脆。多液無滓。含

之香口。嚼之頗酸。取之可供食與

藥用。

製法 採用年青半黃之梅實。

每箇用鹽一兩(鹽少不效)。淹浸

一日一夜。取出晒乾。又淹又晒。漬

至鹽水盡爲度。每用青銅錢三枚。

夾鹽梅兩箇。麻線紮住。裝貯瓷罐

內。封固埋藏地中。約經百日。許。取

出可用。埋藏一年者佳。以愈陳愈

良。又有用糖漬鹽浸者。爲白梅。薰

黑者。名烏梅。各有效能。另詳各該

條。

性質 酸平。無毒。

主治 痰涎壅塞。喉如有物。膈

間作痛。吐之不出。嚥之不下。梅核

膈氣。用此含口。嚥汁入喉。即消。

參攷資料 ①梅花開於冬而

實。熟於夏。得春之全氣。味最酸。性

能收斂。食之生津。糖藏可充果餌。

榨汁可以製梅醬。(李時珍) ②梅

實多食損齒傷筋。蝕脾胃。令人發

腸上痰熱。齒離者。嚼胡桃肉。即解

曾服黃精者。忌食。(大明) ③梅實

如同面粉拌食。則不酸。且無齲牙

之患。(物類相感志)

【梅實仁】即梅核仁之別名。詳「

梅核仁」條。

【梅實水】即梅子水之別名。詳「

梅子水」條。

【梅樹根】採取 以不出土者

用。

主治 風痺。

歷代記述攷證 【宋】大明諸

家本草論梅樹根曰。煎湯飲。治霍

亂止休息痢。

參攷資料 ①梅樹根。出土者

不可用。用之殺人。(綱目) ②初生

小兒。取梅樹根。同桃李根。煮湯浴

之。無瘡熱之患。(崔氏寶要)

【梅葉】即吐鐵之古籍別名。典見

綱目拾遺。詳「吐鐵」條。

性質 酸。斂。

主治 生津解渴。

參攷資料 ①鮮綠萼初放。花

採取蒸露。能解先天胎毒。六月未

出痘。小兒和金銀露食之極佳。②

閩小記海澄人。蒸梅及薔薇露。取

如燒酒。酒一壺。滴少許。便芳香

(周傑園)

【梅邊】即鞭筍之態。梅雨濕氣而

早生者。味淡肉硬。不及秋生者佳。

性質功能參詳「鞭筍」條。

【梓】 古籍別名 木王。(綱目)

外國名詞 Catalpa Ka-

empferi, Set N (拉丁) キサ

サゲ アツサ カハラヒサギ

カミナリササゲ ハブテモ

アラ(日本)

基本 係紫葳科梓屬之梓。

產地 生山野間。

形態 梓爲喬木類之落葉木

本。高二丈餘。葉略呈卵形。掌狀淺

裂。與桐葉相類。惟較小。葉柄長。夏

日開花。唇形。花冠淡黃色。帶有紫

色之斑紋。萼亦唇形。有二深裂。結

實細長。略似豇豆之莢。其根白皮

可供藥用。



梓

種類 ①木理白者。爲梓。梓之

有美文者。爲梓。②木理赤者。爲楸

梓之小者。爲楸。

採取 以堅實不腐者良。

製法 凡使去外層黑皮。取裏

白入藥用。

性質 苦寒。無毒。

主治 熱毒。去三蟲。(本經)療

日中疾。主吐逆。胃反及小兒熱瘡。

身熱煩煩。蝕瘡。煎湯浴之。并搗傅

不過數粒。此方傳自江寧王培德家。已九世無痘之兒。真異方也。
(青梅散方)

●梅桃丹 治痘已出未出。不起不發。隱在皮膚。並治麻症斑症。用梅花一兩。桃仁。辰砂。甘草各二錢。絲瓜五錢。爲末。每服五分。參蘇湯下。痘不問前後。凡黑陷咬牙寒戰。用梅花六錢。穿山甲一兩。仙靈脾五分。麝香一錢。爲末。每服三五分。咬牙戰。加人牙二三釐。內托散送下。(赤水玄珠方)

●種痘新書云。能起五陷。黃蠟梅花素心者尤良。陰乾不拘多少。去毛。燻盛。聽用。桃花陰乾。山查去核。炒爲末。小絲瓜陰乾。爲末。陳皮去白。人參黃芪。炙甘草。炙礞砂。紫河車。酒洗去筋。蒸焙乾。鹿茸酒酥。炙穿山甲。取首尾四足者。炒仙靈脾。去四。剉刺酒焙。人牙火燻。韭汁。炸七次。各爲末。用。按綱目。梅花條下。並無主治。而於臘梅花下。亦僅言解暑生津而已。不知臘梅亦並非梅種。其主治亦廣。不僅治痘也。(二花散方)

●絕痘用兩方綠蠶梅。未放

探藏。風乾。逢四時八節。節前一日。用雞蛋一個。打孔入。蓋紙糊好。飯上蒸熟。吃數次。永不出痘。即出亦不過數粒。(楊春涯驗方)

●解毒毒。立春前後三日。採紅梅。蘆牛。含半開者。一鍾去蒂。仍安鍾內。磁碟蓋住。一週時。足氣汁升。上用新插盆。未經五辛者。搗研如泥。搗成餅樣。加明礞砂水飛一錢。勻。糝於上。緩緩研勻。再加白蜜少許。丸如彈子。曬半乾。金箔爲衣。每服一丸。甘草湯下。忌鐵器重腥。服過一丸後。當日。晚間。微微發熱。次日。遍身發出細瘰。是其驗也。朱禹功仙傳種痘方。赤豆黑豆。煮豆各一兩。研末。入新竹筒中。削皮留節。豎孔入藥。杉木塞緊。用蠟封固。臘月。浸廁中。一月取出。風乾。每藥配梅花片三錢。每服一錢。以經霜絲瓜藤筋煎湯下。神效。(劉氏得效方)

●龍腦膏 治痘出未透。心狂見鬼。陷伏等症。用梅花不拘多少。曬乾。爲末。加冰片少許。共研爲末。以豬心血和勻。爲丸。狂譫者。燈心湯引。紫陷者。以紫草煎湯調之。加酒

數茶匙化下。(種痘新書方)

●千里梅花丸 途中備用。用枇杷葉。乾葛末。百藥煎。烏梅肉。臘梅花。甘草各等分。爲末。用蠟化開。投蜜。每蠟一兩。加白蜜二錢。和藥末。搗二三百下。丸如雞豆大。夏月長途。含化。一丸。津液頓生。寒香滿腹。妙不可言。(醫學指南方)

參攷資料 ●白梅花 古方未見用者。近時有梅花湯。用半開花溶蠟封花口。投蜜罐中。過時。以一兩。架同蜜一匙。點沸湯服。又有蜜漬梅花法。用白梅肉少許。浸雪水。潤花露一宿。蜜浸。蘆酒。又梅花粥法。用落英入熟米粥。再煮食之。故楊誠齋有蜜點梅花帶露餐。及脫蕊收將熬粥喫之句。皆取其助雅致清神思而已。(李時珍) ●梅花冬藏春開。其花不畏霜雪。花後發葉。得先天氣最足。故能解先天胎毒。(百草鏡)

【梅花冰片】即冰片之處方用名。

詳【冰片】條。

【梅花鹿】即鹿之毛褐色而有白星斑點者。以之入藥最良。性質功能參詳【鹿】條。

【梅花腦】即龍腦膏之狀。如梅花者。爲最上品。性質功能。參詳【冰片】條。

【梅柏砂】即礞砂之古籍別名。典見雷公炮炙論。詳【礞砂】條。

【梅桃】即山櫻桃之古籍別名。典見綱目。詳【山櫻桃】條。

【梅核仁】基本 本品即梅實中之核仁。

性質 酸。平。無毒。

主治 明目。益氣。不饑。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論梅核仁曰。除煩熱。明。李時珍本草綱目論梅核仁曰。治代指。忽然腫痛。搗爛和醋浸之。

【梅梗】採取 以綠萼者入藥。良。並宜帶葉成枝者用。

主治 通上下。歸氣。並治婦人小產。

參攷資料 ●凡梅有氣條。青

翠色。此條無藥止。光梗出枝。幹微。若生白膏。用以通上下。歸氣有效。此氣條而非梗也。(趙學敏)

●保產神效方。凡婦人妊娠三月。久慣小產。百藥不效者。以梅梗三五條。煎濃湯飲之。復飲龍眼湯。無

基本 屬薔薇科。爲梅樹(Prunus Mume, S. et Z.)之花。

形態 梅爲落葉喬木之一種。樹幹高達二三丈。葉互生。作長卵圓形。邊緣有鋸齒。在早春未長葉前。先索樹而開單瓣或重瓣之圓形花。有香氣。色有紅白淡紅等。初開時。微帶嫩綠色。凡花露。實仁。實水。葉。梗。根。均能療病。另詳各該條。

種類 梅之種類頗多。其主要者。有鶴頂梅。重葉梅。野梅。鴛鴦梅。早梅。綠萼梅。六瓣梅。水梅。紅梅等。採取 以單葉綠萼者入藥。良。含苞者力較勝。採取時。不犯人手。者更佳。

性質 微酸。溫。無毒。

效能 開胃散鬱。生津止渴。解暑除煩。安神定魄。療痰熱。清頭目。利氣。平肝。

主治 痰熱壅滯。唇瘡。癰癤。癰結。核。先天胎毒。痘毒。一切中毒。

配合應用 ①治癰癤。方以雞

蛋開一孔。入綠萼梅花。將開者七朵。封口。飯上蒸熟。去梅花。食蛋。每日一枚。七日全愈。

②治脣上生瘡。白梅瓣貼之神。

十一畫 梅

效。如開裂出血者即止。(赤水玄珠方)

③宜端午日製合。飛砂砂紅芽大戟。處州山茨菇。千金霜。川文蛤。淨粉。草河車。以上六味。各二兩。珍珠。琥珀。明雄黃。冰片。陳金墨。各五錢。梅花。蔞西牛黃。各一兩。川麝香。四錢。上各藥。爲末。乳篩極細。以糯米粉糊。拌爲丸。研用。(紫金錠方)

④白梅花。蔞三錢。探飽綻者。須預備曬乾。生地黃。三錢。當歸。三錢。生甘草。一錢。臍帶。小兒自己落下時。去灰。或用礬新瓦炙存性。研極細末。同煎濃汁。濾清。熬膏。作一日吃完。可使小兒永不出痘。萬病回春。(稀痘神方)

⑤九仙奪命丹。集驗云。又名十聖丹。治七十二般無名腫毒。惡瘡。流注。火瘡。等症。砂砂三錢。雄黃。乳香。沒藥。冰片。血竭。各二錢。石膽。礬。銅青。麝香。枯礬。熊膽。飛過黃丹。各一錢。五分。蜈蚣。蛇。蚺。蟻。各二條。微炒黃色。去嘴。梅花。一升。寒水石。牛黃。蟾酥。白宮粉。硼砂。各一錢。全蝎。九個。蝸牛。七條。以上廿三味。爲末。研極細。以硃砂一錢。五分。爲衣。

其修合之法。先將蟾酥。用乳汁化開。共爲丸。如丸不起。略加麵粉。如桐子大。每服一丸。令病人。口嚼生葱。一根。咽下。又嚼一根。極爛。吐在手上。心裏。藥用滾熱老酒。吞下。量冷。暖時。候。蓋。被。出汗。如病人。不能嚼。人代嚼之。亦可。如無汗。再服一丸。自愈。凡諸毒。醫遲。遲。走。攻。心。必不可救。若汗來。遲。以熱酒。催之。不可以手。摸。摩。患處。如癢。以舊木梳梳之。自止。(九仙奪命丹方)

⑥用綠萼梅花。七朵。須預養於花瓶內。春分日。摘花。半開者。只用淨瓣。搗爛。白糯米。三匙。滾水。服之。毒即全消。免出痘矣。小兒。滿月後。即服。(稀痘方)

⑦新安汪偉公先生。傳其家親友。凡小兒服此丸。永不出痘。其方。即前稀痘神方。臍帶。口吹氣。梅花。先天之氣。故名二氣丸。(二氣丸方)

⑧梅花點舌丹。治一切疔毒。及惡瘡。初起。天行。痘毒。咽喉。腫痛。等症。輕者。二粒。重者。四粒。先用無根水。送下。次取一粒。噙於舌下。化之。乳香。去油。二兩。珍珠。豆。腐。煮。過。磨。

香水。飛。熊。膽。各六分。沒藥。去油。京牛黃。苦。杏仁。麝。砂。硼。砂。蟾。酥。人。乳。泡。血。竭。雄。黃。水。飛。各二錢。片。腦。一錢。另。研。沈。香。一錢。白。梅。花。陰。乾。一錢。二分。共。爲。細。末。用。人。乳。汁。化。蟾。酥。丸。黍。米。大。金。箔。爲。衣。(集驗方)

⑨三花丹。將出痘之時。用此能稀痘。梅花。桃花。梨花。取已開未開者。陰乾。爲末。等分。兔。腦。爲丸。雄。黃。爲衣。用。赤。小。豆。煮。豆。黑。大。豆。湯。送下。(赤水玄珠方)

⑩預稀痘疹。每年臘月。清晨。摘帶。露。綠。萼。梅。花。一百朵。加上白糖。搗。成。小。餅。令。食。之。(不藥良方)

⑪張。琰。種。痘。新。書。治。痘。氣。血。兩虛。灰。白。水。泡。癢。場。等。症。黃。芪。二。兩。人。參。一。兩。甘。草。五。錢。紫。河。車。一。兩。梅。花。一。兩。五。錢。鹿。茸。一。兩。共。爲。末。每。服。八。九。分。用。內。托。散。煎。湯。下。氣。實。者。如。山。查。陳。皮。各。五。錢。(七。仙。丹。方)

十一 望 梁 梅

產地 多生澤旁湖岸間。

形態 望江青爲澤草類之一種。穀雨後始發苗。莖方中空。葉狹長而尖有鋸齒。對節生。小滿後抽莖。開花成穗。細紫層層直上。寒露時則枯。根多鬚節間方而色白。極長中亦空明。絕類水芹。可供藥用。

性質 苦微寒。無毒。
主治 止吐血。生精力。除溼熱。去星障。療肺癰。勞傷脫力。及小兒驚風。同金器煎服。

配合應用 治打傷撲傷。最活。血搗汁沖酒服。渣搗傷處。同牛膝芍藥。當歸。獨活。玉叉草。活血丹。七葉草。五爪龍。放棒行。金雀腦。覆絲藤。微草等。和勻搗汁。加酒服之。損傷垂死。但得入咽可生。並治諸爛痛瘡。癰吐血。亦效。

去目中星翳障。望江青一兩。羊肝一具。同豆腐煮食。(百草鏡方)

治吐血。白蜜二兩。隔湯頓熱。望江青一兩。煎汁沖蜜服。不論遠年新起一切血症。二服除根。但服此藥後。每服須吃桂圓五觔。二服吃十觔。方無後患。此藥服後。人如

醉。惺惺然欲睡。一週時自愈。再得燕窩粥培元更妙。

治乳癰。乳核。秋泉家祕祖傳天下第一奇方。治乳癰乳核。腫硬大者服之。即內消。用九龍川。即龍見怕一兩。細葉冬青。即山黃楊五錢。龍爪紫金鞭。即馬鞭草。又名龍爪草。一兩。金剪刀三錢。九節金絲草。即望江青五錢。遍地金。龍草。即地五爪三錢。用無灰酒二碗。加香絲藥。或橘葉十餘片。煎鍾半。饑時隨量二三次服之。渣再煎服。

絕癰。望江青乾者五錢。煎酒服。

【望江南】 古籍別名 飯匙倩。草蛇滅門草。(和漢藥考) 大吳風草。(植物辭典)

基本 係屬豆科。望江南 *Cassia Occidentalis L.* 之子實。

產地 生山野陰地。

形態 望江南爲草本。高二三尺。葉概爲五對翼葉。各小葉作卵圓或長橢圓形。前端尖。於莖之上部葉腋抽莖。開黃花。莖之下部葉腋亦著花。花後結長三寸許之莢果。中有作嘴狀之多數扁卵圓形種子。

種子。

成分 望江南所含之成分。大約與大黃及「弗蘭格拉」皮中所含「愛莫琴」 $C_{15}H_{14}O_6(OH)_2$ 相同。

採取 十月間採實去莢用。
主治 腹瀉。下痢。食傷。白濁。十二三粒。

【望江南葉】 主治 蛇蟲咬傷。搽葉貼之。

【望見消】 即菖蒲之古籍別名。典見和漢藥考。詳「菖蒲」條。

【望春】 即辛夷之古籍別名。典見和漢藥考。詳「辛夷」條。

【望果】 即蜜望子之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「蜜望」條。

【望魚】 即鱗魚之古籍別名。典見綱目。詳「鱗魚」條。

【梁上塵】 古籍別名 倒掛塵。烏龍尾。烟珠。(綱目)

基本 本品即屋上倒挂之塵。

製法 雷斅曰。凡梁上塵。須去烟火。大遠高堂殿上者。拂下篩淨末用。李時珍曰。凡用倒掛塵。燒令烟盡。篩取末入藥。雷氏所說。似是梁上灰塵。今人不見用。

一一五八

性質 辛苦。微寒。無毒。

主治 腹痛。嗜睡。中惡。鼻衄。小兒輒驚。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論梁上塵曰。食積。止金瘡。血出。齒斷。出血。

【梁州礬石】 即特生礬石之古籍別名。典見綱目。詳「特生礬石」條。

【梅子水】 性質 酸鹹。無毒。主治 諸毒惡瘡。

參攷資料 造梅子水法。用大梅子三五十個。搗碎入有嘴瓶內。加鹽三兩入河水浸。過二指日。取蠅蚶投入。多多益善。經年更佳。凡毒將水探之。即消。(秋泉祕錄)

【梅仁】 即梅核仁之簡稱。詳「梅核仁」條。

【梅片】 即冰片之處方用名。詳「冰片」條。

【梅冰】 即冰片之別名。詳「冰片」條。

【梅杏】 即杏之實黃而味酸者。性質功能與尋常杏同。參詳「杏」條。

【梅花】 處方用名 綠萼梅。紅梅花。綠梅花。

古籍別名 果。(綱目)

包藏於結晶，味微苦而鹹。此藥須特別貯藏。一次極量〇・二（〇・二）一日極量〇・六（〇・六）和漢藥考曰：前人行外科手術時，每以曼陀羅華配和為麻醉藥。從前外科大家華岡清洲秘製麻藥方劑，曾配合曼陀羅華，警事啓源載之。茲摘錄如下：曼陀羅花八分（陳舊者佳，新者發嘔）草烏頭二分，白芷二分，當歸二分，川芎二分，上五味為粗末，一淪空心服之。須與心氣昏暈，手足麻痺，或沈眠不覺，或悶亂發狂，乘時治之。既而飲以濃茶，又與黃連解毒加石膏湯，二三時乃醒。如目眩、咽乾、神氣不復者，用黑豆湯即解。倘其不醉者，更飲溫酒，或乘勢動搖必醉。其醉有遲速者，由天資有躁靜爾矣。英醫學說謂此藥產中國、印度、歐羅巴及北亞美利加等處。葉與花及子均可入藥。內含一精，即打都仁精。如用其子，須用其成熟者。如用其葉，則新乾均可。如用其花，則用其新乾者，功力勝於其葉。而遜於其子。此藥在印度古時即用為藥品。而阿剌伯人則從印度得之。此草

全體有大臭，能從遠處分辨之。其全體均有藥性。其作用為止痛藥。又為治轉筋藥。又因其能止痛，則能助睡。如腦筋疼或風溼，無論作內外科之用，均能減痛。又如發狂之人服之，亦能平心。然用葉而服至三四釐，則必脈略數，頭略昏，遍體發熱，而面與手亦旋發汗。倘服藥而至八九釐，則能令人醉。身略發熱，語多含糊。甚至瞳人散大，作渴作瀉，小便發多，大便亦不禁。若服過多，則語言顛倒，恍如沉醉。有患氣喘類病者，將其葉作煙葉燃吸，以一分至半錢為一次，能頃刻見效。然作煙吸時，亦不可過多。其功用能治咳嗽、胃氣疼。若外用能止痛，可作貼膏油膏用，至解藥之解此毒與顏茹同。

配合應用 ①治面上生瘡。曼陀羅花晒乾研末少許貼之。（衛生易簡方）
②治小兒慢驚。曼陀羅花七朶，重一字，天麻二錢半，全蝎炒十枚，天南星炮，丹砂、乳香各二錢半，為末，每服半錢，薄荷湯調下。（御藥院方）

③治大腸脫肛。曼陀羅子連殼一對，橡斗十六箇，同剉，水煎三五沸，入朴硝少許洗之。（儒門事親方）

參攷資料 ①相傳此花笑采釀酒飲令人笑。舞采釀酒飲令人舞。予嘗試之，飲須半釐，更令一人或笑或舞，引之乃驗。也。八月採此花，七月採大麻子花，陰乾，等分為末，熱酒調服三錢，少頃昏昏如醉，割瘡灸火，宜先服此，則不覺其苦也。（李時珍）
②法華經言：佛說法時，天雨曼陀羅花。又道家北斗有陀羅星使者，手執此花。故後人因以名花。曼陀羅梵言雜色也。茹乃因葉形爾。姚伯聲花品呼為惡客（李時珍）
③曼陀羅生北土人家，亦栽之。春生夏長，獨莖直上，高四五尺，生不旁引，綠莖碧葉，葉如茄葉。八月開白花，凡六瓣，狀如牽牛花，而大，攪花中折，駢葉外包，而朝開夜合，結實圓而有丁，搗中有小子。八月採花，九月採實。（李時珍）
④日本近代世談云：朝鮮牽牛花來自貞享年中。八月開白花，頗似朝顏，一名曼陀羅花。乃蔓草也。

（和漢藥考）

【曼陀羅花】即曼陀羅之處方用名。詳「曼陀羅」條。

【曼陀羅葉】即曼陀羅之處方用名。詳「曼陀羅」條。

【曼陀羅樹】即山茶花之古籍別名。典見綱目。詳「山茶花」條。

【曼珠沙華】即石蒜之古籍別名。典見和漢藥考。詳「石蒜」條。

【曼遊藤】古籍別名。沉瀝。

產地 生山谷中。

形態 曼遊藤為蔓草類之一種，莖纏木上，狀如寄生。葉似柳，春日開紫色花，可供藥用。

性質 甘溫無毒。

主治 久嗽、癰疾、久服長生延年。

【望日砂】即兔屎之古籍別名。典見綱目。詳「兔屎」條。

【望月砂】即兔屎之處方用名。詳「兔屎」條。

【望江青】古籍別名。還精草。玉星草。銀腳鸞鷲。血見愁。天芝麻。（綱目拾遺）九節金獅草（秋泉家祕）

十一 蠶斜

既晚曹曼

【晚見和漢藥考】詳『龍膽』條。

【斜枝大夫】即龍膽之古籍別名。典見和漢藥考。詳『龍膽』條。

【既濟公】即升麻之古籍別名。典見和漢藥考。詳『升麻』條。

【晚李子】即李子之遲熟者。詳『李子』條。

【晚娘棒】即鳥不宿之古籍別名。典見綱目。詳『鳥不宿』條。

【晚粟】即粟米之遲熟者。詳『粟米』條。

【晚蠶矢】即原蠶沙之古籍別名。典見方書。詳『原蠶沙』條。

【晚蠶沙】即原蠶沙之處方用名。詳『原蠶沙』條。

【晚蠶蛾】即原蠶蛾之古籍別名。典見日華諸家本草。詳『原蠶蛾』條。

【曹公爪】即枳椇子之古籍別名。典見綱目。詳『枳椇子』條。

【曹末砂】即硃砂之古籍別名。典見雷公炮炙論。詳『硃砂』條。

【曼陀羅】命名 道家北斗有陀羅星使者。手執此

花。故後人因以名之。
處方用名 曼陀羅花。曼陀羅

子。曼陀羅葉。

古籍別名 風茄兒。山茄子。(綱目) 蕪客。(姚伯聲花品) 佛花。雜色。癩茄。香婆草。醉仙桃。關陀羅。華天茄。彌陀花。高麗牽牛花。(和漢藥考) 佛茄兒。東莨麻子。(新本草)

外國名 屬茄科。藥用曼陀羅之

基本 (Datura Alba.) (Thornapple Jamesown Weed.)

產地 凡山野路旁間。恒多生焉。

形態 曼陀羅爲一年生草本。自生於山野路旁。或種植園圃。春日抽莖至夏可高三四尺。分枝稀疎。葉爲巨大之卵圓形。彼此互生。似茄子葉。有不整之尖。晚夏開放白花。狀如喇叭。花冠頗長。有突起五。朝開夕萎。實爲裂果。大可寸許。其形橢圓。外生多刺。中藏種子無數。扁平。色黑。此爲毒草。故花。葉。莖。實皆毒。子毒尤甚。人誤食之。立即狂亂。洋產曼陀羅 (Datura Tat-hra, L.) 莖高一尺至五尺。紫色。

葉形卵圓。有不整之缺裂。其柄頗長。彼此互生。夏日葉腋開紫花。作喇叭狀。又似漏斗。但不全開耳。花冠之邊緣。俱作五裂。果實爲蒴果。外生棘刺。中藏無數扁平之黑色種子。其葉爲尖卵圓形。其邊緣有三五不整之尖。葉柄頗長。而深綠。背淡綠。有一種不快之麻醉性。臭乾則無之。味苦辛。種子色褐黑。有光澤。扁平。形如雞心。有小窩點。中藏多白汁之胚乳。與鉤狀之子蕊。

羅 陀 曼

採取 八月採花及葉。九月採實。

用法 剉末和入麻藥中。

性質 辛溫有毒。

成分 曼陀羅華之有效成分。據下山藥學博士所實驗。知其爲非沃斯卻明 (Hyosyamin Or H₂AsN₃)。又藥學士兒島高里。依下山博士之指導。將日本產曼陀羅華子行化學檢查。結果與洋種



羅 陀 曼

相同。

效能 爲麻醉藥。用於喘息及痙攣性咳嗽。他如神經痛。梅毒。痛腫。痛風等症。俱可治之。尤能治老年哮喘。

主治 諸風及寒溼脚氣。煎湯洗之。又主驚癇及脫肛。并入麻藥作用。入胃後略能激胃。健神。

經絡 使麻醉之。至腸被吸收。而至血中。與血液極不起變化。其功效最著者。即由末梢神經受激。而傳達腦神經。使腦部受激。而將全身血管收縮。心跳增速。全身分泌減少。瞳孔亦隨而縮小。同時腸蠕動亦被激而增加。若服大量。則心跳弛緩。血壓減低而死。

國外學說 日本學說謂曼陀羅葉 Folia Stramonii (Datura Stramonium, L. D. Tatura L.) 本兩種植物之葉。花時採收。陰乾。葉柄長而圓。上有細溝。葉色深綠。不甚長。作廣卵圓形。或長卵圓形。又或作針形。上端尖銳。底部如楔。邊緣生不同之鋸齒。或重鋸齒。且帶茸毛。主脈之兩旁有極粗之枝脈。三五條。莖酸鹽細胞。

極粗之枝脈三五條。莖酸鹽細胞。

極粗之枝脈三五條。莖酸鹽細胞。

極粗之枝脈三五條。莖酸鹽細胞。

極粗之枝脈三五條。莖酸鹽細胞。

極粗之枝脈三五條。莖酸鹽細胞。

極粗之枝脈三五條。莖酸鹽細胞。

極粗之枝脈三五條。莖酸鹽細胞。

極粗之枝脈三五條。莖酸鹽細胞。

者不宜早用。則止知疏泄之力。足以下降。而不知其飛揚之性。本能上升。且本經明謂其溫。寇宗奭又以爲辛。則疏散寒邪。正其專職。若其開結泄水下氣降逆等治。則類皆沈重下達之義。頗嫌其與輕揚之本性。不甚符合。按本經旋覆花一名金沸草。局方有金沸草散一方。疑古人本有用其莖葉。而未必皆用其花者。考草木花葉之功用不同者甚多。或升或降。各有取義。亦其稟職使然。不容混合。且莖則質重。花則質輕。亦物理自然之性。況旋覆花之尤爲輕而上揚者乎。乃今人恒用其花。而並不用莖葉。竟以重墜之功。資之輕揚之質。恐亦非古人辨別物性之真旨也。且其花專主溫散疏泄之力。亦猛宜於寒飲。而不宜於熱痰。石頑已謂陰虛勞嗽。風熱燥嗽。誤用之嗽必愈甚。是亦以其輕揚升泄太過。正與降氣之理相反。惟其輕靈之性。流動不滯。自能流通氣化。而宣壅塞。固非專以升散見長。若但以逐水導滯爲治。似不如兼用其莖葉。較爲近理。別錄稱其根專主風溼。

其意可曉然也。黎伯樵曰。今日之旋覆花。大概有二種。一稱廣旋覆。一稱漳旋覆。當爲廣漳二州所出。不然不冠以廣漳二字。然二種性質不同。廣旋覆花堅小而色深黃。花瓣並不開展。所謂旋覆。實言其象。與本草綱目所云形似菊。又稱金錢花。狀況不殊。惟漳旋覆不然。花瓣輕飄。色白。與本草所說大相逕庭。此味本治胸結痰飲。降氣下行。本草稱其氣味鹹溫。張仲景旋覆代赭石湯。治水飲噎氣。饑嘔實相吻合。此惟廣旋覆合用。若漳旋覆氣味未必鹹溫。色白質輕。性揚。與病理實不相投。此種花究竟不知何花。而亦被以旋覆之名。可謂名不副實。核其形態。絕不相類。處方者若率書旋覆花。則爲廣爲漳。任由藥店支配。而醫士未必盡知。是則此物亦須特別註明方可也。

配合應用 治中風壅滯。用旋覆花洗淨焙研。煉蜜丸。梧子大。夜臥以茶湯下五丸至七丸。十九（經驗方）
治牛產漏下。虛寒相搏。其脈

十一 旋

斜

弦乳。旋覆花湯。用旋覆花三兩。葱十四莖。新絳少許。水三升。煮一升。頓服。（金匱方）
治月蝕耳瘡。旋覆花燒研。羊脂和塗之。（集簡方）

治小兒眉癬。小兒眉毛眼眦。因濕不生。用野油化。卽旋覆花。赤箭。卽天麻。苗。防風。等分。爲末。洗淨。以油調塗之。（總微論方）

胡洽治痰飲在兩脇脹滿。有旋覆花丸。

用量 錢半至三錢。
施用宜忌 凡真元虛衰而無實邪者禁用。

著名方劑 七物旋覆代赭湯。治傷寒汗吐下後。心下痞硬。噎氣不除。此主之。（仲景方）旋覆花三兩。人參二兩。生薑五兩。（切）半夏半升。（洗）赭石一兩。大棗十二枚。炙甘草三兩。上七味。以水一斗。煮取六升。去滓再煎。取三升。溫服一升。日三服。

參攷資料 寇宗奭言其行痰水。去頭目風。亦走散之藥。病人涉虛者不宜多服。冷利大腸宜戒也。（朱震亨）諸名皆以花狀命。

也。爾雅云。覆盜庚也。庚者金也。謂其夏開黃花。盜竊金氣也。酉陽雜俎云。金錢花一名毗尸沙。自梁武帝時進入中國。（李時珍）今所在皆有。二月以後生苗。多近水旁。大似紅藍。而無刺。長一二尺。以來葉似柳。莖細。六月開花如菊花。小銅錢。大深黃色。上黨田野人呼爲金錢花。七八月採花。今近道人家園圃所蓄金錢花。花葉並同。極易繁盛。恐卽旋覆也。（蘇頌）旋覆葉如大菊。又如艾蒿。秋開花如梧桐子。花淡黃色。其香過於菊。別有旋花。乃鼓子花。非此花也。（寇宗奭）花狀如金錢。菊水澤邊生者。花小瓣單。人家栽者。花大蓬簇。蓋襲瘠使然。其根細白。俗傳露水滴下卽生。故易變。亦不然。（李時珍）

【旋覆根】 主治 療風溼。續筋。斷搗傳之。

【旋覆葉】 主治 傳金瘡。止血。歷代記述攷證 明李時珍本草綱目論旋覆葉曰。治瘡瘻。【斜枝大士】卽龍膽之古籍別名。

論（飛天蕊、曼羅黃）（和漢藥考）
毗戶沙（西陽雜俎）

基本 屬菊科。爲旋覆之花蕾。

產地 凡川谷平澤間恒多生焉。陳仁山藥物生產辨云。旋覆花產廣西賀縣鍾山八步。廣東下四府惠州陽江等處均有出。

形態 旋覆花爲多年生草本。多自生於原野之選地。春日生苗莖長一二尺。多一株一莖。有時出二莖。葉無柄。形若披針。邊緣有粗鋸齒。微有毛。皆互生。至夏梢端開黃花。大如錢。其形若菊。排列爲頭狀花序。其周圍之花爲舌狀花冠中心之花爲筒狀花冠。有單瓣。雙瓣二種。根作白色。鬚蔓延。殊茂盛。



旋覆花

採取 七八月間採花日乾。

製法 雷斅曰。採得花。去莖并殼皮及蒂子。蕪之。從已至午。懸乾。

用法 恒入煎劑。須用綿包。或

以絹袋盛裹。蓋有細毛。恐射入肺。令人咳逆。間有焙到爲末。和作丸散。

性質 鹹。溫。有小毒。

效能 下氣。消痰。除噎。噎。軟堅。結。用作健胃。祛痰。藥。

主治 結氣。脇下滿。驚悸。除水。去五臟間寒熱。補中下氣。本經。

消胸上痰結。睡如膠漆。心胸痰水。膀胱留飲。風氣。溼痺。皮間死肉。目中眇。瞤。利大腸。通血脈。及益色澤。別錄。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥

性本草論旋覆花曰。主水腫。逐大腹。開胃。止嘔逆。不下食。宋寇宗奭本草衍義論旋覆花曰。行痰水。去頭目風。元王好古湯液本

草論旋覆花曰。消堅軟痞。治噎氣。明繆希雍本草經疏論旋覆花

曰。旋覆花別錄甄權日華子寇宗奭皆無毒。宗奭又加苦辛。而曰。冷利。其稟冬之氣。而生者乎。故其味首係之。以鹹。潤下作鹹。鹹能軟堅。別錄加甘。甘能緩中。微溫。溫能通行。故主結氣。脇下滿。心脾伏飲。則

病驚悸。飲消。則復常矣。除水。去五

臟間寒熱。及消胸上痰結。睡如膠漆。心脇痰水。膀胱留飲。風氣。溼痺。皮間死肉。目中眇。瞤。利大腸者。皆軟堅。冷利。潤下。消痰。飲。除水之功也。其曰。補中下氣者。以甘能緩中。

鹹能潤下。故也。通血脈。益色澤者。蓋指飲消。則脾健。健則能運行。脾

裏血。又統血。故也。清黃宮繡本草求真論旋覆花曰。旋覆花即本經所名金沸草者是也。其性雖兼

辛溫。凡陰虛勞嗽。風熱燥欬。不可誤用。用之其嗽必甚。究之味苦而

鹹。性主下降。凡心脾伏飲。脇下脹滿。胸上痰結。睡如膠漆。風氣。溼痺。皮間死肉。服之即能。有效。更能續

筋。數傷。是以仲景之治傷寒。汗下後。心下痞堅。噎氣。不除。有旋覆代

緒石湯。並金匱半產漏下。有旋覆花湯。胡洽治痰飲。在兩脇。脹滿。有

旋覆花湯。皆取苦能下氣。故耳。惟其性專主下。故書皆載病衰弱。大腸虛。寒暑切忌。以其不禁。再下。故也。五月五日。採花。曬乾。去皮蒂。蕪殺用。清葉天士本草經解論旋覆花曰。旋覆氣溫。稟天春和之本。氣入足厥陰肝經。味鹹。有小毒。得

地北方陰懷之味。入足少陰腎經。氣味降。多於升。陰也。溫能散結。鹹能軟堅。故主結氣。脇下滿也。水

氣乘心。則驚悸。鹹溫下水。所以并主驚悸也。去五臟間寒熱者。五臟

藏陰臟也。痰著五臟。則臟陰不藏。而寒熱矣。鹹溫可以祛痰。所以去

寒熱也。補中者。中爲脾胃。水行痰消。則中宮脾胃受補也。下氣者。鹹

性潤下也。因有小毒。所以服之必煩也。清陳修園本草經讀論旋

覆花曰。旋覆花氣溫。稟風氣。而主散味。鹹。得水味。潤下而軟。堅。味勝

於氣。故以味爲主。唯其軟堅。故結氣。脇下滿等證。皆能已之。唯其潤下。故停水驚悸。及五臟鬱滯而生

寒熱等證。皆能已之。藉鹹降之力。上者下之。水氣行。痰氣消。而中氣自然受補矣。近人學說 張山雷曰。旋覆花體質甚輕。飛揚疏散。其主治。當以泄散風寒。疏通脈絡爲專主。別錄治風氣。溼痺。皮間死肉。通血脈。宗奭去頭目風。皆其輕疏泄散之功也。以治風寒喘嗽。寒飲液肺。最是正法。或謂旋覆降氣。寒邪在肺

焉。春初生苗。深冬始凋。初時葉布地。生似松葉。而狹長。有鋸齒。綠色。而深青淺。夏秋莖高二三尺。而柔弱。數寸一節。節間生葉。四散如繖。頂開白花。成簇。如芹花。蛇狀子花狀。結小實。成簇。其根白。葉似柴胡。(李時珍)

【救肺候】即款冬花之古籍別名。典見和漢藥考。詳「款冬花」條。

【旋栗】即榛栗之別名。性質功能。參詳「榛栗」條。

【旋復花】即旋覆花之處方用名。詳「旋覆花」條。

【旋葛】即旋花之古籍別名。典見新修本草圖經。詳「旋花」條。

【旋花】(經)美草。(別錄)旋葛。(蘇恭)續筋根。鼓子花。旋腸草。(圖經)天劍草。經枝牡丹。(綱目)打碗花。狗兒釋。地腸草。掛金燈。牽枝牡丹。(和漢藥考)

外國名 藥 Calystegia nemum, R. Br. var. japonica, (拉丁)

基本 屬旋花科。為旋花之莖葉花根。

產地 凡川澤田野間恒多生焉。

形態 旋花為多年生蔓性草。本多自生於原野道旁。莖細長。左旋纏繞他物而成。葉為箭狀。又似戟長二三寸。中片特長。末端稍凸而尖。其側片則極短。具長葉柄。皆互生。盛夏葉腋開合瓣花。色淡紅。狀似喇叭。類牽牛花。而小。朝開暮謝。果實為扁平之蒴果。內分三室。室藏種子數粒。根色白。細如筋。雖寸寸切斷。仍能生長為一體。其繁殖力頗強也。



旋花

採取 五月採花。陰乾。二月八月採根。日乾。

性質 花甘。根辛。溫。無毒。

效能 補陰。續筋。用為利尿藥。

主治 面肝。黑色。媚好。益氣。根主腹中寒熱邪氣。(本經)利小便。久服不飢。輕身。續筋骨。合金瘡。(別錄)

十一 蔓 旋

歷代記載攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論旋花曰。搗汁服。主丹毒熱。【明】李時珍本草綱目論旋花曰。補勞損。益精氣。

配合應用 治被斫斷筋。旋葛根搗汁。澀瘡中。仍以滓傳之。日三易。中月即斷筋。處便續。(外臺祕要方)

●太乙金鎖丹。祕精益髓。用五色龍骨五兩。覆盆子五兩。蓮花蕊四兩。未開者。陰乾。鼓子花三兩。五月五日採之。雞頭子仁一百顆。並為末。以金櫻子二百枚。去毛。木白搗爛。水七升。煎濃汁一升。去渣。和藥杵二千下。丸梧子大。每空心溫鹽湯下三十丸。服之至百日。永不泄。如要泄。以冷水調車前末半合服之。忌藥菜。(瑞竹堂方)

用量 錢半至三錢。

參攷資料 凡藤蔓之屬。衆人之筋。所以多治筋病。旋花根細如筋。可啖。故別錄言其久服不飢。時珍自京師還。見北上車夫每載之。云暮歸煎湯飲。可補損傷。則益氣續筋之說。尤可徵矣。(李時珍)

●旋花莖生。今之河北京西關陝

田野中甚多。最難鋤。治之。又生。世又謂之鼓子花。言其形肖也。四五月開花。亦有多葉者。其根寸截。置之土下。頗灌漑。方涉旬。苗已生。(寇宗奭)

●旋花即平澤旋葛也。其根似筋。故一名筋根。(蘇恭)其花不作瓣狀。如軍中所吹鼓子。故有旋花鼓子之名。一種千葉者。色似粉紅。牡丹。俗呼為經枝牡丹。(李時珍)

●旋花田野陰墜皆生。逐節蔓延。葉如波菜。葉而小。至秋開花。如白牽牛之花。粉紅色。亦有千葉者。其根白色。大如筋。不結子。(李時珍)

【旋龜】形龜。旋龜為介類龜。屬之一種。鳥首。龜尾。聲如破木。可供藥用。

主治 耳聾。佩之。

【旋覆花】命名 本品花綠繁茂。圓而覆下。故名。

處方用名 旋復花。金佛花。全福花。金佛草。金福櫻。

古籍別名 金沸草。(本經)戴椹。(別錄)金錢花。滴滴金。夏菊。(綱目)盜庚。(爾雅)皇菊。滴滴盛。椹。六月菊。野金錢。野油菊。(總攷)

十一 薑 敗

【敗 虱】

命名 本品乃匏蠶破開爲之者故名。

採取 以苦匏者佳。年久者尤良。

性質 苦。平。無毒。
主治 消脹殺蟲治痔漏下血崩中帶下赤白。

【敗 醬】

命名 本品根作陳敗豆醬氣味故名。

古籍別名 鹿腸（本經）澤敗鹿首馬草（別錄）苦菜苦職（綱目）

外國名詞 Patrinia scabio-saeifolia, Link. (拉丁)

基本 屬敗醬科爲 Patrinia Scabiosaeifolia, Link. 之根。



(一) 醬 敗

形態 敗醬爲多年自生之宿根草。本莖高三四尺。葉對生下部者爲類菊葉之羽狀複葉或羽狀裂葉。上部者爲細長單葉或三裂。

秋季於梢上簇生黃色小花。狀如蕪菜。根作紫白色。狀類柴胡。



(二) 醬 敗

採取 八月採根曝乾。

製法 雷斅曰凡收得便粗杵入甘草葉相拌對蒸從已至未去甘草葉焙乾用。

性質 苦。平。無毒。

效能 破瘀滯活血。消癰腫排膿。磨障膜。消弩肉。用作瘡瘍藥。又爲目疾藥。

主治 暴熱。火瘡。赤氣。疥癩。疽痔。馬鞍熱氣（本經）除癰腫浮腫結熱。風痺不足。產後痛（別錄）

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論敗醬曰治毒風癰痺破

多年凝血。能化膿爲水。產後諸病止腹痛。餘疹煩渴【宋】大明諸家本草論敗醬曰治血氣。心腹痛。破瘀結。催生落胞。血運鼻。鼻吐血。赤白帶下。赤眼障膜。弩肉。路耳。瘡癰。疥癬。丹毒。排膿補瘻。

近人學說 張山雷曰敗醬有

陳腐氣。故以敗醬得名。能清熱泄結。利水消腫。破瘀排膿。惟宜於實熱之體。本經稱其味苦平。主暴熱。

火創。赤氣。疥癩。疽痔。馬鞍熱氣等（創今作瘡。據今作瘡。馬鞍熱氣四字。頗不經見。蓋陰勝同熱氣。蒸騰亦陰分之溼熱也。）別錄稱其

味鹹微寒。除癰腫浮腫。結熱。風痺。產後痛。甄權稱其辛苦微寒。治毒風。癰痺。破瘀血。能化膿爲水。止煩

渴。療腹痛。產後諸病。日華治血氣。心腹痛。破瘀結。催生落胞。定血運

吐血。衄血。赤白帶下。赤眼障膜。弩肉。路耳。瘡癰。疥癬。丹毒。無一非實

熱瘀滯之症。惟產後諸痛。當以瘀露作痛者爲宜。而瀨湖所引別錄

竟作產後疾痛。大明本草又以產後諸病。渾言之。則流弊良多。不可

不知所辨別者也。

配合應用 ①治腹癰有膿。慈

苡仁附子敗醬湯。用慈苡仁十分。附子二分。敗醬五分。搗爲末。每以

薑。當歸各六分。續斷。芍藥各八分。

芍藥。竹茹各四分。生地黃炒十二分。水二升。煮取八合。空心服。（外臺祕要方）

②治產後腰痛。乃血氣流水。腰腿痛不可轉者。敗醬當歸各八分。芍藥。芍藥。桂心各六分。水二升。煮

八合。分二服。忌葱。（廣濟方）

③治產後腹痛如錐刺者。敗醬草五兩。水四升。煮二升。每服二合。日三服良。（衛生易簡方）

④治蠅蛆尿瘡。遠勝者。敗醬煎汁塗之良。（楊氏產乳方）

⑤用蠶 錢半至三錢。

施用宜忌 凡無瘀滯實熱者禁

藥用。參攷資料 ①敗醬乃手足陽明厥陰藥也。善排膿破血。故仲景治癰。及古方婦人科皆用之。乃易得之物。而後人不知用。蓋未遇識者耳。李時珍 ②南人採嫩者暴

賦。每寸許結節。節節相接。採之可供藥用。

性質 苦。平。無毒。

主治 治上氣氣急。結氣。瘤痛。

【推丸】即蜚蜋之古籍別名。典見本草集註。詳「蜚蜋」條。

【推石】即綠膚青之古籍別名。典見別錄。詳「綠膚青」條。

【推車客】即蜚蜋之古籍別名。典見綱目。詳「蜚蜋」條。

【推車蟲】即推車客之古籍別名。典見綱目。詳「蜚蜋」條。

【推青】即綠膚青之古籍別名。典見別錄。詳「綠膚青」條。

【推屎蟲】即蜚蜋之古籍別名。典見孫氏集效方。詳「蜚蜋」條。

【推蠶】即干歲蠶之古籍別名。典見陸機草木疏。詳「干歲蠶」條。

【搗天皮】即地衣草之古籍別名。典見綱目。詳「地衣草」條。

【救火】即景天之古籍別名。典見別錄。詳「景天」條。

【救火】即景天之古籍別名。典見別錄。詳「景天」條。

【救命王】古籍別名。死裏逃生。綱目拾遺。

基本 救命王爲雜草類之一種。可供藥用。

主治 小兒感冒。風寒咳嗽。大人傷力。損傷吐血及諸風疼痛。無名腫毒。

【救命王】即金不換之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「金不換」條。

【救救人者】基本 救救人者爲雜草類之一種。可供藥用。

產地 生庭院中。

採取 五月十月採。曬乾用。

性質 甘。有毒。

主治 通氣疝痺。諸不足。

【救荒草】即黃精之古籍別名。典見本草拾遺。詳「黃精」條。

【救窮草】即黃精之古籍別名。典見別錄。詳「黃精」條。

【敗石】基本 敗石爲雜草類之一種。可供藥用。

性質 苦。無毒。

主治 療渴痺。

【敗芒箔】命名 本品係芒莖製成之箔。而日久敗壞者。故名。

主治 產後血滿。腹脹血溫。惡露不盡。月閉止。好血。下惡血。去鬼氣。疰痛。癰結。酒發服之。亦燒末酒下。彌久者煙者佳。

【敗席草】基本 本品乃石龍須用其破舊者。

主治 淋病及小便不通。養汁服。

【敗席草】即石龍芻之處方用名。詳「石龍芻」條。

【敗毒菜】即羊蹄之古籍別名。典見綱目。詳「羊蹄」條。

【敗荷葉】即荷葉之處方用名。詳「荷葉」條。

【敗將】即龜版之古籍別名。典見日華諸家本草。詳「龜版」條。

【敗船茹】命名 本品即大鵬輪。刮竹茹以補漏者。故名。

主治 平療婦人崩中。吐血。痢血不止。

歷代記述攷證 【唐】蘇頌圖經本草論敗船茹曰。治金瘡刮敗船茹灰傳之功。同牛膽石灰。

參攷資料 敗船茹。古人以松茹。今人只以麻筋和油石灰爲之。

矣。〔李時珍〕

【敗華】即芫花之古籍別名。典見吳普本草。詳「芫花」條。

【敗筆頭灰】基本 本品係破舊之筆毛。燒灰以供藥用。

採取 兔毫者爲最佳。

性質 微寒。無毒。

主治 水服。治小便不通。小便數難。淋瀝陰腫。脫肛中惡。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論敗筆頭灰曰。酒服二錢。治男子交婚之夕。夢萎。明。李時珍本草綱目論敗筆頭灰曰。酒服二錢。治難產。漿飲服二錢。治咽喉痛。不下飲食。

【敗鼓皮】命名 本品係舊鼓上兩面之破皮。故名。

採取 以黃牛皮者良。

性質 平。無毒。

主治 中蠱毒。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論敗鼓皮曰。治小便淋瀝。塗月蝕耳瘡。並燒灰用。

【敗龜版】即龜版之處方用名。詳「龜版」條。

十一 蠶 接

毒法料。

主治 折傷。續筋骨。除風痺。齒可作浴湯。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器

本草拾遺論接骨木曰。根皮主痰飲。下水腫。及痰瘧。煮汁服之。當痢下及吐出。不可多服。葉主痰瘧。大人七葉。小兒三葉。生搗汁服。取吐。【明】李時珍本草綱目論接骨木曰。千金方。打傷瘀血。及產婦惡血。一切血不行。或不止。並煮汁服。

國外學說 日本和漢藥考曰。

西洋產接骨木。其花可作緩和之藥。與奮劑及發汗藥。又為蒸湯劑。及敷藥。用於風溼痛及潰瘍疼痛等症。花瓣乾則變黃。日本產之花。乾則作黃褐色。且香氣不佳。故不入藥用。又西洋產者。不惟花可入藥用。即其果實。葉。嫩芽。皮等。均可作瀉藥。並利尿藥也。

配合應用 ●治折傷筋骨。接

骨木半兩。乳香半錢。芍藥當歸。芎藭。自然銅各一兩。為末。化黃蠟四兩。投藥攪勻。牽手丸如炙子大。若止傷損。酒化一丸。若碎折筋骨。先用此敷貼。乃服。(衛生易簡方)

●治產後血暈。五心煩熱。氣力欲絕。及寒熱不禁。以接骨木破如算子一握。用水一升。煎取半升。分服。或小便頻數。惡血不止。服之即癒。此木煮之三次。其力一般。乃起死妙方。(產書方)

用蠶 錢半至三錢。

參攷資料 ●接骨以功而名。

花藥部類。葫蘆。陸英。水芹。輩故一名木薊。蘇頌。所在皆有之。葉如陸英。花亦相似。但作樹。高一二丈許。木體輕虛。無心。(蘇恭)

【接骨仙桃】 古籍別名 八

奪命丹。活血丹。(本草拾遺) 蟠桃草。(綱目拾遺)

產地 田野近水處之田廬。多有產生。

形態 接骨仙桃。係桃類之一

種。形似鰾。殼後生苗。葉光如石榴葉。形長類早蓮。高可尺許。莖空。摘斷不黑。亦不香。立夏後開細白花。而成熟。結實如豆。形似桃子。絕小。中空。內有小蟲者。真入藥實連蟲用。

採取 芒種前後。須俟實紅而

採。以空內小蟲。未生翅翼。不能穿穴。而出時收用。則藥力方全。蓋此藥之用。全在乎蟲。若過夏至去採。則蟲穴孔而出。化為小蚊。苟空無用矣。

製法 採後即須曬焙。令內蟲

死。若懸挂風乾。恐內蟲生翅。越出。則藥亦無用矣。

性質 甘淡。溫。無毒。

主治 消癰腫。

配合應用 ●專治肝氣。胃氣。

小腸疝症。用仙桃草有蟲者。金橘核。福橘核。葦澄茄。各等分為末。砂精調丸。菴豆大。每晚服一錢許。至重者。二服斷根。(和肝胃氣方)

●百草鏡云。取有蟲仙桃草用

童便製透。入補藥用。(勞損虛怯方)

●百草鏡云。用新鮮接骨仙桃

草。搗汁。加人乳和服。按吐血諸方。皆用涼血之劑。惟此藥性熱。加人乳能引血歸經。故妙。治吐血方。

●專治跌撲損傷。用蘇木五錢。

八角金盤根一錢。接骨仙桃草五錢。臭梧桐花三錢。煎酒服。(救生

苦海方)

一一五〇

【接骨草】 古籍別名 四季花。

外國名詞 Diapentea japonica, Makino. (拉一)

產地 出廣西。閩林中多有之。

形態 接骨草為澤草類之一

種。高二三尺。而叢生。葉大如柳。而厚。莖有節。綠色。而圓。三月開花。白色。至九月不絕。其枝葉可供藥用。



草 骨 接

性質 平。

主治 跌折傷。續斷骨。搗搥之。

【接骨草】 即消蘆之古籍別名。典見綱目。詳「消蘆」條。

【接續草】 形態 接續草為澤

草類之一種。莖如木



草 續 接

本草拾遺詳「白英」條。

【排風藤】即薊蕪之古籍別名。典見植物學大辭典詳「薊蕪」條。

【排草香】命名 本品根莖芬芳。亦可供合諸香。故名。

處方用名 排草根。排草香根。外國名詞 *Lythamachia sil-*

oliana, Miq. (拉一) ヒロヒンサウ(日本)

基本 係櫻草科珍珠菜屬。爲排草之香根。

產地 陳仁山藥物生產辨云。排草產廣東番禺石排。

形態 排草爲芳草類之多年生草本。獨莖。長葉長根。其葉參差而生。色淡綠。與莖同。偏反下垂。微似鳳仙花葉。而光澤無鋸齒。夏間開細柄黃花。五瓣尖長。有淡黃蕊一簇。花罷結細角。長二寸許。枯時可以浸油刷髮。其根狀如白芽。亦如細柳根。色白而氣甚香。如麝香爲熱帶諸香所不及。

採取 秋間採之。

製法 採得根陰乾用。

用法 恒以外用水煎薰洗。或

燒煙薰之。

效能 辟穢濁。驅時氣。用作祛惡辟臭藥。

主治 辟臭。去邪惡氣。

歷代記述攷證 【清】黃宮繡

本草求真論排草香曰。排草氣味

芳香。據書載能祛惡辟臭。除瘴。與

天時行。並宜燒之。水腫浮氣。風癰

可用生薑芥子煎湯浴洗。玩此氣

味芳香。僅可以辟邪魅鬼。惡使之

氣不克勝。至於水腫浮氣。亦須香

以通達使之氣伸浮散。故止可入

外用。若使作湯以服。則經絡遍布

雖曰祛邪扶正。而正氣或虛。則又

因香而斷敗矣。故古人制方。有宜

於外者。則卽以外爲主。而內不投

及之者。又有麝香木。出占城乃老

朽樹心節。氣頗類麝(李時珍)。

排草根芳香之氣。皆可辟臭。去邪

惡氣。天行時氣。並宜燒之。水煮洗

水腫浮氣。與生薑芥子煎湯浴風

癰效(張石頑)。此味亦止可入

外用。若使作湯以服。則經絡遍布

雖曰祛邪扶正。而正氣或虛。則又

因香而斷敗矣(盧飛鵬)。

【排草香根】卽排草香之處方用

名詳「排草香」條。

【排草根】卽排草香之處方用名

詳「排草香」條。

【掘據】卽蘭茹之古籍別名。典見

綱目詳「蘭茹」條。

【掛金燈】卽旋花之古籍別名。典

見和漢藥考詳「旋花」條。

【掛金藤】卽金縷釣蝦蟆之古籍

別名。典見綱目拾遺詳「金縷釣

蝦蟆」條。

【掛綠】卽荔枝實之最佳者。產廣

東增城縣。性質功能參詳「荔枝」

條。

【採芸神袖】卽神麝之處方用名

詳「神麝」條。

【接余】卽香菜之古籍別名。典見

爾雅詳「香菜」條。

【接骨】卽續斷之古籍別名。典

見別錄詳「續斷」條。卽攀倒甌

之古籍別名。典見綱目詳「攀倒

甌」條。

【接骨木】命名 本品功能接

骨故名。

古籍別名 續骨木。木蒴藋。

(綱目) 木英。扞括。野黃楊。章漆

木(和漢藥考)

外國名詞 *Sambucus race-*

Hooa, L. (拉一)

基本 屬忍冬科。爲接骨木之

枝葉。

形態 接骨木爲落葉灌木。或

自生山野。或種於人家之牆角。樹

幹拗折。然枝條繁茂。高可丈餘。早

春卽發芽。葉爲奇數羽狀複葉。皆

對生。小葉爲長卵圓形。邊緣有鋸

齒。葉面平滑。夏日梢頭開五瓣之

花。色白而帶綠。黃。相綴而爲圓錐

形花序。果實爲小核果。至秋成熟

現紫黑色。

性質 甘。苦。平。無毒。

效能 除用爲發汗藥外。打傷

挫傷等。並可服用。又用爲患部之

十一畫 排

掘掛採接

一二四九

結實形圓色黑。莖與葉俱供藥用。

性實 苦。無毒。

主治 凡一切癰疽。腫毒初起。

取莖葉一握。研汁和酒溫服。利下惡物。去其根本。

【常春藤實】 性實 甘。溫。無毒。

主治 風血。羸老。腹內諸冷。血閉。強腰脚。變白。煮服浸酒皆宜。

【常蕤子】 卽蒼耳子之古籍別名。典見廣雅。詳「蒼耳子」條。

【康于石】 卽松化石產於康于河者之別名。典見唐書。詳「松化石」條。

【康伯鼓】 卽蒲州鼓之別名。性質功能詳「豆鼓」條。

【張天剛】 形體 叢生。硬莖有節。紅黃色。葉似小蘇葉。實如小嬰。褐色。莖葉實俱有小刺如毛。根淡紅色。有鬚。可供藥用。



張 天 剛

性實 甘。溫。

效能 補陰分不足。

主治 下部虛軟。

【鹽仇】 卽百合之古籍別名。典見本草圖註。詳「百合」條。

【強鹽】 卽百合之古籍別名。典見別錄。詳「百合」條。

【強脊】 卽狗脊之古籍別名。典見別錄。詳「狗脊」條。

【彫胡米】 卽茺米之古籍別名。典見綱目。詳「茺米」條。

【彫菰】 卽茺米之古籍別名。典見綱目。詳「茺米」條。

【彫蓬】 卽茺米之古籍別名。典見爾雅。詳「茺米」條。

【彫瓊】 卽茉莉花之古籍別名。典見和漢藥考。詳「茉莉花」條。

【御戈】 卽鬼桃之古籍別名。典見綱目。詳「羊桃」條。

【御米】 卽墨粟子之處方用名。詳「墨粟子」條。

【御米粥】 基本 本品卽以御米煮成之粥。

主治 反胃利大腸。

【御米殼】 卽墨粟殼之處方用名。詳「墨粟殼」條。

【御李子】 卽李子之古籍別名。典見綱目。詳「李子」條。

【御風草】 卽天麻之古籍別名。典見藥性。詳「天麻」條。

【御柳】 卽檉柳之日本名。詳「檉柳」條。

【御麥】 卽玉蜀黍之古籍別名。典見綱目。詳「玉蜀黍」條。

【御葵】 卽落葵之古籍別名。典見綱目。詳「落葵」條。

【御黃李子】 卽李子之北方產者。典見綱目。詳「李子」條。

【御溝金水】 性實 性平。味微鹹。帶甘。

主治 男婦骨蒸。乾血勞。童子勞。晝夜發熱。至緊不肯服藥。此水不比尋常。大有功效。

參攷資料 製御溝金水法。用雞雞八隻。高二尺。取山上淨土。裝入罐內。用磁鉢八個盛之。取童便八桶。傾入七罐土內。淋上。以井花水推之。共傾入一罐土內。如淋少。再用清水推前七罐。淋下。又加上一罐內。待他一夜淨。淋下水三五碗。以磁罐收貯。外用井水養之。但遇此症。待口中要茶吃。將此水

半杯。溫服卽安。至重不過三七次立愈。(集驗方)

【御藥園木香】 卽土木香之古籍別名。典見和漢藥考。詳「土木香」條。

【惟那木】 卽南天燭之古籍別名。典見登真隱訣。詳「南天燭」條。

【威施】 卽蟾蜍之古籍別名。典見韓詩註。詳「蟾蜍」條。

【悉蘭脂】 卽錫胺脂之古籍別名。典見綱目。詳「錫胺脂」條。

【煥華】 基本 煥華爲雜草類之一種。可供藥用。

性實 甘。無毒。

主治 上氣解煩。堅筋骨。

【扈子花】 卽石蒜之古籍別名。典見和漢藥考。詳「石蒜」條。

【捻頭】 卽寒具之古籍別名。典見錢乙。詳「寒具」條。

【掃帚】 卽地膚子之古籍別名。典見本草集註。詳「地膚子」條。

【掃帚菜】 卽地膚子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「地膚子」條。

【排風】 卽白英之古籍別名。典見

湯(阮氏方)

●治胸中痰飲。恒山、甘草各一兩。水五升。煮取一升。去滓。入蜜二合。溫服七合。取吐不吐更服。(千金方)

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡非氣壯邪實者禁用。畏玉札、忌葱菜及菴菜。伏砒石得甘草吐痰痰。

著名方劑

●常山飲。治痰癆。(局方)常山(火酒炒)知母、貝母、草果、板榔各一錢。烏梅三枚。加姜蜜煎。癰未發時。面東溫服。●蜀漆散。癰多寒者。名曰乾薑此湯主之。(金匱方)蜀漆(洗去腥)雲母(燒二日夜。龍骨各等分。杵為散。未發時。以漿水服半錢。溫瘧加蜀漆半。分隨發時服一錢。

參攷資料

●蜀漆春夏用華葉。秋冬用根。老人久病。切忌服之。(雷斅)●常山蜀漆。有卻痰截癰之功。須在發散去邪。及提出陽分之後。用之得宜。神效立見。用失其法。真氣必傷。大瘡有六經五臟癰瘡。瘰癧食積瘰癧。疫鬼諸瘡。須分陰陽虛實。不可一概論也。常山蜀漆

生用則上行必吐。酒蒸炒熟用則

氣稍緩。少用亦不致吐也。得甘草則吐。得大黃則利。得烏梅。鐵錒。則入肝。得小麥。竹葉。則入心。得秫米。麻黃。則入肺。得龍骨。附子。則入腎。得草果。板榔。則入脾。蓋無痰不吐。瘰癧二物之功。亦在驅逐痰水而已。楊士瀛直指方云。常山治癰人皆薄之。癰家多畜痰涎。黃水。或停滯心下。或結滯脇間。乃生寒熱。法當吐痰逐水。常山豈容不用。水在上焦。則常山能吐之。水在脇下。則常山能破其滯。而下其水。須行血藥品佐助之。必收十全之功。其有純陽發癰。或蘊熱內實之證。投以常山。大便點滴而下。似泄不泄者。復用北大黃為佐。泄利數行。然後獲愈也。又待制李燕云。嶺南瘴氣寒熱所感。邪氣多在營衛肉皮之間。欲去皮膚毛孔中瘴。根本非常山不可。但性吐人。惟以七寶散冷服之。即不吐。且驗也。(李時珍)●恒山亦常也。恒山乃北岳名。在今定州。常山乃郡名。亦今真定。豈此藥始產於此。得名歟。蜀漆乃常山苗。功用相同。今併為一。(李時珍)●

常山生山谷間。莖圓有節。高者不

過三四尺。葉似茗而狹長。兩兩相當。二月生白花。青萼。五月結實。青圓。三子為房。其葉暴燥。色青白。堪用。若陰乾。便黑爛變壞矣。(蘇恭)●今汴西淮浙湖南州郡亦有之。海州出者。葉似橄欖。八月中有花。紅白色。子碧色。似山楝子。而小。今天台山出一種草。名土常山。苗葉極甘。人用為飲。甘味如蜜。又名蜜香草。性涼益人。非此常山。(蘇恭)●瘰癧必有黃涎聚于胸中。故曰無痰不成癰。弦脈主痰飲。故曰瘰癧脉自弦。常山去老痰積食。故為諸瘰癧要藥。又曰。常山吐癰痰。瓜蒂吐熱痰。烏附尖吐淫痰。萊菔子吐氣痰。藜蘆吐風痰。(吳遵程)●【常山苗】即蜀漆之別名。典見綱目。詳常山條。

【常吏之生】

古籍別名 常吏之生。(蜀本草)

形態 常吏之生為雜草類之一種。結實有刺。大如稻梁。可供藥用。性質 苦。平。無毒。

主治 明目。

【常吏之生】即常吏之生之譌寫者。典見蜀本草。詳常吏之生條。【常思子】即蒼耳子之古籍別名。典見本草集註。詳蒼耳子條。

【常春藤】 命名 本品小兒取藤打地。能作鼓聲。故有土鼓之名。後改為常春藤。

古籍別名 土鼓藤(拾遺龍

麟祥菴(日華)木蒿(日本)

外國名詞 Hedera Helix, L. var. colchica, C. Koch. (拉

丁) キヅタ フユヅタ (日本)

基本 係五加科常春藤屬。為

常春藤之莖葉。其子實詳見該條

產地 生山野間。



常春藤

形態 常春藤為蔓草類藤屬之常綠灌木。莖蔓生。常以氣根攀緣於他木。其大者幹徑約二三寸。葉卵形。全邊或掌狀分裂。冬開小花。黃綠色。花瓣五。為繖形花序。

升。欲發前服取吐。(外臺祕要方)
用常山一兩。桃米一百粒。水六升。
煮三分。分三服。先夜未發。隨發時
服盡。(肘後方)予用此四十年。奇
效。不能盡述。切勿加減。萬一無吐
者。常山酒煮曬乾。知母。貝母。草果
各一錢。牛水一鍾。牛煎半熟。五更
熱服。渣以酒浸。發前服。(養生主
論。王隱者。應瘧湯方)

⑤ 截瘧諸酒。用常山一兩。酒一
升。漬二三日。分作三服。平旦一服。
少頃再服。隨發又服。或加甘草煮
服之。(肘後方) 醇醪湯。治間日瘧。
支太醫云。乃桂廣州方也。甚驗。恒
山一錢二分。大黃二錢。牛炙甘草
一錢二分。水一盞。牛煎減半。發
日五更溫服。再服一盞。煎減半。
日。未發時溫服。(宋侯經心錄
方) 治久瘧不止。常山一錢。牛橫
一錢。丁香五分。烏梅一個。酒一
盞。浸一宿。五更飲之一服。便止。永
不再發。如神。(虞搏醫學正傳方)

每服二十丸。竹葉湯下。五更一服。
天明一服。發前一服。或吐。或否。即
止。(千金方) 恒山搗末。三兩。真丹
一兩。研白蜜和。杵下。丸。梧子大。
先發時。三九。少頃再服。三九。隨時
服。三九。酒下。無不斷者。(肘後丹
炒丸方) 黃丹丸。治大小久瘧。恒
山二兩。黃丹半兩。烏梅。漆。核。瓦。焙
一兩。爲末。糯米粉糊丸。梧子大。每
服三五十丸。涼酒下。隔一夜一服。
平旦一服。午後方食。(活幼心書
方) 用恒山三兩。知母一兩。甘草
半兩。搗末。蜜丸。梧子大。先發時服
十九丸。次服七丸。後服五六丸。以瘧
爲度。(葛洪肘後方) 瞻仰丸。治一
切瘧。常山四兩。炒存性。草果二兩。
炒存性。爲末。薄糊丸。梧子大。每臥
時。冷酒服五十丸。五更再服。忌鵝
羊。紫。芎。(和劑方) 又勝金丸。治
一切瘧。胸膈停滯。發不愈者。常山
八兩。酒浸。蒸。焙。板。榔。二兩。生研末。
糊丸。梧子大。如上法服。(和劑局
方) ② 聖丸。治諸瘧不拘遠近。大
小。用雞骨恒山。雞心橫。榔。各一兩。
生研。鯉。鱧。甲。煨。焦。一兩。牛。爲末。糯
粉糊丸。菴豆大。黃丹爲衣。每服三

五十丸。如上法服。(集簡方)

④ 治陰除肝瘧。寒多熱少。喘息
如死狀。或小腹滿。小便如膿。不問
久近。不吐不瀉。如神。恒山一兩。醋
浸一夜。瓦器煮乾。每用二錢。水一
盞。煎半盡。五更冷服之。(趙真人
濟急方)

⑤ 治太陰肺瘧。痰聚胸中。病至
令人心寒。寒甚乃熱。熱間善驚。如
有所見。恒山三錢。甘草半錢。桃米
三十五粒。水二鍾。煎一鍾。發日早
分三次服。(千金方)

⑥ 治少陰腎瘧。漉漉然寒手足
寒。腰脊痛。大便難。目陶然。恒山
二錢。牛膝半兩。烏梅一錢。竹葉一
錢。牛薢白三根。水一升。牛煎一升。
發前分三服。(千金方)

⑦ 治壯熱獨熱不冷者。蜀漆一
錢。牛甘草一錢。麻黃二錢。牡蠣粉
二錢。水二鍾。先煎麻黃。蜀漆。去沫。
入藥。再煎。至一鍾。未發前溫服。得
吐則止。(外臺祕要方)

⑧ 治溫瘧熱多。恒山一錢。小麥
三錢。淡竹葉二錢。水煎五更服。甚
良。(業性論方)

⑨ 治三十年老瘧。及積年久瘧。

常山。黃連。各一兩。酒三升。漬一宿。
以瓦釜煮。取一升。半。發日早服五
合。隨時再服。熱常吐。冷當利。無不
瘳者。(肘後方) 用恒山一兩。牛。龍
骨五錢。附子炮二錢。牛。大黃一兩。
爲末。雞子黃和丸。梧子大。未發時
五九。將發時五九。白湯下。支太醫
云。此方神驗。無不斷者。(張文仲
備急方)

⑩ 治瘧瘧寒熱。常山一寸。草果
一枚。熱酒一碗。浸一夜。五更望東
服之。蓋臥酒醒即愈。(劉長春經
驗方) 用常山。板。榔。甘草各二錢。
黑豆一百粒。水煎服之。乃彭司寇
所傳。(談楚翁試驗方) 用常山。黃
連。香。或各一兩。附子炮七錢。搗末。
蜜丸。梧子大。空腹飲服。四九。欲發
時。三九。至午後乃食。(葛稚川肘
後方)

⑪ 治妊娠瘧疾。酒煮常山。石膏
煨。各一錢。烏梅。炒。五分。甘草四分。
水一盞。酒一盞。浸一夜。平旦溫服。
(姚僧坦經驗方)

⑫ 治小兒驚悸。是驚卒死中惡。
用蜀漆炒二錢。左顧牡蠣一錢。二
分。漿水煎服。當吐痰而愈。名千金

根即蜀漆。功用略同。但苗性輕揚。其於上焦邪結。治之更宜。

國外學說 日本學說謂常山者。用於間歇熱（即瘧病）其成分如黃連。內有「ベルベリン」古方藥品考曰。蜀漆（即若葉常山苗）木高五六尺。葉似若葉。而闊大光滑。觸之。臭氣染手。春發細黃花。根屈曲色淡黃（即常山）

辨偽 郭景純曰。常山假者。色帶黃。按常山又名恒山。產益州及漢中。今汴西淮浙湖南諸州郡皆有。生山谷間。常山者。根之名也。狀似荊根。細實而黃者。謂之雞骨常山。用之最勝。今市肆所賣假常山。不知何物偽充。良可慨已。曹炳章曰。按常山十月出新。湖南常陽山出者。色黃無蘆。形如雞骨者。良俗稱雞骨常山。為最佳。如外黃內白粗大者。皆偽。是別種樹根。偽充不可不辨也。許小士曰。常山之治瘧發明。可謂甚古。本經別錄。甄權不云乎。考之歷代之治瘧藥物。非參用本品不為功。此則一勘古書之治案。即可得也。蓋以瘧有日晡間日瘧。三日

十一 瘧常

瘧之分。其病原係由癘拉利亞原蟲侵入人體血液中之赤血球。其傳染之媒介為蚊。蚊名曰安俄斐雷斯（Anopheles）。此癘拉利亞原蟲之侵入赤血球後也。乃在此赤血球內。管其增殖繁殖之作用。及至成為多數之幼蟲。赤血球即為其所破壞。當此之時。此種癘拉利亞原蟲。乃遊走血液之中。而產生一種毒素。人體因其毒素之刺激。遂發寒熱。故名為瘧。脾為無管腺之一。其實蓋一較大之淋巴腺耳。有製造白血球及淋巴球之功能。據一般醫學家之研究。凡人體感傳染病時。而脾臟常腫大。所以然者。因脾細胞有吞噬細菌之作用。淋巴腺則在人體中有吸收水分及雜質之特能。其次凡有害於身體之細菌。亦多為淋巴球所困。使不致有蔓延作祟之虞。綜上所述之生理病理。及證之余個人臨牀之經驗。確知常山之有治瘧效能者。第一。即能中和癘拉利亞原蟲在血液中所分泌之毒素。并有撲殺癘原蟲之可能性。第二。當有刺激淋巴盡量吸收毒素及排除毒素

等抗毒作用。故凡患者。服用常山後。血液中之癘拉利亞毒素。被其中和。精神不受刺激。其寒熱當不發。故瘧愈。瘧愈則淋巴已無毒素之遺留。故脾腫亦消。其有患久瘧之慢性脾腫者。則常山服之無效。因此時脾臟內之血管。以發生栓塞。故必須用去瘀藥。攻之。常山無蕩滌瘀血之功能。故服之不效也。晚近治瘧之藥物。莫不知有規寧（金雞納霜）其業者。然適症服規寧後。往往有復發之記錄。服本品則否。故余謂本品有撲殺瘧原蟲者。蓋亦絕對可信者也。據植物辭典。謂本品之汁液。外用可殺牛馬之蠱。可知內服當亦有殺瘧原蟲之作用。以此而證明本品治瘧之特效。愈覺先民之發明藥理。真確可據。予我人研究之興趣。此其功德。至可欽佩者也。雖然。本品不僅治瘧而已。別錄之治風癱。甄權之治項下瘤。鳳癰。瘰癧之病狀。部位。非項下之淋巴腺腫脹乎。所以然之謂。因淋巴有吸收毒素之抗毒作用。今淋巴因吸收某種毒素。太多。腺之間隙。被其梗阻。以致淋

巴液不能流通。故其處腫大。或發炎也。故我為常山有刺激淋巴。吸收羅梅及排除梅毒等抗毒作用者。若用以治此淋巴腺之腫脹。而促進其循環。其奏效亦何疑焉。至謂其治胸中痰涎。及方書之所謂無痰不成瘧者。我人若深明淋巴之生理。及此所謂無痰不成瘧之語意。則此所謂無痰不成瘧之痰字。乃為瘧時之一種經胃間之滲出物之證狀。所以然者。因淋巴原為吸收人體中之水分及雜質之機能。今因本身吸收毒素太多之故。而瘧原蟲之分泌毒素。復源源而來。如是因循。則其原有之抗毒作用。以感不平衡。遂致肺胃間之雜質水分。難以盡量吸收。故滯留而為痰。為涎矣。故瘧愈。則淋巴之機能。以恢復原狀。而營其原有之生理工作。於是之所謂痰涎之來源。遂可不治而愈。俗醫不知此理。因治瘧時。見其多痰多涎。即疑瘧為痰涎所作。彼又安知此所謂痰涎云者。蓋即淋巴失其功用乎。

配合應用 ①截瘧諸湯。用常山三兩。漿水三升。浸一宿。煎取一

形體 常山爲落葉小灌木。莖高五六尺。長者可丈許。葉爲廣橢圓或倒卵圓形。有短柄。面有光澤。彼此互生。葉面且有透明之小點。臭氣甚烈。四五月間。開淡黃色四瓣小花。雌雄異株而生。雌花有短梗。攢簇葉腋而生。雄花有長梗。排列爲總狀。果實爲蒴果。熟則縱裂。種子飛散遠處。根細長。屈曲。色黃。內部充實。有苦味。最細者稱雞骨常山。本草以常山入毒草類。農家以之煎汁。爲牛馬之殺虱藥。又有海州常山。爲屬於馬鞭草科。臭桐之根。藥舖往往以之染黃。僞充常山。土常山爲屬於虎耳草科之甘茶。亦落葉灌木。四月八日佛會用之。



(二) 山 常

採取 五月採葉。(即採蜀漆)
製法 雷斅曰。凡使常山。採時連根苗收。如用莖葉。臨時去根以

甘草細剉。同水拌濕蒸之。臨時去甘草。取蜀漆細剉。又拌甘草水勻。再蒸。日乾。用其常山。凡用以酒浸一宿。漉出。日乾。熬搗。用。李時珍曰。近時有酒洗蒸熟。或五炒熟者。亦不甚吐。人又有醋制者。吐人。

性質 苦。寒。有毒。

成分 常山之成分。亦爲祕魯培林。與黃連同。

效能 行水。吐痰。除寒熱。用爲截瘧之要藥。

作用 在胃中微有激胃神經。使胃黏膜之分泌增加。至腸中略能激腸之蠕動。使積糞緩排。排出血中。即刺激中樞神經。使體溫下降。又能減少窒素之排泄。以阻止體溫之升高。且可使固有溫度次第消失之。

主治 傷寒寒熱。發溫瘧鬼毒。胸中痰結。吐逆。(本經)療鬼蠱往來水脹。酒洒惡寒。風癰。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥

性本草論常山曰。治諸瘧。吐痰涎。治項下瘤癰。【明】繆希雍本草經疏論常山曰。常山味苦寒。別錄桐君益之以辛。宜其有毒也。苦泄辛

散。故善逐飲。陰寒祇熱。故善破瘴癘。入口即吐。其性暴悍。又可知已。本經主傷寒寒熱。宜作主山嵐瘴氣寒熱。發爲溫瘧鬼毒。胸中痰結。古方治瘧多用。蓋以嶺南西粵鬼方。咸多山嵐瘴癘之氣。所感邪氣。充於榮衛皮膚之間。欲去皮膚毛孔中瘴氣。根本非常山。不可以其性能祇逐老痰積飲。善散山嵐瘴癘之邪故也。【明】李士材本草圖解論常山曰。常山苦寒。有小毒。消痰至捷。截瘧如神。常山劫痰療瘧。無他藥可比。須在發散表邪之後。用之得宜。立建神功。世俗聞雷數有老人久病之戒。遂視常山爲峻劑。殊不知常山發吐。惟生用與多用爲然。與甘草同行。則亦必吐。若酒浸炒透。但用錢許。余每用必見奇功。未有見其或吐者也。不一表明。將使良藥見疑。沉疴難起。抑何其愚耶。酒浸一宿。切薄片。慢火久炒。形如雞骨者。良。性猛烈。施之蠶食者多效。若肉食之人。稍稍挾虛。不可輕入。【清】黃宮繡本草求真論常山曰。常山辛苦而寒有毒。功專引吐行水。爲除瘧疾老痰積飲

要藥。蓋瘧無不挾痰挾熱而成。然亦有風痰寒熱食氣之分。治須分其陰陽虛實表裏以定。如癰果因傷寒寒熱及時氣溫疫而致黃涎聚於胸中心下牢固不解。則常用此引吐。然亦須在發散表邪及提出陽分之後而用之。其用又當審其所見部位。又藥佐使以治。如常山得甘草則吐。水在上焦者宜之。得烏梅山甲則入肝。水在脇下者宜之。得大黃則利水。邪熱交結而成內實者宜之。得小麥竹葉則入心。得糯米麻黃則入肺。得龍骨附子則入腎。得草果板榔則入脾。然此陰毒之草。其性悍暴。雖有破瘴逐飲之能。而亦終損真氣。所以仲景治瘧方中。從無及此。而更傷於暑秋必瘧癘。及瘧在三陰。元氣寒入。則常山等藥皆爲戈戟。或問吐藥甚多。何以瘧疾必用常山蜀漆。蓋以常山性兼逐痰。瘧疾本於濕疫。故於常山蜀漆則宜。猶之瓜蒂烏附尖。萊菔子。藜蘆。皆爲吐劑。而瓜蒂則止宜於熱痰。烏附尖則止宜於濕痰。萊菔子則止宜於氣痰。藜蘆則止宜於風痰也。酒浸炒用。

冬不凋。似冬青葉而厚。背白。有細毛。又云。不侶冬青。柔而不尖。色深綠。其花細碎。數十房成一朵。冬生春開。微紫色。

採取 二三月間採花曝乾。

製法 雷敷曰。凡使揀淨。酒浸一宿。漉出候乾。并蜜令潤。蒸之。從卯至酉。日乾。再并蒸。如此三度。日乾。用每一兩用酒八兩。蜜半兩。

性質 甘平。微寒。無毒。

效能 祛腎障。明眼目。專作眼科藥。

主治 青盲。膚翳。赤腫多眵淚。消目中赤脉。小兒荊豆及疳氣攻眼。

歷代記述攷證 【元】王好古

湯液本草論密蒙花曰。入肝經氣血分。潤肝燥。【明】繆希雍本草經

疏論密蒙花曰。密蒙花其莖萌於冬而開於春。氣平微寒。味甘而無毒。爲厥陰肝家正藥。觀本經所主

無非肝虛有熱所致。蓋肝開竅於目。得血而能視。肝血虛則爲青盲。膚翳。肝熱甚則爲赤腫眵淚。赤脈及小兒疳餘毒。疳氣攻眼。此

藥甘以補血。寒以除熱。肝血足而

諸證無不愈矣。好古謂其潤肝燥。守真以之治畏日羞明。誠謂此也。形與羌花相似。但羌花狹小而密蒙花差大爲異。用者宜詳辨之。

辨偽 鄭育巖曰。蒙花一名

蒙山茶。一名雲芝茶。性寒能清肺胃之熱。故疹病用之尤宜。近今多以近道礪花爲充。則味懸殊矣。曹炳章曰。按蒙花三月出新。湖北當歸山出者。其花白綠色。白茸毛淨而無梗者佳。各處出花碎小色白黃。梗多者次。

配合應用 治青盲翳障。密

蒙花。空青。木賊。生地黃。蟬蛻。白蒺藜。穀精草。決明子。羚羊角。

治肝腎虛。目不能遠視。密蒙花。甘菊花。枸杞子。生地黃。白蒺藜。穀精草。

治風熱溼熱眼赤痛。密蒙花。黃連。赤芍藥。防風。荊芥穗。黃蘗。甘菊花。甘草。龍膽草。

治小兒疳積。眼目不明。密蒙花。胡黃連。白蘗。使君子。蟬蛻。木賊。蘆薈。

治目中障翳。密蒙花。黃蘗。根各一兩爲末。水丸。梧子大。每臥時

湯服十丸至十五丸。(聖濟總錄方)

用量 八分至錢半。

參攷資料 密蒙花蜀中州

郡皆有之。樹高丈餘。葉似冬青葉而厚。背白。有細毛。又似橘葉。花微紫色。二月三月採花曝乾用。(蘇頌)

利州甚多。其葉冬不凋。亦不似冬青。柔而不光潔。不深綠。其花細碎。數十房成一朵。冬生春開。(寇宗奭)

【寇脫】即通草之古籍別名。典見山海經。詳「通草」條。

【將軍】即大黃之古籍別名。典見李氏藥錄。詳「大黃」條。

【石硫黃】之古籍別名。典見綱目。詳「石硫黃」條。

【將軍乾】即蟋蟀之處方用名。詳「蟋蟀」條。

【蟋蟀】條。

【將離】即白芍之古籍別名。典見綱目。詳「白芍」條。

【尉佗生】即肉桂之古籍別名。典見和漢藥考。詳「肉桂」條。

【尉佗桂】即肉桂之古籍別名。典見和漢藥考。詳「肉桂」條。

【尉魚】即鯪魚之古籍別名。典見

毛詩疏義。詳「鯪魚」條。

【屏風】即防風之古籍別名。典見別錄。詳「防風」條。

【荳蔻】即白欒之古籍別名。典見別錄。詳「白欒」條。

【崑崙瓜】即茄子之古籍別名。典見御覽。詳「茄子」條。

【崑崙草】即冬桃之古籍別名。典見綱目。詳「冬桃」條。

【崑崙草】即青箱子之古籍別名。典見唐本草。詳「青箱子」條。

【崑崙紫瓜】即茄子之古籍別名。典見杜寶拾遺錄。詳「茄子」條。

【崑崙黃】即雌黃之古籍別名。典見綱目。詳「雌黃」條。

【石硫黃】之古籍別名。典見本草集註。詳「石硫黃」條。

【崑崙蔗】即甘蔗之古籍別名。典見綱目。詳「甘蔗」條。

【崖香】即海南沈香之產於崖州者。性質功能與尋常之沈香同。詳「沈香」條。

【崖椒】古籍別名 野椒。(綱目)

外國名詞 Zanthoxylum

爲末。每服二錢。以酒水各一小盞煎一盞。溫服。少頃當吐出痰涎爲妙。(聖惠方)

②治消渴飲水。神效方用密陀僧二兩。研末湯浸。蒸餅丸。梧子大。濃煎鹽湯或茄根湯或酒下一日五丸。日增五丸至三十丸止。不可多服。五六服後。以見水。惡心爲度。惡心時。以乾物壓之。日後自定。甚奇。(選奇方)

③治赤白下痢。密陀僧三兩。燒黃色。研粉。每服一錢。醋茶下。日三服。(聖惠方)

④治腸風痔瘡。用銅青。密陀僧各一錢。麝香少許爲末。津和塗之。(濟急方)

⑤治小兒初生。遍身如魚卵。又如水晶。破則成水流。滲又生者。用密陀僧生研。搗之。仍服蘇合香丸。(救急方)

⑥治腋下胡臭。漿水洗淨。油調密陀僧塗之。以一錢用熱蒸餅一箇。切開搽夾夾之。(集簡方)

⑦治口臭。密陀僧一錢。醋調漱口。(普濟方)

⑧治大人口瘡。密陀僧煅研。搽

之。(聖濟方)

⑨治小兒口瘡。不能吮乳。密陀僧末。醋調塗足心。瘡愈洗去。蔡醫博方也。(黎居士簡易方)

⑩治鼻內生瘡。密陀僧。香白芷等分爲末。蠟燭油調搽之。(簡便方)

⑪治鼻衄赤痢。密陀僧二兩。細研。入乳調夜塗。目洗。譚氏亦治瘡。瘰癧。又外臺治野雞斑點。(聖惠方)

⑫治夏月汗斑如疹。用密陀僧八錢。雄黃四錢。先以薑片擦熱。仍以薑片蘸末擦之。次日即愈。(活人心統方)

⑬治骨疽出骨。一名多骨瘡。不時出細骨。乃母受胎。未及一月。與六親骨肉交合。感其精氣。故有多骨之名。以密陀僧末桐油調勻。攤貼之。即愈。(壽域方)

⑭治血風腫痛。密陀僧香油入粗罈內。磨化。油紙攤膏。反覆貼之。(孫氏集效方)

⑮陰汗澀痒。密陀僧末。傅之。戴氏加蛇牀子末。

施用宜忌 凡中寒無實邪者

禁用。

參攷資料 ①密陀僧感鉛銀之氣。其性重墜下洗。直走下焦。故能墜痰止吐。消積定驚。癰。治瘡。疔。止消渴。療瘡。腫。洪邁夷堅志云。驚氣入心。絡瘡。不能言語者。用密陀僧末一匕。茶調服。即愈。昔有人伐薪爲狼所逐。而得是疾。或授此方而愈。又一軍校採藤逢惡蛇。病此亦用之而愈。此乃驚則氣亂。密陀僧之重以去怯而平肝也。其功力與鉛丹同。故膏藥中用代鉛丹云。(李時珍)

部可外敷。不可內服。此藥難得真者。銷銀爐底。乃硝銅之氣所結。能爛一切物。故益不宜輕用。(醫希雅)

②密陀僧製法。先以鉛入鍋。煮。用錘再爛。令與天空養氣相合。變作黃粉。即黃丹。隨將該粉攪出。復用烈火煮透。俟冷凝結。即成爲密陀僧。不入服劑。製膏或和入別藥。作收口膏。凡瘡科皮膚等症。不能收口者。以此膏貼之。(西藥略釋)

【密香】即沈香之古籍別名。典見綱目。詳「沈香」條。

③密陀僧堅重。椎破如金色者佳。(寇宗奭)

【密蒙花】 命名 本品花序繁密。蒙茸如錦簇。故名。

④今嶺南閩中。銀銅治虛。亦有之。是銀鉛腳。其初採破時。銀銅相雜。先以鉛同煎。鍊。銀隨鉛出。又採山木。燒灰。開地作爐。填灰其中。謂之灰池。置銀鉛於灰上。更加火煨。鉛溶。灰下。銀住灰上。罷火候冷。出銀。其灰池感金銀氣。積久成此物。(蘇頌)

基本 屬馬錢科。爲密蒙之花。產地 陳仁山藥物生產辨云。密蒙花產陝西興安府。漢中府。湖北宜昌府。均有出。又有一種俗稱明花珠。實磨盆草仁。產湖南湖北兩省。

⑤密陀僧能治野雞斑點。

形態 密蒙花樹高丈餘。葉經

⑥密陀僧能治野雞斑點。

十一畫 密

⑦密陀僧能治野雞斑點。

一四一

⑧密陀僧能治野雞斑點。

密

⑨密陀僧能治野雞斑點。

密

【寄童】卽桑寄生之古籍別名。與見和漢藥考。詳「桑寄生」條。

【密陀僧】 命名 密陀沒多。皆梵語也。

古鑄別名 沒多僧。(唐本)爐底。(綱目)灰坯。陀僧。理文石。甜陀。淳子。甜面。淳子。(和漢藥考)丹錠。(西藥名)銀池。淡銀。(藥物生產辨)

外國名詞 Litharyum.

(拉丁) Litharge. (英) Bihig-latte. (德)

產地 陳仁山藥物生產辨云。

密陀僧各屬有出。此乃傾銀爐之爐底也。又名銀池。又名淡銀。西藥名丹錠。

形態 密陀僧爲粉末或鱗片狀之塊。色黃或紅黃。無臭無味。水不能溶解。稀硝酸能溶解之。又浸於稀硝酸中。則夾雜其間之銅鐵。均可除去。

種類 帶灰色者謂之銀密陀僧。現黃色者謂之金密陀僧。品質相同。惟因色彩而區別耳。

製法 雷敦曰。凡使搗細。安瓷鍋中。重紙袋盛。柳蛙末焙之。次下

東流水。浸滿。火煮一伏時。去柳末。紙袋取用。又精鍊銀鑛之際。熱鑛石末。加入鐵屑。除去硫黃。加鉛熔合。再使鉛融化。令吸收於木灰中。

依精鍊之灰吹法。而造出副產物。是爲密陀僧。或祇將鉛鑛化。使觸空氣酸化而製之。

性質 鹹。辛。平。有小毒。成分 在化學上謂之酸化鉛(PbO)

效能 刮痰。鎮驚。配合膏藥。用爲治瘡藥。溼疹。水疱疹。

作用 能收縮黏膜。及潰瘍處之血管。使分泌減少。同時又與白血球化合。而成蛋白化鉛。令患處與空氣隔離。故可免除腐爛。

主治 久痢。五痔。金瘡。面上瘰癧。面膏藥用之。

歷代記述攷證 【宋】大明日華諸家本草論密陀僧曰。鎮心補五臟。治驚癇。咳嗽。嘔逆。吐痰。【明】李時珍本草綱目論密陀僧曰。療反胃。消渴。瘧疾。下痢。止血殺蟲。消積。治諸瘡。消腫毒。除胡臭。染髭髮。

【明】繆希雍本草經疏論密陀僧曰。密陀僧感銀銅之氣而結。故其

味鹹。辛。氣平。有小毒。久痢。五痔。大腸。溼熱。積滯。也。辛。主散結滯。鹹。主潤下。除熱。大腸。清寧。則久痢。五痔。自瘳。矣。體重。能消。磨。堅。積。味。鹹。能入血。涼。血。故。又。主。金。瘡。及。滅。面。上。瘰。癧。也。【清】黃宮繡本草求真論

密陀僧曰。密陀僧係出銀坑之中。眞者難得。今用多屬傾銀爐底。味辛。而鹹。氣平。小毒。大率多屬祛滯除熱。消積。滌痰。鎮陰之品。故書載

能絕癰。除痢。安驚。定魄。止血。散腫。消積。殺蟲。及療腫毒。數凍瘡。解狐臭。染髮。非其痰。祛熱。清滯。除重鎮。鎮堅。則病。易。克。去。乎。但。此。出。於銷。銀。爐。裏。則。有。銅。氣。雜。入。不。堪。入藥。且。只。可。以。外。敷。不。可。以。作。服。餌也。若入藥須煮一伏時。

國外學說 日本和漢三才圖會曰。灰吹之滓也。有金密陀僧。銀密陀僧二種。以黃白色別之。用煎湯藥者少。膏藥或桐油漆中始用之。英美學說謂密陀僧化名鉛養。係從鉛礦製出。其結冰如鱗片。在古人早已知有此質。爲提金提銀工內所常用。至鉛中分銀之工內亦用之。尋常出售之密陀僧。常含

鐵少許。又含銅。鉛。養。炭。養。(二)破養。(三)與土質等。其毒質。與鉛之別質相同。匠之以鉛爲業者。每易受其害。如與流質油相和。成密陀僧膏藥。可爲數種膏藥內之要質。不可不。服。外。用。能。作。貼。膏。類。至。解藥之解此毒者。須先服土朴硝。或洋朴硝。後服吐瀉瀉劑。解毒之後。服鴉片止痛。又服牛奶與雞蛋清。等。用密陀僧貼膏四分。黃蠟一分。杏仁油三分。或香油亦可。共化勻。攤布條上。以裹患處。治溼癬甚效。

(密陀僧油膏方) 又密陀僧膏二十四兩。松香三兩二錢。洋肥皂一兩六錢。先將密陀僧膏煑熱。另以一鐵將松香洋肥皂。煮熔然後加入密陀僧膏。和勻。此膏宜以布開調。凡割症。用以合口甚妙。(密陀僧合口膏方) 又密陀僧膏二十

七兩。洋肥皂四兩八錢。松香八錢。照合口膏方製之。製成後。用布開紙開調。均可。凡瘡科及皮膚等症。不能收口者。以此膏貼之。(密陀僧收口膏方) 配合應用 治痰結胸中不散。密陀僧一兩。醋水各一盞。煎乾

典見新修本草圖經。詳「冰片」條。
①即百部之古籍別名。典見和漢藥考。詳「百部」條。

【婆律香膏】

原名 龍腦香膏

命名 本品即冰片製成之膏。
故名

主治 耳聾。摩一切風。

【婆娑石】

古籍別名 摩娑石。
(綱目)

產地 生南海。

形態 婆娑石爲石類之一種。

其色綠無斑點。或謂海南有山。五色叢峙。其下水流如箭。舟過其下。人以刀斧擊取。其石有光焰。燒之作硫黃氣。可供藥用。

採取 以有金星而能磨成乳汁者佳。以手磨點。鷄冠血。當化爲水者真。

性質 甘。淡。寒。無毒。

主治 解一切藥毒。瘡。疫。熱。悶。頭痛。

參攷資料 婆娑石。能置五金。伏三黃。制鉛汞。(李時珍)

【婆娑奶】即大生地之古籍別名。典見和漢藥考。詳「大生地」條。

【婆娑酸】即石蒜之古籍別名。典見和漢藥考。詳「石蒜」條。

【婆娑鐵線包】即羅摩之俗名。詳「羅摩」條。

【婆娑】即百部之古籍別名。典見和漢藥考。詳「百部」條。

【婆娑草】即百部之古籍別名。典見日華諸家本草。詳「百部」條。

【婆羅得】

古籍別名 婆羅勒。
(綱目)

產地 生於波斯。

形態 婆羅得爲喬木類之一種。樹似柳。實如蓖麻子。以指甲抓之。即有汁出。其子可供藥用。

性質 辛。溫。無毒。

主治 冷氣塊。溫中補腰腎。破痼癖。可染髮。髮令黑。

【婆羅門皂莢】即阿勃勒之古籍別名。典見本草拾遺。詳「阿勃勒」條。

【婆羅門參】即仙茅之古籍別名。典見圖經本草。詳「仙茅」條。

【婆羅勒】即婆羅得之古籍別名。典見綱目。詳「婆羅得」條。

【婆羅樹】即天門冬之古籍別名。典見綱目。詳「天門冬」條。

【婢艇魚】即比目魚之別名。典見臨海志。詳「比目魚」條。

【婢雲魚】即比目魚之古籍別名。典見綱目。詳「比目魚」條。

【婪尾春】即白芍之古籍別名。典見和漢藥考。詳「白芍」條。

【宿田翁】即狼尾草之古籍別名。典見陸璣詩疏。詳「狼尾草」條。

【宿芽】即黃芽之古籍別名。典見本草集註。詳「黃芽」條。

【寄生】即鐵指甲之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「鐵指甲」條。

【寄生草】即桑上寄生之別名。性質功能。詳「桑寄生」條。

【寄生蟲】即寄居蟲之古籍別名。典見綱目。詳「寄居蟲」條。

【寄居】即蝸牛之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蝸牛」條。

【寄居蟲】

基本 本品爲蟲之寄居於螺殼中者。

古籍別名 寄生蟲。(綱目) 巢螺。蟬蟬。(動物辭典)

外國名 寄居蟲 Pagurus 或 Eupagurus Hermit Crab Enastodierkebs (拉丁) ヤトカリ (日本)

基本 係節肢動物甲殼類胸甲類十腳類長尾類寄居蟲科之寄居蟲。

產地 生海涯及湖澤間。

形態 寄居蟲爲蟲類之一種。其頭胸部堅硬。被剛毛。有肢腹部。柔軟觸角。稍長。第一對腳。形大爲鉗狀。全體赤色。或蒼黑。大者長四寸。恒寄居螺類之遺殼。可供藥用。



寄居蟲

主治 益顏色。美心志。

參攷資料 海南一種似蜘蛛。入螺殼中。負殼而走。觸之即縮。如螺。火炙乃出一名。特無別功用。(陳藏器) 案孫愐云。寄居在龜殼中者名曰寄居。亦非一種也。(李時珍)

【寄居】即桑寄生之古籍別名。典見本經。詳「桑寄生」條。

度。亦治濕漏諸癰。(張文仲備急方)

●治瘡傷水毒。商陸根搗炙。布裏熨之。冷即易之。(千金方)

用量 五分至一錢

施用宜忌 凡脾虛而非邪實者禁用。

參攷資料 ①方家不甚用。惟

療水腫。切生根。雜鯉魚。煮作湯服。道家乃散用之。及煎釀服。皆能去尸蟲。見鬼神。其實子亦入神藥。花名荔花。尤良。(陶弘景) ②商陸苦寒。其性下行。專於行水。方家治腫

滿。小便不利者。以赤根搗爛。入麝香三分。貼於臍心。以帛束之。得小便利。即腫消。又治溼水。以指畫肉上。隨散不成文者。用白商陸。香附子炒乾。出火毒。以酒浸一夜。日乾

爲末。每服三錢。米飲下。或以大蒜同商陸煮汁服亦可。其莖葉作蔬食。亦可治腫疾。李時珍 ③赤者但可貼腫服之。傷人。痢血不止。殺人。令人見鬼神。(蘇恭) ④俗名章柳根。多生於人家園圃中。春生苗

高三四尺。青葉如牛舌而長。莖青赤。至柔脆。夏秋開紅紫花。作衆根

如蘿蔔而長。八九月採之。爾雅謂之薺。廣雅謂之馬尾。易經謂之

莫陸。雷斅曰。一種赤苗。苗葉絕相類。不可服之。有傷筋骨。消腎之毒。惟花白年多者。仙人採之作脯。可

下酒也。(蘇頌) ⑤商陸昔人亦種之。爲蔬。取白根及紫色者。擊破作

畦栽之。亦可種子。根苗莖並可洗蒸食。或用灰汁煮過亦良。服丹砂

乳石食之尤利。其赤與黃色者有毒。不可食。按周憲王救荒本草云。

章柳幹粗似雞冠。花幹微有線楞。色微紫。赤極易生植。(李時珍)

【商陸花】 原名 荔花。主治 人心昏塞。多忘喜臥。取花陰乾。百日搗末。日暮水服。方寸匕。乃臥。思念所欲事。即於眠中醒悟也。

【商陸根】 即商陸之處方用名。詳「商陸」條。

【商陸葉】 性質 辛。平。有毒。效能 行水利便。通

腸消腫。主治 腫瘰。

【商庚】 即蠶之古籍別名。典見爾雅。詳「蠶」條。

【商草】 即貝母之古籍別名。典見和漢藥考。詳「貝母」條。

【商棘】 即天門冬之古籍別名。典見和漢藥考。詳「天門冬」條。

【商殼】 即枳殼之古籍別名。典見和漢藥考。詳「枳殼」條。

【間荊】 即接續草之別名。性質功能。詳「接續草」條。

【國大李仁】 即郁李仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳「郁李仁」條。

【國木皮】 即土骨皮之古籍別名。典見和漢藥考。詳「土骨皮」條。

【國丹】 即黃丹之古籍別名。典見和漢藥考。詳「黃丹」條。

【國老】 即甘草之古籍別名。典見別錄。詳「甘草」條。

【國豆】 即豌豆之古籍別名。典見綱目。詳「豌豆」條。

【執火】 即蠶之古籍別名。典見綱目。詳「蠶」條。

【聖石】 即石灰之古籍別名。典見和漢藥考。詳「石灰」條。

【聖灰】 即石灰之古籍別名。典見本經。詳「石灰」條。

【聖蠶】 即蚯蚓之古籍別名。典見綱目。詳「蚯蚓」條。

【華】 ①即旱芹菜之古籍別名。典見新修本草圖經。詳「旱芹菜」條。

②即草烏頭苗之古籍別名。典見本草拾遺。詳「草烏頭」條。

【華草】 即葫蘆之古籍別名。典見別錄。詳「葫蘆」條。

【華堊菜】 即紫花地丁之古籍別名。典見植物圖考。詳「紫花地丁」條。

【華葵】 ①即石龍芮之古籍別名。典見山海經。詳「石龍芮」條。

②即早芹菜之古籍別名。典見新修本草圖經。詳「早芹菜」條。

【華葉】 即香薷之古籍別名。典見和漢藥考。詳「香薷」條。

【婆子】 即水毬之別名。詳「水毬」條。

【婆木香】 即煎香之別名。詳「煎香」條。

【婆那婆】 即波羅蜜之古籍別名。典見綱目。詳「波羅蜜」條。

【婆固脂】 即補骨脂之原名。詳「補骨脂」條。

【婆固紙】 即補骨脂之古籍別名。典見和漢藥考。詳「補骨脂」條。

【婆律香】 ①即冰片之古籍別名。

成分似太輕率。其利尿之理由。今尙不明。日本和漢藥考曰。世俗每以山牛蒡爲商陸。實則同名而異物也。山牛蒡爲屬於菊科之宿根草。根似牛蒡。故名山牛蒡。莖高二三尺。上葉葉柄短。葉形卵圓或橢圓。邊緣有鋸齒。下葉葉柄長。似牛蒡之葉。莖與葉俱有灰白色之茸毛。至秋生蕾。形圓如球。而有刺。旋開深紫色之喇叭花。作頭狀花序排列。其嫩葉如商陸。可供食用。老葉用以引火。山牛蒡之嫩葉。浸以酸汁。可供食用。其乾根煎服。不見有害。生根之絞汁。則毒性猛烈。服之往往致死。島根土人。秋分掘山野自生之山牛蒡根。以小刀剝去外皮。浸鼓汁。或作蜜餞食之。以治風毒水腫。脚氣諸症。頗有效。牛蒡根爲菊科植物之宿根草。歐洲各國多產之。莖與花俱似牛蒡。入藥以野生者爲佳。故有山牛蒡根之名。近人譯作商陸。其實與真正之商陸相混。此根外作灰褐或灰白色。有皺裂。形如紡錘。內部類白色。橫斷面爲放線狀。味甘。性微黏。其生根有一種烈臭。爲發汗利尿藥。

十一 薑商

以治慢性皮膚病。微毒。痛風等症。用此藥一〇・〇至二〇・〇。製成煎劑服之。成分爲伊努寧(Insulin)糖質。鞣酸等。山牛蒡根。爲商陸科植物之宿根草。產於北美及非洲之北部。與歐洲之南部。爲商陸之一種。此可充真正之商陸。服〇・〇六至〇・三。已有利尿變質之效。若服至〇・五或二・〇。必起吐瀉。商陸之基本植物。同名異種者頗多。一說中國產之商陸。與日本產爲異種云。

辨偽 鄭育巖曰。僞名次商陸。卽俗所稱豬卜卜者。其性無從稽考。萬不可服。按商陸氣味辛平有毒。主治水腫。癰腫。殺鬼精物。近道所在有之。春生苗高二三尺。莖青赤。極柔脆。葉如牛舌而長。夏秋開花作朶。根如蘿蔔。似人形者有神。有赤白二種。白根者花白。赤根者花赤。白者入藥。赤者毒更甚。俗名羊柳。不可服。服之見鬼神。嗟。同是一種根。色赤者。尙不可用。豬卜卜之異種乎。曹炳章曰。按商陸八九月出。新各處皆出。吾江浙市上通用白商陸。赤者不入藥。服之有消癰。解胃之毒。故勿餌。鄭君所云豬卜卜。不知其形狀若何。因未曾見過。不敢妄評。

配合應用 ①治濕氣脚軟。章柳根切小豆大。煮熱。更以綠豆同煮爲飯。每日食之。以瘳爲度。甚效(斗門方)

②治水腫氣滿。用白商陸根去皮。切如豆大。一大盞。以水二升。煮一升。更以粒米一大盞。同煮成粥。每日空心服之。取微利。不得難食。(外臺秘要方)用白商陸六兩。取汁半合。和酒半升。看人與服。當利下水。取效。(千金方)用白商陸一升。羊肉六兩。水一斗。煮取六升。去滓和葱。鼓作臠食之。有效。(梅師方)

③治腹中暴脹。有物如石。痛刺啼呼。不治百日死。多取商陸根。搗汁。或煮之。以布藉腹上。安藥勿覆。冷卽易。晝夜勿息。(千金方)

④治痰癖如石。在脇下。堅硬。生商陸根汁一升。杏仁一兩。浸去皮。搗如泥。以商陸汁絞杏泥。火煎如餠。每服藥許。空腹熱酒服。以利下惡物爲度。(聖惠方)

⑤治產後腹大。堅滿。喘不能臥。白聖散用章柳根三兩。大戟一兩。半。甘遂炒一兩。爲末。每服二三錢。熱湯調下。大便宜利。爲度。此乃去水聖藥也。(潔古保命集方)

⑥治五尸注痛。腹痛。脹急。不得喘息。上攻心胸。旁攻兩脇。痛。或嘔塊。涌起。用商陸根。然以蠶盛。更互熨之。取效。(肘後方)

⑦治小兒痘毒。小兒將痘發熱。失表。忽作腹痛。及膨脹。唇氣乾。蟹亂。由毒氣與胃氣相搏。欲出不得出也。以商陸根和葱白。搗傅臍上。斑止。瘡出。方免無虞。(摘玄方)

⑧治耳卒熱。腫。以生商陸。削尖。納入耳。日再易。(聖濟方)

⑨治喉卒攻痛。商陸切根。炙熱。隔布熨之。冷卽易。立愈。(圖經本草方)

⑩治癰腫。喉痛。攻痛。生商陸根。搗作餅。置臍上。以艾柱於上。灸三四壯。良。(外臺秘要方)

⑪治一切腫毒。商陸根和鹽少許。搗傅。日再易之。(千金方)

⑫治石難如石。堅硬。不作膿者。生章陸根。搗。之。燥。卽易。取軟。爲

外皮。橫切片有風曲凹凸之輪層。性柔艱。不易破折。肉色白。帶粉性。無甚臭味云。但第四版改正。已刪去(和漢藥考)



商陸

採取 二月八月。採根日乾。

製法 雷斅曰。取花白者根。銅刀刮去皮。薄切以東流水浸兩宿。漉出架甑。蒸以黑豆葉一重。商陸一重。如此蒸之。從午至亥。取出。去豆葉。曝乾。剉用。無豆葉以豆代之。

性質 辛平。有毒。

成分 商陸根中有毒成分。名曰賈脫拉克託克辛 (Phytolactoxin, $C_{24}H_{40}O_6$)。為無結晶之華爾斯。水不能溶解。遇酒精即全溶解。然加水沖淡。則再起沈澱。此有毒成分。在商陸根中。約含有四%至五%。析出之後。以水製成。越幾斯。行生理之試驗。毫無效果。復試以酒製越幾斯。則功效顯著。效能 大瀉臟腑水飲。專作利

尿藥。

主治 水腫疝瘕瘰癧。除癰腫。殺鬼精物。(本經)療胸中邪氣。水腫。癰瘕腹滿。洪直疏五臟。散水氣。(別錄)

歷代記述攷證

【唐】甄權藥

性本草論商陸曰。渴十種水病。喉痺不通。薄切醋炒。塗喉外良。【宋】大明日華諸家本草論商陸曰。通大小腸。瀉蠱毒。墮胎。婦人產後。傳惡瘡。【明】李士材本草圖解論商陸曰。商陸酸辛。有毒。通大小腸。疎澀水腫。攻消痰癖。搗爛傳腫毒。喉痺。小兒痘毒。同葱白填臍。白者可入湯散。赤者但堪外貼。古實云。其味酸辛。其形類人。其用療水。其效如神。與大戟甘遂。異性同功。虛者不可用。止用貼臍。小便利。即腫消也。腫脹。因脾虛者多。若誤用之一時。雖效。未幾再作。決不能救。【清】黃宮繡本草求真論商陸曰。商陸辛酸苦寒。有毒。功專入脾行水。其性下行最峻。有排山倒海之勢。功與大戟。芫花。甘遂相同。故凡水腫水脹。疝瘕癰腫。喉痺不通。溼熱蠱毒。惡瘡等症。服此即能見效。如仲景

牡蠣澤瀉散之用商陸。以治大病後腰以下腫。用此急迫以散之也。若脾虛水腫。因服輕劑未愈。遂用苦劣有毒純陰之藥。迅迫效。雖稍見。未幾即發。決不可救。取花白者良。赤者只堪貼臍。黑豆湯浸。蒸用。得蒜良。【清】黃元御長沙藥解論商陸曰。商陸根酸苦澀瀉。專於利水。功力迅急。與羌遂大戟相同。得水更利。善治水氣腫脹之病。神效非常。兼療癰腫。痰癖諸證。赤者大毒。用白者鮮根搗汁。服後勿飲水。【清】鄒澍本經疏證論商陸曰。異哉。李瀕湖謂商陸沈降而陰。其性下行。專於治水。與大戟甘遂異性同功也。夫所貴於治本經者。為能審名辨物。知其各有所宜耳。若商陸之功。不過與大戟甘遂埒。則用大戟甘遂已耳。又何取於商陸哉。夫大戟甘遂味苦。商陸味辛。苦者取其降。辛者取其通。降者能行逆。折橫流之水。通者能行壅滯停蓄之水。取義既殊。功用遂別。豈得以此况彼也。仲景書中十棗湯用大戟甘遂。大陷胃湯。甘遂半夏湯。大黃甘遂湯。均用甘遂。不用大戟。則

甘遂之與大戟。固自有異矣。獨於大病差後。腰以下有水氣者。牡蠣澤瀉散中。偏取商陸。謂非商陸有異於大戟甘遂乎。商陸不用赤花。赤根。獨有取於白花白根者。蓋以其色之白。恰配其味之辛。以為攻堅破頑之用。下病者上取。上病者下取。牡蠣澤瀉散。治腰以下水氣不行。必先使商陸事。從肺及腎。開其來源之壅。而後牡蠣海藻之。輕堅。蜀漆澤瀉之。開洩。方能得力。用栝樓根者。恐行水之氣過。傷上焦之陰。仍使之從脾吸陰。還歸於上。與常山之蛇。擊其首則尾應。擊其尾則首應者。不殊也。是故商陸之功。在決壅導塞。不在行水。疏利。明乎此。則不與他行水之物。同稱混指矣。

國外學說 日本學說謂商陸者。自昔為有名之利尿劑。本草綱目云。療水。其效如神。櫻村清德氏。確定其酒精越幾斯。於諸般水腫。有顯效。又長井氏。摘出一種華爾斯樣之化合物。命名曰「フネトラツトキシン」。然依動物試驗之結果。即以之為商陸之利尿

顎比上顎長。口略向上。殆無齒脊。鰭小。胸鰭鰭亦小。尾分叉。肉可供食與藥用。

性質 甘。平。無毒。
主治 開胃暖中作藥尤良。

【勒魚鰓及脊骨】 疾以一寸入七寶飲酒水各半煎。露一夜服。【勒魚】即勒魚之乾者與見綱目詳「勒魚」條。

【瓠瓜】即瓠蘆實之無柄而圓大形扁者。性質功能詳「瓠蘆」條。

【區余】 基本 區余爲雜草類之一種。可供藥用。
性質 辛。無毒。
主治 心腹熱癰。

【參三七】 即三七之處方用名。詳「三七」條。
【參貝陳皮】 即橘皮用參貝製成者詳「橘皮」條。

【參果根】 古籍別名 百連。烏藜。風莖。鹿蒲。(別錄)
形態 參果爲雜草類之一種。根生百餘根。根有衣裹莖。可供藥用。

採取 三月三日採根。

性質 苦。有毒。
主治 鼠瘻。

【參軍肉】 即豬肉之古籍別名。與見崔豹古今注。詳「豬肉」條。

【庵叭香】 即藏香之別名。性質功能詳「藏香」條。

【啄木鳥】 命名 本品斷裂樹木取其蠶食故名。
古籍別名 斷木鳥。(爾雅)鷲。(綱目)青鷲。(動物辭典)赤色者名山啄木鳥。(圖經本草)

外國名詞 Ficus sp. (拉丁) Wood-pecker (英) Specht (德) キツツキ 或 アテグラ (日本)

基本 屬脊椎動物鳥類攀禽類啄木鳥科。
產地 出山林間。及原野之樹洞中。

形態 啄木鳥。爲林禽類之一種。其嘴尖直而堅。嘴根有剛毛。接於額而開鼻孔。舌細長。尖端具逆鉤。伸縮自如。體之上。面。概青色。雄之頭部紅色。雌者灰色。眼下有紅斑。覆翼羽。稍帶黃。手翼暗褐。而外翼有多數白斑。腰部有鮮黃斑。體下淡綠。有暗色橫斑。尾羽軸剛直。

上暗綠。下灰色。脚短。二趾前。二趾後。皆具尖銳之鉤爪。便於攀木。常叩樹幹。覓蠶食之。其肉可供食與藥用。

性質 甘。鹹。平。無毒。

主治 痔瘡。及牙齒疳。蟲牙。燒存性研末。納孔子中。不過三次。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論啄木鳥肉曰。追勞蟲治風癰。

參攷資料 ①淮南子云。啄木愈。蟬以類相攝也。荆楚歲時記云。野人以五月五日。取啄木主齒痛。(劉禹錫)②追勞治癰治癰。皆取制蟲義也。(李時珍)

【啄木鳥舌】 主治 齲齒作痛。以綿裹尖。咬之。

【啄木鳥血】 主治 庚日向西熱飲。令人面色如朱。光彩射人。

【商陸】 原名 蓮藕。命名 本品能逐蕩水氣。故曰蓮藕。說爲商陸。又說爲當陸。北音說爲章柳。或云枝枝相植。葉葉相當。故曰當陸。或云多當陸。

路而生也。
處方用名 商陸根。
古籍別名 夜呼。(本經)當陸。(廣雅)莧陸。(易經)昌陸。章陸。鹿神。文章。柳牛舌根。杜大黃。樟柳根。(和漢考藥)

外國名詞 Radix Phytolaccae (拉丁)

基本 屬商陸科。爲山牛蒡之根。

產地 凡山野川谷間之陰地。恒多生爲。陳仁山藥物生產辨云。商陸產廣東清遠。

形態 商陸爲多年宿根草。莖高三四尺。葉互生。爲長卵圓或長橢圓形。似菸葉而小。且有光澤。夏日草梢葉腋間。開有梗無萼之小白花。作總狀花序排列。果實爲漿果。色紫黑。其根形似蘿蔔根。外面淡褐色。內部灰白色。出售者多截作三寸許。再切成片。日本藥局方載入商陸。略謂商陸係採其根莖。乾而用之。根頗彎曲。縱截面有污白色之條紋。紋皆隆起。似行行排列。其左右兩面。被以似紅似白之

成帝時。獵者於終南山見一人。無衣服。身生黑毛。跳坑越澗如飛。乃密圍獲之。去秦時二百餘載矣。事出葛洪抱朴子書中。(李時珍) 參攷資料 兜納香氣味甘溫。(陳藏器)

【兜萵婆香】即兜萵香之古籍別名。典見綱目。詳「茴香」條。【兜香】之古籍別名。典見楞嚴經。詳「薑香」條。

【兜鈴苗】即馬兜鈴之古籍別名。典見和漢藥考。詳「馬兜鈴」條。

【剪刀草】形態 獨莖高尺許。對葉尖長。微似鳳仙花葉而無齒。面綠背青白。梢端抽長條。結黃實。如慈仁而小。層綴如穗而疏。可供藥用。

【側柏瘰】即柏瘰之別名。詳「柏瘰」條。

【側梨】即陸釐之古籍別名。典見新修本草圖經。詳「陸釐」條。

【兜木香】即返魂香之別名。性質功能。詳「返魂香」條。

【兜納香】性質 辛平。無毒。主治 溫中除暴冷。

歷代記述攷證 【唐】李珣海藥本草論兜納香曰。惡瘡腫癰。止痛生肌。並入膏用。燒之辟遠近惡氣。帶之夜行。壯膽安神。與茅香柳枝煎湯浴小兒。易長。

【剪金花】即王不留行之古籍別名。條。

【剪金子】即王不留行之古籍別名。典見和漢藥考。詳「王不留行」條。

【剪金花】即王不留行之古籍別名。條。



剪刀草

名。典見諸家本草。詳「王不留行」條。

【剪紅羅】即剪春羅之古籍別名。典見綱目。詳「剪春羅」條。

【剪草】形態 生山澤間。一種。其葉似茗而細。狀如茜草。又如細辛。或謂即茜草。其根可供藥用。

採取 二月三月。採根曬乾用。

性質 苦涼。無毒。

主治 諸惡瘡。疥癬風癢。癰蝕。有蟲。浸酒服。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論剪草曰。主一切失血。

參攷資料 上部血。須用剪草。牡丹皮。天門冬。麥門冬。(張元素) 許學士本事方云。剪草治勞瘵。吐血損肺。及血妄行。名曰神傳膏。其法。每用一斤。淨洗晒乾。未入生蜜二斤。和爲膏。以器盛之。不得犯鐵器。一日一蒸。九蒸九曝。乃止。病人五更起。面東坐。不得語言。以匙抄藥四匙。食之。良久。以稀粟米飲壓之。藥只冷服。米飲亦勿太熱。或吐或否。不妨。如久病肺損。咯

血。只一服。愈。尋常嗽血妄行。每服一匙可也。有一貴婦病瘵。得此方。九日藥成。前一夕病者夢人戒令翌日勿亂服藥。次日將服藥。屋上土墜器中。不可用。再合成。將服。爲籍覆器。又不得食。再合未就。而夫人卒矣。此藥之異。有如此。若小小血妄行。只一啜而愈也。此藥絕妙。若此。而世失傳。惜哉。(李時珍)

【勒佉】即紫鐵之古籍別名。典見綱目。詳「紫鐵」條。

【勒母】即貝母之古籍別名。典見和漢藥考。詳「貝母」條。

【勒草】即葎草之古籍別名。典見別錄。詳「葎草」條。

【勒馬宣】即大戟之古籍別名。典見和漢藥考。詳「大戟」條。

【勒魚】命名 本品魚腹。有硬刺。勒人。故名。

古籍別名 鰻。動物辭典(乾名者勒鰻。綱目)

基本 係脊椎動物魚類喉鰓類。鰻科爲勒魚之肉。

產地 出東南海中。

形態 勒魚爲鱗類之一種。其形似鰻。亦似鱗。呈棒狀。眼大。下

血。只一服。愈。尋常嗽血妄行。每服一匙可也。有一貴婦病瘵。得此方。九日藥成。前一夕病者夢人戒令翌日勿亂服藥。次日將服藥。屋上土墜器中。不可用。再合成。將服。爲籍覆器。又不得食。再合未就。而夫人卒矣。此藥之異。有如此。若小小血妄行。只一啜而愈也。此藥絕妙。若此。而世失傳。惜哉。(李時珍)

【勒佉】即紫鐵之古籍別名。典見綱目。詳「紫鐵」條。

【勒母】即貝母之古籍別名。典見和漢藥考。詳「貝母」條。

【勒草】即葎草之古籍別名。典見別錄。詳「葎草」條。

【勒馬宣】即大戟之古籍別名。典見和漢藥考。詳「大戟」條。

【勒魚】命名 本品魚腹。有硬刺。勒人。故名。

古籍別名 鰻。動物辭典(乾名者勒鰻。綱目)

基本 係脊椎動物魚類喉鰓類。鰻科爲勒魚之肉。

產地 出東南海中。

形態 勒魚爲鱗類之一種。其形似鰻。亦似鱗。呈棒狀。眼大。下

浸或炒或生用。

國外學說 英美學說謂側柏

產中國、西國等處。取該樹之葉與子。可爲藥品。然惟葉扁而側生者。始可入藥用。其子之功用。能利小便。行氣。祛風。主治白淋。腹症。作泡。水或服油酒等。處方以側柏子一兩。或用葉亦可。水十六兩。泡一刻。鐘。濾渣爲度。分三次服。能利小便。治老人小便閉甚效。(側柏泡水方)又側柏子四錢。麥糠八兩。甘草二錢。煮稠。乘熱敷之。凡毒瘡初腫未潰者。以側柏子搗爛。和別藥塗之最良。(側柏子糊方)

配合應用 服松柏法。孫真人枕中記云。嘗以三月四月。採新

生松葉。長三四寸許。并花蔭陰乾。又於深山巖谷中。採當年新生柏葉。長二三寸者。陰乾爲末。白蜜丸。如小豆大。常以日出時手持八十一丸。以酒下。服一年。延十年命。服二年。延二十年命。欲得長肌肉。加大麻巨勝。欲心力壯健者。加茯苓人參。此藥除百病。益元氣。滋五臟六腑。清明耳目。強壯不衰。老年益壽神驗。用七月七日露水丸

之更佳。

神仙服餌。五月五日。採五方

側柏葉三斤。遠志去心二斤。白茯苓去皮一斤。爲末。煉蜜和丸。梧子大。每以仙靈脾酒下三十丸。日再服。並無所忌。勿示非人。

治中風不省。涎潮口禁。語言

不出。手足羸曳。得病之日。便進此藥。可使風退氣和。不成廢人。用柏藥一握。去枝。葱白一握。連根研如泥。無灰酒一升。煎二十沸。溫服。如不飲酒。分作四五服。方進他藥。(楊氏家藏方)

治時氣瘴疫。社中西南柏樹

東南枝。取暴乾研末。每服一錢。新水調下。日三四服。(聖惠方)

治霍亂轉筋。柏葉搗爛裹脚

及煎汁淋之。(聖惠方)

治吐血不止。用柏葉米飲。服

二錢。或蜜丸。或水煎服。並良。(聖惠方)

治憂恚嘔血。煩滿少氣。胃中

疼痛。柏葉爲散。米飲調服二方寸匕。(聖惠方)

治衄血不止。柏葉。榴花研末

吹之。(普濟方)

治小便尿血。柏葉。黃連焙研。酒服三錢。(濟急方)

治大腸下血。隨四時方向採

側柏葉燒研。每米飲服二錢。王煥之舒州病。此陳宜父大夫傳方。二服愈。百一選方)

治酒毒下血。或下痢。嫩柏葉

九蒸九晒。二兩。陳槐花炒焦一兩。爲末。蜜丸。梧子大。每空心溫酒下四十丸。(普濟方)

治蟲痢下血。男子婦人。小兒

大腹下黑血。茶脚色。或膿血如淀色。柏葉焙乾爲末。與黃連同煎爲汁服之。(圖經方)

治小兒洞痢。柏葉煮汁。代茶

飲之。(經驗方)

治月水不斷。側柏葉炙。芍藥

等分。每用三錢。水酒各半煎服。室女用側柏葉。木賊炒微焦。等分爲末。每服二錢。米飲下。(聖濟方)

治湯火燒灼。柏葉生搗塗之

繫定二三日。止痛滅癢。(圖經方)

治鼠瘻核痛。未成膿。以柏葉搗塗。熬鹽熨之。氣下卽消。(姚僧坦集驗方)

治大風癢疾。眉髮不生。側柏

葉九蒸九晒爲末。煉蜜丸。梧子大。每服五丸。至十九日。三夜一服。百日即生。(聖惠方)

治頭髮不生。側柏葉陰乾作

末。和麻油塗之。(梅師方)

治頭髮黃赤。生柏葉末一升

猪膏一斤。和丸彈子大。每以布裹一丸。納泔汁中。化開沐之。一月色黑而潤矣。(聖惠方)

用量 錢半至三錢

施用宜忌 凡無溼熱者禁用

畏菊花羊蹄諸石及麵麴瓜子牡蠣桂爲之使

著名方劑 柏葉湯。治吐血不

止。(金匱方)柏葉乾薑各三兩。艾三把。上三味。以水五升。取馬通汁一升。合煮。取一升。分溫再服。

參攷資料 柏性後調而耐

久。稟堅凝之質。乃多壽之木。所以可入服食道家以之點湯常飲。元且以之浸酒辟邪。皆有取於此。麋食之而體香。毛女食之而體輕。亦其證驗矣。毛女者。秦王宮人。關東賊至。驚走入山。飢無所食。有一老

公教喫松柏葉。初時苦澀。久乃相宜。遂不復飢。冬不寒。夏不熱。至漢

均是仁也。而所治大略相同如此。方書安心之藥。每用藥仁。稱心之丹。不遺柏仁。一方之中。往往連類而及。想有同等功效之故歟。(黃元御)

【側柏子殼】

主治 解脫霜如神用三錢炒

紅土三錢。同研爲末。用雞子清調服。服後作一寒顫。即愈。重者不過兩服。

【側柏油】

基本 係屬松杉科之側柏。爲該樹所榨

取之油脂。

產地 側柏油各省境內均有產。惟產於山西者最佳。

形態 本品受熱極易成溶液。冷則成結晶狀之塊粒。並耀烏黑色之瑩光。氣若松香。取之可供塗敷。與藥用。

主治 諸癰毒。赤遊丹。禿瘡。頭面耳部黃水瘡。

參攷資料 ①身面疣目。同松脂研勻塗之。數夕自失。(聖惠)

②本品殺蟲力最強。如壁蝨。匿藏板壁之空隙處。祇須滴少許於板壁縫內。蝨即盡死。③此物以竹箸挑

之。懸絲不斷者。爲真。

【側柏炭】即側柏葉焙炒成炭者之處方用名。詳「側柏葉」條。

【側柏枝節】

主治 黃汁酸。酒去風痺。歷節。

風。燒取豬油。療瘡疥及蟲癩良。

配合應用

①治霍亂轉筋。以煖物裹脚後。以柏木片。浸湯淋之。(經驗方)

②治齒齦腫痛。取柏枝燒熱。拄孔中。須臾蟲緣枝出。(聖惠方)

③治惡瘡有蟲。久不愈者。以柏枝節。燒瀝取油敷之。三五次。無不愈。亦治牛馬疥。(陳永本草方)

【側柏根白皮】

性質 苦平。無毒。

效能 涼血液。生毛髮。

主治 火灼。爛瘡。

配合應用 熱油灼傷。柏白皮以臘豬脂煎油。塗數瘡上。(肘後方)

【側柏葉】

原名 扁柏葉。命名 柏有多種。入藥宜用葉扁而側生者。故名。

藥方用名 側柏炭。扁柏葉。柏葉汁。

古醫別名 栴葉(綱目) 叢柏葉(和漢藥考)

外國名詞 Leaf of Arbor-vitae (英)

基本 爲松杉科側柏樹之葉。

產地 陳仁山藥物生產辨云。扁柏中國各省有。出廣東各屬。均有。但以清遠爲多。功用行氣祛風。利小便。行瘀血。

形態 側柏爲山野之常綠樹。本品作小鱗狀。酷類檜葉。

製法 雷斅曰。凡用。揆去兩畔。并心枝子。用糯泔浸七日。以酒拌蒸。一伏時。每一斤。用黃精自然汁十二兩。浸焙。又浸。又焙。待汁乾。用之。李時珍曰。此服食治法也。常用或生或炒。各從本方。

性質 苦微溫。無毒。

成分 主要素爲 pinipirin, kaolin, 餘爲揮發油。樹脂。單寧。

效能 涼血。止血。去風。理溼。用作婦人崩漏及吐衄之止血藥。亦爲淋疾之利尿藥。

作用 入胃後。略能促進胃分泌。同時又能防止其過量之酸酵。

入腸能增加腸之斂性。至血中。稍有收縮血管。凝固血球之功。

主治 吐血衄血。痢血。崩中。赤白。輕身益氣。令人耐寒暑。去溼痺生肌。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論側柏葉曰。治冷風。歷節。疼痛。止尿血。【宋】大明日華諸家本草論側柏葉曰。灸寒濕。瘡。燒取汁塗。頭黑潤髮。【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論側柏葉曰。傳湯火傷。止痛滅癰。服之療蟲痢。作湯常服。殺五臟蟲。益人。【明】羅希雍本草經疏論側柏葉曰。側柏葉味苦而微溫。義應並於微寒。故得主諸血崩中。赤白。若夫輕身益氣。令人耐寒暑。則略同於柏實之性矣。惟生肌去溼。痺。乃其獨擅之長也。【清】黃宮繡本草求真論側柏葉曰。側柏葉苦瀟微寒。書言養陰滋肺。燥土。然稟受西金。堅勁不凋。服此大能伐胃。雖有止血涼血之功。而氣味與血分無涉。不過仗金氣以制木。借炒黑以止血耳。別錄稱爲補益。似屬未是。但藥湯火傷。損生肌。殺蟲。灸瘡。凍瘡。汁染髮。最佳。酒

性質 甘平。無毒。
效能 補心脾。潤血脉。用作滋養強壯藥。

主治 療恍惚。虛損。吸。歷節。脈中重痛。金血止汗。驚悸。氣除。風溼。安五臟。久服令人潤澤。美色。耳目聰明。不飢不老。輕身延年。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥

性本草論柏實曰。治頭風。腰腎中冷。膀胱冷。澀宿水。與陽道。益壽。去百邪鬼魅。小兒驚癇。【元】王好古湯液本草論柏實曰。潤肝。【明】李時珍本草綱目論柏實曰。養心氣。潤腎燥。安魂定魄。益智寧神。燒溼澤頭髮。治疥癬。【明】繆希雍本草經疏論柏實曰。柏感秋令。得金氣。其質堅。而氣極芬芳。故其實味甘平無毒。甄權加辛。亦應有之。其主驚悸者。心藏神。腎藏精。與志。心腎兩虛。則病驚悸。入心故養神。入腎故定志。神志得所。養而寧定。則其證自除矣。芬芳則脾胃所喜。潤澤則肝腎所宜。故能安五臟。五臟皆安。則氣自益矣。心主五色。耳為腎竅。目為肝竅。加以久服氣專。其力自倍。豈不令人潤澤美色。耳目聰

明。不饑不老。輕身延年哉。惟除風溼痺之功。非潤藥所能當。是葉之能事耳。別錄療恍惚。即驚悸之漸也。虛損。吸。精氣微也。歷節。脈中重痛。肝腎不足也。汗乃心液。心主血。益陰血。則諸證悉瘳矣。【清】黃

宮繡本草求真論柏實曰。柏子仁辛甘平潤。考書俱言四臟皆補。究之止屬心藥耳。蓋香雖能補脾。而實可以通竅而入心。潤雖可以補肝而益腎。而實可以寧神而定志。甘雖足以和胃而固中。而實足以益血而神守。是以風溼可除。驚癇可療。邪魅可辟。皮膚可澤。惟見神

恬氣適耳。聰目明。而無枯槁燥塞之患矣。然性多潤滑。陰寒泄瀉者。切忌。氣多香洩。體虛火盛者。亦忌。若云不飢不老。延年輕身。雖出經典。仍當活視。毋為書執。蒸熟暴乾。自裂入藥炒。【清】黃元御玉楸葉

解論柏實曰。柏子仁辛香甘溫。乘燥金斂肅之氣。而體質則極滋潤。能收攝神魂。寧安驚悸。滑腸開秘。榮肝起痿。明目聰耳。健膝強腰。澤潤舒筋。斂血止汗。燥可泄溼。潤亦

清風。至善之品。蒸曬香斂。取仁炒

研。燒溼取油。光澤鬚髮。塗抹癬疥。搽黃水瘡。溼最效。

牛膝。【酒浸】卷柏各五錢。澤蘭。續斷各二兩。熟地黃一兩。蜜丸。米飲下。

配合應用 服柏實法。九月連房取實。暴收去殼。研為細末。每服二錢。溫酒下。一日三次。服。即飲水。令人悅澤。一方加松子仁等分。以松脂和丸。一方加菊花等分。蜜丸服。

參攷資料 柏取譜以療馬。癆疥。今未見用。松瀝者。老人虛秘。柏子仁。大麻子。仁。松子仁。等分同研。溶白蠟。桐子大。以少黃丹湯。服三三十九丸。食前。管官陝西。每登高望之。雖千萬株。皆一。西指。蓋此木為至堅之木。不畏霜雪。得木之正氣。他木不逮也。所以受金之正氣所制。故一向之。【寇宗奭】

治老人虛閉。柏子仁。松子仁。大麻仁等分同研。銚蜜蠟丸。梧子大。以少黃丹湯。食前服。三三十九丸。二服。【寇宗奭方】

治小兒驚啼驚癇。腹滿。大便青苔色。用柏子仁末。溫水調服一錢。【聖惠方】

陸氏積虛堂方。治黃水瘡。真柏油二兩。熬稠。搽之。如神。【聖惠方】

治腸風下血。柏子仁十四粒。搗碎。蠶肝。浸好酒三盞。煎八分。服立止。【普濟方】

用盤 一錢至三錢。施用宜忌 凡便濁多痰者。禁用。畏菊花。羊蹄草。

警名方劑 柏子仁丸。治經行復止。血少神衰。用柏子仁。【去油】

而柏子仁。則主除風溼痺。安五臟。

十一畫 乾

假 假 偏 做 側

【乾藕節】即藕節陰乾者之別名。

詳「藕節」條。

【乾蟾】即蟾蜍曬乾者之別名。詳「蟾蜍」條。

【乾蟾腹】即蟾蜍之處方用名。詳「蟾蜍」條。

【乾鵠】即鵠之新語名。詳「鵠」條。

【乾蠍】即全蠍曬乾者之別名。詳「全蠍」條。

【僵鼠】即隱鼠之古籍別名。典見綱目詳「隱鼠」條。

【假君子】即牽牛子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「牽牛子」條。

【假油柑】即真珠草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「真珠草」條。

【假建】即煙草之葉絲非福建產者。性質功能詳「煙草」條。

【假素馨】原名 青藤仔。產地 出粵中。

形態 假素馨爲藤屬之一種。葉長三四寸。多芒刺。莖大如指。而堅韌似柳條。其花可供藥用。

主治 煎湯洗疥瘡。

【假蘇】即荊芥之原名。詳「荊芥」條。

【假豬鬃】即海鬃之古籍別名。典

見綱目。詳「海鬃」條。

【偏桃核】即桃實之肉薄而尖。頭偏狀如月牙形。仁似新羅桃實者。性質功能與尋常桃實同。詳「桃」條。

【偏精】即黃精葉偏生不對節者之別名。性質功能詳「黃精」條。

【做打馬】即番打馬之別名。性質功能詳「番打馬」條。

【側子】命名 本品生於附子之側故名。

處方用名 製側子。

古籍別名 蒟子（許慎）

基本 屬毛茛科。爲附子根旁之塊根。

採取 八月間須在附子邊側間削取之。

用法 水煮薰洗。或剉末用。

性質 辛大熱有毒。

效能 療脚氣治頑痺。用作麻酔性之驅風燥濕藥。

主治 癰腫。風痺。歷節。腰脚疼。冷寒熱。鼠瘻。又墮胎。

歷代記載攷證 【南北朝】雷獸雷公案對論側子曰。冷酒調服。治遍身風癰。神妙。【唐】甄權藥性

本草論側子曰。療脚氣。冷風濕痺。大風。筋骨掣急。【清】黃宮繡本草求真論側子曰。側子連生附側。宜於發散四肢。故治手足風濕諸痺。其功皆與附子補散差殊。【清】汪創庵本草備要論側子曰。側子散側旁生。宜於發散四肢。充達皮毛。治手足風濕諸痺。

用量 五分至八分。

施用宜忌 凡無風寒濕邪者禁用。

參攷資料 【唐】元希聲侍郎治癰瘻風有側子湯。見外臺秘要（李時珍）此附子邊角之大者。削取之。青時不用。比來醫家以療脚氣多驗（陶弘景）側子附子皆是烏頭下旁出者。以小者爲側子。大者爲附子。今以附子角爲側子。理必不然。若當陽以下。江左山南。嵩高齊魯間。附子時復有角。如大豆許。藥州以上。劍南所出者。附子之角。但如黍粟。豈可充用。比來都下皆用細附子有效。未嘗取角也（蘇恭）

【側生】即荔枝之古籍別名。典見和漢藥考。詳「荔枝」條。

一二三〇

【側金盞花】即黃蜀葵之古籍別名。典見綱目。詳「黃蜀葵」條。

【側柏子仁】原名 柏實。葉扁而側生。故曰側柏。

古籍別名 栴仁。柏子仁。（和漢藥考）

基本 係屬松杉科側柏之核仁。

產地 陳仁山藥物生產辨云。產山東兗州府。九月新。

形態 本品作倒卵圓形。大四五分許。內有黃白之仁。如麥粒大。

採取 每年九月採。曬乾。

製法 雷敩曰。凡使先以酒浸一宿。至明。漉出。晒乾。用黃精白熟汁。於日中煎之。緩火煮成膏。爲度。每煎柏子仁三兩。用酒五兩。浸。李時珍曰。此法是服食家者用。尋常用。只蒸熟。曝烈日。春鐵取仁。炒研入藥。



側柏子仁

仁(去皮尖)肉桂(去粗皮)各四斤。先將甘草用白砂糖炒及八分黃熟。次入乾薑同炒。令薑裂。次入杏仁又同炒。候不作聲爲度。篩淨。俟入肉桂一處。搗爲散。每服二錢。水煎溫服。如煩燥。并花水調下。不拘時。沸湯調亦得。●乾薑人參半夏湯。治妊娠嘔吐不止(金匱方)乾薑人參各一兩。半夏二兩。上三味末之。生薑汁和丸。梧子大。每服十丸。

參攷資料 ●乾薑。大辛大熱。陽中之陽。其用有四。通心助陽一也。去臟腑沉寒痼冷二也。發諸經之寒氣三也。治感寒腹痛四也。腎中無陽。脉氣欲絕。黑附子爲引。水煎服之。名薑附湯。亦治中焦寒邪。寒淫所勝。以辛散之也。又能補下焦。故四逆湯用之。乾薑本辛。炮之稍苦。故止而不移。所以能治裏寒。非者附子行而不止也。理中湯用之者。以其回陽也。(張元素)●乾薑。生辛。炮苦。陽也。生則逐寒邪而發表。炮則除胃冷而守中。多用則耗散元氣。辛以散之。是壯火食氣。故也。須以生甘草緩之。辛熱以散

裏寒。同五味子用以溫肺。同人參用以溫胃也。(李杲)●乾薑。心脾二經氣分藥也。故補心氣不足。或言乾薑辛熱而言補脾。今理中湯用之。言泄不言補何也。蓋辛熱燥溼。損脾中寒溼邪氣。非泄正氣也。又云服乾薑以治中者。必僭上不可不知。(王好古)●乾薑入肺中。利肺氣。入腎中。燥下溼。入肝經。引血藥生血。同補陰藥。亦能引血藥入氣分。生血。故血虛發熱。產後大熱者。用之。止唾血。痢血。須炒黑用之。有血脫色白而天不澤。脉濡者。此大寒也。宜乾薑之辛溫以益血。大熱以溫經。(朱震亨)●乾薑孕婦不可食。令胎內消。蓋其性熱而辛散故也。(李時珍)●乾薑如性散。炒黃用。或炒微焦。市醫將其泡淡用之。殊屬可笑。(吳遵程)●薑留皮則冷。去皮則熱。非皮性本冷也。蓋留皮則行表而熱。去皮皮則守中而熱存耳。(朱丹溪)●造乾薑法。選取母薑無筋者。水溫三日。用蘘索刮去皮。洗淨。風日透乾。以堅爲度。除夕製此最良。惟天陰雨雪。難免凍壞耳。他時製者。力

避。用時。水洗剝細。藥舖製法。與此不同。不分母薑。于薑投滾水中。煮片刻。即取出。晒乾。石灰粉之。收貯販賣。以此要利。慎勿用之。又有寒製乾生薑。亦不分其母子。但切作錢片。晒乾收貯。於小寒大寒三十日中製之。故云。此種質軟輕虛。氣味俱減。然勝於湯灰乾薑遠矣。缺時可倍用之。本草綱目引張元素語曰。乾薑本辛。炮之稍苦。故止而不移。李杲曰。乾薑生辛。炮苦。朱震亨曰。止唾血。痢血。須炒黑用之。三說皆非。蓋乾薑之味本辛。何來苦味。所以苦者。即炮炒焦黑之變。非本味也。物經焦黑。無不變苦。豈獨乾薑哉。故用炒焦乾薑者。與不用同。(和漢藥考)●整塊晒乾者。日本藥舖呼爲麻留乾薑。切片晒乾者。呼爲乾生薑。俱佳。色白。味甚辛。上品也。又三河乾薑。形瘦小。外白肉赤。如錫。辛味較薄。不及前二種。製法。秋冬之交。取老薑肥大者。水浸洗過。候天晴。刮去皮。或切片。晒乾。若一時難乾。入磁器烘之。亦可。或云。寒中製者。不堪用。以其極不易乾。兼易凍壞。其氣味俱損故也。

(古方藥品考)●乾薑。以白淨結實者爲佳。來自外國者無此貨。日本參州。遠州出者。名三河乾薑。其色白。以石灰收貯故也。用時宜洗去石灰。黑薑一名炮薑。乾生薑藥舖亦多。或誤作乾薑用之。非生薑方書以嫩根爲子薑。或稱紫薑。其老根爲母薑。(日用藥品考)●養老新書曰。老人和脾胃。氣。進飲食。止疲。療腹痛。調中氣。莫如用木香。人參。散方用木香半兩。人參去蘆頭半兩。薑香葉一分。甘草半兩。炒乾薑半兩。炒陳皮半兩。去穢。茯苓去黑皮一分。白朮半兩。微炒。枇杷葉去毛一分。厚朴去粗皮。用生薑汁。製丁香半兩。凡十二味。秤準分兩。搗羅爲末。每服二錢。水一盞。入生薑一片。棗二枚。同煎至六分。去滓溫服。此男子婦人通用之方也。方中厚朴無分量。大約與丁香相等耳。(錄續昆陽漫錄)【乾歸】即當歸之古籍別名。典見本經「當歸」條。【乾雞筋】即淫羊藿之古籍別名。典見日華諸家本草。詳「淫羊藿」條。

瀉。完穀不化。配以甘草。取辛甘合化爲陽之義。入五積散。助散寒。治小腹痛。入理中湯。定寒霍亂。止大便瀉。助附子以通經寒。大有回陽之力。君參朮以溫中氣。更有反本之功。生薑主散。乾薑主守。一物大相迥別。孕婦勿用。

國外學說 英美學說謂乾薑產中國。印度及西印度羣島等地。根可入藥。第須刮去外皮。令乾。如不刮去外皮。則謂之黑薑。刮去外皮。則謂之白薑。古時羅馬人疑薑爲胡椒之根。因其味與胡椒略同。西國常出售之黑薑。係從東印度運來。此薑多種補於印度平原與山上各處。白薑則從西印度運來。白薑黑薑。俱有香辛之味。如以水或濃酒浸之。則其藥性之質。自能消化而出。其醫治作用。爲安胃暖性之香藥。能爲引灸取嚏生津藥。又能爲行氣補胃藥。祛風藥。如傷食。胃中發氣或胃難消化。宜服之。氣能療治血滯身冷等症。入鼻則能作嚏。入口則能令喉熱生津液。入胃則能令內皮發暖行血。第此藥除肚疼氣脹外。獨用之處甚少。

大抵多倍別藥而作補劑。與瀉劑同服。能止瀉藥之烈。而瀉時之肚疼可免。外用能作漱水。治喉鬆。處方乾薑四錢。搗爛。沸水十二兩。四錢四分。浸半點鐘。濾淨。宜乘熱服。治肚疼氣脹。或輕病症。服此亦效。每服一兩至二兩。(乾薑泡水方)

辨偽 ①鄭肯巖曰。土北薑溫州所產。質鬆不結。味淡不辛。又有種洋北薑。氣味尤劣。更不可用。按北乾薑氣味辛溫。其色黃白。兼見乃手足太陰之溫藥也。凡製乾薑炮薑。當以三衝開化產者爲佳。用母薑水浸晒乾。以肉厚而白淨。結實明亮如天麻者良。故又名白薑。近今藥肆。且有以傷水變味之生薑。曬乾炮用。未免有名無實。誤人匪淺。②曹炳章曰。按乾薑湖南均州出。小雙頭內白色。爲均薑。最佳。浙江台州出者。爲台薑。個小肉黃黑色者。次。其他江南。江西。寧國。四川。皆出。總要個大堅實。內肉色白爲佳。

黑用。

①治脾胃虛弱。飲食減少。易傷難化。無力肌瘦。用乾薑頻研四兩。以白錫切塊水浴過。入鐵銚溶化。和丸梧子大。每空心米飲下三十丸。

②治頭暈吐逆胃冷生痰。用炮薑二錢半。炙草一錢二分。水一鍾半煎。減半服。

③治中寒水瀉。炮薑研末。粥飲服二錢。

④治寒痢青色。乾薑切如豆大。每米飲服六七枚。日三夜一。累用得效。

⑤治血痢不止。乾薑燒黑存性。放冷爲末。每服一錢。米飲下。神效。

⑥治脾寒瘧疾。乾薑炒黑。爲末。臨發時。以溫酒服三錢匕。

⑦治胸滿咳逆上氣。乾薑生用。同橘皮。烏藥。白豆蔻。

⑧乾薑紫蘇。桂枝。能溫中出汗。加朮則能逐風溼痺。

⑨治下利寒冷腹痛。用乾薑。朮。茯苓。人參。甘草。

歸。牛膝。

⑩治腸辟下血。用乾薑。生地黃。白芍藥。麥門冬。人參。黃耆。甘草。升麻。

⑪治中惡。用乾薑。薑黃。香附。砂。橘皮。紫蘇。木香。去木香加木瓜。則治霍亂脹滿。加桂枝。并治風邪諸毒。皮膚間結氣。

⑫治胃虛嘔逆。乾薑。橘皮。人參。

⑬治痰癰久不愈。用乾薑。橘皮。朮。貝母。茯苓。

⑭治寒癰。用乾薑。人參。朮。桂枝。橘皮。

⑮治虛寒泄瀉。中寒作瀉。用乾薑。人參。朮。甘草。

⑯用薑 三分至一錢。

⑰施用宜忌 乾薑大辛。辛能散氣走血。久服損陰傷陽。陰虛內熱。陰虛咳嗽。吐血。表虛有熱。汗出。自汗。盜汗。臟毒下血。因熱嘔惡。火熱。腹痛等症。禁用。惡黃芩。黃連。夜明砂。秦椒。爲之使。

⑱著名方劑 ①大順散。治胃暑。伏熱。引飲過多。脾胃受濕。水穀不分。霍亂吐瀉。臟腑不調。局方。乾薑四斤。甘草三十斤。(對寸長)杏

身體重。腰中冷。又云。腰以下冷痛。
●半夏乾薑散證曰。乾嘔吐逆。吐涎沫。以上三方。乾薑或四兩。或諸藥等分。
●人參湯證曰。喜唾。又曰。心中痞。通脈四逆湯證曰。下利清穀。又曰。手足厥逆。又云。乾嘔。●小青龍湯證曰。心下有水氣。乾嘔。又云。咳。●半夏瀉心湯證曰。嘔而腸鳴。●柴胡姜桂湯證曰。胸脇滿。又云。心煩。●黃連湯證曰。腹中痛。欲嘔吐。●苓甘五味姜辛湯證曰。咳胸滿。●乾薑黃連黃芩人參湯證曰。吐下。●六物黃芩湯證曰。乾嘔下利。以上九方。乾薑皆三兩。
●梔子乾薑湯證曰。微煩。●甘草乾薑湯證曰。厥咽中乾。煩躁吐逆。●乾薑附子湯證曰。煩躁不得眠。以上三方。乾薑二兩。一兩而四兩之例。
●四逆湯證曰。下利清穀。又曰。手足厥冷。以上一方。乾薑一兩半而三兩之例。
●桃花湯證曰。下利。●乾薑人參半夏丸證曰。嘔吐不止。以上二方。乾薑一兩而三兩之例。歷觀此諸方。其嘔吐者。咳者。痛者。下利者之等。壹是皆水毒之結滯者也。

十一 薑 乾

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論乾薑曰。治腰腎間疼痛。冷氣。破血去風。通四肢關節。開五臟六腑。宣諸絡脉。去風毒冷痺。夜多小便。宋大明日華諸家本草論乾薑曰。消痰下氣。治轉筋吐瀉。腹脹反胃。乾嘔。瀉血。撲損。止鼻衄。解冷熱毒。開胃消宿食。元王好古湯液本草論乾薑曰。主心下寒痞。目睛久赤。明李時珍本草綱目論乾薑曰。乾薑能引血藥入血分。氣藥入氣分。又能去惡養新。有陽生陰長之意。故血虛者用之。凡人吐血衄血。下血有陰無陽者。亦宜用之。乃熱因熱用。從治之法也。【明】繆希雍本草經疏論乾薑曰。乾薑稟天地之陽氣。故味辛而氣溫。雖熱而無毒。辛可散邪。理結溫可除寒。通氣。故主胸滿。咳逆。上氣。溫中。出汗。逐風。溼痺。下痢。因於寒冷。止腹痛。其言止血者。蓋血虛則發熱。熱則血妄行。乾薑炒黑。能引諸補血藥入陰分。血得補。則陰生而熱退。血不妄行矣。治腸辟亦其義也。生薑能通神明。辟惡氣。故主中惡。霍亂。脹滿。風邪。諸毒。皮膚間

結氣。惟唾血。定非寒證。則錄載之誤矣。清陳修園本草經讀論乾薑曰。乾薑氣溫。稟厥陰風木之氣。若溫而不烈。則得冲和之氣。而屬土也。味辛得陽明燥金之味。苦辛而不偏。則金能生水。而轉潤矣。故乾薑為脾寒之要藥也。胸中者。肺之分也。肺寒則金失下降之性。氣壅於胸中而滿也。滿則氣上。所以咳逆上氣之症生焉。其主之者。辛散溫行也。中者。土也。土虛則寒。而此能溫之。止血者。以陽虛陰必走。得煖則血自歸經也。出汗者。辛溫能發散也。逐風溼痺者。治寒邪之留於筋骨也。治腸辟下痢者。除寒邪之陷於腸胃也。以上諸治。皆取其雄烈之用。如孟子所謂剛大浩然之氣。塞乎天地之間也。生則辛味渾全。故又申言曰。生者尤良。即金匱治肺癰。用甘草乾薑湯。自註炮用。以肺虛不能驟受過辛之味。炮之使辛味稍減。亦一時之權宜。非若後世炮黑炮灰。全失薑之本性也。葉天士亦謂炮黑入腎。何其陋歟。清黃元御長沙藥解論乾薑曰。乾薑燥溼溫中行。鬱降濁補

益火土。消納飲食。暖脾胃而溫手足。調陰陽而定嘔吐。下衝逆而平咳嗽。提脫陷而止滑泄。清黃宮繡本草求真論乾薑曰。乾薑其味本辛。炮制則苦。大熱無毒。守而不走。凡胃中虛冷。元陽欲絕。合以附子同投。則能回陽立效。故書則有附子無薑不熱之句。與仲景四逆白通姜附湯皆用之。且同五味。則能通肺氣而治寒嗽。同白朮。則能燥溼而補脾。同歸身。則能入氣而生血。故凡因寒內入。而見臍臍痛。蔽關節不通。經絡阻塞。冷痺寒痢。反胃隔絕者。無不藉此。以為拯救。除寒炒黑。其性更純。味變苦鹹。力主下走。黑又止血。辛熱之性雖無。而辛涼之性尚在。故能去血中之鬱熱而不寒。止吐血之妄行而不滯。較之別藥。徒以黑能止血為事者。功勝十倍矣。血寒者。可多用。血熱者。不過三四分。為導而已。白淨結實者。良。母薑晒乾者。為乾薑。【清】賈九如辨藥指南論乾薑曰。乾薑乾久。體質收束。氣則走泄。味則含蓄。比生薑辛熱過之。所以止而不行。專散寒氣。如腹痛身涼作

十一 薑 乾

也。凡人畏漆者。嚼蜀椒塗口鼻則可免生漆瘡者。杉木湯紫蘇湯漆結草湯蟹湯浴之皆良。(李時珍)

⑤梁州漆最甚。益州亦有。廣州漆性急易燥。其諸處漆桶中自然乾者。狀如蜂房。孔孔隔者爲佳。(陶弘景)

⑥漆樹高二三丈餘。皮白葉似槐。花似槐。其子似牛李子。心黃。六月七月刻取。滋汁。金州者最善。漆性並急。凡取時須往油解破。故淳者難得。可重別制。試之上等清漆。色黑如蠶。若鐵石者好。黃嫩者。蜂窩者不佳。(韓保昇)

⑦澤漆藥中未見。用者皆乾漆爾。其澤者在燥熱及未冷時則難乾。得陰澤雖寒月亦易乾。亦物之性也。若霧漬人。以油治之。凡驗漆惟稀者以物蘸起。細而不斷。斷而急收。更有塗於乾竹上。陸之速乾者。並佳。(寇宗奭)

⑧漆樹人多種。之春分前移栽。易成有利。其身如柿。其葉如椿。以金州者爲佳。故世稱金漆。人多以物亂之。試訣有云。微扇光如鏡。懸絲急似鉤。撼成琥珀色。打着有深瀝。今廣浙中出一種漆樹。似小槐而大。六月取汁。漆物黃

也。按續洪濟方云。甘露湯治反

澤如金。即唐書所謂黃漆者也。入藥仍當用黑漆。廣南漆作餡糖氣。沾沾無力。(李時珍)

【乾餅藥】即石鹼之古籍別名。典見藥科書。詳「石鹼」條。

【乾蝦】 命名 蝦之曬乾者也。主治 能解毒并治水土不服。

參攷資料 蝦生淡水者。色青生鹹水者。色白。溪澗中出者。殼厚氣腥。以其得土氣薄也。湖澤池沼中者。殼薄肉滿。氣不腥。味佳。海中心者。色白。肉粗味殊劣。(趙恕軒)

【乾醋】即醋之古籍別名。典見新本草。詳「醋」條。

【乾菴蓉】即肉菴蓉之處方用名。詳「肉菴蓉」條。

【乾錫糟】 命名 本品係製造錫餡所餘之糟粕。故名。

性質 甘。溫。無毒。

主治 反胃吐食。暖脾胃。化飲食。益氣緩中。

參攷資料 錫以鑊成。暖而消導。故其糟能化滯緩中。養脾止吐也。按續洪濟方云。甘露湯治反

胃嘔吐不止。服此利胸膈。養脾胃。進飲食。用乾錫糟六兩。生薑四兩。二味同搗作餅。或焙或晒。入炙甘草末二兩。鹽少許。點湯服之。常熱一富人。病反胃。往京口甘露寺。設水陸泊舟岸下。夢一僧持湯一杯。與之飲。罷便覺胸快。次早入寺。供湯者。乃夢中所見僧。常以此湯待賓。故名。曰甘露湯。予在臨汀療小吏旋愈。切勿忽之。(李時珍)

【乾糲糧】即粳米之古籍別名。典見綱目。詳「粳米」條。

【乾薑】 處方用名 淡乾薑。川乾薑。

古籍別名 白薑。均薑。(李時珍)

外國名詞 Zingiber (Ginger)

基本 屬薑荷科。爲 Zingiber officinale 之根。

產地 陳仁山藥物生產辨云。乾薑以四川爲最。白肉。廣東六步次之。黃肉。欽廉。北海。廣西均有。出又次之。均黃肉。安南。東京產者。亦次之。白肉。

一二六

薑。均薑之名。外面黃褐色。有皺紋。製法 陶弘景曰。凡作乾薑。水淹三日。去皮。置流水中。六日。更刮去皮。然後曬乾。置磁缸中。釀三日。乃成。蘇頌曰。造法採根於長流水中。洗過。日曬爲乾薑。以漢溫池州者爲良。陶說乃漢州乾薑也。李時珍曰。乾薑以母薑造之。今江西薑均皆造。以白淨結實者爲良。故今人呼爲白薑。又曰均薑。凡入藥並宜炮用。

性質 辛。溫。無毒。

成分 含有揮發油及纖維等。效能 溫中祛寒。燥溼。消痰。用作驅風消化藥。

主治 胸滿咳逆上氣。溫中止血。出汗。逐風溼痺。腸澼下痢。生者尤良。(本經) 寒冷腹痛。中惡霍亂。脹滿。風邪諸毒。皮膚間結氣。止唾血。(別錄)

張仲景之發明 乾薑一味。經張仲景之實驗。認爲「主治結滯水毒也。旁治嘔吐。咳下。利厥冷。煩躁腹痛。胸膈痛。」茲考徵如下。

①大建中湯證曰。心胸中大寒。痛嘔不能飲食。②蒼朮朮甘湯證曰。

經希雍本草疏論乾漆曰乾漆味辛氣溫蠶蠟加鹹宗爽加苦氣味俱厚通行腸胃入肝行血之藥也凡風寒溼邪之中人留而不去則腸胃鬱而生蟲久則五臟六腑皆受病或爲癰瘕或爲拘攣所自來矣此藥能殺蟲消散逐腸胃一切有形之積滯腸胃既清則五臟自安痿緩痺結自調矣又損傷一證專從血論蓋血者有形者也形質受病惟辛溫散結而兼鹹味者可入血分而消之瘀血消則絕傷自和筋骨自續而髓腦自足矣其主痞結腰痛女子疝瘕者亦指下焦血分受寒血凝所致利小腸者取其通行經脈之功耳至於療咳嗽雖非正治然亦有瘀血停積發爲骨蒸勞瘵以致咳嗽者得其消散瘀血之力則骨蒸退而咳嗽亦除也誤中漆毒者多食鹽及甘豆湯解之【明】李士材本草圖解論乾漆曰乾漆辛溫降而行血毒而殺蟲二者已罄其功能若祛風止痛除嗽理傳尸正行血殺蟲之效也性急多毒弗得過用凡畏漆者嚼椒塗口鼻免生漆瘡如杉木如

紫蘇如蟹患漆瘡者皆可煎湯浴之煎乾炒令烟盡存性【清】黃宮繡本草求真論乾漆曰乾漆味辛氣溫有毒有降無升專破日久凝結之血及創年深堅結之積緣人感受風寒暑溼鬱而爲病則中外不舒胃中有物留滯不消久而生蟲血積不化結而爲瘀由是陽氣竭澤津液枯槁癰瘕風痺因之不免用此辛溫毒烈之性鏟除瘀積中氣得復絕陽皆濟而緩急和矣按血見漆花水故能化蠱破血千金三蠱方皆賴以之爲君本經言能輕身者以其蠱去而身自輕之謂也所謂中氣可復絕陽可續者亦因瘀去而中自復與陽自續之謂也但無積血者切忌以其傷營血損胃氣耳炒令烟盡爲度

配合應用 ①治腹中瘀血作痛乾漆蠶蟲桃仁當歸紅花蘇木牡丹皮五靈脂延胡索牛膝或產後感寒惡露未盡結成痞塊作痛者加入乾薑澤蘭

②殺腸胃一切諸蟲乾漆棟根鶴虱檳榔錫灰慈苳根烏梅龍膽草

③治女子月閉乾漆牛膝牡丹皮續斷赤芍藥桃仁乳香沒藥紅花延胡索鼈甲若瘀血臍腹作痛畏寒及不發熱不口渴者可加桂

④治紫雲風乾漆稀莖葉生地黃牛枝蓮胡麻荊芥何首烏天門冬苦參

⑤治小兒蟲病胃寒危惡證與癰相似者用乾漆搗燒烟盡白蕪黃等分爲末米飲服一字至一錢

（杜仁方）

⑥治九種心痛及腹脇積聚滯氣筒內乾漆一兩搗炒烟盡研末醋煮麵糊丸梧子大每服五丸至九丸熱酒下（簡要濟衆方）

⑦治婦人不曾生長血氣疼痛不可忍及治丈夫疝氣小腸氣撮痛者並宜服二聖丸溼漆一兩熬一食頃入乾漆末一兩和丸梧子大每服三四丸溫酒下怕漆人不

可服（經驗方）

⑧治產後青腫疼痛及血氣水疾乾漆大麥芽等分爲末新瓦罐相間鋪滿鹽泥固濟煨赤放冷研散每服一二錢熱酒下但是產後諸病皆可服（婦人良方）

⑨治五勞七傷補益方用乾漆柏子仁山茱萸酸棗仁各等分爲末蜜丸梧子大每服二七丸溫酒下日二服（千金方）

⑩治喉痺欲絕不可針藥者乾漆燒烟以筒吸之（聖濟總錄方）

⑪解中蠱毒平胃散末以生漆和丸梧子大每空心溫酒下七十九至百丸（直指方）

⑫下部生瘡生漆塗之良（肘後方）

用量 八分至一錢半

施用宜忌 凡無瘀滯者禁用畏雞子忌油脂惡川椒紫蘇及蠶中夏爲之使

參攷資料 ①仙方用蠶消漆爲水鍊服長生抱朴子云淳漆不黏者服之通神長生或以大蟹投其中或以雲母水或以玉水合之服九蟲悉下惡血從鼻出服至一年六甲行廚至也（陶弘景）②漆性毒而殺蟲降而行血所主諸證雖繁其功只在二者而已（李時珍）③今人貨漆多雜桐油故多毒惟南子云蟹見漆而不乾相感志云漆得蟹而成水蓋物性相制

出。

形態 乾陀木爲雜木類之一種。樹大皮厚。葉似櫻桃葉。其木皮可供藥用。

性質 溫平。無毒。

主治 瘵癆氣塊。溫腹煖胃。止嘔逆。破宿血。婦人經閉。腹內血塊。酒煎服之。

【乾柿】即柿餅之別名。性質功能詳「柿餅」條。

【乾苔】基本 本品爲海苔之乾燥者。

古籍別名 苔菜。(本草葉言)

海苔(綱目)青苔(日本)紅藤(本草綱目)

外國名詞 Enteromorpha Linza, J. G. Ag. (拉丁) ノラ

ン(日本)

基本 係真正綠藻類絲藻族石莖科乾苔屬之乾苔。

產地 出淺海中。

形態 乾苔爲苔類之一種。即苔之產海中者。葉爲細長之管狀。體似絲綿。又似韭。可供食與藥用。

採取 冬春間採長數寸者。日乾用。

性質 鹹寒。無毒。

主治 瘵癆。結氣。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論乾苔曰。治痔殺蟲。及霍亂嘔吐不止。煮汁服。【唐】陳藏器本草拾遺論乾苔曰。心腹煩悶者。冷水研如泥飲之。即止。【宋】日華諸家本草論乾苔曰。下一切丹石諸藥毒納木孔中。殺蠹。【明】吳瑞日用本草論乾苔曰。消茶積。【明】李時珍本草綱目論乾苔曰。燒末吹鼻止衄血。湯浸搗傅手背腫痛。

參攷資料 ①洪氏夷堅志云。河南一寺僧。盡患瘵疾。有洛陽僧共寮。每食取苔脯同餐。經數月。僧項贅皆消。乃知海物皆能除是疾也。【李時珍】②柔苔寒。乾苔熱。【陶弘景】③苔脯食多發瘡疥。令人癢黃。少血色。【孟詵】④有咳嗽人不可食之。【吳瑞】

【乾奇叢】即獨脚一枝蓮之古籍別名。典見百草鏡。詳「獨脚一枝蓮」條。

【乾皋】即鸚鵡之古籍別名。典見綱目。詳「鸚鵡」條。

【乾魚】即鮑魚之古籍別名。典見綱目。詳「鮑魚」條。

綱目。詳「鮑魚」條。

【乾棗】即大棗曬乾者之古籍別名。典見別錄。詳「大棗」條。

【乾葛】即葛根之處方用名。詳「葛根」條。

【乾萊服】即地骷體之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「地骷體」條。

【乾菖蒲】即菖蒲之處方用名。詳「菖蒲」條。

命名 漆本作黍。水汁而下之形也。故名。藥用其乾涸者。遂命之曰乾漆。

古籍別名 續命筒。(和漢藥考) 黑漆(俗名)

基本 乾漆爲漆樹之液汁。貯置器內。漸次乾涸。凝成堅固之塊。粒。

產地 陳仁山藥物生產辨云。乾漆乃油漆店之漆盆底。乾而不能再用之漆。取出沽之。

形態 漆樹科之漆樹(Elmus Vernicifera, D. C.)其樹幹鋸下後。鋸痕有液汁流出。即爲漆液。其散去水氣。成爲暗褐色濃稠液者。謂之黑目漆。其乾涸成爲黑色。

蜂窩狀輕塊。謂之繭目乾漆。可供藥用。

製法 大明曰。凡使乾漆入藥。須搗碎炒熟。不爾損人腸胃。若是溼漆煎乾更好。亦有燒存性。

用法 恒以剉末和作丸散用。

性質 辛溫。無毒。

成分 生漆之成分爲水、漆酸(C₁₅H₁₀O₂)、膠質、蛋白質等。漆液在空氣中之硬化。係由其主成分氧化所致。但須有溼氣存在。方能硬化。

效能 破血、消積、燥溼、殺蟲。用作通經藥。又有燒烟吸之。用治勞瘵喉痺等。

主治 絕傷。補中。續筋骨。填髓。腦。安五臟。五緩六急。風寒溼痺。生漆去長蟲。久服輕身耐老。(本經)

乾漆療咳嗽。消痰血。疥瘡。腰痛。女子疝瘕。利小腸。去蛇蟲。別錄。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論乾漆曰。殺三蟲。主女人經脈不通。【宋】大明諸家本草論乾漆曰。治傳尸勞。除風。【金】張元素珍珠囊論乾漆曰。削年深堅結之積滯。破日久凝結之瘀血。【明】

者。謂之黑目漆。其乾涸成爲黑色。

【鬼蓋】即人參之古籍別名。典見本經。詳「人參」條。

【鬼筍】即筍葉之古籍別名。典見植物學大辭典。詳「筍葉」條。

【鬼箭】即衛矛之古籍別名。典見別錄。詳「衛矛」條。

【鬼箭羽】即衛矛之處方用名。詳「衛矛」條。

【鬼骷髏】基本 本品乃殘老之向日葵其子可供藥用。

主治 通氣透膿。合麝香、急性子搗爛爲膏。貼臍能落胎。

參攷資料 冬日桃園中有樹上乾枯殘桃亦名鬼骷髏。與此名同物異。

【鬼齒】基本 本品爲腐敗竹根之先入地者。

古籍別名 鬼鍼（綱目）

性質 苦平。無毒。

主治 中惡注忤。心腹痛。煮汁服之。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論鬼齒曰。煮汁服。下骨硬。燒存性。入輕粉少許。油調塗小兒頭瘡。

【鬼燈檠】即山慈姑之古籍別名。典見綱目。詳「山慈姑」條。

【鬼獨搖草】即鬼督郵之古籍別名。典見唐本草。詳「鬼督郵」條。

【鬼頭】即菟藟之古籍別名。典見綱目。詳「菟藟」條。

【鬼螺螄】即石上螺螄之俗名。詳「石上螺螄」條。

【鬼醜】即甘遂之古籍別名。典見吳普本草。詳「甘遂」條。

【鬼鍼】即鬼針草之古籍別名。典見綱目。詳「鬼針草」條。○即鬼齒之古籍別名。典見綱目。詳「鬼齒」條。

【鬼藏】即鬼蓋之古籍別名。典見本草集註。詳「鬼蓋」條。

【鬼藏】即玄參之古籍別名。典見吳普本草。詳「玄參」條。

【鬼繫腰】即絡石之古籍別名。典見外科精要。詳「絡石」條。

【鬼藥】即鬼臼之古籍別名。典見綱目。詳「鬼臼」條。

【鬼麗】即烏韭之古籍別名。典見綱目。詳「烏韭」條。

【鬼饅頭】即木蓮子之俗名。詳「木蓮子」條。

【鬼蠅蠅】即蒲包草實之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「蒲包草」條。

【鬼鬍鬚】即桃梔之古籍別名。典見綱目。詳「桃梔」條。

【鬼蠅】即蠅魚之小者。典見綱目。詳「蠅魚」條。

【乾冬菜】命名 本品即冬菜之曬乾者。故名。

古籍別名 臘乾菜（綱目拾遺）

性質 甘平。無毒。

主治 利膈下氣。開胃益血。生津液。補虛勞。並療久年痰嗽。聲音不出。泡湯飲。湯火傷和酒搗傳。白火丹煎服及洗浴之。

參攷資料 冬菜乃白菜。杭俗小雪前後。居人率市白菜以鹽醃之作臘藏爲禦冬及春時所食。名曰冬菜。其瀹汁煮豆及豆腐食。能清火益肺。誠食中佳品。至春分後。天漸暖。菜亦漸變黑色。味苦不堪食。以之曬作乾飯鍋上蒸黑。再曬再蒸。如此數次。乃曝之極乾。貯缶器中。可久藏不壞。名曰臘乾菜。即

乾冬菜也。年久者出之香氣醃烈。功能開胃。噤口痢及產後以下下。粥大有補益。蓋白菜本能和中下氣。利三焦。通二便。含土德之精。有生金之用。乾之則苦返其初。而從母化也。久蒸久曬。則味反甘。全其德。故有中和之運功。與參耆等。惜乎世多忽而不知。余故特爲表之。瀨湖綱目。煮下無乾菜之用。殊爲缺略。近日寬橋人所市者。乃蘿蔔英所乾。與芥菜乾。蒸曬成者。皆不入藥。須人家冬白菜醃作蒸曬。年久者爲佳。羣芳譜有造黑醃法。用白菜如法醃透。取出掛於桁上。曬極乾。上飯蒸熟。再曬乾。收之。極耐久藏。夏月以此鹽和肉炒。可以久留不臭。即今乾冬菜也。（趙學敏）

【乾地黃】即大生地之原名。詳「大生地」條。

【乾地龍】即蚯蚓之處方用名。詳「蚯蚓」條。

【乾陀木皮】命名 本品褐色。可染僧褐。故名。

產地 生西域諸地。安南亦有。

十靈 鬼

生草本。莖高二三尺。葉爲三出之
二回羽狀複葉。對生。秋末各枝梢
着頭狀花。黃色。花後結實。長五六
分。頂上有刺毛四五本。能藉是附
着人物。散布他處。

性質 苦。平。無毒。

主治 蜘蛛蛇咬。杵汁服。併敷。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論鬼針草曰。塗蠍蠱傷。

參攷資料 ①生池畔。方莖。葉

有極子作銀針。著人衣如針。北人

謂之鬼針。南人謂之鬼銀。(陳藏

器) ②割甲傷肉不愈。鬼針草苗

鼠黏子根搗汁。和臘猪脂塗。(千

金)

【鬼卿】即蠶本之古籍別名。典見

本經。詳『蠶本』條。

【鬼眼】即龍眼最小者之別名。詳

『龍眼』條。

【鬼眼睛】即蠶蛭殼之古籍別名。

典見綱目。詳『蠶蛭殼』條。

【鬼銀】即鬼針草之古籍別名。典

見綱目。詳『鬼針草』條。

【鬼畫符】即夜蘭葉上之白篆文

者之古籍別名。典見嶺南雜記。詳

『夜蘭』條。

【鬼都郵】即鬼督郵之古籍別名。

典見唐本草。詳『鬼督郵』條。

【鬼新】即蠶本之古籍別名。典見

本經。詳『蠶本』條。

命名 本品專治鬼

督。故名。

古籍別名 鬼都郵。鬼獨搖草。

(唐本草)

學名 Macrocinidum rig-

idulum, Mark. (植名後編補辭

B. E. R.) Pertya sigula,

Makino, (圖鑑) Pertya Mac-

rocinidum, Mak. (圖鑑) M.

robustum, Max. (植物名彙)

基本 係菊科。爲鬼督郵之根。

產地 在山野間。

形態 鬼督郵爲山草類之野

生草本。叢生。而苗惟一莖。莖端生

葉。若繖狀花。生於葉心。黃白色。其

根橫生而細黑無鬚。可供藥用。



鬼 督 郵

採取 二月八月間採之。

製法 雷敷曰。凡採得。細剉。用

生甘草水煮一伏時。日乾用。

性質 辛。苦。平。無毒。

主治 鬼疰。卒忤中惡。心腹邪

氣。百精毒。溫瘧瘕疾。強腰脚。益腎

力。

參攷資料 ①按東晉深師方。

治上氣咳嗽。邪嗽。鰥嗽。冷嗽。四滿

丸。用鬼督郵同蜈蚣。芫花。踴。蠲。諸

毒藥。爲丸。則其有毒。可知矣。非毒

藥。不能治鬼疰。邪惡之病。唐本云。

無毒。蓋不然。(李時珍) ②此草獨

莖。而葉攢其端。無風自動。故曰鬼

獨搖草。後人誤爲鬼督郵。爾。因其

專主鬼病。猶司鬼之督郵也。古者

傳舍有督郵之官。主之。徐長卿。亦

箭。皆治鬼病。故並有鬼督郵之名。

名同而物異。(李時珍) ③莖似細

箭。幹高二尺以下。葉生莖端。狀如

傘花。生葉心。黃白色。根橫生。而無

鬚。二月八月採根。徐長卿。亦箭。並

有鬼督郵之名。而主治不同。宜審

用之。(韓保昇) ④鬼督郵與及己

同類。根苗皆相似。但以根如細辛

而色黑者爲及己。根如細辛而色

一一二二

黃白者爲鬼督郵。(李時珍)

【鬼督郵】即天麻之古籍別名。

典見本經。詳『天麻』條。即徐長

卿之古籍別名。典見本經。詳『徐

長卿』條。

產地 生林野潤邊。

形態 鬼督藤爲蔓

草類之一種。葉如梨葉。子如棗子。

其藤葉可供藥用。

性質 苦。溫。無毒。

主治 浸酒服。祛風氣。

【鬼膊藤葉】性質 苦。溫。無

毒。

主治 搗傳癰腫。

【鬼蒜】即百合之古籍別名。典見

和漢藥考。詳『百合』條。

【鬼蜀蕒】即天南星之古籍別名。

典見諸家本草。詳『天南星』條。

古籍別名 朝生。鬼繖。

【鬼蓋】(弘景) 鬼屋。(藏器)

產地 生陰溼諸地。及垣墻之

下。

形態 鬼蓋爲土菌之一種。幼

生夕死。狀如菌。而莖赤。可供藥用。

性質 甘。平。無毒。

主治 和醋傳腫毒惡瘡。

一莖。莖枯則爲一白。假令生來二十年。則有二十白。豈惟九白耶。根肉皮鬚並似射干。今俗用多是射干。而江南別送一物。非真者。今荊州當陽縣。陝州遠安縣。襄州荊山縣山中並貢之。亦極難得。(蘇恭) ①鬼白根。如天南星相疊之狀。故市人道謂小者爲南星。大者爲鬼白。殊爲謬誤。按黃山谷集云。唐婆舘葉底開花。俗名羞天花。卽鬼白也。歲生一白。滿十二歲則可爲藥。今方家乃以鬼燈檠爲鬼白。誤矣。又鄭樵通志云。鬼白葉如小荷。形如鳥掌。年長一莖。莖枯則根爲一白。亦名八角盤。以其葉似之也。據此二說。則似是今人所謂獨脚蓮者也。又名山荷葉。獨荷草。旱荷葉。八角鏡。南方處深山陰密處有之。北方惟龍門山玉屋山有之一莖。獨上莖生葉心而中空。一莖七葉。圓如初生小荷葉。面青背紫。採其葉作瓜李香。開花在葉下。亦有無花者。其根全似蒼朮。紫河車。丹爐家採根制三黃砂朮。或云其葉八角者更靈。或云其根與紫河車一樣。但以白色者爲河車。赤色者

十 薑 鬼

爲鬼白。恐亦不然。而庚辛玉冊謂蚤休陽草。旱荷陰草。亦有分別。陶弘景以馬目毒公與鬼白爲二物。殊不知正是一物。而有二種也。又唐獨孤酒丹房鏡源云。尤律草有二種。根皆似南星。赤莖直上。莖端生葉一種。葉凡七瓣。一種葉作數層。葉似蓖麻。面青背紫。而有細毛。葉下附莖。開一花。狀如鈴鐸。倒垂。青白色。黃蕊中空。結黃子。風吹不動。無風自搖。可制砂朮。按此卽鬼白之二種也。其說形狀甚明。(李時珍) ②鬼白性最猛悍。故能以毒攻毒。顯名思義。故能殺鬼辟邪。(醫學大辭典)

【鬼白根】卽鬼白之處方用名。詳「鬼白」條。

【鬼白】條。

【鬼皂莢】 產地 生江南澤畔。形態 鬼皂莢爲雜草類之一種。狀如皂莢。高二三尺。其葉可供藥用。

主治 作湯浴去風瘡。疥癩。按葉去衣垢。沐髮令長。

【鬼芋】 古籍別名 蒟蒻。(圖經本草)

產地 生山野深谷間。

形態 鬼芋爲芋之一種。狀如專預。可供藥用。

製法 採得剖作四片。入砂盆磨作膠漿。鍋煮成膏。待冷則凝結如餅塊。一復剖爲四片。添水再煮成膏。膏成照前三煮四煮。乃可食。

主治 療瘰。

【鬼見愁】卽無患子之古籍別名。典見綱目。詳「無患子」條。

【鬼油麻】卽漏蘆之古籍別名。典見日華諸家本草。詳「漏蘆」條。

【鬼芭】卽師系之古籍別名。典見別錄。詳「師系」條。

【鬼前】卽射干之古籍別名。典見和漢藥考。詳「射干」條。

【鬼屋】卽鬼蓋之古籍別名。典見本草拾遺。詳「鬼蓋」條。

【鬼柳】卽樺之古籍別名。典見綱目。詳「樺」條。

【鬼香油】 命名 本品搗汁。其味如香油。故名。

基本 鬼香油爲蔓草類之一種。苗葉如香薷。可供藥用。

主治 諸瘡腫毒。敗瘡毒。潤肌膚。滋顏色。

配合應用 冬瓜癰。附骨疽。用

鬼香油加甘草一錢。入醬板鹽花搗搗有效。(章藥方)

【鬼香油根】功用與葉同。詳「鬼香油」條。

【鬼扇】卽射干之古籍別名。典見土宿本草。詳「射干」條。

【鬼扇草】 產地 生石壁間。形態 鬼扇草爲石草類之一種。葉面青。有直紋。如白葉狀。枝生如扇骨形。可供藥用。

主治 打傷昏死。搗汁灌入。卽醒。

【鬼桃】卽羊桃之古籍別名。典見本經。詳「羊桃」條。

【鬼神】卽薺本之古籍別名。典見和漢藥考。詳「薺本」條。

【鬼針草】 古籍別名 鬼鍼。鬼針。(綱目) 梅檀草。(日本)

外國名詞 *Biaens bipina* (英) *L. (拉丁) センダングサ* *キツチバナ* (日本)

基本 係菊科鬼針草屬。藥用鬼針之根苗。

產地 原野池畔均有出。

形態 鬼針草爲溼草類之野

和漢藥考詳『蘆薈』條。

【鬼仙木】卽杜仲之古籍別名典

見和漢藥考詳『杜仲』條

【鬼仙橋】卽山馬蘭之古籍別名。

典見百草鏡詳『山馬蘭』條。

【鬼目】①卽羊蹄之古籍別名典

見本經註「羊蹄」條。卽脾之

古籍別名典見經目註。房目。見。

目。羊。白。英。案。

【鬼目花】卽凌霄花之古籀別名。

典見吳普本草。詳『凌霄花』條。

【鬼考子】卽蛇牀子之古籍別名。

典見雷公炮炙論詳『蛇牀子』條。

命名 本品根形似白。

【鬼曰】故名。

處方用名 鬼臼根。

古籍別名。九白。爵犀。馬目毒。

公（本經）天曰九老（本草崇原）

解毒（別錄）害母草。瑤田草（圖）

經）獨脚蓮。獨荷草（土宿）鬼藥。

羞天子羞天花。尤律草山荷葉早。

已有剛健姿態。溫升之性。時時流露。所以兼能振作陽氣。戰勝陰霾。二者所主之病。雖同陰枯血耗之候。惟陰虛之體。相火易升。則宜於遼參而不宜於高麗參。若陰液既耗。而真陽亦衰。則宜用高麗參。而不宜用遼參。一則養陰而兼理虛熱。一則補陰而即以扶陽。各有專主。不容或紊。若治虛熱而誤用高麗參。無異抱薪救火。則欲蘇涸轍之附。而灼其垂竭之脂膏。若治虛寒而誤投遼參。幾於落阱下石。則欲回黍谷之春。而適以陽絕於冰窖。同是虛也。同是參也。在當用之時。而一字之爭。已如水火冰炭之各異。彼夫風寒溼邪。痰飲食積。氣血鬱結之不得妄投是味者。更無庸言矣。

辨偽 鄭省巖曰。別直參。即高麗參。以野山所產爲上品。近日價值甚昂。有以副野僞充者。即新山所產也。色白味淡。紋稀。虛寒之體。服之作瀉。且煎熬之後。參片糜爛。不比真者參片完固。以此辨之。便知真僞。聞又有抄參糖參二種。以之混充。則殊礙衛生。曹炳章

曰。抄參糖參二種。乃人參之種。參前人參條下已辨明。與別直不同。別直產韓國。即古之高麗。其產參之地。如京畿道之松都龍仁。平安道之江界。全羅道之錦山。忠清道之忠州。其間以松都產者爲最勝。紅參製造官廠在焉。其地在韓京之北二十餘里。四面皆山。居北緯三十八度。寒暑之差殊甚。如松都產者。以金剛山出者曰金剛參。爲最上品。即今正官別直也。而拳頭參次之。且有官私之別。紅白之分。官參。松都所產。由義州出關。加以重稅。私參。別處所出。多偷漏出口。故曰私也。廣報云。白參雖不行於內地。而實則紅參鮮時亦是白參製成。不過加附子水以護其色。價且較白參爲昂。及考其性。紅參又遠不逮白參之和平。故土人無食紅參者。蓋別直雖爲種品。如歷年餘久。質味愈良。古時每栽七年而採。後則五年而採。近世韓國割讓日本。日人多精農學。教以人工栽培速成之法。三年即能採買。故其受氣逐年薄弱。而性味效能。亦年不如年也。凡辨真僞。若真正官別

體態圓方形而直。蘆頭大。與身混直而上。皮面近蘆有細橫皺紋。中身細直。紋顯則無紋。味若兼微甘。鮮潔而有清香氣。煎淘多次。汁清而參仍不腐爛。此爲最上之品。近時射利之徒。多以廠參僞充。即俗所爲扁剛石渠子。是也。考廠參中身大蘆頭小。頭細。紋下亦粗圓。而外皮紋直而粗。味苦而兼濃煎淘汁混。參亦腐化。以此可辨爲質品。若廠參以鐵灰同貯藏年餘。參性受灰抗燥過度。形質因此堅緻。煎之亦汁清不烊。其味仍苦兼濃。總不若真別直質味之清香鮮潔也。

參攷資料 韓國人參之起原。去今數百年前。一韓人於巨濟(釜山與馬山浦之間)之幽谷。發見一奇草。採掘之。攜至釜山。以示中國商人。詢其名。不能答。即出高價購之。且頻促再往採索。採取此事。喧傳遐邇。人爭趨之。深山幽谷。一時採掘殆盡。該韓人乃試行栽植。終不能如天然產。其後思得一法。將栽植者蒸熟曬乾。再示之中國商賈。云此亦可。韓國之人參殆

即起原於此。蓋始識之者爲華人。而今則成爲韓國國產之一云。韓國之輸出人參於中國。以宣德年間廢除歲幣金銀。改贖紅參爲其溢。自是高麗人參之名。見稱於中國。歷年貢使赴北京時。許隨員各帶紅參八十斤。准其出售。謂之包定數。明亡清興。運帶紅參。其數大增。貢使隨員書狀官以下。三十五六名人員。共得攜帶至一萬二百斤。此外義州商賈之隨該員密運者。年達一二萬斤云。隨員攜帶紅參。應豫先在松都購得定數。每斤納錢文二十五兩(二貫五百文)之稅。於松都留守處取得類似今之印花者。貼箱上。准許攜帶。及一行渡鴨綠江時。義州府使再加查驗。後納每斤二兩(一云銀四兩半)。渡江稅始准通行云。【高麗牽牛花】即曼陀羅花之古籍別名。典見和漢藥考。詳「曼陀羅」條。

【兩子】即附子之根左右附而偶生者之古籍別名。典見綱目。詳「附子」條。

【鬼丹】即蘆薈之古籍別名。典見

錢。薑末一錢。寒怒兼有各一錢半。以米飲加入生薑汁一匙。鹽一匙。服之立止。韓飛霞醫通書。亦稱其功云。(心口痛方) ⑤良薑形氣與杜若相似。而葉如山薑。(李時珍)

⑥良薑內郡雖有。而不堪入藥。春生莖葉。如薑苗而大。高一二尺許。花紅紫色。如山薑花。(蘇頌) ⑦良薑不可單用。多用。恐犯沖和之氣。虛人須與參朮同行。(吳儀洛) ⑧凡患脚氣人。每旦飽食。午後少食。晚則不食。若飢可食。飯粥。若不消。而欲致霍亂者。即以高良薑一兩。水三升。煮一升。頓服。盡即消。若倉卒無者。以母薑一兩代之。清酒煎服。雖不及高良薑。亦甚效也。(蘇恭)

【高良薑子】 原名 紅豆蔻。產地 生南海諸山谷中。

形態 紅豆蔻。花叢生。葉瘦如碧蘆。春末始發。初開花。抽一穗有。大籐包之。籐垢花見一穗數十。莖淡紅鮮妍。如桃杏花色。萎重則下垂。如蘿蔔。又如火燭環珞。及剪彩。繡枝之狀。每莖有心兩瓣。人比之。

連理也。子似豆蔻。故名紅豆蔻。性質 辛溫無毒。主治 腸虛水瀉。心腹絞痛。霍亂嘔吐。酸水。解酒毒。歷代記述攷證 ①唐甄權藥性本草論紅豆蔻曰。冷氣腹痛。消療。痧毒氣。去宿食。溫腹腸。吐瀉痢疾。②明李時珍本草綱目論紅豆蔻曰。治噎膈反胃。虛癆寒脹。燥溼散寒。③清黃宮繡本草求真論紅豆蔻曰。氣味辛甘而溫。炒過入藥。亦是散寒燥溼。補火醒脾之味。且善解酒。并治風寒牙痛。

配合應用 治風寒牙痛。用紅豆蔻爲末。隨左右以少許搗鼻中。并擦牙取涎。或加麝香。(衛生家寶方)

參攷資料 ①紅豆蔻苦辛。多食令人舌粗。不思飲食。(甄權) ②紅豆蔻最能動火。傷目致飢。食料不宜用之。(生生編) ③紅豆蔻。李東垣脾胃藥中常用之。亦取其辛熱芳香。能醒脾溫肺。散寒燥溼。消食之功。爾若脾肺素有伏火者。切不宜用。(李時珍) ④紅豆蔻之禁忌炮製。一如良薑。(吳儀洛) ⑤紅

豆蔻苗如蘆。葉如薑。花作穗。嫩葉卷之而生。微帶紅色。嫩者入臘。累累作朶。不散落。須以朱槿花染令色深。善醒醉。解酒毒。無他要使也。(李珣)

【高柴子】即胡荽之古籍別名。典見和漢藥考。詳「胡荽」條。

【高飛】即白楊之古籍別名。典見綱目。詳「白楊」條。②即扶移之古籍別名。典見崔豹。詳「扶移」條。

【高魚】即石斑魚之古籍別名。典見綱目。詳「石斑魚」條。

【高粱】即稷米之俗名。詳「稷米」條。

【高脚黃】即茶菊之黃色者。典見綱目拾遺。詳「茶菊」條。

【高麗胡椒】即蕃椒之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蕃椒」條。

【高麗參】 命名 本品爲人參。產於朝鮮者。即古之百濟。新羅諸地。故名。古籍別名 白條參。別錄。朝鮮參。韓國參。百濟參。新羅參。紅參。白參。別直參。(綱目)

外國名詞 Corae-Ginseng. (拉丁)

產地 朝鮮江原道之太白山。小白山。爲古來有名產地。其次成鏡道之麒麟山。白雲山。狼林山。白頭山等。爲八道中有名產地。其中除小白山外。以狼林山所產爲最粗。性質亦佳。

種植 高麗參於園圃培植人參。自時後須閱七年。方可採取。

採取 產生於山野者。恒集山中。搜採取之法。由時而異。其最簡者。於積雪未消盡時。入山。有參之處。其地較暖。則雪先融。消約二尺。大四方地者。即知有參。而採之。

性質 甘微溫。無毒。

主治 腸胃中冷。心腹鼓痛。胸脇逆滿。霍亂吐逆。調中止消渴。通血脈。破堅積。令人不忘。

近人學說 張山雷曰。朝鮮地當東海之濱。東東方發生之氣。故其氣味濃厚。色亦重濁。具有溫養生發之性。今用之於脾胃虛寒。真陽衰弱。及中氣不振。陰寒用事。諸證。功效甚捷。較之遼參。偏於養陰。含有清涼氣味者。性質迥異。蓋遼參稟性醇正。絕無剛烈氣象。是以滋養陰津。尤其獨步。而高麗參則

十年來。時疫頻行。無年不有。所見無不如是。蓋附吳。莫良薑。薑黃之屬。均為此症必須要藥。惟近賢王

孟英。陸九芝。兩家所論霍亂。皆主溼熱而言。且謂肢冷脈伏。即是熱深厥深之候。萬萬不可誤用四逆法者。此則當時見症之不同。蓋亦天時人事之變遷。固自有不可一概論者。此當以舌苔之皓白與黃膩辨之。而所瀉所吐之物。一則清澈如水。一則穢氣惡濁。亦必確乎有惡。固不患臨症時之無所適從也。又曰。戴器謂止痢者。當以虛寒滑利言之。必非溼熱積滯之腸辟可知。甄權謂治腹內久冷氣痛。大明治反胃。則胃中無火。食入反出之朝食暮吐。完穀清瀉者也。蘇頌謂含塊噤津。治忽然惡心嘔清水。亦胃寒之症。瀕湖謂健脾胃。寬噎膈。破冷痺。除瘴癘。皆以陰蠶填塞者言。而胃燥津枯之噎膈。淫熱穢濁之瘴癘。非可一概論矣。石頑謂脾胃為客寒所犯。則逆冷霍亂。辛溫暖脾胃而逐寒邪。故能治之。甄權大明之主治。皆暖胃溫中散寒之功。如寒疝小腹痛。須同茴香治

之產後下焦虛寒。瘀血不行。小腹結痛者。亦用之。若胃火作嘔。傷暑霍亂。禁用。

●配合應用 治霍亂吐利。高良薑。炙令香。每用五兩。以酒一升。煮三四沸。頓服。亦治腹痛中惡。外臺秘要方。

●治霍亂嘔甚不止。用高良薑生剉二錢。大棗一枚。水煎冷服。立定。名冰壺湯。普濟方。

●治心脾冷痛。用高良薑三錢。五靈脂六錢。為末。每服三錢。醋湯調下。永類鈴方。

●治霍亂腹痛。高良薑一兩。剉以水三大盞。煎二盞。去滓。入粳米一合。煮粥食之。便止。聖惠方。

●養脾胃。去冷消痰。寬胸下氣。大治心脾痛。及一切物傷。用高良薑乾薑等分。泡研末。麵糊丸。梧子大。每食後橘皮湯下十五丸。妊娠勿服。和劑局方。

●治脾虛寒。瘧寒多熱。少飲食。不思。用高良薑麻油炒。乾薑炮各一兩。為末。每服五錢。用豬膽汁調成膏。子臨發時。熱酒調服。或以膽汁和丸。每服四十丸。酒下亦佳。此

丸屢施皆效。救人以百計。大抵寒發於膽。用豬膽引二薑入膽去寒而燥脾胃。一寒一熱。陰陽相制。所以作效也。一方只用二薑。牛生牛炮各半兩。穿山甲炮三錢。為末。每服二錢。麝香酒下。朱氏集驗方。

●治妊婦腫脹。先因傷寒。變成者。用高良薑三錢。剉以豬膽汁浸一夜。東壁土炒黑。去土。以肥棗肉十五枚。同焙為末。每用三錢。水一盞。煎熱將發時服。神妙。永類鈴方。

●治暴赤眼痛。以管吹良薑末入鼻取嚏。或彈出鼻血即散。試驗方。

●治風牙腫痛。良薑二寸。全蠍焙一錢。為末。搽之。吐涎。以鹽湯嗽口。此乃樂清丐者所傳。百一選方。

●治頭痛。用良薑生研。類嗜鼻。普濟方。

●治頭痛。用良薑生研。類嗜鼻。普濟方。

●治頭痛。用良薑生研。類嗜鼻。普濟方。

●治頭痛。用良薑生研。類嗜鼻。普濟方。

●良附丸。治胃脘寒痛。屢發屢止。心口痛方。高良薑。酒洗。七次。二錢。香附。醋洗。七次。一錢。右二味。剉為末。加薑汁一匙。鹽少許。為丸。每服一錢。米飲下。高良薑丸。治心脾冷痛。永類鈴方。高良薑。切片。四兩。分作四份。一兩用陳廩米半合炒黃。去米。一兩用陳壁土炒黃。去土。一兩用巴豆三十四粒炒黃。去豆。一兩用斑蝥炒黃。去蝥。更以吳茱萸一兩。酒浸一夜。同良薑再炒為末。以浸吳萸之酒。打糊為丸。梧子大。每服五十丸。空心薑湯下。

●噎逆胃寒者。高良薑為要藥。人參。茯苓。佐之。為其溫胃。解散胃中風邪也。楊士瀛。

●孫思邈千金方。言心脾冷痛。用高良薑細剉。微炒為末。米飲服一錢。立止。李時珍。凡男女心口一點痛者。乃胃脘有滯。或有蟲也。多因怒及受寒而起。遂致終身俗言心氣痛者。非也。用高良薑以酒洗七次。焙研。香附子以醋洗七次。焙研。各記收之。病因寒得用薑末二錢。附末一錢。因怒得用附末二



高良薑

膏。實作濃橙色卵圓形。其鬚根頗多。長約二寸。粗約四五分。外部時或生有許多節環。並被有細皺紋之薄皮。呈赤褐色。惟內部則為白色。充實而呈纖維狀。質輕而作木質狀。氣味芳香。味如胡椒。

種類 良薑出嶺南者。形大虛輭。生江左者。細緊亦不甚辛。其實一也。今人呼細者為杜若。大者為良薑者。亦非也。

採取 二三月間根採。

製法 李時珍曰。凡使良薑紅豆蔻。并宜炒過入藥。亦有以薑同吳茱萸。東壁土炒過入藥者。朱氏集驗方。脾虛寒痛。高良薑麻油炒。永類鈴方。治婦人妊娠瘧疾。豬膽汁浸一宿。東壁土炒。

性質 辛大溫。無毒。

成分 為揮發油。辛味性樹脂。越幾斯。澱粉。膠質等。凡高良薑中含有三種結晶體。即「幹普費里

葛」[Kamferid,「格蘭丁」Galangin,「阿魯車寧」Alpinin, 是也。甲為黃色扁平結晶體。 $(C_{15}H_{14}O_6 \cdot H_2O)$ 不溶於水。熱之則於二百二十一度至二百二十二度熔化。乙為淡黃色稜柱狀結晶體。丙為粒狀結晶體。

效能 暖胃散寒。止痛。消食。用作芳香性健胃藥。能治初期虎列拉橫隔膜。驚攣。急性腸炎。答兒作用。能刺激胃壁神經。使消化機能亢進。亦能刺激腸壁血管。使之收縮。傷寒霍亂等菌過之。即感強烈之刺激而死。

主治 暴冷胃中冷逆。霍亂腹瀉。

歷代配述攷證 【唐】甄權藥性本草論良薑曰。治風破氣。腹內久冷氣痛。去風冷痺弱。【唐】陳藏器本草拾遺論良薑曰。下氣。金聲好顏色。煮飯服之。止痢。【宋】大明日華諸家本草論良薑曰。轉筋瀉痢。反胃。解酒毒。消宿食。【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論良薑曰。含塊。噤津。治忽然惡心。嘔清水。遂巡即瘥。若口臭者。同草豆蔻為末水煎飲。

【明】李時珍本草綱目論良薑曰。健脾胃。寬噎膈。破冷癰。除瘧瘧效。【明】繆希雍本草經疏論良薑曰。高良薑。本經大溫。藏器辛溫。元素辛熱。純陽浮也。入足陽明。大陰經。二經為客寒所犯。則逆冷。霍亂腹痛。諸病生焉。辛溫暖脾胃。而逐寒邪。則胃中冷逆自除。霍亂腹痛自愈。愈矣。甄權治腹內久冷氣痛。去風冷痺弱。大明主轉筋瀉痢。反胃解酒毒。消宿食。蘇頌治惡心嘔清水。皆取其煖胃溫中散寒祛冷之功也。【清】黃宮繡本草求真論良薑曰。良薑氣味辛熱。治無他屬。凡因客寒積於胃脘。而見食積不消。絞痛殆甚。暨霍亂瀉痢。吐惡噎膈。瘧瘧冷癖。皆能溫胃却病。故同薑附則能入胃散寒。同香附則能除寒祛鬱。若傷暑泄瀉。實熱腹痛。切忌此。雖與乾薑性同。但薑乾經炮。經制則能以去內寒。此則辛散之極。故能以辟外寒之氣也。

辨偽 鄭有謚曰。陶隱居言高良薑始出高良郡。故得此名。別錄云。氣味辛大溫無毒。主治暴冷胃中冷逆。霍亂腹痛。近有偽品色黑而暗不黃。根瘦無味。非高良所產。不可用。用之反有害矣。曹炳章曰。高良薑。廣東海南出。者皮紅有橫節紋。肉紅黃色。味辛辣。為道地出貨。多用。途少。偽者鮮見。南越筆記云。高良薑出於高涼。故名。根為高良薑子。即紅豆蔻子。未坼含胎。曬乾經冬味辛香入饌。又云。凡物盛多謂之薑。是子如紅豆而叢生。故名紅豆蔻。今驗此花深紅如灼。與圖經花紅紫色相照。合花體結實。大如白果。有稜。嫩時色紅。紅如細如橘。囊。所謂含胎也。老則色紅。即草木狀之生薑。變辭之杜若也。

近人學說 良薑大辛大溫。潔古謂辛熱純陽。故專主中宮真寒重症。別錄獨以治胃冷氣逆。霍亂腹痛者。正以霍亂皆中宮大寒。忽然暴作。俄頃之間。胸腹絞痛。上吐下瀉。即四肢冰冷。面唇青色。淡白如紙。脈伏不見。冷汗如油。大肉陡削。良由盛暑之時。乘涼飲冷。汨沒真陽。致中氣暴絕。見症如是之劇。甚者一二時即已告斃。此非大劑溫燥。萬不能挽回垂絕之元陽。三

喉痛喉癰諸症。用此亦頗有效。皆即懶湖用治牙痛之意。而陽邪實盛者。類皆不可妄試。昔人每謂此藥入腎。治骨。并能治骨傷碎。因得此名者。皆當識得此意。非陰虛有熱之骨痛。骨癢。果可以一概主治也。戴元禮症治要訣。謂病後下虛不善調養。或遠行。或房勞。致兩足痿軟。或痛或癢。遂成痢風。宜用獨活寄生湯。加虎骨四斤丸。仍以骨碎補三分之一。同研酒服。則以腎之虛寒而言。此藥溫腎。能起骨萎宜矣。惟痢後風之脚軟膝腫。亦有陰虛生內熱者。則宜魏玉璫之一貫煎。戴氏此法。非可概投。所謂萬痛有正面皆有反面。審症論治。最當明辨。設或囫圇吞棗。希圖弋獲。未有不敗者矣。此藥之根。有似於薑。且生茸茸之毛。故又有毛薑之名。一名猴薑。或謂即以有毛其形似猴得名。壽頤則謂寄生木石之上。等於榛之升木。字之以猴。其義易知。非象形也。又名申薑。則以申年之即猴兒年耳。

配合應用 ①治虛氣攻牙。齒痛血出。或痒痛。骨碎補二兩。銅刀

十畫 骨 高

細剉。瓦鍋慢火炒黑爲末。如常搗齒。良久吐之。嚥下亦可。劉松石云。此法出靈苑方。不獨治牙痛。極能堅骨固牙。益精髓。去骨中毒氣。疼痛。牙動將落者。數擦立住。再不復動。經用有神。

②治風蟲牙痛。用骨碎補。乳香等分爲末。糊丸塞乳中。名金針丸。
(聖濟總錄方)

③治耳鳴耳閉。骨碎補制作細條。火炮熟。塞之。
(圖經方)

④治病後髮落。胡孫薑。野薔薇嫩枝。煎汁刷之。

⑤治腸風失血。胡孫薑燒存性。五錢。酒或米飲服。
(仁存方)

用量 錢半至三錢。
施用宜忌 凡精虧血虛。及無瘀滯者禁用。

參攷資料 ①骨碎補入婦人血氣藥。蜀人治閉折筋骨傷損。取根搗篩。煮黃米粥。和裹傷處有效。
(蘇頌)

②骨碎補足少陰藥也。故能入骨治牙。及久泄痢。昔有魏刺史子久泄。諸醫不效。垂殆。予用此藥末。入豬腎中煨熟。與食。頓住。蓋腎主大小便。久泄屬腎虛。不可專

從脾胃也。雷公炮炙論。用此方治耳鳴耳。亦腎之竅也。按戴原禮症治要訣云。痢後下虛。不善調養。或遠行。或房勞。或外感。致兩足痿軟。或痛或痺。遂成痢風。宜用獨活寄生湯。吞虎骨四斤丸。仍以骨碎補三分之一。一同研取汁酒解服之。外用杜牛膝。杉木節。草薢。白芷。南星煎湯。頻頻薰洗。此亦從腎虛骨癢而治也。
(李時珍)

③骨碎補本名猴薑。開元皇帝以其主傷折補骨碎。故命此名。或作骨碎布訛矣。江西人呼爲胡孫薑。象形也。
(陳藏器)

④卷謂主折傷破血。此物功同。故有菴蘭之名。
(李時珍)

⑤今淮浙陝西。秦州。郡皆有之。生木或石上。多在背陰處。引根成條。上有黃赤毛。及短葉附之。又抽大葉成枝。葉面青綠色。有青黃點。背青白色。有赤紫點。春生葉。至冬乾黃。無花實。採根入藥。
(蘇頌)

【骨路支】 古籍別名 飛廉。
綱目拾遺

產地 生山野間。
形態 骨路支爲蔓草。類藤屬之一種。莖葉似凌霄。根如青木

香。可供藥用。
性質 辛。平。無毒。
主治 上氣浮腫。水氣嘔逆。婦人胸中餘血。癥瘕。殺三蟲。

【骨蓬】 即牽蓬草之古籍別名。典見和漢藥考。詳「牽蓬草」條。
【骨篤】 即蛇角之古籍別名。典見綱目。詳「蛇角」條。
【骨篤犀】 即骨咄犀。詳「蛇角」條。
【高山源黑魚】 即鯢魚之別名。典見和漢藥考。詳「鯢魚」條。

【高良薑】 命名 本品始出高良郡。即今高州。故名。其山高而精涼。則名當作高涼也。
處方用名 高良薑。

古籍別名 蠻薑。綱目埋光烏藥。比目連理花。
(和漢藥考)

外國名詞 Calanga (英) Calagant (德) 基本 係屬薔薇科良薑之地。下莖。

產地 陳仁山藥物生產辨云。良薑產廣東瓊州各屬爲多。
形態 良薑爲多年生草。莖圓而直立。高六七尺。葉作披針形。有短柄。稍似肉質。花呈綠白色。不整

【骨托食】即蛇鳥之古籍別名。典見綱目。詳「蛇鳥」條。

【骨咄咄】即蛇角之古籍別名。典見綱目。詳「蛇角」條。

【骨美】即白薇之古籍別名。典見綱目。詳「白薇」條。

【骨訥】即臘腦臍之古籍別名。典見和漢藥考。詳「臘腦臍」條。

【骨納】即臘腦臍之古籍別名。典見綱目。詳「臘腦臍」條。

【骨牌草】即辟瘟草之俗名。詳「辟瘟草」條。

【骨紐】即臘腦臍之古籍別名。典見和漢藥考。詳「臘腦臍」條。

【骨碎補】原名 猴薑。本品能治折傷而補骨碎故名。根如猴形狀似薑塊。遂有猴薑之稱。

處方用名 鮮毛薑。申薑。

古籍別名 胡猴薑（拾遺）石毛薑。日華（石菴蘭）綱目毛薑（俗名）

基本 隱花植物。石草類。為骨碎補之根。

產地 多在山野川谷石樹間。

陳仁山藥物生產辨云。骨碎補產

廣東北江、清遠、三坑等處。

形態 骨碎補為石草類多年自生之隱花植物。莖細長。延繞於巖石或樹木上。其枝幹密生。春生葉為三出羽狀複葉。葉面青綠。背面色白。夏日生多數子囊。有包如穀斗。其根扁長似薑。入藥用。



骨 碎 補

採取 春秋季採之。

製法 數日。凡採得用銅刀刮去黃赤毛。細切。蜜拌。潤飯蒸一日。曬乾。用急用。焙乾不蒸亦得也。

性質 苦溫無毒。

效能 補腎治骨傷。破血療風。痛。用作緩和滋養藥。又為殺蟲鎮痛藥。

主治 破血止血。補傷折。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論骨碎補曰。主骨中毒氣。風血疼痛。五勞六極。足手不收。上熱下冷。【宋】大明諸家本草論骨碎補曰。惡痰。蝕爛肉。殺蟲。【明】李

時珍本草綱目論骨碎補曰。研末。猪腎夾煨。空心食。治耳鳴及腎虛久泄。牙疼。【清】黃宮繡本草求真論骨碎補曰。骨碎補味苦而溫。功。尚入腎補骨。且能入心破血。是以腎虛耳鳴。久瀉。跌仆損傷。骨痛。牙痛。血出。無不用此調治。俾其腎補。骨堅。破瘀生新。而病即除。至論其名曰骨碎補。以其骨碎能補骨。故耳。雖與補骨脂相似。然總不如補骨脂性溫固腎通心。而無逐瘀破血之治也。去毛。蜜拌。蒸用。【清】鄒澍本經疏證論骨碎補曰。折之。不死。插之。輒生。剪枝移續。則根重。栽皆草木。恒性。詎足為異。未可以療傷折也。然則倒插亦生。橫埋亦生。雖切之成塊。暴之至枯。摘其一葉。分其一瓣。無不可生者。遂可以療傷折乎。此不過水與土正相嬌。草木偶得之。遂乘此生發耳。又烏足以療傷折。且傷之為傷。豈無差別。在皮肉曰傷破。在筋脈曰傷斷。惟在骨乃曰傷折。傷既在骨。而遠望水土之滋凝。草木之聯屬。其傷處敗壞久矣。惟骨碎補者。寸寸折之。寸寸皆生。處處折之。處處有汁。無

藉根株之係。不致血液之漏。故曰主破血。止血。補傷折。言能。不使瘀結者。留滯。不使流動者。妄行。而補其傷折。如未嘗傷折也。所以然者。若本堅裏而內含水。自應腎之體。溫本生養。而能運水。自應腎之用。此後人所以察其幾微。而謂為補腎。以除耳鳴齒痛。皆可以。是義推之矣。

近人學說 張山雷曰。骨碎補寄生石樹之間。有根有葉。黏着不落。亦猶桑上寄生之屬。性溫而通。故入血和血。通調脈絡。開竅。本本草謂氣味苦溫。主破血。止血。補傷折。又入藥用。根溫而達下。則入肝腎。故甄權謂主骨中毒氣。風血疼痛。上熱下冷。蓋溫養下元。能引升浮之熱。藏於下焦。窟宅。是以可治上熱下冷。李瀕湖謂研末。同猪腎煨食。可治耳鳴。及腎虛久泄。牙痛。皆是此意。非可通治胃家實火之齒痛。壽頤先業師閔仙朱先生。嘗用以治寒痰凝滯。牙關不利。煩重隱痛之骨槽症。甚有捷驗。又凡陰虛於下。而肝膽浮陽。挾痰上凝之齒痛。牙槽不利。及陰寒逼陽上浮之

能治風痺。通節數也。病在上者。酒以行之。甘以助之。故飲美酒。噉炙肉云。李時珍。

【馬蘭】 命名 本品葉形似蘭。且大而俗稱物之大者爲馬。故名。

處方用名 馬蘭根。馬蘭葉。

古藥別名 紫菊(綱目)紺菊。

(日本)嫩尖名馬蘭頭。(俗名)

外國名詞 Aster trinervus, Roxb. var. adustus Maxim.

(拉丁)コンギク(日本)

基本 係菊科紫苑屬。爲馬蘭之根莖。

產地 多生於山野田澤間。



馬蘭

形態 馬蘭爲芳草類之多年生草本。高二三尺。葉長作卵形而尖。粗糙。有三大脈。其鋸齒甚深。互生。秋月莖頭枝梢開花。花深紫色。與雞兒腸相類。惟有許多冠毛。故相差異。其嫩苗可作蔬茹。而根葉

等均可供藥用。

性質 辛。平。無毒。

主治 破宿血。養新血。止鼻衄。吐血。合金瘡。斷血痢。解酒疸。及諸

菌毒。蟲毒。生搗塗蛇咬。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論馬蘭曰。主諸瘡及腹中急痛痔瘡。

近人學說 祝天一曰。吳地町

畦有草。葉似澤蘭。青而滋。花似野菊。瓣紫蕊黃。莖圓而赤。嫩時野人摘而充饌。味頗美。因值錢。亦不甚惜。鄉人名之曰馬藍。言此草係藍

屬。繁植而賤。可供馬食。故稱焉。根名爲馬藍根。亦賤名也。味辛涼。能

解毒。東垣普濟解毒飲用。治時行大頭。有奇效。搗汁敷暑毒。滿喉痺。應響甚疾。誠良藥也。綱目有馬蘭

釋名紫菊。註云。葉似澤蘭。花似菊。抑卽馬藍歟。蘭與藍音同。故出此

綱目藍條中。另有馬藍。蓋指慈藍而言也。或曰蘭與藍既音同。不妨

名之爲蘭。何必名之爲藍。余曰。蘭芳草也。此草不香。不可稱蘭。蘭貴

名也。此草託身田坂。安可自稱尊而僭亂其名乎。

而僭亂其名乎。

參攷資料 ①馬蘭辛。能入

陽明血分。故治血與澤蘭同功。近

人用治痔漏云有效。春夏取生。秋

冬取乾者。不用鹽醋。白水煮食。并飲其汁。或以酒煮。焙研糊丸。米飲

日服之。仍用煎水入鹽少許。日

日熏洗之。醫學集成云。治痔用馬蘭根。搗傳片時。看肉平。卽去之。稍

遲恐肉反出也。(李時珍) ②馬蘭

生澤旁。如澤蘭而氣臭。楚辭以惡草喻惡人。北人見其花。呼爲紫菊。以其似單瓣菊花而紫也。又有山

蘭。生山側。似劉寄奴葉。無極。不對生。花心微黃。亦大破血。皆可用。

(陳藏器) ③馬蘭湖澤卑溼處甚多。二月生苗。赤莖白根。長葉有刻齒狀。似澤蘭。但不香。爾南人多採

治曝乾。爲蔬及餵餚。入夏高二三尺。開紫花。花罷有細子。莖節無馬

蘭之名。陳氏指爲惡草。何據。(李時珍) ④馬蘭根露。係馬蘭根蒸

取之露也。性質辛涼。無毒。功用散結清熱。破宿血。治痔瘡。以此物辛

涼。爲散結清熱之良品。入陽明血分。有和營清化之功效。(醫學大辭典) ⑤馬蘭膏。功用治小兒紅

赤遊風丹毒。並治大人丹毒。或溼

熱伏於經絡。腿面不紅不腫。疼痛

赤遊風丹毒。並治大人丹毒。或溼

熱伏於經絡。腿面不紅不腫。疼痛

異常。病者祇覺熱。他人按之極冷

者。方用馬蘭。不拘多少。無葉取根。清水洗去泥。搗絞取汁。以雞毛蘸

汁擦之。乾則再換。或調飛浮六一散擦之。亦可。(醫學大辭典)

【馬蘭根】 卽馬蘭之處方用名。詳

【馬蘭】條。

【馬蘭葉】 卽馬蘭之處方用名。詳

【馬蘭】條。

【馬蘭樹皮】 卽合歡皮之古籍別

名。典見和漢藥考。詳【合歡皮】條。

【馬蘭】 卽馬蘭之古籍別名。典見

郭璞賦。詳【馬蘭】條。

【馬蘭】 卽馬蘭之古籍別名。典見

郭璞賦。詳【馬蘭】條。

【馬蘭】 卽水蛭之古籍別名。典見

本草衍義。詳【水蛭】條。

【骨片】 卽鹿茸之花名。詳【鹿茸】

條。

【骨皮露】 基本 本品爲地骨

皮所蒸之露。

主治 解肌熱。骨蒸。一切虛火。

矣。(李時珍) ④今陝西諸郡及鼎

澧州亦有之。近汴尤多。葉似薤而

長厚。三月開紫碧花。五月結實。作

角子如薤。大而赤色。有稜根。細長

通黃色。人取以爲刷。三月開花。五

月採實。並陰乾用。許慎說文云。薤

似薤而小。根可爲刷。高誘云。河北

平澤率生之。江東頗多。種於階庭

呼爲旱薤。不知卽馬薤也。(蘇頌)

⑤蠶草生荒野中就地叢生。一本

二三十莖。苗高三四尺。葉中抽莖

開花。又能結實也。(李時珍)

【馬蘭花及根葉】 主治 去

白蟲(本 經)療喉痺。多服令人清洩。(別

錄) 歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論馬蘭花及根葉曰。主

癰疽惡瘡

配合應用 ①治睡死不寤。蠶

實根一握。搗爛。以水絞汁。稍澹

之。外臺祕要方)

②喉痺口瘡。馬蘭花一兩。薤荊

子一兩爲末。溫水服一錢。

③喉痺腫痛。喘息欲死者。外臺

祕要用馬蘭根葉二兩。水一升半。

煮一盞。細飲之。立瘳。用根搗汁三

合。蜜一合。慢火熬成。徐徐點之。日

五七度。(聖惠方)

④治沙石熱淋。馬蘭花七枚。燒

故筆頭二七枚。燒。粟米一合。炒爲

末。每服二錢。酒下。日二服。名通神

散。

⑤治小便不通。馬蘭花炒。茴香

炒。薤塵炒爲末。每酒服二錢。(十

便良方)

⑥治一切癰疽。發背惡瘡。用鐵

掃帚。同松毛牛膝。以水煎服。(乾

坤生意方)

⑦治面上癰腫。取鐵掃帚。地上

自落葉并子。煎湯頻洗。數次自消

(壽域神方)

⑧治面皰鼻皰。馬蘭子花杆。傳

之佳。(肘後方)

參攷資料 ①蠶草花實皆入

藥。列仙傳云。寇先生宋人。好種薤

食其葩實是矣。(蘇頌) ②按葉水

東日記云。北方田野人患胸腹飽

脹者。取馬蘭花搗。涼水服卽泄。數

行而愈。按此則多服令人泄之說

有驗。而蠶實謂之馬蘭。更無可以

疑矣。(李時珍)

【馬薤】 命名 凡物大者。多以

網目詳「水藻」條。

馬名。本品似芹而大。故

名。

古籍別名 牛薤(爾雅)胡芹

(通志)野茴香(綱目)

產地 生水澤間及卑溼諸地。

形態 馬薤爲菜類之一種。與

芹同類。三四月生苗。一本叢生。如

蒿。白毛蒙茸。似水芹而微小。似苧

藟。葉而色深。五六月開碎花。攢簇

如蛇牀。及薤花。青白花結實。亦

如薤。而色黑且重。根白色。長尺

許。氣亦香。硬堅不堪食。莖苗可供

食與藥用。

性質 甘。辛。溫。無毒。

主治 益脾胃利胸膈。去冷氣。

作菜茹食。

【馬薤子】 性質 甘。辛。溫。無毒。

主治 心腹脹滿。開

胃。

反胃。

【馬薤膏】 命名 膏。項上也。卽

馬項上之脂膏。故名。

性質 甘。平。有小毒。

主治 生髮。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論馬薤膏曰。治面黚手

足皴粗入脂澤用。療偏風口喎僻

參攷資料 ①馬薤脂膏。五

金(經源) ②按蠶樞經云。卒口僻

急者。煩筋有寒。則急引頻移。煩筋

骨熱。則縱緩不收。以桑鈎鈎之。以

生桑灰置坎中坐之。以馬膏熨其

急頻。以白酒和桂末塗其緩頻。且

飲美酒。噉炙肉爲之三指而已。蠶

樞無註本。世多不知此方之妙。驚

謂口頻喎僻。乃風中血脈也。手足

陽明之筋絡於口。會太陽之筋絡

於目。寒則筋急而僻。熱則筋緩而

縱。故左中寒。則逼熱於右。右中寒

則逼熱於左。寒者急而熱者緩也。

急者。皮膚煩燥。營衛凝滯。治法。急

者緩之。緩者急之。故用馬薤之甘

平。柔緩以摩其急。以潤其痺。以通

其血脈。用桂酒之辛熱。急寒以塗

其緩。以和其營衛。以通其經絡。桑

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

葉

目)

性質 有毒。

主治 小兒驚癇。女子崩中。赤白帶。赤用赤馬。白用白馬。

歷代記述攷證 【宋】日華諸家本草論馬鬣毛曰。燒灰服止血塗惡瘡。

【馬寶】即鮮苔之生於馬腹中者。用治癰癤。其性味詳『鮮苔』條。

【馬懸蹄】採取 以赤白馬者良。

性質 甘。平。無毒。

主治 驚邪癰癥。乳難。辟惡氣。鬼毒。蠱注不祥(本經)止衄。內漏。齩齒。赤馬者治婦人崩。白馬者治白帶(別錄)。

歷代記述攷證

【唐】韓保昇蜀本草論馬懸蹄曰。主癰癤齒痛。

【唐】孟詵食療本草論馬懸蹄曰。赤馬者辟溫瘧。【明】李時珍本草綱目論馬懸蹄曰。療腸癰。下瘀血帶下。殺蟲。又燒灰入鹽少許。搽走馬疳蝕甚良。

【馬蘭子】原名 蠶實。

處方用名 馬棟子。古籍別名 劇草子。豕首子。

十畫 馬

(本經)荔實。(別錄)馬薤子。(禮記注)馬薤子。(爾雅)鐵掃帚子。(救荒本草)旱蒲子。(禮記)三堅子。(綱目)莽子。(爾雅)

外國名詞 Iris enata, Thunb var. chinensis, Maxim.

基本 屬馬尾科。馬蘭之種子。

形態 馬蘭為自生之宿根草。春末自宿根叢生數十葉。高二三尺。葉細厚旋捲。類溪蓀葉。故有捲溪蓀之名。四五月間抽莖。梢上開紫碧色類似溪蓀之六瓣花。後結莢實。中有帶赤色小扁子。謂之馬蘭子。供藥用。



馬蘭子

採取 五月間採實。陰乾。

製法 時珍曰。凡入藥炒過用。

治疳則以醋拌炒之。

性質 甘。平。無毒。

效能 瀉濕熱。解諸毒。用治小腹痛。瘰癧。

主治 皮膚寒熱。胃中熱氣。風

寒溼瘰癧。堅筋骨。令人嗜食。久服輕身。(本經)止心煩滿。利大小便。長肌膚。肥大。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新修本草論馬蘭子曰。療金瘡。血內流。癰腫有效。【宋】大明日華諸家本草論馬蘭子曰。婦人血氣煩悶。產後血暈。并經脈不止。崩中帶下。治一切瘡癤。止鼻衄。吐血。通小腸。消酒毒。治黃病。殺蠱毒。傳蛇蟲咬。

【明】李時珍本草綱目論馬蘭子曰。治小腹痛。腹內冷積。水痢諸病。

配合應用 治諸冷極病。醫所不治者。馬蘭子九升。洗淨。空腹服一合。酒下。日三服。(千金方)

治寒疝諸疾。寒疝不能食。及腹內一切諸疾。消食肥肌。馬蘭子一升。每日取一把。以麵拌煮吞之。服盡愈。(姚僧坦集驗方)

治喉痺腫痛。用蠶實一合。升麻五分。水一升。煎三合。入少蜜。攪勻。細呷大驗。(聖惠方)用馬蘭子二升。升麻一兩。蜜丸。水服一錢。又方。馬蘭子八錢。牛蒡子六錢。研為細末。空心用溫酒服。方寸匕。飯後

生易簡方)

治水痢百病。用馬蘭子以六月六日。麵熬各等分。為末。空心米飲服六寸匕。如無六月六日。麵常麵亦可。或牛骨灰亦可。又方。馬蘭子乾。薑黃連各等分。為散。熱湯服二方寸匕。入腹即斷也。冷熱皆治。常用神效。不得輕之。忌豬肉冷水。(張文仲備急方)

治腸風下血。有痔瘡瘡破者。不治。馬蘭子一斤。研破。酒浸。夏三冬七日。曝乾。何首烏半斤。雄黃雌黃各四兩。為末。以浸藥酒打糊丸。梧子大。每服三十丸。溫酒下。日三服。見效。(普濟方)

用量 錢半至三錢。

參攷資料 月令仲冬。荔挺出。鄭玄注云。荔馬薤也。通俗文云。一名馬蘭。本草謂之荔實。(蘇恭)

馬蘭子北人說為馬棟子。廣雅云。馬薤。荔也。高誘云。荔挺出。荔草挺出也。譌禮者不識。呼為荔挺。又作馬薤。並誤矣。馬薤亦名豚耳。即馬蘭也。(蘇頌)爾雅云。莽音瓶。馬薤也。此即荔草。謂其可為馬刷。故名。今河南北人呼為鐵掃帚是

十畫 馬

探取 七八月間採之。

製法 採得莖葉曬乾用。

性質 苦微寒。無毒。

效能 破血通經殺蟲消脹。用作清血藥。

主治 下部瘰癧。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器

本草拾遺論馬鞭草曰瘰癧血瘕久瘕破血殺蟲搗爛煎取汁熬如飴每空心酒服一匕【宋】大明諸

家本草論馬鞭草曰治婦人血氣肚脹月候不勻通月經【元】安丹

溪本草衍義補遺論馬鞭草曰治金瘡行血活血【明】李時珍本草綱目論馬鞭草曰搗塗癰腫及蠅

螻尿瘡男子陰腫【明】繆希雍本草經疏論馬鞭草曰馬鞭草圖經

謂之龍牙別錄味苦氣寒無毒保昇日華子咸謂辛涼本是涼血破

血之藥下部瘰癧者血熱之極兼之淫熱故血汚濁而成瘡且有蟲

也血涼熱解汚濁者破而行之靡不瘳矣陳藏器謂其破血殺蟲亦

此意耳。

配合應用 ①治瘰癧痰熱用馬鞭草搗汁五合酒二合分二服

(千金方)

①治鼓脹煩渴身乾黑瘦馬鞭草細剉曝乾勿見火以酒或水同煮至味出去滓溫服以六月中旬

雪鳴時採者有效(衛生易簡方)

②治大腹水腫馬鞭草鼠尾草各十斤水一石煮取五斗去滓再

煎令稠以粉和丸大豆大每服二三丸加至四五丸神效(肘後方)

③治男子陰腫大如升核痛人所不能治者馬鞭草搗塗之(集驗方)

④治婦人疝痛名小腸氣馬鞭草一兩酒煎淡服以湯浴身取汗甚妙(纂要奇方)

⑤治婦人經閉結成瘕塊肋腹大欲死者馬鞭草根苗五斤剉細水五斗煎至一斗去滓熬成膏每

服半匙熱酒化下日三服(聖惠方)

⑥治酒積下血馬鞭草灰四錢白芷灰一錢熬餅丸梧子大每米

飲下五十丸(摘玄方)

⑦治魚肉瘰癧凡食魚鱸及生肉在胸脇不化成瘕瘕馬鞭草搗

汁飲一升即消(千金方)

⑧治乳癰腫痛馬鞭草一握酒一碗生薑一塊搗汁服渣敷患處

(衛生易簡方)

⑨治白癩風瘡馬鞭草爲末每服一錢食前煎芥薄荷湯下日三

服忌鐵器(聖惠方)

⑩治人疥馬疥馬鞭草不犯鐵器搗自然汁半盞飲盡十日內愈

神效

⑪治赤白下痢龍牙草五錢陳茶一撮用水煎服神效(醫方摘要方)

⑫治發背癰毒痛不可忍龍牙草搗汁飲之以滓敷患處(集簡方)

⑬治楊梅惡瘡馬鞭草煎湯先熏後洗氣到便爽痛腫隨滅(本草蒙筌方)

⑭治馬喉痺風腫煩吐血馬鞭草一握避風去兩頭搗汁飲之良

用量 錢半至三錢

施用宜忌 凡無瘀滯及元虛而無淫熱瘡毒者禁用忌火

參攷資料 ①葉似狼牙及荊蒾抽三四穗紫花似車前穗賴輓館都不似蓬蒿也(蘇恭) ②今衡

一一一〇

山廬山江淮州郡皆有之。尚類益母而莖圓高二三尺又曰龍牙草

生施州高二尺以來春夏有苗葉至秋冬而枯採根洗淨用(蘇頌)

①馬鞭下地甚多春月生苗方莖葉似益母對生夏秋開細紫花作穗如車前穗其子如蓬蒿子而細

根白而小(李時珍) ②馬鞭草味苦有毒伏丹砂硫磺(甄權)

【馬鞭草根】

性質 辛溫。

主治 赤白下痢初起焙搗羅末每米飲服一錢匕無所忌

【馬鞭皮】即生於土上之葉根之皮與桑白皮性味完全不同不可

採用有毒食之殺人

【馬蠅草】即地錦之別名詳『地錦』條

【馬顛】基本 馬顛爲雜草類之一種可供藥用

性質 甘有毒

主治 療浮腫不可多食

【馬駿毛】即馬駿毛之簡稱詳『馬駿毛』條

【馬駿毛】原名 鬚毛。古籍別名 鬚。(綱

懸蹄 條。

【馬蹄決明】即決明子之古籍別名。典見本草集註。詳「決明子」條。

【馬蹄香】①即杜若之古籍別名。典見植物學大辭典。詳「杜若」條。②即杜衡之處方用名。詳「杜衡」條。

【馬蹄草】①「專」之古籍別名。典見綱目。詳「專」條。②即決明子之古籍別名。典見本草集註。詳「決明子」條。

【馬蹄芋】即杜衡之古籍別名。典見和漢藥考。詳「杜衡」條。

【馬錢子】即番木鱉之古籍別名。典見綱目。詳「番木鱉」條。

【馬頭骨】性質 甘。微寒。有小毒。

主治 喜眠。令人不睡。燒灰水服方寸匕。日三夜一作枕亦良。

歷代記述攷證 【宋】日華諸家本草論馬頭骨曰。治齒痛。燒灰

傳頭耳瘡。【明】李時珍本草綱目論馬頭骨曰。療馬汗氣入瘡痛腫。燒灰傳之。白汗出良。

【馬類】即海月之古籍別名。典見綱目。詳「海月」條。

【馬薺】即馬通之俗名。詳「馬通」條。

【馬薺石】即鮮荅之古籍別名。典見和漢藥考。詳「鮮荅」條。

【馬薺】①即白朮之古籍別名。典見綱目。詳「白朮」條。②即大薺之古籍別名。典見范汪。詳「大薺」條。

③即蒼朮之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蒼朮」條。

【馬薺根】即續斷之古籍別名。典見初虞氏古今錄驗方。詳「續斷」條。

【馬薺子】即馬蘭子之古籍別名。典見禮記注。詳「馬蘭子」條。

【馬檳榔】古籍別名 馬金囊。事珠 紫板榔。（綱目）（雲志）馬金南。（記

形態 馬檳榔為檳榔之一種。其莖蔓生。結實大如葡萄。紫色。核頗大。似大楓子。而殼稍薄。圓長斜扁。其中仁可供藥用。

性質 苦。甘。寒。無毒。

主治 產難。隨時細嚼數枚。并華水送下。須臾立產。再以五枚去殼。兩手各握二枚。惡水白下也。欲斷產者。常嚼二枚。水下。久則子宮

冷。自不孕矣。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論馬檳榔仁曰。傷寒熱病。食數枚。冷水下。又治惡瘡腫毒。內食一枚。冷水下。外嚼塗之。即無所傷。

參攷資料 馬檳榔仁。凡嚼之者。以冷水一口送下。其甜如蜜。亦不傷人也。（汪機）

【馬薺】即玉竹之古籍別名。典見別錄。詳「玉竹」條。

【馬藍】命名 本品為藍之一種。其葉如苦蕒。故名。

古籍別名 板藍（俗名）大葉冬藍。山海經。琉球藍。和漢藥考。外國名詞 Strobilanthes

flacidiifolia, Nees. (拉一) 主治 婦人敗血。連根焙搗下

節。酒服一錢匕。

【馬蟻】即水蛭之古籍別名。典見本草衍義。詳「水蛭」條。

【馬鞭草】命名 本品節生紫花。如馬鞭之節。而穗類鞭鞘。故名。

古籍別名 龍牙草。（圖經）鳳頭草。（綱目）馬折。馬鞭草。杜牛夕。

鐵掃帚。鐵筍草。（和漢藥考）鐵筍。外國名詞 Verbena officinale, L. (拉一) Vervain. (英)

基本 屬馬鞭草科。馬鞭草之葉莖。

產地 陳仁山藥物生產辨云。馬鞭草有兩種。產廣西。南寧。百色。安南。東京等處。單枝形如馬鞭。又名黃草。洗淨。僞充金銀釧用。廣東生草藥店所沽者。其形若傘。開花結子時。有簍籠過草邊。褲脚每多被筋所刺。以此種為正。

形態 馬鞭草為原野自生之多年生草。亦有栽植以供玩賞者。春季自宿根生苗。莖作方形。高二三尺。葉對生。初似菊葉。後作三尖。更分裂為羽狀。邊緣有細鋸齒。夏日梢上開穗狀小花。作淡紫色。花冠作唇形。根白色。類貝母。



馬鞭草

●治目中息肉淫膚赤白膜。馬齒莧一大握洗淨。和芒硝末少許。綿裹安上。類易之。龍本論方。

●治風齒腫痛。馬齒莧一把。嚼汁漬之。即日腫消。本事方。

●治漏耳諸瘡。治耳內外惡瘡。及頭瘡肥瘡癩瘡黃馬散黃蘗牛兩乾馬齒莧一兩爲末。傳之。聖惠方。

●治項上癰瘡。用馬齒莧陰乾。燒研。臘豬脂和以暖酒洗拭。傳之。外臺祕要方。又治癰癰未破。馬齒莧同靛花搗搽。日三次。簡便方。

●治腋下胡臭。馬齒莧杵。以蜜和作團。紙裹。泥固。半寸厚。日乾。燒過。研末。每以少許和蜜作餅。先以生布揩之。以藥夾脇下。令極痛。久忍。然後以手巾勒兩臂。日用一次。以瘥爲度。千金方。

●治小兒火丹。熱如火。遠勝即損人。馬齒莧搗塗。廣利方。

●治小兒臍瘡。久不瘥者。馬齒莧研傳之。千金方。

●治豌豆瘡。馬齒莧燒研傳之。須臾根逐藥出。不出則更傳之。

(肘後方)

●治疔瘡腫毒。馬齒莧二分。石灰三分。爲末。雞子白和傳之。

●治反花惡瘡。馬齒莧一斤。燒研豬脂和傳。

●治疔脚腫瘡。用乾馬齒莧研末。蜜調傳上一宿。其蟲自出。神效。海上方。

●治足趾甲疽腫爛者。屋上馬齒莧。昆崙青木香。印城鹽等分。和勻。燒存性。入光明砂少許。傳之。外臺祕要方。

●治瘡久不瘥。積年者。馬齒莧搗爛封之。取汁煎稠。傳亦可。千金方。

●治馬咬人瘡入心者。馬齒莧煮食之。聖惠方。

●治射工溪毒。馬齒莧搗汁一升。服。以滓傳之。日四五次。良。海上方。

●治毛蟲螫人。赤痛不止。馬齒莧搗熱封之。妙。靈苑方。亦治蜂螫人。張文仲方。

●治蜈蚣咬傷。馬齒莧汁塗之。肘後方。

●治小兒白禿。馬齒莧煎膏塗之。

之。或燒灰豬脂和塗。聖惠方。

●治身面癰瘰。馬齒莧湯日洗二次。聖惠方。

●治雜物眯目不出。用東牆上馬齒莧。燒灰研細。點少許於眵頭。即出也。聖惠方。

●用鹽。錢半至三錢。施用宜忌。凡脾虛便泄及孕婦禁。用忌繁甲。

●參攷資料。馬齒莧所主諸病。皆只取其散血消腫之功也。李時珍。多年惡瘡。百方不瘥。或痛癢不已者。並搗爛馬齒莧。傳上。不過三兩遍。此方出於武元衡相國。武在西川。自苦瘡。瘡瘁不堪。百醫無效。及到京。有驛吏上此方。用之。便瘥也。李絳記其事於兵部手集。蘇頌。馬齒莧雖名莧。類而苗葉與莧都不相似。一名五行草。以其葉青梗赤花黃根白子黑也。蘇頌。馬齒莧處處園野生之。柔莖布地。細細對生。六七月開細花。結小尖實。實中細子如葶麻子狀。人多採苗煮曬爲蔬。方士採取伏蛇。結承黃丹砂。伏硫黃。死雄制雌。別有法度。一種水馬齒生

水中。形狀相類。亦可均食。見王西樓菜譜。李時珍。

【馬齒莧子】

主治 明目。

【唐】孟詵食療本草論馬齒莧子曰。延年益壽。明。常效。先食。醫心。鐵論。馬齒莧子曰。青。青。白。醫除邪。氣。利。大小。腸。去。寒。熱。以。一。升。搗。末。每。以。一。匙。用。葱。鼓。黃。粥。食。或。著。米。糲。五。味。作。羹。食。之。

【馬齒莧粥】

基本 本品係以馬齒莧和米

煮成之粥。

主治 治瘰。消腫。

【馬齒莧芽草】即馬齒莧之古籍別名。典見綱目。詳『馬齒莧』條。【馬齒莧】即礬石色青白生者之古籍別名。典見本草集註。詳『明礬』條。

【馬瓊】即水蛭之古籍別名。典見本草衍義。詳『水蛭』條。

【馬瓊子】即覆盆子之古籍別名。典見綱目。詳『覆盆子』條。

【馬蛇草】即地錦草之古籍別名。典見綱目。詳『地錦草』條。

【馬蹄】即馬懸蹄之簡稱。詳『馬

性質 酸寒無毒。

效能 瀉熱治惡瘡。解毒散血。瘡。用治毒蟲及毒蛇刺傷藥。

主治 諸腫癰瘡目。搗搗之。破。瘡。止消渴。

歷代記述攷證 【唐】韓保昇

蜀本草論馬齒莧曰。治白尸脚。陰

腫【唐】蘇恭新修本草論馬齒莧

曰。飲汁。治反胃諸淋。金瘡流血。破

血癰癰。小兒尤良。用汁治緊唇

面皴。解馬汁射工毒。塗之瘰【唐】

孟詵食療本草論馬齒莧曰。作膏

塗。溼癩。白禿。杖瘡。又主三十六種

風。癰癰止痢及疳痢。治腸痛【宋】

蘇頌嘉祐圖經本草論馬齒莧曰。

能肥腸。令人不思食。治女人赤白

帶下【宋】開寶重定新本草論馬

齒莧曰。服之長年不白。治癰瘡。殺

諸蟲。生搗汁服。當利下惡物。去白

蟲和梳垢封。丁腫。又燒灰和陳醋

滓。先灸後封之。即根出【明】李時

珍本草綱目論馬齒莧曰。散血消

腫。利腸滑胎。解毒通淋。治產後虛

汗【明】繆希雍本草經疏論馬齒

莧曰。馬齒莧味辛苦。氣寒無毒。經

十 薑 馬

原病式云。諸痛痒瘡瘍。皆屬心火。

辛寒能涼血散熱。故主癰結。癰瘡

疔腫。白禿。及三十六種風結。瘡。搗

敷。則腫散。行根拔。絞汁服。則惡物

當下。內外施之。皆得也。辛寒通利。

故寒熱去。大小便利也。苦能殺蟲。

寒能除熱。故主殺諸蟲。去寸白。止

渴。辛寒能散肺家之熱。故主目盲

白翳也。長年不白。總言其涼血益

血。病去身輕之功耳。方士多採取

用。以其亦有代砂結汞之能也。

近人學說 張山雷曰。此草葉

似首帶而肥厚如錢。其莖亦最肥

碩。曬於烈日之中。不易乾燥。其稟

性陰寒。已可概見。故最善解癰腫

熱者。亦可作敷藥。蜀本草稱其酸

寒。寇宗奭謂其寒滑。陳藏器謂治

諸腫。破癰癰。止消渴。皆寒涼解熱

之正治。蘇恭亦謂飲汁。治反胃。金

瘡流血。諸淋。破血癰癰。癰。則不獨

治癰腫。兼能消痞。蓋此草之葉面

青而背紫。莖亦作紫色。故入血分

而破血滯。諸症。蘇頌謂治女人赤

白帶下。則此症多由濕熱凝滯。寒

沿以利導之。而溼熱可泄。又兼能

入血破癰。故亦治赤帶。瀕湖謂散

血治腫。利腸滑胎。解毒通淋。又無

一非寒滑二字之成績也。

配合應用 ①治三十六風結

瘡。馬齒莧一碩。水一碩。煮取汁。入

蜜蠟三兩。煎成膏。塗之。（食療

本草方）

②治諸氣不調。馬齒莧煮粥食

之。（食醫心鏡方）

③治癰癰解氣。六月六日。採馬

齒莧曬乾。元日煮熱。同鹽醋食之。

可解癰癰氣。（唐寶經驗方）

④治筋骨疼痛。不拘風溼氣。楊

梅瘡及女人月經病。先用此藥止

疼。然後調理。乾馬齒莧一斤。溼馬

齒莧二斤。五加皮半斤。蒼朮四兩。

春碎。以水煎湯洗。澡。急用葱薑搗

爛。沖熱湯三碗服之。暖處取汗。立

時痛止也。（海上名方）

⑤治脚氣浮腫。心腹脹滿。小便

澀。少馬齒莧和少粳米醬汁煮食

之。（食醫心鏡方）

⑥治男女瘡疾。馬齒莧搗扎手

寸口男左女右。

⑦治產後虛汗。馬齒莧研汁三

合服。如無以乾者煮汁。（婦人良

方）

⑧治產後血痢。小便不通。臍腹

痛。生馬齒莧菜杵汁三合。煎沸。入

蜜一合和服。亦治小兒血痢。（產

寶方）

⑨治肛門腫痛。馬齒莧葉三葉

酸草等分。煎湯熏洗。一日二次。有

效。（瀕湖方）

⑩治痔瘡初起。馬齒莧不拘鮮

乾。煮熟急食之。以湯熏洗。一月內

外其孔閉即愈矣。（楊氏經驗方）

⑪治赤白帶下。不問老稚孕婦。

悉可服。取馬齒莧搗絞汁三大合。

和雞子白二枚。先溫令熱。乃下莧

汁微溫。頓飲之。不過再作即愈。（

崔元亮海上方）

⑫治小便熱淋。馬齒莧汁服之。

（聖惠方）

⑬治陰腫痛極。馬齒莧搗傳之

良。（水類鈴方）

⑭治中蠱殺死。馬齒莧搗汁一

升飲。并傳之日四五次。（壽域方）

⑮治腹中白蟲。馬齒莧水煮一

碗。和鹽醋空腹食之。少頃白蟲盡

出。（孟勸方）

⑯治緊唇面皴。馬齒莧煎湯日

洗之。（聖惠方）

(本)

基本 係蓼科蓼屬。爲馬藜之

莖葉。

產地 原野溼地均有出。

形態 馬藜爲溼類之野生雜草。莖高一二尺。葉長橢圓形而尖。互生。其鞘狀托葉之邊緣有細長之剛毛甚多。初夏開花。花淡紅色。密生於花軸之上部。穗狀花序。其莖葉可供藥用。



馬 藜

性質 辛溫。無毒。

主治 去腸中蛭蟲。輕身。

參攷資料 ①馬藜伏丹砂。雌

黃(李時珍) ②凡物大者。皆以馬

名之。俗呼大藜是也。高四五尺。有

大小二種。但每葉中間有黑跡如

墨點。記故方士呼爲墨記草。(李

時珍) ③馬藜。生下溼地。莖斑葉

大有黑點。亦有兩三種。其最大者

名龍藜。卽水莊花也。(陶弘景)

【馬醉木】 命名 本品牛馬食其葉卽有醉狀故名

馬醉木。

古籍別名 檉木。(拾遺)

基本 屬石南科馬醉木之葉。

產地 凡山野川谷間皆有之。

形態 馬醉木爲山野自生之

常綠樹。庭園亦栽植之。以供玩賞。

高五六尺。但生於深山者。有時高

至二丈。葉互生。爲革質。作長卵圓

形而稍尖。邊緣有細鋸齒。春季於

枝梢垂穗三寸許。葉生白色。蠶狀

小花。花後結小實。



馬 醉 木

用法 水煎薰洗。或焙剉外搽。

性質 苦平。有毒。

效能 殺蟲蟲。洗瘡癰。用作殺

蟲藥。

主治 破產後血。燙汁服之。其

葉煎汁洗瘡癰。搗碎封蛇傷。

用量 八分至一錢。

國外學說 本草綱目啓蒙曰。

檉木生山中者。多係五六尺小

年久者。始至丈餘。葉互生。形細長

有鋸齒。似拾葉而薄。經冬不凋。春

日枝梢開花。呈白色。如新木花。穗

長三寸許。叢集下垂。後結小子。亦

如綴木子。牛馬若食此葉。卽作醉

狀。故名馬醉木。鹿食之。則不時角

解。菜園生小長黑蟲時。用此葉煎

湯。放冷灌之。可殺蟲。又和漢藥考

曰。將葉之生汁點舌上。舌立麻痺。

若誤咽下。時致喪命云。

用量 八分至一錢。

施用宜忌 凡內服藥中禁用。

參攷資料 ①檉木生江東林

實間。樹如石榴。葉細。高丈餘。四月

開花。白如雪。(陳藏器) ②此木今

無識者。其狀頗近山欒。恐古今稱

謂不同耳。(李時珍)

【馬駒】卽薪實之古籍別名。典見

吳普本草詳「薪實」條。

【馬齒砂】卽碌砂之古籍別名。典

見本草集註詳「碌砂」條。

【馬齒莧】 命名 本品莖序比

並如馬齒而性滑利

似莧。故名。

古籍別名 馬莧。(別錄)五行

草。(圖經)五方草。長命菜。馬齒龍

芽草。九頭獅子草。狔耳草。綱目)

五色莧。鼠齒莧。(和漢藥考)

外國名詞 Portulaca oler-

acea L.(拉丁)

基本 屬馬齒莧科。馬齒莧之

莖葉。

產地 凡原野間恆多生焉。

形態 馬齒莧爲一年之自生

草。本春季生苗。平臥地上。分歧成

長莖圓。帶微赤色。葉厚而對生。作

長橢圓形。葉莖俱係多汁肉質。表

面滑澤。夏季於葉腋開大二分許

之黃色五瓣花。後結實。實橫裂。中

藏小黑色粒子。



馬 齒 莧

採取 六七月間採之。

製法 雷斂曰。凡使勿用大葉

者。韓保昇曰。葉小者至難煉。當以

槐木槌碎。向日東作架曬之。三兩

日即乾。如隔年矣。入藥須去莖。用

其莖無效。

性質 辛。溫。有毒。

主治 腹中大聖瘕。破積聚。息肉。惡瘡。白禿。(本經)療寒熱痞結。脇下滿。別錄。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論馬陸曰。辟邪瘴。

參攷資料 馬陸係神農藥。雷氏備載炮炙之法。而古方鮮見用者。惟聖惠逐邪丸用之。其方治久瘧發歇無時。用百節蟲四十九枚。淫生蟲四十九枚。桃霜三錢。粽子角七枚。五月五日未出時。於東南上尋取兩般蟲。至午時向南研勻。丸小豆大。每發日早。男左女右手。把一丸。嗅之七遍。立效。修時忌孝子。婦人。師尼。雞犬。見之亦令別錄。瘧寒熱之說。大抵毒物止。可外用。不敢輕入丸散中。(李時珍)

【馬留】即獼猴之古籍別名。典見倦遊錄。詳「獼猴」條。

【馬寫】即車前草之古籍別名。典見別錄。詳「車前草」條。

【馬蛤】即馬刀之古籍別名。典見別錄。詳「馬刀」條。

【馬蛭】即水蛭之古籍別名。典見唐本草。詳「水蛭」條。

唐本草。詳「水蛭」條。

【馬軸】即馬陸之古籍別名。典見別錄。詳「馬陸」條。

【馬阿螺】即珂之古籍別名。典見綱目。詳「珂」條。

【馬新蒿】即馬先蒿之古籍別名。典見唐本草。詳「馬先蒿」條。

【馬棟子】即馬蘭子之處方用名。詳「馬蘭子」條。

【馬溺】採取 以白馬者良。性質 辛。微寒。有毒。

主治 消渴。破癥堅積聚。男子伏梁積疝。婦人癥積。銅器承飲之。歷代記述攷證 【唐】孟誥食療本草論馬溺曰。洗頭瘡。白禿。漬惡刺瘡。日十次。愈乃止。【明】李時珍本草綱目論馬溺曰。熱飲治反胃。殺蟲。

參攷資料 馬尿治癥瘕有驗。按祖台之志怪云。昔有人與其奴皆患心腹痛。病奴死。剖之。得一白鼈。赤眼。仍活。以諸藥納口中。終不死。有人乘白馬觀之。馬尿噴鼈而鼈縮。遂以灌之。即化成水。其人乃服白馬尿而疾愈。此其徵效也。反胃亦有蟲積者。故亦能治之。(李時珍)

參攷資料 馬尿治癥瘕有驗。按祖台之志怪云。昔有人與其奴皆患心腹痛。病奴死。剖之。得一白鼈。赤眼。仍活。以諸藥納口中。終不死。有人乘白馬觀之。馬尿噴鼈而鼈縮。遂以灌之。即化成水。其人乃服白馬尿而疾愈。此其徵效也。反胃亦有蟲積者。故亦能治之。(李時珍)

參攷資料 馬尿治癥瘕有驗。按祖台之志怪云。昔有人與其奴皆患心腹痛。病奴死。剖之。得一白鼈。赤眼。仍活。以諸藥納口中。終不死。有人乘白馬觀之。馬尿噴鼈而鼈縮。遂以灌之。即化成水。其人乃服白馬尿而疾愈。此其徵效也。反胃亦有蟲積者。故亦能治之。(李時珍)

參攷資料 馬尿治癥瘕有驗。按祖台之志怪云。昔有人與其奴皆患心腹痛。病奴死。剖之。得一白鼈。赤眼。仍活。以諸藥納口中。終不死。有人乘白馬觀之。馬尿噴鼈而鼈縮。遂以灌之。即化成水。其人乃服白馬尿而疾愈。此其徵效也。反胃亦有蟲積者。故亦能治之。(李時珍)

參攷資料 馬尿治癥瘕有驗。按祖台之志怪云。昔有人與其奴皆患心腹痛。病奴死。剖之。得一白鼈。赤眼。仍活。以諸藥納口中。終不死。有人乘白馬觀之。馬尿噴鼈而鼈縮。遂以灌之。即化成水。其人乃服白馬尿而疾愈。此其徵效也。反胃亦有蟲積者。故亦能治之。(李時珍)

參攷資料 馬尿治癥瘕有驗。按祖台之志怪云。昔有人與其奴皆患心腹痛。病奴死。剖之。得一白鼈。赤眼。仍活。以諸藥納口中。終不死。有人乘白馬觀之。馬尿噴鼈而鼈縮。遂以灌之。即化成水。其人乃服白馬尿而疾愈。此其徵效也。反胃亦有蟲積者。故亦能治之。(李時珍)

參攷資料 馬尿治癥瘕有驗。按祖台之志怪云。昔有人與其奴皆患心腹痛。病奴死。剖之。得一白鼈。赤眼。仍活。以諸藥納口中。終不死。有人乘白馬觀之。馬尿噴鼈而鼈縮。遂以灌之。即化成水。其人乃服白馬尿而疾愈。此其徵效也。反胃亦有蟲積者。故亦能治之。(李時珍)

【馬腦】性質 有毒。主治 斷酒。臘月者溫酒服。

參攷資料 馬腦食之。令人癡。(孟詵)

【馬腸】產地 生泰州。形體 馬腸為雜木類之一種。其葉似桑。其根葉可供藥用。

採取 三月採葉。六月採根。性質 苦。辛寒。有毒。

主治 根療蟲除風。其葉療疔疥。

【馬蓬】即鬱金之原名。詳「鬱金」條。

【馬蜂】即土蜂之古籍別名。典見綱目。詳「土蜂」條。

【馬飯】即薺草之古籍別名。典見別錄。詳「薺草」條。

【馬瘍木】產地 生山谷間。形體 為雜木類之一種。樹形似樗。其根皮可供藥用。

性質 有小毒。

主治 惡瘡疥癬。生蟲作痒。為末和油塗之。

【馬精香】即返魂香之古籍別名。

典見海藥本草。詳「返魂香」條。

【馬蟬】即水蛭之古籍別名。典見唐本草。詳「水蛭」條。

【馬蜋】即蟬之古籍別名。典見爾雅。詳「蟬」條。

【馬蟻】即馬陸之古籍別名。典見爾雅。詳「馬陸」條。

【馬銜芎藭】即芎藭節大莖細。狀如馬銜者之古籍別名。典見綱目。詳「川芎」條。

【馬鳴退】即蟬蛻之別名。見「蟬蛻」條。

【馬鞭草】即馬鞭草之古籍別名。典見和漢藥考。詳「馬鞭草」條。

【馬價珠】即真珠產於西番者之古籍別名。典見格古論。詳「真珠」條。

【馬鬣】即馬勃之古籍別名。典見綱目。詳「馬勃」條。

【馬箭】即黃精之古籍別名。典見別錄。詳「黃精」條。

【馬蓼】古籍別名 大蓼。龍鼓。水紅花。墨記草。(綱目)

外國名詞 Polygonum Polsumbu, Hein. Var. Blumei, Matsuna. (拉丁)イヌタデ(日

1105

⑦治卒中惡死。吐利不止。不知是何病。不拘大人小兒。馬糞丸。絞汁灌之。乾者水糞汁亦可。此扁鵲法也。(肘後方)

⑧治攪腸痧痛欲死者。用馬糞研汁飲之立愈。(經驗方)

⑨治小兒卒忤。馬屎三升燒末。以酒三斗糞二沸取汁。浴兒避風。(千金方)

⑩治小兒癰疔。面青腹強。是忤客氣。新馬糞一團絞汁灌之。(聖濟總錄方)

⑪治傷寒勞復。馬屎燒末。冷酒服方寸匕便驗。(聖惠方)

⑫治熱毒攻肢手足腫痛欲脫。以水煮馬屎汁漬之。(外臺祕要方)

⑬治風蟲牙痛。白馬屎汁。隨左右含之。不過三口愈。(聖惠方)

⑭治鼻齕不聞。新馬屎汁含滿口。灌入即通。(聖惠方)

⑮治筋骨傷破。以熱白馬屎傳之無靈。(千金方)

⑯治疔腫傷風作腫。以馬屎炒熨瘡上五十遍。極效。(聖惠方)

⑰治多年惡瘡。或痛痒生覺。用

馬糞并齒同研爛。傅上不過數次。武丞相在蜀時。歷有瘡痒不可忍。用此而痊。(兵部手集方)

⑱治諸瘡傷水。或傷風寒痛劇。用馬屎燒烟熏令汗出愈。(千金方)

⑲治凍指欲墮。馬糞煮水。漬中日即愈。(千金方)

⑳治積聚脹滿。白馬糞同蒜搗膏。傅患處效。(活人心鏡方)

㉑治一切漏尿。白馬通汁。每服一升良。(千金方)

㉒用蠶三錢至四錢。施用宜忌 凡無實熱者禁用。

參攷資料 ①馬屎曰通牛屎曰洞。豬屎曰零。諱其名也。凡屎必達胸腸乃出。故曰通曰洞。腸廣腸也。李時珍。②別錄以雲中馬爲良。雲中今大同府也。大抵馬以西

北方者爲勝。東南者劣。弱不及。馬應月。故十二月而生。其年以齒別之。在齣屬火。在辰屬牛。或云在卦

屬乾。屬金。馬之眼光照人全身者。其齒最少。光愈近。齒愈大。馬食杜衡善走。食稻則足重。食鼠屎則腹

脹。食鷄糞則生骨眼。以僵變烏梅

拭牙則不食。得桑葉乃解。掛鼠狼皮於槽。亦不食。遇海馬骨則不行。以豬槽飼馬。石灰泥馬槽。馬汗着門。並令馬落駒。繫獼猴於廐。辟馬病。皆物理當然耳。(李時珍)

【馬達】 基本 馬達爲雜草類之一種。可供藥用。

性質 辛。無毒。

主治 殺癰蟲。

【馬陰莖】 製法 ①陳藏器曰。白馬。春月游牝時。力勢正強者。生取陰乾百日用。②雷敩曰。用時以銅刀破作七片。將生羊血拌蒸半日。曬乾。以粗布去皮及乾血。挫碎用。

性質 甘。鹹。平。無毒。

主治 傷中絕脈。陰不起。強志益氣。長肌肉。肥健生子。(本經)小兒驚癇。(別錄)

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論馬陰莖曰。益丈夫陰

氣。

參攷資料 ①陰乾。同肉蓯蓉等分爲末。蜜丸。梧子大。每空心酒下四十九日。再百日見效。(孟詵)

②生男子陰痿。故房中術備用之。(甄權)

【馬陸】 古籍別名 百足。(本經) 馬軸。(別錄) 重螭。李氏藥錄。刀環蟲。(蘇恭) 百節。衍義。千足。(炮炙論) 馬蟻。馬蟻。(郭璞) 馬蟻。(爾雅) 蟻(綱目) 馬蟻。

外國名詞 Julius Julius

Thousand-legs (拉丁) ヤスデ (日本)

基本 係節肢動物多足類馬陸類馬陸科。

產地 陰澤諸地。處處有之。

形態 馬陸爲澤生蟲類之一種。其體圓長。約三十箇同形之環節合成。每環節具脚二對。頭部扁平。有短觸鬚一對。及單眼數個。口

有上下顎各一對。無毒。蝨。背面有黃黑相間之環紋。晝伏夜出。食草根及腐敗物。常有一種惡臭。觸之則蹙曲如蠟狀。而不動。其在山而大者。謂山蠶蟲。採得可供藥用。

製法 雷敩曰。凡收得馬陸。以糠頭炒至糠焦黑。取出去糠。竹刀刮去頭足。研末用。

③治多年惡瘡。或痛痒生覺。用

馬糞并齒同研爛。傅上不過數次。武丞相在蜀時。歷有瘡痒不可忍。用此而痊。(兵部手集方)

④治諸瘡傷水。或傷風寒痛劇。用馬屎燒烟熏令汗出愈。(千金方)

⑤治凍指欲墮。馬糞煮水。漬中日即愈。(千金方)

月結實如大棗。狀似鈴。作四五瓣。其根名雲南根。微似木香。大如小指。赤黃色。七八月採實曝乾。(蘇頌)

肺熱咳嗽。爲絕少之症。今人惑於錢乙補肺阿膠一方。取以治虛嗽。百服百死。按單以馬兜鈴治虛嗽。固不可。若配以阿膠糯米。有何不可。此則一偏之言也。(陳修園)

【馬兜鈴根】即青木香之原名。詳「青木香」條。

【青木香】條。

【馬勒口鐵】即馬口鐵之別名。見「馬口鐵」條。

【馬口鐵】條。

【馬眼】採取以白馬生殺者。取之良。

性質平。無毒。

主治驚癇腹滿。瘧疾。

歷代記述攷證【唐】蘇恭新修本草論馬眼曰。小兒驚病。與母帶之。

【馬絆繩】命名本品乃繫馬之繩。故名。

主治煎水治小兒癰疾。

歷代記述攷證【明】李時珍本草綱目論馬絆繩曰。燒灰摻鼻。

【馬經骨】性質甘寒。無毒。主治煨存性。降陰火。中氣不足者用之。可代黃芩。黃連。

【馬莧】即馬齒莧之古籍別名。典見別錄。詳「馬齒莧」條。

【馬蝮】即馬陸大者之別名。詳「馬陸」條。

【馬陸】條。

【馬蟥】即馬陸之古籍別名。典見郭璞賦。詳「馬陸」條。

【馬通】命名本品即馬之糞。凡糞必達潤腸而出故名。

處方用名白馬通。白馬屎。

古籍別名馬屎。馬糞。(俗名)

製法新瓦上焙乾用。

性質微溫。無毒。

功效能清血熱。止吐衄。用作解熱止血藥。

主治止渴。止吐血。下血。鼻衄。金瘡出血。婦人崩中。

歷代記述攷證【南北朝】徐之才雷公藥對論馬通曰。數項止衄。

【唐】陳藏器本草拾遺論馬通曰。絞汁服。治產後諸血氣。傷寒時疾。當吐下者。

【唐】孟詵食療本草

論馬通曰。治時行病起合陰陽垂死者。絞汁三合。日夜各二服。又治杖瘡。打損傷瘡。中風作痛者。炒熱包熨五十遍。極效。【明】李時珍本草綱目論馬通曰。絞汁灌之。治卒中惡死。酒服。治產後寒熱。悶脹。燒灰水服。治久痢赤白。和豬脂治馬咬人瘡。及馬汗入瘡。刺死馬骨。刺傷人。毒攻欲死者。【明】繆希雍本草經疏論馬通曰。白馬通本經雖云微溫。然必是苦而涼者也。惟其苦涼。所以能療諸血熱。證止渴及孟詵主陰陽易垂死者。絞汁服也。【明】李士材本草圖解論馬通曰。白馬通即馬屎。微溫。主婦人崩中。止渴。及吐血。下血。鼻衄。金瘡。止血。治陰陽易垂死者。絞汁服。白馬溺味辛微寒。主消渴。破癥堅。積聚。男子伏梁積疝。婦人瘕疾。銅器盛飲之。【清】鄒澍本經疏證論馬通曰。史記大宛多善馬。馬汗血其先天馬子也。是知馬之氣最盛者。能使血隨汗出。即劣亦不能使血停於中。散之以行脈絡矣。然獨用其通何也。蓋馬通之治。治血之因寒而停。過障以溢者。何以知之。則以別

錄謂其微溫。仲景用於柏葉湯。知之。夫血緣火迫而溢。必不用性溫者爲治。且不使與乾薑艾葉爲伍矣。馬一身之物。非性寒即有毒。均非能鍾生氣於人身者。惟通則性溫。而爲養馬一身之餘。縱使一切性寒有毒之骨肉臟腑。皆賴此以生長。則人之身。其因寒而傷。而血停。因血停而吐衄崩漏者。均能行以散之。不容其再停矣。然謂其止渴何也。夫惟止渴一語。獨隸於婦人崩中之下。亦可知其崩中。則一身津液隨血而流。遂不足以滋。固無與於吐衄金創。小小下血者矣。

配合應用 治吐血不止。燒白馬通。以水研絞汁一升服。(梅師方)

治衄血不止。用綿裹白馬屎塞之。(錄驗方)又用赤馬糞絞汁飲一二升。並滴鼻內。乾者浸水亦可。(千金方)

治口鼻出血。用赤馬糞燒灰。溫酒服一錢。(永類鈴方)

治久痢赤白。馬糞一丸。燒灰水服。(肘後方)

近人學說

●賈九如曰：馬兜鈴體質輕氣味俱清，凡輕清者上浮，單入肺部，主治肺熱久嗽，痰結喘促，肺氣上急，坐臥不安，蓋嗽久則肺虛，肺虛則氣熱，氣逆則喘促，上急以此苦味者涼之降之，使肺熱去而嗽自止也。盛後湖云：肺熱久嗽，喘促連聲不絕者，非此不能除，因其體輕升上，直入腦竅，主治腦漏。●張山雷曰：馬兜鈴開資本草釋其苦寒，甄權則謂之平，瀕湖則曰微苦辛，蓋煩按味固稍苦而氣甚清，雖能清熱，却非大苦大寒之品。東垣謂味厚氣薄，陰中微陽，瀕湖加一辛字，蓋亦以其輕而能散，固亦隱隱有辛開之作用者也。開寶謂主肺熱咳嗽，痰結喘促，正以形質空虛，虛中雖有實，而亦片片如紙，宛若木蝴蝶之隨風飛揚，故同爲宣通肺氣化痰開閉之藥，其能治喘促者以肺有痰濁鬱結，則呼吸不暢而喘促隨之，此能通其結塞，斯氣道利而喘促自寧。此與虛喘家濁陰上逆，宜於攝納鎮墜之治者一輕一重用藥相反，而同爲定喘之兩大法門。甄權謂主肺

氣上急，咳逆連連，潔古謂去肺中濕熱，固皆肺實氣壅之正治也。開寶又謂治血痔瘻，則清利宣通，固爲瘡家血熱壅結之良劑，且血痔腸漏皆屬大腸燥金溼熱之壅滯，此能清金開泄，是以主之。若潔古以爲清肺，而又以爲補肺，則殆誤解錢仲陽補肺阿膠散之真旨，要之仲陽意中，祇爲肺受燥火之陵，熱壅不宜，故用牛蒡杏仁，兜鈴皆屬開宣清熱主治，特以熱傷肺陰，乃主阿膠，非諸藥皆是補肺正將。瀕湖已謂錢氏此方，非以兜鈴補肺，乃取其清熱降氣，使邪去而肺安。壽頤案宣肺之藥，紫苑微溫，兜鈴微清，皆能疏通壅滯，止嗽化痰，似此二者，有一溫一清之分，宜辨寒嗽熱嗽，寒喘熱喘主治，究竟紫苑本非大溫，兜鈴亦非大寒，而能抉壅疎通，皆有捷效，洵乎同爲肺金壅塞之良藥矣。

辨偽

張山雷曰：近今市肆中別有所謂洋兜鈴者，止有片片之兜鈴實，而無其外囊，形狀稍巨，作淡褐色，謂同類異種，似屬可信，用者取其色澤鮮明，頗行於世，然氣

味更清，力量更薄，究其功用，不如杜兜鈴爲佳，而價值則較貴，尙不知究是何物。如謂果即兜鈴之別種，則其外囊又何以棄而不用，且此藥之所以開肺者，性情專在於亮，瀕湖所謂體輕而虛，熱則懸而四開，有肺之象者是也。今乃偏去其外殼，則未免有買櫝還珠之憾矣。

配合應用

●治水腫腹大喘急，馬兜鈴煎湯日服之，千金方。
●治肺氣喘急，馬兜鈴二兩，去殼及膜，酥半兩，入器內拌勻，慢火炒乾，甘草炙一兩爲末，每服一錢，水一盞，煎六分，溫呷或噙之，（簡要濟衆方）

●治一切心痛，不拘大小男女，大馬兜鈴一個，燈上燒存性爲末，溫酒服立效，（摘玄方）

●解蛇蟲毒，飲食中得之，咽中如有物，嚥不下，吐不出，心下熱悶，兜鈴一兩，煎水服，即吐出，（崔行功纂要方）

●治痔瘻腫痛，以馬兜鈴於瓶中燒烟熏病處良，（日華本草方）用量 八分至錢半。

應用宜忌 凡屬寒嗽及脾弱便泄者禁用。

參攷資料

●馬兜鈴體輕而虛，熱則懸而四開，有肺之象，故能入肺，氣寒味苦，散寒，能清熱，苦辛能降肺氣，錢乙補肺阿膠散用之，非取其補肺，乃取其清熱降氣，邪去則肺安矣。其中所用阿膠糯米，則正補肺之藥也。湯劑中用多，亦作吐，故崔氏方用以吐蟲，其不能補肺，又可推矣，（李時珍）其根吐利人，微有香氣，故有獨行木香之名，嶺南人用治蟲，隱其名爲三百兩銀藥，肘後方作都淋蓋誤傳也，（李時珍）●獨行根生古堤城旁，所在平澤叢林中，皆有之，山南名爲土青木香，一名兜鈴根，蔓生，葉似蘿摩而圓，且澀，花青白色，其子大如桃李而長，十月以後枯，則頭開四系者，囊其中實，薄扁似榆莢，其根扁而長，尺許，作葛根氣，亦似漢防己，二月八月採根，（馬志）●馬兜鈴今關中河東河北淮寧浙州郡皆有之，春生苗，作莖繞樹而生，葉如山黧葉而厚大，背白，六月開黃紫花，頗類枸杞花，七

【馬兜鈴】 命名 本品蔓附木上。秋間葉落。其實懸垂。狀如馬頭之鈴。故名。

處方用名 杜兜鈴。蜜炙兜鈴。

古籍別名 王黃瓜。王室瓜。玉寶瓜。兜鈴苗。苗金藤。(和漢藥考)雲南根。綱目。都淋藤。(肘後方)

外國名詞 Aristolochia debilis, S. et Z. (拉丁)

基本 屬馬兜鈴科。藥用馬兜鈴之子實。

產地 陳仁山藥物生產辨云。馬兜鈴產安徽亳州。河南。山東。直隸。山西。平古縣等。



馬兜鈴

形態 馬兜鈴爲生於原野路旁之多年生蔓草。春季自宿根生苗。纏絡樹木而上。葉似薯蕷葉而厚。背呈白色。有毛茸。葉莖俱有一種惡臭。夏季於葉腋開黃紫色不整筒狀花。後結實。即名馬兜鈴。根名青木香。此草至秋季而枯死。實

爲褐色卵圓形。長一寸。闊六七分。被有薄皮。中有多數白色扁平種子。類似榆實。

採取 七八月採實陰乾。

製法 雷斅曰。凡用馬兜鈴。採得實。去葉及蔓。以生絹袋盛於東屋角畔。待乾。劈開去革膜。取淨子焙用。

性質 苦。寒。無毒。

效能 開肺下氣。清熱。化痰。治肺熱喘咳症。

主治 痰結喘促。血痔瘻瘡。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論馬兜鈴曰。肺氣上急。坐息不得。咳逆連連不止。【金】張元素珍珠囊論馬兜鈴曰。清肺氣。補肺去肺中溼熱。【明】繆希雍本草經疏論馬兜鈴曰。馬兜鈴味苦。氣寒。而無毒。亦應有辛。入手太陰經。苦善下洩。辛則善散。寒能除熱。其性輕揚。厥狀類肺。故能入肺除熱。而使氣下降。咳嗽者。氣升之病也。氣降熱除。嗽自平矣。痰結喘促。亦肺熱病也。宜并主之。血痔瘻瘡。無非血熱。兪痔病屬大腸。大腸與肺爲表裏。清肺熱則腑熱亦清矣。故

亦主之。甄權用以治肺氣上急。坐息不得。咳逆連連不止。潔古用以清肺氣。補肺去肺中溼熱者。皆除熱降氣散結之力也。【清】黃宮繡本草求真論馬兜鈴曰。馬兜鈴辛。性苦寒。體輕而虛。熱則四開。象肺因苦則能入肺降氣。因寒則能瀉熱除痰。因辛則於寒中帶散。故肺熱痰喘。聲音不清者。服此最宜。且其體輕則性上涌。故竊要治蛇蟲毒。一味濃煎服之。探吐。其毒即解。至有云服馬兜鈴能補肺陰者。取其熱清氣降。而肺自安之意。錢氏用此。同阿膠糯米補肺。其功原在糯米。阿膠耳。豈馬兜鈴之謂哉。又云可治腸風痔瘻。以肺與大腸爲表裏。腸胃之熱。本於肺臟所移。肺清而腸之熱與之俱清耳。若肺寒喘嗽失音者。切忌去筋膜。取子用。【清】汪詒庵本草備要論馬兜鈴曰。馬兜鈴體輕而虛。熱則四開。象肺。故入肺。寒能清肺熱。苦辛能降肺氣。治痰嗽喘促。血痔瘻瘡。大腸經熱。亦可吐蠱。蔓生實如鈴。去筋膜。取子用。【清】黃元御玉楸葉解論馬兜鈴曰。馬兜鈴味苦。氣寒。入

手太陰肺經。清肺降逆。定喘止嗽。治痔瘻腫痛。能解蛇蟲之毒。多用則吐。【清】楊時泰本草述鈞元論馬兜鈴曰。馬兜鈴所治。專主咳嗽之因於肺熱而痰結喘促者。第肺熱痰結。須分虛實。經曰。太陽獨至。厥喘虛氣逆。是陰不足。陽有餘也。又有虛勞少血。津液內耗。心火自焚。使燥熱乘肺。咯喘膿血。上氣涎潮。其嗽連續而不已者。用兜鈴於補瀉中。得不從所主劑。以爲別乎。且就痰結而論。亦不能以熱盡之。有咳因寒。寒久而痰滯。氣道壅塞。亦竟喘促不得臥。是乾薑理中之治也。較病於肺熱爲陽之有餘者。霄壤懸殊。而患證相類。就是推之。則六淫所感。寒熱而外。更如風暑燥溼。有乘於各氣之偏累及陰陽合和之宗氣。遂極於主氣肺臟。以爲咳嗽氣逆者。更舉七情受病。有因各臟之戾氣。以累及宗氣。而極於主氣者。種種可止。就肺熱而實之歟。况六淫七情。每每因鬱化火。治火之法。必先治鬱。而火乃散。又不謂清肺熱。下逆氣。便可一了百當也。知此則可以善用兜鈴矣。

肺解熱散血止嗽。治喉痺咽痛。鼻衄失音。外用敷諸瘡。良。生。澤地朽木上。狀如肺肝。紫色虛。彈之粉。取出粉用。

近人學說 張山雷曰。馬勃。生於陰溼之處。色紫成團。輕鬆多粉。乾而撲之。粉輕四散。有如烟霧。雖非苔類。而稟陰溼之氣以生。蓋亦與苔相似。故李氏綱目。附於苔類之末。唯輕虛能散。與苔類之專於滑降者不同。其氣味。則名醫別錄以爲辛平。其主治。則別錄雖止治惡瘡。馬疥。蓋既能散毒。又能燥溼。以療溼瘡。固得其宜。故弘景亦謂傳諸瘡甚良。今人用以爲金瘡止血。亦效。寇宗奭謂以蜜拌揉。以水調呷。治喉痺咽疼。蓋散鬱熱。亦清肺胃。確是喉症良藥。東垣普濟消毒飲用之。亦是此意。瀕湖謂清肺散血熱解毒。內服外敷。均有捷驗。誠不可以微賤之品而忽之。

配合應用 治咽喉腫痛。嚔物不得。馬勃一分。蛇退皮一條。燒末。綿裹一錢。含嚔立瘳。(聖惠方) 治走馬喉痺。馬屁勃。即灰菰。紹消一兩爲末。每吹一字。吐涎血。

即愈。經驗良方) 治聲失不出。馬竊勃。馬牙消等分。研末。沙糖和丸。炙子大嚔之。(摘玄方) 治久嗽不止。馬勃爲末。蜜丸。梧子大。每服二十九丸。白湯下。即愈。(普濟方) 治魚骨哽咽。馬勃末。蜜丸彈子大。嚔嚔。(聖濟總錄方) 治積熱吐血。馬屁勃爲末。沙糖丸如彈子大。每服半丸。冷水化下。(袖珍方) 治妊娠吐衄不止。馬勃末。濃米飲服半錢。(聖惠方) 治斑瘡入眼。馬屁勃。蛇皮各五錢。皂子十四箇爲末。入罐內。鹽泥固濟。燒存性。研。每溫酒服一錢。(閩孝忠集驗方) 治腫瘡不斂。葱鹽湯洗淨拭乾。以馬屁勃末傳之。即愈。(仇遠稗史方) 用鹽 八分至錢半。參攷資料 馬勃。即唐韓退之所謂牛溲馬勃。俱收並蓄者也。有大如斗者。小亦如升杓。去膜。以蜜拌。拌少。以水調呷。治喉閉咽痛。

生澤地及腐木上。夏秋採之。(寇宗奭) 每見用寒涼藥數資者。雖愈而熱毒內攻。變生他病。爲害不小。惟馬勃辛平而散。甚爲穩妥。(吳遵程) 馬屎。即馬通之俗名。詳「馬通」條。 馬尿中粟 主治 金創。小兒寒熱。客忤。不能食。 歷代記述攷證 明李時珍本草綱目論馬屎中粟曰。治小兒脇痛。 馬思哥油 即酥之古籍別名。典見綱目詳「酥」條。 馬思答吉 產地 出西域 諸地 形態 馬思答吉爲菜類植物之一種。形如椒而香氣酷烈。可供藥用。 性質 苦。溫。無毒。 主治 去邪。順氣。溫中。利脇。止痛。生津。解渴。令人口香。 馬珂璽 即珂之古籍別名。典見綱目詳「珂」條。 馬胸 即白棘之古籍別名。典見

綱目詳「白棘」條。 馬胞 即馬勃之古籍別名。典見和漢藥考。詳「馬勃」條。 馬胞衣 主治 婦人天癸不通。假存性爲末。在服三錢。入麝香少許。空腹新汲水下。不過三服。良。 馬革 即裘之古籍別名。典見郭義恭廣志。詳「裘」條。 馬韭 即麥門冬之楚名。典見綱目詳「麥門冬」條。 馬唐 即薺草之古籍別名。典見別錄。詳「薺草」條。 馬廐瓜 即王瓜之古籍別名。典見本草衍義。詳「王瓜」條。 馬料豆 即稽豆之俗名。詳「稽豆」條。 馬草 即敗醬之古籍別名。典見別錄。詳「敗醬」條。 馬骨 性質 有毒。 主治 燒灰和醋。傳小兒頭瘡及身上瘡。 歷代記述攷證 明李時珍本草綱目論馬骨曰。止邪。瘰癧。灰和油。傳小兒耳瘡。頭瘡。陰瘡。瘰癧。有漿如火灼。敷乳頭。飲兒。止夜啼。

一一〇〇

種。葉細而長。花紅而小。根似菰子。核色黃且多細絲如髮。不拘鮮乾。俱可供藥用。

主治 蛇蜂諸毒。

【馬尾歸】即當歸之產於陝西。頭圓多尾。色紫氣香而肥者。詳『當歸』條。

【馬尾藻】即海藻之處方用名。詳『海藻』條。

【馬尾駒】即馬勃之處方用名。詳『馬勃』條。

【馬折】即馬鞭草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『馬鞭草』條。

【馬疔】即馬勃之古籍別名。典見綱目。詳『馬勃』條。

【馬肝】 古籍別名 懸燈。 性質 有大毒。 主治 經水不通。

參攷資料 ①馬肝及鞍下肉。殺入。陶弘景。②按漢武帝云。食肉毋食馬肝。又云。文成食馬肝而死。韋莊云。食馬留肝。則其毒可知矣。方家以鼓汁鼠矢解之。（李時珍）

【馬肝石】 外國名詞 Polyg. ovum multiflor.

um. Thunb. (拉丁)

命名 本品爲石之青黑如馬肝者故名。

製法 須盛以金函。養以水銀。

主治 烏髮拭之。止饑。和九轉丹服。

【馬肝石】即何首烏之古籍別名。典見綱目。詳『何首烏』條。

【馬豆】即雲實之古籍別名。典見綱目。詳『雲實』條。

【馬辛】即藉實之古籍別名。典見綱目。詳『藉實』條。

【馬乳】 性質 甘。冷。無毒。 主治 止渴治熱。

歷代記述攷證 〔唐〕蘇恭新修本草論馬乳曰。作酪性溫。飲之消肉。

參攷資料 馬乳性冷利。同魚胎食作癢。（孫思邈）

【馬乳葡萄】即葡萄之古籍別名。典見綱目。詳『葡萄』條。

【馬夜眼】 古籍別名 附蟬尸。 基本 本品在馬膝上。有此目。能夜行。

主治 卒死尸厥。蠲齒痛。

【馬鬐子】即馬鬐子之古籍別名。

典見爾雅。詳『馬鬐子』條。

【馬明退】即蠶蛻之古籍別名。典見補註本草。詳『蠶蛻』條。

【馬牀】即蛇牀子之古籍別名。典見廣雅。詳『蛇牀子』條。

主治 寒熱。陰痿。

【馬肺】

【馬金南】即馬欖榔之古籍別名。典見記事珠。詳『馬欖榔』條。

【馬金囊】即馬欖榔之古籍別名。典見雲志。詳『馬欖榔』條。

【馬前子】即車前子之別名。詳『車前子』條。

【馬勃】 處方用名 輕馬勃。馬尻勃。

古籍別名 馬疔。馬癩。灰菰。牛屎菰。（綱目）灰包。馬包。馬胞。馬尼。菌。馬天乙。茸。（和漢藥考）狗頭灰。（俗名）

外國名詞 Lycopodium bovis, L. (拉丁) Puffball (英)

基本 係夏季生於山林陰地之馬勃。爲菌類之一種。

產地 陳仁山藥物生產辨云。馬勃以廣東南順之樂基產者爲佳。質鬆浮。其次廣西產者。再次則

產於河南省開封府。質結而重。均十月新。

形態 初生作白色球狀。如馬糞。及長大。外面作暗褐色。質輕如綿。中含無數孢子。其熟者。燭之發塵煙。

採取 夏秋間採曝乾。

製法 李時珍曰。凡用以生布張開。將馬勃於上摩擦。下以盤承取末用。

性質 辛。平。無毒。

效能 清肺火。療喉痛。開音。止血。

主治 惡瘡。馬疥。

歷代記述攷證 〔南北朝〕陶弘景本草集註論馬勃曰。傳諸瘡疥甚良。〔宋〕寇宗奭本草衍義論馬勃曰。去膜以蜜拌。揉少以水調。呷治喉痺咽疼。〔明〕李時珍本草綱目論馬勃曰。清肺散血。熱解毒。

【明】繆希雍本草經疏論馬勃曰。馬勃味辛氣平而無毒。宜其主惡瘡。馬疥及止凍瘡也。衍義曰。去膜以蜜拌。拌少以水調。呷治喉痺痛。則辛散之功也。〔清〕汪詒庵本草備要論馬勃曰。馬勃辛平輕虛。清

橫玲瓏。洞敞可愛者。即馬牙消也。

性質 甘大寒。無毒。

主治 除五臟積熱伏氣。末歸

點眼亦去赤腫障翳。滴淚痛亦入

點眼藥中用。功同芒硝。

【馬牙硝】即朴硝之處方用名。

詳「朴硝」條。即馬牙消。

【馬牙齒】性質 甘平。有小毒。

主治 小兒馬廔水

摩服。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器

本草拾遺論馬齒曰。燒灰唾和塗

癰疽丁腫出根效。

【馬包】即馬勃之古籍別名。典見

和漢藥考詳「馬勃」條。

【馬吐同仇大乃】即蟻蜋之古籍

別名。典見和漢藥考詳「蟻蜋」條。

【馬尼齒】即馬勃之古籍別名。典

見和漢藥考詳「馬勃」條。

【馬甲】即海月之古籍別名。典見

綱目詳「海月」條。

【馬甲子】產地 江西處處有

之。

形態 如莢。莢莖。大葉如柿。

葉亦硬。面綠。背淡有緒紋。開小白

花。如葉花。結實形似鰓魚。圓小如

錢。生青熟緒。有扁核。青時味如梨

而淡。其根可供藥用。



馬甲子

主治 喉痛。

【馬皮】主治 婦人臨產。赤馬

皮。催生良。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論馬皮曰。治小兒赤禿。

以赤馬皮。白馬蹄燒灰和臘豬脂

傳之良。

【馬目毒公】即鬼臼之古籍別名。

典見本經詳「鬼臼」條。

【馬目奪公】即八角連之古籍別

名。典見綱目拾遺詳「八角連」條。

【馬矢蒿】即馬先蒿之古籍別名。

典見本經詳「馬先蒿」條。

【馬先蒿】命名 本品氣如馬

矢。先為矢字之誤。故

名。

古籍別名 馬矢蒿。本經練

石草。爛石草。別錄馬新蒿。唐

本草虎麻。綱目鹽龜菊。鹽龜

草。日本外國名詞 Pedicularis renu-

dinata, L. (拉丁) シホガマキ

ク シホガマサウ (日本)

基本 係玄參科馬先蒿屬。藥

用馬先之莖葉。

形態 馬先蒿為澤草類蒿屬

之一種。多年生草本。高二三尺。葉

長卵形。互生。或對生。秋月開花。作

唇形。花冠紅紫色。生於莖之上部。

或有帶黃白色者。八月結角。似小

豆。銳而長。其莖葉可供藥用。

性質 苦平。無毒。

主治 寒熱鬼疰。中風瘰癧。女

子帶下病。無子。本經練石草。治

五癰。破石淋。膀胱中結氣。利水便

小便。別錄

歷代記述攷證 【南北朝】陶

弘景本草集註論馬先蒿曰。治惡

瘡。

參攷資料 葉大如荊薊。花紅

白色。三月八月採莖葉陰乾。用八

月九月實熟。俗謂之虎麻是也。一

名馬新蒿。所在有之。荊薊苗短小。

其子夏中熟。二物初生極相似也。

(蘇恭)

【馬耳】即桑子之古籍別名。典見

別錄詳「桑子」條。

【馬行】即紫參之古籍別名。典見

別錄詳「紫參」條。

【馬尾】主治 女人崩中。小兒

客忤。

參攷資料 馬尾。濟生方治崩

中。十灰丸中用之。又延壽書云。刷

牙用馬尾。令齒疎損。近人多用燒

灰搽拭。最腐齒齦。不可不知。(李

時珍)

【馬尾】即商陸之古籍別名。典見

廣雅詳「商陸」條。

【馬尾香】即乳香之古籍別名。典

見海藥詳「乳香」條。

【馬尾連】產地 出雲南省。

上有小根頭。土人盤曲之以市。

性質 性寒。味苦。

效能 能去皮裏膜外及筋絡

之邪熱。

主治 小兒傷風及痘疹難透。

命名 本品形如馬

尾。故名。

產地 出臺灣海島間。

形態 馬尾絲為雜草類之

形。

馬尾絲為雜草類之

形。

肉色黑及馬自死者並不可食。殺人馬黑脊而斑腎者不可食。(張鼎) ⑤患痢生疥人勿食。食必加劇。妊婦食之令子過月。乳母食之令子疳癰。(蕭炳) ⑥同倉米者耳食必得惡病。十有九死。同薑食生氣嗽。同豬肉食成霍亂。食馬肉毒發心悶者飲清酒則解。飲濁酒則加。(孟詵) ⑦食馬中毒者飲蘆服汁食杏仁可解。(李時珍)

【馬刀】

俗稱大爲馬。本品大而形如刀。故名。

古籍別名 馬蛤(別錄)齊蛤。

(吳普)螻(爾雅)處(周禮)螳螂。草母。燠岸(綱目)

產地 生江湖池澤及海中。

製法 凡使馬刀殺煉粉用。

形體 馬刀爲介類動物之一種。棲水泥中。其形似蚌而小。形狹而長。其類甚多。又與螳相類。殼成長方形。大者長三四寸。外色蒼黃。內色淡黃。其肉可供食。殼可供藥用。

性質 辛。微寒。有毒。

主治 婦人漏下赤白。寒熱。破石淋。殺禽獸賊鼠。(本經)能除五

臟間熱。肌中鼠竄。止煩滿。補中氣。去厥痺。利機關。(別錄)

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論馬刀殺曰。消水。癰氣。癰痰。飲。

參攷資料 ①馬刀殺得水火

良。(蘇恭) ②馬刀殺得水爛人腸。

(綱目)

【馬口鐵】

古籍別名 馬勒口鐵。

基本 本品爲馬口中所含之鐵嚼環也。

性質 辛。

主治 小兒驚風。

【馬子鐵】即人中黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳「人中黃」條。

【馬天乙茸】即馬勃之古籍別名。典見和漢藥考。詳「馬勃」條。

主治 健忘。

參攷資料 ①馬心患病人食之。則瘡開加甚。(孟詵) ②以白馬者良。

【馬牙半支】 命名 本品即虎牙半支之葉。

扁大者。故名。

古籍別名 醫辯半支。鐵梗半

支。山半支。(綱目拾遺) 旱半支。(百草鏡) 醫辯豆草(家寶方) 醫

辦草。

產地 生石壁間。及燥土平澤諸處。

形體 馬牙半支爲半支類之一種。引蔓而生。二月發苗。其莖微方。作水紅色。有細紅點。子經霜不凋。四月開黃花。如瓦松。葉大叢生。圓如醬中豆。瓣莖莖葉可供藥用。

性質 寒。無毒。

主治 利水化溼熱。和血消癰。腫。療腸癰痔漏。並蛇咬。疔疽。便毒。風痺。跌撲。黃疸。擦汗斑。尤妙。搗汁陳酒和服。

配合應用 ①絕癰。醫辦豆草。六月六日。雞鳴時。採略洗。蒸熟。一日曬乾。不乾焙之。每一筋。配老薑一筋。磨細收貯。一日者一錢。二日者二錢。三日者三錢。酒調服。服後飲酒至醉爲妙。合時忌雞犬婦人見之。神效。(家寶方)

②治狗咬。以酒洗淨瘡口。血。搗醬板半支。卷上一二日。即癒而愈。

③治癰癤。馬牙半支。作菜常服。多年癰癤皆消。屢試屢驗。

④治急癰。用醫辦草陰乾。每服三錢。水煎服。

⑤治淋疾。芝麻一把。核桃一個。石上馬牙半支共搗。滾生酒沖服。

(奇方類編)

⑥治水腫。取醫辦草搗。合麝香貼臍眼。如人行五里。其水即下。

參攷資料 馬牙半支有二種。有紅梗青梗之別。治婦人赤白帶第一妙藥。赤帶用赤梗者。白帶用白梗者。採得搗汁。半酒盞。酸迷迷草亦有赤白二種。赤帶用赤者。白帶用白者。搗汁。半酒盞。和勻。加紹酒。半盞。煮熱。一服。即止。永不再發。

(綱目拾遺)

【馬牙砂】即硃砂之古籍別名。典見新修本草圖經。詳「硃砂」條。

古籍別名 牙消。

產地 陳仁山藥物生產辨云。牙消。各國各省均有出。乃用舊泥頃而得之。近日由外洋來者多屬田料用之。

製法 用芒硝再煎。化澄去脚。入蘿蔔數枚。同煮。熟。傾盆中。經宿結於上面。生牙如圭。角作六稜。縱

一〇九七

十畫 釘釜針 陝陟除隻車馬

③治痘瘡不起。藥膏搗汁。和白

酒釀頓溫服之。但不可頓大熱。大熱則反不妙。慎之。(良方集要)

④保元丹。黃精一觔。甘枸杞四兩。酒釀五觔。好黃酒五觔。入礬煮一炷香。每食一茶杯。藥渣搗爲丸。加胡桃肉八兩。大黑棗八兩。青州柿餅一觔。(千金不易方)

參攷資料 酒釀味醱厚。多飲腹瀉。而性善升透。凡火上行者忌之。(趙學敏)

【釘頭緒石】卽代緒石之處方用名。詳『代緒石』條

【釘頭螺】卽海螺小者之別名。典見綱目。詳『海螺』條

【釜月下土】卽伏龍肝之古籍別名。典見和漢藥考。詳『伏龍肝』條

【釜月中墨】卽釜臍墨之古籍別名。典見四聲本草。詳『釜臍墨』條

【釜臍】卽釜臍墨之古籍別名。典見綱目。詳『釜臍墨』條

【釜煤】卽釜臍墨之古籍別名。典見綱目。詳『釜臍墨』條

【釜臍墨】命名 本品卽釜臍下之黑灰。故名。

古籍別名 釜月中墨(四聲)

鐵墨(開寶)釜煤。釜臍。鍋底墨。(綱目)

性質 辛。溫。無毒。

主治 中惡蟲毒。吐血。血暈。以酒或水溫服二錢。亦塗金瘡。止血生肌。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論釜臍墨曰。消食積。古腫喉痺。口瘡。陽毒發狂。

參攷資料 古方治傷寒。黑奴丸用釜底墨。竈突墨。梁上塵。三物同合諸藥。爲其功用相近耳。(李時珍)

【針辰砂】卽辰砂之古籍別名。典見和漢藥考。詳『辰砂』條

【針砂】卽辰砂之古籍別名。典見和漢藥考。詳『辰砂』條

【針魚】卽鱖魚之俗名。詳『鱖魚』條

【陝州豉汁】命名 本品乃用陝州大豆和鹽。椒。生薑所製之豉汁。故名。

主治 除煩熱。

【陟釐】古籍別名 側梨。(蘇恭)水苔。石髮。(開寶)

石衣。(廣雅)水衣。(說文)水綳。澤

烏韭。(綱目)

產地 生淡水中及水石間。

形態 陟釐爲苔類之一種。其形有多數之細胞。成爲一列綠色。或蒙茸如髮。或纏繞如絲。以顯微鏡視之。葉體成螺旋形。構造甚精。可爲肥料。并可供藥用。

性質 甘。大溫。無毒。

主治 心腹大寒。溫中消穀。強胃氣。止洩痢。

歷代記述攷證 【宋】日華諸家本草論陟釐曰。搗汁服。治天行病心悶。【宋】寇宗奭本草衍義論陟釐曰。作脯食。能止渴疾。禁食鹽。

【明】李時珍本草綱目論陟釐曰。搗丹毒赤遊。

【除辛】卽鈎吻之古籍別名。典見吳普本草。見『鈎吻』條

【隻刺】卽蒼耳子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蒼耳子』條

【隼】卽鷗之古籍別名。典見綱目。詳『鷗』條

【馬】外國名詞 Equus cab. (拉丁) (Horse 或 Mare 或 Stallion) (英)

基本 係脊椎動物哺乳類。有胎盤類。有蹄類。奇蹄類。馬科。

產地 出新疆。蒙古。青海。川邊一帶。

形態 馬爲獸類家畜類之一種。卽野馬之變種也。面部長。耳較直立。能動。頸背有鬃。上下顎各有門牙三對。犬牙一對。牝者無之。白牙六對。四肢強健。肢各一趾。着地趾有蹄。尾具長毛。體毛或褐或白。或黃不一。體長五六尺。至七八尺。性溫順。堪力役。其肉可供藥用。

採取 以純白牡者良。

性質 辛苦。冷。有毒。

主治 傷中。除熱。下氣。長筋骨。強腰脊。壯健強志。輕身不飢。作脯治寒熱瘧瘵。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論馬肉曰。煮汁洗頭瘡白禿。

參攷資料 ①馬肉只堪煮食。餘食難消。漬以清水。搗洗血盡。乃煮。不然則毒不出。患疔腫。或曰以冷水煮之。不可蓋釜。(日華)

②馬生角。馬無夜眼。白馬青蹄。白馬鼻頭者。並不可食。食令人癩。馬鞍下

似豆蔻。其子可供藥用。

性質 甘。辛。平。無毒。

主治 消食下氣。消酒止渴。辟邪。消腫。癰。殺蛇蟲。治尸疰。勞瘵。蟲。瘰癧。癰。結核。癰。疽。潰爛。食。果。成。積。用。酒。杯。藤。子。燒。灰。糖。井。服。下。五。七。錢。白。效。飲。酒。過。量。成。病。用。酒。杯。藤。子。煎。服。極。驗。

【酒泥草】 命名 本品係酒罈頭泥中之草。故名。

主治 剪刀風。

【酒炒】 卽米酒之處方用名。詳『米酒』條。

【酒苧】 卽黃苧用酒製成者之處方用名。詳『黃苧』條。

【酒浸】 卽米酒之處方用名。詳『米酒』條。

【酒窩】 卽酒釀之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『酒釀』條。

【酒製軍】 卽大黃以酒製成者之處方用名。詳『大黃』條。

【酒蘗】 命名 本品爲年久酒罈中所生之蘗。故名。

主治 一切酒傷。酒勞。酒疸。因酒成病諸症。服之立效。

參攷資料 酒蘗生酒罈中。不

十畫 酒

恒有凡藏酒之家。千百罈酒間。有一罈。啓之中空無酒。下有蜜結於中。其蘗初結之時。酒上薄凝如衣膜。久則漸厚。一二寸。便能滲酒。將酒中精華醇釀之氣。盡攝於膜內。膜乃漸厚。酒亦漸少。久久則酒乾。所存十不餘一。其膜如蚌海盤。濡潤而軟。嗅之作酒香。微帶微蒸氣。識者取之焙乾。乾者如瓜皮。面青黑。背作肉紅色。溼軟如棉。可入藥。蓋酒能生蘗。必罈係新出。未脫火氣。而置酒之地。又爲溼熱所蒸。致中變而成此。故造釀家用罈。貴舊而不貴新也。（趙學敏）

【酒糟】 原名 糟。

基本 本品爲糯秬黍麥之屬。蒸釀酒後所餘之糟粕。

採取 以臘月清明重陽。造酒者良。

製法 溼乾。入鹽少許收藏。若榨乾者則無味。不適用。

性質 甘。辛。無毒。

主治 溫中消食。除冷氣。殺腥。去草萊毒。潤皮膚。調臟腑。

歷代記述攷證 【宋】日華諸

家本草論酒糟曰。撲損瘀血。浸水洗凍瘡。搗傅蛇咬蜂叮毒。

參攷資料 酒糟有麴蘗之性。能活血行經。止痛。故治傷損有功。按許叔微本事方云。治腕折傷筋。骨痛不可忍。者用生地黃一斤。藏瓜喜糟一斤。生薑四兩。都炒熟。布裹。蒸傷處。冷卽易之。又類編所載。只用藏瓜喜糟一物。入赤小豆末和勻。罨於斷傷處。以杉片或白桐片夾之。云不過三日卽痊也。（李時珍）

【酒罈上紙】 基本 本品卽封蓋酒罈口上之紙。

採取 陳久者良。

主治 療皮膚間忽然血出。撕破貼之。

【酒麴】 卽小麥麴之俗名。詳『小麥麴』條。

【酒釀】 基本 本品乃未榨出酒之米醪。

古籍別名 酒窩。浮蛆。（綱目拾遺）

性質 甘。辛。溫。無毒。

主治 行血氣。發癰瘰。益髓脈。

生津液。

配合應用 ①治赤眼掩經。杜仲。厚朴。桑白皮。檳榔各一錢。取雄雞肝一個。忌見水。去紅筋。入白酒釀六兩。隔湯蒸熟。去渣。以湯肝食下。隔二日再服一次。全愈。（祝氏效方）

②治小兒鼻風。吹乳腫痛。用酒釀和菊花葉敷上。立愈。無葉用根。甘菊葉尤佳。搗汁沖和服更效。（劉起堂經驗方）

③治吹乳方。用苧藤根嫩者炒。和白酒釀少許。共搗爛敷患處。一日夜卽消。忌食發物。（周氏家寶方）

④治頭風。用蒼耳子。白芷。穀精草各五錢。川芎三錢。甜酒釀四兩。老酒二碗。煎一小時。服（妙淨方）

⑤治少遺白濁。酸梅草二錢。孩兒菊二錢。搗取汁。加不見水酒釀。空心量服。（救世普濟方）

⑥治難產。用酒釀。肺油。蜂蜜。童便。雞子白各半盞。煎溫服卽下。

⑦治痘出不起。用狗蠅七枚。冬日取蠅在狗耳內搗爛。和酒釀服。卽日發起。紅潤可觀。（不藥良方）

【貢桂】即肉桂之處方用名。詳『肉桂』條。

外國名詞 Rosm. arinus officinalis.

ト(拉丁)マンロネンウマンルサウ(日本)

基本 係臂形科迷迭香屬。藥用迷迭香之子實。

產地 原產南部歐羅巴。

形態 迷迭香爲芳草類之常綠小灌木。葉作線形。草質。花淡黃色。生於莖上部之葉腋。結實嚴霜不凋。芳香甚烈。



迷迭香

性質 辛溫。無毒。

主治 惡氣令人衣香。燒之去鬼。合羌活爲丸燒之。可以辟除蚊蚋。

參攷資料 ①廣志云。出西海。

魏略云。出大秦國(陳藏器)②魏文帝時。自西域移植庭中。同曹植等各有賦。大意其草修幹柔莖細

枝弱。根繁。花結實。嚴霜弗凋。收採幽經。摘去枝葉。入袋佩之。芳香甚烈。與今之排香同氣。(李時珍)③迷迭香用爲通經藥。又將其枝葉蒸溜之。採取迷迭油。以之供外用。亦間有內用者。此油有毒。故用時若其量過多。足以致死。(植物學大辭典)

【起蛟水】主治 壯筋骨。健腰膝。已虛勞。除驚悸。殺蟲。尸疰。鬼注。遁尸。邪氣。瘡疥。虛弱者。以代水煎。滋補藥。良。性升。能直透顛頂。

參攷資料 ①徽州多山。每春夏之交。久雨有起蛟之患。村人習見。勿異也。蛟初起。一二日間。地中先有聲。隱隱如雷鳴。或如牛吼。至期。土中輒陷出一小穴。如豆大。水從穴出。直上一二尺。如箭已而漸升。漸長。至簷隙與溜合。則水勢乃大下。穴亦漸大。如碗孔。蛟如飲饌形。從穴出。乘水而上。過簷。則形變。大乃飛越奔騰而去。屋宇亦無害。惟相隔一二里許。田禾間有傷損者。爲山水冲刷而然。此水初起。一二尺時。山人以瓶盞之屬接取。

食之力大無窮。蓋出蛟口中。含吮精力。貫注直逼而上。其全身之力。盡在此水。故人亦不能多食。壯健者三盞。即腹脹。不能再飲。土人以釀酒。更壯精力。可已虛勞。(張宇南)②蛟初起時。水如箭。清如泉。脈漸湧而高。必合天雨水。則勢大。而能飛騰。蛟出穴。始泛出水。名曰發洪。若初起時。用河水一杓。灌入其穴。則蛟水自回。便不能出穴。或取婦人月經。穢布塞之。亦止。若人服蛟水作脹。用千里長流河水煎服之。亦可解也。(單杜可)

【起目】即苡仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳『苡仁』條。

【起貨草】即紫葳之古籍別名。典見寶藏論。詳『紫葳』條。

【起陽草】即韭之古籍別名。典見侯氏藥譜。詳『韭』條。

【軒子】即薺草之古籍別名。典見綱目。詳『薺草』條。

【追風使】即五加皮之古籍別名。典見圖經本草。詳『五加皮』條。

【追魂使者】即鉛之古籍別名。典見土宿真言本草。詳『鉛』條。

【逆石】即石牀之古籍別名。典見綱目。詳『石牀』條。

【逆流水】命名 本品即倒流之水。故名。

性質 甘平。無毒。

主治 中風卒厥。頭風。癰疾。咽喉諸病。其性逆而倒上。故宜吐痰飲之。藥宜用之。

【郎君子】產地 生海中。

形態 郎君子爲介類之一種。狀如螺。中實如石。大如豆。藏箱篋中。積年不壞。若置醋中。即盤旋不已。可供藥用。

主治 婦人難產。手握之便生。極驗。

【郎耶草】即狼把草之原名。詳『狼把草』條。

【郎皋】即斑鳩之古籍別名。典見綱目。詳『斑鳩』條。

【郎城漢】即菱之古籍別名。典見綱目。詳『菱』條。

【酒母】即小麥麴之古籍別名。典見綱目。詳『小麥麴』條。

【酒杯藤】產地 出自西域諸地。

形態 酒杯藤爲果類之一種。藤大如臂。葉堅硬。結實大如指。味

宜多食耳。又補珍方云。中風。瘳毒者。以豇豆。煮汁。飲即解。欲試者。先刈鼠莽苗。以汁。澆之。便根爛。不生。此則物理然也。(李時珍) ③此豆紅色居多。莢必雙生。故有豇豆。雙之名。廣雅。指爲胡豆。誤矣。(李時珍) ④豇豆。處處。三四月。種之一種。蔓長丈餘。一種。蔓短。其葉俱本大。末尖。嫩時。可茹。其花有紅白二色。莢有白紅紫赤斑駁數色。長者至二尺。嫩時充菜。老則收子。此豆可菜。可果。可穀。備用最多。乃豆中之上品。而本草。失收。何哉。(李時珍)

種毛短密。生色蒼褐。至赤褐。有光。具暗褐色。或黑色之斑點。在背與體旁之斑點。如薔薇花形。或環形。大且明。在肢者則減少。且稍黑。腹部白色。身長四尺許。四肢大。尾長。能攀樹木。性殘忍。捕食動物。其肉可供藥用。



豹

古籍別名 程(列子)失刺孫(綱目)

外國名詞 Fels leopardus

I. (拉丁) Leopardus Panther (英) ヒョウ或ウ(日本)

基本 係脊椎動物。哺乳類。有胎盤。食肉類。裂腳類。貓科。

產地 出西南亞洲。及非洲諸地。

形態 豹爲獸類之一種動物。其形似虎。面圓耳短。比虎耳尖。瞳孔能隨光而收放。齒具門犬大三

十靈豹豺貢

傷輕身壯筋骨也(寇宗奭)

【豹皮】 參攷資料 ①豹皮。不可藉睡。令人神驚。其毛入人瘡中。有毒(陳藏器) ②廣西南界有嗜獵蟲。食死尸。不可驅逐。惟以豹皮覆之。則畏懼而不來(李時珍)

【豹足】 卽卷柏之古籍別名。典見吳普本草。詳「卷柏」條。

【豹脂】 基本 本品係用豹肉所熬成之脂肪。

主治 生髮。亦入面脂。

【豹鼻】 主治 鬼交狐魅。同狐鼻水煎服。

【豹頭骨】 主治 燒灰淋汁。去頭風白屑(孟詵)

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論豹頭骨曰。作枕辟邪。

古籍別名 豺狗(綱目)

基本 係脊椎動物。哺乳類。有胎盤。食肉類。裂腳類。犬科。

形態 豺爲獸類之一種。形瘦如犬。略似狼。口吻狹長。口裂深。幾至耳下。腦與鼻根處不凹。耳殼直立。眼銳有光。牙銳利。軀幹長。四肢前長後短。各肢具鈎爪。有小隱。便

游水尾垂後方。稍蓬鬆。毛色茶褐。帶微紅。或灰黃。而帶深黑色。頗有小白點。全體長四尺餘。有臊臭。氣鳴聲如犬吠。性凶暴。喜食羊。其皮可供藥用。

性質 熱。

主治 冷痺。軟脚氣。熱之以糞裹病上卽痊。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論豺皮曰。療諸疳痢腹中諸瘡。煮汁飲。或燒灰酒服之。亦可傳壓齒瘡。【明】李時珍本草綱目論豺皮曰。治小兒夜啼。百法不效。同狼屎中骨。燒灰等分。水服少許卽定。

參攷資料 ①豺皮。燒灰。和酒灌解。槽牛馬。便馴良。②豺肉。醃熱有毒。食之損人精神。消人脂肪。令人瘦(孟詵)。

【豺漆】 卽豺脂。

【豺節】 卽五加皮之別名。見「五加皮」條。

【實尖】 六安茶之最佳者。功用見「六安茶」條。

【實沉香】 卽沉香之處方用名。詳「沉香」條。

一〇九三

極腴美。皮可冒鼓及飾刀劍樂器。范成大處衡記云秦兵捕蚌蛇滿頭插花蛇即注視不動。乃逼而斷其首。待其騰擲。力竭乃斃。昇歸食之。又按山海經云巴蛇食象。三年而出其骨。君子服之。無心腹之疾。郭璞注云今蚌蛇即其類也。南齊志蚌蛇蟹曰蚌。惟大蛇既洪且長。採色獸映。其文錦章。食灰吞鹿。腹成養瘡。餐養嘉食。是豆是鰻。(李時珍)

【蚌蛇牙】 探取 以長六七寸者用。

主治 佩之辟不祥。利遠行。

【蚌蛇肉】 性質 甘溫。有小毒。主治 飛尸游蠱。喉中小物。吞吐不出。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論蚌蛇肉曰。除疳瘡。辟瘟疫瘴氣。明李時珍本草綱目論蚌蛇肉曰。除手足風痛。殺三蟲。去死肌。皮膚風毒。癩風疥癬惡瘡。

參攷資料 ①蚌蛇肉四月勿食之(綱目) ②度嶺南食蚌蛇瘴毒不侵(甄權) ③按柳子厚捕蛇說云。永州之野產異蛇。黑質白章。

觸草木盡死。無禦之者。然得而脂之以爲餌。可已大風。變院癩癩去死肌。殺三蟲。又張鷟朝野僉載云。泉州盧元欽患癩風。惟鼻不倒。五月五日。取蚌蛇進貢。或言肉可治風。遂取食之。三五日頓可。百日平復。(李時珍)

【蚌蛇酒】 製法 用蚌蛇肉一斤。羌活一兩。袋盛。同麴置缸底。糯米飯蓋之。釀酒。待熟取酒。以蛇肉焙乾。研末和藥。或袋盛浸酒亦可。

主治 諸風痛痺。殺蟲辟瘴。治癩風疥癬惡瘡。

【蚌蛇膏】 性質 甘平。有小毒。主治 耳聾及皮膚風毒。

歷代記述攷證 【南北朝】陶弘景本草集註論蚌蛇膏曰。治癩疾。明李時珍本草綱目論蚌蛇膏曰。綿裹塞耳聾。

辨偽 眞膏藥如梨。豆子相着。他蛇膏皆大如梅李子也。(陶弘景)

【蚌蛇】 卽蝴蝶之俗名。詳「蝴蝶」條。

【蚌蛇】 卽青蚌之古籍別名。典見綱目。詳「青蚌」條。

【蛭休】 卽蛭休之古籍別名。典見別錄。詳「蛭休」條。

【訓狐】 卽鴞之古籍別名。典見拾遺。詳「鴞」條。

【豇豆】 命名 本品色多紅絳。故名。

古籍別名 辟瘟(綱目)大角豆(日本)長豆(俗名)

外國名詞 Vigna sinensis, hasaki (拉丁)ササゲ(日本)

基本 係豇科豇豆屬。爲豇豆之子實。

形態 豇豆爲穀類之一。一年蔓生草本。莖有蔓性。能纏繞於他物上。葉爲羽狀複葉。自三小葉成。夏日開花。作蝶形花冠。色淡青。帶紫。果實爲長莢。莢內有種子數粒。既可供食。亦可充藥用。



豇豆

探取 秋月採之。性質 甘鹹平。無毒。主治 理中益氣。補腎健胃。和五臟。調營衛。生精。止消渴。止逆泄。利小便。數解風毒。

歷代記述攷證 【清】黃宮繡本草求真論豇豆曰。豇豆味甘而鹹。性平無毒。考之時珍云。豇豆可菜可穀。備用最多。乃豆中之上品。又曰。豇豆開花結莢。必兩兩並垂。有習坎之義。豆象微曲。有似人腎。所謂豆爲腎穀者。宜此當之。是以腎氣虛損。必賴此爲主治。且此味甘而平。入腎而更入胃。故凡胃津不生。胃渴不止。吐逆泄痢。小便頻數。草藥毒中。皆得甘以調劑。而使諸症悉平。也。普載諸疾。無腫。惟水腫忌補。腎氣不宜多食耳。清王士雄隨息居飲食譜論豇豆曰。豇豆甘平。輒時採莢爲蔬。可葷可素。老則收子充食。宜餚宜饌。頗有腎形。或有微補。

參攷資料 ①豇豆微曲如人腎形。昔盧廉夫教人補腎氣。每日空心煮豇豆。入少鹽食之。蓋得此理。與諸疾無禁。但水腫忌補腎。

理。與諸疾無禁。但水腫忌補腎。

忌之(醫學大辭典)

【蚤休根】即蚤休之處方用名。詳

【蚤休】條

【蜈蚣】 命名 本品身大而行更舒徐。冉冉然也。故名

處方用名 蜈蚣膽。

古籍別名 南蛇。埋頭蛇。(綱目)巴蛇。(綱目)

外國名詞 Python molurus L. (拉丁) (Indian python 或 Black-tailed python) (英)

基本 係爬蟲類蛇屬。藥用蜈

蛇之膽 產地 在嶺南諸地之山野間。



蛇 蜈

形體 蜈蚣大者五六丈。圍四五尺。小者不下三四丈。身有斑紋如錦。形如蠶頭。似蠶尾。圓無鱗。其首不舉。故有埋頭蛇之稱。其膽狹長通黑。皮膜極薄。舐之甜苦。刮末

着水中。浮游盤旋行走者。真。其偽者。旋行但遲耳。

製法 採得曝乾用。

用法 恒以外傳。到末和藥。

性質 甘苦。寒。有小毒。

效能 萬熱。明目。治疳。用作殺蟲。瘰癧。藥。又爲去翳明目藥。及傷科要藥。

至治 目腫痛。心腹腫痛。下部

醫瘡。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥

性本草論蜈蚣膽曰。治小兒八痛。

【唐】孟詵食療本草論蜈蚣膽曰。

疳。水化灌鼻中。除小兒腦熱。疳瘡。

瘰癧。灌下部。治小兒疳痢。同麝香。

傳商衍宣露。【唐】陳藏器本草拾

遺論蜈蚣膽曰。破血止血。痢蟲。蟲

下血。【明】李時珍本草綱目論蜈

蚣膽曰。明目。去翳。膜。療大風。【明】

繆希雍本草經疏論蜈蚣膽曰。蜈

蚣膽味苦。中有甘氣。寒。有小毒。入

手少陰。足厥陰。陽明。經。心腹。腫痛

者。蟲在內。攻嚙也。下部。瘰癧者。蟲

在外。侵蝕也。溼熱。則生蟲。苦寒。能

燥。溼。殺蟲。故內外施之。皆得也。肝

開竅於目。肝熱。則目腫痛。入肝。泄

熱。則腫痛除矣。今人受杖時。用此

噙化。可得不死。其功能護心。止痛

使止血。不卜。薄心。有神力也。

配合應用 ①治小兒急疳瘡。

水調蜈蚣膽傳之。(聖惠方)

②治小兒疳痢。羸瘦多睡。坐則

閉目。食不下。用蜈蚣膽。豆許。二枚

煮通草汁。研化。隨意飲之。并塗五

心下部。(楊氏產乳方)

③治齒齦宣露。出膿血。用蜈蚣

膽三錢。枯白礬一錢。杏仁四十九

枚。研勻。以布揩齦。咽令血盡。日三

搽之。愈乃止。(聖惠方)

④治痔瘡腫痛。蜈蚣膽。香油

調塗。立效。(醫方摘要方)

用量 八分至錢半。

施用宜忌 凡無風熱實火者

禁用。

參攷資料 ①嶺表錄云。雷州

有養蛇戶。每歲五月五日。即昇蛇

入官。取膽。曝乾。以充土貢。每蛇以

軟草藉於簾中。盤屈之。將取則出

於地上。用杈楊十數。翻轉蛇腹。按

日捕之。則遠遠露腹瘡。以明無膽。

又言取後。尚能活三年。未知何否。

(蘇頌)真膽狹長。通黑。皮膜極

薄。舐之甜苦。摩以注水。即沉而不

散。(陶弘景)②試法。別取粟許。着

淨水中。浮游水。一回旋行走者。爲

真。其徑沉者。諸膽血也。勿多着。亦

沉散也。陶未得法耳。(蘇恭)③人

多以猪膽。虎膽。爲之。雖水中走。但

遲耳。(孟詵)④其膽着醋。能卷人

筋。終不可脫。惟以芒草作筋。乃可

段。成。式。酉陽雜俎云。蜈蚣長十丈。

管吞鹿。鹿消盡。乃遠樹。則腹中之

骨。穿鱗而出。養瘡時。肪膜甚美。或

以婦人衣投之。則蟬而不起。(陳

藏器)⑤按劉珣錄異記云。蜈蚣

大者五六丈。圍四五尺。小者不下

三四丈。身有斑紋。如故錦。纈。秋夏

於山林中。同鹿吞之。蛇遂羸瘦。待

鹿消乃肥壯也。或言一年食一鹿

也。又顧玠海槎錄云。蜈蚣吞鹿及

山馬。從後脚入毒氣。呵及角。自解

脫。其膽以小者爲佳。王濟手記云。

年生草本。一莖獨上。高尺餘。莖當
葉心。葉爲長卵形。成層輪生。凡二
三層。或五七層。每一層有七葉色
綠似芍藥。夏月莖端開赤黃色花。
一花七瓣。有金絲蕊下垂。長三四
寸。秋結紅子。根大如鬼臼。或如蒼
朮狀。又似尺二蜈蚣。肥紫富滯外
藥中白。

採取 五月採之。

製法 採根。洗淨切片。日乾用。
用法 與他藥水煎。或剉末服。

或磨汁外塗。

性質 苦。微寒。有毒。

效能 殺三蟲。治癰瘡。專作解

毒藥。

主治 驚癇搖頭弄舌。熱氣在

腹中。(本經)癰疾癰瘡。除蝕下三
蟲去蛇毒。(別錄)

歷代記述攷證【唐】蘇恭新

修本草論蚤休曰。生食一升。利水。

【宋】大明諸家本草論蚤休曰。治

胎風。手足搖。能吐泄瘰癧。【明】李

時珍本草綱目論蚤休曰。去瘧疾

寒熱。

近人學說 ①張山雷曰。蚤休

乃苦泄解毒之品。瀕湖謂足厥陰

經之藥。蓋清解肝膽之鬱熱。息風
降氣。亦能退腫消痰。利水去溼。本
經治驚癇搖頭弄舌。皆肝陽肆虐。
木火生風之症。又謂之癰疾者。癰
卽顛頂之顛。字亦作顛。謂是肝風
上凌。直上頂顛之病。今西學家所
謂血沖腸經者。頗似吾國醫學向
所未聞。然氣上不下。頭痛顛疾。見
於素問五常政大論。字皆作顛。豈
非明言其病在顛頂。聲類謂癰爲
風病。豈非風動上凌。直犯顛頂。則
其病在腦。亦可於言外得之。可證
此種肝風猝動之變。吾國舊籍。早
已明知其爲氣血上沖。正不待西
學家自矜創獲。蚤休能治此症。正
以苦寒泄降。能息風陽而清氣火。
則氣血不沖。腦經不擾。而癰疾驚
癇。搖頭弄舌。諸病可已。本經之旨
直與龍素諸條。息息相通。以皆古
醫經之無上精義。惜乎漢魏六朝。
以降誤以顛頂之顛。認作顛狂之
顛。而驚癇昏仆等症之真旨。遂晦
是病乃不復可治。此是後世醫學
之陋。固不可與素問本草經同日
而語。然卽此可知本經素問論病
探源。竟有非漢魏以下醫家所能

悟到者。則信乎古書之真。非易讀
矣。若其專治癰腫。則苦寒清熱。亦
能解毒。治陰蝕下三蟲。亦苦寒勝
溼。自能殺蟲。其用淺顯易知。不煩
多贅。瀕湖引該語。有七葉一枝花
深山是我家。癰疽如過客。一似手
拈拿。云云。知此草專治癰腸。古今
無不推重。然此類寒涼諸品。惟陽
發紅腫大痛者爲宜。而堅塊頑木
之陰症。大忌。非謂凡是外科。無不
統治也。

配合應用

①治小兒胎風。手
足搐搦。用蚤休卽紫河車爲末。每

服半錢。冷水下。(衛生易簡方)

②治慢驚發搐。帶有陽證者。白

甘遂末。卽蚤休一錢。梧樓根末二

錢。同於慢火上炒焦黃。研勻。每服

一字。煎麝香薄荷湯調下。(錢乙

小兒方)

③治中風莽毒。金線重樓根。磨

水服卽愈。(集簡方)

④治咽喉賊腫。痛用重臺。赤

色者。川大黃炒。木鼈子仁。馬牙消

牛兩。半夏泡一分爲末。蜜丸。炙干

大含之。(聖惠方)

用量 錢半至三錢。

用 錢半至三錢。

施用宜忌 凡無實火熱毒者
禁用。

參攷資料

①冷。無毒。伏雄黃

丹砂。蓬砂及鹽。大明)②蟲蛇之

毒。得此治之。卽休。故有蚤休螫休

諸名。重臺三層。因其葉狀也。金線

重樓。因其花狀也。甘遂。因其根狀

也。紫河車。因其功用也。(李時珍)

③今謂重樓金線者是也。一名重

臺。南人名爲甘遂。一莖六七葉。似

王孫兒。白莖。麻華。葉有二三層。根

如肥大。莖蒲。細肌。脆白。(蘇恭)

④蚤休無旁枝。止一莖。挺生。高尺餘。

頗有四五葉。葉有歧。似苦枳。中心

又起莖。亦如是。生藥。惟根入藥用。

冠宗爽)⑤重樓金線。處處有之。

生於深山陰溼之地。一莖獨上。莖

當葉心。葉綠色。色似芍藥。凡二三層

每一層七葉。莖頭夏月開花。一花

七瓣。有金絲蕊。長三四寸。王屋山

產者。至五七層。根如鬼臼。蒼老狀。

外紫中白。有黏糯二種。外丹家採

制三黃砂。求入藥。洗切焙用。(李

時珍)⑥蚤休入足厥陰經爲散

結導熱之品。以治外證。殊有功效。

但其性苦寒。不宜多服。元氣虛者

行瀝而已。日華言其治瘡。近有一兒病瘡。專食此粉。不復他食。亦一異也。(李時珍)

【蛇蟥酒草】即鼠麴草之古籍別名。典見西陽雜俎。詳「鼠麴草」條。

【蛟】即水蛭之古籍別名。典見別錄。詳「水蛭」條。

【蛭蟥】即蛭蚓泥之古籍別名。典見綱目。詳「蛭蚓泥」條。②即蛭蚓之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蛭蚓」條。

【蛭母】即知母。見「知母」條。

【蛭】古籍別名 慈(綱目)狗蜋(俗名)

基本 係有椎動物爬蟲類蛇類管牙類蛭科響管蛇亞科。為蛭蛇屬之蛭蛇。

形態 蛭為蛭蛇類之一種。全體比蛭為小。土色無文。蟠時不圓。風如狗。蜃亦有劇毒。其肉可供藥用。

製法 凡使去頭、尾、腸、皮、骨。醋炙研末用。

主治 療瘡內漏。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論蛭曰。治破傷中風。大

風。惡瘡疾。

【蛭青】即地膽之古籍別名。典見本經。詳「地膽」條。

【蛭】即蛭蟲之簡稱。詳該條。

【蛭蟲】古籍別名 蛭。蝮人龍。(綱目)

形態 蛭為九蟲之一種。乃蠕形動物。狀如蚯蚓。而無環節。色白兩端甚尖。寄生於人腹小腸間。雌者長至尺餘。雄者亦長七八寸。可供藥用。

性質 大寒。

主治 目中膚赤熱痛。取大者洗淨。斷之。令汁滴目中。三十年膚赤亦差。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論蛭蟲曰。治一切眼疾及生膚翳。赤白膜。小兒胎赤。赤眼。燒末傳之。或以小兒吐出者。陰乾。為末。入米粉少許。唾津調塗之。又治一切冷瘕。

參攷資料 蛭人腹中長蟲也。按巢元方病源云。人腹有九蟲。伏蟲長四分。蟬蟲之主也。蛭蟲長五

六寸至一尺。發則心腹作痛。上下口喜吐涎及清水。實上心則死。白

蟲長一寸。色白頭小。生育轉多。令人精氣損弱。腰脚疼。長一尺。亦能殺人。肉蟲狀如爛杏。令人煩悶。肺蟲狀如蠶。令人咳嗽。成勞。殺人。胃蟲狀如蝦蟇。令人嘔逆。喜噦。弱蟲又名隔蟲。狀如瓜瓣。令人多唾。赤蟲狀如生肉。動作腹鳴。蟬蟲至微。形如菜蟲。居腸中。令人生癰疽。疥癬。癰瘡。痔瘡。疳積。諸病。諸蟲皆依腸胃之間。若入臟腑。氣實則不為害。虛則浸蝕。變生諸病也。又有尸蟲。與人俱生。為人大害。其狀如犬馬尾。或如薄筋。依脾而居。三寸許。有頭尾。凡服補藥。必須先去此蟲。否則不得藥力。凡一切癰瘕。久皆成蟲。紫庭真人云。九蟲之中。六蟲傳變為勞瘵。而蛭。蛇。寸白。三蟲不傳。其蟲傳變。或如嬰兒。如鬼形。如蝦蟇。如守宮。如蜈蚣。如蠅。如蛇。如蠶。如蠅。如蛆。如蟻。如蟻。如豬肝。如血汁。如亂髮。亂絲等狀。凡蟲在腹上。句頭向上。中旬向中。下旬向下。服藥須於月初四五日五更時。則易效也。張子和云。巢氏之行九蟲詳矣。然蟲之變。不可勝窮。要之皆以溼熱為生。蟲得木氣

乃生。得雨氣乃化。豈非風木主熱。雨澤主癰耶。故五行之中。皆有蟲。諸木。有蟬。諸果。有蠶。諸穀。有妨。五穀。有螟。蟬。蠶。麥。朽。蛾。飛。栗。破。蟲。出。草。腐。蠶。化。皆木之蟲也。烈火有鼠。爛。灰。生。蠅。皆火之蟲也。穴。蟻。牆。蝎。田。蠅。生。蝎。皆土之蟲也。蟬。蚪。馬。蛭。魚。龍。蛟。龍。皆水之蟲也。昔有治工。破一釜。見其斷處。白中有一蟲。如米。色。色。正。赤。此。則。金。中。亦。有。蟲。也。李時珍

【蛭蟲窠】即雀巢之古籍別名。典見本經。詳「雀巢」條。

【蚤休】命名 本品能療蟲蛇之毒。得此治之。即能早休。故名。

處方用名 蚤休根。

古籍別名 蚤休(別錄)重寶。重樓。金線。草。甘遂(唐本草)整休。(日華)紫河車(圖經)七葉一枝。花(蒙筌)三層草。白甘遂(綱目)草紫河車(圖經)

基本 屬毒草類。為蚤休之根。

產地 陳仁山藥物生產辨云。蚤休以廣西南寧屬多出。

形態 蚤休為野生深山之多

十畫 苧菜 虻 蚊 蚌

【草】條。

【苧草】即苧草之原名。詳「苧草」條。

【菜】即榛之古籍別名。典見綱目。詳「榛」條。

【虻】即獅之古籍別名。典見綱目。詳「獅」條。

【蚊】即枸杞蟲之古籍別名。典見爾雅。詳「枸杞蟲」條。

【蚊驚樹】即夜蘭之古籍別名。典見嶺南雜記。詳「夜蘭」條。

【蚌】學大辭典

外國名詞 Anodonta chinensis (拉丁) Swan mussel (英) Flussmuschel (德) カラ


スガヒ或ドブガヒ或タンガヒ (日本)

基本 係軟體動物瓣鰓類無管類同柱類蚌科。

產地 生江湖淡水中。

形態 蚌為介類之一種。與蛤同類而異。其殼長橢圓形而薄。殼內真珠。色帶微紅。老者殼頂之表皮剝脫。常露出真珠層。較合部無齒。唯後方有一個齒。又有內外

殼廣而突出。肉色黃白。肉柱有二。脚大殼長約達尺許。其肉可供食與藥用。



蚌

性質 甘。鹹。冷。無毒。

主治 止渴除熱。解酒毒。去眼赤。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論蚌肉曰。明目除溼。主婦人勞損下血。【宋】日華諸家本草論蚌肉曰。除煩解熱毒。血崩帶下。痔瘻。壓丹石藥毒。以黃連末納入。取汁點赤眼。眼暗。

參攷資料 ①蚌肉性微冷。多食發風。動冷氣。【寇宗奭】②馬刀蚌蛤。蛭蛻。大同小異。寇氏止言冷而不言溼。溼生熱。熱久則氣上升。而生痰生風。何冷之有。【朱震亨】

【蚌水】 命名 本品係蚌殼中所含之水故名。

性質 涼。無毒。

主治 清熱消痰。除溼。治雀目夜盲。婦人胎動小兒嘔驚。塗湯火傷。解酒積丹石藥毒。

【蚌胎】即真珠之古籍別名。典見和漢藥考。詳「真珠」條。

【蚌珠】即真珠之古籍別名。典見南方志。詳「真珠」條。

【蚌粉】即蚌殼粉之原名。詳「蚌殼粉」條。

基本 即蚌中水也。

性質 鹹寒。

主治 清熱安胎。消痰除溼。解酒積丹石藥毒。初生小兒嘔驚。達原云。用活蚌水磨墨。滴入口中。少頃下黑。薰而愈。湯火傷。用生蚌炙水塗之。

參攷資料 蚌生淡水中。色蒼入肝。故有清熱行溼。治雀目夜盲之力。綱目載蚌肉及蚌粉。功用獨遺。其殼內所含之水。不知此水乃真陰天一之精。入藥最廣。特為補其缺。趙恕軒。

【蚌殼】 製法 凡使蚌殼去淨外層黑殼。擇其內層光潔如真珠色者用。故俗有真珠母之稱。以真珠生於蚌殼中故也。

性質 甘。鹹。冷。無毒。

主治 滋肝陰。清肝火。治頭狂驚癇眩暈。耳鳴心跳。血熱崩中。吐衄。

參攷資料 蚌殼入心肝二經。與石決明。僅入肝經者不同。故涉神志病者。非此不可。【醫學辭典】

【蚌殼灰】即蚌殼粉之處方用名。詳「蚌殼粉」條。

製成之粉。故名。

【蚌殼粉】 命名 本品係蚌殼製成之粉。故名。

處方用名 蚌殼灰。

性質 鹹寒。無毒。

主治 爛殼粉治反胃。心胸痰飲。用米飲服。

歷代記述攷證 【宋】日華諸家本草論蚌殼粉曰。諸疳。止痢。并嘔逆。醋調塗臍腹。【明】李時珍本草綱目論蚌殼粉曰。解熱燥溼。化痰消積。止白濁。帶下。痢疾。除溼。腫水嗽。明目。擦陰瘡。溼瘡。癩瘡。

參攷資料 蚌粉與海蛤粉同功。皆水產也。治病之要。只在清熱

功。皆水產也。治病之要。只在清熱

功。皆水產也。治病之要。只在清熱

功。皆水產也。治病之要。只在清熱

通呼爲香草爾。近世但知蘭花。不知蘭草。惟虛谷方回考訂極言古之蘭草。卽今之千金草。俗名孩兒菊者。其說可據。**李時珍**。①蘭草澤蘭。一類二種也。俱生水旁下濕處。二月宿根生苗成叢。紫莖素枝。赤節綠葉。葉對節生。有細齒。但以莖圓節長而葉光有歧者爲蘭草。莖微方節短而葉有毛者爲澤蘭。嫩時並可採而佩之。八九月後漸老。高者三四尺。開花成穗如鷄蘇花紅白色。中有細子。雪點炮炙論所謂大澤蘭。卽蘭草也。小澤蘭。卽澤蘭也。禮記佩帨蘭茝。楚辭紉秋蘭以爲佩。西京雜記載漢時池苑種蘭以降神。或雜粉藏衣書中辟蠹者。皆此二蘭也。今吳人蒔之呼爲香草。夏月刈取以酒油灑制。經作把子。貨爲頭澤佩帶。與別錄所出大吳之文正相符合。或云家蒔者爲蘭草。野生者爲蘭澤。亦通。**李時珍**。②蘭有數種。蘭草澤蘭生水旁。山蘭卽蘭草之生山中者。蘭花亦生山中。與三蘭迥別。蘭花生近處者。葉如麥門冬。而春花。生福建者。葉如菅茅而秋花。黃山谷

所謂一幹一花爲蘭。一幹數花爲蕙者。蓋因不識蘭草蕙草。遂以蘭花強生分別也。蘭草與澤蘭同類。故陸機言蘭似澤蘭。但廣而長節離騷言其綠葉紫莖素枝。可組可佩。可藉可膏。可浴。鄭詩言士女乘蘭。應邵風俗通言尙書奏事。懷香握蘭。禮記言諸侯贊。大夫贊蘭。漢書言蘭以香自燒也。若夫蘭花有葉無枝。可玩而不可佩。藉浴乘程膏焚。故朱子離騷辨證言古之香草。必花葉俱香。而燥溼不變。故可刈佩。今之蘭蕙。但花香而葉乃無氣。質弱易萎。不可刈佩。必非古人所指。甚明。古之蘭似澤蘭而蕙。卽今之零陵香。今之似茅而花有二種者。不知何時誤也。熊大古翼越集言世俗之蘭。生於深山窮谷。決非古時水澤之蘭也。陳遜齋閑覽言楚騷之蘭。或以爲都梁香。或以爲澤蘭。或以爲猗蘭。當以澤蘭爲正。今人所種如麥門冬者。名幽蘭。非真蘭也。故陳止齋著蘭盜說以譏之。方虛谷訂蘭說。言古之蘭草。卽金之千金草。俗名孩兒菊者。今之所謂蘭。其葉如茅而嫩者。

根名土續斷。因花蘂郁。故得蘭名也。楊升菴云。世以如蒲葦者爲蘭。九畹之受誣久矣。又吳草廬有蘭甚詳云。蘭爲醫緩上品之藥。有枝有莖。草之植者也。今所謂蘭無枝無莖。因黃山谷稱之。世遂謬指爲離騷之蘭。寇氏本草亦溺於俗。反疑舊說爲非。夫醫經爲實用。豈可誤哉。今之蘭。果可利水殺蟲而除痰癖乎。其種盛於閩。朱子乃閩人。豈不識其土產。而反辨析如此。世俗至今猶以非蘭爲蘭。何其惑之難解也。**李時珍**。③此非今蘭蕙建蘭之蘭。潮州綱目辨之極詳。說文謂之香草。陸機草木疏謂蘭爲王者之香。其莖葉皆似澤蘭。廣而長節。節中赤。高四五尺。藏之書中辟蠹。據此則蘭草澤蘭相似而非一物。故本草經上品既有蘭草。而中品又有澤蘭。然別錄謂蘭草生太吳池澤。本經亦曰一名水香水經零陵郡都梁縣西小山上有淨水。其中悉生蘭草。則本是水產。實與澤蘭大同小異。故漢書司馬相如傳。衡蘭芷若。顏注謂卽今之澤蘭。江賦櫻以蘭紅。注亦以爲澤蘭。蓋

二物之相混久矣。瀕湖亦謂一物二種。張山雷。④草蘭子治目。醫赤眼生膜。納管內少頃。膜卽出。塵物入目。納三四枚於目中。子卽濕脹。與塵俱出。醫學辭典。⑤草蘭花性質苦無毒。功用宣氣利水道。治滯下痢疾。黃酒服。辟不祥。按此物氣類水香。苦甚黃連。善能宣氣。四達。故治痢疾功效甚捷。**醫學辭典**。⑥草蘭香。卽鬱金香之古籍別名。典見佛書。詳鬱金香條。⑦草龍甲。卽茄之古籍別名。典見養生主論。詳茄條。⑧收。卽冬葵子之古籍別名。典見爾雅。詳冬葵子條。⑨蜀葵之古籍別名。典見和漢藥考。詳蜀葵條。⑩菰麥。卽香麥之古籍別名。典見日用本草。詳香麥條。⑪菰菰。卽五味子之古籍別名。典見爾雅。詳五味子條。⑫桂桐。卽罌子桐之古籍別名。典見本草衍義。詳罌子桐條。⑬荒芳草。卽無風獨搖草之古籍別名。典見郭璞賦。詳無風獨搖

條。

【草續斷】即石龍芻之古籍別名。與見本經。詳「石龍芻」條。

【草蘭】

原名 蘭草。

命名 本品葉似馬蘭。

故名。

應方用名 省頭草。

古籍別名 蘭水香（本經）香水蘭燕尾香（開寶）煎澤草（唐本）蘭澤草（弘景）大澤蘭（炮炙）都梁香（李氏藥錄）女蘭孤兒菊（綱目）孩兒菊千金草九節蘭（綱目拾遺）

基本 屬蘭科。爲草蘭之葉。



(一) 蘭草

形態 草蘭爲芳草類之多。常綠草本。山野及池澤恒有自生。高二三尺。有地下莖。葉細長而尖。或短而狹小。質平滑有光澤。邊緣有鋸齒甚細。長尺許。有平行脈。由根叢生。下部之葉三裂。上部尖長。花色淡紫。或淡黃綠色。瓣上有細

紫點。花冠爲管狀。列爲頭狀花序。一莖一花。幽香清遠。古人恒摘而佩之。故謂之都梁香。其花子根葉可供藥用。



(二) 蘭草

採取 四五月間採之。

性質 辛平無毒。

效能 辟惡。調氣。用作芳香健胃藥。

主治 利水道。殺蟲毒。辟不祥。久服益氣輕身不老通神明（本經）除胸中痰癖（別錄）

歷代記述攷證【南北朝】雷

獸雷公炮炙論蘭草曰。生血調氣。養營【唐】陳藏器本草拾遺論蘭

草曰。主惡氣香澤。并可作膏塗髮。草曰。煮水浴風病【元】李東垣用

藥法象論蘭草曰。其氣清香生津。止渴潤肌肉。治消渴癆瘵【明】李

時珍本草綱目論蘭草曰。消腫。調月經。煎水解中牛馬毒【明】經

調月經。煎水解中牛馬毒【明】經

希雍本草經疏論蘭草曰。蘭草稟天地清芬之氣以生。故其味辛。氣平無毒。入手太陰足陽明經。肺主氣。肺氣鬱結。則上竅閉而下竅不通。胃主納水穀。胃氣鬱滯。則水穀不以時化而爲痰癖。蟲毒不祥之氣。亦胃中受病。辛平能散結滯。芬芳能除穢惡。則上來諸證自廖。大都開胃除惡。清肺消痰。散鬱結之聖藥也。久服等語。亦言其效之極功耳。

近人學說

張山雷曰。蘭草芳

香。故能解毒辟穢而生於水中。則

能利水。功用亦與澤蘭無甚大別。

東垣謂其氣清香。生津止渴。治消

渴脾瘕。蓋消渴脾瘕。皆脾胃熱壅。

氣愈鬱。則熱愈熾。清芳可以導濁。

則熱氣疏通。內經謂肥美所發。令

人口甘。治之以蘭。除陳氣也。石頑

逢原亦謂噤咽脾痺。口中時時溢

出甜味者。非此不除。芳香辛溫。調

肝和脾。功倍麝香。善散積久陳鬱

之氣。

配合應用

同麝香。枇杷葉。

石斛。竹茹。橘紅。開胃氣之神品。

●治噤膈之將成者。加入洗水。

香。鬱金。白豆蔻。真蘇子。蘆根汁。下

氣開鬱。

●治消渴。同枳椇根。麥冬。黃連。

竹葉。蘆根汁。

●食牛馬毒殺人者。省頭草連

根葉煎水服。即消。【唐】韋經方。

用量 錢半至三錢。

參攷資料 ●蘭草浸油塗髮。

去風垢。令香潤。史記所謂羅襪襪

解微聞香澤者是也。崔實四時月

令作香澤法。用清油浸蘭香。薰香

雞古香。首蓿葉四種。以新綿裹浸。

胡麻油和猪脂。納銅鑊中。沸定。下

少許青蒿。以綿幕瓶。鎔瀉出。瓶

收用之。【李時珍】●香蘭乃香草。

能辟不祥。陸機詩疏。言鄒俗三月

男女乘蘭於水際。以自祓除。蓋蘭

以蘭之蘭。以蘭之其義一也。淮南

子云。男子種蘭。美而不芳。則蘭須

女子種之。女蘭之名。或因乎此。其

葉似菊。女子小兒喜佩之。則女蘭

孩菊之名。又或以此也。唐韋經驗

方。言江南人家種之。夏月採置甕

中。令頭不隨。故名省頭草。其說正

合煎澤之義。古人蘭蕙皆稱香草。

如零陵香草。都梁香草。後人省之。

見和漢藥考。詳「苡仁」條。

【草麻繩索】

命名 小曰索。大曰繩。本品係用草或麻所製成之繩索故名。

主治 大腹水病。取三十枚去皮研水三合。日服。口中當吐下水。汁結囊。若不盡。三日後再作。未盡更作。療後禁水飲鹹物。

【草雲母】即雲實之苗。見唐本草。詳「雲實」條。

【草當歸】即當歸色白而味薄者之古籍別名。典見本草集註。詳「當歸」條。

【草蛭】即水蛭之古籍別名。典見綱目。詳「水蛭」條。

【草蜂窠】即露蜂房之古籍別名。典見綱目。詳「露蜂房」條。

【草裏金銀】即玉釵草開黃花者之別名。詳「玉釵草」條。

【草棉】外國名詞。Gossy-
pium herbaceum L.

產地 東印度及亞刺比亞原產。我國各地亦有栽培。

基本 錦葵科。草棉屬。

形態 草棉爲一年生草本。高至二三尺。葉掌狀分裂有長葉柄。

互生。托葉二片。形狹而尖。秋月葉腋開花。花大有苞。基部連合。上部分裂。萼杯狀。花冠五瓣。黃色。單體。雄蕊包圍於雌蕊之外。雌蕊一枚。子房上位。果實爲蒴果。熟則開裂。其種子被以長毛白色。俗名棉花。可爲絮及藥用。



草 棉

性質 甘溫。

主治 禦寒却冷。燒灰止血。敷凍瘡。

【草裏銀釵】即玉釵草開白花者。見「玉釵草」條。

【草蒿】即青蒿之古籍別名。典見本草。詳「青蒿」條。即黃花蒿之古籍別名。典見綱目。詳「黃花蒿」條。

【草蒿子】即青蒿子之古籍別名。典見本草。詳「青蒿子」條。

【草蜘蛛】原名 蜘蛛。產地 生原野草木稠密諸處。

形態 草蜘蛛爲蜘蛛類之一種。其腹長。恒於草木枝葉間。張平網如棚。作穴於一隅。隱伏其身。以待蟲至網而捕食。此物可供藥用。主治 出疔腫。根搗膏塗之。

【草蜘蛛絲】

主治 去癰贅。拭子除瘰癧疾。

【草蜜】即羊刺蜜之古籍別名。典見本草拾遺。詳「刺蜜」條。

【草節】即甘草之處方用名。詳「甘草」條。

【草節鉛】即鉛之產於四川犍爲縣者。見「鉛」條。

【草蓮】即海鳳絲之別名。見「海鳳絲」條。

【草從蓉】即列當之處方用名。詳「列當」條。

【草菌】即鹿豆之古籍別名。典見爾雅。詳「鹿藿」條。

【草鞋】古籍別名 草屨。屨。不借千里馬（綱目）。

採取 以破舊者入藥用。

主治 和人亂髮。燒灰醋調。傳小兒熱毒遊腫。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論草鞋曰。催生。治霍亂。

【草鞋底】即葦箬之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「葦箬」條。

【草鞋鼻】功用與草鞋同。詳該條。

【草頭】首習之別名。見「首習」條。

【草鴟頭】即貫衆之古籍別名。典見別錄。詳「貫衆」條。

【草龍珠】即葡萄之古籍別名。典見綱目。詳「葡萄」條。

【草龍髻】即龍鬚草之古籍別名。典見述異記。詳「龍鬚草」條。

【草龍膽】即龍膽之俗名。詳「龍膽」條。

【草屨】即草鞋之古籍別名。典見綱目。詳「草鞋」條。

【草蠶】即射干之古籍別名。典見別錄。詳「射干」條。

【草蠟子】即蝸牛之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蝸牛」條。

【草鍾乳】即韭之古籍別名。典見本草拾遺。詳「韭」條。

【草蘭茹】即通蘭茹。取其漆頭赤皮者。本品乃白蘭茹之別名。典見綱目。功用與蘭茹同。詳「蘭茹」條。

【草麒麟】即無骨苧麻之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「無骨苧麻」條。

藥、黃耆、甘草（炙）各三兩。烏頭三枚（咬咀）以蜜二升煮取一升即出烏頭。上五味咬咀四味以水三升煮取一升去滓。納蜜煎中更煎之。服七合。不知更服之。④大烏頭煎。腹滿脈弦而緊。弦則衛氣不行。即惡寒。緊則不欲食。邪正相搏。即爲寒疝。遶臍痛。若發則自津出手足厥冷。其脈沉緊者。此主之。（金匱方）烏頭（大者五枚熬去皮不必咀）水二升煮取一升去滓。納蜜二升。煎令水氣盡。又一煎法。取二升。強人服七合。弱人服五合。不知明日更服。不可一日再服。⑤烏頭赤石脂丸。心痛澈背。背痛澈心。此主之。（金匱方）蜀椒一兩。烏頭一兩。泡。附子半兩。乾姜一兩。赤脂一兩。上五味末之。蜜丸如梧子大。先食服一丸。日三服。不知再加。⑥烏頭桂枝湯。治寒疝腹中痛。逆冷手足不仁。若身疼痛。灸刺諸藥不能治者。（金匱方）烏頭大者五枚。熬去皮不必咀。以水二升煎減半去滓。以桂枝湯五合解之。又一煎法。令將一升後。初服二合。不知。卽服三合。又不知。加深加至五

合。其知者。如醉狀。得吐者爲中病。參攷資料 ①草烏頭。今杭人多植於庭院。九月開花。淡紫嬌豔。與菊同時。謂之鸚鵡菊。又謂雙鸞菊。爲雙菊。僧鞋菊。皆以花之形狀名之。根有大毒。與川中所出之烏頭迥別。古時烏頭烏喙。隨時所稱。非有異也。後人以形正者有似烏鳥之頭。其兩歧相合而生者有似烏鳥鳥之喙。以此別之。然形狀雖殊。主治則一。（王塚崖）②草烏之毒甚於川烏。蓋川烏由人力種蒔。當時則採。草烏乃野生地上。多歷歲月。故其氣力尤爲勇悍。猶之芋子人植者無毒。可啖。野生者有毒。不可啖。其理一也。又川烏先經鹽淹。殺其烈性。寄至遠方爲日稍久。故其毒少減。草烏未經淹製。或係現取。其毒較甚。（王塚崖）③今人製造酒藥。凡川烏草烏暨各種毒品。亦皆在內。名曰紹興酒藥。釀酒易熱。且多氣味香烈。杭俗甚行而受其害者比比也。（仲氏）④凡風寒溼痺。骨內冷痛。及損傷入骨。年久發痛。或陰疽腫毒。並宜草烏頭兩星等分。少加肉桂爲末。薑汁熱酒

調塗。未破者能內消。久潰者能去黑爛。二藥性味辛烈。能破惡塊。逐寒熱。遇冷卽消。遇熱卽潰。（楊清叟）【草珠兒】卽苡仁之古籍別名。典見救荒本草。詳「苡仁」條。【草紙】基本 本品係用稻草所製成之紙。用以包物者。性質 甘。平。無毒。主治 腸風下血。癰腫惡瘡。小兒臍瘡。燒灰用。餘與楮紙同。【草荔】卽木蓮之古籍別名。典見山海經。詳「木蓮葉」條。【草梢】卽甘草梢之處方簡名。詳「甘草」條。【草犀】命名 本品解毒之功如犀角。故名。處方用名 草犀根。產地 在山野間。形態 莖高二三尺。獨莖。根如細辛。性質 辛。平。無毒。主治 解一切毒氣。虎狼蟲虺所傷。溪毒丹蠱惡刺等毒。並宜燒服之。隨死者亦得活。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論草犀根曰。天行癘瘡。寒熱咳嗽。痰壅。飛尸。喉痺。瘡腫。小兒寒熱丹毒。中惡。注忤。利血等病。養汁服之。嶺南及陸梁間中毒者。以此及千金藤並解之。參攷資料 ①草犀生衢慶洪饒間。苗高二三尺。獨生根如細辛。生水中者名水犀。（陳藏器）②廣州記云。生嶺南及海中。獨莖對葉而生。如燈臺。草根若細辛。（李時）【草犀根】卽草犀之處方用名。詳「草犀」條。【草紫河車】卽蚤休之別名。詳「蚤休」條。【草豉】形態 草豉爲葉類之花中。可供食與藥用。性質 辛。平。無毒。主治 辟惡氣。調中。益五臟。開胃。令人能食。【草雀】卽鶻雀之別名。詳「鶻雀」條。【草魚】卽鱣魚之古籍別名。典見綱目。詳「鱣魚」條。【草魚目】卽苡仁之古籍別名。典

草烏食鹽同炒。黑慘之。(海上方)

●治寒氣心疝三十年者。射罔食茱萸等分爲末。蜜丸。麻子大。每酒下二丸。日三服。劉國英所祕之方。(范汪東陽方)

●治寒癰瘰癧。巴豆一枚。去心皮。射罔去皮。如巴豆大。大棗去皮一枚。搗成丸。梧子大。清旦先發時。每服一丸。白湯下。(肘後方)

●治脾寒厥癰。先寒後熱。名寒癰。但寒不熱而色黑者。名厥癰。寒多熱少。面黃腹痛。名脾癰。三者並宜服此。買耆老用之二十年。累試有效。不蛀草烏頭。削去皮。沸湯泡二七度。以盞蓋良久。切焙。研細。糊丸。梧子大。每服三十九。薑十片。棗三枚。葱三根。煎湯清早服。以棗壓之。如人行十里許。再一服。絕勿飲湯。便不發也。(東坡良方)

●治腹中癥結。雷妨飲食。羸瘦。射罔二兩。椒三百粒。搗末。雞子白和丸。麻子大。每服一丸。漸至三丸。以愈爲度。(肘後方)

●治水泄寒痢。大草烏一兩。以一半生研。一半燒灰。醋糊和丸。綠豆大。每服七丸。井華水下。忌生冷

魚肉。(十便良方)

●治泄痢注下。三神丸。治清濁不分。泄瀉注下。或赤或白。腹痛刺痛。裏急後重。用草烏頭三箇。去皮尖。以一箇火炮。一箇醋煮。一箇燒灰。爲末。醋糊丸。綠豆大。每服二十丸。水瀉流水下。赤痢甘草湯下。白痢薑湯下。忌魚腥生冷。(和劑局方)

●治結陰下血腹痛。草烏頭。蛤粉炒。去皮。脾切。一兩。茴香炒三兩。每用三錢。水一盞。入鹽少許。煎八分。去滓。露一夜。五更冷服。(聖濟總錄方)

●治老人遺尿。不知出者。草烏頭一兩。童便浸七日。去皮。同鹽炒爲末。酒糊丸。綠豆大。每服二十丸。鹽湯下。(普濟方)

●治內痔不出。草烏爲末。津調點肛門內。痔即反出。乃用枯痔藥點之。外科集驗方)

●治疔毒初起。草烏頭七箇。川烏頭三箇。杏仁九箇。飛羅麵一兩。爲末。無根水調。搽留口。以紙蓋之。乾則以水潤之。(唐瑤經驗方)

●治疔毒惡腫。生烏頭切片。醋

熬成膏。攤貼。次日根出。又方。兩頭尖。一兩。巴豆四箇。搗貼。疔自拔出。(普濟方)

●治疔瘡發背。草烏頭去皮。爲末。用葱白連鬚和搗丸。豌豆大。以雄黃爲衣。每服一丸。先將葱一根細嚼。以熱酒送下。或有惡心。嘔三四口。用冷水一口止之。即臥。以被厚蓋。汗出爲度。亦治頭風。(乾坤秘韞方)

●治惡毒諸瘡。及發背疔瘡。便毒等證。二烏膏。用草烏頭。川烏頭。於瓦上。以井華水磨汁塗之。如有口。即塗四邊。乾再上。亦可單用草烏磨醋塗之。(永類鈴方)

●治大風癰瘡。遍身黑色。肌體麻木。痺痛不常。草烏頭一斤。刮洗去皮。極淨。攤乾。以清油四兩。鹽四兩。同入鍋內。炒令深黃色。傾出。剝油。只留鹽并藥。再炒令黑。煙出。爲度。取一枝。擊破。心內如米一點白者。始好。自多再炒。乘熱杵羅。爲末。醋糊丸。梧子大。每服三十九。空心溫酒下。草烏性毒難制。五七日間。以黑豆煮粥食。解其毒。(濟察方)

●治遍身生瘡。陰囊兩脚尤甚者。草烏一兩。鹽一兩。化水。浸一夜。炒赤。爲末。豬腰子一具。去膜。煨熱。竹刀切。搗醋糊丸。綠豆大。每服三十九。空心鹽湯下。(濟察方)

●治一切諸瘡未破者。草烏頭爲末。入輕粉少許。臘猪油調和。搽(普濟方)

●治癰癰初作未破。作寒熱。草烏頭半兩。木鱉子二箇。以米醋磨細。入搗爛葱頭。蚯蚓蚘少許。調勻。傳上。以紙條貼。令通氣。孔妙。(醫林正宗方)

●治馬汗入瘡。腫痛急。療之。遲則毒深。以生烏頭末。傅瘡口。良久。有黃水出。即愈。(靈苑方)

●治蛇蠍螫人。射罔傳之。類易血出。愈。(梅師方)

●治中沙風毒。用射罔傳之。佳。(千金方)

用量 八分至一錢。
節用宜忌 凡陰虛陽盛。及非真中寒者。禁用。反半夏。栝實。貝母。白欬。白芨。惡藜蘆。
著名方劑 ●烏頭湯。治歷節疼痛。不可屈伸。(金匱方) 麻黃芍

十 薑 草

川烏頭一枚。生附子一枚。並爲末。葱一斤。薑一斤。搗如泥。和作餅子。以草鋪盤內。加楮葉於上。安餅於葉上。又鋪草葉蓋之。待出汗。只一日夜。乃曬之。爲末。以生薑取汁。煮麵糊和丸。梧子大。初服三十丸。日二服。服後身痒。汗出卽愈。惟須避風。(乾坤祕輿方)

①治破傷風。病用草烏頭爲末。每以一二分。溫酒服之。出汗。(壽域方) 又用草烏尖。白芷。并生研末。每服半錢。冷酒一盞。入葱白一根。同煎服。少頃。以葱白熱粥投之。汗出卽愈。(儒門事親方)

②治年久麻痺。或歷節走氣。疼痛不仁。不拘男女。神授散。用草烏頭半斤。去皮爲末。以袋一箇。盛豆腐半袋。入烏頭末在內。再將豆腐填滿。壓乾。入鍋中煮一夜。其藥卽堅。如石。取出曬乾。爲末。每服五分。冷風酒氣。以生薑湯下。麻木不仁。以葱白湯下之。(活人心統方)

③治風溼痺木。黑神丸。草烏頭連皮生研。五靈脂等分。爲末。六月六日。滴水丸彈子大。四十歲以下分六服。病甚一丸作二丸。薄荷湯

化下。覺微麻爲度。(本事方)

④治風溼走痛。黑鷄煎丸。用兩頭尖。五靈脂各一兩。乳香。沒藥。當歸三錢。爲末。醋糊丸。梧子大。每服十丸。至三十丸。臨臥溫酒下。忌油膩。選麪。孕婦勿服。(瑞竹堂方)

⑤治腰脚冷痛。烏頭三箇。去皮臍。研末。醋調。貼須臾。痛止。(十便良方)

⑥治膝風作痛。草烏。細辛。防風。等分。爲末。搽靴襪中。及安護膝內。能除風溼。健步。(扶壽方)

⑦治遠行脚腫。草烏。細辛。防風。等分。爲末。搽鞋底內。如草鞋。則以水微溼。搽之用之。可行千里。甚妙。(經驗方)

⑧治脚氣掣痛。或膀間有核。生草烏頭。大黃末。鼈子作末。薑汁煎茶調貼之。又法。草烏一味。爲末。以薑汁或酒糟同搗貼之。(永賴鈴方)

⑨治溼滯足腫。早輕晚重。用草烏頭一兩。以生薑一兩同研。交感一宿。蒼朮一兩。以葱白一兩同研。交感一宿。各焙乾。爲末。酒糊丸。梧子大。每服五十丸。酒下。

⑩除風去溼。治脾胃虛弱。久積冷氣。飲食減少。用草烏頭一斤。蒼朮二斤。以去白陳皮半斤。生甘草四兩。黑豆三升。水一石。同煮乾。只揀烏木。曬焙。爲末。酒糊丸。梧子大。焙乾收之。每空心溫酒下二三十丸。覺麻卽漸減之名烏丸。(集簡方)

⑪治偏正頭痛。草烏頭四兩。川芎。藜蘆四兩。蒼朮半斤。生薑四兩。連鬚生葱一把。搗爛。同入瓷瓶。封固埋土中。春五夏三。秋五冬七日。取出曬乾。揀去葱薑。爲末。醋麵糊和丸。梧子大。每服九丸。臨臥溫酒下立效。(戴古渝經驗方)

⑫治久患頭風。草烏頭尖。生用一分。赤小豆三十五粒。麝香一字。爲末。每服半錢。薄荷湯冷服。更隨左右磨臍。(指南方)

⑬治風痰頭痛。體虛傷風。停聚痰飲。上厥頭痛。或偏或正。草烏頭炮去皮尖。半兩。川烏頭生去皮尖。一兩。麝香乳香三皂子大。爲末。每服二錢。薄荷薑湯下。食後服。(陳言三因湯方)

⑭治女人頭痛。血風證。草烏頭。梔子。等分。爲末。自然葱汁。隨左右調塗太陽及額上。勿過眼。須避風。(濟生方)

⑮治腦洩臭穢。草烏去皮半兩。蒼朮一兩。川芎二兩。並生研末。麵糊丸。綠豆大。每服十丸。茶下。忌一切熱物。(聖濟總錄方)

一〇八二

⑯治耳鳴耳癢。如流水及風聲。不治成聾。用生烏頭。搗得葉澤。削如棗核大。塞之。日易二次。不三日愈。(千金方)

⑰治喉痺口噤。不開欲死。草烏頭。皂莢等分。爲末。入麝香少許。擦牙。并磨臍內。牙關自開也。用草烏尖。石膽等分。爲末。每用一錢。醋煮皂莢汁調稀。搽入腫上。流涎數次。其毒卽破也。(濟生方)

⑱治瘰癧口瘡。滿口連舌者。草烏一箇。南星一箇。生薑一大塊。爲末。睡時以醋調塗手心。足心。或以草烏頭。吳茱萸等分。爲末。搗調塗足心。(本事方)

⑲治疳蝕口鼻。穿透者。草烏頭燒灰。入麝香等分。爲末。貼之。

⑳治風蟲牙痛。草烏炒黑一兩。細辛一錢。爲末。搗之。吐出涎。一方

其糟粕。如烏頭素以極淡之溶液。
(如千分含一)嘗之能令唇舌
麻刺。今中醫用藥。乃去其元素。
取其糟粕。反謂之去毒精製。誠大
惑莫解也。蓋烏頭附子等雖極毒。
而入藥主治之功能。則爲諸藥所
莫及。然單服者甚少。宜與他藥並
用爲妙。明其病理與分劑。卽勿須
畏其毒。惟能用毒藥。方爲良醫。夫
兵者凶器也。而仁人用之可以救
民。用藥通乎用兵也。故內經多稱
毒藥。淮南子云。『天下之物莫凶
於奚毒。然而良醫藥而藏之。有用
也。』李時珍云。『吾新郡知府自貢
知醫。因病辭。服草烏頭。木鱉子。藥
過多。甫入腹。而麻痺遂至不救。可
不慎乎。』予謂郝氏之死。非死於
毒。乃死於不善用毒耳。李氏又云。
『李東垣治馮翰林姪陰盛格陽
傷寒。面赤煩渴引飲。脈來七八至。
按之則散。用薑附湯加人參投半
斤服之。得汗而愈。此則神聖之妙
也。』按以上所云。陰盛格陽。其脈
七八至。面目赤而煩渴者。無一非
烏頭之正治。用之而效。固其宜也。
又何神奇之有。李氏不知。乃以不

奇爲奇。非所謂皆非勝是者歟。惟
云共投半斤。則幸爲製造無力之
物。如同嚼啖。啖飯否。則立時致命
矣。金匱用烏頭約五方。用天雄一
方。用附子約十八方。傷寒論用附
子約十九方。古用皆天產也。烏頭
附子。天雄。側子。俱用原質。此藥喜
生深山向陰之地。採根於春日及
花後莖枯之時。洗去泥土及根鬚。
輕刮去外皮。陰乾。收藏勿洩氣。用
時搗碎。採子於成熟之後。採葉於
夏日陰乾。用之入藥。用根與子其
莖葉亦可。惟力較遜耳。有大毒。微
臭。鮮質管之味。先甜微苦。後則辛
熱麻刺。(嘗時須謹慎)烏頭。附
子。天雄。側子。性味俱同。行於皮膚
則生汗。若與桂枝並用。亦能止汗。
傷寒論桂枝加附子湯用之。能令
血管舒縮。中樞微阻。故能止其漏
汗。若走於神經系統。能平臍止痛。
醫風寒溼痺。頭痛目痛。不能久視。
項強關節炎。肩臂痛。腰痛。四肢拘
攣。寒氣腹痛。經痛。子宮寒。白帶等
症。均有效。行於血循環。能令血壓
減少。因能走神經中樞被激。致心
肌受阻。則血管舒短。中樞亦受阻。

是以血壓爲緩。故於脈波洪數。因
血旺鼻衄。心跳等症。佐生地三七
等藥服之。能令脈數爲緩。但至脈
沉微欲絕時。如四肢厥逆。霍亂吐
瀉等症。與乾薑等藥相配。又能加
增血壓。有回陽通絡溫經之功。故
仲師四逆湯。通脈四逆湯用之。再
走於腎經。能刺激小便。加多。故桂
枝加附子湯內用之。主小便難。療
學云。『此藥乃醫家爲重要之劑。
其效尤爲他藥不能及。』但此藥
功效雖多。其毒性亦烈。只醫士臨
症變化。惟於虛弱症慎用。若於局
部神經系痛。以烏頭素擦。擦之
有效。惟於近目口處不可用。再此
藥能惹胃。足分劑多服。令人眩暈
嘔吐。金匱烏頭桂枝湯云。『加至
五合。其知者如醉狀。得吐者爲中
病。』此係烏頭入腦惹胃之力。毒
分劑則致呼吸中樞被癱。脈波弛
緩。以至心舒停止而死。

配合應用 ①治陰毒傷寒。生
草烏頭爲末。以葱頭蘸藥。納穀道
中。名提益散。亦治二便不通。(王
海藏陰症略例方)
②治中風癱瘓。手足顫掉。言語
蹇澀。左經丸。用草烏頭炮去皮四
兩。川烏頭炮去皮二兩。乳香。沒藥。
各一兩。爲末。生烏豆一升。以班蝥
三七箇去頭翅。同煮豆熟。去蠶取
豆。焙乾爲末。和勻。以醋糊丸。梧
子大。每服三十丸。溫酒下。(簡易
方)
③治癰疽瘰癧。骨節疼痛。下元
虛冷。諸風痔漏。下血。一切風瘡。草
烏頭。川烏頭。兩頭尖。各三錢。硫黃。
麝香。丁香。各一錢。木鱉子。五箇。爲
末。以熟艾揉成。一處用草
紙包裹。燒熏病處。名雷丸。(孫天
仁集效方)
④治諸風不遂。用生草烏頭。晚
蠶沙。等分爲末。取生地龍。搗和。入
少醋糊丸。梧子大。每服四五丸。白
湯下。甚妙。勿多服。恐麻人。名鄂落
小金丹。(宋氏集驗方)又用草烏
頭四兩。去皮。大豆半升。鹽一兩。同
以沙瓶煮三伏時。去豆。將烏頭入
木臼。搗三百杵。作餅。焙乾爲末。酒
糊丸。梧子大。每空心鹽湯下。十九
名至寶丹。(經驗濟世方)
⑤治一切風證。不問頭痛風。風
黃。獨。脚。脚。痺。生。淮。烏。頭。一。斤。生

先用擦酒擦臍。俟數日不愈。方可內服。又如牙痛。以綿花蘸擦酒塞入牙穴。其痛即止。又如初患風溼。每日宜服此藥三四次。連服數日可愈。若舊症骨衣生厚。亦宜每日服飲劑三四次。兼以擦酒擦之。又如跌打損傷。以擦酒擦之。有奇效。又如胃不消化。及古有白苔。宜與發汗藥或瀉藥同服。此藥以火酒浸之。能提出功力。尋常用者。則以所浸之酒入藥。其功用又能治痛風。胃氣疼。毒癰。心體變大。梅核生炎。牙關緊閉。癆瘵。第藥性酷烈。用宜慎。至解藥之解此毒。須先用吐劑。後用內外行氣劑。

近人學說 ①張山雷曰。本經

亦有烏頭之名。李氏綱目謂此非川產之烏頭。而野生於他處者。故以草烏頭別之。壽頤按本經烏頭。但云生山谷。初無川產非川產之明文。但今之草烏。既非川產。則藥性當自有別。蓋川中烏附。據宋人楊天惠附子說。謂產於綿州之彰明縣。熟耕作壟。冬月播種。春月生苗。云云。可知川產皆為人力所培植。而他處所產。既是野生。則毒烈

自當更甚。其汁煎之名曰射罔。能殺野獸。其毒可知。國語謂麗姬置葦於閣。章昭注葦烏頭也。左傳載麗姬置毒。謂公祭之地。地債與犬大斃。與小臣小臣亦斃。烏頭大毒。乃至於此。誠非附子之可以同日語也。本經謂主中風惡風。洗洗蓋仍以外感寒風而言。洗洗讀作灑灑。仍是灑灑惡風之候。而後世乃謂可治惡風。以惡字作如字讀。豈古人之真旨。要知毒風厲風等症。皆是血熱成毒。似此大熱大毒之物。胡可妄投。此蓋誤讀古書之謬。癡人說夢。妄不可聽。惟果是寒溼寒痰。洄陰沍寒。堅凝結聚之症。始可用為佐使。引到病所。以開堅積耳。此藥雖經甘草湯浸。姜汁製透。然入口管之喉舌。即刺痛異常。少頃且麻木熱腫。猛烈莫與等倫。欲入煎劑。不過一二分而止。瀕湖謂吾蘇郡知府自貢。知醫。因為風痺服草烏頭。藥入腹。麻痺遂至不救。後人亦當知所戒矣。楊華亭曰。本草經烏頭。附子。天雄。雖分三名。而主治略同。惟烏頭條下有可為射罔殺禽獸等語。別錄

云「烏頭生郿陵」(屬河南確山縣)。李時珍以川產者為烏頭。他處為草烏頭。實大誤。近世烏頭。附子。天雄。側子。皆用四川人工產者。其形態與天產稍異。其根粗圓而短。其鮮質大者兩餘。乾者約七八錢。若天產鮮質。至大不過四錢。小者一二錢。乾質大者約一二錢。小者數分。西國入藥。統名烏頭。非西國烏頭。不生附子。亦非棄去附子。蓋烏頭。附子。天雄。側子。漏籃子。其性味皆同。實不能強為分別。獨恨雷斅云「喙附。烏雄。側。中。毗者。服之令人喪目」。自欺欺世。誠醫藥界之罪人也。予曾以天生之烏頭。附子等為未試。服二哩。至一小時。覺腦中如開電機。顫動迅速。而動力輕浮。微茫。如分劑再加。卽至眩暈。因知此藥。先至腦部。故漢霍顯使醫淳于衍。以烏頭毒皇后。后曰。我頭岑岑也。或謂中西烏頭。附子。等不類。但予嘗驗其功能。實係相同。其不同者。中西用法有異耳。中醫多用原質。配藥煎服。西醫多用烏頭酒單服。而配劑較少。故其取較與主治常覺不類。非藥之本

質有懸殊也。別錄於烏頭等之修治。云「採根陰乾」。至雷斅與陶弘景云「熱灰炮製」。由是炮製之法。日益加多。至宋乃有釀造之治。明李中梓以薑汁鹽水煮之。今四川人工產者。均以鹽水煮熟。色褐黑而光。形如煮熟甘藷。因此藥內含澱粉。如被煮熟。則體質已變而黏。(藥市以此為生附子。生烏頭。實誤)及至藥房。復用水浸。必達至咀嚼無味。切成薄片。美其名曰淡附片。俗醫往往用至兩許。皆此造作物也。陳修園云「按製藥始於雷公。炮製荒謬。難以悉舉。要知此人名數未時。人非黃帝時之雷公也」。日人和田啓十郎云「後世修治之法。甚煩。去醋烈之本味。藥偏性之毒氣。使鈍弱無能之物。而欲以除毒治病。是猶緣木求魚也。蓋藥之本性。在毒。無毒則不成藥。豈能專司修治。以減藥之毒耶」。夫藥之大毒小毒。以病當之。以分劑計之。何毒之有。本草復凡例云「若用毒藥療病。先起如黍粟。病去卽止。不去倍之。不去十之。取去為度」。西醫用藥。多提取元素去

柔則能養筋。又何患其不伸。寒溼痺是氣因邪而阻閉。陽氣強則能逐邪。又何患其不開。於此見附子柔烏頭剛矣。夫惟其沉方能柔。惟其散則爲剛。沉而柔者無處不可到。無間不可入。散而剛者無處不可開。無結不可解。故附子曰破癥。聖積聚血癰。烏頭曰破積聚寒熱。於此可見其一兼入血。一則止及氣分矣。大烏頭煎治寒疝。只用烏頭一味。篇中論癥甚詳。尤在淫釋之尤妙。曰弦緊脈皆陰也。而弦之陰從內生。緊之陰從外得。弦則衛氣不行。惡寒者陰出而痺。其外之陽也。緊則不欲食者陰入而痺。其胃之陽也。衛陽與胃陽並衰。外寒與內寒交盛。由是陰反無畏而上衝。陽反不治而下伏。所謂邪正相搏。卽爲寒疝。此用烏頭之証也。曰寒疝繞臍痛。自汗出。手足厥冷。曰拘急不得轉側。發作有時。陰縮。此用烏頭之証也。此外用烏頭之法。猶有二證。一則曰病歷節不可屈伸。疼痛者烏頭湯。一則曰寒疝腹中痛。逆冷。手足不仁。若身疼痛。灸刺諸藥不治者。抵當烏頭桂枝湯。

烏頭湯比於麻黃。抵當烏頭桂枝湯比於桂枝。可知烏頭爲治陽痺陰逆之要劑矣。

國外學說

日本學說謂據狹子氏之實驗云。烏頭究非如漢醫所稱道之貴重藥品。若於病床用之。則從來所謂適宜之症。宜有制限者。不過用於神經痛（內服或外用）而已。已就二三藥物書。舉其醫治效用。大略（一）爲鎮痛藥。於懷麻賓斯神經痛。痛風等症用之。（二）以鎮靜心動之亢進爲目的。於腳氣用之。但因熱發而亢進者。反以不用爲良。（三）爲利尿藥。於諸般之水腫用之。至其用量。根內用一回〇・〇三（七毫八絲）一日〇・三（七釐八毫）。極量一回〇・一（一釐六毫）。一日〇・五（一分三釐）。又藥用烏頭。品種甚多。藥學博士下山順一郎氏大別之爲草烏頭。白川附子。勝山附子。（以上三種爲日本產）川烏頭。大附子（以上二種華產）五種。註明草烏頭爲烏頭稚根。白川附子爲其老根。而川烏頭及大附子。則未有註釋。又據有毒草木圖說曰。烏

頭有大毒。有二種。山中自生者。曰草烏頭。毒性甚烈。春從宿根生苗。高三四尺。莖弱不能直立。葉分歧而互生。至秋每葉間開花。作深碧色。大抵二三朵相叢。狀似伶人鳥冠。又有濃紫色與白色者。後者日本呼爲 *Hokuranata*。人家園圃所栽者。曰川烏頭。毒性較草烏頭稍遜。莖強而直立。葉厚。有深綠色光澤。花濃紫色。狀與草烏頭之花無異。凡烏頭卽爲其母。附子卽爲其子。側子生於附子之側。栽附子不生子而長大者。則謂之天雄。此皆根之名。本草綱目烏頭釋名曰。李時珍曰。『草烏頭取汁和酒。爲毒藥。射禽獸。』蝦夷地方。取附子加蜘蛛。薔薇同搗。將煎凝之毒汁。塗於竹箭。以射禽獸。謂之 *Bian* 或 *Tobidanya*。足知其毒之深。綱目謂之射罔。卽此。英美學說謂草烏頭產中國。歐羅巴。印度等處。高約一尺六寸至五尺。根則頭大而末削。及多橫強。長約三四寸。其根與葉均可爲藥品。內含一精。卽厄哥匿爾糖（亞格尼質）。野生者較家烏頭尤毒。本草綱目謂其

爲至毒之藥。況西土較中國高亢。所產者其力自較中國愈大。用鮮葉可配膏汁等。用乾根可配酒及搽酒等。第根之功力。比葉尤峻。故凡釀作藥酒者。或用根或用葉。亦須聲明。西國常用之草烏頭。在歐羅巴數處山上。養六畜之處。或冷處得之。如英國內地。間亦有之。西國古時。原入毒品。人所鮮服。其用以作服劑。僅百有餘年耳。至其醫治作用。爲止痛寧睡藥。平腦藥。平脈藥。又爲解熱藥。解炎藥。第有最烈之毒。能徑平知覺。腦筋。如欲用減熱氣之藥。則此藥有大用。如以根少許入口嚼之。則發口津必多。口中覺熱而癢。唇舌間覺有針刺。服後則能平腦。令遍體腦筋麻木不寧。四肢如觸叢針。肉筋亦隨減力。若服稍多。則必眼簾攣縮。又令人昏蒙癱瘓。因暈絕而死。如或服至殺人之分兩。則覺喉刺熱。肚疼。作渴。作吐。作瀉。遍體麻木而愈形軟弱。惟不至昏蒙抽搐。又如腦氣筋疼。風溼及心病。用此藥均有益。凡腦氣筋疼。或服飲劑。或以搽酒類搽其腫。又如牙部腦筋作疼。宜

十壹草

【草烏頭】 原名 烏喙。土附子。命名 本品形如川

烏。而又爲野生者故名。

古籍別名 兩頭尖。奚毒。(本

經) 耿子毒。公帝秋。(吳普本草)

金鵝。鴛鴦菊。(綱目) 苗名黃。茂重

獨白草。(綱目拾遺) 汁煎名射罔

(綱目拾遺) 僧鞋菊。(吳俗名) 雙

蘭菊。(日名)

外國名詞 Aconitum (拉丁)

基本 屬毛茛科。爲烏頭之球

根。

產地 陳仁山藥物生產辨云。

烏頭產四川龍安府。陝西漢中兩

處。近日所用川烏草烏。長身細個

者。俱由日本運來。萬國藥方卷三

四十七篇論產於歐洲印度大謬

形態 烏頭爲山野自生之宿

根草。莖高二三尺。葉有光澤。作掌

狀分裂。十月間於梢上開青紫色

或白色花。有兜狀不整齊萼。形如

伶人之鳥冠。故日本呼此爲鳥兜

此草由產地而異其花形葉莖亦

有硬軟之別其球根即烏頭作蘿

蔔狀下部漸細小。未端或尖或

鈍上部壓平。往往彎曲頗多縱橫

皺裂。色帶褐黃。

採取 春二月間採根。陰乾。

製法 李時珍曰。凡使烏頭或

生用。或炮用。或以烏大豆同煎熟。

去其毒用。

用法 恒用焙到爲末。和作外

治藥。間有和作丸散用。

性質 辛溫有大毒。

成分 主成分爲耶普阿哥尼

丁 Jaconitine C₂₁H₃₃O₆N

效能 祛風。潤。開痰。用作麻

醉。與鎮痙藥。施於腹痛。胸痛。頭痛。

足痛。關節痛。及諸風痛。癱瘓。腦

黑內障。眼等症。又治疝痛。偏癱。腦

性痙攣。性小兒麻痺。

作用 自腸壁吸入血中。即能

大減血液循環之速率。使血壓降

低。由末梢神經傳達入腦。腦神經

被激而麻痺。視覺聽覺亦均減。其

敏銳。心臟之跳動先速而後緩。同

時全身肌肉弛緩。思想紊亂。汗出

尿增。若服過量。竟可由失覺而死。

主治 中風。惡風。洗洗出汗。除

寒。瘧疾。咳逆。上氣。破積聚。寒熱。其

汁煎之名射罔。殺禽獸。(本經。消

胸上痰。冷食不下。心腹冷。瘧瘧間

痛。不可俛仰。目中痛。不可久視。又

墮胎。(別錄)

歷代記述要覽 【唐】甄權藥

性本草論草烏曰。主惡風。情寒。冷

痰。包心。腸腹疝痛。痙攣。氣塊。齒痛。

益陽事。強志。【明】李時珍本草綱

目論草烏曰。治頭風。喉痺。癰瘰。疔

毒。【清】黃宮繡本草求真論草烏

曰。草烏頭辛苦大熱。按書論此。惟

長洲張謇辨之。明晰言此。與射罔

乃至毒之物。非若川烏頭附子之

比。自非風頑急疾。不可輕投。此藥

止能搜風。勝濕。開頑痰。治頑瘡。以

毒攻毒而已。本經治惡風。洗汗出

但能去惡風。而不能回陽。發寒可

知。昔人病風。癰。服草烏頭木鱉子

藥過多。甫入腹。遂麻痺不救。烏附

五種。主治攸分。附子大壯元陽。雖

偏下焦。而周身內外。無所不至。天

雄峻溫。不減於附。而無頃刻回陽

之功。川烏專搜風。濕。痛。痺。却少溫

經之力。則子善行。四支不入臟腑

草烏悍烈。僅堪外治。此烏附之同

類異性者。至於烏喙。稟氣不純。服

食遠之可也。【清】張隱庵本草崇

原論草烏曰。烏喙。雖亦名烏頭。實

乃土附子也。性劣有毒。但能搜風

勝濕。開頑痰。破堅積。治頑瘡。其毒

攻毒。不能如附子益太陽之經。助

少陽之火熱。而使神機之靈。轉

用者辨之。【清】楊時泰本草述約

元論草烏曰。草烏頭爲至毒之藥

如用以治病。必須沉寒痼冷。足以

相格。或寒溼。合併結聚。癰塊。頑痰

死血。阻塞真陽。非是不可以開道

路。令流氣破積之藥。得以奏功。蓋

因於風虛。則病深。潛聚而不化。則

病於風。癰。謂之頑風。是其所治者

淫風也。故明其爲風虛。則知用此

以透陽之鬱。豈得概謂治風而投

之風淫。以取敗哉。【清】鄭澍本經

疏證論草烏曰。烏頭之用。大率亦

與附子略同。其有異者。亦無不可

條疏。而件比之也。夫附子曰主風

寒。咳逆。邪氣。烏頭曰中風。惡風。洗

洗出汗。咳逆。邪氣。明明一偏於寒

一偏於風。一則沉著而回浮。越之

陽。一則輕疏而散已潰之陽。於此

見附子沉。烏頭浮矣。附子曰除寒

濕。緩拘攣。膝痛不能行。烏頭

曰除寒。濕痺。一主治腰一主治痺

踐。拘攣是筋因寒而收引。陽氣

①治脾痛脹滿草果仁二箇酒煎服之(時後方)

②治胃弱嘔逆不食用草豆蔻仁二枚高良薑半兩水一盞煮取汁入生薑汁半合和白麵作餅刀以羊肉脂汁煮熱空心食之(普濟方)

③治虛癰自汗不止用草果一枚麵裹煨熟連麵研入平胃散二錢水煎服(經效濟世方)

④治赤白帶下連皮草果一枚乳香一小塊麵裹煨焦黃同麵研細每米飲服二錢日二服(衛生易簡方)

用量 八分至錢半

施用宜忌 凡陰血不足而無寒溼實邪者禁用

著名方劑 果附湯治氣虛脾寒癰疾熱少寒多或單寒不熱或大便泄而小便多不能食(濟生方)草果仁熟附子各二錢半生薑七片棗肉二枚上以水三盞煎取一盞溫服

參攷資料 ①草豆蔻氣味極辛微香性溫而調散冷氣甚速虛弱不能飲食者宜此與木瓜烏梅

縮砂益智仁麴蘖甘草生薑同用(寇宗奭)②風寒客邪在胃之上當心作疼者煨熟用之(李杲)③草豆蔻性溫能散滯氣消膈上痰若明知身受寒邪口食寒物胃脘作疼方可溫散用之如鼓應桴或溼痰鬱結成病者亦效若熱鬱者不可用恐積溫成熱也必用梔子之劑(朱震亨)④豆蔻治病取其辛熱浮散能入太陽陽明除寒燥溼開鬱化食之力而已南地卑下山嵐烟瘴飲啖酸醢脾胃常多寒溼鬱滯之病故食料必用與之相宜然過多亦能助脾熱傷肺損目或云與知母同用治瘧瘧寒熱取其一陰一陽無偏勝之害蓋草果治太陽獨勝之寒知母治陽明獨勝之火也(李時珍)⑤按揚雄方言云凡物盛多白蔻豆蔻之名或取此義豆象形也南方異物志作漏蔻蓋南人字無正音也今雖不專爲果猶入茶食料用尚有草果之稱焉金光明經三十二品香藥謂之蘇乞迷羅細(李時珍)⑥草豆蔻今嶺南皆有之苗似蘆其葉似山薑杜若葉根似高良薑二月

開花作穗房生於莖下嫩葉卷之而生初如芙蓉花微紅穗頭深紫色其葉漸廣花漸出而色漸淡亦有黃白色者南人多採花以當果尤貴其嫩者并穗入鹽同淹治疊疊作朶不散又以木槿花同浸欲其色紅爾其結實者龍眼子而銳皮無鱗甲皮中子如石榴瓣夏月熟時採之曝乾根苗微作樺木香根莖子並辛香(蘇頌)⑦豆蔻生交趾其根似益智皮殼小厚核如石榴而辛香葉如芫荽而小三月採其葉細破陰乾用味近苦而有甘(李珣)⑧草豆蔻草果雖是一物然微有不同今建寧所產豆蔻大如龍眼而形微長其皮黃白淨而穠暗其仁大如縮砂仁而辛香氣和瀝廣所產草果長大如詞子其皮黑厚而穠密其子粗而辛臭正如斑蝥之氣彼人皆用茗茶及作食料恒用之物廣人取生草蔻入梅汁鹽漬令紅曝乾釀酒名紅鹽草果其初結小者名鸚鵡舌元朝飲膳皆以草果爲上供南人復用一種火楊梅僞充草豆蔻其形圓而粗氣味辛猛而不和人亦多用

之或云卽山薑實也不可不辨(李時珍)

【草東床】卽大腹皮之古籍別名典見和漢藥考詳「大腹皮」條

【草果】卽草豆蔻之古籍別名典見鄭樵通志詳「草豆蔻」條

【草果仁】卽草豆蔻之處方用名詳「草豆蔻」條

【草河車】卽草紫河車之簡稱詳「蜜休」條

【草金丹】卽杏仁之古籍別名典見和漢藥考詳「杏仁」條

【草金鈴】卽牽牛子之古籍別名典見炮炙論詳「牽牛子」條

【草附子】卽香附子之古籍別名典見圖經本草詳「香附子」條

【草馬餘糧】卽土茯苓之古籍別名典見本草拾遺詳「土茯苓」條

【草莓】卽蓬蘽之日本名詳「蓬蘽」條

【草烏】卽草烏頭之簡稱詳「草烏頭」條

【草烏喙】卽烏喙之原名詳「烏喙」條

【草烏喙】卽草烏頭兩歧相合者之別名詳「草烏頭」條

花漸出色漸淡亦有黃白色者。結實若龍眼。皮無鱗甲。皮中子如石榴瓣。夏月熟時採之。曝乾。根苗微作樟木香。根莖子俱辛香也。

種類 ●建寧所產者名草豆蔻。大如龍眼。而形微長。其皮黃白。薄而稜峭。仁大如縮砂仁。而辛香氣和。●滇廣所產者名草果。長大如訶子。其皮色黑厚而稜密。其子粗而辛臭。正如斑蝥之氣。

採取 夏月採實曝乾。

製法 雷斅曰。凡使草豆蔻。須用蒂取向裏子及皮。用茱萸同於鐵上緩炒。待茱萸微黃黑。即去茱萸。取草豆蔻皮及子杵用之。李時珍曰。今人惟以麵裹煇火煨熟。去皮用之。

性質 辛。溫。無毒。
效能 燥濕。祛寒。除痰。截癰。用為健胃。解毒藥。

主治 溫中。心腹痛。嘔吐。去口臭氣。

歷代記述攷證 【宋】開寶重定新本草論草蔻曰。下氣。止霍亂。一切冷氣。消酒毒。【元】李東垣用藥法象論草蔻曰。調中補胃。健脾。

消食。去客寒。心與胃痛。【明】李時珍本草綱目論草豆蔻曰。治瘴癘寒癰。傷暑吐下。洩痢噎膈。反胃痞滿。吐酸。痰飲積聚。婦人惡阻帶下。除寒燥溼。開鬱破氣。殺魚肉毒。制丹砂。【明】繆希雍本草經疏論草豆蔻曰。味辛氣溫。而性無毒。海藏又云。大辛熱。入足太陰陽明經。蓋辛能破滯。香能入脾。溫熱能祛寒。燥溼。故主溫中。及寒客中焦。心腹中寒。嘔吐。及脾開竅於口。脾家有積滯。則癰而為熱。故發口臭。醒脾導滯。則口氣不臭矣。辛散溫行。故下氣寒客中焦。飲食不消。氣因閉滯。則霍亂。又散一切冷氣。消酒毒者。亦燥溼破滯。行氣健脾。開胃之功也。產閩之建寧者。氣芳烈。類白豆蔻。善散冷氣。療胃脘痛。理中魚產滇貴南粵者。氣猛而濁。俗呼草果者是也。善破瘴癘。消穀食。及一切宿食停滯。作脹悶及痛。【清】黃宮繡本草求真論草蔻曰。草豆蔻辛熱香散。功與肉蔻相似。但此辛熱燥溼除寒。性兼有瀉。不似豆蔻瀉性居多。能止大腸滑脫不休也。又功與草果相同。但此止逐風。

寒客在胃口之上。症見當心疼痛。不似草菓辛熱浮散。專治瘴癘寒癰也。故凡溼鬱成病。而見胃脘作疼。服之最為有效。若使鬱熱內成。及陰虛血燥者。服之為大忌耳。閩產名草蔻。如龍眼而微長。皮黃白。薄而稜峭。仁如砂仁。而辛香氣和。滇廣所產名草菓。如訶子。皮黑厚而稜密。子粗而辛臭。雖是一物。微有不同。麵裹煨熟。取仁。忌用鐵器。【清】閻立陞本草選旨論草蔻曰。草菓味大辛熱。氣溫而猛。升也。陽也。無毒。與草豆蔻並入足太陰陽明經。辛能去滯。香能入脾。溫熱能祛寒。燥溼。故主治消食除痰。祛寒破滯。但氣比草菓猛。而且濁。功力迅速。故凡胸腹脹滿。宿食不消。或感寒中寒。腹痛吐利。或生冷積聚。痰涎鬱結。或寒邪客胃。當心作疼。或感山嵐瘴氣。或病霍亂。惡心。若審知其為寒溼所致。而不為暑熱所傷者。用之如鼓應桴。而且同縮砂能溫中。焦故寒中者。用之同常山能截疫癘。故時癘者。用之皆取其氣之猛烈。功之大而效之速也。然其氣溫。積溫成熱。過多能助脾。

熱。傷肺損口。至於老衰虛羸。元氣不足者。則全戒焉。以其氣專消導也。

國外學說 英美學說謂草豆蔻產印度。暹羅等國。其果可入藥。能溫補。開胃。祛風。佐瀉劑。同服。能免肚疼。每服一分至三分半。

配合應用 ●入人參養胃湯。能消一切宿食。開拓中焦滯氣。

●藥性論云。草豆蔻單用。能主一切冷氣。

●治心腹脹滿短氣。用草豆蔻一兩。去皮。為末。以木瓜生薑湯調服。牛錢（千金方）。

●治霍亂煩渴。草豆蔻。黃連。各一錢。牛馬豆五十粒。生薑三片。水煎服。（聖濟總錄方）。

●治脾胃不足。虛寒泄瀉。草菓仁一兩。以舶上茴香一兩。炒香。去茴不用。吳茱萸一兩。湯泡七次。同破故紙一兩。炒香。去故紙不用。胡盧巴二兩。同山茱萸一兩。炒香。去茱萸不用。三味。為末。酒糊丸。每六七十丸。鹽湯下。（百一還方）。

●香口辟臭。草豆蔻細辛。為末含之。（直指方）。

目詳「茶葉」條。

【草八角】古籍別名 紅孩兒。孩兒擇拿（綱目拾遺）

遺

產地 浙江於潛昌化之山野間。

形態 草八角爲木八角之一種。高尺許。葉角上仰。色黃。獨莖一葉。夏秋間開花。兩朵相對。粉紅色下垂。結子紅色。亦成對。其根圓而不長。可供藥用。

性質 溫。無毒。

主治 祛骨內風。癰腫諸毒。

參攷資料 八角金盤。有草木

二種。木本者。其葉尖。角仰起如盤之狀。葉背色黃。故曰金盤。草本者。葉尖。角不仰。葉背不黃。微有分別。

此藥性熱力猛。有毒咀之味麻。雖壯實人亦宜少用。服藥後忌魚腥。

豬羊牛馬等肉。犯之令人癲狂。惟白萊菔可解。入藥用近根皮。酒煎服。取汗即愈。力弱者發咳作吐。病亦愈。趙學敏。

【草三稜】卽三稜之古籍別名。典見開寶本草。詳「三稜」條。

【草木之王】卽南天燭之古籍別名。

名。典見登真隱訣。詳「南天燭」條。

【草牛黃】卽黃若子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「黃若子」條。

【草王】卽桑葉實之古籍別名。典見別錄。詳「桑葉實」條。

【草古】卽甘草之古籍通用簡名。詳「甘草」條。

【草甘遂】卽蚤休之古籍別名。典見唐本草。詳「蚤休」條。

【草石蠶】命名。本品根似石蠶。故名。

古籍別名 地蠶（日用）土蟬（餘冬錄）甘露子（食物）滴露。地瓜兒（綱目）

外國名詞 *Stachys Sieboldi* Miq.（拉丁）チヨロギチヨウロギ（日本）

基本 係唇形科水蘇屬。爲草石蠶之根。

產地 出山野間。

形態 草石蠶爲山草類之多。年生草本。方莖。高二尺餘。葉與莖皆密生毛茸。葉對生。有鋸齒。下部之葉長心臟形。上部之葉長卵形。秋日花生於上部之葉腋。連綴如穗狀。唇形花冠呈淡紅紫色。其生

於地下根莖。尖端肥大。肉質呈連球狀。白色。大如指。形如蠶。可煮食。味如馬鈴薯。亦供藥用。

採取 冬月採之。

性質 甘平。無毒。

主治 浸酒除風。破血。養食治深毒。



草石蠶

【草兵】卽巴豆之古籍別名。典見和漢藥考。詳「巴豆」條。

【草決明】卽青箱子之原名。詳「青箱子」條。

【草豆仁】卽草豆蔻之古籍別名。典見和漢藥考。詳「草豆蔻」條。

【草豆蔻】原名 豆蔻。

肉豆蔻而名也。

處方用名 煨草果。草果仁。

古籍別名 漏蔻。草物志。草果。鄭樵通志。豆叩豆。沐家。寶蔻。草豆仁（和漢藥考）蘇。迄米羅。細（金光明經）

外國名詞 *Cardamomum*（拉丁）（Cardamoms）（英）

基本 屬於薑荷科。爲草豆蔻之子實。

產地 陳仁山藥物生產辨云。草果產雲南百色。廣西龍州等處。有運東京海防而來。有運南寧而來。十一月新。

形態 草豆蔻苗似蘆。其葉似山薑。杜若。根似高良薑。二月開花。作穗。房生莖下。嫩葉卷之初如芙蓉花。微紅。穗頭深赤。其葉漸廣。

參攷資料 ①草石蠶和五臟下氣清神（飲膳正要）②草石蠶不宜生食及多食。生寸白蟲。與諸魚同食令人吐（李時珍）

【草血竭】卽地錦草之古籍別名。典見綱目。詳「地錦草」條。

十畫 草

十畫 荊 苳 苳 苳

一〇七四

香如蘇如薑如芥也。(李時珍)

今處處有之。葉似落葵而細。初生

香辛。可噉。人取作生菜。古方稀用。

近世醫家爲要藥。並取花實成穗。

者。曝乾入藥。又有胡荊芥。俗呼新

羅荊芥。又有石荊芥。生石間。體

性相近。入藥亦同。(蘇頌)

荊芥原是野生。今爲世用。遂多栽蒔。二

月布子生苗。炒食辛香。方壺細葉

似獨帶葉而狹小。淡黃綠色。八月

開小花。作穢成房。房如紫蘇。房內

有細子。如葶藶子狀。黃赤色。連穗

收採用之。(李時珍)

今人但遇風證。概用荊防。不知唯風在皮裏

膜外者宜之。若風入骨肉者。須防

風不得混用。(吳遵程)

荊芥炭。即荊芥之處方用名。詳

荊芥條。

荊芥穗。即荊芥之處方用名。詳

荊芥條。

荊桃。即櫻桃之古籍別名。典見

綱目。詳櫻桃條。

荊崗沙。即菰藟之古籍別名。典

見和漢藥考。詳菰藟條。

荊鳩。即斑鳩之古籍別名。典見

綱目。詳斑鳩條。

【荊瀝】 命名 本品係用牡荊

根莖炙取之汁。如竹瀝

然。故名。

基本 屬馬鞭草科。爲牡荊之

根汁。

形體 牡荊爲落葉灌木。每植

庭園中。以供玩賞。高四五尺。大達

丈餘。新枝色綠。其形方有茸毛。舊

枝色褐。其形圓。葉爲掌狀複葉。三

小葉附之。其在梢頭者。則有五小

葉。俱有長柄。小葉爲橢圓狀。或爲

長披針形。葉尖有鋸齒與茸毛。花

朵小。色青紫。夏日開於枝葉之間。

爲圓錐花序。其瀝則清冽如水。與

竹瀝相彷彿。

製法 時珍曰。取法用新採根

莖。截尺五長。架於兩磚上。中間燒

火炙之。兩頭以器承取用。又法截

三四寸長。束入瓶中。仍以一瓶合

住。固外以糠火煨燒。其汁瀝入下

瓶中。亦妙。

用法 乘熱時飲服。或和入湯

藥中。

性質 甘平。無毒。

效能 通經絡。瀉痰涎。用爲祛

主治 飲之去心悶煩熱。頭風。

旋暈目眩。心頭澀澀欲吐。卒失音。

小兒心熱驚癇。止消渴。除痰吐。令

人不睡。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論荊瀝曰。除風熱。開經

絡。導痰涎。行血氣。解熱利【清】汪

訥庵本草備要論荊瀝曰。荊瀝甘

平。除風熱。化痰涎。開經絡。行血氣。

治中風失音。驚癇痰迷眩暈煩悶。

消渴熱痢。爲去風化痰妙藥。氣虛

食少者忌之。

配合應用 治中風口噤。荊

瀝每服一升。(范汪方)

治頭風頭痛。荊瀝日日服之。

(集驗方)

治喉痺瘡腫。荊瀝細細咽之。

或以荊一握水煎服之。(千金方)

治目中卒痛。燒荊木黃汁點

之。(肘後方)

治心虛驚悸瘦羸者。荊瀝一

升。火煎至一分。作四服。日三夜一。

(小品方)

赤白下痢。五六年者。荊瀝每

日服五合。(外臺祕要方)

淫癘瘡癰。荊木燒取汁。日塗

之。(梅師方)

用量 八分至錢半。

參攷資料 荊瀝氣平味甘。

化痰去風爲妙藥。故孫思邈千金

翼云。凡患風人多熱。常宜於竹瀝。

荊瀝。姜汁合五合和勻。熱服。以達

爲度。陶弘景亦云。牡荊汁治心風

爲第一。延年祕錄云。熱多用竹瀝。

寒多用荊瀝。(李時珍)

二汁同功。並以姜汁助送。則不凝滯。但氣

虛不能食者。用竹瀝氣實能食者

用荊瀝。(朱震亨)

牡荊本東甲

度所產。享保年。始有人取漢種。

栽種江戶藥園。說見小野蘭山翁

著本草紀聞。(和漢藥考)

基本 荊草爲雜草類

之一種。可供藥用。

性質 辛。無毒。

主治 療金瘡。

荊 荊草之古籍別名。典見

詩經。詳荊條。

荊浮萍之古

籍別名。典見和漢藥考。詳浮萍

條。

荊絲菜。即荊菜之俗名。詳荊

菜條。

荊芥穗一兩三錢。桃仁五錢。去皮尖。炒爲末。水服三錢。若喘加杏仁。去皮尖。炒甘草炒各三錢。(保命集方)

①治產後下痢。大荊芥四五穗。於甕內燒存性。不得犯油火。入麝香少許。以沸湯些須調下。此藥雖微。能愈大病。不可忽之。(深師方)

②治產後鼻衄。荊芥焙研末。童子小便服二錢。海上方也。(婦人良方)

③治九竅出血。荊芥煎酒。通口服之。(直指方)

④治口鼻出血如涌泉。因酒色太過者。荊芥燒研。陳皮湯服二錢。不過二服也。

⑤治吐血不止。用荊芥連根洗。搗汁半盞服。乾穗爲末亦可。(聖惠方) 又用荊芥穗爲末。生地黃汁調服二錢。(經驗方)

⑥治小便尿血。荊芥。確砂。等分爲末。糯米飲下三錢。日三服。(集簡方)

⑦治崩中不止。荊芥穗於麻油燈上燒焦爲末。每服二錢。童子小便服。此夏太君娘方也。(婦人

良方)

①治痔漏腫痛。荊芥煮湯。日日洗之。(簡便方)

②治大便秘下血。用荊芥炒爲末。每米飲服二錢。婦人用酒下。亦可拌麵作饅飽食之。(經驗方) 又用荊芥二兩。槐花一兩。用炒紫爲末。每服三錢。清茶送下。(簡便方)

③治小兒脫肛。荊芥。皂角等分。煎湯洗之。以鐵漿塗上。亦治子宮脫出。(經驗方)

④治陰癰腫痛。荊芥穗五焙爲散。酒服二錢。即消。

⑤治小兒臍腫。荊芥穗煎湯洗淨。以煨葱刮薄。上火毒。貼之。即消。(海上方)

⑥治瘰癧潰爛。瘰癧牽至胸前。兩腋塊如茄子大。或牽至兩肩。上四五年不能療者。皆治之。其效如神。武進縣朱守仁傳云。其項不能回頭。用此數日。滅如瘡爛破者。用荊芥根下一段。剪碎。煎沸湯。溫洗良久。看爛破處。紫黑。以鍼一刺去血。再洗三四次。用樟腦雄黃等分爲末。麻油調掃上出水。次日再洗再掃。以愈爲度。(活法機要方)

①治疔腫諸毒。荊芥一握。切以水五升。煮取一升。分二服。俟冷飲。(藥性論方)

②治一切瘡疥。荊芥末。以地黃自然汁熬膏。和丸。梧子大。每服三十五丸。茶酒任下。(普濟方)

③治脚極濕爛。荊芥葉搗傅之。(簡便方)

④治癰脚生瘡。荊芥燒灰。葱汁調傅。先以甘草湯洗之。(摘玄方)

⑤治小兒風寒。煩熱有痰。不省人事。荊芥穗半兩。焙。麝香片腦各一字。爲末。每茶服半錢。大人亦治。(普濟方)

⑥治頭目諸疾。一切眼疾。血勞風氣。頭痛。頭眩。目眩。荊芥穗爲末。每酒服三錢。(龍樹論方)

⑦治經閉不通。小腹急痛。無問久新。荊芥。大黃爲末。等分。每溫水服三錢。小便不通。大黃減半。大便不通。荊芥減半。名倒換散。(普濟方)

用量 錢半至三錢。
施用宜忌 凡無外感風寒溼邪者。禁用。忌火。反魚蟹。河豚。驢肉。
參攷資料 ①荊芥反魚蟹河

豚之說。本草醫方並未言及。而稗官小說往往載之。按李廷飛延壽書云。凡食一切無鱗魚。忌荊芥。食黃鱸魚後食之。令人吐血。惟地漿可解。與蟹同食動風。又蔡條鐵山叢話云。子居嶺嶠。見食黃鱸魚。犯荊芥者立死。甚於鈎吻。洪邁夷堅志云。吳人魏幾道。啖黃鱸魚羹。後採荊芥和茶飲。少頃。足痒。上激心。肺狂走。足皮欲裂。急服藥兩日。乃解。陶九成輟耕錄云。凡食河豚。不可服荊芥。藥大相反。予在江陰。見一儒者。因此喪命。草航細談云。凡服荊芥。風藥忌食。魚。楊誠齋曾見一人立致於死也。時珍按荊芥乃日用之藥。其相反如此。故詳錄之。以爲警戒。又按物類相感志。言河豚用荊芥同煮三五次。換水則無毒。其說與諸書不同。何哉。大抵養生者。能守前說爲戒可也。(李時珍) ②按吳普本草云。假蘇一名荊芥。葉落藜而細。蜀中生。噉之。普乃東漢末人。去別錄時未遠。其言當不謬。故唐人蘇恭祖其說。而陳士良蘇頌復啓爲兩物之疑。亦臆說爾。曰蘇曰薑。曰芥。皆因氣味辛

日按荊芥三月出新。江南孟阿陸宛產者。莖細短。穗多色綠爲最佳。大倉出者。穗多氣香亦佳。蕭山龍山出者。梗粗葉綠。穗少氣香。略次。江西山東產者。梗粗穗紅不香。南京出性硬。皆極次。其他各處皆出。總要梗紅穗多。葉綠氣香者爲道地。

近人學說 張山雷曰。荊芥味微辛而帶芳香。其氣甚清。質又輕揚。故治風熱在表在上諸症。能泄肺熱而達皮毛。風熱咳嗽宜之。風熱外感頭痛寒熱。亦是主藥。又入血分清血熱。能治咽喉口舌發頰大頭諸症。亦治瘡瘍風疥癰癤。吐衄下血崩漏。能激上散下。散結導瘀。厥功甚多。而亦甚捷。誠風熱血熱之一大法。王不可以其微賤易得而忽視之。然古法每謂產後中風。口噤發瘧。角弓反張。血暈不醒。有豆淋酒法。以防風羌活荊芥等藥。炒研爲末。另以黑豆炒熱酒淋。乘熱調藥沖服。意謂此是產後猝受外風。故宜風藥酒服。溫升疏散之法。無論何書。往往稱爲大效。甚且託名於華元化。稱之爲華陀

愈風散。不知產後瘳厥。角弓反張。純是陰脫於下。陽浮於上。雖曰中風。明是內動之風。上升沖腦。以致知覺運動。頓失其常。鎮而降之。猶恐不濟。妄投風藥。加以熱酒。是爲敬發升火。火上添油。殺之尤速。安有得效之理。此皆古人誤認內風作外風之治法。一盲羣盲。千驚一律。最是黑暗地獄。惟荊芥炒黑。則輕揚疏散之性已失。而黑能入血。可以止血之妄行。若產後去血過多。陰不涵陽。暈厥昏曠者。用童便調灌。則又能立定其氣血。沖腦之變。是爲一舉兩得。卻是佳方。此不可與豆淋酒之法作一例觀也。

配合應用 ①治頭項風強。八月份後取荊芥穗作枕。及鋪牀下。立春日去之。(千金方)

②治風熱頭痛。荊芥穗、石膏等分爲末。每服二錢。茶調下。(永類鈴方)

③治風熱牙痛。荊芥根、烏柏根、葱根等分煎湯。頻含漱之。

④治小兒驚癇。一百二十種。用荊芥穗二兩。白礬半生。牛枯一兩。爲末。糊丸。黍米大。碌砂爲衣。每晝

湯下二十丸。日二服。(醫學集成方)

⑤治一切偏風。口眼喎斜。用荊芥一斤。青薄荷一斤。同入砂盆內研爛。生絹絞汁。於磁器中煎成膏。澆去滓三分之一。將二分日乾爲末。以膏和丸。梧子大。每服三十丸。白湯下。早暮各一服。忌動風物。(經驗方)

⑥治中風口噤。荊芥穗爲末。酒服二錢。立愈。名荊芥散。賈似道云。此方出會公談錄。前後用之甚驗。其子名順者。病此已革。服之立定。眞再生丹也。

⑦華佗愈風散。治婦人產後中風。口噤手足癱瘓。如角弓。或產後血暈不省人事。四肢強直。或心眼倒。藥吐瀉欲死。用荊芥穗子微焙爲末。每服三錢。豆淋酒調。或童子小便服之。口噤則挑齒。灌之。斷噤則灌入鼻中。其效如神。大抵產後太陰則汗出而脈理疎。則易於中風也。時珍曰。此方諸書盛稱其妙。(姚僧坦集驗方)以酒服。名如聖散。云藥下可立待應效。(陳氏方)

名舉卿古拜散。(肅存敬方)用古

者錢前湯服。名一捻金。(王昶指迷方)如當歸等分。水煎服。許叔微本方云。此藥委有奇效。神聖之功。一婦人產後睡久。及醒則昏。昏如醉。不省人事。醫用此藥。及交加散。云服後當醒。必以左手搥頭。用之果然。醫腹產寶方云。此病多因怒氣傷肝。或憂氣內鬱。或坐草受風而成。愈宜服此藥也。戴原禮證治要訣。名獨行散。賈似道悅生隨抄呼爲再生丹。

⑧治產後迷悶。因怒氣發熱。迷悶者。獨行散。用荊芥穗以新瓦半炒。半生爲末。童子小便服一二錢。若角弓反張。以豆淋酒下。或到散童尿煎服。極妙。蓋荊芥乃產後要藥。而角弓反張。乃婦人急候。得此證者。十存一二而已。(戴原禮要訣方)

⑨治產後血暈。欒心。眼倒風縮。欲死者。取乾荊芥穗。搗篩爲末。每用二錢匕。童子小便一酒盞。調勻熱服。立效。口噤者。挑齒。口閉者。灌鼻中。皆效。近世名醫用之。無不知神也。(圖經本草方)

⑩治產後血眩風虛。精神昏冒。

處方用名 荊芥穗 荊芥炭 炒荊芥 黑荊芥

古鑑別名 鼠糞(本經) 薑芥

(別錄) 京芥 鄭芥 一捻金 再生丹 如聖散 獨行散 舉卿古拜散 (和漢藥考) 胡荊芥 石荊芥 新羅荊(綱目)

外國名詞 Galvia Plebeia

(拉丁) (Vagoe) (英)

基本 屬唇形科 爲荊芥之花穗與莖葉

產地 陳仁山藥物生產辨云 荊芥產江西 紅梗者爲佳 其次浙江杭州府 再次湖北廣城 廣東產者名土荊芥 全無辛香 不適用 夏季出新

形體 荊芥(此與土荊芥異) 爲一年生草本 莖直立 高一二尺 葉作長披針形 其端尖銳 別有五小葉成爲繖狀 葉腋歧生分枝 梢端開淡紅色之唇形花 與紫蘇花相似 綴成長穗 氣芳香 味如樟腦 採取 五六月間 並花實成穗者採之 曝乾

製法 凡使以陳者良 去梗取穗 有微炒用以殺辛香者 若用以

止血 須炒黑 性質 辛溫 無毒 與黃芩同而較弱

成分 含有揮發油與樹脂 效能 輕宣發表 祛風理血 爲鎮痛鎮痙藥 用於胃寒性痙攣及痛風發作 產後亦多用之 若用大量則有疏表發汗之用 施於感冒及天痘瘰癧 功效甚著 又治流行性感冒

主治 寒熱 鼠瘻 癰癤 生瘡 破結聚氣 下瘀血 除溼疸 歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論荊芥曰 去邪除勞渴 冷風出汗 麥汁服之 搗爛醋和傳丁腫腫毒 【唐】甄權藥性本草論荊芥曰 單用治惡風 賊風 口面喎斜 遍身癢痺 心虛忘事 益力添精 辟邪毒氣 通利血脈 【唐】陳士良食性本草論荊芥曰 主血勞風氣 壅滿 背脊疼痛 虛汗 理丈夫脚氣 筋骨煩疼 及陰陽毒 傷寒頭痛 頭旋目眩 手足筋急 【唐】孟詵食療本草論荊芥曰 產後中風 身強直 研末酒服 【宋】日華諸家本草論荊芥曰 利五臟 消食下氣 醒酒作

菜生熟皆可食 并煎茶飲之 以破汗煎服 治暴傷寒 能發汗 【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論荊芥曰 治婦人血風及瘡疥爲要藥 【明】李時珍本草綱目論荊芥曰 散風熱 清頭目 利咽喉 消瘡腫 治項強 目中黑花 及生瘡陰癰 吐血衄血 下血 血痢 崩中 痔漏 【明】繆希雍本草經疏論荊芥曰 假蘇荊芥也 其氣溫 其味辛 其性無毒 入血分之風藥也 故能發汗 其主寒熱者 寒熱必由邪盛而作 散邪解肌出汗 則寒熱自愈 鼠瘻由熱結於足少陽陽明二經 火熱鬱結而成瘰癧爲病 亦屬二經故也 生瘡者 熱血有溼也 涼血燥溼 瘡自脫矣 破結聚氣者 辛溫解散之力也 下瘀血入血分 辛以散之 溫以行之之功用也 瘡者 風寒溼三邪之所致也 祛風燥溼散寒 則溼痺除矣 【清】黃宮繡本草求真論荊芥曰 荊芥辛苦而溫 芳香而散 氣味輕揚 故能入肝經氣分 驅散風邪 凡風在於皮裏膜外 而見肌膚灼熱 頭目昏眩 咽喉不利 身背疼痛者 用此治無不效 不似防風氣不輕揚 驅風

之必入人骨肉也 是以宣散風邪 用以防風之必兼用荊芥者 以其能入肌膚宣散故耳 且既入肝經 風木之臟 則肝即屬於藏血之地 故又能以通利血脈 俾吐衄腸風 崩漏 產後血暈 瘡毒癰腫 血熱等症 靡不藉其輕揚 以爲宣泄之具 寧於風木之臟 既於其氣而理者 復不於血而治乎 玩古方產後血暈風起 有用荊芥爲末 同酒及或童便調治 崩中不止 有用炒黑荊芥以治於此 可見其概矣 連穗用治血須炒黑

國外學說 日本藥學士村山義溫嘗試驗中國產荊芥中之揮發油 據稱揮發油中含有薄荷精 與日本產薄荷油中所含者相似 惟用光學試驗 則見平面相同 立體則異 蓋含於荊芥油中者爲右旋性 含於薄荷油中者乃左旋性也

辨偽 鄭肖巖曰 荊芥本經名假蘇 味辛性溫 臭香處處有之 本係野生 今多栽種 近有一種偽品 並無香味 又安能治寒熱 破結聚 下瘀血而除溼疸乎 曹炳章

故也。畏水與日。最宜坡地蔭處。清明前探者上。穀雨前者次之。此後皆老若爾。採蒸揉焙。修造皆有法。詳見茶譜。昔賢所稱。大約謂唐人尙茶。茶品益衆。有雅州之蒙頂。石花。露芽。穀芽爲第一。建寧之北苑。龍鳳園爲上。供蜀之茶則有廣川之神泉。獸日。硤州之碧潤。明月。夔州之眞香。邛州之火井。思安。黔陽之都濡。嘉定之峨眉。瀘州之納溪。玉壘之沙坪。楚之茶則有荊州之仙人掌。湖南之白露。長沙之鐵色。蘄州蕲門之團面。壽州霍山之黃芽。廬州之六安。英山。武昌之樊山。岳州之巴陵。辰州之淑浦。湖南之寶慶。茶陵。吳越之茶則有湖州顧渚之紫筍。福州方山之生芽。洪州之白露。雙井之白毛。廬山之雲霧。常州之陽羨。池州之九華。丁山之陽坡。袁州之界橋。睦州之鳩坑。宣州之陽坑。金華之舉岩。會稽之日鑄。皆產茶有名者。其他猶多而得維更甚。按陶隱居註苦茶云。西陽武昌廬江晉陵皆有好茗。飲之宜人。凡所飲物。有茗及木葉。天門冬苗。莪藟葉皆益人。餘物並冷利。又

巴東縣有眞茶。火煬作卷結。爲飲亦令人不服。俗中多煮檀葉。及大皂李葉作茶飲。並冷利。南方有瓜蘆木。亦似者也。今人採檣櫟。山礬。南燭。烏藥諸葉。皆可爲飲。以亂眞茶云。(李時珍) ①微之松蘿茶化食。六合之苦丁茶。止瀉。瀘南之普洱茶。消食辟瘴。(盧明飛) ②產中國。日本。印度。日本除北海道外。各地皆產之。其中有名者。如山城之宇治。駿河之安倍。蘆久保。近江之信樂。武藏之狹山等。(和漢藥考) ③貯茶用磁製或錫製壺最佳。陶製及玻璃器不能將茶保存長久。(和漢藥考) ④蠶豆葉。枸杞葉。柳葉等。農家往往用以代茶。好商則往往以之混入茶葉。使增加重量。(和漢藥考)

【茶腿】即火腿之別名。見「火腿」條。

【茶樹根】 性質 味苦平。無毒。 主治 口爛。煎湯代茶飲之。立效。

【茸母】即鼠麴草之古籍別名。典見綱目。詳「鼠麴草」條。

【茸母草】即鼠麴草之古籍別名。

典見和漢藥考。詳「鼠麴草」條。

【葦花枝】即合歡皮之古籍別名。典見和漢藥考。詳「合歡皮」條。

【茹根】即白茅根之古籍別名。典見本經。詳「白茅根」條。

【茹草】即柴胡之古籍別名。典見吳普本草。詳「柴胡」條。

【茹蘆】即茜草根之古籍別名。典見別錄。詳「茜草根」條。

【茹藤】即茜草根之古籍別名。典見和漢藥考。詳「茜草根」條。

【荳蔕】即益母草之原名。詳「益母草」條。

【荳蔕子】即益母草子之原名。詳「益母草子」條。

【荳蔕草子】條。

【荳蔕子】條。

【荳蔕子】條。

【荳蔕子】條。

羽狀深裂。互生。花黃色。或白色。頭狀花序。其花外圍之花。作舌狀花冠。中部之花。作筒狀花冠。每一花。結子近百。成穗如地毯及苦蕒子。其莖葉可供食與藥用。



荳 蔕

性質 甘辛平。無毒。 主治 安心氣。養脾胃。消痰飲。利腸胃。

參攷資料 荳蔕多食動風。氣薰人心。令人氣滿。(掌禹錫)

【荳】即荳蒳之古籍別名。典見和漢藥考。詳「荳蒳」條。

【荳】即赤小豆之古籍別名。典見廣雅。詳「赤小豆」條。

【荳】即雞之古籍別名。典見綱目。詳「雞」條。

【荳三稜】即三稜之處方用名。詳「三稜」條。

【荳三稜】條。

【荳三稜】條。

【荳三稜】條。

④解諸中毒。芽茶白礬等分碾末。冷水調下。(簡便方)

⑤治瘡瘡作痒。房中宜燒茶烟恒薰之。

⑥治陰囊生瘡。用蠟面茶爲末。先以甘草湯洗後貼之妙。(經驗方)

⑦治脚極濕爛。茶葉嚼爛傳之有效。(攝生方)

⑧治蠟螬尿管。初如糝粟。漸大如豆。更大如火烙。藥炮疼痛至甚。者速以草條并蠟茶俱可以生油調傳藥至痛乃止。(勝金方)

⑨治風痰顛疾。茶芽。梔子各一兩。煎濃汁一碗。服良久探吐。(摘玄方)

⑩治霍亂煩悶。茶末一錢。煎水調乾薑末一錢。服之即安。(聖濟總錄方)

⑪治月水不調。茶清一瓶。入沙饒少許。露一夜。服雖三箇月胎亦通。不可輕視。(鮑氏方)

⑫治痰喘咳嗽。不能睡臥。好末茶一兩。白礬一兩。爲末。放盆內。蓋定。傾沸湯一小盞。臨臥再添湯點服。(瑞竹堂方)

用量 錢半至二錢。

施用宜忌 凡脾虛胃寒及酒後與水腫痼疾者禁用。

參攷資料 ①一人好燒鵝炙。

②日常不飲。人咸防其生瘰癧。後卒不病。訪知其人每夜必吸涼茶一碗。乃知茶能解炙燂之毒也。(汪頤)

③薑茶治痢。薑助陽。茶助陰。並能消暑解酒食毒。且一寒一熱。調平陰陽。不問赤白冷熱。用之皆良。生薑細切與真茶等分。新水濃煎服之。蘇東坡以此治文潯公有效。(楊士瀛)

④茶苦而寒。最能降火。火爲百病。火降則上清矣。然火有五火。有虛實。若少壯胃健之人心肺脾胃之火多盛。故與茶相宜。溫飲則火因寒氣而下。降熱飲則茶借火氣而升散。又兼解酒食之毒。使人神思開爽。不昏不睡。此茶之功也。若虛寒及血弱之人。飲之既久。則脾胃惡寒。元氣暗損。土不制水。精血潛虛。成痰飲。成痞脹。成痿痺。成黃瘦。成嘔逆。成洞瀉。成腹痛。成疝瘕。種種內傷。此茶之害也。(李時珍)

⑤典樞同食。令人身重。(胡洽)

入腎經。令人腰脚膀胱冷痛。兼患水腫擊痺諸疾。大抵飲茶宜熱宜少。不飲尤佳。空腹最忌之。(李廷飛)

⑥凡服威靈仙土茯苓者。忌飲茶。(李時珍)

⑦郭璞云。早採爲茶。晚採爲茗。一名芽。蜀人謂之苦茶。陸羽云。其有五。一茶。二檟。三蔎。四茗。五芽。(蘇頌)

⑧今閩浙蜀江湖淮南山中。皆有之。通謂之茶。春中始生。嫩葉蒸焙去苦水末之。乃可飲。與古所食殊不同也。陸羽茶經云。茶者南方嘉木。自一尺二尺至數十尺。其巴川峽山有兩人合抱者。伐而掇之。木如瓜。蘆葉如梔子。花如白薔薇。實如枳椇。辛如丁香。根如胡桃。其上者生爛石中。若生機。擲下者生黃土。藝法如種瓜。三歲可採。陽岸陰林。紫者上。綠者次。箭者上芽者次。葉卷者上。舒者次。在二月三月四月之間。茶之

筍者生於爛石之間。長四五寸。若獸之始抽。後露採之。茶之芽者。發於纖薄之上。有三枝四枝五枝。於枝顯採之。採得蒸焙封乾。有千類萬狀也。略而言之。如胡人靴者。盛縮然如犍牛臄者。廉沽然。出山者

輪困然。拂水者。潤澹然。皆茶之精好者也。如竹。如荷。皆茶之精老者也。其別者。有名南芽。枸杞芽。枇杷芽。皆治風疾。又有皂莢芽。槐芽。柳芽。乃上春摘其芽和茶作之。故今南人輸官茶。往往雜以菜葉。

惟芽蘆竹筍之類。不可入。自餘山中草木芽葉。皆可合和。椿柿尤奇。真茶性冷。惟雅州蒙山出者溫而主疾。毛文錫茶譜云。蒙山有五頂。上有茶園。其中頂曰上清峯。昔有僧人病冷。且久。遇一老父。謂曰。蒙

之中頂茶。當以春分之先後。多聚人力。俟雷發聲。併手採擇。三日而止。若獲一兩。以本處水煎服。即能祛宿疾。二兩當眼前無疾。三兩能固肌骨。四兩即爲地仙矣。其僧如說。獲一兩餘服之。未盡而疾瘳。其四頂茶園。採摘不應。惟中峯草木繁密。雲霧蒙蔽。獸獸時出。故人跡不到矣。近歲稍費此品。製作亦精。於他處。(蘇頌)

⑨茶有野生種生。種者用子。其子大如指。頂正圓黑。色其仁入口。初甘後苦。畏鹹人喉。而閩人以榨油食用。二月下種。一次須百顆。乃生一株。蓋空穀者多。

其第一類謂之綠茶。綠茶能分數種。內有五種。如官茶、圓珠、熙春、兩前、屯溪等。此類茶樹均耐冷。故英國多種植此樹。能經冬不枯。中國有數種綠茶。其色係將醃類之物所染。曾有西人查考常出售之綠茶。有加色料與不加色料之別。其第二類謂之武夷茶。西國以爲此樹出各種黑茶。卽爲白毫、臘生、小種、工夫、武夷等。第黑茶與綠茶俱爲綠茶樹之葉。在中國之南方北方等處。惟黑茶則大半在中國之南。如廣東省等處。而黑茶與綠茶之分別。因黑茶必先置露天若干時。待其少發酵而後加熱烘之。則能變爲黑色。印度人種中國之茶子。以其所得茶樹之葉依中國法烘之。而與中國安徽省之上等烏龍茶相比較。初無上下之分。考茶之功用。能收斂而稍行血氣。大半感動腦筋。令人覺爽。遇如辛勞力乏時。飲之能補精神。飲濃茶則能感動腦筋。如飲更淡之茶。則能平火安心。其功用又能發汗。解鴉片毒。免其困迷。日本和漢藥考曰。種茶及製茶之起始。散見諸書。今將

「日本事物起原」所載者。錄之如左。種茶及製茶之起始。無從確知。惟徵之史乘。有聖武天皇太平年間。召百僧於禁庭。賜茶云云。又嵯峨天皇弘仁年間。始立賞茶式云云。足見日本飲茶年代頗遠。至後鳥羽院文治年間。有建仁寺開基千光國師。槃西留學宋國。於建久年間。歸日。由江南浮梁。攜回茶之種子。種於筑前國。晉振山。其所製茶。謂之岩上茶。並著有喫茶養生錄一書。藥西實爲日本種茶及製茶之始祖也。

近人學說 念饒曰。茶葉爲我國特產。且爲一般人所嗜之飲料。最近據大阪市立衛生試驗所山口博士研究所得。茶內實含有偉大的殺菌力。以之治却。殺司虎列拉。赤痢諸症。甚見功效。博士曾以却殺司之細菌。置於濃冷之茶汁中。發見此種細菌。在紅茶中二十分鐘。在綠茶中三十分鐘。全告死亡。若於咖啡中。則不見效。因茶中含有多量的單寧酸。單咖啡則無。細菌中之蛋白質。遇茶中之單寧酸。卽被吸收結合。而停止其生活。

此與石炭而做成普通消毒劑。完全不同。而自成爲一種獨特新異的殺菌法。至於紅茶中所含之單寧酸。較綠茶中所含者約多二倍。故紅茶之功效較偉。又虎列拉與赤痢之細菌。比却殺司之細菌尤弱。博士以此種細菌。置於顯微鏡下。以茶汁一滴注之。不到七分鐘。卽失其活動。博士並言。印人昔以茶治傷風。却殺司諸病。云甚靈效。今由實驗所得。可信其言不謬。故普通以茶作飲品。不但可以預防傳染。卽以治療上述諸病。亦必靈驗異常也。

用之有效。(直指方)一方蠟茶末。以白梅肉和丸。赤痢甘草湯下。白痢烏梅湯下。各百丸。一方建茶合醋煎熱服。卽止。(經驗方)

①治大便秘下。氣衝氣虛。或受風邪。或食生冷。或痰火熾。或飲食過度。積熱腸間。使脾胃受傷。糟粕不聚。大便秘下。利清血。膈腹作痛。裏急後重。及酒毒一切下血。並皆治之。用細茶半斤。碾末。川百藥煎五箇。燒存性。每服二錢。米飲下。日二服。(普濟方)

②治產後秘塞。以葱涎調蠟茶末。丸百丸。茶服自通。不可用大黃利藥。利者百無一生。(郭稽中婦人方)

③治久年心痛。十年五年者。煎湖茶。以頭醋和勻服之。良。(兵部手集方)

④治腹痛難轉。煎茶五合。投醋二合。頓服。(五詒方)

⑤治嗜茶成癖。一人病此。一方士令以新鞋盛茶。令滿。任意飲盡。再盛一鞋飲。如此二度。自不喫也。男用女鞋。女用男鞋。用之果愈也。(集簡方)

之水。無色溶化。呈中性反應。溶於

二分之沸湯。冷後凝結。成爲結晶

性藥劑。又可溶於哥羅仿姆 (C₁₂H₁₀O₂) 及約五十分之酒精。

惟於伊打。則不甚溶解。置空氣中

則風化。將本品徐徐燒熱。約在百

度時。僅一部分揮散。至一百八十

度。則完全昇華。又將本品〇・一

瓦。溶化於綠氣水十立方仙米內。

於重湯煎上蒸發。所得殘留物。作

黃赤色。和以安母尼亞水少許。則

呈紫紅色。

效能 清熱。降火。消食。醒睡。用

作興奮神經藥。又爲利尿藥。又治

疲勞性精神衰弱症。

作用 入胃後。除所含之一部

分單寧制止消化酵素之作用。及

凝固已消化之蛋白外。餘皆不起

何等變化。惟精油 (香精) 有稍能

激胃分泌增多之功。由幽門而達

十二脂腸。小腸等處。始次第將茶

精吸入血中。由微血管而傳達中

樞神經。使血液循環加速。腦部血

量增多。精神遂被激而興奮。惟效

力微甚。而時間亦短促。

渴。令人少睡有力。悅志。

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新

修本草論茶葉曰。下氣消食。作飲

加黃芩葱薑良。【唐】陳藏器本草

拾遺論茶葉曰。破熱氣。除瘴氣。利

大小腸。【宋】陳承本草別說論茶

葉曰。治傷暑。合醋服治泄痢甚效。

【元】王好古湯液本草論茶葉曰。

清頭目。兼治中風昏憤。多睡不醒。

【明】吳瑞日用本草論茶葉曰。炒

煎飲。治熱毒赤白痢。同芍藥葱白

煎飲。止頭痛。【明】李時珍本草綱

目論茶葉曰。濃煎飲吐風熱痰涎。

【明】繆希雍本草經疏論茶葉曰。

若本經味甘。氣微寒。無毒。藏器言

苦。然亦有不可苦者。氣薄味厚。入手

太陰少陰經。太陰爲清肅之臟。喜

涼而惡熱。熱則生痰而津液竭。故

作渴也。瘴瘴者。大腸積熱也。小便

不利者。小腸熱結也。甘寒入心肺

而除熱。則津液生。痰熱解。臟氣既

清。腑病不求其止而止矣。令人少

睡者。蓋心藏神。神昏則多睡。清心

經之熱。則神常自惺。寂故不寐也。

【明】李士材本草圖解論茶葉曰。

若苦甘微寒。下氣消食。清頭目。醒

睡。眠。解炎。燻毒。消食。同薑治

痢。按者得天地清陽之氣。故善理

頭風。肅清上膈。使中氣寬舒。神情

爽快。此惟洞山上品。方獲斯效。至

如俗用雜茶。性味不佳。久啜慕雅。

必使中土蒙寒。元精暗耗。輕則黃

瘦減食。甚則嘔泄痞脹。無病不集。

害可勝數哉。茶序云。消停滯滯。一

日之利。暫性。瘴氣。侵精。終身之累

斯大。東坡云。除煩去膩。不可無茶。

然空心飲茶。直入腎經。且寒脾胃。

乃引賊入室也。【清】黃宮繡本草

求真論茶葉曰。茶者大者爲若。小

者爲茶。茶稟天地至清之氣。得春

露以培生意。充足纖芥。滓穢不受。

味甘氣寒。故能入肺清痰利水。入

心清熱解毒。是以垢膩能滌。炎燻

能解。凡一切食積不化。頭目不清。

痰涎不消。二便不利。消渴不止。及

一切吐血便血衄血血痢。火傷目

疾等症。服之皆能有效。但熱服則

宜。冷服聚痰。多服少睡。久服瘦人

甚多。有以陽羨名者。謂之真嚴茶。

治能降火以清頭目。有以臘茶名

者。以其經冬過臘。佐劉寄奴治便

血最效。有以松蘿名者。是生於徽

耑於化食。有以日鑄名者。生於浙

紹。諸於清火。有以建茶名者。生於

閩地。諸於辟瘴。有以苦丁名者。產

於六合。諸於止痢。有以普洱名者。

生於滇南。諸於消食辟瘴止痢。至

於蒙山。世所罕有。且有許多僞充

真偽莫辨。然大要總屬導痰宣滯

之品。雖一日之利。暫快。而終身之

累斯大。損多益少。服宜慎矣。【清】

王士雄隨息居飲食譜論茶葉曰。

茶微苦微甘而涼。清心神醒睡除

煩。涼肝膽滌熱消痰。肅肺胃。明目

解渴。不渴者勿飲。以春採色青。炒

焙得法。收藏不泄氣者。良。色紅者

已經蕪害。失其清滌之性。不能解

渴。易成停飲也。普洱產者味重力

峻。善吐風痰。消肉食。凡暑穢瘴氣

腹痛乾霍亂痢疾等證。初起。飲之

輒愈。

國外學說 英美學說謂茶葉

十畫 茶

參攷資料 茶油不宜生食。及煎熬不熟食之令人作瀉。(趙學敏)

【茶炳】

產地 出遠東塞外諸地。

形體

茶炳爲山果類之一種。高三尺許。葉如楝樹背有黃白點。開花碧色。有四出有八出形似手結子大如拳。味甘如飴。樹皮浸水可取油以燃燈。其子實可供食與藥用。

性質 甘。無毒。

參攷資料 遼塞無藥。土人有病者恒取啖之即愈。(趙學敏)

【茶根】即茶樹根之簡稱。

【茶炬摩】即鬱金香之古籍別名。典見佛書。詳『鬱金香』條。

【茶婆蟲】即蜚蠊之古籍別名。典見綱目。詳『蜚蠊』條。

【茶蛀蟲】

基本 茶蛀蟲爲化生蟲類之一種。即蠹蟲之生於茶葉籠中者。其蛀屑可供藥用。

主治 聾耳出汗。研末絞淨搽。

【茶蛀蟲蛀屑】

功用 治聾耳出汗。(研)

末搽之)

【茶蛀蟲糞】即茶蛀蟲蛀屑。

古籍別名 黃色者名盤桓。白色者名玉玲瓏。(綱目拾遺)

產地

出浙江杭州之寶橋。及紹興之新昌。與安徽江西皆有之。

形體 茶菊爲溼草類菊屬之一種。其莖柔輭。嫩青老紫。葉色淡綠。似小金鈴而尖。氣似薄荷。花色有黃有白。小如指頭。實如拳。種之亦生。其花可供藥用。

採取 以浙江江西者佳。入藥陰乾去蒂用。

性質 苦。微甘。平。無毒。

主治 諸風。頭目眩暈。平咳逆。解肌熱。清鬱火。益肺腎。

配合宜忌 反河魀。無鱗魚。白朮。杞子。地骨皮。爲使。

【茶菊枝葉】

主治 紅絲疔。瘡和雄黃。螻蛄。共搗爛。傳至絲。盡處。跌打損傷。和童便。無灰酒煎服。

【茶菊枝葉】

主治 紅絲疔。瘡和雄黃。螻蛄。共搗爛。傳至絲。盡處。跌打損傷。和童便。無灰酒煎服。

【茶菊花露】

基本 本品即以茶菊蒸取之。

露。

性質 苦。微甘。平。無毒。

主治 清心明目。除熱祛風。

【茶菊根】

採取 以白花者良。

【茶葉】

原名 茗。古籍別名 苦茶。(唐本草) 檉。(爾雅) 葢。蔎。綱目 荈。苦茶。碧潤。雲霧。(郭璞註爾雅) 外國名詞 Thea (拉丁) Tea (英) Thee (德)

基本 屬山茶科茶樹之葉。

產地 陳仁山藥物生產辨云。茶各屬有出三四月新。普洱茶產雲南。由蒙自配車經河口魯街出河內轉海防付船來港。近日以同慶印同興印爲最好。原以姑娘茶爲最好。惜乎甚少。

製法 凡入藥用須以臘茶。研治作餅。日乾用。尤以陳細者良。

用法 沸水沖。或水煎。或對末用。

性質 苦。甘。微寒。無毒。

成分 茶葉中含有咖啡鹼。咖啡鹼 Caffeinum C₈H₁₀N₄O₂ + H₂O 爲柔刺白色針狀結晶。有絹絲狀光澤。味微苦。溶於八十分



茶 葉

形體 茶爲常綠小灌木。高達五六尺。葉作長橢圓形。長一寸許。

●治男子酒疸。用茵陳蒿四根。梔子七箇。大田螺一箇。連殼搗爛。以百沸白酒一大盞。沖汁飲之。祕方也。

●治眼熱赤腫。山茵陳、車前子等分。煎湯。細茶調散服數服。(直指方)

用量 二錢至四錢。

應用宜忌 凡無溼熱而發黃。由於蓄血者。禁用。忌火。

著名方劑 黃疸方。治身目皆黃。皮肉瘦出。千金翼方。茵陳一把。梔子二十四枚。石膏一斤。上以水五升。煮二升。取二升半。去渣。以猛火燒石膏令赤。投湯中。沸定。服一升。覆取汗。周身以粉粉之。不汗更服。

參攷資料 ●張仲景治傷寒

熱甚發黃。身面悉黃者。用之極效。一僧因傷寒後。發汗不微。有留熱。面身皆黃。多熱。年不愈。醫作食治。不對。而食不減。予與此藥。服五日。病減三分之一。十日減三分之二。二十日病悉去。方用山茵陳。山梔子各三分。秦艽。升麻各四錢。爲散。每用三錢。水四合。煎二合。去滓。

十畫 茵 茶

食後溫服。以知爲度。此藥以山茵陳爲本。故書之。(寇宗奭) ●張仲景曰。茵陳。梔子。大黃湯。治溼熱也。梔子。藥皮湯。治燥熱也。如苗澇則溼黃。苗旱則燥黃。溼則瀉之。燥則潤之可也。此二藥治陽黃也。韓祿和李思訓治陰黃。用茵陳。附子湯。大抵以茵陳爲君主。而佐之以附子。大黃。各隨其寒熱也。(王好古) ●近道皆有之。不及太山者佳。春初生苗。高三五寸。似蓬蒿而葉緊細。無花實。五月七月採莖葉。陰乾。今謂之山茵陳。江寧府一種。茵陳葉大根粗。黃白色。至夏有花。雙階州一種。白蒿。一似青蒿而背白。本土皆以爲茵陳。入藥。今南方醫人用山茵陳。乃有數種。或著其說云。山茵陳。汴京及北地用者。如艾蒿。葉細。而背白。其氣亦如艾。味苦。乾則色黑。江南所用者。莖葉都似家茵陳。而大高三四尺。氣極芳。香味甘辛。俗又名龍腦薄荷。吳中所用。乃石香薷也。葉至細。色黃。味辛。甚香烈。性溫。若誤作解脾藥服。大令人煩。以本草論之。但有茵陳蒿。無山茵陳。注云。似蓬蒿而緊細。今汴

京北地所用。山茵陳是也。大體世方用山茵陳。療體痛。解寒發汗。行肢節。滯氣。化痰利腸。治勞倦。最要詳本草正經。惟療黃疸利小便。與世方都不應。今試取汴京所用。山茵陳。爲解肌發汗藥。灼然少效。江南山茵陳。療傷寒。腦痛。絕勝。比見諸醫議論。謂家茵陳。亦能解肌下膈。去胸中煩。方家少用。但可研作飲服之。本草所無。自出。俗方茵陳。萬當別是一物。主療自異。不得爲山茵陳也。此說亦可據。但以功較之。則江南者爲勝。以經言之。則非本草所出。醫方所論。更當考論爾。(蘇頌) ●茵陳。昔人多謬爲蔬。故入藥用山茵陳。所以別家茵陳也。洪舜俞老圃賦云。醋糟紫薑之掌。沐醴青陳之絲是也。今淮揚人二月二日。猶採野茵陳。苗和粉麵作茵陳餅食之。後人各據方土所傳。遂致淆亂。今山茵陳。二月生苗。其莖如艾。其葉如淡色青蒿。而背白。葉岐緊細。而扁。整九月。開細花。黃色。結實。大如艾子。花實並與薔薇花實相似。亦有無花實者。(李時珍) ●茵陳有二種。一種葉細如

青蒿者。名綿茵陳。專於利水。爲溼熱黃疸要藥。一種生子如鈴者。名山茵陳。又名角蒿。其味苦辛。小毒。專於殺蟲。治口齒瘡。絕勝。本經主風溼寒熱。熱結黃疸。溼伏陽明。所生之病。皆指綿茵陳而言。茵陳專走氣分。而利溼熱。若蓄血發黃。非此能治也。(張石頑)

【茵陳】即茵芋之古籍別名。典見和漢藥考。詳「茵芋」條。

【茶子】性質 苦寒。有毒。主治 喘急咳嗽。去痰垢。搗仁洗衣。除油膩。

【茶芎】即土當歸之古籍別名。典見進賢。詳「土當歸」條。

【茶果】即紫金牛之古籍別名。典見植物名彙。詳「紫金牛」條。

【茶油】原名 樟油。外國名 Oleum Camelliae. (拉丁) (Tea Oil) (英)

基本 本品乃樟樹子實榨取之油。俗呼爲茶油。

性質 甘涼。無毒。主治 潤腸消胃。殺蟲解毒。燃燈益目。抹髮解脫。

自利。小柴胡湯證。腹痛而嘔。小半夏湯證。小便色不變而嘔。桂枝加黃芪湯證。脈浮。梔子大黃湯證。心中懊憹。消石礬石散證。額上黑。日晡發熱。則內外有熱。但頭汗出。齊頸而還。腹滿。小便不利。口渴。爲茵陳蒿湯證矣。第腹滿之治在大黃。內熱之治在梔子。惟外復有熱。但頭汗出。小便不利。始爲茵陳的治。其所以能治此者。豈不爲新葉茵陳幹而生清芬。可以解鬱熱。苦寒可以洩停滯邪。蓋陳幹本能降熱利水。復加以葉之如絲如縷。挺然於暑溼蒸逼之時。先草木而生後草木而彰。不必能發散而清芳揚溢。氣暢不斂。則新感者遂不得不解。自是汗出不止於頭矣。故曰發熱汗出。此爲熱越。不能發黃也。

國外學說 日本學說謂茵陳蒿者。自生於山野。宿根之草也。收花供藥用。又茵陳蒿者。古來皆用以療黃疸有效。而著名者。猶于博士。嘗論其效驗云。其症爲加答兒性黃疸。又癰水腫有效。然果較他利尿劑優勝與否。不能無疑。氏又於化學分析上。得一種苦味素。然

不能斷爲本藥之有效成分。又療黃疸有效之說。村井純之助云。殆因有物質。如洋藥亞爾鮮中所含苦味質之「アアシニン」之故歟。茵陳蒿之用量。一日五・〇至一〇・〇爲煎劑與之。

近人學說 黎伯樞曰。昔李時珍作本草綱目。於茵陳蒿謂有石茵陳。山茵陳。家茵陳。三種。豈知今日已無此等名目。別有所謂綠茵陳。綿茵陳。二種。查綠茵陳之所以名爲綠。不知何所取義。其來由爲何。然其物莖梗葉俱有莖爲方莖。似是蒿類。然殊不見其綠。若綿茵陳一種。純是細小花瓣。其所謂綿。當是指其柔輭。嗅之別有一種香氣。其性輕浮。實爲走表之物。至爲何種之花。不得而知。惟與綠茵陳形色性味。迥然各別。查茵陳蒿本治黃疸。卽西醫所謂膽汁溢出之病。實以綠茵陳爲合。今醫士處方。但書茵陳。揀藥店人云。率以綠茵陳與之。然余曾實驗過。亦有與綠茵陳者。殊不一定。余意須以綠茵陳爲正。但僅書茵陳。不能必藥店之定給。以何種。是則處方時

須特別註明也。張山雷曰。茵陳味淡利水。乃治脾胃二家溼熱之專藥。溼疸酒疸。身黃瘦赤。如醬。皆胃土溼滯積熱之證。古今皆以此物爲主。其效甚速。蕩滌腸胃。外達皮毛。非此不可。蓋行水最速。故凡下焦溼熱。痒搔。及足脛跗腫。溼瘡流水。並皆治之。其陰黃一證。雖曰虛寒。然亦內有蘊熱。故能發見黃色。則以入於溫經隊中而掃蕩之。卽仲景茵陳附子之法。惟女勞疸一症。則療滯痺者。非僅通利所可奏功。故必以硝石礬石之峻利者。爲刮垢磨光之治。而無取於茵陳也。

配合應用

①茵陳性苦寒。能除一切溼熱。五疸雖各有其因。然同爲溼熱所成。故得黃連。乾薑。黃蘗。首蓿。五味子。治酒疸如神。

②治穀疸。茵陳二朮。茯苓。澤瀉。車前子。木通。橘皮。神麴。紅麴。麥門冬。

③治疸因酒色而得。病名女勞疸。茵陳。生地黃。仙人對坐草。石斛。木瓜。牛膝。黃蘗。

④治穀疸。寒熱不食。食卽頭眩。

心胸不安。茵陳六兩。梔子十四枚。大黃二兩。以水一斗。先煮茵陳。減六升。內二味。煮取三升。去滓。分溫三服。小便當利。尿如皂角汁狀。色正赤。一宿腹減。黃從小便而去也。(仲景茵陳湯)

⑤又茵陳五苓散。總治諸疸。⑥茵陳除大熱寒濕。傷寒頭痛。風熱瘧瘧。利小便。以茵陳細切者。羹食之。生食亦宜。(食醫心鏡方)

⑦治遍身風痒。生瘡疥。用茵陳煮濃汁。洗之。立瘳。(千金方)

⑧治癰瘍風病。茵陳蒿兩握。水一斗五升。煮取七升。先以皂莢湯洗。次以此湯洗之。冷更作。隔日一洗。不然。恐痛也。(崔行功要方)

⑨治風疾。癰急。茵陳蒿一升。糯米一石。麴三斤。和勻。如常法釀酒服之。(聖濟總錄方)

⑩治癰黃如金。好服吐涎。茵陳蒿。白鮮皮。等分水二鍾煎服。日服二。(三十六黃方)

⑪治遍身黃疸。茵陳蒿一把。同生薑一塊。搗爛於胸前四肢日日擦之。

基本 屬菊科茵陳蒿之葉莖。

產地 陳仁山藥物生產辨云。

茵陳蒿產江西吉安府爲最。名曰

土茵陳。產廣西柳州者氣味亦同。

有一種名綿茵陳。以產湖北省黃

州府漢陽府兩屬毗連數縣所產

爲佳。安徽亦有出。形狀披散。名爲

綿絲。不悅俗眼。春季出新。

形態 茵陳蒿爲生於山野或

河岸沙礫之多年生草。春季叢生

先密生白毛葉。類似胡蘿蔔葉。繼

抽莖二三尺。互生銀鼠色細葉。愈

上而愈細。作絲狀。夏秋之間。於梢

葉間。點綴白色穗狀小花。結實如

芥子。色褐黃。

種類 ①山生者曰山茵陳。②

野生者曰野茵陳。③採集其細莖

葉者曰綿茵陳。

採取 每年五月間及立秋節。

採其莖葉陰乾。

製法 雷斅曰。凡使須用葉有

八角者。陰乾。去根。細剉。勿令犯火。

性質 苦平。微寒。無毒。

十畫 茵

主治 風溼寒熱。邪氣熱結。黃

疸。久服輕身益氣。耐老。面白悅。長

年。白兔食之。仙。〔本經〕治通身發

黃。小便不利。除頭熱。去伏瘕。〔別

錄〕

張仲景之發明 茵陳一味。經

張仲景之實驗。認爲主治溼熱發

黃也。茲考徵如下。①茵陳五苓散

證曰。黃疸。②茵陳蒿湯證曰。心胸

不安。久欠發黃。以上二方。茵陳蒿

一方六兩。一方十分。觀此二方。茵

陳蒿治發黃也明矣。或問曰。發黃

之證。治之之方。其不用茵陳蒿者。

間亦有之。如何。答曰。發黃。小便不

利。或渴。無餘證者。茵陳五苓散主

之。發黃。大便不通者。茵陳蒿湯主

之。若乃一身盡黃。腹脹。小便必黑。

時澀者。消癰散主之。發黃。心中懊

懣。梔子大黃湯發黃。腹滿。小便

不利。大黃消石湯發黃。頭痛惡風。

自汗出。桂枝加黃耆湯發黃。嘔逆。

小半夏湯主之。發黃。胸脇苦滿。小

柴胡湯主之。發黃。腹中拘急。小建

歷代記述攷證 〔唐〕陳藏器

本草拾遺論茵陳曰。通關節。去滯

熱。傷寒用之。〔宋〕大明日華諸家

本草論茵陳曰。石茵陳。治天行時

疾。熱狂。頭痛。頭旋。風眼。疼。瘧。癘。女

人瘵。癰。并閃損。乏經。〔明〕繆希雍

本草經疏論茵陳曰。茵陳蒿味苦

平。微寒。無毒。故主風溼寒熱。邪氣

熱結。黃疸。通身發黃。小便不利。及

頭熱。皆溼熱在陽明太陰所生病

也。苦寒能燥溼除熱。溼熱去。則諸

證自退矣。去伏瘕。及久服輕身益

氣。耐老。面白悅。長年未有修事者

日華子云。石茵陳味苦涼無毒。即

山茵陳也。入足陽明太陰足太陽

三經。除溼散熱結之要藥也。〔明〕

李士材本草圖解論茵陳曰。茵陳

蒿足太陽藥也。治發黃。驅溼熱。利

小便。通關節。按發黃有陰陽二種。

茵陳同梔子黃蘗以治陽黃。同附

子乾薑以治陰黃。總之茵陳爲君

隨佐使之寒熱。而理黃症之陰陽

也。古法以茵陳同生薑搗爛。於胸

入太陽膀胱。發汗利水。俾太陽陽

明溼熱之邪。盡得於藥而解矣。且

治傷寒時疫。狂熱瘧癘。頭痛頭旋

女人疝瘕。亦是溼熱爲病。但黃原

有陰陽寒熱之分。陽黃者由熱蘊

於脾土。如茵值於大旱。則茵必燥

而黃。是茵因燥而黃者也。太溽則

茵必溼而黃。是茵因溼而黃者也。

熱爲陽。寒爲陰。故黃亦以陰陽分

之。是以仲景立有茵陳蒿湯。梔子

藥皮湯。麻黃連翹赤小豆湯。以治

陽黃之症。又立茵陳附子湯。以治

陰黃之症。茵陳治黃通劑。在人審

其所因而酌治耳。若蓄血發黃。則

治不在茵陳之列。以茵陳本屬氣

分藥也。於血則不能治矣。茵陳本

有二種。葉細而青蒿者可用。若生

子如鈴。則爲山茵陳矣。崑於殺蟲

及治口瘡。〔清〕鄒澍本經疏證論

茵陳曰。風溼寒熱。邪氣新感者也。

熱素有着也。新感之邪爲素有之

熱結成黃疸。此證已所謂茵陳矣。

故傷寒金匱二書。幾若無疸不茵

症。多是風溼爲用。如治風癰。則有茵芋丸。治風痺。則有茵芋酒。治產後風。則有茵芋膏。凡風溼痺症。多用茵芋。與石南藥草。同爲一類。若云能療虛羸寒熱。恐莫及耳。出彭城海鹽。莖赤。葉如石榴而短厚者。佳。取根葉陰乾。用。

國外學說

本草綱目啓蒙曰。茵芋係生於深山幽陰處之山木。高一二尺。更高者其本皆倒。揭祇末直立。今種樹家多栽之。高四五寸者。亦能開花結實。葉兩對。形似 *Morus Koku* (日名) 葉厚而帶赤。經冬不凋。正二月枝頭著花。成穗二寸許。花大三分。五瓣。白色。萼稍帶褐色。後結實。實熟作赤色。大如南天燭子。有一種綠萼者。帶亦綠色。又大和本草曰。茵芋有毒。煎注菜蔬殺蟲。又本田重次郎氏從茵芋葉及各部分。發見一種植物鹽基。名茵芋精。加以化學的及藥物學的研究。知本品爲極微弱鹽基。雖能與磷酸共結成結晶性鹽。但一加水。則仍返爲分離鹽基。其化學的集成爲 $C_{22}H_{35}MgO_9$ 。對於筋之作用。甚爲顯著。蛙筋接

觸其毒。即陷於強直狀態。盡失運動能力。即在 14000 之稀薄液。此作用仍顯明現出。若比較筋對於本品之感受性。則赤蛙筋較金線蛙筋爲易。本品又能使反射興奮性亢進。惟此現象。在赤蛙不可得見。此外本品對於心臟之作用。亦頗顯著。試之於蛙。其心臟即漸次衰弱。終至筋呈麻痺狀而靜止。於其他動物。行大量靜脈內注射。輒發痙攣而斃。此時之直接死因。亦爲心臟麻痺。若僅用中等量。則對於心臟之作用小。而且暫祇使血壓沉降而已。今就其微弱鹽基對於筋之作用。亢進反射興奮性作用等以觀。則本品似甚類咖啡精。惟咖啡精之特殊作用。影響筋之動作。及尿之分泌作用。在本品則無。故終不能歸入咖啡精類也。

配合應用

●茵芋酒。治賊風手足枯痺拘攣。用茵芋。附子。天雄。烏頭。秦艽。女萎。防風。防己。石南藥。躑躅花。細辛。桂心。各一兩。十二味。切以絹袋盛。清酒一斗。漬之。冬七夏三。春秋五日。藥成。每服一合。日二服。以微痺爲度。方出胡治居士

百病方 (圖經方)

●茵芋丸。治風氣積滯成脚氣。發則痛者。茵芋葉炒。慧苡仁。各半兩。郁李仁。一兩。牽牛子。三兩。生研末。牛兩上。爲末。煉蜜丸。如梧子大。每服二十丸。五更薑棗湯下。取利。未利再服。取快。(本事方)

●治產後中風。茵芋五兩。木防已半斤。苦酒九升。漬一宿。猪脂四斤。煎三上。三下。膏成。每服熱摩千遍。千金方。

用量 三分至八分。

施用宜忌 凡陰虛而無風溼實邪者禁用。

參攷資料 ●千金外臺諸古

方。治風癰有茵芋丸。治風痺有茵芋酒。治婦人產後中風。有茵芋膏。風溼諸方多用之。茵芋。石南藥草。皆古人治風妙品。而近世罕知。亦醫家疎缺也。(李時珍) ●茵芋生太山川谷。三月三日採葉陰乾。(別錄) ●好者出彭城。今近道亦有莖葉狀似莽草而細軟。連細莖採之。方用甚稀。惟合療風酒。(陶弘景) ●今雍州絳州華州杭州亦有之。春生苗高三四尺。莖赤。葉

似石榴而短厚。又似石南藥。四月開細白花。五月結實。三月四月七月採莖葉日乾。(蘇頌)

【茵草】即莽草之古籍別名。典見和漢藥考。詳「莽草」條。

【茵陳】即茵陳蒿之簡稱。詳「茵陳蒿」條。

【茵陳草】即茵陳蒿之處方用名。詳「茵陳蒿」條。

【茵陳酒】基本 本品係以茵陳釀成之酒。

製法 用茵陳蒿一斤。秫米一石。麴三斤。如常釀之。

主治 風痰。筋骨痙攣。

【茵陳蒿】原名 山茵陳。

類。經冬不死。至春因舊苗枯。則由陳莖而再生。故名。因陳形似蓬蒿。後加蒿字耳。

處方用名 綿茵陳。茵陳草。

古醫別名 因塵(張揖廣雅)。

白蒿(圖經本草) 著蒿。家茵陳。

(大明本草) 石茵陳。(和漢藥考)。

外國名 茵陳蒿 *Herba Artemisiae Copilantis Herb. Artem. Cap. (拉丁)*

●肝風內煽發厥。不省人事者。余每重用茯神木治之。無不神效。蓋此症雖屬肝。而內煽則必上薄於心。心君爲之不寧。故致發厥。茯神本治心。而中抱之木又屬肝。以木制木。木平則風定。風定則心寧。而厥自止也。(沈金鑒)

【茯神木】 命名 本品即茯神心內木。故名。

原名 黃松節。

主治 偏風口面喎斜。毒風筋攣不語。心神驚悸。虛而健忘。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論茯神木曰。治脚氣痺痛諸筋牽縮。

【茯神塊】即茯神切成塊之處方用名。詳「茯神」條。

【茯神糕】即茯神製成之糕。詳「茯神」條。

【茯蘊】即茯苓之本名。詳「茯苓」條。

【茯苓】即茯苓之古籍別名。典見和漢藥考。詳「豬苓」條。

【茱萸粥】 基本 本品即以茱萸和米煮成之粥。

主治 治心腹疼痛。

【茫芒】 原名 茫芒決明。外國名詞 Iathyrus Davidi Hoe (拉丁) イタチサ

サゲ エンドウサウ (日本) 基本 係豆科山黧豆屬。爲茫芒之子實。

產地 山野道旁間。

形態 茫芒爲溼草類之蔓生草。本由卷鬚而上昇。葉爲羽狀複葉。小葉卵形。其數在二對以上。有托葉甚顯著。蝶形花冠。呈黃色。果實細長。與豌豆之莢相似。其子扁而色綠。可供藥用。

性質 甘平。無毒。

主治 調中除痰。止渴。令人不睡。

參攷資料 茫芒莖葉味甘而滑。可作酒麴。嫩時採以爲蔬。及點茶食。均甚香美。(醫學辭典)

【茫芒決明】即茫芒之原名。詳「茫芒」條。

【茱萸】即防風之古籍別名。典見吳普本草。詳「防風」條。

【茴香】即大茴香。其子實莖葉。詳「大茴香」條。

【茴香八角珠】即莽草之別名。詳「莽草」條。

【莽草】條。

【茴香酒】 製法 用茴香浸酒。飲。舶苗尤妙。

主治 卒然腎氣痛。翠丸偏墜。牽連心腹痛。

【茴香粥】 基本 本品係茴香和米煮成之粥。

主治 和胃治疝。

【茴香蟲】 命名 本品係生於茴香枝葉中之蟲。故名。

形態 茴香蟲爲卵生蟲類之一種。狀如尺蠖。青色。可供藥用。

主治 小腸疝氣。

【茴草】即防風之古籍別名。典見和漢藥考。詳「防風」條。

【茴草】(別錄) 茴草。衛與卑山竹。(和漢藥考)

基本 屬繖形科茴草之莖葉。產地 凡深山幽谷之陰地間恒有生長。

形態 茴草爲多年自生草本。莖高一二尺。或三四尺。春生苗葉。葉酷似樺葉。夏月開圓錐花。呈綠白色。秋季結紅色肉果。味辛苦。有芳香。

【茴草】(別錄) 茴草。衛與卑山竹。(和漢藥考)

芳香。

採製 三四月間採莖葉用。製法 凡使莖葉陰乾炙用。

性質 苦溫有毒。

成分 含有茴草精 Anisylamine, shikimin, C₁₀H₁₅N₃O₃ 毒質。

效能 祛風溼。療痺痛。用作治風藥。又治振顫。麻痺。痛風。

作用 入胃後略能刺激脾液。神經。使脾分泌增多。出幽門而至十二指腸及小腸內。次第被吸收而入血。由末梢神經被刺激而傳達於大腦。大腦亦被激而麻醉。同時血液之循環。與細胞之新陳代謝。亦遲滯而緩慢。

主治 五臟邪氣。心腹寒熱。羸瘦如瘵。狀發作有時。諸關節風溼痺痛。(本經) 療久風溼走四肢脚弱。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論茴草曰。治男子女人腰脚。毒風。拘急。攣痛。【宋】大明諸家本草論茴草曰。一切冷風。筋骨怯弱。羸弱。入藥炙用。【清】黃宮繡本草求真論茴草曰。茴草本屬毒物。味辛而苦。氣溫有毒。據書所述治

1061

【茯苓粉粥】

基本 本品以茯苓粉和米煮

成之粥。

主治 清上實下。

【茯苓酒】

製法 用茯苓粉和麴米釀酒飲。

主治 頭風虛眩腰膝痠五勞七傷。

【茯神】

命名 本品由松根之津氣不盛止能附結本根不能發泄於外結為茯苓既不離本遂抱根而生者故曰茯神。

處方用名 辰茯神抱木茯神。

殊茯神雲茯神茯神塊茯神糕。

基本 屬芝栢科為松根地下所結之菌塊。

形態 茯神為木類菌類之一種與茯苓同生於松根但茯苓澁結於根外而茯神則抱根而生無苗莖葉花形大如拳肉白質鬆。

採取 二月八月採之陰乾。

製法 凡使去木先以茯神去皮剉細入羅篩內置水盆中瀉篩去筋膜澄清取水底細末曬乾復以人乳拌蒸三四次或五六次更佳每一兩煮作二兩。

性質 甘平無毒。

效能 安神魄養精治驚悸失眠用作鎮靜藥。

主治 辟不祥療風眩風虛五勞口乾止驚悸多悲恐善忘開心益智安魂魄養精神。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論茯神曰補虛乏主心下急痛堅滿人虛而小腸不利者加而用之【明】經書雅本草經疏論茯神曰茯神抱木心而生以此別於茯苓別錄謂茯神平總之其氣味與性應是茯苓一體茯苓入脾胃之用多茯神入心之用多故主辟不祥療風眩風虛五勞口乾止驚悸多悲恐善忘開心益智安魂魄養精神藥性論又云茯神君味甘無毒主驚癇安神定志補勞乏主心下急痛堅滿人虛而小腸不利加而用之其心名黃松節治偏風口面喎斜毒風筋攣不語心神驚掣虛而健忘其所主與茯苓大同小異耳【清】黃宮繡本草求真論茯神曰茯神功與茯苓無異但神抱心以生苓則不從心抱故苓則能入脾與腎而神則多入心耳。

書曰服此開心益智安魂定魄無非入心導其痰滯故能使心與腎交通之謂耳心木書名黃松節味苦性溫能治諸筋攣偏風喎斜心制健忘是入血滲淫之意取苓有心者是去皮及中木用【清】張隱菴本草原論茯神曰離松根而生者為茯苓抱松根而生者為茯神總以茯苓為勝茯苓皮茯神木後人收用各有主治然皆糟粕之藥並無精華之氣不足為重也。

【清】賈九如辨藥指南論茯神曰茯神生於枯松根下因無枝葉上升津氣向下抱根附結得松之神氣而成不離於本有依守之義故名茯神特取此鎮伏心神能中守而不移以其體沉重重可去怯其性溫補補可去弱戴人曰心本熱虛則寒如心氣虛怯神不守舍驚悸怔忡魂魄恍惚勢怯健忘俱宜溫養心神非此不能也。

辨偽 鄭肯岩曰茯神真者木心或在旁或在中亦不止一心切開有筋膜者是也假者木心在中且止一心而無筋膜【曹炳章曰按茯神即茯苓之抱木中心者

茯苓乃得松之氣自作塊而大不附著根其包根而青虛者茯神也其餘鑑別法詳前茯苓條下。

配合應用 養心安神朱雀丸治心神不定恍惚健忘不樂火不下降水不上升時復振跳常服消陰養火全心氣用茯神二兩去皮沉香半兩為末煉蜜丸小豆大每服三十九食後人參湯下【百一選方】

用量 三錢至四錢。

著名方劑 茯神丸治心虛風虛驚悸心忪健忘等症【華繩方】茯神（去木）人參（去蘆）麥冬（去心）熟地黃芩苡仁栢子仁犀角屑各一兩龍齒雲母粉各兩半防風（去蘆）黃耆各七錢半上藥共研細末令勻煉蜜和丸梧子大每服二十丸不拘時溫粥飲送下。

參攷資料 ①仙方止云茯苓而無茯神治療既同用應無嫌（陶弘景）②神農本草止言茯苓名醫別錄始添茯神而主治皆同後人治心病必用茯神故潔古張氏於風眩心虛非茯神不能除然茯苓未嘗不治心病也（李時珍）

兩上共研末以山藥六兩酒煮糊丸補精鹽湯下赤濁燈心湯下白濁茯苓湯下消渴米飲下

參攷資料 ①茯苓白色者補赤色者利俗用甚多仙方服食亦爲至要云其通神而致靈和魂而鍊魄利竅而益脾厚腸而開心調營而理衛上品仙藥也善能斷穀不飢(陶弘景) ②茯苓赤濁白補上古無此說氣味俱薄性浮而升其用有五利小便也開腠理生津液也除虛熱也止瀉也如小便利或數者多服則損人目汗多人服之亦損元氣天人爲其淡而滲也(張元素) ③小便多能止之小便滿能利之與車前子相似雖利小便而不走氣酒浸與光明朱砂同用能秘重元味甘而平如何是利小便耶(王好古) ④茯苓茯神生大山西谷大松下二月八月採陰乾(別錄) ⑤今出鬱州大者如三四升器外皮黑而細皺內堅白形如鳥獸龜鱉者良虛赤者不佳性無朽蛀埋地中三十年猶色理無異也(陶弘景) ⑥今泰山亦有茯苓實而理小不復採用第一出

十畫 茯

華山形極粗大雍州南山亦有不如華山(蘇恭) ①所在大松處皆有惟華山最多生枯松樹下形塊無定以似龜鳥形者爲佳(韓保昇) ②范子計然言茯苓出嵩山及三輔淮南子言千年之松下有茯苓上有兔絲與術言松脂入地千歲爲茯苓望松樹赤者有之廣志言茯神乃松汁所作勝於茯苓者云即茯苓實着松根者生朱提漢陽縣(掌禹錫) ③今大華嵩山皆有之出大松下附根而生無苗葉花實作塊如拳在土底大者至數斤有赤白二種或云松脂變成或云假松氣而生今東人見山中古松久爲人斬伐其枯折橫枝葉不復上生者謂之茯苓攢即於四面文餘地內以鐵頭錐刺地如有茯苓則錐固不可拔乃掘取之其攢大者茯苓亦大皆自作塊不附着根其包根面輕虛者爲茯神則假氣生者其說勝矣龜策傳云茯苓在兔絲之下狀如飛鳥之形新雨已霽天晴無風以火夜燒兔絲去之即篝火此地罩之火滅即記其處明乃掘取入地四尺或七

尺得矣此類今不開有之(蘇頌) ④下有茯苓則上有靈氣如絲之狀山人亦時見之非兔絲子之兔絲也注淮南子者以兔絲子及女羅爲說誤矣茯苓有大如斗者有堅如石者絕勝其輕虛者不佳蓋年淺未堅故爾劉宋王微茯苓贊云皓蒼下居形絲上蒼中狀雞兔其容龜蔡神降少司保延幼艾終志不移柔紅可佩觀此形絲即兔絲之證矣寇氏未解此義(李時珍) ⑤茯苓乃松之精汁流注於根而生是則天之陽以下返其宅者也下有茯苓其松巔上有茯苓苗名威喜蓋茯苓在土中氣自能上應於苗得松之精則有木性能疏土也凝土之質味淡色白功主滲利能行水也其氣不相連自上應於苗故能化氣上行而益氣(唐容川) ⑥有謂茯苓善滲凡下元不足者忌之非也夫茯苓爲古松精華蘊結而成入地最久得氣最厚其實重其氣清其味淡重能培土清能益金淡能利水惟其得土氣之厚故能調三部之虛虛熱虛火脾虛痰濕凡涉虛者皆宜之

以其中和粹美非他迅利剋伐者比也又能爲諸陰藥之佐而去其滯爲諸陽藥之使而宣其道補不滯瀉泄不峻利精純之品無以過之乃治虛勞者久已與澤瀉同棄殊爲良藥惜矣(理虛元鑑) ⑦茯苓一味爲治痰主藥痰之本水也茯苓可以行水痰之動瀝也茯苓又可行瀝(世補齋) ⑧松之餘氣爲茯苓楓之餘氣爲猪苓竹之餘氣爲雷丸亦名竹苓猪苓在本經爲中品雷丸在下品茯苓在上品方藥用之獨多以其得松之精英久服可以安魂養神不飢延年也又有一種橘苓生於橘樹其形如單可治乳癰見趙恕本草綱目拾遺(冷廬醫話)

【茯苓皮】 外國名詞 Smilax sinensis (拉)

(Chen) (英)

主治 水腫膚脹利水道開腠理

參攷資料 茯苓皮行水而不耗氣功勝大腹皮其用法去心搗末濾過用浮濁者爲赤筋能傷目(醫原辭典)

斤重量之茯苓。然其生結不在原種根上。隨氣息止而結苓。往往有種於西杖根而結苓在東杖根。間

有種而不結者且松根下結苓而
葉必萎黃或發紅色此即松之精
氣收聚凝結爲苓者也故土人望而
卽知其謂有苓種苓外皮懸浮而
厚內肉鬆而不堅結色白無神卽
種苓也爲次凡茯苓有筋者去之
雷斅云茯苓有赤筋者誤服令人
目中有星多服致目盲服茯苓者
注意之

配合應用 ①白茯苓得煉蜜。

胡麻仁餌之。可以辟穀延年。不饑。則去桂。

●得人參白朮橘皮山藥藟豆
芍藥甘草爲補脾胃之上藥。

④得二朮澤瀉車前白芍藥橘皮木瓜豬苓爲消水腫之要劑。

五入六味地黃丸能伐腎邪。

●入補心丹則補心安魂養神

⑦治血虛心汗別處無汗獨心

孔有汗思慮多則汗亦多宜養心
血以芡湯調茯苓末服一錢（證

●治心虛夢洩。或白濁。白茯苓末二錢。米湯調下。日二服。東坡方也。(直指方)

⑨治妊娠水腫。小便不利。惡寒。赤茯苓去皮。葵子各半兩。爲末。每

服二錢新汲水下（禹講師方）
⑥治卒然耳聾。黃蠟不拘多少。

和茯苓末細嚼茶湯下（普濟方）

有筋連無節肉蟲出如燈心長數寸。遍身綠毛卷。名曰血餘。以茯苓

胡黃連煎湯飲之愈（夏子益奇疾方）

③治水腫尿澀茯苓皮椒目等分煎湯日飲取效（普濟方）

③治胸脇氣逆脹滿茯苓一兩
人參半兩每服三錢水煎服日三

（聖濟總錄方）
④治小便頻多。白茯苓去皮。乾

下五十丸。(德生堂經驗方)

治下部諸疾。龍液膏用堅實白茯苓。去皮焙研。取清溪流水浸。

去筋膜復焙入瓷罐內以好蜜和勻入銅釜內重湯桑柴煮一日。

取出收之。每空心白湯下二三匙。解煩鬱躁渴。一切下部疾皆可除。

⑦ 治殮泄滑痢不止。白茯苓一

兩木香煨半兩爲末。紫蘇木瓜湯下二錢卽止。(百一選方)

⑤治面黥雀斑白茯苓末蜜和
夜夜傅之。二七日愈。（姚僧垣集）

驗方）
⑤治豬雞骨哽。五月五日。取楮

子曬乾白茯苓等分爲末每服二錢乳香湯下一方不用楮子以所

㊟治漏痔神方。赤白茯苓。去皮。

沒藥各二兩。破故紙四兩。石臼搗成一塊。春秋酒浸三日。夏二日。冬

五日取出木籠蒸熟曬乾爲末酒糊丸。梧桐子大。每酒服二十九丸。漸

加至五十丸（革柄集驗方）
用量 三錢至四錢。

一〇五八

者禁用。惡白斂。畏牡蒙、地榆、雄黃、秦艽、鼈甲、忌米醋。及酸物。馬問爲之使。得甘草、防風、芍藥、紫石英、麥門冬共療五臟。

著名方劑 ①朱雀丸治心神不定恍惚健忘心火不降腎水不

升時復振跳等症（百一選方）茯苓二兩（去皮）沉香半兩上共研

末煉蜜丸小豆大每服三十丸食後人參湯下。㊂威喜丸治丈夫元

陽虛。慙精氣不固。小便下澀淋瀝。
常漏夢寐多驚。頻頻遺泄。婦女白

淫白帶並主之（局方）白茯苓四兩（去皮作𧄢）豬苓四錢半（入

內養二十餘沸取出日乾去豬苓
爲末上藥以黃蠟搜和丸彈子

大每嚼一丸空。心津下。以小便清爲度。忌米醋。㊂茯苓丸。治心腎俱

虛神志不守小便淋瀝或夢遺白濁（三因方）白茯苓赤茯苓各等

分上藥爲末。新汲水飛去沫。挖乾
以地黃汁同搗。酒熬作膏。和丸。彈

于大空心鹽湯嚼下一丸。④茯苓丸。治夢遺滑精。赤白便濁。以及強

中消渴（局方）茯苓石蓮子各二兩。菟絲子十兩（酒浸）五味子八

渴。利小便。除溼益燥。和中益氣。利腰膝。開血。【元】李東垣用藥法象論。茯苓曰。逐水。煖脾。生津。導氣。平火。止泄。除虛熱。開腠理。【元】王好古湯液本草論茯苓曰。瀉膀胱。益脾胃。治腎積奔豚。【明】繆希雍本草經疏論茯苓曰。茯苓生於古松之下。味甘平。性則無毒。入手足少陰。手太陽足太陰陽明經。胸脇逆氣。邪在手少陰也。憂恚驚邪。皆心氣不足也。恐悸者。腎志不足也。心下結痛。寒熱煩滿。欬逆。口焦舌乾。亦手少陰受邪也。甘能補中。淡而利竅。補中則心脾實。利竅則邪熱解。心脾實則憂恚驚邪自止。邪熱解則心下結痛寒熱煩滿欬逆。口焦舌乾自除。中焦受溼熱。則口發渴。溼在脾。脾氣弱。則好睡。大腹者。脾土虛不能利水。故腹脹大也。淋瀝者。脾受溼邪。則水道不利也。腦中痰水水腫。皆緣脾虛所致。中焦者。脾土之所治也。中焦不治。故見斯病。利水實脾。則其證自退矣。開胸膈。調臟氣。伐腎邪者。何莫非利水除溼解熱散結之功也。長陰益氣。力保神守。中久服安魂養神。不

饑延年者。補心脾。伐腎邪。除溼利竅之極功也。白者入氣分。赤者入血分。補心益脾。白優於赤。通利小腸。專除溼熱。赤亦勝白。【清】黃宮繡本草求真論茯苓曰。茯苓色白入肺。味甘入脾。味淡溼。故書皆載上滲脾肺之溼。下伐肝腎之邪。其氣先升後降。凡人病因水溼而見氣逆煩滿。心下結痛。呃逆嘔吐。口苦舌乾。水腫淋結。憂恚驚恐。及小便或澀或多者。服此皆能有效。故入四君。則佐參朮以滲脾家之溼。入六味。則使澤瀉以行腎邪之餘。最為利水除溼要藥。書曰。健脾胃水去。而脾自健之謂也。又曰。定魄。即水去。而魄自安之意也。且水既去。則小便自開。安有癃閉之慮乎。水去。則內溼已消。安有小便多見之謂乎。故水去。則胸膈自寬。而結痛煩滿不作。水去。則津液自生。而口苦舌乾悉去。惟水衰精滑。小便不禁。非由水溼致者。切忌恐其走表洩氣。故耳。苓有赤白之分。赤入小腸。白入膀胱。白微有補赤則止瀉溼熱。一氣一血。自不容混。如此。至皮專治水腫膚脹。以皮行皮

之義。以大塊堅白者良。【清】賈九如藥學指南論茯苓曰。茯苓。苓字。世俗訛傳。史記及仙經。皆名茯苓。假松之真液而生。受松之靈氣。而結。寒地陰最厚。味獨甘淡。甘則能補。淡則能滲。甘淡屬土。用補脾陰。土旺生金。兼益肺氣。主治脾胃不和。泄瀉腹脹。胸脇逆氣。憂思煩滿。胎氣少安。魂魄驚跳。腸間痰氣。蓋甘補則脾臟受益。中氣既和。則津液自生。口焦舌乾。煩渴亦解。又治下部溼熱。淋瀝水腫。便溺黃赤。腰膝不利。停蓄邪水。蓋淡滲則膀胱得養。腎氣既旺。則腰膝間血自利。津道流行。益肺於上。源補脾於中部。令脾肺之氣。從上順下。通調水道。以輸膀胱。故小便多而能止。澀而能利。惟痘瘡起脹時。禁用。恐滲泄不能貫漿。其赤茯苓。淡赤微黃。但不堪入肺。若助脾行痰。與白者功同。因松種不一。故分赤白。原無白補赤瀉之分。

辨偽 ●鄭肯岩曰。茯苓當取整個切片。照之微有筋脈者。真。切之其片自捲。以結白爲上。近來有一種鏡片。多以米粉和苓末假造

混充。間又有以米粉包裹松根造。成整個者。亦宜細辨。●曹炳章曰。按寇宗奭曰。茯苓生於多年大松之根。乃松之精氣盛而抑鬱發泄於外。結爲茯苓。故不抱根。離其本體有零之義也。精氣不盛。止能附結本根。既不離本。故曰茯神。淮南子云。千年之松下有茯苓。上有菟絲。寇宗奭曰。上有菟絲之說。甚爲可信。李時珍曰。下有茯苓。上有靈氣如絲之狀。土人亦時見之。非菟絲也。典術云。松脂入地。千年爲茯苓。望松樹赤者。下有茯苓。此皆言天然野生之茯苓。其生長在十年或數百年不等。得松之精氣足。其皮黑細。其肉堅緻結白。不論何地產。皆爲佳品。惟雲南產。天然生者爲多。亦皮薄。紋細。肉帶玉色。體糯質重。爲最佳。惜乎出產不多。其他產臨安。六安於潛者。種苓爲多。其法用本地天產鮮茯苓。搗碎如泥。種於肥土山。葉茂松根上。先將松根傍離根二尺餘。掘去泥土。至見松根。將茯苓層每株約一兩。以竹簍裹附松之支根上。閱半年。施肥料一次。至三年起掘。則成二三

十畫 菱 茯

性質 甘。大寒。無毒。

主治 腸胃痼熱。消瀉。止小便。利。攝汁飲之。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器

本草拾遺論菱白根。白根。燒灰和雞子白。塗火燒瘡。

參攷資料 菱白根亦如蘆根。冷利更甚。(蘇頌)

【菱 杷】 原名 菱手。 命名 本品爲菱菜三年者。中心生白蘆如藕狀。似兒臂。故有菱手之稱。卽俗謂之菱杷也。

古籍別名 菱首。(蜀本草) 烏菱。(拾遺) 蘆疏。(綱目)

性質 甘。冷。滑。無毒。

主治 心胸中浮熱。風氣。滋齒。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器

本草拾遺論菱杷。白。煮食。止瀉。及小兒水痢。

參攷資料 菱杷性滑。發冷氣。令人下焦寒。傷陽道。禁蜜食。發痢疾。服巴豆人不可食。(孟詵)

【菱 草】 卽菱白之古籍別名。典見說文。詳「菱白」條。

【菱 蚤】 卽壁蝨。詳「壁蝨」條。

【菱 荷】 卽菱白之古籍別名。典見

日用本草。詳「菱白」條。

【菱 蝨】 卽壁蝨。詳「壁蝨」條。

【菱 雞】 卽鳩鴿之古籍別名。典見綱目。詳「鳩」條。

【茯 兔】 卽伏兔。詳「伏兔」條。

原名 伏兔。

【茯 苓】 命名 本品乃松之神靈。伏結而成。故名。俗作茯苓。乃傳寫之訛耳。

處方用名 白茯苓。白雲苓。白苓。浙茯苓。白苓塊。浙苓。雲茯苓。苓乳糕。雲苓。白苓糕。雲苓塊。白糕。製茯苓。

古籍別名 伏兔。(本經) 松腹。不死麋。(記事珠) 更生。雪腰。金龜。兔絲形絲。不死麋。萬萼精。絳晨伏胎。(和漢藥考)

外國名詞 Pachyna Coosa. (拉丁) Lycoparion. (英)

基本 係生於截斷松樹根部下之一種茸類菌藥物。

產地 陳仁山藥物生產辨云。茯苓以雲南產者爲雲苓。最正地道。實結不能切片。產安徽者名安苓。選起最好者爲掛苓。又名天生苓。其次大揀苓。中揀苓。小揀苓。

之分。切片者俱用安徽苓。原携來者名平片。餘碎作切片。原個到廣東。切片名齊厚片。頂厚片。上厚片。中厚片。頂卷。齊頂卷。上卷。中卷。上散片。白茯苓邊之分。赤茯苓。單產日本。以橫濱爲最。神戶次之。

形態 茯苓爲大小不同之塊。大如兒頭。表皮極厚。擁腫如疣。乾則現黑褐色。而生細皺。內部爲肉質粒狀。色白或淡紅。白者質堅實。名白茯苓。上品也。淡紅者質輕虛。名赤茯苓。品下矣。

採取 採收茯苓。自七月下旬至來年三月底止。山民用茯苓突。刺入截斷松樹近旁之土中。以探索茯苓。若覺有如半塊之物。或出茯苓突嗅之。覺帶有茯苓之臭氣者。依之發掘。每得茯苓。百不失一。茯苓突者。乃比鐵火等稍粗之鐵棒也。一端裝柄。作丁字式。茯苓掘出之後。先浸水中一宿。以小刀削去外皮。切成小片。陰乾。約六七日。包裹收貯。

製法 雷斅曰。凡使茯苓。用皮去心。搗細。於水盆中攪濁。浮者瀝去之。此是茯苓赤筋。若離服。卽令

一〇五六

人瞋子並黑睛點小。兼目盲。陶弘景曰。作丸散者。先煮一二沸。乃切。曝乾。用。後人有用乳蒸者。

性質 甘。平。無毒。

成分 未經細加試驗。但其主要成分。則爲匹克聖。

效能 益心脾。行水滯。用爲利水藥。以治水腫與淋病。又爲強壯藥。用於衰弱者。

作用 與胃極無變化。由腸壁吸入血中。能增高血壓。使腎臟之分泌機能亢進。

主治 胸脇逆氣。憂恚驚邪。恐悸。心下結痛。寒熱煩滿。欬逆。口焦舌乾。利小便。久服安魂養神。不饑延年。(本經) 止消渴。好睡。大腹淋瀝。腸中痰水。水腫淋瀝。開胸肺調。臟氣。伐腎邪。長陰。益氣力。保神氣。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論茯苓曰。開胃。止嘔逆。養安心神。主肺痿痰壅。心腹脹滿。小兒驚癇。及女人熱淋。(宋)大明日華諸家本草論茯苓曰。補五勞七傷。開心益志。止健忘。煖腰膝。安胎。

【金】張元素珍珠囊論茯苓曰。止

血少者。則愈趨愈虛。而病愈深矣。
 (朱震亨) ⑤ 茜根赤色。而氣溫味微酸而帶鹹。色赤入營。氣溫行滯味酸入肝而鹹走血。手足厥陰血分之藥也。專於行活血活血。俗方治女子經水不通。以一兩煎酒服之。一日即通。甚效。名醫別錄言其久服益精氣。輕身日華子言其潰精殊不相合。恐未可憑。(李時珍) ⑥ 按陸佃云。許氏說文。言蒐乃人血所化。則草蒐爲蒐。以此也。陶隱居本草言。東方有而少。不如西方多。則西草爲蒐。又以此也。陸璣云。齊人謂之茜。徐人謂之牛蔓。又草之盛者爲蒐。牽引爲茹。連覆爲葢。則舊茹葢之名。又取此義也。人血所化之說。恐亦俗傳耳。土宿眞君本草云。四補草。其根茜草也。一名西天玉草。一名四岳近陽草。一名鐵塔草。風車兒草。(李時珍) ⑦ 茜根生喬山山谷。二月三月採根。曝乾。又曰。茜根生山陰谷中。蔓延草木上。莖有刺。實如椒。(別錄) ⑧ 染緋草。葉似桑葉。頭尖下闊。莖葉俱滴。四五葉對生。節間蔓延草木上。根紫赤色。所在皆有。八月採。(韓保昇) ⑨ 今國人亦作哇種。故史記云。干畝居西。其人與千戶侯等。言其利厚也。(蘇頌) ⑩ 茜草十二月生苗。蔓延數尺。方莖中空。有筋外有細刺。數寸一節。每節五葉。葉如鳥葉。葉而糙澀。面青背綠。七八月開花。結實如小椒。大中有細子。(李時珍)

【茜草莖】性質功用。詳「茜草根」條。
 【茜草藤】即茜草。詳「茜草根」條。
 【茹菹】即天名精之古籍別名。典見爾雅。詳「天名精」條。
 【華麻仁】即大麻仁之古籍別名。典見本經。詳「大麻仁」條。
 【葦子】即覆盆子之古籍別名。典見爾雅。詳「覆盆子」條。
 【茨】即刺蒺藜之古籍別名。典見爾雅。詳「刺蒺藜」條。
 【茨梧桐】即鳥不宿之別名。詳「鳥不宿」條。
 【茨菇】即慈菇。詳「慈菇」條。
 【茨菰】即慈菰。詳「慈菰」條。
 【茨藩】即知母之古籍別名。典見和漢藥考。詳「知母」條。

十畫 茜 荳 荳 荳 荳

【荳白】原名 荳。
 命名 本名根交結而色白。故名。
 古籍別名 荳草。(說文) 荳草。(綱目) 芽名荳筍。(綱目) 荳筍。(日用) 荳菜。(綱目) 其苗有莖梗者名荳蔕草。(綱目拾遺)
 外國名詞 *Nigella aquatica*。
 基本 係禾本科荳屬。爲荳之筍。其葉根米均詳見各條。
 產地 生江湖池澤中。
 形態 荳爲水草類之多年生草本。高五六尺。春月生新芽如筍狀。即荳筍。亦即俗名荳白。生熟可喫。爲蔬類植物之一種。其葉細長而尖。有平行脈。夏秋之間。梢上開花。花單性。列爲圓錐花序。結實如米。可煮粥飯。其筍可供食與藥用。



荳白

性質 甘。冷。滑。無毒。
 主治 利五臟邪氣。酒微面赤。

白痢。癰瘍。目赤。熱毒。風氣。卒心痛。可鹽醋煮食之。
 歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論荳筍曰。去煩熱。止渴。除目黃。利大小便。止熱痢。雜鯽魚爲羹食。開胃口。解酒毒。壓丹石毒發。
 參攷資料 ① 荳筍寒滑。不可多食。(孟詵) ② 荳之種類皆極冷。不可過食。甚不益人。惟服金石人相宜耳。(蘇頌)

【荳米】原名 荳米。
 命名 本品乃荳草之子實。故名。
 古籍別名 影蓬。(爾雅) 影蓬。彫胡米。安胡。(綱目)
 形態 荳米爲六穀之一種。色白而滑膩。作飯香脆。可供藥用。採取 霜後採之。
 性質 甘。冷。無毒。
 主治 止渴。
 歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論荳米曰。解煩熱。調腸胃。

【荳白根】古籍別名 荳根。荳筍。(綱目)

有人用於小兒佝僂病。試服此根四年。終奏殊效。誠經驗之良方也。方用茜根二錢。乾橙皮一分六釐。茴香搗碎二分半。右到細。同入磁罐。以水六磅。煎至二磅。冷定。取上清。收貯玻璃瓶中。作一日之服量。名茜根煎。凡小兒諸骨。柔軀痿弱。難於舉動。或諸骨已彎屈者。祇須無他惡症。服此決能恢復。但此煎劑中。宜酌加蜂蜜。令其適口。即乳母亦可服之。若別有大便秘結。或下利腹脹之患者。則各加對症之藥。此劑苟非連服數月。必不見效。茜根於經閉為最有效之藥。而且性最平穩。不如他種通經藥有攻擊驅泄之害。

近人學說 張山雷曰。茜根性寒。所主多血熱。失血之症。古今說解。都無異義。而本經主治。獨以寒溼二字為冠。最為不倫。雖各本無不盡同。然病情藥性。大相矛盾。此必古人傳寫之訛。不可望文生義。曲為附和。風痺指血瘀血熱。痺者不行而言。茜草寒涼。又色赤入血。而能通瘀活絡。是以主之。古人論痺。本有熱痺一候。此必不可與上

文寒溼。連屬讀之。而謬謂可治寒痺。溼痺也。黃疸本屬熱症。此則并能清熱。逐瘀。戀仲醇謂指蓄血發黃。而不專於溼熱。其說甚是。補中以清熱言。熱淫於裏。則中氣傷。惟去其熱。清其血。則中得其補。經文最簡。皆當觀其會通。並非泛泛言之。別錄止血。以血熱湧泄言之。一以清血中之熱。一以通壅積之瘀。斯血循古道而不橫逆。崩中亦以龍雷太亢之時而言。如其所失太多。陽氣已毀。即非所宜。踉蹌必有血瘀。瘀則蘊而生熱。故宜清熱行瘀。蟲毒皆南方熱淫之毒。清血熱者。必能解毒。陳藏器謂蘊荷與茜主蠱為最。惟膀胱不足一證。殊屬費解。姑且存而不論。以俟知者。又曰。瀕湖謂茜根赤色。而氣溫味微酸。而帶鹹。色赤入營。氣溫行滯。味酸入肝。而鹹走血。專於行血活血。俗方治女子經水不通。以一兩煎酒服之。甚效。

配合應用

①治吐血衄血。諸血熱妄行。溢出上竅。茜草。地黃。麥門冬。當歸身。阿膠。茅根。童便。

②治腸風下血。茜草。牛膝。地黃。

黃耆。地榆。芍藥。蒲芥穗。

③佐地榆。治橫痃魚口。有神。

④同廬蟲。乳香。沒藥。桂心。牛膝。地黃。主跌跌。

⑤治吐血不止。茜根一兩。搗末。每服二錢。水煎冷服。亦可水和二錢服。(周應簡要濟衆方)

⑥治吐血。躁渴及解毒。用茜根。雄黑豆。去皮。甘草炙。等分。為末。井水糊丸。彈子大。每服溫水化一丸。(聖濟總錄方)

⑦治鼻血不止。茜根。艾葉各一兩。烏梅肉二錢。牛為末。煉蜜丸。梧子大。每烏梅湯下五十九丸。(本事方)

⑧治五旬行經。婦人五十後。經水不止者。作敗血論。用茜根一名。過山薑一兩。阿膠。側柏葉。炙黃。各五錢。生地黃一兩。小兒胎髮一枚。燒灰。分作六帖。每帖水一盞。牛煎七分。入髮灰服之。(經驗方)

⑨治心痺。心煩內熱。茜根。蜜汁。傷寒類要方。

⑩解中蠱毒。吐下血如豬肝。茜草根。黃芩。各三分。水四升。煮二升。服即愈。(陳延之小品方)

⑪黑髭烏髮。茜草一斤。生地黃三斤。取汁。以水五大盞。煎茜絞汁。得滓再煎。三度。以汁同地黃汁。微火煎如膏。以瓶盛之。每日空心溫酒服半匙。一月髭髮如漆也。忌蘿蔔五辛。(聖濟總錄方)

⑫治蟻蝨漏瘡。茜根。燒灰。千年石灰。等分。為末。油調傅之。(儒門事親方)

⑬治脫肛不收。茜根。石榴皮各一握。酒一盞。煎七分。溫服。(聖惠方)

⑭預解瘡疹。時行瘡疹。正發。服此。則可無患。茜根煎汁。入少酒飲之。(奇效良方)

⑮用量 錢半至二錢。配合宜忌 畏貝母汁。忌鐵。鉛。制雄黃。

⑯參攷資料 ①茜草主蠱毒。黃汁服。周禮庶民。掌除蠱毒。以嘉草攻之。嘉草者。蘊荷與茜也。主蠱為最。(陳藏器) ②俗人治瘡。風用草藥。取速效。如石絲為君。過山龍等佐之。皆熱性而燥。不能發陰。却能燥淫病之淺者。溼痰得燥。而開。瘡血得熱而行。故亦暫效。若病深而

性本草論茜草根曰治六極傷心
肺吐血瀉血【宋】大明諸家本草
論茜草根曰止鼻洪尿血產後血
暈月經不止帶下撲損瘀血泄精
痔瘡瘡癰排膿酒煎服【明】李時
珍本草綱目論茜草根曰通經脈
治骨節風痛活血行血【明】繆希
雍本草經疏論茜草根曰茜根味
苦寒甄權云甘潔古微酸鹹溫無
毒蓋惡之矣行血涼血之要藥非
苦不足以洩熱非甘不足以和血
非鹹不足以入血韋堅非溫少陽
之氣不足以通行故主痺及疽瘡
有五此其爲治蓋指蓄血發黃而
不專於溼熱者也痺者血病行血
驟望則痺自愈甘能益血而補中
病去血和補中可知矣苦寒能下
洩熱氣故止內崩及下血除熱故
益膀胱蹇跌則血瘀血行則蹇跌
自安涼無病之血行已傷之血故
治蟲毒藥性論味甘主六極傷心
肺吐血瀉血日華子味酸止鼻洪
帶下產後血暈乳結月經不止腸
風痔瘡排膿治瘡癰泄精尿血撲
損瘀血皆取其涼血行血苦寒泄
熱之功耳【清】黃宮繡本草求真

論茜草根曰茜草味酸鹹寒色赤
功用略有似於紫草但紫草則止
入肝涼血使血自爲通活此則能
入肝與心胞使血必爲走泄也故
凡經閉風痺黃疸因於瘀血內阻
者服之固能使瘀下行如值吐崩
尿血因於血滯而見艱澀不快者
服之更能逐瘀血止總皆除瘀去
血之品與紫草血熱則涼之意貌
同而實異不可混也但血虛發熱
者忌用根可染絳忌鐵【清】陳修
園本草經疏論茜草根曰氣味苦
寒者得少陰之氣化也風寒溼三
氣合而爲痺而此能入手足少陰
俾上下交通而旋轉則痺自愈矣
上下交通則中土自和斯有補中
之效矣中土和則溼熱之氣自化
而黃疸自愈矣又素問以蘆茹二
兩烏鰂骨四兩丸以雀卵飲以鮑
魚汁治氣竭肝傷脫血血枯經閉
丈夫陰痿精傷名曰四烏鰂骨一
蘆茹丸蘆茹卽茜草也亦取其入
少陰以生血補中宮以統血汁可
染絳以血而能行血歟後人以此
三味入烏骨白絲毛雞腹內以陳
酒重便煮爛烘乾爲丸以百勞水

下五七十丸治婦人倒經血溢於
上男子咳嗽吐血左手關脈弦背
上畏寒有瘀血者【清】楊時泰本
草述約元論茜草根曰茜根味甘
而微酸鹹色赤氣溫專於行血活
血本經治寒溼風痺固以其溫而
行之矣乃亦以治黃疸者蓋血挾
熱則毒內瘀而發黃以寒涼行之
不若以溫從治之此義可通於血
證凡滯血發熱者其脈澀外證必
衆嗽水及嘔惡痰涎或兩腳厥冷
或小腹結急或唾血或鼻衄心煩
燥渴皆其明驗又熱毒瘀血在小
便爲淋痛在大便爲腸風釋此則
茜根之療唾血衄血及尿血瀉血
非從治而導療之故歟夫血以寒
泣亦以熱凝熱能使陰不守致血
狂越而四溢亦能療之使不循經
而四溢然則療血證者不可不知行
之活之而徒守降火一法乎甄氏

又言治六極傷心肺吐血瀉血夫
六極皆虛勞證何以茜根亦治之
觀金匱以大黃虻蟲丸主乾血則
知茜根之治六極所傷而爲吐血
瀉血者矣夫血蓄於內瘀則易治
乾則難治茜根非能治乾血也特

有內傷者即能瘀血不獨吐衄者
有之且如女子血證豈惟閉者爲
瘀卽月經不止或亦調養失節內
傷元氣致血壅隧道不能歸經而
錯出是皆得以茜根行之者不可
不知也

國外學說 和漢藥考曰西洋

茜草亦多年生草本從前南歐及
東歐栽種甚多莖高一二尺葉爲
廣披針形邊緣有細刺六葉輪生
花開於梢頭與葉腋爲黃綠色之
小花攢簇如穗果實爲漿果然甚
小荷蘭藥鏡曰茜草以根入藥又
爲紅色染料性溫味帶苦有收瀉
解凝利尿之效故能淨刷肝脾腎
及子宮而用於脾病黃疸水腫諸
種腫病爲一種疏解開達之良藥
治肝脾腫塞諸症以茜根水煎或
爲泡劑服之極驗跌打損傷及內
部創傷用之則散瘀血止疼痛俱
有速效水煎或葡萄酒麥酒浸服
或燒酒浸製爲丁幾劑用一說服
此根後則小便及婦人之乳汁俱
變紅色終則骨亦變紅以此用於
諸骨病有奇效（或云久服此藥
則諸骨變軟故於骨病有害）然

其實過之。若離本枝。一日而色變。二日而香變。三日而味變。四日而色香味盡去矣。又蔡義荔枝譜云。廣蜀所出。早熟而肉薄。味甘酸。不及閩中下等者。閩中惟四郡有之。福州最多。興化最奇。泉漳次之。福州延巨原野。一家甚至萬株。興化上品大徑寸餘。香氣清遠。色紫殼薄。蠟厚。膜紅。核如丁香。母剝之。如水精食之。如絳雪。荔枝以甘爲味。雖百千樹。莫有同者。過甘與淡。皆失於中。若夫厚皮尖斜。肌理黃色。附核而赤。食之有渣。食已而澀。雖無酢味。亦自下等矣。最忌麝香。獨之花實盡落也。又洪邁夷堅志云。莆田荔枝名品。皆出天成。雖以其核種之。亦失本體。形狀百出。不可以理求也。沈括筆談。謂蕉核。荔子乃土人去其大核。燻焦種成者。大不然也。(李時珍) 荔枝藥品中今未見用。惟崔元亮方中收之。果實中爲上品。多食亦令人發虛熱。此物喜變質。尤可愛。宋朝有蔡君謨荔枝譜。其說甚詳。唐杜牧詩云。一騎紅塵妃子笑。無人知是荔枝來。此是川蜀荔枝。亦可生置之。

十 薑 荔

長安也。(寇宗奭) 所謂止渴者。亦陽虛而不能化陰。則津液不生。故能止之。猶止泄瀉。以白朮健胃生津也。若陽盛而渴者用之。則爲倒施矣。(劉潛江)

【荔枝肉】即荔枝之處方用名。詳『荔枝』條。

【荔枝花及皮根】主治 喉水麥汁。細細含嚥之。

【荔枝核】基本 屬無患科。爲荔枝之核。

形態 荔枝之核橢圓而紫褐色。味甘。

性質 甘溫。溫。無毒。

效能 散寒。滯結氣。消疔。癰腫。痛。專作疔痛藥。

主治 心痛。小腸氣痛。以一枚煨存性。研末。新酒調服。

歷代記載攷證 【明】李時珍本草綱目論荔枝核曰。治頑疔氣痛。婦人血氣刺痛。【明】經希雅本草經疏論荔枝核曰。核味甘溫。主心痛。小腸氣痛。癰疔。婦人血氣刺痛。以一枚煨存性。研末。酒調服。蓋其氣溫而通行。入肝腎。散滯氣。辟

寒邪。所以能療如上諸證也。【清】黃宮繡本草求真論荔枝核曰。荔枝核味甘氣溫。專入肝腎。散滯辟寒。雙核形似舉丸。尤治癰疔。卵腫。以其形類相似。有感而通之義也。

配合應用 治脾痛不止。荔枝核煨爲末。醋服二錢。數服即愈。

(衛生易簡方)

治婦人血氣刺痛。用荔枝核。燒存性。半兩。香附子炒一兩。爲末。每服二錢。鹽湯米飲任下。名鐵痛散。(婦人良方)

治疔氣癰腫。荔枝核。炒黑色。大茴香炒。等分。爲末。每服一錢。溫酒下。(孫氏方) 玉環來笑丹。用荔枝核四十九箇。陳皮連白九錢。硫黃四錢。爲末。鹽水打麵糊丸。綠豆大。過痛時。空心酒服九丸。良久再服。不過三服。其效如神。亦治諸氣痛。(皆效方)

治陰腎腫痛。荔枝核。燒研。酒服二錢。

治腎腫如斗。荔枝核。青橘皮。茴香等分。各炒研。酒服二錢。日三。

用量 錢半至三錢。

參攷資料 荔枝核入厥陰。行

散滯氣。其實雙結而核肖舉丸。故其治癰疔。卵腫。有效類象形之義。(李時珍)

古醫別名 鐵皮葱。雪裏青。(綱目拾遺) 過冬青。天名精。(經驗廣集) 鳳眼草。賴師草。隔冬青。(草藥方)

形態 荔枝草爲雜草類之一。種冬。莖發苗。經霜不枯。三月抽莖。高近尺許。開花細紫。成穗。五月。遂枯。莖方中空。葉尖長。面有麻點。邊有鋸齒。葉色深青。映日有光。背淡白色。有絲筋紋。綻露。葉面麻藥。凹凸分明。皆獨瓣。一叢數十葉。可供藥用。

性質 涼。無毒。

主治 涼血。消癰腫。楊梅瘡。痔瘡。煎藥。喉喉十八症。

配合應用 治急驚。荔枝草汁。牛鍾水。飛過。碌砂半分。和勻服之。立愈。

治小兒疳積。荔枝草汁。入茶盃內。用不見水雞。櫻肝一個。將銀針鑽數孔。浸在汁內。汁浮於肝。放飯鍋上。蒸熟。食之。即愈。(集驗方)

治喉痛。或生乳蛾。用荔枝草

十壹 荔

曰。荔枝子。南方果也。本經雖云平。而其氣實溫也。鮮時味極甘美。多津液。故能止渴。甘溫益血。助榮氣。故能益人顏色也。多食令人發熱。或衄血。齒痛者。以其生於炎方。熱於夏月。故性善助火發熱耳。【清】黃宮繡本草求真論荔枝曰。荔枝味甘而酸。氣溫故能入脾助氣。入肝益血。養營然於血虛火衰則宜。若使病非虛弱。及素火盛服之。反致助火發熱。而有衄血齒痛之病矣。痘瘡不起。用殼煎湯以服。盡取殼性溫補內托之意。然要皆屬性燥。用當酌症所宜。非若龍眼性主溫和而實益甚多也。出建產者良。【清】王士雄隨息居飲食譜論荔枝曰。荔枝甘溫而香。通神益智。填精充液。辟臭止疼。滋心營。養肝血。果中美品。鮮者尤佳。以核小肉厚而純甜者勝。多食發熱。動血損齒。凡上焦有火者忌之。食之而醉者。卽以其殼煎湯。或蜜湯解之。

● 配合應病 ● 治瘡瘡不發。荔枝肉浸酒飲。并食之。忌生冷。（聞人規痘疹論方）

● 治疔瘡癰腫。用荔枝五箇。或

三箇。不用雙數。以狗糞中米。淘淨爲末。與糯米粥。同研成膏。攤紙上貼之。留一孔出毒氣。（普濟方）用荔枝肉白梅各三箇。搗作餅子。貼於瘡上。根卽出也。（濟生祕覽方）

● 治風牙疼痛。荔枝連殼燒存性。研末擦牙卽止。乃治諸藥不效仙方也。（普濟方）用大荔枝一箇。剔開。填鹽滿殼。煨研擦之。卽愈（孫氏集效方）

● 呃逆不止。荔枝七箇。連皮核。燒存性。爲末。白湯調下立止。（楊拱璧方摘要）

● 用鹽 錢半至三錢。

● 施閉宜忌 凡陰虛火旺者禁用。

參攷資料 ● 荔枝屬陽主散。無形質之滯氣。故瘡贅赤腫者用之。有不明此。雖用之無應。（朱震亨）● 多食不傷人。如少過度。飲蜜漿一盃便解也。（蘇頌）● 荔枝氣味純陽。其性長熱。鮮者食多卽艱腫口痛。或衄血也。病齒腫及火病人尤忌之。開寶本草言其性平。蘇氏謂多食無傷。皆謬說也。按物類相感志云。食荔枝多則醉。以殼

浸水飲之卽解。此卽食物不消。還以本物消之之意。（李時珍）● 司馬相如上林賦作離支。按白居易云。若離本枝。一日色變。三日味變。則離支之名。又或取此義也。（李時珍）● 荔枝生嶺南及巴中。今閩之泉州漳州興化軍蜀之嘉州瀘州。及二廣州郡皆有之。其品以閩中爲第一。蜀州次之。嶺南爲下。其本高二三丈。自徑尺至於合抱。類桂木。冬青之屬。綠葉蓬蓬然。四時榮茂。不彫。其木性至堅勁。土人取其根作阮咸槽。及彈碁局。其花青白。狀若冠之義。綴其子喜變實。狀如初生松毬。殼有皺紋。如羅初青。漸紅。肉色淡白。如肪玉。味甘而多汁。夏至將中。則子翕然俱赤。乃可食也。大樹下子至百斛。五六月盛熟時。彼方皆燕會。其下以賞之。極量取。雖多亦不傷人。少過則飲蜜漿便解。荔枝始傳於漢世。初惟出嶺南。後出蜀中。故左思蜀都賦云。旁挺龍目。側生荔枝。唐白居易圖序論之詳矣。今閩中四郡所出特奇。蔡襄譜其種類至三十餘品。肌肉甚厚。甘香瑩白。非廣蜀

之比也。福唐歲貢白臘荔枝。蜜煎荔枝。肉俱爲上方珍果。白臘須嘉實。乃堪。其市貨者多用雜色。荔枝入鹽梅。曝成。皮色深紅。味亦少酸。殊失本真。經曝則可經流。商販流布。遍及華夏。味猶不欲。白果之盛。皆不及此。又有焦核荔枝。核如雞舌。香味更甜美。或云是木生背陽。結實不充。就者。又有綠色蠟色。皆其品之奇者。本上亦自難得。其獨嶺荔枝。初生小酢。肉薄核大。不堪白曝。花及根亦入藥。（蘇頌）● 顧微廣州記云。荔枝冬夏常青。其實大如雞卵。殼朱肉白。核黃黑色。似半熟蓮子。精者核如雞舌。香甘美。多汁。極益人也。（陳藏器）● 荔枝炎方之果。性最畏寒。易種而根浮。其木甚耐久。有經數百年猶結實者。其實生時。肉白。乾時肉紅。日曬火烘。肉淺蜜煎。皆可致遠。成柔囓乾者。謂之荔枝。按白居易荔枝圖序云。荔枝生巴峽間。樹形圓圓如帷蓋。葉如冬青。花如橘而春。實如丹而夏熟。衆如蒲桃。核如枇杷。殼如紅絳。膜如紫紺。瓤如潔白。如冰雪。漿液甘酸如醴醕。大略如彼。

氏藥錄) 御節(李氏草秘)

形態 臭藤爲蔓草類藤屬之一種二月發苗蔓生地上葉對生而氣臭六七月開花粉紅色結子似葡萄而氣亦臭其根細小二三年者大如菜菔可供藥用

主治 腿脚諸風寒溼痛拘攣煎洗腸癰跌打損傷流注風火瘰癧毒散鬱氣理痼疾合紫蘇煎湯洗

【臭藤】即齊藤之古籍別名典見日華諸家本草詳「齊藤」條

即齊藤之古籍別名典見和漢藥考詳「齊藤」條

【臭藤草】即益母草之古籍別名典見和漢藥考詳「益母草」條

【般若湯】即米酒之古籍別名典見和漢藥考詳「米酒」條

【松釘魚】即杜父魚之古籍別名典見綱目詳「杜父魚」條

【船虹】生川蜀諸地

形態 船虹爲雜草類之一種其色黃可供藥用

採取 立秋採之

性質 酸無毒

主治 下氣止煩渴可作浴湯

藥。

【茗葱】古籍別名 山葱生沙地者名沙葱生水澤者名水葱(綱目)

外國名詞 Allium victorialis L. (拉丁) ギヤウジヤニンニウ ヤマル センジャウニンニク(日本)

基本 係百合科葱屬爲茗葱之葉莖

產地 山野平原處處有之

形態 茗葱爲葱類野生之一種開白花結子如小葱頭莖葉可供藥用

性質 辛微溫無毒

主治 除瘴氣惡毒久食強志益膽氣

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新修本草論茗葱曰主諸惡氣狐尿刺毒山溪中沙蟲射工等毒煮汁浸或搗傳大效

【茗葱】即蓮肉之古籍別名典見和漢藥考詳「蓮肉」條

性質 辛微溫無毒

主治 洩精

【茗】即茶葉之原名詳「茶葉」條

【茗荷】即蘘荷之日本名詳「蘘荷」條

【荔枝】即荔枝詳「荔枝」條

【荔枝紅】即山牛膝之古籍別名典見綱目拾遺詳「山牛膝」條

【荔枝奴】即龍眼之古籍別名典見新修圖經本草詳「龍眼」條

原名 離枝

【荔枝】命名 本品結實時枝弱而蒂牢不可摘須以刀斧割取其枝割與荔同故名

處方用名 荔枝肉

古籍別名 丹荔(綱目) 芮大荔山芝天芝火芝丹芝赤芝金芝火寶蘭芝桂芝紫芝紫靈神芝雷芝離芝甘液側生朱柿紅鐵樹枝檉枝瓊珠皺皮垣衣福果紺紫荔錦十八娘五德子天圻子玉晴子甘露水燕胎子顧蛇珠海山仙人釘坐真人峰衣仙子皺玉天漿(和漢藥考)

外國名詞 Nephelium Litchi Camb. (拉丁)

基本 屬無患樹科荔枝之實

產地 陳仁山藥物生產辨云荔枝核產廣東以番禺增城東莞

爲多出新安惠州汕尾亦有

形態 荔枝爲高一丈五尺餘之常綠樹葉爲羽狀複葉頗爲滑澤花似棉花呈青白色花後結實色爲茶褐形近球圓狀酷似龍眼

外被有鱗形皺裂之殼皮破之內部空虛正中有核稍附果肉氣味俱類龍眼

採取 五六月間成熟時採之

用法 生食或煮服或生搗或

煨用

性質 甘平無毒

效能 養血止煩渴消腫發痘

主治 止渴益人顏色

歷代記述攷證 【唐】李珣海藥本草論荔枝曰食之止煩渴頭重心燥背膊勞悶【唐】孟詵食療本草論荔枝曰通神益智健氣

【明】李時珍本草綱目論荔枝曰治瘰癧瘡赤腫疔腫發小兒痘

【明】穆希雍本草經疏論荔枝



荔枝

十畫 臭

【臭草】卽雲實之古籍別名。典見圖經本草。詳「雲實」條。

【臭梧桐】 古籍別名 秋葉。採藥書後庭花。學圖餘疏。臭芙蓉。八角梧桐。（綱目拾遺）

產地 羣芳譜云。臭梧桐生南海及雷州。近海之州郡亦有之。

形態 羣芳譜云。臭梧桐葉大如手。作三花。尖長青不彫。皮若梓白而堅韌。可作繩。水入不爛。花細白如丁香。而臭。味不甚美。遠觀可也。人家園內多植之。皮堪入藥。採取無時。敏按臭梧桐有山野之別。家生者成樹而高大。野生者木小不成樹。不過三四尺。花色粉紅。赤無大紅。純白者二種。俱可入藥。功用亦相近。綱目拾遺云。臭梧桐生人家牆下甚多。一名芙蓉。根葉深綠色。大暑後開花。紅而淡。似芙蓉。外苞內蕊。花白五出。瓣尖帶紅。霜降後苞紅中有實。作紫翠色。百草鏡云。一名臭芙蓉。其葉圓尖。不甚大。搓之氣臭。葉上有紅筋。夏開花。外有紅苞成簇。色白五瓣。結實青圓如豆。十一月熟。莢色花葉皮。

俱入藥。

主治 寬筋活血。化痔消瘰。

配合應用 ①治獨脚楊梅瘡。洗鷄掌風。一切瘡疥。煎湯洗汗斑。溼火腿腫。久不愈者。同菴園子浸酒服。并能治一切風溼。止痔腫。煎酒服。貼臍瘡。搗爛作餅。加桐油貼神效。

②治牛支風。取葉連根。掛於風頭廊下。吹乾。將葉燒灰入瓶內。每早服三錢。酒吞。（百草鏡方）又用臭梧桐葉并梗。曬燥磨末。共二斤。用白蜜一斤。爲丸。早滾水下。晚酒下。每服三錢。驗過神效。（邱虎臣驗方）

③治牛邊頭痛。用川椒五錢。臭梧桐葉二兩。先將桐葉炒黃。次入椒再炒。以火酒灑在鍋內。拌和取起。捲在絹內。繫在痛處。吃熱酒一碗。取被蓋頭而睡。出汗即愈。

④治一切內外痔。用臭梧桐葉七片。瓦松七枝。皮硝三錢。煎湯薰洗神效。（急救方）

⑤治風氣頭風。集驗。凡頭風用臭梧桐花。陰乾。燒灰存性。爲末。每服二錢。臨臥酒下。三服無不愈。

⑥止痢。用隔年臭梧桐花。煎湯服即愈。（必效方）

⑦消腫脹疔。臭梧桐葉百片。煎湯服三四次。（救生苦海方）

⑧治內外一切乳毒。用臭梧桐春夏取頭三個。秋冬取根。搗爛絞汁。對陳酒熱服。取汗爲度。神效。（經驗廣集方）

⑨治挂心疔。臭梧桐葉。每歲用一片。共歲若干。葉若干。清水洗葉。用無灰白酒煎服。（華玉先試效方）

⑩柿桐丸。此丸治男婦感受風溼。或嗜飲冒風。內溼外邪。傳於四肢。脈絡壅塞。不舒。以致兩足軟痠。疼痛不能步履。或兩手牽絆。不能仰舉。凡辛勞之人。常患此症。狀似風癱。服此丸立能全愈。用地梧桐俗謂臭梧桐。不論花。葉。梗。子。曬乾。切碎爲末。一斤。篩盡草炒。磨末八兩。二味和勻。蜜丸如桐子大。早晚以白滾湯送下。四錢。忌食豬肝。羊血。番茹等物。或單用臭梧桐二兩。煎湯飲。以酒過之。連服十劑。其痛即癒。或煎湯洗手足亦可。（濟世養生集方）

一〇四八

參攷資料 周延國云。臭梧桐。一年三月十月兩次作花。若葉無紅筋。搓之不臭者。疏。臭梧桐者。臭地野生。花色淡。無植之者。淮揚間成大樹。花微紅者。給紳家植之。中庭或云後庭花也。獨閩中此花鮮紅。異常名曰紅花。作長鬚。亦與吳地不同。園林中植之。灼灼出燦。牆上至生深洞中。與清泉水白石相映。永嘉人謂之丁香花。

【臭葡萄】卽臭藤之古籍別名。典見汪氏藥錄。詳「臭藤」條。

【臭蒿】卽黃花蒿之古籍別名。典見綱目。詳「黃花蒿」條。

【臭樗皮】卽樗櫟白皮之處方用名。詳「樗櫟白皮」條。

【臭橘】卽枸橼之古籍別名。典見綱目。詳「枸橼」條。

【臭橙】卽柑之古籍別名。典見食性本草。詳「柑」條。

【臭蕪荑】卽蕪荑之處方用名。詳「蕪荑」條。

【臭蟲】卽壁蝨之古籍別名。典見綱目。詳「壁蝨」條。

【臭藤】 古籍別名 卽藤。（綱目拾遺）臭葡萄（汪

主治 調中辟惡去臭。

【胭脂】即脂脂之古籍別名。典見和漢藥考。詳「脂脂」條。

【耿子】即草烏頭之古籍別名。典見吳普本草。詳「草烏頭」條。

【能消】即威靈仙之古籍別名。典見和漢藥考。詳「威靈仙」條。

【能消草】即玄參之古籍別名。典見和漢藥考。詳「玄參」條。

【能鼈】(綱目) 古籍別名 三足鼈。

產地 出吳興陽羨縣山池中。

形態 能鼈爲介類鼈屬之一種。形似鼈而生三足其肉可供藥用。

性質 大寒。有毒。

主治 折傷主痛。化血。生搗塗之。道家辟諸厭穢死氣。或畫像止之。

參攷資料 ①能鼈食之殺人。

(蘇頌) 按姚福庚已編云。太倉民家得三足鼈。命婦烹食畢。入臥少頃。形化爲血水。止存髮耳。隣人疑其婦謀害。訟之官。時知縣黃廷宣鞠問不決。乃別取三足鼈。令婦如前烹治。取死囚食之。入獄亦化。

如前人遂辨其獄。竊謂能鼈之有毒不應如此。然理外之事亦未可以臆斷也。而山海經云。從水多三足鼈。食之無蠱。近亦有人誤食而無恙者。何哉。蓋有毒害人亦未必至於骨肉頓化也。(李時珍)

【脂麻】即胡麻之古籍別名。典見本草衍義。詳「胡麻」條。

【蛇蛇】 故名 本品體能脆斷。

產地 出雲南、貴州、及崑崙山野間。

形態 蛇蛇爲鱗類蛇屬之一種。長尺餘。圓如錢。嘴尖尾禿。背黑腹白。暗鱗點點。常伏莽草間。見人輒躍起數尺。跌爲十二段。人去復合爲一。兩端俱生頭。其色如白金。甚光亮。誤拾之。往往觸毒即斃。其肉可供藥用。

採取 置竹筒於其側。候其入筒中。急持之。方得完全。稍緩則碎。斷。或伺其斷時。錯取之。須各置異處。以免仍續成蛇。待風乾入煎用。

性質 有毒。

主治 熬膏採癰癰疽。及療風。

參攷資料 蛇蛇治癰疽。腰以上用首。腰以下用尾。又治大厥風及痢疾。(綱目拾遺)

【蛇蛇骨】 主治 醋磨服。腫毒。

【臭牡丹】 形態 葉形與臭梧桐相同。但薄而糙。氣亦臭。五月開花成朵。一蒂百花色粉紅。

主治 洗痔瘡。治疔。蒼耳。臭牡丹各一大握。搗爛。新汲水調服。瀉下黑水即愈。一切癰疽。臭牡丹枝葉。搗爛。覺之立消。

【臭牡丹葉】 功用詳「臭牡丹」條。

【臭芙蓉】 即臭梧桐之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「臭梧桐」條。

【臭花根草】 即天名精草之別名。詳「天名精」條。

【臭屎茉莉頭】 產地 南海。

採取 二三月。

主治 理脚氣。

【臭柚】 即柚之古籍別名。典見綱目。詳「柚」條。

【臭草】 產地 出西域諸地。

形態 臭草爲雜草類。

之一種。高尺許。開小黃花。結子成實。裂分四房。每房有子數粒。春秋二仲皆可布種。或於春月折枝插之。亦能活。不畏霜雪。又不喜肥。須澆以清水。則茂。若以手持之。則臭氣拂拂。亦非穢汚腐臭之氣可比。其葉與花蕊可供藥用。

主治 泄瀉及小便不通。解蛇蠍蜈蚣諸毒。生食或煮食。鼻衄。搗葉塞之。危急重病。昏暈。醋蒸搗塞鼻孔。耳痛。搗汁置石榴皮內。煨過。灌之。目痛。置清水內。露二三次。點之。功用與香草等。

參攷資料 臭草植樹下。能殺樹上蟲。植園中。能辟蛇蠍蜈蚣等諸毒。並治蠱蟲。以清油煎臭草葉。搗爛敷臍上。勝食使君子。遠矣。目力過勞。以臭草葉自然汁。加蜂蜜一滴。并略加小茴香。自然汁調和。點眼。久則光明。楊梅瘡。以自然汁略加好酒。并清水粉同煎治之。婦人心氣痛病。由於子宮上沖。用臭草葉嗅之。以愈爲度。大庚實上土。曾用此方。嗅其靈驗。小兒大便秘。出。以好酒煮臭草葉。搗爛用布作膏貼之。(綱目拾遺)

各一錢爲末。每服一字。薄荷湯下。吐涎爲效。全嬰方。

●治小兒腹瀉。粉霜一字。小兒半錢。蓮花湯調下。冬月則用蓮肉（保幼大全方）。

●治風熱驚狂。神白丹。治傷寒積熱。及風生驚搐。或如狂病。諸藥不效。粉霜一兩。以白麵六錢。和作餅子。炙熱同研。輕粉半兩。銕白霜二錢半。爲末。滴水丸。梧子大。每服十九至十五丸。米飲下。（宣明方）。

●治癰疹生醫。粉霜八分。硃砂一錢。爲末。水調少許。傾入耳內。（飛鴻集方）。

●治腋下胡臭。粉霜。水銀等分。以面脂和塗之。（聖濟總錄方）。

●治楊梅惡瘡。粉霜一味。擦之。（集簡方）。

用量 五分至一錢。

施用宜忌 凡非氣壯邪實者。禁用。畏蕎麥稈。灰。硫黃。

參攷資料 ●以汞粉轉升成霜。故曰粉霜。抱朴子云。白雪。粉霜。也以海國爲度。蓋以土鼎勿洩精。

華七日乃成。要足陽氣。勿爲陰侵。惟竊竊地。丁河車。可以煉之。點化。

在仙爲玄靈。在人爲精原。在丹爲木精。在造化爲白雲。在天爲甘露。（李時珍）。

●粉霜。輕粉。亦能潔淨。府去膀胱中垢膩。既毒而損齒。宜少用之。（張元素）。

【紋秦丸】即秦丸之處方用名。詳「秦丸」條。

【紋銀】即銀箔之處方用名。詳「銀箔」條。

【納籠】古籍別名。餉才。（圖經）。

形態 納籠爲介類之一種。即鼈之無裙。而頭足不縮者。其甲可供藥用。

性質 有小毒。

主治 傳尸勞。及女子經閉。

參攷資料 納籠肉有毒。食之令人昏塞。以黃耆。美藍。煎湯服之立解。（蘇頌）。

【純青蒿】即青蒿之處方用名。詳「青蒿」條。

【純鈎鈎】即鈎藤之處方用名。詳「鈎藤」條。

【純陽草】即金剛纂之古籍別名。典見丹房本草。詳「金剛纂」條。

【紗羊】即蜻蜒之古籍別名。典見

綱目。詳「蜻蜒」條。

【紗帽翅】形態 紗帽翅爲雜草類之一種。一莖間數十花。色黃。其葉可供藥用。

主治 癰疾。

【紙母】即知母之古籍別名。典見和漢藥考。詳「知母」條。

【素火腿】即處鮮片之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「處鮮片」條。

【素心蘭】即建蘭之別名。詳「建蘭」條。

【素芝】即白芝之古籍別名。典見綱目。詳「白芝」條。

【素奈】即蘋果色白者之古籍別名。典見綱目。詳「蘋果」條。

【素馨花】產地 以廣東南番爲最多。



素馨花

主治 解心氣鬱痛。下痢腹痛。古籍別名 馬耳。（別錄）。

【素干】

基本 素干爲雜草類之一種。可供藥用。

性質 苦。無毒。

主治 易耳。

【素馨香】即丁香之古籍別名。典見和漢藥考。詳「丁香」條。

【缺盆子】即覆盆子之古籍別名。典見爾雅。詳「覆盆子」條。

【缺盆草】即蓴之古籍別名。典見綱目。詳「蓴」條。

【羔羊肉】即幼羊之肉。其功用詳「羊肉」條。

【殺羊肉】即羊肉之處方用名。詳「羊肉」條。

【殺羊窗】即百里奚草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「百里奚草」條。

【殺肉】即羊肉之古籍別名。典見綱目。詳「羊肉」條。

【耆婆草】即曼陀羅之古籍別名。典見和漢藥考。詳「曼陀羅」條。

【耕香】形態 耕香爲茅草類之一種。乃排草香之一類。其莖生細葉。可供藥用。

產地 出熱帶諸地。

性質 辛。溫。無毒。

醫用竹節人參作祛痰藥。並非偶然云。

效能 肅肺。下氣。治咳嗽。平喘。逆。爲人參之代用品。亦爲強壯藥。此外有健胃解熱祛痰之效。

醫治 慢性消化不良症。習慣性便秘。

作用 助胃。助分泌之不足。刺激胃之蠕動。使消化功能增大。至腸始吸收至血中。使心臟動力增加。

主治 氣香味淡。性善下降。能伸肺經治節。使清肅下行。補氣生津。治咳嗽喘逆。痰湧火升。久癰淋瀝。難產。經閉。瀉痢。由於肺熱者。反胃。噎膈。由於燥溼者。凡有升無降之症。每見奇效。以其根一直下行入土最深故也。

配合應用 ①治白帶初起。土人參切片三兩。用陳紹酒飯上蒸熟。分作三服。服完即愈。(百草鏡方)

②補陰虛及楊梅結毒。對配茯苓熬膏。酒煎服。(王安採藥方)

用量 一錢至三錢。
施用宜忌 凡脾虛下陷滑精

夢遺者禁用。孕婦亦忌。以其下行而滑致也。

參攷資料 土參於春二三月發苗如蒿艾而葉細小。本長二三寸。作石綠色。映日有光。土人恒於夏月採根入藥。(綱目拾遺)

【粉兒茶】即粉口兒茶之簡稱。

【甘草】即甘草之處方用名。詳「甘草」條。

【粉草薺】即草薺之處方用名。詳「草薺」條。

【粉葛根】即葛根之處方用名。詳「葛根」條。

【粉團花】古籍別名。大者名玉粉團。小者名洋粉團。(綱目拾遺)

形態 粉團爲落葉灌木類之一種。葉略成圓形。有鋸齒。多皺紋。生細毛。夏初開白花。花瓣成簇。望之如粉團。大者初青後白。小者青色。轉白。白後轉紅藍色。雄雌花叢集成球。直徑可達二寸許。其花可供藥用。

性質 寒。無毒。

主治 水煎洗腎囊風。同水龍骨。雷公藤。燒燻除臭蟲。

【粉團花根】**主治** 喉爛。磨創。毛。藥掃涎。出即愈。

【粉節草】即蕪菁之古籍別名。典見綱目。詳「蕪菁」條。

【粉豬苓】即豬苓之處方用名。詳「豬苓」條。

【粉錫】即白粉之古籍別名。典見本經。詳「白粉」條。

命名 本品由水銀復轉升鍊而成。質輕如粉。色白如霜。故又命之曰水銀霜。

古籍別名 水銀霜。白雲。白蠟砂。(綱目)白霜砂。(新中藥)

外國名詞 Corrosive Sublimate (拉丁)

基本 係汞化合物之一種。

形態 粉霜爲白色半結晶性之塊粒或粉末。潔白而有光澤。

製法 李時珍曰。升鍊法。用真汞粉一兩。入瓦罐內。令勻。以燈盛仰置。罐口鹽泥塗縫。先以小炭火鋪罐底。四圍以水浸紙。不住手在燈蓋內。撥。勿令間斷。逐漸加火。至罐頸住火。冷定取出。即成霜如白蠟。按外臺秘要載古方崔氏造水

銀霜法。云用水銀十兩。石硫黃十兩。各以一鐵熬之。良久。銀熱黃消。急傾入一鐵小緩。即不相入。仍急攪之。良久。硫成灰。銀不見。乃下伏龍肝末十兩。鹽末一兩。攪之。別以鹽末鋪罐底。一分入藥在上。又以鹽末蓋面。一分以瓦盆覆之。鹽土和泥塗縫。炭入煨一伏時。先文後武。開盆刷下。凡一轉後。分舊土爲四分。以一分和霜入鹽末二兩。如前法飛之。訖。又以土一分鹽末二兩。和飛如前。凡四轉上盡。更用新土如此七轉。乃成霜用之。此法後人罕知。故附於此云。

用法 恒以和作丸散用。

性質 辛溫。無毒。

效能 劫痰消積。或用作驅微菌藥。

主治 下痰涎。消積滯。利水。與輕粉同功。

作用 有直接殺滅微菌之能力。性甚強烈。可刺激患部之黏膜。使分泌驟增。若用時過久。反致局部結痂而腐蝕。

配合應用 ①治小兒急驚。搗搗涎盛。粉霜二錢。白牽牛炒輕粉

十臺 稗 秆 笋 粉

黑褐。眼之上部巨頰部灰赤色。有淡黑之橫斑。尾短色黑。脚帶赤褐色。趾無蹼。體長四寸餘。翼長三寸半。尾長一寸八分。能游泳。善步行。不能高飛。夏至後夜鳴達旦。秋後即止。其肉可供藥用。

性質 甘溫。無毒。
主治 蟻瘻。

【稗】 命名 稗字篆文。象其禾體柔弱之形。故名。

古籍別名 粟。糯。糯。糯米。(唐本草) 黃糯米。(綱目)

外國名詞 Panjoum Italicum L. Var. glutinosa. (拉丁) モチアノ(日本)

基本 係禾本科稷屬。爲稗之米。其根詳見「稗根」條。

形態 稗米爲稷粟類之一種。乃粟米粟米之有黏性者。有赤白黃三色。皆可釀酒熬糖及作糰糕食與供藥用。

性質 甘微寒。無毒。
主治 寒熱。利大腸。療漆瘡。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論稗米曰。治筋骨攣急。殺瘡疥毒熱。生搗和雞子白。傳毒腫。

良。【宋】日華諸家本草論稗米曰。主大咳。凍痛。嚼傳之。【明】李時珍本草綱目論稗米曰。治肺癰。及陽盛陰虛。夜不得眠。及食鷄鴨成癥。妊娠下黃汁。

參攷資料 ①稗米性平。不可常食。擁五臟氣。動風。閩人(孟詵) ②稗米味酸。性熱。黏滯。易成黃積。

病。小兒不宜多食。(李時珍) ③稗米作酒煮糖。肥輒易消。方藥不正用。惟嚼以塗漆瘡。及釀諸藥。醱爾(陶弘景) ④稗者。肺之穀也。肺病宜食之。故能去寒熱。利大腸。大腸者。肺之合。而肺病多作皮寒熱也。

千金治肺癰方用之。取此義也。靈樞經。岐伯治陽盛陰虛。夜不得眠。牛夏湯中用之。取其益陰氣。而利大腸也。大腸利。則陽不盛矣。方見牛夏條。又異苑云。宋元嘉中。有人食鴨成癥。藏醫以稗米研粉。調水服之。須臾煩躁。吐出一鴨雛。而瘥也。千金方。治食鴨肉成病。胸滿面赤。不能食。以稗米泔一盞飲之。(李時珍)

【稗米粥】 性質 甘溫。無毒。
主治 益氣。治脾胃。

虛寒。洩痢。吐逆。小兒痘瘡白色。主治 煮湯洗。祛風。

【稗根】

【根】 ①即稗米之黑者。典見綱目。詳「稗米」條。②即黍之色黑者。典見爾雅。詳「黍」條。

【筍】 即竹筍之俗名。詳「竹筍」條。

【粉口兒茶】 即孩兒茶之別名。詳「孩兒茶」條。

【粉丹皮】 即牡丹皮之處方用名。

詳「牡丹皮」條。

【粉甘草】 即甘草之處方用名。詳「甘草」條。

原名 土人參。

【粉沙參】 命名 本品各地皆產。莖葉一似人參。故名。出江浙者。俗名粉沙參。

古籍別名 竹節人參。土參。節人參。佛掌參。竹鞭人參。(和漢藥考)

外國名詞 Panax Repens (拉丁)

基本 屬五加科爲土參之根。

產地 趙學敏本草綱目拾遺曰。土人參。各地皆產。尤於錢塘西湖南山尤多。

一〇四四

形態 土人參爲多年生草。生於深山陰地。莖葉俱酷似人參。莖高二尺餘。葉爲掌狀複葉。由五小葉而成。類七葉樹。夏月於梢頭簇生細小五瓣白花。作繖形。花序排列。實小如豆。初綠。熟紅。頂端有黑色輪根。初爲球根。次變直根。後復橫行。爲竹節狀。橫生。根如小指。大呈鉛黃色。有多數鬚根。本根味苦。鬚根則甘。

種類 ①粉沙參。即土人參之出於江浙者。②紅黨參。即土人參之去皮淨煮極熟。陰乾而成者。③小人參。即土人參之產於日本薩摩者。④鬚人參。即土人參之產於日本信濃下野日光者。

採取 夏秋之交。採根日乾。

製法 趙學敏曰。凡使須蒸之極透。則藥去而氣香。味淡。

性質 甘微寒。無毒。

成分 日本藥學士井上圓治氏。嘗研究竹節人參之成分。由化學試驗之結果。發見一種糖原質。又由動物試驗。確定其所含成分。應屬「沙波寧」Saponin。沙波寧爲祛痰藥主要成分。故氏謂中。

●治小便艱難。或轉胞腹滿。不急療。殺人。用秦朮一兩。水一盞。煎六分。分作二服。又方加冬葵子等分爲末。酒服一匕。(聖惠方)

●治胎動不安。秦朮甘草。鹿角膠炒。各半兩爲末。每服三錢。水一大盞。糯米五十粒煎服。又方秦朮阿膠炒。艾葉等分。如上煎服。(聖惠方)

●治發背初起。疑似者。便以秦朮牛乳煎服。得快利三五行即愈。(海上方)

●治瘡口不合。一切皆治。秦朮爲末。糝之。(直指方)

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡便滑洩數。及無風溼者。禁用。畏牛乳。菖蒲爲之使。

著名方劑 ●秦朮龍甲散。治骨蒸潮熱。肌肉消瘦。唇紅頰赤。氣粗。四肢倦。夜有盜汗。咳嗽。(羅謙甫方) 柴胡龍甲。(去裙醋炙。選九肋者) 地骨皮各一兩。秦朮當歸。知母各五錢。右六味。爲粗末。每服五錢。水一盞。青蒿五葉。烏梅一個。煎至七分。去滓溫服。空心臨臥各一服。●秦朮扶羸湯。治臍肺二

經虛熱。及肺痿。骨蒸已成。或寒或熱。聲啞不出。體虛自汗。四肢怠惰。(直指方) 柴胡二錢。人參龍甲(醋炙) 秦朮。當歸。紫苑。半夏各一錢。地骨皮。錢半。甘草五分。右水二盞。薑三片。烏梅大棗各一枚。煎七分。食後服。如熱甚者。加青蒿。汗多者。加黃芩。去半夏。生薑二味。

參攷資料 ●秦朮手足陽明經藥也。兼入肝膽。故手足不遂。黃疸煩渴之病。須之。取其去陽明之溼熱也。陽明有溼。則身體酸疼。煩熱有熱。則日晡潮熱。骨蒸所以聖惠方治急勞煩熱。身體酸疼。用秦朮柴胡一兩。甘草五錢爲末。每服三錢。白湯調下。治小兒骨蒸潮熱。減食瘦弱。用秦朮炙甘草各一兩。每用一二錢。水煎服之。錢乙加薄荷葉五錢。(李時珍) ●今陝西州郡多有之。其根土黃色。而相交糾。長一尺以來。粗細不等。枝幹高五六寸。葉婆娑。連莖梗俱青色。如蒿苗葉。六月中開花。紫色似葛花。當月結子。每於春秋採根陰乾。(蘇頌) ●今庸師喜用秦朮。且不辨左紋右紋。凡遇痛症。動輒用之。失

其旨矣。(張石頑) 【秦朮】即秦朮之原名。詳「秦朮」條。 【秦料】即秦朮之古籍別名。典見別錄。詳「秦朮」條。 【秦荻藜】 古籍別名 藜藟秋。 產地 生於低濕諸地。

形態 秦荻藜爲菜類之一種。狀如荻莖。葉可供菜茹與藥用。性質 辛溫無毒。主治 心腹冷脹。下氣消食。和醬醋食之。 歷代記述攷證 【唐】孟誥食療本草論秦荻藜曰。破氣甚良。又末之和酒服。療心痛。悵悵塞滿氣。參攷資料 秦荻藜加入生菜中最香美。(孟誥)

【秦荻藜子】 主治 腫毒。搗末和醋塗。 【秦椒】 ●即秦椒之古籍別名。典見龍柏藥性考。詳「秦椒」條。 ●即花椒之原名。詳「花椒」條。 【秦慈】即秦慈之古籍別名。典見圖經本草。詳「秦慈」條。 【秦當歸】即當歸之處方用名。詳

「當歸」條。 【秦膠】即秦朮之俗名。詳「秦朮」條。 【秦燕毛】 命名 本品爲燕之。 由古秦地南來者。故名。 主治 解諸藥毒。取二七枚。燒灰水服。 【秦龜甲】即山龜甲之原名。詳「山龜」條。

【秦歸】頭圓尾多色紫。氣香肥潤者。即馬尾歸之古籍別名。典見綱目。詳「當歸」條。 【秧雞】 古籍別名 水雞。 外國名詞 水雞。 aequans indious. Blyth (拉) (Water rail 或 Eastern water-rail 或 Indian water-rail) (英)

基本 係脊椎動物鳥類涉禽類秧雞科。 產地 出田澤沼池水畔間。 形態 秧雞爲原禽類之一種。其狀似雞。嘴比頭長。略彎曲。嘴根亦而尖淡黑。背面概作煤褐色。其白斑混交赤褐。中殆黑翼亦黑。頰

十靈 秦 秧

便。差五種黃病。癰炳曰療酒黃黃疽大效。廣利方曰。秦尤療黃心煩熱口乾。皮肉皆黃有極效。此外如孫真人治黃疸亦用秦尤。以此等例觀之。秦尤似有鎮痛利水作用也。其主要成分供簡單的化學方法檢驗時。似為一種配糖體也。張山雷曰。秦尤之尤。本從草下。取糾結之意。玉篇本作牛。孫氏問經堂所刻本草經從之。今作尤。或作亢者。皆草之變體。非從草下九及几也。其根入土甚深。互相糾結。故以為名。而能通行經絡。流利骨節。名義功用。皆從此出。其氣味則本經謂之苦平。而別錄加以辛及微溫。以其主治風寒溫痺。必有溫通性質也。然其味本苦。其功用亦治風熱。而能通利二便。已非溫藥本色。後人且以治胃熱黃疸煩渴等症。其非溫性。更是彰明較著。考本經別錄主治。功在舒筋通絡。流利骨節。惟治痺痛癰結之證。蓋與防風羌獨同類之品。甄權之治頭風。即祛風也。惟又稱其利大小便。亦與本經下水利小便之旨相合。蓋秦尤之根。曲折通達。既能外行

於關節。亦能內達於下焦。故宜通諸府。引導濕熱。直走二陰而出。昔人每謂秦尤為風家潤藥。其意指此。因之而并及腸風下血。張石頑且謂其治法。皆以濕熱有餘。宜泄積滯言之。非統治諸虛不攝之下血帶下也。又就其導泄去熱而引伸之。則治胃熱泄內熱。而黃疸酒毒牙痛口瘡。溫疫熱毒。及婦人懷胎蘊熱。小兒疳熱煩渴等症。皆胃家濕熱。而秦尤又能通治之矣。約而言之。外通經隧。內導二便。是其真宰。而通絡之功。又在理溫之上。要之皆是從濕阻熱結一面着想。而氣虛血弱之症。皆非其治。仍與防風羌獨等味。異曲同工耳。又曰。秦尤之根。以互相糾結為名。故陶弘景謂相交而長大者佳。無謂左右也。乃劉宋時之雷斅。妄為區別。竟謂左文為秦。右文為亢。鄙陋可笑。其謬已極。秦是地名。牛是物理。而可分為二。不通執甚。而後人能為應聲之蟲。皆以左者為佳。不知草之根莖。隨便互結。左右何關性質。亦猶藤本蔓生。未聞左右旋。顯分區別也。考雷斅所著之炮

炙論。詞多可鄙。本無足取。因其書竟稱為雷公炮炙論。而無識者流。甚至誤認為黃帝時之雷公。謬加推崇。轉相援引。因而沿訛襲謬。附和同聲。卒莫知其究竟。此亦談醫之一則笑話矣。秦尤治熱。本因其能通利二便。遂以胃家渥家諸症。一概歸其主治。然皆治實熱。非虛熱也。自日華本草。插入主傳尸骨蒸一語。而俗醫又以為勞瘵發熱之聖藥。於是血虛身熱。率以秦尤柴胡。錯綜相同。自謂已握治勞之祕鑰。不知苦能傷胃。寒能傷脾。寧不輕者致重。重者致死。而病者醫者。皆不覺悟。則日華殆其作俑者乎。李東壁謂黃疸煩渴之用秦尤。取其去陽明之溫熱也。陽明有濕。則身體痠疼。而煩熱。陽明有熱。則日晡潮熱。而骨蒸。其說甚是。清微蓋其能治潮熱骨蒸。亦皆胃有實熱之證。而謬者遂以移之於虛熱。其相去不太遠耶。若小兒疳熱。亦惟實證為宜。挾虛者審之。石頑亦謂肢體疼痛。或浮腫。挾有客邪者。用以祛風利濕。方為合劑。若久痛虛羸。血氣不能營養。而痛及下體

虛寒。痠疼枯瘦。而小便清利者。咸非所宜。

配合應用 ①治酒疸。秦尤、乾葛、茵陳、五味子、黃連、扁豆、木通、苳蓿。

②治下部濕熱作癢。或生溼瘡。秦尤、杏仁、木瓜、五加皮、黃柏、蒼朮、牛膝。

③治五種黃疸。崔元亮海上方云。凡黃有數種。傷酒發黃。誤食風蠶亦作黃。因勞發黃。多痰涕。目有赤脈。益懨懨。或面赤惡心者是也。用秦尤一大兩。剉作兩帖。每帖用酒半升。浸絞取汁。空腹服。或利便止。就中飲酒人易治。應用生力。又治黃病。內外皆黃。小便赤。心煩口乾者。以秦尤三兩。牛乳一大升。煮取七合。分溫再服。此方出於許仁。則又孫真人方加芒硝六錢（貞元廣利方）。

④治暴瀉引飲。秦尤二兩。甘草炙半兩。每服三錢。水煎服。（聖惠方）。

⑤治傷寒煩渴。心神燥熱。用秦尤一兩。牛乳一大盞。煎六分。分作二服。亦治小兒骨蒸。（聖惠方）。

基本 屬胃脘科。爲秦艽之根。

產地 陳仁山藥物生產辨云。

秦艽以陝西省漢中府產者爲正地道名曰西秦艽。其次雲南產者多。四川者少。總其名稱曰川秦艽。氣味不及西艽之佳也。

形態 秦艽莖高五六寸。葉婆娑。莖梗俱青色。如萵苣葉。六月中開紫色花。似葛花。花後遂結子。其根色黃。而互相交錯。長一尺左右。粗細不等。

採取 二月八月間。採根曝乾。

製法 雷斅曰。凡使秦艽。須於脚文處。認取左文列爲秦。治疾右文列爲芩。即發脚氣。凡用秦。以布拭去黃白毛。乃用黃元湯浸一宿。日乾。用李時珍曰。秦艽但以左文者爲良。分秦與芩爲二。則謬矣。

性質 苦。平。無毒。

效能 散風溼。治痺痛。用作風痺藥。

主治 寒熱邪氣。寒溼風痺。肢節痛。下水。利小便。〔本經〕療風無問久新。通身變愈。〔別錄〕

歷代配鏡錄【唐】甄權藥

十 薑 秦

性本草論秦艽曰。牛乳點服。利大小便。療酒黃疸。解酒毒。去頭風。

【宋】大明諸家本草論秦艽曰。傳尸骨蒸。治疳。及時氣。〔金〕張元素

珍珠璣論秦艽曰。除陽明風溼。及手足不遂。口噤。牙痛。口瘡。腸風瀉

血。養血榮筋。〔元〕王好古湯液本草論秦艽曰。泄熱。益膽氣。〔明〕李

時珍本草綱目論秦艽曰。治胃熱。虛勞發熱。〔明〕經希雍本草經疏

論秦艽曰。秦艽味苦。平。別錄兼辛。微溫。而無毒。潔。氣微溫。味苦。辛。

亦可云微寒。苦能洩。辛能散。微溫能通利。故主寒熱邪氣。寒溼風痺。

肢節痛。下水。利小便。性能祛風除溼。故別錄療風。無問久新。及通身

變愈。能燥溼散熱。結。故日華子治骨蒸。及疳熱。甄權治酒疸。解酒毒。

元素除陽明風溼。及手足不遂。腸風瀉血。養血榮筋。好古泄熱。益膽

氣。咸以其除溼散結。清腸胃之功也。〔清〕黃宮繡本草求真論秦艽

曰。秦艽苦多於辛。平。微溫。凡人感冒風寒。與溼。則身體酸痛。肢節

煩疼。拘攣不遂。如風勝則爲行痺。寒勝則爲痛痺。溼勝則爲着痺。痺

在於骨則體重。痺在於脈則血滯。

痺在於筋則拘攣。痺在於肉則不仁。痺在於皮則膚寒。至於手足酸

疼。寒熱俱有。則爲陽明之溼。潮溼骨蒸。則爲陽明之熱。推而道黃便

澀。腸風瀉血。口噤。牙痛。亦何莫不由陽明溼熱與風所成。用此苦多

於辛。以燥溼邪。辛兼以苦。以除肝膽風熱。實爲驅風除溼之劑。然久

痛虛羸。血氣失養。下體虛寒。痠疼枯瘦。小便利者。咸非所宜。形作羅

紋相交。長大黃白。左紋者良。右紋勿用。

國外學說 日本和漢藥考曰。

此藥純係中國產。其基本植物未詳產於中國之河北。河南諸省。一

說。因產於陝西。故名秦艽。一說。屬於爵牀科。未得其證。不敢臆斷。日

本向以屬毛茛科之牛扁充之。截然不同也。本草綱目啓蒙曰。中國

產根肥大。色黃白。左右分岐。又有上爲分枝。而未端仍合爲一者。根

中空。外如網。因之如羅紋相交。草保年間。國人自高麗攜其秧來。始

有此種。頃已漸多。葉似毛茛。而無毛。一根叢生。方莖直立。葉互生。

開淡黃花。形似烏頭花。而小。根黃色。此草多產於城州之北。山及信州。花亦有作淡紫色。或黃白色者。種樹家稱爲伶人草。其根極似中國來之乾根。色黑。槁去皮。則內中空。虛。羅紋相交。味苦。同時又有中國來者。偶有葉雜入。則見其葉似萵苣葉。非毛茛之形。據此。則萵苣之種。殆又非秦艽矣。

辨偽 鄭肖巖曰。假芩出秦

中。今涇州鄜州岐州河陝諸郡。皆有其根土黃色。作羅紋交錯。左右

旋轉。李時珍云。以左紋者良。今市肆偽品。即邊秦有毛。其枝尙小。匪

特左右紋難辨。不知何物混充。又安能療病乎。曹炳章曰。按秦艽

陝西寧夏府出者。色黃。肥大。蘆少左旋者佳。山西五臺山亦出。皮色

略黑。肉黃白色。亦佳。以上皆名西秦艽。湖北產者。條細質鬆。毛屑較

多名。洵秦艽爲次。

近人學說 袁淑範曰。秦艽

味苦辛。而氣平。性溫無毒。主治寒熱邪氣。寒溼風痺。肢節痛。下水利

小便。本草證類亦曰。療風不問新久。皆效。藥性論云。秦艽利大小

漬水。便成碧色。書紙看之。皆青色者。真也。根似槐根。又古方藥品考曰。秦木高一二丈。幹枝皆綠。白色。春出葉一條五六葉排生。夏月枝梢開花。後結實。薄似松子而長大。日本產秦皮有二種。其皮不厚。白綠色。裏面褐色。浸水即變碧色。此爲真品。今藥舖賣者可用出丹州。若州等處。又有小葉者。高四五尺。枝葉相似。但瘦小。以其皮浸水。即變淡綠色。味略同。下品也。出城州。天臺山。又大和本草曰。葉似椿葉。又似槐葉。而小。亦似薔薇葉。以皮與葉浸水。立成綠汁。此汁善治紅眼腫。花多作紫色。如女郎花。樹幹性直。堪作鑿刀之柄。樹皮現紫黑色。又物類品隲曰。所在多有。大葉者形似吳茶。黃小葉者叢生。此藥用治眼病。其效最顯。取其浸汁入墨色尤光潤。加入畫色中更妙。又荷蘭藥鏡載秦皮之效如左。樹之裏皮色白。乾則帶黃色。味苦。收瀝能發汗。利小便。治瘡有特效。爲煎劑或散劑服之。木質性收瀝。爲末敷之。可愈創止血。或謂煎劑能治微毒。一說此樹滲出之汁。治蛇蛇咬傷。取效如神。堪爲解毒藥。故以之內服。其葉則貼傷部。綠枝瓦上焙之。折斷處自有津液滴出。凡患傷冷毒之耳聾。以此津液滴入耳中。立愈。子實能利小便。治水腫。每晨以子半錢和葡萄酒一盞飲服。即利小便。以治水腫。黃疸。累驗。

配合應用 ●治赤眼生腎。秦皮一兩。水一升半。煮取七合。澄清。日日溫洗。一方加滑石、黃連等分。

（外臺祕要方） ●治眼暴腫痛。秦皮、黃連各一兩。苦竹葉半升。水二升半。煮取八合。食後溫服。此乃謝道人所方也。

（外臺祕要方） ●治赤眼睛瘡。秦皮一兩。清水一升。白蠟中浸。春夏一食頃以上。看碧色出。即以筋頭纏繞。仰臥點令滿眼。微痛勿畏。良久添取熱汁。日點十度以上。不過兩日即瘥也。

（外臺祕要方） ●治眼弦挑鍼。乃肝脾積熱。剉秦皮。夾沙糖水煎。調大黃末一錢。微利佳。（直指方）

●治血痢連年。秦皮、鼠尾草、薔薇根等分。以水煎取汁。銅器重釜煎成丸。如梧子大。每服五六丸。日二服。稍增。以知爲度。亦可煎飲。（千金方）

●治天蛇毒瘡。似癩非癩。天蛇乃早間花蜘蛛也。人被其螫。爲露水所濡。乃成此疾。以秦皮煮汁一斗。飲之即瘥。（寇宗奭方）

用量 八分至錢半

施用宜忌 凡脾胃虛寒及無實熱者。禁用。惡苦瓠、防葵、吳茱萸、忌火。大戟爲之使。

參攷資料 ●痢則下焦虛。故張仲景白頭翁湯以黃蘗、黃連、秦皮同用。皆苦以堅之也。秦皮浸水青藍色。與紫草同用。治目病以增光暈尤佳。（王好古） ●枳皮色青氣寒。味苦。性溫。乃是厥陰肝少陽膽經藥也。故治目病。驚癇。取其平木也。治下痢。崩帶。取其收瀝也。又能治男子少精益精。有子皆取其瀉而補也。故老子云。天道貴瀉。此藥乃服食及驚癇崩痢所宜。而人止知其治目一節。幾於廢棄。良爲可慨。淮南子云。枳皮色青。治目之要藥也。又萬華術云。枳皮止水。謂其能收瀝也。高誘解作致水。言能

使水沸者。譌也。（李時珍） ●樹葉似檳。故名。石檳俗因味苦。呼爲苦樹。（蘇恭） ●秦皮生廬江川谷。及冤句水邊。二三月採皮陰乾。（別錄） ●俗云是樊桐皮。而水漬以和墨書。色不脫。微青。陶弘景云。此樹似檳。葉細皮有白點。而不粗錯。取皮漬水。便帶青色。書紙看之皆青色。色是真。（蘇恭） ●今陝西川郡及河陽亦有之。其木大都似檳枝。幹皆青綠色。葉如點。虛大而木不光。並無花實。根似槐根。俗呼爲白樺木。（蘇頌）

【秦尖】 卽刺蒺藜之古籍別名。典見和漢藥考。詳「刺蒺藜」條。

【秦光】 原名 秦札。命名 本品出秦中。而根作羅紋交錯者。故名。

處方用名 左秦光。西秦光。紋秦光。

古籍別名 秦瓜。（四聲本草）
秦札。秦糾。（別錄）秦膠。（俗名秦仇綱草。產家大器。和漢藥考）

外國名詞 Zanthoxylum
Fiperium DC. (拉丁)
學名 Instiada gendaruba

黃湯炮炒半兩爲末。醋糊丸。梧子大每服五十丸。米飲下。(一百一選方)

④治產後暈絕。神麴炒爲末。水服方寸匕。(千金方)

用量 二錢至四錢。

施用宜忌 凡中虛無積。胎元不足者禁用。

參攷資料 ①按倪維德啓微

集云。神麴治目病。生用能發其生氣。熟用能斂其暴氣也。賈思勰齊民要術。雖有造神麴古法。繁瑣不便。近時造法更簡易也。(李時珍)

②金匱薯蕷丸。用神麴治虛勞百病。以其調中而消滯也。(黃元御)

③六神者。白虎(白麴)青龍(青蒿)朱雀(赤小豆)玄武(杏仁)勾陳(蒼耳)騰蛇(野薔)各配六神也。此藥陳者爲良。故一名陳麴(和漢藥考)

【神麴酒】 製法 用神麴燒赤。滓酒飲。

主治 閃胸腰痛。

【神驚石】 卽石硫黃之古籍別名。典見本草集註。詳『石硫黃』條。

【神龜】 卽白芷之古籍別名。典見

和漢藥考。詳『白芷』條。

【柰】 卽黍之一稗。二米者。典見爾雅。詳『黍』條。

【秦爪】 卽秦尤之古籍別名。典見四聲本草。詳『秦尤』條。

【秦王試劍草】 卽鹿蹄草之古籍別名。典見綱目。詳『鹿蹄草』條。

【秦仇】 卽秦尤之古籍別名。典見和漢藥考。詳『秦尤』條。

【秦札】 卽秦尤之古籍別名。典見別錄。詳『秦尤』條。

命名 一作柰皮。其木

【秦皮】 小而岑高。故名。或云本出秦地。藥用其皮。遂名之秦皮。

古籍別名 柰皮。樺木皮。石櫟皮。(別錄)樊桐皮。(陶弘景)盆桂皮。(日華)苦樹皮。(蘇恭)苦檻皮。(綱目)樺櫟皮。白樺木皮。若裏木皮。細辛木皮。(和漢藥考)

外國名詞 Fraxinus Bungeana, DC. var. pubinervis, Wt. (拉丁)

基本 屬木犀科爲秦樹之皮。

產地 陳仁山藥物生產辨云。

秦皮產秦天省。十月新。

形態 秦皮爲山野自生之落

葉喬木。多產於寒地。幹高二三丈。周圍可三尺。葉爲奇數羽狀複葉。

小葉形長橢圓或長卵圓。皆對生。末端尖銳。三四月間。枝梢簇生淡紫色小花。有四萼片。而無花冠。果實爲扁平之翅果。樹皮平滑。色青綠。以水浸之。立變碧青。此液多用

以洗患眼。煎樹熬皮。可製成一種越幾斯謂之木膠。入藥用。此樹皮所生之白蠟。用以塗物。殊滑澤。

皮 秦

微取 二月八月採之。採剝其皮陰乾用。尤以去骨取皮。漬水。色碧青者佳。

性質 苦。微寒。無毒。

效能 瀉熱明目。瀉腸。止痢。用作眼藥。又爲瀉痢藥。

主治 風寒濕痺。洗洗寒氣。除熱。目中青翳白膜。(本經)療男子少精。婦人帶下。小兒痢身熱。可作洗目湯。久服皮膚光澤肥大有子。(別錄)



歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論秦皮曰。明目。去目中久熱。兩目赤腫。疼痛。風淚不止。作湯浴小兒身熱。煎水澄清。洗赤目極效。唐陳藏器本草拾遺論秦皮曰。同藥煮湯。洗蛇咬。并研末傳之。

【元】王好古湯液本草論秦皮曰。主熱痢下重。下焦虛。清黃宮繡本本草真論秦皮曰。秦皮味苦。氣寒。色青。性瀉。功滑入肝。以除熱。入腎。以瀉氣。是以因風而見溼痺驚

癇。目障之症者。則當用此苦燥苦降之味。以除因脫。而見崩帶腸癖下痢之症者。則當用此取瀉寒氣以固。如仲景白頭翁之用秦皮。苦瀉之類。老子云。天道貴瀉。惟瀉故補。服此不惟瀉瀉止脫。而且益腎有子矣。至治赤眼腫痛。則合黃連等分。類點。並秦皮一味。煎湯以洗甚效。但此氣寒傷胃。總不宜於胃虛少食之人耳。出酉上。皮有白點。漬水碧色。書紙不脫者真。

國外學說 日本和漢三才圖會曰。秦皮。其木大抵似樺。枝幹皆青綠色。葉細如匙頭。虛大而不光。無花實。皮有白點而不粗錯。取皮

地充麴。但正貨俱無香味。充貨切開必香。凡用此味。著在消滯解表。究竟用六神麴較穩當也。六神麴方青蒿葉、蒼耳子、北杏、正小荳、生早辣參各等分。春爛用粗麥麴埋餅。即完全六神麴也。

製法 李時珍曰：五月五日。或六月六日。或三伏日。用白麴百斤。青蒿自然汁、赤小豆末、杏仁泥、各三升。蒼耳自然汁、野麥自然汁、各三升。以配白虎青龍朱雀玄武勾陳騰蛇六神。用汁和麴。豆杏仁作餅。麻葉或楮葉包裹。如造醬黃法。待生黃衣。曬收之。臨用炒令香入藥。

性質 甘。辛。溫。無毒。

效能 行氣消食。治瀉痢。化痰涎。用為消化藥。

主治 化水穀。宿食。癥結。積滯。健脾暖胃。

歷代記述攷證 【金】張元素

珍珠囊論神麴曰：養胃氣。治赤白痢。【明】李時珍本草綱目論神麴曰：消食下氣。除痰逆。霍亂泄痢。腹滿諸疾。其功與麴同。以挫腰痛者。燉過洋酒。溫服有效。婦人產後欲

回乳者。炒研酒服二錢。日二即止。甚驗。【清】黃宮繡本草求真論神麴曰：神麴辛甘氣溫。其物本於白麴。杏仁赤小豆、青蒿、蒼耳、紅麥。六味作餅蒸鬱而成。其性六味為一。故能散氣調中。溫胃化痰。逐水消滯。小兒補脾。輕平等藥。醫多用此。以為調治。蓋取辛不甚散。甘不甚壅。溫不見燥也。然必合以補脾等藥。並施則佳。若孕婦無積。及脾陰不足。胃火旺者。並勿用耳。義與麥芽同也。【清】陳修園本草經讀論神麴曰：凡麴蘖皆主化穀食積。服此便消。或鼻中如聞酒香。藥性所生。主治亦不外此。癥結積聚者。水穀之積。久而成也。健脾暖胃者。化水穀之效也。除化水穀之外。並無他長。人人以之常服。且云祛百病。怪甚。考造麴之法。六月六日是六神聚會之日。用白麴百斤。青蒿茶葉野麥各自然汁三升。杏仁研泥。赤小豆為末。各三升。通化作餅。麻葉或楮葉包裹。如造醬黃法。待生黃衣。曬收之。陳久者良。藥用六種。故名六神麴。今人除去六字。只名神麴。任意加至數十味。無非尅

破之藥。大傷元氣。且有百草神麴。害人更甚。近日通行福建神麴。其方於六神本方中去赤小豆。惡其易蛀。加五苓散。平胃散料。及麥芽。穀芽。使君子。樺子。大黃。黃芩。大腹皮。砂仁。白蔻。丁香。木香。薑黃。香附。良薑。芍藥。防風。秦艽。羌活。獨活。川芎。蘇葉。荊芥。防己。歸黨。參。茯苓。萊菔子。苡仁。木通。茶葉。乾薑。乾葛。枳椇。查肉。檳榔。青皮。木瓜。薄荷。蟬退。桃仁。紅花。三棱。莪朮。鬱金。菖蒲。柴胡。菊花等。為末。製為方塊。以草簍發黃衣。曬乾。此方雜亂無序。誤人匪淺。且以藥末合五穀。簍造發黃。而為麴。只取其速於釀化。除消導之外。並無他長。何以統治百病。且表散之品。因容發而失其辛香之氣。攻堅之品。以容發而失其雄入之權。補養之藥。氣味中和。以容發而變為臭腐穢濁之物。傷脾妨胃。更不待言。明者自知。如感冒病。宜審經以發散。若服神麴。則裏氣以攻伐而虛。表邪隨虛而入。裏矣。傷食新病。宜助胃以越化。傷食頗久。宜承氣以攻下。若服神麴。則釀成甜酸穢腐之味。滯於中焦。漫無出路。則為惡心脹痛矣。吐瀉是陰陽不交。泄瀉是水穀不分。赤白痢是濕熱下注。噎膈是食門乾澀。翻胃是命門火衰。痰餘是水氣泛溢。與神麴更無干涉。若誤服之。輕則致重。重則致死。可不慎哉。

配合應用 ①神麴開胃健脾。消食止泄。同山楂、麥芽、神砂、陳皮、草果、藿香、白朮、乾薑、蓮肉等用效。

②療瘡滿暑泄。神朮丸。用神麴炒。蒼朮泔製炒。等分為末。糊丸。梧子大。每米飲下五十丸。（百一選方）

③健胃思食。治脾胃俱虛。不能消化。水穀。胸膈痞悶。腹脇膨脹。連年累月。食減嗜臥。口無味。神麴六兩。麥蘖炒三兩。乾薑泡四兩。烏梅肉焙四兩。為末。蜜丸。梧子大。每米飲下五十丸。日三服。（和劑局方）

④食積心痛。陳神麴一塊。燒紅。洋酒二大碗。服之。（摘玄方）

⑤胃虛不壯。神麴半斤。麥芽五升。杏仁一升。各炒為末。煉蜜丸。彈子大。每食後嚼化一丸。（普濟方）

⑥治暴泄不止。神麴炒二兩。茶

麻條。

【神馬草】即海藻之古籍別名。典見和漢藥考。詳「海藻」條。

【神符白雲】即鉛霜之古籍別名。典見綱目。詳「鉛霜」條。

【神符樹】即夜蘭之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「夜蘭」條。

【神黃豆】產地 出雲南西南境地及四川。

形體 神黃豆莢如槐角。形似細竹筒。長可三四寸。搖之有聲。中如竹節片片相疊。剖之狀如棋子而色白。內有豆粒。色黃光亮。較蠶豆略大。似五倍子。中有線紋。堅實而扁。其出四川者。莢如連翹而略短。內有豆粒。作微紅色。俱可供藥用。

主治 稀痘解毒。

配合應用 凡痘自胸以上自臍以下俱有。而中間一截全無者。名兩頭痘。此氣血不能貫通。上下而腰臍之間為寒毒凝滯也。若不急治。七日之後。必變灰白之症矣。見點時。急用生苣當歸赤芍桔梗防風荊芥厚樸續斷白芷山查木通神黃豆三十粒。服此。中間方

有痘可無虞。張璠種痘新書方。

神黃豆用筒瓦火焙。去其黑殼。碾末。白水下之。可永除小兒痘毒。服法以每月初二日。十六日為期。牛歲每服半粒。一歲每服一粒。一歲半每服一粒半。遞至三歲服三粒。則終身不出矣。或曰按二十四氣服之。以二十四粒為度。或云水壘閉日服之。綱目拾遺方。

痘將發未發時。用神黃豆連殼焙炒。燉用豆研細水服。珍異藥品方。

痘將出時。用神黃豆。按一歲一粒。剝去外殼。并內皮。將瓦焙熟。一半。留生一半。芫荽湯調服。毒重者。稀。毒輕者更稀。十餘歲者亦不過七粒。倘未曾出痘者。亦如法以水調服之。竟不出痘。宜三月。五月。五七月。七九月。九等日。寶笈方。

神狸香 即靈貓香之古籍別名。典見離騷註。詳「靈貓香」條。

神箭 即衛矛之古籍別名。典見廣雅。詳「衛矛」條。

神膠 即水銀之古籍別名。典見石藥爾雅。詳「水銀」條。

神燈火 主治 一切腫毒。癰疽發背。能解毒活血。

參攷資料 外科有神燈照法。用硃砂雄黃俱研。水飛。血竭沒藥。箬烘去汗。各二錢。磨香四分。為極細末。每用三分。以紅棉紙緊捲擦。條約長七寸。麻油潤透。以火燃著。須令患者坐無風處。將藥條離瘡半寸。自外至內。週圍徐徐照入。火頭向上。藥氣乃入。毒即隨火解散。自不內侵臟腑。不可太過。恐傷好肉。其瘡微覺熱。心神即爽。每日只熏一次。初用三條。每日加一條。加至四五條。勢即漸減。然後每日減去一條。直熏至紅腫消盡為度。熏後用後藥。癰疽草新鮮採得者。搗爛。入陳年小粉等分。和起。再

加白鹽。研細少許。打成稠糊。敷半寸厚。留頭。必須敷過瘡暈三分。方能鎮定。毒根瘡口之上。用大蔥葉滾水泡熱。扯開貼之。或膏蓋亦可。避風為妙。自能拔出膿毒。如無鮮草。以如意黃金散代之。集要云。神燈照法。勿用太早。如瘡四五日間。形未成。毒未聚。驟用之。毒必內鬱。

反難外出。須用在八九日後。瘡勢已定。毒氣已聚。未成膿腐之時。用此照之。未成者自消。已成者自高。不起發者即發。不腐潰者即潰。若毒已潰膿已泄者。不宜用。每日以猪蹄湯淋洗。或蔥頭煎湯洗。亦佳。忌發物。趙超軒。

神錦花 即翠羽草之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「翠羽草」條。

神與草 即犍牛兒之古籍別名。典見和漢藥考。詳「犍牛兒」條。

神麴 造酒後醫乃造神麴。專供藥用。力更勝之。蓋取諸神聚會之日造之。故得神名。

處方用名 六神麴。范志麴。建神麴。神麴。六神。採芸神麴。焦六神。炒神麴。

古醫別名 陳麴。俗名。麥曲。六丁麴。和漢藥考。

基本 神麴係用白麴和藥汁。如造醬黃法而製成者。

產地 陳仁山藥物生產辨云。神麴原產福建。名曰建麴。但字號名目太多。真偽難辨。以左字採芸居麴為通行。其次范志麴。其餘滿

【稀稗石】即井泉石之別名。詳『井泉石』條。

【破布】產地 出廣東高要、陽江、陽春、恩平諸地。

基本 破布爲雜木類之一種。

其葉狀如掌而色綠可供藥用。

主治 解夢香毒能醒迷。

參攷資料 嶺南險地舟人多以胡蔓草合香焚之。人即迷悶。名爲夢香。以此煎服立解。故有身無破布葉莫上夢香船之曲。(綱目拾遺)

【破地鍾】即萊服之古籍別名。典見王禎農書。詳『萊服』條。

【破門】即大黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳『大黃』條。

【破故芷】即補骨脂之古籍別名。典見和漢藥考。詳『補骨脂』條。

【破故紙】即補骨脂之處方用名。詳『補骨脂』條。

【破軍殺】即大戟之古籍別名。典見和漢藥考。詳『大戟』條。

【破胸槌】即枳實之古籍別名。典見和漢藥考。詳『枳實』條。

【破雪】即荑荳子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『荑荳子』條。

【破管草】即雀麥之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『雀麥』條。

【破銅錢】即藜之古籍別名。典見綱目詳『藜』條。

【破關草】即雀麥之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『雀麥』條。

【破關符】即蓬莪朮之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蓬莪朮』條。

【祕惡】古籍別名 杜逢(別錄)

基本 祕惡爲雜草類之一種。可供藥用。

性質 酸。無毒。

主治 肝經邪氣。

【祝鳩】即斑鳩之古籍別名。典見綱目詳『斑鳩』條。

【神丹】基本 神丹爲石類之一種。可供藥用。

性質 辛溫有小毒。

主治 百病寒熱。

【神木】即茯神木之簡稱。詳『茯神木』條。

【神水】即口津之古籍別名。典見綱目詳『口津』條。即水銀之古籍別名。典見石藥爾雅。詳『水銀』條。即五月五日。剖取新竹

中之水。其功用詳『竹精』條。

【神火】製法 取神火法。用劈水冲之。面上有浮起細沫一層。用荊川紙拖水面。其沫即黏著紙上。將紙曬乾。掃下。即神火也。其砂澄清水。再研再冲。見有浮起之沫。依前法拖曬。如此六七次。直至無浮沫方止。每砂一斤。約可取神火八九用烏金紙包收貯。

效能 拔毒收口。

主治 凡癰疽毒瘡。難收口者。以神火少許。鵝翎蘸掃膏藥上貼。毒水易乾。瘡口易斂。爲外科聖藥。

【神仙對坐草】古籍別名 蜈蚣草。地蜈蚣。綱目拾遺)

產地 生山野陰溼諸地。及道旁多有之。

形態 神仙對坐草爲溼草類之一種。莖幹蔓生。兩葉相對。色青。形似佛耳草。夏開小黃花。每節間着二葉。清明時發苗。高尺許。亦似鵝腸草狀。對節而生。可供藥用。

採取 二三月間採之。陰乾用。主治 黃疸初起。脫力虛黃。黃

白火丹。反胃噎膈。水腫臃脹。陰症傷寒。及一切疝氣。

【神末砂】即硃砂之古籍別名。典見雷公炮炙論。詳『硃砂』條。

【神守】即鼈甲之古籍別名。典見古今注。詳『鼈甲』條。

【神朴】即厚樸之處方用名。詳『厚樸』條。

【神芝】即荔枝之古籍別名。典見和漢藥考。詳『荔枝』條。

【神屋】即龜版之古籍別名。典見本經。詳『龜版』條。

【神砂】即礬砂之古籍別名。典見本草求真。詳『礬砂』條。即礬砂之古籍別名。典見和漢藥考。詳『礬砂』條。即礬砂之古籍別名。典見和漢藥考。詳『礬砂』條。

【神胎】即眞珠之古籍別名。典見和漢藥考。詳『眞珠』條。

【神座砂】即硃砂之古籍別名。典見雷公炮炙論。詳『硃砂』條。

【神桃】即桃梟之古籍別名。詳『桃梟』條。

【神草】即人參之古籍別名。典見別錄。詳『人參』條。即天麻之古籍別名。典見吳普本草。詳『天

服立出(千金方)

●治胞衣不下。眞珠一兩。研末。苦酒服(千金方)

●治子死腹中。眞珠末二兩。酒服立出(外臺祕要方)

●治癰疽不發。珠子七枚爲末。新汲水調服(儒門事親方)

●治肝虛目暗。茫茫不見。眞珠末一兩。白蜜二合。鯉魚膽二枚。和合。銅器煎至一半。新綿濾過。瓶盛。頻點取瘥。亦治青盲不見。(聖惠方)

●治小兒中風。手足拘急。眞珠末水飛一兩。石羔末一錢。每服一錢。水七分。煎四分。溫服。日三。(聖惠方)

●治目生頑翳。眞珠一兩。地榆二兩。水二大盞。煮乾。取眞珠。以醋浸五日。熱水淘去醋氣。研細。未用。每點少許。以愈爲度。

用量 五釐至一分。

施用宜忌 凡無實火鬱熱者禁用。

參攷資料 ●河北滄深中亦有圈及寸者。色多微紅。珠母與廉州者不相類。但清水急流處。其色

光白。濁水及不流處。其色灰暗也。

(寇宗奭)●按廉州志云。合浦縣海中有梅青壘三池。蜃人每以長繩繫腰。攜籃入水。拾蚌入籃。即振繩令舟人急取之。若有一線之血浮水。則葬魚腹矣。又熊太古冀越集云。禹貢言淮夷蜃珠。後世乃出嶺南。今南珠色紅。西洋珠色白。北海珠色微青。各隨方色也。子管見蜃人入海。取得珠子。樹數擔。其樹狀如柳枝。蚌生於樹。不可上下。樹生於石。蜃人鑿石得樹。以求蚌。甚可異也。(李時珍)

【眞珠】即硃砂之古籍別名。典見石藥爾雅。詳「硃砂」條。

【眞珠母】即蚌殼之處方用名。詳「蚌殼」條。

【眞珠花】即蒴藋之別名。詳「蒴藋」條。

【眞珠草】古籍別名。陰陽草。假油柑(綱目拾遺)

產地 生野道旁及牆垣間。

形態 眞珠草爲溼草類之一種。葉似槐而狹小。晝開夜閉。葉背生小珠如鳳仙子。疊疊直綴。經霜輒紅。高三四寸。可供藥用。

主治 小兒百病。及諸疳瘦弱。眼欲盲。皆效。爲末。白湯下。或蒸煮魚肉食。

性質 甘。潤。無毒。

【眞珠菜】主治 利水。通淋。結消腹脹。下氣。癢閉。

參攷資料 六安有眞珠菜。如眞珠。又益部方物略記。眞珠菜。戎盧等州有之。生水中石上。翠縷纖蔓。首貫珠。蜀人以蜜熬食之。或以鹽煮。可致千里不壞。又黃山志。眞珠菜。藤本。莖生暮春發芽。每芽端綴一二莖。圓白如珠。葉翠綠如茶。連莖腊之。香甘鮮滑。他蔬讓其美。(趙恕軒)

【眞珠黃】即石硫黃之古籍別名。典見和漢藥考。詳「石硫黃」條。

【眞菊】即茶菊之古籍別名。典見雪芳譜。詳「茶菊」條。

【眞菜】即蔞臺子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蔞臺子」條。

命名 本品即豆之產於甘肅省舊慶陽府眞寧地方者。故名。

性質 甘。平。無毒。

主治 解諸藥毒。

【眞檀】即檀香之古籍別名。典見和漢藥考。詳「檀香」條。

【眞蟲草】日本名蔞麻。爲眞蟲草。詳「蔞麻」條。

【眞蘆薈】即蘆薈之處方用名。詳「蘆薈」條。

【玢結】即玢莢之古籍別名。典見綱目。詳「玢莢」條。

【砥石】即羊肝石之原名。詳「羊肝石」條。

【砧風】即蠅蝨之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蠅蝨」條。

命名 本品石鋒。古以代針。刺病之石。故名。

古籍別名 鍼石(綱目)

主治 刺百病癰腫。

參攷資料 按東山經云。高氏之山。晁麗之山。皆多鐵石。郭璞注云。可爲砭鍼也。素問異法方且論云。東方之域。魚鹽之地。海濱傍水。其病爲瘡瘍。其治宜砭石。故砭石亦從東方來。王冰注云。砭石如玉。可以爲鐵。蓋古者以石爲鍼。季世以鐵代石。今人又以瓷鍼。刺病。亦砭之遺意也。但砭石無識者。豈即石砭之屬爲之與。(李時珍)

效。但體最堅硬。研如飛麵。方堪服。食否則傷人臟腑。外搽肌肉作疼。蚌蛤無陰陽化。牡須雀化成。故珠端一於陰精也。

國外學說 日本和漢藥考曰。

眞珠藥用者少。裝飾者爲多。其新光正圓且巨大者。世人莫不珍之。若小而修整或暗且帶色。則價值大有等差。必裝飾不適用者。方肯入藥。如大村眞珠。伊勢眞珠。志摩眞珠。尾張眞珠。水戸眞珠。蛤仔眞珠。石決明眞珠等。皆供藥料者也。又眞珠自來多偽造品。因除藥用外。且作裝飾品。故奇貨可居也。如法意等國。俱以玻璃。蠟。魚眼等。仿造其原形。外以淡水產之魚鱗。研成粉末塗之。製作之巧。誠足驚人。驟視之。竟與眞珠無別也。又以眞珠製成細末。(眞珠質堅。欲研粉末。必先加熱。然熱之過度。仍難成粉末。故相傳搗碎研粉。尙爲穩妥之舊法也。)有種種之法。將眞珠入土器。加大豆四五粒。土器加蓋。爐上熱之。至大豆膨脹爲度。將珠取出。或入米泔水蓋煮。至微鳴取出。搗碎。

辨偽 鄭有巖曰。珍珠偽名。

藥珠。每用上海假珠。或廣東料珠。僞充。若研爲粉。更難辨識。古方外症多用湯藥。罕用。近人湯劑。喜用蘇瑤珠。又豈料爲假珠。所欺誑乎。用者慎之。曹炳章曰。接茂成大蟲魚志云。珍珠出合浦海中有珠池。蟹戶投水採蚌取之。相傳海底有處。所如城郭。大蚌居其中。有怪物守之。不可近。蚌之細碎。蔓延於外者。始得而採之。嶺表錄異云。珠池在廉州邊海中有洲島。島上有大池。謂之珠池。每年刺史親監珠戶入池採珠。以充貢賦。皆採老蚌。取而剖珠。池在海上。其底與海通。其水乃淡水。不可測也。土人採小蚌肉作脯食。亦往往得細珠如粟。(即今之廉珠也)乃知珠池之蚌。隨其大小。悉胎中皆有珠矣。而今之取珠蚌者。云得之海邊。不得於池中也。其北海珠蚌種類小。土人取其肉。或有得珠者。色黃白不甚光瑩。(或即今之藥珠也)蚌中又有一種江瑤者。腹亦有珠。皆不及南海者奇。而且多。寇宗奭曰。河北澹溪中亦有珠。圓及寸者。色多

微紅。珠母與廉州者亦不相類。但清水急流處。其色光白。濁水及不流處。其色暗也。照太古葛集云。禹貢言淮夷蠙珠。後世乃出嶺南。今南珠色紅。西洋珠色白。北海珠色微青。各隨方色也。予嘗見蜃人入海取得珠子。樹數株。狀如柳枝。蚌生於樹。不可上下。樹生於石。蜃人鑿石得樹。以求蚌。甚可異也。南越志云。珠有九品。以五分至一寸八九分者爲大。品有光彩。一邊似鍍金者名瑤珠。次則走珠。滑珠等品也。格古論云。南番珠色白。圓耀者爲上。廣西者次之。北海珠(即藥珠)色微青者爲上。粉白油黃者下也。西番馬價珠爲上。色青如翠。其老色灰石粉青油烟者下也。凡蚌聞雷則瘵瘦。其孕珠如懷孕。故謂之珠胎。中秋無月。則蚌無胎。左思賦云。蚌蛤珠胎。與月盈虧是矣。陸佃云。蚌蛤無陰陽牝牡。須蜃蛤化成。故能生珠。專一於陰精也。龍珠在額。蛇珠在口。魚珠在眼。鰈珠在皮。鼈珠在足。蝶珠在腹。皆不及蚌珠也。據近時市上所通用。最上者爲濂珠。即廉州合浦縣珠池

所產。粒細如粟。如粟。色白光滑有寶光。其次曰藥珠。種類甚多。即北海所產。色白黃有神光者亦佳。惟色黑質鬆者爲最次。不入藥用。

配合應用

●治小兒驚癇。風熱。大人失志癲狂。用眞珠粉丹砂。牛黃。犀角。天竺。黃茯。神。遠志。鈎藤。琥珀。金箔。
●治目生翳障。眞珠。爐甘石。龍腦。香。白礬。砂。空。青。人。爪。點目。
●治廣瘡結毒。及陰蝕。瘡。眞珠粉。鍾乳石。象牙末。牛黃。冰片。白礬。紅。鉛。天。蠶。蠶。蚌。竹。屑。樺。皮。灰。沒藥。明礬。
●治口疳。珠粉。人中白。黃。礬。青。黛。硼砂。和冰片少許。治下疳。加入雞內金。膩粉。
●安魂定魄。眞珠末。豆大。一粒。蜜一蜺。燉和服。日三。於小兒尤宜。(肘後方)
●治卒忤不言。眞珠末。用雞冠血和丸。小豆大。以三四粒納口中。(肘後方)
●治灰塵迷目。用大珠拭之。則明也。(格古論方)
●治婦人難產。眞珠末一兩。酒

殼之外面黏附於深二丈至六丈之海中岩礁上而產生。介殼似帆立貝。大自三寸至六七寸。形扁平。上緣直。如切下緣作半圓形。外現茶褐色。或帶紫色。如牡蠣殼。邊緣極薄。內面有真珠狀光澤。殊美麗。其肉可食。此貝雖有足而不能匍匐。故殼外叢生無數似絲之毛。以是牢附岩石。其毛長一二寸至六七寸。色黑綠。有光澤。老介中偶產有極貴重之真珠。尚有雙殼類中屬於同柱類之蚌。則潛生於湖沼池澤等淡水之底。介殼稍呈橢圓形。長二寸至四寸。廣三寸至七寸。許。外黑似漆。內面有真珠狀光澤。中產真珠。土人浮小舟以趕網撿取之。檢視其殼內有無真珠。其肉可充肥料。真珠介及蚌貝等物當在水中生存之時。偶有微細之生物或砂粒等竄入殼中。外套膜受其刺激。殊覺不適。遂分泌真珠質（與殼內有光輝之物質相同）被覆而保護已體。因此真珠者。實一種病之物質也。試檢查真珠。其中心必皆存有砂粒。砂粒之外。則係無數之薄層疊積而成。即知非虛

妄矣。現今東西各國盛行飼養珠母之法。於其外套膜間投入砂粒。放養數年。自然產生真珠。遂採收而貨賣之。蚌貝所產之真珠。較珠母略大。然用真珠養成術者。其光澤不及珠母之珠。惟介殼類之種族。原因位置種種不同。故產生之真珠。其形狀大小。色澤亦異。形狀有球圓長圓之別。最小如芥子。最大若大豆。色澤有白藍黃黑褐諸種。質堅。微透映。有如銀之光澤。放美麗之光。重量自一毫至三分餘。要之不論大小。概以正圓形者為上品。光澤以產於海水者為佳。淡水產次之。

採取 五月至九月間採之。

製法 李珣曰。凡使珍珠須要新完未經鑽殺者。研如粉。方堪服。食不細則傷人臟腑。雷斅曰。凡用以新者。絹袋盛之。置牡蠣四兩於平底鐺中。以物四向支穩。然後著珠於上。乃下地榆五花皮五方草各到四兩。籠住。以漿水不住火。住三日三夜。取出。用甘草湯淘淨。於白中搗細。重篩。更研二萬下。方可服食。慎微曰。抱朴子云。真珠徑寸

以上服食。令人長生。以醋醬漬之。皆化如水銀。以浮石蜂窠蛇黃等物合之。可引長三四尺。為丸服之。李時珍曰。凡入藥不用首飾及見尸氣者。以人乳浸三日。煮過。如上搗研。一法以絹袋盛入豆腐腹中。煮一炷香。云不傷珠也。

用法 恒以剉末和作丸散。

性質 鹹甘寒無毒。

成分 真珠主要之成分。為炭酸鈣 $CaCO_3$ 。東京化學會誌曾載有真珠之成分。錄之如左。真珠如不碎之為粉。醋酸便不溶解。其成分為炭酸鈣九一·七二。動物質植物質五·九四。水二·二三。與存在全母貝殼中之量不同。

效能 瀉熱。潛陽。安神。定驚。磨腎。明目。或專作眼科藥。又作解熱解毒藥。

主治 鎮心。點目。去膚。腎障。膜。塗面。令人潤澤。好顏色。塗手足去皮膚。逆風。綿裹。塞耳。主聾。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論真珠曰。磨腎。磨痰。【唐】李珣海藥本草論真珠曰。除面黚。止洩。合知母。煨煩。熱消。濕。合左經

根治小兒。缺豆。瘡入眼。【宋】寇宗奭本草衍義論真珠曰。除小兒驚熱。【明】李時珍本草綱目論真珠曰。安魂魄。止遺精。白濁。解痘疔毒。主難產。下死胎。胞衣。【明】繆希雍本草經疏論真珠曰。珠藏於澤。則川自媚。況塗面。寧不令人潤澤。好顏色乎。凡小兒驚熱風癩。為必須之藥。【清】黃宮繡本草求真論真珠曰。珍珠。即蚌所生之珠也。珠稟太陰精氣而成。故中秋無月。則蚌即無珠也。此藥。馮楚瞻醫論最詳。謂其功用。多入陰經。其色光明。其體堅硬。大小無定。要以新完未經鑽殺者為尚。味甘微鹹。氣寒無毒。入手少陰心經。足厥陰肝經。蓋心虛有熱。則神氣浮遊。肝虛有熱。則目生翳障。除二經之熱。故能鎮心明目也。耳聾。本屬腎虛。有熱。甘寒所以主之。逆風者。腫脹也。胸腹氣逆。脹滿。以及手足皮膚皆腫也。經曰。諸浮腫滿。皆屬脾土。諸滿脹大。皆屬於熱。此脾虛有熱。兼有積滯所致。珍珠味甘。既能益脾。寒能除熱。體堅復能磨積消滯。故亦生之至於疔毒。癰腫。長肉生肌。尤臻奇

施用宜忌 益智芳香。性本溫熱。證屬燥熱。病人有火者。皆當忌之。故凡嘔吐由於熱而不因於寒者。氣逆由於怒而不由於虛者。小便餘瀝由於水潤精虧者。內熱而不由於腎氣者。虛寒泄瀉。由於溼火暴注。而不由於氣虛腸滑者。並禁用。

參攷資料 按洪邁夷堅志

云秀川進士陸迎。忽得吐血不止。氣蹶驚顛。狂躁直視。至深夜欲投戶而出。如是兩夕。徧用方藥弗瘳。夜夢觀音授一方。命但服一料。永除病根。夢覺記之。如方治藥。其病果愈。其方用益智子仁一兩。生硃砂二錢。青橘皮五錢。麝香一錢。碾爲細末。每服一錢。空心燈芯湯下。(李時珍) 脾主智。此物能益脾胃。故也。與龍眼名皆智義同。按蘇軾記云。海南產益智。花實皆長穗而分爲三節。觀其上中下節。以候早中晚。不之豐凶。大豐則皆實。大凶皆不實。罕有三節並熟者。其爲藥只治水而無益於智。其得此名。豈以其知歲耶。此亦一說也。終近穿鑿。(李時珍) 顧微廣州記云。

其葉似薔薇。長丈餘。其根上有小枝。高八九寸。無華。莖如竹。節子從心出。一枝有十子。叢生。大如小棗。其中核黑而皮白。核小者佳。舍之搗涎。或四破去核。取外皮。蜜煮爲粽。食味辛。晉盧循遺劉裕益智標是此也。(陳藏器) 益智子似蓮翹子。頭未開者。苗葉花根與豆蔻無別。惟子小爾。(蘇恭) 按密含南方草木狀云。益智二月花。連着實。五六月熟。其子如筆頭而兩頭尖。長七八分。雜五味中。飲酒芬芳。亦可鹽曝及作粽食。觀此則顯微言其無華者誤矣。今之益智子。形如棗核。而皮及仁皆似草豆蔻云。(李時珍)

【益爛草】產地 出浙江永嘉縣。

形態 益爛草爲芳香草類之一種。葉如澤蘭。莖赤。高二三尺。可供藥用。

性質 苦。平。無毒。
主治 五痔脫肛。止血。炙香浸酒服。

【益旦】即寒號蟲之古籍別名。典見綱目。詳「五靈脂」條。

【盞合子】即預知子之古籍別名。典見日華諸家本草。詳「預知子」條。

【真川柏】即黃柏之處方用名。詳「黃柏」條。

【真川連】即黃連之處方用名。詳「黃連」條。

【真水仙】即水仙之古籍別名。典見靈芳譜。詳「水仙」條。

【真朱】即硃砂之古籍別名。典見和漢藥考。詳「硃砂」條。

【真芋】即芋子之古籍別名。典見新修本草圖經。詳「芋子」條。

【真京膽】即天南星之處方用名。詳「天南星」條。

【真阿膠】即阿膠之處方用名。詳「阿膠」條。

【真青黛】即青黛之處方用名。詳「青黛」條。

【真珍珠】即真珠之處方用名。詳「真珠」條。

【真風斗】即石斛之處方用名。詳「石斛」條。

【真桑瓜】即甜瓜之日本名。詳「甜瓜」條。

【真海決】即石決明之處方用名。

詳「石決明」條。

【真珠】處方用名 真珍珠。珠粉。湖瑣珠。瑣珠粉。瑣珠。李瑣珠。細瑣珠。中瑣珠。珍珠母。古籍別名 珍珠。開寶。蚌珠。

(南方志) 瑣珠(萬貫)走珠。明月南珠。神胎。腳尼。滑珠。鮫珠。蚌胎。龍珠。廟珠。西洋珠。北海珠。南海珠。李藏珠。走盤珠。南蕃珠。惡思佛。(和漢藥考) 馬價珠。(格古論)

外國名詞 Magazine. (拉丁) Pearl. (英) Peridhna. (德)

基本 係貝類之殼。內面生一種病之分泌物。就中以雙殼類中屬於異柱類之真珠介所產。最爲著名。

產地 陳仁山藥物生產辨云。珍珠產區衆廣。原日以廣東廉州。合浦產者正地道。奈近日少出。俱以南洋蘇錄爲上等。印度更多出。

架喇吉打。噠味。兩半爲聚。由此運來。和漢藥考曰。真珠產於印度。巴西。墨西哥。阿刺伯。澳洲。日本。各處之海灣。中國亦有之。

形態 真珠介一名珠母。以其

含有比重〇・九二至〇・九四

之右旋性揮發油。自三%至五%。

脂肪油一%。澱粉三%。三四兩次

改正之日本藥局方內。特收入此

藥。定名為小豆蔻 Fructus Car-

damomi (Elettaria cardamo-

num, White et Maron.) 大

抵係採收稔熟之萌果而乾燥之

顆粒作淡黃色。長一二仙米。粗約

一仙米。有鈍稜三條。且有縱脈頂

端有小嘴。內分三房。各房俱藏縱

列之種子約七粒。種子色褐。呈不

整齊之有角性。且帶皺紋。而覆以

無色菲薄之衣。種子在囊殼中時

含有極芳香之分泌物。至果殼則

無甚氣味。又和漢藥考曰。益智原

名 Cardamomum。為香味藥。

多產於東印度地方。種類頗夥。益

智。縮砂草果等皆屬之。初版日本

藥局方中收入縮砂 Fructus

Cardamomi。嘗記其基本植物

名與其形狀。至第三四版。特更名

為小豆蔻。亦記其基本形狀等。故

此 Cardamomum 之譯名與其

基本植物。當定名時。煞費苦心也。

又有譯作小益智。白豆蔻。草果等

名者。

近人學說 張山雷曰。益智始

見於藏器本草拾遺。謂之辛溫。不

言其溫。但諸家所述主治。無一非

溫。溫功用。藏器謂主遺精虛瀉。小

便餘瀝。夜多小便者。以二十四枚

碎之。入鹽同煎服。有奇效。東垣謂

治客寒犯胃。和中益氣。及人多睡

(石頑謂胃虛多睡。蓋胃氣虛寒。

而脾泉不攝。涎唾自流。此藥溫胃

而瀉。最有捷效。) 海藏謂益脾胃

理元氣。補腎虛滑瀉。皆溫補脾胃

而尤以固瀉為主。瀨湖謂其大辛

行陽退陰。三焦命門氣弱者宜之。

(此氣弱以元陽之氣而言。李氏

集驗方縮泉丸。(益智子鹽炒烏

藥等分。酒煮山藥粉為丸。) 治脾

氣不足。小便頻數。及老年陽虛遺

瀉皆效。楊仁齋直指方云。心者脾

之母。進食不止於和脾。火能生土

當使心藥入脾胃藥中。庶幾相得

古人進食藥中。多用益智土中益

火也。頤案此為脾陽虛餒。而不思

食者。立法脾土喜溫而惡寒。喜燥

而惡溼。寒溼困之。則健運力乏而

不思納穀。且食亦無味。此惟溫脾

以助陽和而斡旋大氣。則能進食。

益智醒脾益胃。固亦與砂仁豆蔻

等。一以貫之。仁齋說到益火生土

上去。附會心經之藥。尚是舍近求

遠。故意深言之。亦殊不必。瀨湖又

謂治心氣不足。夢洩赤濁。則以腎

陽無權。滑泄不禁者立論。故可用

此溫瀉一法。然遺瀉之虛寒症。絕

少。石頑謂因於熱者。色黃乾結。不

可誤用。極是。瀨湖又謂治熱傷心

系吐血。血崩諸證。則既是熱傷而

反用此大辛大熱之藥。何其背謬

一至於此。要知洪氏夷堅志所載

吐血不止。驚顛狂躁一條。用益智

等藥而愈者。本是小說家言。何可

徵信。按之病理。寧不矛盾。而乃採

入綱目。且因之而創為專治熱傷

之吐血。亦可謂好奇太過矣。

配合應用 ①佐人參。茯苓。半

夏。橘皮。車前子。則攝涎機立效。

②同藿香。蘇子。橘皮。枇杷葉。木

瓜。止逆氣上壅。

③同五味子。山茱萸。炒鹽。人參。

治小便頻數淋瀝。

④同人參。乾薑。橘皮。藿香。治因

寒犯胃作嘔吐。

⑤小便頻數。脾氣不足也。雷州

益智子。鹽炒。去鹽。天合烏藥。等分

為末。酒煮山藥粉糊為丸。如梧子

大。每服七十丸。空心鹽湯下。名縮

泉丸。(朱氏集效方)

⑥心虛尿滑。及赤白二濁。益智

子。仁。白茯苓。白朮。等分為末。每服

三錢。白湯調下。

⑦白濁尿滿。不拘男婦。用益智

仁。鹽水浸炒。厚朴。薑汁炒。等分。薑

三片。棗一枚。水煎服。(永類鈴方)

⑧小便赤濁。益智子。仁。茯苓。各

二兩。遠志。甘草。水煮各半斤。為末

酒糊丸。梧子大。空心鹽湯下。五十

丸。

⑨腹脹忽瀉。日夜不止。諸藥不

效。此氣脫也。用益智子。仁。二兩。濃

煎飲之立愈。(危氏得效方)

⑩婦人崩中。益智子。炒碾細。米

飲入鹽服一錢。(產寶方)

⑪香口辟臭。益智子。仁。一兩。甘

草。二錢。碾粉紙之。(經驗良方)

⑫漏胎下血。益智子。仁。半兩。縮砂

仁。一兩。為末。每服三錢。空心白湯

下。日二服。(胡氏濟陰方)

用量 一錢至三錢

產辨云。產瓊崖十三屬。以陵水爲上等。五六月新。

形態 益智葉似翼荷。長丈餘。其根上有小枝。高八九寸。莖如竹筍。二月花連著實。五六月熟。其子如筆頭。而頭尖長七八分。但今益智子。形如棗核。而其皮及仁。皆似草豆蔻也。但係覆果。大於縮砂。形長圓。色暗黑。頂端有小嘴。其下則有果梗。中藏細小種子。色紅褐。作多角形。氣芳香。略似沒藥。

採取 每年六七月間採實陰乾。

製法 米氏集驗方曰。凡使益智仁。去殼用鹽水炒。

性質 辛溫無毒。

成分 含有比重〇一九二至〇一九四之右旋性發揮油。自百分之三至百分之五。脂肪油百分之二。澱粉百分之三。

效能 煖腎縮小便。溫脾止洩瀉。用作健胃消化藥。又用以治遺精。小便餘瀝。及夜中尿多諸症。藥主治 遺精虛漏。小便餘瀝。益氣安神。補不足。利三焦。調諸氣。夜多小便者。取二十四枚。碎入鹽同煎服。有奇驗。

煎服。有奇驗。

歷代記述攷證 【元】王好古

湯液本草論益智曰。益脾胃理元氣。補腎虛滑瀝。【元】李東垣用藥法象論益智曰。客寒犯胃。和中益氣。及人多唾。【明】李時珍本草綱目論益智曰。冷氣腹痛。及心氣不足。夢洩赤濁。熱傷心。系吐血血崩諸證。【明】繆希雍本草經疏論益智曰。益智子。仁味辛。其氣溫。其性無毒。入足太陰。足少陰經。惟辛故所以散結。惟溫故所以通行。其氣芳香。故主入脾。其稟火土與金。故燥而收斂。以其斂攝。故治遺精虛瀉。及小便餘瀝。此皆腎氣不固之證也。腎主納氣。虛則不能納矣。又主五液。涎乃脾之所統。脾腎氣虛。二臟失職。是腎不能納。脾不能攝。故主氣逆上浮。涎穢泛溢而上溢也。飲攝脾胃之氣。則逆氣歸元。涎穢下行。宜東垣用以治客寒犯胃。和中益氣。及人多唾。王好古謂益智本脾家藥。主君相二火。故用以益脾胃理元氣。補腎虛滑瀝。劉河間又謂益智辛熱。能開發鬱結。使氣宣通。皆以其香可入脾。開鬱辛

能散結。復能潤下。於開通結滯之中。復有收斂之義故也。【清】黃宮繡本草求真論益智曰。益智氣味辛熱。功溫燥脾溫胃。及飲脾胃氣逆。藏納歸源。故又號爲補心補命之劑。是以胃冷而見涎睡。則用此以收斂。脾虛而見不食。則用此溫理。腎氣不溫。而見小便不縮。則用此鹽炒。與烏藥等分爲末。酒煮山藥粉爲丸。鹽湯下。名縮泉丸。以投與夫心腎不足。而見夢遺滑精。則用此以爲祕精固氣。若因熱成氣虛。而見崩漏夢遺等症者。則非所宜。此雖類於縮砂蜜。同爲溫胃。但縮砂蜜多有快滯之功。此則止有逐冷之力。不可不分別而審用耳。

出嶺南。形如棗核者。【清】閻立陞本草選旨論益智曰。益智味辛。微溫無毒。入手足太陰經。治心腎脾肺。和中煖胃之藥也。故凡嘔吐自利。飲食少進。脾胃受寒之故也。遺精虛漏。淋帶赤白。胃氣虛冷之故也。三焦衰弱。涕唾稠黏。肺氣淹滯之故也。惟用益智之辛溫。開發以宣暢而通理焉。使寒者溫之。虛者補之。滑者澀之。滯者和之。則君相

之火以調。脾肺之氣以健。是四經之藥也。然好古有言。益智本脾藥。在集香丸則入肺。在四君子湯則入脾。在風髓膏則入腎。三經互用。有子母相關之義。當於補中兼用之。故今人於進食劑中。用補心腎氣藥用。又方治應多小便者。取三十四枚。碎入鹽同煮服。有奇驗。其必有道矣。亦勿多服。

國外學說

日本學說謂益智漢醫用爲健胃消化藥。益智有一種芳香。是由揮發油而來者。此油在種子中。其成分含有一種「ステアロブテン」在藥局方上僅供製劑之用。如於複方丁幾類中。爲芳香性附加物而已。【又扶氏藥物學】Cardanumun。從前譯作益智。其入藥之仁。名曰 Elettaria cardamumun, Matou. 又名馬刺拔爾加他摩斯。此物產於馬刺拔爾之海岸。約在二千五百至五千尺高處。錫蘭亦有之。果實爲三稜長圓形。呈淡褐色。長一二仙米。徑一仙米許。具有維靛之線。稜與皺裂。莖微中包藏種子。約二十粒。香味特異。酷似樟腦。

益肝行血故明目益精其氣純陽。辛走而不守故除水氣肝臟有火則血逆肝涼則降而順矣大熱頭痛心煩皆血虛而熱之候也清肝散熱和血則頭疼心煩俱解【清】葉天士本草經解論芫薺子曰芫薺子氣微溫稟天初春之木氣入足厥陰肝經味辛甘無毒得地金土之味入手太陰肺經足太陰脾經氣味俱升陽也肝爲藏血之臟脾爲統血之臟辛甘益血目得血則能視所以明目脾者陰氣之原也肺者津液之原也甘辛能潤所以益精脾者爲胃行津液者也肺者相傳之官通調水道者也辛甘益脾肺則津液行而中道通所以除水氣久服益肝脾肺主周身之氣脾主周身之血肝爲生生之臟以生氣血氣血生生長旺自然身輕矣【清】陳修園本草經讀論芫薺子曰本經芫薺子主治無一字言及婦人經產之病其云微溫者得春木之氣也味辛者得秋金之味也木有制則其性和性和則有輕身之效經所謂風能生物是也其云明目者以肝開竅於目也

十 益

其云益精者以精生於飲食之菁華先散於肝而後藏之於腎也葉主癰疹瘡者以洗浴能去肌表之風也凡產後微發熱是外感微風此物甚爲對症若重症則不足恃况症重藥輕病將日深終至敗壞而莫挽今人奉爲女科聖藥貽誤滋多且其獨具之長反掩矣

近人學說 張山雷曰芫薺古人止用其子本經之明目益精則溫和養血而又沈重直達下焦故爲補益腎陰之用除水氣者辛溫下降故能通絡而逐水其莖可浴癰瘡則活血疏風之功也別錄加以微寒則亦溫亦寒大是不妥蓋當時以治熱證因而囂入此說療血逆者溫和行血又子能重墜下降故能平逆惟主大熱頭痛心煩則與溫養之性不符存而不論可也又曰芫薺古用其子今用莖葉氣烈味濃功專活血行血今三吳之俗以爲產後唯一之要藥無人不服又主經行不利腹痛臍脹皆有捷驗其稟溫和之性亦可概見而又治癰腫瘡瘍內飲其汁外敷其滓則頗似涼血解毒不知生搗

取汁其性已與煎服微有不同而辛溫之氣宜通血絡自然散毒消腫其子其莖皆具溫通之性但子則沈重下降守而不走故能補腎益精明目莖葉則扶疏旁達走而不守故能活血流氣通調經絡凡草木之枝葉花實性質各有不同皆卽此義若白花紅花之異則一類二種形式臭味皆無二致其用亦同或謂紅者主血分白者主氣分則皮相之見也

用量 錢半至三錢

施用宜忌 凡非血滯血熱及腫神散大者禁用忌鐵

【益母草苗】

原名 薺菜
性質 辛平無毒

毒

主治 破血產後腹痛養汁服
參攷資料 ①薺菜生江南陰地似益母方莖對節白花（陳藏器）②此卽益母之白花者乃爾雅所謂薺是也其紫花者爾雅所謂薺是也薺薺皆同一音乃一物二種故此條亦主血病與益母功同郭璞獨指白花者爲益母皆殷謂白花者非益母皆欠詳審嫩苗

可食故謂之菜寇宗奭言芫薺嫩苗可養食正合此也（李時珍）

【益志】卽龍眼之古籍別名典見和漢藥考詳『龍眼』條

【益志子】卽益智仁之古籍別名典見和漢藥考詳『益智仁』條

【益決草】 產地 生山陰間

草類之一種根如細辛可供藥用

性質 辛溫無毒

主治 咳久肺傷

【益明】卽益母草之古籍別名典見本經詳『益母草』條

地膚子之古籍別名典見藥性詳『地膚子』條

【益智】卽龍眼之古籍別名典見別錄詳『龍眼』條

【益智仁】 命名 脾主智此味能益脾胃故名

古醫別名 英華庫益志子（和漢藥考）

基本

爲屬於薺荷科之植物

其子實卽名益智

產地 陳藏器云凡鳳嶺國及交趾今嶺南州郡及馬刺拔爾

地方恒多產焉陳仁山藥物生

身不遂。失音不語。童便酒下。產後

氣喘。咳嗽。胸膈不利。惡心吐酸水。面目浮腫。兩脇疼痛。舉動失力。溫酒下。產後月內咳嗽。自汗發熱。久則變爲骨蒸。童便酒下。產後鼻衄。舌黑口乾。童便酒下。產後兩太陽穴痛。呵欠。心忪。氣短。羸瘦。不思飲食。血風身熱。手足頑麻。百節疼痛。並米飲化下。產後大小便不通。煩躁口苦者。薄荷湯下。婦人久無子息。用溫酒下。(各般產寶方)

⑤治婦人難產。益母草搗汁七大合。煎減半。頓服立止。無新以乾者。一大握。水七合煎服。(韋宙獨行方)

⑥治胎死腹中。益母草搗熟。以暖水少許和絞取汁。頓服之。(韋宙獨行方)

⑦治產後血暈。心氣欲絕。益母草研汁服一盞絕妙。(子母祕錄方)

⑧治產後血閉不下者。益母草汁一小盞。入酒一合溫服。(聖惠方)

⑨治帶下赤白。益母草花開時。採搗爲末。每服二錢。食前溫湯下。

(集驗方)

①治小便尿血。益母草搗汁服一升。立瘳。此蘇澄方也。(外臺祕要方)

②治赤白雜痢困重者。益母草日乾。陳麴梅燒存性。等分爲末。每服三錢。白痢乾薑湯下。赤痢甘草湯下。名二靈散。(衛生家寶良方)

③治小兒疳痢垂死者。益母草嫩葉。同米煮粥食之。取足。以瘳爲度。甚佳。取汁飲亦可也。(廣利神效方)

④治痔疾下血。益母草葉搗汁飲之。(食醫心鏡方)

⑤治一切癰瘡。婦人如乳。乳癰小兒頭瘡。及浸淫黃爛熱瘡。疥疽陰蝕。並用天麻草切五升。以水一斗半煮一半。分數次洗之。以殺瘳。(千金方)

⑥治急慢疔瘡。用益母草搗封之。仍絞五合服即消。(聖惠方)又用益母草四月連花採之。燒存性。先以小尖刀十字劃開疔根。令血出。次透根開破。捻出血。拭乾。以稻草心蘸藥。擦入瘡口。令到底良久。當有紫血出。捻令血淨。再擦藥入。

見紅血乃止。一日夜擦藥三五度。重者二日根爛出。輕者一日出。有瘡根脹起。即是根出。以針挑之。出後仍傳藥生肌。易愈。忌風寒房室酒肉一切毒物。(醫方大成方)

⑦治癰毒已破。益母草搗傳甚妙。(斗門方)

⑧治勒乳成癰。益母爲末。水調塗乳上一宿。自瘳。生瘳亦得。(聖惠方)

⑨治喉閉腫痛。益母草搗爛。新汲水一盞。絞濃汁。頓飲。隨吐愈。冬月用根。(衛生易簡方)

⑩治聾耳出汁。芫蔚莖葉汁滴之。(聖惠方)

⑪治粉刺黑斑。開闢事宜云。五月五日收帶根天麻。紫花者曬乾。燒灰。以面塗根。搗自然汁。加酸醋和。搜灰作餅。炭火煨過。收之。半年方用。入面藥。甚能潤肌。又蘇頌曰。唐天后鍊益母草澤面法。五月五日採根苗具者。勿着火。曝乾。搗羅以麵水和成團。如雞子大。再曝乾。仍作一爐。四旁開竅。上下置火。安藥中央。大火一炊久。即去大火。留小火養之。勿令火絕。經一伏時出。

之。瓷器中研治。篩再研。三日收用。如燥豆法。日用二方。每十兩加滑石一兩。胭脂一錢。

⑫治馬咬成瘡。苦低草切細。和醋炒塗之。(孫真人方)

⑬新生小兒。益母草五兩。煎水浴之。不生瘡疥。(簡要濟衆方)

⑭五月五日採紫花益母草。搗汁。分貯瓷器內。各少許。曬乾。別取和蜂蜜封固。加入參。琥珀。乳香。沒藥。血竭。沉香。丹砂。五靈脂。催生及胞衣不下神效。兼產後血暈。瘀血。薄心。惡露不行。腹痛。少腹兒枕痛。調經。治血閉經阻。經行作痛。

⑮單用和童便服。能下死胎。及治熱入血室。發熱煩躁。類傷寒。

⑯君四物湯。杜仲。阿膠。真川續斷。爲丸。安胎止漏。

⑰得生地黃。白芍藥。麥門冬。枇杷葉。青蒿子。五味子。阿膠。治血熱經行先期。及胎漏下血。

⑱同生甘菊。蒼耳草。金銀花。紫花地丁。各一握。貝母。鼠黏子。白芷。殭蠶。白及。白欬生甘草。連翹。生地黃。各三錢。熬夏枯草汁。和藥同煎。濃頓飲之。消一切疔腫發背。及無

深缺刻。似鳥頭葉。其莖頂之葉。則似艾葉。裏面色綠。夏中葉間輪生淡紫色之小唇形花。一花常結四子。是名羌蔚子。亦入藥用。

種類 益母之白花者。入氣分。卽藏器所謂鬘菜。爾雅所謂雅也。益母之紅花者。入血分。卽爾雅所謂麗也。

採取 五月採刈莖葉。九月採收子實。

製法 凡使益母膏。須三月採取。連根葉莖花洗淨。令淨於箔上攤曝。水乾。以竹刀切長五寸。勿用鐵刀。置於大鍋中。以水浸過二三寸。煎煮候草爛。水減三之二。漉去草。取汁約五六斗。入盆中。澄半日。以綿漉去濁滓。以清汁入釜中。慢火煎取一斗。如稀餚狀。磁瓶封收。性實 辛微苦寒無毒。效驗 祛瘀生新。活血調經。用作通經藥。

主治 癰癤。可作浴湯。

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新修本草論益母草曰。搗汁服。主浮腫下水。消惡毒。丁腫乳癰。丹遊等毒。併傳之。又服汁。主子死腹中及

產後血脹悶。滴汁入耳中。主痔耳。搗傳蛇虺毒。【唐】陳藏器本草拾遺論益母草曰。入面藥。令人光澤。治粉刺。【明】李時珍本草綱目論益母草曰。活血破血。調經解毒。治胎漏產難。胎衣不下。血暈血風。崩中漏下。尿血瀉血。痢病痔疾。打撲內損瘀血。大便小便不通。【清】黃宮繡本草求真論益母草曰。益母草一名羌蔚。辛微苦寒。功能入胞心胞絡。消水行血。去瘀生新。調經解毒。爲胎前胎後要劑。是以無胎而見血淋。血閉。血崩。帶血。下痛。既胎而見胎漏。臨產而見難產。已產而見血暈。疔癰乳腫等症。服此皆能去瘀生新。蓋味辛則於風可散。血可活。味苦則於瘀可消。結可除。加以氣寒。則於熱可療。並可臨症酌施。則於母自有益耳。外此番沙腹痛嘔吐之用。此濃煎飲亦取能散惡血。然氣味辛散。腫子散大者。其切忌之。益母子主治略同。但行中有補。非若益母草徒以消水行血爲事也。小暑端午及或六月六日採取。良忌鐵子。微炒妙。【清】賈九如辨藥指南論益母草曰。益

母草味苦略辛。入肝清熱疏散。專治胎前產後諸症。故名益母。凡胎前氣易滯。故惡阻而胎不安。產後血易凝。故血暈而腹痛。以此活血行氣。而不推蕩。使血氣流通。以除凝滯。大有益於陰分。故云有補陰之功。此非濡潤之物。體本枝葉。僅可通散。不可滋補。惟用之疏滯氣。卽所以養真氣。用之行瘀血。卽所以生新血耳。

國外學說 荷蘭藥鏡云。益母草又名羌蔚。有稀釋。透氣。強壯之效。於子宮諸病。心腹痛。心下牽脹。心悸。或黏液壅滯。妨礙胃之消化運動。致發緊急痛者。或肢節牽引拘攣者。以此作泡劑服飲。俱有效。洵良藥也。

配合應用 濟陰返魂丹。此方乃吉安文江高師禹備禮求於名醫所得者。其效神妙。活人甚多。能治婦人胎前產後諸疾。危證。用野天麻。又名益母。又名火欬。又名貢擔。卽羌蔚子也。葉似艾。莖類大麻。方梗四面。四五月節節開花。紅紫色。如蓼花。南北隨處皆有。白花者不是。於端午小暑。或六月六日。花正開時。連根採。採陰乾。用葉及花子。用忌鐵器。以石器碾爲細末。煉蜜丸。如彈子。隨證服用。湯使其根燒存性。爲末。酒服。功與黑神散不相上下。其藥不限丸數。病愈爲度。或丸如梧子大。每服五七十丸。又可搗汁。漉淨。熬膏服之。胎前臂腹痛。或作聲者。米飲下。胎前產後。臍腹刺痛。胎動不安。下血不止。當歸湯下。產後以童子小便化下一丸。能安魂定魄。血氣自然調順。諸病不生。又能破血。痛養脈。息調經。絡並溫酒下。胎衣不下。及橫生。不順。死胎不下。經日脹滿。心悶。心痛。並用炒鹽湯下。產後血暈。眼黑。血熱。口渴煩悶。如見鬼神。狂言不省人事。以童子小便和酒化下。產後結成血塊。臍腹疼痛。時發寒熱。有冷汗。或面垢。額赤。五心煩熱。並用童子小便酒下。或薄荷自然汁下。產後惡露不盡。結滯刺痛。上衝心胸。滿悶。童子小便酒下。產後瀉血水。以棗湯下。產後痢疾。米湯下。產後血崩漏下。糯米湯下。產後赤白帶下。煎膠艾湯下。月水不調。溫酒下。產後中風。牙關緊急。半

乾。再入酒浸。丹參四錢酒洗透。羌
蔚子四錢酒蒸透。香附三錢。以薑
土醋鹽童便甘草水乳汁。逐次製
過。用雲白朮五錢陳土炒。女貞子
三錢。以白芥車前水浸乾。用如氣
血熱加丹皮。生地。氣血寒加肉桂
數分。不真確之寒熱。而先後至者
照本方。如經閉無分婦女。本方加
牛膝。綱目拾遺。

【珠兒參】即珠參之處方用名。詳

『珠參』條。

【珠粉】即真珠之處方用名。詳『

真珠』條。

【珠實】即蓮肉之古籍別名。典見

和漢藥考。詳『蓮肉』條。

【珠樹】即青琅玕之古籍別名。典

見山海經。詳『青琅玕』條。

【珠璽】即蓮肉之古籍別名。典見

和漢藥考。詳『蓮肉』條。

【珠蘭】古籍別名。雞爪蘭花。

拾遺。芝蘭。

形態 珠蘭爲蘭之一種。枝葉
似茉莉花。發長條細蕊。與建蘭同
其香亦相似。而濃郁過之。其根可
供藥用。

主治 磨傳癰毒。

參攷資料 珠蘭性毒。止可取

其香氣。故不入藥。張璠云。中條

山有老道士。教人治狐魅。有一女

子爲雄狐所祟。教以用珠蘭根搗

爛置牀頭。俟狐來交時。塗其莖物

上。狐大噉。寢去。次日野外得一死

狐。道士云。此根狐肉沾之。即死。性

能毒狐。尤捷效也。綱目拾遺。

產地 出海中。

【珠鼈】形態 珠鼈爲介類鼈

屬之一種。其狀如鼈。有四目。六足

皆有珠。蓋蚌珠在腹。而鼈珠在足

故以名之。可供藥用。

性質 甘酸。無毒。

主治 食之辟疫癘。

產地 生山谷中。

【班珠藤】形態 班珠藤爲蔓

草類之一種。凌冬不凋。其子如珠

而有斑。可供藥用。

採取 冬月採之。

性質 甘溫。無毒。

主治 祛風活血。羸瘦婦人諸

疾。 【玳】即玳之古籍別名。典見綱目。

【病草】即艾葉之古籍別名。典見

和漢藥考。詳『艾葉』條。

【皋毼】即虎皮之古籍別名。典見

莊子。詳『虎皮』條。

【皋蘆】古籍別名。瓜蘆。陶

弘景。苦薺。過羅。物羅

綱目拾遺。唐茶。苦茶。日本

外國名詞 Thea Dineasis,

L. var. macrophylla, Sieb,

(拉丁) タウチヤ ニガチヤ

キツカフチヤ(日本)

基本 係山茶科山茶屬。

產地 生山野間。

形態 皋蘆爲味果類茶之一

種。乃常落灌木。全體與茶樹相似。

惟莖較粗。葉亦肥大而厚。長三四

寸。秋末葉腋生花。比茶花亦稍大

白色。其嫩葉不宜煎飲。可充紅茶

之料。老葉可供藥用。

性質 苦平。無毒。

主治 煮飲。止渴明目。除煩。令

人不睡。消痰利水。

歷代記述攷證 【唐】李珣海

藥本草論皋蘆葉曰。通小腸治淋

喉。

施用宜忌 凡胃寒脾冷者禁

用。

【益母草】原名 茺蔚。

子實皆莢。盛密蔚。故名。

古籍別名 益母。火秋。(本經)

聖藥。陳藏器。貞蔚。(別錄。陳權)

(爾雅)牛薺。(爾雅注)野天麻

(會編)鬱臭草。貞藿。(咎殷產寶

方)苦低草。(圖經)夏枯草。(外

臺祕要)猪麻。土質汗。(綱目)質

大。小胡麻。千層塔。天芝麻。反魂

丹。臭鬱草。透骨草。鬱臭苗。目比也

吐。(和漢藥考)

外國名詞 Leonurus japonica, L. (拉丁)

基本 屬唇形科。爲益母草之

莖葉。

產地 凡海濱及田野間恒多

生焉。陳仁山藥物生產辨云。益母

草產廣東各屬。以肇慶來者多。

形態 益母草乃雜草也。多生

原野間。春日抽莖。入夏莖高三四

尺。莖作方形。有縱溝。每節對生有

長柄之葉。葉作深裂三。各片更有

逆結之氣。

參攷資料 小切狼屬膏。與稻米爲飽。調以狼胸臆中骨和米作粥糜也。古人多食狼肉。以膏煎和飲食。故內則食狼去腸。膈。禮獸人冬獻狼。取其膏聚也。諸方亦時用狼之脂牙皮。蓋而本草並不著其功用。祇有陳藏器述狼筋疑似一說。可謂缺矣。今通攷飲膳正要諸書補之云。(李時珍)

【狼喉醫】 主治 噎病。日乾爲末。每以半錢入飯內食之妙。

【狼跋子】 原名 黃狼子。命名 跋乃狼足。其葉似之。故名。性質 苦寒。無毒。主治 惡瘡。蝨疥。殺蟲魚。

【狼脂膏】 採取 於臘月煉淨黍米。大印定。又能斷酒。主治 補中益氣。潤燥澤。塗諸惡瘡。

【狼尿】 主治 瘰癧。燒灰。油調封之。又治骨硬不下。燒灰。水服之。

【狼茅】 卽狼尾草之古籍別名。典見爾雅。詳「狼尾草」條。

【狼屎中骨】 主治 小兒夜啼。燒灰水服二黍米。大印定。又能斷酒。

【狼脂膏】 採取 於臘月煉淨黍米。大印定。又能斷酒。主治 補中益氣。潤燥澤。塗諸惡瘡。

【狼尿】 主治 瘰癧。燒灰。油調封之。又治骨硬不下。燒灰。水服之。

【狼茅】 卽狼尾草之古籍別名。典見爾雅。詳「狼尾草」條。

【狼齒】 卽狼牙之古籍別名。典見別錄。詳「狼牙」條。

【珠子仁】 卽苡仁之古籍別名。典見和漢藥考。詳「苡仁」條。

【珠子草】 卽七葉黃荊之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「七葉黃荊」條。

【珠友】 卽瑞香之古籍別名。典見和漢藥考。詳「瑞香」條。

【珠參】 原名 珠兒參。命名 本品卽人參之產於閩地。形扁而圓大如珠狀。故名。

【珠參】 原名 珠兒參。命名 本品卽人參之產於閩地。形扁而圓大如珠狀。故名。

【珠參】 原名 珠兒參。命名 本品卽人參之產於閩地。形扁而圓大如珠狀。故名。

【珠參】 原名 珠兒參。命名 本品卽人參之產於閩地。形扁而圓大如珠狀。故名。

【珠參】 原名 珠兒參。命名 本品卽人參之產於閩地。形扁而圓大如珠狀。故名。

【珠參】 原名 珠兒參。命名 本品卽人參之產於閩地。形扁而圓大如珠狀。故名。

珠參本非參類。前未聞有此。近年始行。然南中用之絕少。或云來自粵西。是三子。又云草根大約以參名。其性必補。醫每患其苦寒。友人朱秋亭。客山左。聞貨珠參者。有製法。服之可代遼參。每五錢。索價五十金。秋亭幣千金。市其方。祕不輕授。予懇其弟退谷。始得其術。因錄之以濟貧。珠參切片。每五錢。以附子三分研末拌勻。將雞蛋一個。去黃白。每殼納參片五錢。封口。用雞哺。待小雞出時取出。將雞蛋一

圈於蛋上作記。如此七次。共成七圈。其藥卽成矣。每遇垂危大症。并產褥無力吃參者。煎服五錢。力勝人參。并能起死回生。較臘狐心功力尤捷。不得少服。約人以五錢爲率。每次須多飲數兩。救人(綱目拾遺)。

⑤又接濟陰保元湯。咸在醫鈴。此方理脾化邪。生氣引氣。生血爲調經聖藥。瀉珠參三錢。以米仁四錢。并水煎透。咀片。再入。加米仁汁。蒸晒乾。用懷生地一兩。砂仁。酒黃。三味。拌蒸。九曬。收。再以瓦焙爲炭。當歸四錢。白芍三錢。酒炒。川芎二錢。去淨油。米泔水浸洗。收

珠參本非參類。前未聞有此。近年始行。然南中用之絕少。或云來自粵西。是三子。又云草根大約以參名。其性必補。醫每患其苦寒。友人朱秋亭。客山左。聞貨珠參者。有製法。服之可代遼參。每五錢。索價五十金。秋亭幣千金。市其方。祕不輕授。予懇其弟退谷。始得其術。因錄之以濟貧。珠參切片。每五錢。以附子三分研末拌勻。將雞蛋一個。去黃白。每殼納參片五錢。封口。用雞哺。待小雞出時取出。將雞蛋一

圈於蛋上作記。如此七次。共成七圈。其藥卽成矣。每遇垂危大症。并產褥無力吃參者。煎服五錢。力勝人參。并能起死回生。較臘狐心功力尤捷。不得少服。約人以五錢爲率。每次須多飲數兩。救人(綱目拾遺)。

⑤又接濟陰保元湯。咸在醫鈴。此方理脾化邪。生氣引氣。生血爲調經聖藥。瀉珠參三錢。以米仁四錢。并水煎透。咀片。再入。加米仁汁。蒸晒乾。用懷生地一兩。砂仁。酒黃。三味。拌蒸。九曬。收。再以瓦焙爲炭。當歸四錢。白芍三錢。酒炒。川芎二錢。去淨油。米泔水浸洗。收

珠參本非參類。前未聞有此。近年始行。然南中用之絕少。或云來自粵西。是三子。又云草根大約以參名。其性必補。醫每患其苦寒。友人朱秋亭。客山左。聞貨珠參者。有製法。服之可代遼參。每五錢。索價五十金。秋亭幣千金。市其方。祕不輕授。予懇其弟退谷。始得其術。因錄之以濟貧。珠參切片。每五錢。以附子三分研末拌勻。將雞蛋一個。去黃白。每殼納參片五錢。封口。用雞哺。待小雞出時取出。將雞蛋一

圈於蛋上作記。如此七次。共成七圈。其藥卽成矣。每遇垂危大症。并產褥無力吃參者。煎服五錢。力勝人參。并能起死回生。較臘狐心功力尤捷。不得少服。約人以五錢爲率。每次須多飲數兩。救人(綱目拾遺)。

⑤又接濟陰保元湯。咸在醫鈴。此方理脾化邪。生氣引氣。生血爲調經聖藥。瀉珠參三錢。以米仁四錢。并水煎透。咀片。再入。加米仁汁。蒸晒乾。用懷生地一兩。砂仁。酒黃。三味。拌蒸。九曬。收。再以瓦焙爲炭。當歸四錢。白芍三錢。酒炒。川芎二錢。去淨油。米泔水浸洗。收

珠參本非參類。前未聞有此。近年始行。然南中用之絕少。或云來自粵西。是三子。又云草根大約以參名。其性必補。醫每患其苦寒。友人朱秋亭。客山左。聞貨珠參者。有製法。服之可代遼參。每五錢。索價五十金。秋亭幣千金。市其方。祕不輕授。予懇其弟退谷。始得其術。因錄之以濟貧。珠參切片。每五錢。以附子三分研末拌勻。將雞蛋一個。去黃白。每殼納參片五錢。封口。用雞哺。待小雞出時取出。將雞蛋一

【狼把草】即狼把草之訛見『狼把草』條。

【狼毒】**命名** 本品毒性猛烈如狼故觀其名則知其毒矣。

古籍別名 狼青草（崇原續毒）和漢藥考。

基本 爲狼毒草之根。

產地 陳仁山藥物生產辨云。

狼毒即尖尾木芋頭也各屬皆有三月新。

形態 狼毒葉似商陸及大黃。

莖葉上有毛四月開花八月結實其根皮黃肉白以實重者良輕者力劣。

採取

二月八月採根陰乾。

製法 凡使以陳久者良宜醋炒入藥用。

用法

恒以剉末和作丸散。

性質 辛平有毒。

效能 止九種心痛殺一切蟲。

痛用作鎮痛藥又爲殺蟲藥。

主治 咳逆上氣破積聚飲食。

寒熱水氣惡瘡鼠瘻疽蝕鬼精蟲。

毒殺飛鳥走獸（本經）除胸下積。

僻（別錄）。

歷代記述攷證 【宋】大明諸

家本草論狼毒曰治痰飲癥瘕亦

殺鼠【明】李士材本草圖解論狼

毒曰狼毒辛平有大毒陳而沉水

者良主咳逆治蟲疽癰癰結痰驅

心痛【清】張隱菴本草崇原論狼

毒曰狼青草有大毒稟火氣也氣

味辛平莖葉有毛入水則沈稟金

氣也稟金氣故主治肺病之咳逆

上氣金能攻利故破積聚破積聚

則飲食壅滯而爲寒爲熱之病亦

可治矣水氣水寒之氣也水氣而

濡則有惡瘡鼠瘻疽蝕并鬼精蟲

毒之病狼毒稟火氣而溫膿寒故

皆治之又言其毒能殺飛鳥走獸

草以狼名殆以此故。

國外學說 本草類編曰狼毒

二月八月採根陰乾四月開花八

月結實本草綱目啓蒙曰昔時有

自漢傳來者形如商陸皮黃白色

有橫紋甚密如真正羌活多疣瘤

肉白色地錦抄曰狼毒春自宿根

生葉多毛花黃色開於八九月日

俗呼「粟橘」。

配合應用 ①治腹中冷痛水

穀陰積心下停痰兩脇痞滿按之

鳴轉逆害飲食用狼毒三兩附子

一兩旋覆花三兩搗末蜜丸梧子

大每服三丸食前白湯下日三服

亦治兩脇氣痛（肘後方）

②治陰疝欲死丸縮入腹急痛

欲死狼毒四兩防風二兩附子三

兩燒以蜜丸梧子大每服三丸日

夜三度白湯下（肘後方）

③治一切蟲病川狼毒杵末每

服一錢用饒一息子大沙糖少許

以水化開臥時空腹服之次早即

下蟲也（集效方）

④治乾溼蟲疥狼毒不拘多少

搗爛以猪油馬油調搽患處方睡

勿以被蒙頭恐藥氣傷面此維揚

潘氏所傳方（蘭氏經驗方）

⑤治積年疥癩狼毒一兩一牛

生研一半研炒輕粉三合水銀三

錢以茶末少許於瓦器內以津液

擦化爲末同以清油浸藥高一寸

三日待藥沉油清過夜不見燈火

藥油塗瘡上以口鼻於藥杯上吸

氣以取效（永類鈴方）

⑥治積年乾癬生瘡搔之黃水

出每逢陰雨即痒用狼毒末塗之

（聖惠方）

⑦治惡疾風癩狼毒秦羌等分

爲末每服方寸匕溫酒下日二服

或一服（千金方）

⑧治心腹連痛作脹用狼毒二

兩附子半兩搗篩蜜丸梧子大

日服一丸二日二丸三日三丸止

又從一丸起至三丸止以瘳爲度

（肘後方）

用量 三分至八分。

施用宜忌 凡非氣壯邪實者

禁用惡麥句薑長占斯蜜陀僧大

豆爲之使。

著名方劑 九痛丸治九痛。

一蟲二蛀三風四悸五食六飲七

冷八熱九氣又治連年積冷流

注心胸及落馬墮重瘀血中蠱等

證局方狼毒（炙香）吳茱萸

（湯泡）巴豆（去心取霜）乾薑

（炮）人參各一兩附子（去皮）三

兩右各爲末煉蜜丸梧子大每空

腹溫酒下一丸。

參攷資料 ①狼毒合野葛納

耳中治聾（抱朴子）②狼毒生秦

亭山谷及奉高二月八月採根陰

乾陳而沉水者良（別錄）③秦亭

在隴西奉高是大山下縣陶云沉

【狼尾】

主治 驚馬胸前辟邪
氣令馬不驚

【狼尾草】

命名 本品穗狀似
狼尾故名

古籍別名 狼薹郎狼茅孟（爾雅）宿田翁守田（詩疏）

產地 生原野田澤及道旁間

形態 狼尾草為穀類之多年生草本其莖直立而堅有小刺毛葉細長而尖有並行脈秋日莖頂生黑褐色長刺毛出穗五六寸作圓柱形如粟花紫色列為穗狀花序密生長芒其米可供藥用

性質 甘平無毒

主治 作飯食之令人不饑

【狼把草】

原名 耶耶草
命名 閩人呼為

耶龍狼把當作耶龍乃通故本品即是耶耶草

古籍別名 附草虱草田五加

木（和漢藥考）

外國名詞 Bidens tripartita L. (拉丁)

基本 屬菊科狼把草之葉莖

產地 凡山野道旁川澤水濱

及田畦間皆有生焉

形態 狼把草為一年生草春季抽莖高達二尺餘其葉或裂為三或裂為五作卵圓披針形邊緣有粗鋸齒每節對生惟梢上之葉則為作披針形之單葉夏季於枝梢開黃色筒狀花冠頭狀花總苞外另有多數有柄之小葉秋季結刺栗毬狀實成熟立即脫落附他物以達遠方故日本俗呼此為附草虱草



狼 把 草

採取 夏月三伏中刈取陰乾

性質 苦平無毒

成分 據東京衛生試驗所高橋增次郎氏之分析言狼把草中含有樹脂（稍多量）揮發油（極少量）蠟（稍多量）鞣酸（多量）加鐵液則呈綠色）苦味質（極少量）黏液質（多量）無機鹽類（多量）礬石及綠化鉀）據氏言未見有可治肺病之物質云

效能 療血痢治癰瘡用作健

胃利尿藥

主治 黑人髮令人不老又云耶耶草主赤白久痢小兒大腹痞滿丹毒熱取根莖煮汁服

歷代記述攷證 【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論狼把草曰狼把草主丈夫血痢不療婦人根治積年疳痢取草二斤搗絞取汁一小升納白麵半雞子許和勻空腹頓服極重者不過三服或收苗陰乾搗末蜜水半碗服一方寸匕【明】李時珍本草綱目論狼把草曰可染鬚髮治積年癰天陰即痒搔出黃水者搗末搽之

國外學說 日本農學士原田東一耶氏著「藥用草木栽培法」之狼把草條下載有類似草之識別法摘錄於左以供參考（一）真正狼把草多生於溼地能受陽光之處類似草則生於堤岸竹園等乾燥之地（二）真者粗大節與節間互相接近類似草則纖細節與節間相距頗長（三）真者枯時即變黑褐色類似草則變黃褐色（四）真者葉對生類似草之葉則非對生（五）真者有花被枯後仍貼

附花萼從不脫落類似草則未有花被貼附花萼者上野藥學士更分析狼把草據云其水製成幾斯如仍溶化於水時見有物質析出聚集檢之知該析出物係由可溶於酒精之樹脂狀物及可溶於熱湯之無機鹽類（礬石及綠化鉀）而成其樹脂狀物質根據試驗之反應假定屬於糖原質或苦味質又和漢藥考曰係民間藥謂治肺病有特效云（一）說此草雖無治肺功效但煎湯飲之能使胃強健治咳利尿）醫學博士中西氏著有「狼把草藥談」一文醫學博士遠山氏著有「迷信狼把草」一文俱論該藥對於肺病並無何等功效云

用量 煎成茶狀日服三合至五合或錢半至三錢

參攷資料 ①方士言耶把草即虱尾草功用亦近之但無的據（李時珍）②狼把草生山道旁與穗秋子並可染皂又曰耶耶草生山澤間高三四尺葉作麻商如鬼針苗鬼針即鬼針也其葉有極如銀腳狀（陳藏器）

（四）真者葉對生類似草之葉則非對生（五）真者有花被枯後仍貼

砂汞其狀頗與方解石相似但投水不冰者爲眞其出金穴中者名握雪礬石(李時珍)

【特迦香】 古籍別名 鷹嘴香(綱目拾遺)

主治 辟邪去疫安魂魄定驚悸

參攷資料 出弱水西形如雀卵色頗淡白焚之辟邪去穢鬼魅避之博物志載漢武帝焚西使香宮中病者盡起徐奮得鷹嘴香焚之一家獨不疫疾卽此類歟(五雜俎)

【狻猊】 卽獅之古籍別名典見綱目詳「獅」條

【狼】 古籍別名 毛狗(綱目) 牡者名獾子名獾(爾雅)

外國名詞 Canis lupus L. (拉丁) (Wolf) (英) オーカミ(或オホカミ(日本))

基本 係脊椎動物哺乳類有胎盤類食肉類裂腳類犬科

形態 狼爲獸類犬屬之一種形酷似犬性猛惡常食哺乳類鳥類動物眼裂斜有凶光鼻長口裂深耳殼小而尖頸上生剛毛呈粗

頸之觀體瘦背略傾斜肩高聳四肢長能涉水毛剛硬肩頸臂各部爲尤長體黃或褐灰口吻黑頰及眼之上部淡黃或灰褐上唇與上顎白色前肢之腕部有黑色條紋尾下垂常蓬鬆全體常發一種惡臭長約五六尺高約三尺性凶惡食生物其肉可供藥用

性質 鹹熱無毒

主治 補益五臟厚腸胃填骨髓腹有冷積者宜食之

【狼子】 卽狼牙之古籍別名典見別錄詳「狼牙」條

【狼牙】 命名 本品根黑如獸之齒牙故名

處方用名 狼牙根

古籍別名 牙子(本經)狼齒

狼子別錄犬牙抱牙吳普支蘭(李當之)源草(日本)

外國名詞 Potentilla Cry. photoeanae, Maxim. (拉丁) ツモトサウ ミナモトサウ

基本 係薔薇科委陵菜屬藥用狼牙之根與莖葉

產地 多在山野川谷間

形態 狼牙爲毒草類之野生草本莖頗長質硬而直立上部之葉每葉皆有三小葉花黃色花序由數花而成有萼樣之花雌蕊多數各雌蕊含一腋珠花後結乾果色黑

性質 苦寒有毒

主治 邪氣熱氣疥癬惡瘍瘡痔去白蟲

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論狼牙曰治浮風癢瘡煎汁洗惡瘡【宋】大明諸家本草論狼牙曰殺腹臟一切蟲止赤白痢煎服【清】黃元御長沙藥解論狼牙曰狼牙味苦性寒入足厥陰肝經清肝之鬱熱療女子之陰瘡金匱狼牙湯(狼牙三兩水四升煮半升以綿經筋如繭浸湯瀝陰日四)治婦人少陰脈滑而數陰中生瘡蝕爛者尺中候腎尺脈滑數是木鬱於水而生下熱法當陰裏生瘡溫熱蒸腐故剝蝕而壞爛狼牙清鬱熱而達肝止蝕爛而消痛癢也【清】張隱庵本草崇原論狼牙曰狼性燥智此草根如獸之牙齒而專以狼名者疑取其上下齧

通之義寒水之氣上行則能散在表之邪氣熱氣以及皮膚之疥癬惡瘍苦寒之氣下洩則能除在下之瘡痔以及在內之白蟲金匱要略曰少陰脈滑而數者陰中即生瘡陰中蝕瘡爛者狼牙湯洗之此草氣味苦寒稟性純陰故能治少陽之火熱瘡爛也

配合宜忌 惡地榆棗肌蕪荑爲之使

參攷資料 ①狼牙生淮南川谷及冤句八月採根暴乾中濕腐爛生衣者殺人別錄②葉青根黃赤六七月華八月實黑正月八月採根(吳普)③所在有之苗似蛇莓而厚大深綠色根黑若獸之牙三月八月採根日乾(韓保昇)④范子計然云出建康及三輔色白者善(李時珍)

【狼牙根】 卽狼牙之處方用名詳「狼牙」條

【狼牙莖及葉】 主治 金瘡出血婦人陰蝕小兒陰瘡

主治 暖人辟邪惡氣

【狼皮】 主治 暖人辟邪惡氣

煙葉搗汁。浸松香。曬乾入藥。亦取其氣味以透利筋絡也。(葉天士種福堂方)

●治毒蛇咬傷。先避風。擠出惡血。用生煙葉或乾葉搗研傅之。或煙膏煙灰皆可。(慈航活人書方)
●辟臭蟲。煙葉鋪牀代褥。或燒熏之盡絕。

參攷資料 烟葉生者有毒。食之即中毒。雖治。其莖更烈。凡溪塘中大魚。雖捕用烟壘。到末同青胡桃皮。搗爛置水中。大魚輒如醉。浮水面。小魚皆死。雖鱧鱖蠔蝦龜蟹蚌蛤之屬。無一活者。其毒之烈如此。但造烟吸之。則味淡迥不如葉之味厚耳。(綱目拾遺)

【烟桿】

基本 本品爲吸旱烟

用之竹管。以年久色黑毛竹。男子用者良。

主治 婦人血崩。

參攷資料 ●新昌張姓。茹竹

烟管四十餘年。色如漆而光可鑑。珍同拱璧。雖感好不輕假也。母病無藥。傾資質錢二緡。典主子患損病。諸藥罔效。或謂非多年竹烟管不可治。遂取張物截之數寸。煎湯

服之。愈後酬張以巨萬金。(秋燈叢話)

●烟桿雖受烟火熏漬之氣。然非藉人氣津液漸漬之。必不酥透。其桿經男子食者。光澤可鑑。一經婦人口。便色黯不鮮明。且多直裂紋。又最忌薰。凡多年好桿。持以上廁。能令光澤若象牙。桿便裂開。走油不堪用。物性之相忌如此。

(陳毅齋) ●殺蟲毒傳屍瘡。塗惡瘡。劈取中心油。透而酥者。搗如糊。塗瘡。即疔。或攤油紙上。貼治蟲腦。(陳毅齋) ●毒蛇咬傷。先取婦人舊油頭繩。紮住腫處。勿令腫上。再取耳垢封之。止痛。隨用多年油黑竹烟筒。桿紫色者亦可。毛竹最佳。一段約長三寸。咀嚼嚥汁。渣淡吐去。并取桿中之油。搽患處。烟桿味辣。服之反耐。蛇毒亦隨解。痛止自愈。試效多人。凡蛇咬有蛇齒留肉內者。烟油塗之。即出。(百草鏡)

●凡血崩諸藥不效者。用多年舊烟桿。紫色油透者佳。截一寸。燒灰。黃酒調服。下喉。即止。屢試屢效。(劉怡軒)

【烟筒頭中煤】

主治 蜈蚣咬傷。取烟筒

頭內硬煤。擦之。立時止痛。

●治 風寒濕熱。骨節疼痛。痠痺不仁。鶴膝風。歷節風。偏頭風。漏肩風。毒蛇咬傷。辟臭蟲。兼治腦漏。

參攷資料 菸葉半劬。曬乾。研極細末。調花露。四兩。曬乾。用玫瑰餅。再研吹入。吃蘭花烟。成腦漏者。以白麝香。骨燒烟。燻之。數日。愈。蘭花乃江西賈人帶來一種。蘭子即澤蘭子也。氣香烈。取其子研。拌入烟名曰蘭花烟。人食之作。蘭花香。然其氣薰。上往往入頂。傷腦。易成腦漏。(楊春泥驗方)

【烟膠】

命名 本品係熏消牛

皮。竈及燒瓦窖所結之黑土。由烟煤結如膠狀。故名。

主治 頭瘡。白禿。疥瘡。癬。癩。痛流水。取牛皮竈岸爲末。麻油調塗。或和輕粉少許。

【烟藥】

基本 烟藥爲石類之

性質 一種。可供藥用。辛溫有毒。

主治 癰癰。痔瘡。瘡根。根腫。

●煬鐵石。即慈石之古籍別名。典見本草衍義。詳「慈石」條。

【特生礬石】

命名 本品所

附着於他石而生。故名。古籍別名 蒼礬石。蒼石。(別錄)

●昆毒。梁州礬石。(綱目)

製法 徐之才曰。火煉之良。性質 甘溫有毒。

主治 明目。利耳。腹內絕寒。破堅積。及風癱。殺百蟲。蠱獸。蒼石主寒熱。下氣。瘰癧。殺禽獸。配合宜忌 畏水。

參攷資料

●別錄云。礬石久

服。令人筋癢。特生礬石。久服。能延年。丹書亦云。礬石化爲水。能伏水銀。煉入長生藥。此皆方士謬說也。與服礬石。永長生之義同。(李時珍)

●礬石有數種。白礬石。蒼礬石。紫礬石。紅皮礬石。桃花礬石。金星礬石。銀星礬石。特生礬石。但是一物。但以形色立名。其性皆熱毒。並可毒風制承。惟蒼白二色入藥。

用。諸藥生於山。則草木不生。霜雪不積。生於水。則水不冰凍。或有溫泉。其氣之溫。可知已。庚辛玉册云。舉陽石也。生山谷水中。濯出似礬。有文理。橫截在其中。爲佳。伏火制

極膏。又曰氣泥。曰五行丹。剔以燃燈代油。則一切毒蟲皆不近入水。蛟龍亦畏之。入藥。舊竹桿劈取者。良。凡梅條。藤條。紫檀。烏木。老鶴草。及純銅。純銀桿中油。皆不及竹中者性良。惟象牙桿中烟油。可殺蟲毒。固有橄欖木烟桿。其中油可毒魚。至烟膏亦各隨所食烟質為高。下烟肆所市烟。俱以烟葉噴油。打成塊。用鐵錘披竹絲售之。此為純葉。不雜。為上品。更有打塊時。夾素葉。雜以礬紅錫成絲。再加薑黃末。以和其色者。其氣燥烈。損人。烟膏亦淡而薄。不及上品力厚也。海鹽朱進士醒菴云。烟油解蛇毒。初不甚信。後見里人獲一赤練蛇。長八九尺。粗如臂。口吐毒烟。一人近之。蛇噴以氣。即腹裂死。一人戲以舊竹烟桿。去頭嘴。以竹絲通出油。刺入蛇口。蛇噴之。即瞑目閉口。身捲縮。俄復伸長。如是數次。直如繩而斃。始知其解毒殺蟲之功。信不虛謬。諸城劉仲旭少府云。西北口外。出一種毒蟲。名曰蠼蟻。狀如中土蠅。人出遇之。即觸人面。不論何處。被其觸者。亦不甚痛。頃覺眼

眶四圍出細蛆。攢食睛膏。痛不可忍。彼土人治法。惟取烟桿四五枝。折取烟油。塗目內。痛忍片時。其蛆皆死。然後再用溫水洗去烟油。即愈。(陳穀齋)

【烟花】即烟草之古籍別名。典見和漢藥考。詳【烟草】條。

【烟珠】即梁上塵之古籍別名。典見綱目。詳【梁上塵】條。

【烟草】古籍別名。實菸草。烟草。長命草。淡肉蕒。延命草。相思草。貧報草。南蠻草。返魂草。(和漢藥考) 淡芭菰。(植物學大辭典)

外國名詞 Nicotiana tabacum, L. (拉丁) タバコ (日本) 基本 係茄科烟草屬。為煙草之葉。

產地 原產地在南美及西印度諸島。今則各國有之。我國向產於福建。現今種者尤夥。

形態 烟草為毒草類。一年生草本。種類甚多。栽者另闢煙圃。種之莖圓。高五六尺。葉為闊大之橢圓形。末端帶尖。皆互生。葉柄短。若以葉面抱其莖者。故作水漬式。長

尺許。而黃綠。青較淡。乾則變枯褐色。具有麻醇性。味苦。葉與莖俱有微細之茸毛。毛頭有黏液腺。花開於秋初。時則花梗抽出。放淡紅紫色之花。長寸許。為五裂漏斗狀之合瓣花。排列作短穗狀。果實為蒴果。形圓如球。又似卵。中藏無數淡褐色之細小種子。



烟草

性質 辛。溫。微毒。

成分 主要成分。一為植物鹽基。名尼古丁 Nicotin. (煙草中尼古丁之含量。視產地種類種植法等而有多少之別。有祇含百分之二者。有多至百分之九者。此尼古丁係千八百二十八年濃攝爾托及伊衣滿兩人最先發見。) 一為煙草精。名尼可可丁 Nicotina. (又名煙草腦) 其灰分中則含有加里石灰。酸化里胃謨等。

歷代記述攷證 【清】黃宮繡本草求真論烟草曰。下咽。即能醉人。且或醉倒而復甦。其性力之猛。殆非他物所能比類者矣。景岳云。吸其味。則辛而鮮甘。審其氣。則溫而且熱。凡書所述烟草。皆言在表。則能散。陰助陽。如由巔惡毒瘰癧。而致癰理閉。筋骨痠痛。服此可以見效。在裏則能開胃和中。凡因風寒食滯。而致霍亂嘔吐。宿食難消。膨脹鬱結。下陷後墜。服此亦克有功。且其氣一入人口。不比常度。頃刻而周一身。令人通體俱快。醒能使人醉。醉能使人醒。饑能使人飽。飽能使人饑。以之代酒代茗。終身不厭。卒不能以妨人。其故何耶。蓋緣烟性猛。人不能勝。故下咽即醉。醉因氣耗。理固然也。然烟氣易散。而人氣隨服。陽性留中。旋亦生氣。雖散仍補。此惟陰滯者用之。如神。若陽盛氣越。多燥多火。及氣虛氣短。多汗者。皆不宜用。閩產者最佳。

配合應用 ①治風寒濕氣。骨節疼痛。瘰癧不仁。鶴膝風。歷節風。及偏頭風。漏肩風。有見明膏。用鮮

十畫 烏烘烙烟

草、馬蘭菊。各一握搗汁。徐嚥。祖傳方也。〔醫藥正傳方〕

●治項下熱腫。俗名蝦蟆瘰。五葉藤搗傳之。〔丹溪纂要方〕

●治一切腫毒。發背。乳癰。便毒。惡瘡。初起者。並用五葉藤。或根一握。生薑一塊。搗爛。入好酒一盞。絞汁。熱服。取汗。以渣傳之。即散。一用大蒜代薑亦可。〔壽域神方〕

●治跌撲損傷。五爪龍搗汁。和童尿熱酒服之。取汗。〔簡便方〕

●參攷資料 ●五葉如白蘇。故曰烏蘇。俗名五爪龍。江東呼龍尾。亦曰虎葛。曰龍。曰葛。並取莖形。赤澀與赤葛及拔音相近。〔李時珍〕

●莖端五葉。開花青白色。所在有之。夏採苗用。〔韓保昇〕 ●墟野間甚多。其藤柔而有稜。一枝一鬚。凡五葉。葉長而光。有疎齒。面青背淡。七八月結包成簇。青白色。花大如粟。黃色。四出。結實大如龍葵子。生青熟紫。內有細子。其根白色。大者如指。長一二尺。搗之多涎滑傳滋。醫學集成謂即紫葛。楊起簡便方謂即老鴉眼睛草。斗門方謂即何首烏。並誤矣。〔李時珍〕

【烏蘇莖葉】 性質功用與根同。詳「烏蘇莖」條。

【烏鰓】 即鰓魚之古籍別名。典見綱目。詳「鰓魚」條。

【烏欖】 命名 本品即橄欖之烏色者。故名。

產地 廣東番禺諸地。

形態 烏欖為橄欖屬之一種。樹高。端直而多獨幹。至頂乃布枝柯。有雌有雄。結子如棗。大長寸許。光澤。無稜角。其瓣先生者向下。後生者向上。八九月成熟。皮青黑。肉白。有文層。疊如海螵蛸狀。其仁肥大。與實俱可供藥用。

採取 以長竿擊之。或刻其幹東。納以紅繩。則其幹束之子遂落。刻其幹之西。或南北亦然。

性質 甘。溫。無毒。

主治 補血。

參攷資料 橄欖即今常食之青果。概仁可治咽喉者。亦指青果核中仁而言。非指烏欖仁也。橄欖有青烏二種。閩人以白者名青果。粵中止名白欖。不曰青果也。白欖利微。人少種焉。烏欖下番禺諸鄉皆種之。種至二年。其秧長八九尺。

必扞之乃結實。扞至三年。而子小。收十年而大。收矣。烏欖子以溫水泡。候衣紫脂浮起。溢出乃可食。水冷則生膠。熱則肌膚反實。總二欖論之。白欖雄而烏欖雌。白屬陽而烏屬陰。陽故色白而行氣。陰故色紅而補血。惟烏者陰。故有仁可食。白者陽。故仁小而不成。此其別也。〔超學敏〕

【烏欖子仁】 性質 甘。淡。無毒。

主治 潤肺下氣。補血。殺諸魚毒。

【烏欖】 即菱粳之古籍別名。典見本草拾遺。詳「菱粳」條。

基本 本品非謂火烘。即青綠柿子收置器中。

【烘柿】 自然紅熟如烘成。澀味盡去而甘如甜者。

性質 甘。澀。寒。無毒。

主治 通耳。鼻氣。治腸胃不足。解酒毒。腰胃間熱。止口乾。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論烘柿曰。續經脈氣。

參攷資料 ●飲酒食紅柿。令人易醉。或心痛欲死。別錄言解酒。

毒。失之矣。〔李時珍〕 ●生柿性冷。鹿心柿尤不可食。令人腹痛。〔陶弘景〕 ●凡柿皆涼。不至大寒。食之引痰。為其味甘也。日乾者食多。動風。凡柿同蟹食。令人腹痛。作瀉。二物俱寒也。〔寇宗奭〕 ●按玉璣百一選方云。一人食蟹。多食紅柿。至夜大吐。繼之以血。皆不肯人。一

道者云。惟木香可解。乃磨汁灌之。即漸醒而愈也。〔李時珍〕

【烘柿】 即柿之古籍別名。典見綱目。詳「柿」條。

【烙鐵草】 即雷公藤之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「雷公藤」條。

基本 係烟具中所積滯之流質也。

【烟油】 古籍別名 五行丹。綱目。

性質 辛。微毒。

主治 毒蛇咬。蜈蚣咬。

參攷資料 ●烟油入口。如小兒及好吃烟者。誤犯之。若將別種湯洗。愈洗愈疼。必至瞎而後已。須用亂頭髮或麻繩緩緩揉之。即愈。〔同壽錄〕 ●烟油乃五行之氣相合而生。近日外丹家用以點藥。金又可益金色。術士隱其名呼為太

用惡白芨、白斂附子。

參攷資料 ①海螵蛸亦治牛

馬障翳(蘇恭)②海螵蛸投於井

水蟲皆死(陳藏器)③烏賊骨久

服絕嗣無子(張鼎)④按本經云

主癥瘕無子別錄云令人有子孟

詵亦云久服益精而張鼎此說獨

相背戾必誤矣若云血病無多食

鹹烏鰂亦主血閉故有此說然經

閉有有餘不足二證有餘者血滯

不足者肝傷烏鰂所主者肝傷血

閉不足之病正與素問相合豈有

令人絕嗣之理當以本經別錄爲

正恐人承誤故辨正之(李時珍)

⑤陶隱居言此是鵝鳥所化今其

口腹具存猶頗相似腹中有墨可

用故名烏鰂能吸波吸墨令水涸

黑自衛以防人害又南越志云其

性嗜鳥每自浮水上飛鳥見之以

爲死而啄之乃卷取入水而食之

因名烏鰂言爲鳥之賊害也(蘇

頌)⑥案羅願爾雅翼云九月寒

鳥入水化爲此魚有文墨可爲法

則故名烏鰂鰂者則也骨名鰂鰂

象形也(李時珍)⑦魚有兩鰭遇

十畫 烏

名鰂魚(大明)①近海州郡皆有

之形若革囊口在腹下八足聚生

於口旁其背上只有一骨厚三四

分狀如小舟形輕虛而白又有兩

鰭如帶甚長腹中血及膽正如墨

可以書字但逾年則迹滅惟存空

紙耳世言烏鰂懷墨而知禮故俗

謂是海若白事小吏也(蘇頌)②

烏鰂無鱗有鬚黑皮白肉大者如

蒲扇燒熟以薑醋食之脆美背骨

名海螵蛸形似棉蒲子而長兩頭

尖色白脆如通草重重有紋以指

甲可刮爲末人亦鑊之爲細飾又

相感志云烏鰂過小滿而形小也

(李時珍)

【烏鰂魚肉】

性平。無毒。

主治 益氣強志。

歷代記述攷證 【宋】大明諸

家本草論烏鰂肉曰益人通月經

參攷資料 烏鰂肉味珍美。動

風氣(吳瑞)

主治 耳聾。

【烏鰂魚腹中卵】

性平。無毒。

主治 開胃利水。

【烏鰂腸中墨】

主治 血刺

心痛。醋磨服

之。炒研。醋調服亦可。

【烏鰂死蠶】

基本 本品爲

蠶在簇上爛死

而黑臭者。

主治 蝨瘡有根者。及外野雞

病。並傳之。白死者主白遊癬。赤死

者主赤遊癬。

【烏蘇莓】

命名 本品五葉如

白蘇故名。

古籍別名 五葉莓。龍草。(陶

弘景)拔龍葛(爾雅)赤葛五爪

龍(綱目)赤潑藤(綱目)五葉葛

五潑藤(和漢藥考)五葉屯(綱

目)五龍草(綱目)

外國名詞 Cissus Japonica,

Willd. (拉丁)

基本 屬葡萄科爲烏蘇莓之

根。

產地 多在山野川谷及平澤

園雜間。

形態 烏蘇莓爲山野自生之

本呼爲「蘇枯」葉互生。爲五個掌

狀複葉。夏月於枝梢開黃綠色四

瓣小花。作聚繖花序排列。後結圓

實。略與南天燭實同大。初綠色。成

熟則變黑色。根爲黃白色。長一二

尺。其粗如指。搗之有汁。



烏蘇莓

採取 四五月採之。

用法 根搗汁外塗。或內飲。葉

採熟外貼之。

性質 酸。苦。寒。無毒。

效能 清熱毒。消癰腫。用治癰

瘍。凡癰癤瘡腫。蟲咬。搗根傳之。

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新

修本草論烏蘇莓曰。風毒熱腫。游

丹。搗傳并飲汁。【明】李時珍本草

綱目論烏蘇莓曰。涼血解毒。利小

便。根搗酒服。消癰腫神效。

配合應用 ①治小便尿血。五

葉藤。陰乾爲末。每服二錢。白湯下。

(衛生易簡方)

②治喉痺腫痛。五爪龍草。車前

有餘者多爲氣與寒與積所逆。證發於暫或痛或實。通劑乃可用之。不足者。衝任內竭。其證無形。其來也漸。不可用通劑。烏賊所主者。乃肝傷血閉不足之病也。即漏漏亦有餘不足之分。其爲熱所乘致傷衝任者。是謂有餘。可治以黃連解毒湯。其肝腎受傷而衝任之氣不能約制經血者。是謂不足。治以烏賊骨末醋湯調下是也。然則用烏賊骨或通或止。總爲益肝腎之陰氣而已。血隨氣而行。亦因氣而固。方書概言中氣。而不言肝腎之氣。雖補益中氣。亦可以治肝腎。第由肝腎之虛以傷中氣者。不本病因而投之可乎。且陰氣陽氣之治有殊。此味真陰氣之專以化血而血黑。故肝腎之陰氣有損者。投之適宜。不漫同他味之能益陰也。女子赤白帶下。方書多主溼熱。東垣云。此任脈之病。尺脈濡弱而滑沉微無力。爲白帶。爲血虛或滯數而實。爲赤帶。爲熱。然則烏賊所主者。任脈病。非中宮溼熱下溜之病也。其味鹹。宜歸水臟。血爲水所化。一切主治。總由益腎之陰氣。并使肝

之藏血者。能司其運化出納之職而已。豈獨爲女子要藥乎。凡屬血病。上而鼻舌。下而前後便。皆能療之。即不屬血病。上而目昏耳聾。下而溺失精遺痔患。亦能療之。

配合應用 ①治赤白目翳。傷寒熱毒攻眼。生赤白翳。用烏鯽魚骨一兩。去皮爲末。入龍腦少許。點日三。又治諸目翳。用烏鯽骨五靈脂等分。爲細末。熟豬肝切片蘸食。日子聖惠方。

②治赤翳攀睛。照水丹。治眼翳。惟厚者尤效。及赤翳攀睛。貫瞳人。用海螵蛸一錢。辰砂半錢。乳細水飛。澄取以黃蠟少許。化和成劑。收之。臨臥時。火土旋丸。黍米大。揉入眇中。睡至天明。溫水洗下。未退更用一次。即效。海上方。

③治雀目夜眼。烏賊骨半斤。爲末。化黃蠟三兩。和捏作錢大餅子。每服一餅。以豬肝二兩。竹刀批開。搽藥。扎定。米泔水半碗。煮熟食之。以汁送下。楊氏家藏方。

④治血風赤眼。女人多之。用烏賊魚骨二錢。銅絲一錢。爲末。每用一錢。熱湯泡洗。楊氏家藏方。

⑤治疳眼流淚。烏賊魚骨。牡蠣等分。爲末。糊丸。阜子大。每用一丸。同豬肝一具。米泔煮食。經驗方。

⑥治小兒痰射。多年海螵蛸木米。飲服一錢。葉氏摘玄方。

⑦治底耳出膿。海螵蛸半錢。麝香一字。爲末。以綿杖蘸淨。吹入耳中。澹寮方。

⑧治小便便血。海螵蛸木一錢。生地黃汁調服。又方。海螵蛸。生地黃。赤茯苓等分。爲末。每服一錢。柏葉車前湯下。經驗方。

⑨治鼻瘡疳。烏賊魚骨。白及各一錢。輕粉二字。爲末。搽之。錢乙小兒方。

⑩治大腸下血。不問大人小兒。臘毒腸風。及內痔下血。日久多食。易飢。先用海螵蛸炙黃。去皮研末。每服一錢。木賊湯下。三日後。服豬臟黃連丸。直指方。

⑪治小兒臍瘡。出血及膿。海螵蛸。臘脂。爲末。油調。搽之。聖惠方。

⑫治卒然吐血。烏賊骨末米。飲服二錢。聖惠方。

⑬治頭上生瘡。海螵蛸。白膠香。各二錢。輕粉五分。爲末。先以油潤淨。乃搽末。二三次。即愈。衛生易簡方。

⑭治骨梗在喉。烏賊魚骨。陳橘紅。焙等分。爲末。寒食麵和。餛飩炙子。大。每用一丸。含化。噀汁。聖濟總錄方。

⑮治癰瘍白。先以布拭。用烏賊骨磨三年醋塗之。外臺祕要方。

⑯治舌腫出血如泉。用烏賊骨。蒲黃。各等分。炒爲細末。每用塗之。簡便單方。

⑰治疔瘡惡腫。先刺出血。以海螵蛸末。搽之。其疔即出。普濟方。

⑱治跌破出血。烏賊魚骨末。傅之。直指方。

⑲治蠅螫痛楚。烏賊骨一錢。白礬二分。爲末。噉鼻。在左壁者。噉左鼻。在右壁者。噉右鼻。衛生寶鑑方。

⑳治陰囊溼痒。烏賊骨。蒲黃。撲之。醫宗三法方。

㉑治灸瘡不瘳。烏賊骨。白礬等分。爲末。日塗之。千金方。

㉒治陰虛多熱者。禁施用宜忌。凡陰虛多熱者。禁

烏賊 刺烏賊 *Sepia a. uleta*. 槍
枝 *Spioventh lessoniiana*, Fer
et Orb. 耳烏賊 *Sepiola japon-*
ica Fer. et Bor. 鰐烏賊 *Omura*
atrephes pacificus, Appel. 六

種。採取骨實供藥用者。爲眞烏賊
及刺烏賊二種。其他質柔薄。不適
藥用。

製法 陶弘景曰。凡使烏鰐骨。
須炙黃用。雷斅曰。勿用沙魚骨。其
形真似。但以上文順者是。假以血
滴作水浸。并煮一伏時。漉出。掘一
坑。燒紅。入魚骨在內。經宿取出。入
藥。其效加倍也。

性質 鹹。溫。無毒。

成分 由磷酸鈣。炭酸鈣。膠質
等而成。

效能 通血脈。祛寒溼。溫經。止
帶。用作止血藥。及爲女子血枯經
閉藥。或配合眼藥。及用作牙粉原
料。又治肺結核。咯血。痔出血。創傷
其作用與石決明同。惟凝固血液
之能較石決明爲強。

主治 女子赤白漏下。經汁血
閉。陰蝕腫痛。寒熱癥瘕。無子。(本

經)驚風入腹。腹痛環臍。丈夫陰
中腫痛。令人有子。又止瘡多膿汁
不燥。(別錄)

歷代記述攷證

【唐】陳藏器

本草拾遺論海螵蛸曰。炙研飲服。
治婦人血瘕。大人小兒下痢。殺小
蟲。【唐】孟詵食療本草論海螵蛸
曰。治眼中熱淚。及一切浮翳。研末
和蜜點之。久服益精。【宋】大明日
華諸家本草論海螵蛸曰。療血崩。
殺蟲。【明】李時珍本草綱目論
海螵蛸曰。主女子血枯病。傷肝。唾
血下血。治瘡消癰。研末傅小兒疳
瘡。瘡瘻臭爛。丈夫陰瘡。湯火傷。跌
傷出血。燒存性酒服。治婦人小戶
嫁痛。同雞子黃塗小兒重舌。鵝口。
同蒲黃末傅舌腫。血出如泉。同桃
花末吹鼻。治衄血。同銀硃吹鼻。治
喉痺。同白礬末吹鼻。治蚊蠅咬痛。
同麝香吹耳。治聾耳。有膿及耳聾。
【明】繆希雍本草經疏論海螵蛸
曰。烏賊魚骨味鹹。氣微溫。無毒。入
足厥陰少陰經。厥陰爲藏血之臟。
女人以血爲主。虛則漏下。赤白。或
經汁血閉。寒熱癥瘕。少陰爲藏精
之臟。主隱曲之地。虛而有溼。則陰

蝕腫痛。虛而寒客之。則陰中寒腫。
男子腎虛。則精竭無子。女子肝傷。
則血枯無孕。鹹溫入肝腎。通血脈。
而祛寒溼。則諸證除。精血足。令人
有子也。其主驚氣入腹。腹痛環臍。
者。蓋肝屬木。主驚。驚入肝膽。則營
氣不和。故腹痛環臍也。入肝膽。舒
營氣。故亦主之。溫能燥溼。故又主
瘡多膿汁也。按素問云。有病胸脇
支滿者。妨於食。病至則先開脘。臍
臍。出清液。先唾血。四肢清。目眩。時
時前後血痛。名曰血枯。得之年少
時。有所大脫血。或醉入房。中氣竭。
肝傷。故月事衰少不來。治之以四
烏鰐骨一箇。茹爲末。丸以雀卵。大
如小豆。每服五丸。飲以鮑魚汁。所
以利腸中及傷肝也。觀此。則其入
厥陰血分。爲女人崩漏下血之要
藥。可知矣。【清】葉天士本草經解
論海螵蛸曰。烏賊魚骨。氣微溫。稟
天春和之木氣。入足厥陰肝經。味
鹹。無毒。入足少陰腎經。氣味頗多
於倒陽也。女子以血爲主。肝爲藏
血之臟。肝血不藏。則赤白漏下。其
主之者。氣溫以達之也。肝藏血。血
枯。則血閉。其主之者。味鹹以通之。

腎爲藏精之臟。主陰戶隱曲之地。
肝爲厥陰。其經絡陰器。其筋結陰
器。二經溼濁下注。則陰蝕腫痛。其
主之者。氣溫可以燥溼。味鹹可不
消腫也。寒熱癥瘕者。癥瘕而發寒
熱也。烏鰐骨鹹可頓堅。溫可散寒
熱也。男子腎虛。則精竭無子。女子
肝傷。則血枯無子。鹹溫入肝腎。通
血益精。令人有子也。【清】黃元御
玉欬藥解論海螵蛸曰。烏鰐魚骨
善能斂新血。而破瘀血。素問治女
子血枯。先唾血。四肢青。目眩之前
便血。以烏鰐魚骨。茹爲末。丸以
雀卵。血枯必由夫血脫。血脫之原
緣。瘀滯不流。經脈莫容。烏鰐骨行
瘀固脫。兼擅其長。故能著奇功。其
諸治效。止吐衄崩帶。腰腎障癥。瘕
瘕。跌打湯火。淚眼。雀目。重舌。鵝口。
喉痺。耳聾。精瘦。消腫。拔疔。敗毒。斂
瘡。燥膿。化癰。止癰。收陰。寒溼。瘰癧。
小便血淋。【清】楊時泰本草述鈞
元論海螵蛸曰。烏賊骨。既治女子
赤白漏下。經汁及血崩。唾血。下血
矣。而又主血閉。月事衰少不來。癥
瘕無子。何以一物之用。能通能止。
迴殊哉。夫經閉有有餘不足二證。

後頭痛。天台烏藥、川芎、藜蘆等分爲末。每服二錢。臘茶清調下。產後鐵錘燒紅。淬酒調下。(濟生方)

④治咽喉閉痛。生烏藥即矮樟根。以酸醋二錢煎一盞。先噙後嗽。吐出痰涎爲愈。(經驗方)

⑤治孕中有癰。洪州烏藥、輭白香辣者五錢。水一盞。牛皮膠一片。同煎至七分溫服。(婦人良方)

⑥治心腹氣痛。烏藥水磨濃汁一盞。入橘皮一片。蘇葉一錢煎服。(集簡方)

用量 錢半至三錢。
施用宜忌 凡氣虛而有內熱者禁用。

署名方劑 ①烏沉湯。治一切氣。一切冷補五臟。調中壯陽。暖腰膝。去邪氣。冷風麻痺。膀胱腎間冷氣。攻衝背脊。俯仰不利。風水毒腫。吐瀉轉筋。癢癢刺痛。中惡心腹痛。鬼氣狂忤。天行瘡疫。婦人血氣痛。

(局方)天台烏藥百兩。沉香五十兩。人參三兩。甘草四兩。右共研末。每服半錢。鹽湯空心服。或水煎溫服。②縮泉丸。治脬氣不足。小便頻數。(丹溪方)烏藥、益智仁各等

分。右共研末。酒煮山藥糊丸。④磨飲。治七情傷感。上氣喘急。胸膈不快。妨則不食。(濟生方)人參、烏藥、檳榔、沉香、四味。各濃磨水。取七分煎三五沸。空心溫服。

參攷資料 ①烏藥性和。來氣少。走泄多。但不甚剛猛。同沈香同磨。作湯點服。治胸腹冷氣甚穩當。

(慈示藥) ②烏以色名。其葉狀似鰂鮑。魚故俗呼爲鰂鮑樹。拾遺作旁。其方音訛也。南人亦呼爲矮樟。其氣似樟也。(李時珍) ③烏藥生嶺南。邕州、容州及江南。樹生似茶。高丈餘。一葉三桠。葉青陰白。根狀似山芍藥。及烏樟根。色黑褐。作車紋。橫生。八月採根。根直者不用。(陳藏器) ④今台州、雷州、衡州皆有之。以天台者爲勝。木似茶。根高五七尺。葉微圓而尖。面青背白。有紋。四五月開細花。黃白色。六月結實。根有極大者。又似釣樟根。然根有二種。嶺南者黑褐色。而堅硬。天台者白而虛軟。並以八月採根。如車紋。紋形如連珠者佳。或云天

台者香白可愛。而不及海南者力大。(蘇頌) ⑤吳楚山中極多人以

爲薪根。葉皆有香氣。但根不甚大。纔如芍藥爾。嫩者肉白。老者肉褐色。其子如冬青子。生青熟紫。核殼極薄。其仁亦香。而苦。(李時珍)

【烏藥子】 主治 陰毒傷寒。腹痛欲死。取一合炒起。黑烟。投水中煎三五沸。服一大盞。汗出陽回即痊。

【烏藥茶】 產地 出東莞。製法 以芝麻醬油。雜茶爲汁煎之。

主治 去風溼。破食積。

【烏藥嫩葉】 主治 炙礬。煎飲代茗。補中益氣。止小便滑數。

參攷資料 烏藥下通少陰腎經。上理脾胃元氣。故丹溪朱氏。間陰丸藥中。往往加烏藥葉也。(李時珍)

【烏藤子】 卽覆盆子之古籍別名。典見綱目。詳「覆盆子」條。

【烏鯛骨】 原名 海螵蛸。命名 本品形象螵蛸。故名。

【烏賊骨】 處方用名 烏賊骨。古醫別名 墨魚骨。(綱目) 饒

魚骨。(日華)海若白事小吏。(圖經)白龍柔骨。烏賊甲。墨烏骨。烏魚。(和漢藥考)

基本 屬頭足科二類。爲軟體動物烏賊之背骨。產地 陳仁山藥物生產辨云。海螵蛸以廣東北海平海。汕尾水東等處產者爲大。日本山東亦有出。

形態 烏賊體作囊狀。呈灰色。下部叢集八短脚。另有一對頗長之鬚狀觸脚。各脚具有吸盤四列。體側緣有扁平擴展作鰭狀者。口生於體與脚之間。眼生於口上。體肉白色。囊中貯有墨汁。逢敵即吐。而自晦其蹤跡。本品爲雪白色。長橢圓形之骨質。表面作革質狀。一面稍凹。一面隆凸。由石灰鹽類之結晶針組成。質脆弱。逢酸類即溶解。遺留膜狀物質。

種類 烏賊種類頗多。日本產者有真烏賊 *Sepia nemus* Ha-



烏鯛

鱗翅(綱目)矮樟。房花。率麻。稀樟。矮脚樟。比目沈香(和漢藥考)

外國名詞 Lindera Strychnifolia, Vill. (拉丁) (Daphnium Strychnifolium, S. et Z.)

(英) 基本 屬樟科之天台烏藥及屬防己科之衡州烏藥之根

產地 凡嶺南諸州及吳楚山谷中恒多產焉尤以天台者佳

形態 烏藥為常綠灌木。高八九尺。葉厚作圓形。或橢圓形。前端尖。邊緣無鋸齒。縱有三條脈絡。春

月於枝梢葉腋開淡黃綠色之小花。其根外部紫褐色。內部黃白色。根莖均有一種香氣。

種類 嶺南者黑褐色而堅硬。天台者其色白而虛軟。形如天冬。兩端尖。中肥大。成連珠狀。旁有鬚根。粗三四分。長四五寸許。以新者為良品。衡州者形如木根。不作連珠狀。實為下品。

採取 八月間採根。根如車轂紋。形如連珠者用。

製法 根採旁附狀如蠲珠連者。直根不堪用。去皮心略炒。或生

磨用。性質 辛。溫。無毒。效能 溫中順氣。用治中風中氣霍亂。

主治 中惡。心腹痛。蠱毒。疔疔。鬼氣。宿食不消。天行疫癘。膀胱腎間冷氣。攻衝背脊。婦人血氣。小兒腹中諸蟲。

歷代記述攷證 【六】大明日華諸家本草論烏藥曰。除一切冷霍亂。反胃。吐食。瀉痢。癰瘡。疥癩。并解冷熱。其功不可悉載。貓犬百病。並可磨服。【元】王好古湯液本草論烏藥曰。理元氣。【明】李時珍本草綱目論烏藥曰。中氣。脚氣。疝氣。氣厥。頭痛。腫脹。喘急。止小便頻數。及白濁。【明】繆希雍本草經疏論烏藥曰。烏藥味辛。氣溫。無毒。然營其味。亦帶微苦。氣亦微香。足陽明少陰經。其主中惡。心腹痛。疔疔。鬼氣。天行疫癘者。皆足陽明受病。陽明開竅於口鼻。凡邪惡。疔疔。鬼氣。與夫疫癘之氣。侵入。悉從口鼻而入。此藥辛溫。煖胃。辟惡。散邪。故能主諸證也。胃煖則宿食自消。辛散則蠱毒亦解。又腎與膀胱為表裏。處則

寒客之。而冷氣攻衝背脊。辛溫能散寒邪。其性又善下走。則冷氣攻衝自止也。性溫走泄。故復能散婦人血凝氣滯。微苦而辛。故又能療小兒腹中諸蟲也。【清】黃宮繡本草求真論烏藥曰。烏藥辛溫。香。實。書載上入脾。肺。下通腎。經。如中風中氣。膀胱冷結。小便頻數。反胃。吐食。泄瀉。霍亂。女人血氣凝滯。小兒蛇蝎。外而瘡癰。疥癩。并凡一切病之屬於氣逆。而見胸腹不快者。皆宜用此。功與木香。香附。同為一類。但木香苦溫。入脾。寒滯。宜於食積。則宜香附。辛苦入肝。膽。二經。開鬱散結。每於憂鬱。則妙。此則逆邪橫胸。無處不達。故用以為胸腹逆邪要藥耳。氣行則風自散。若氣虛內熱。而見胸膈不快者。非其所宜。根有車轂紋。形而連珠者良。酒浸一宿。或煨研用。

配合應用 ①同沉香。木香。白豆蔻。香附。橘皮。檳榔。治婦人氣實暴氣壅脹。

②治一切氣痛。不拘男女。冷氣。血氣。肥氣。息貫氣。伏梁氣。奔豚氣。搶心切痛。冷汗喘息欲絕。天台烏

藥小者。酒浸一夜。炒。茴香。炒。青橘皮。去白。炒。良薑。炒。等分為末。溫酒童便調下(衛生家寶方)

③治男婦諸病。香烏散。用香附。烏藥。等分為末。每服一二錢。飲食不進。薑棗湯下。瘧疾。乾草。白鹽湯下。腹中有蟲。檳榔湯下。頭風。虛腫。茶湯下。婦人冷氣。米飲下。產後血攻心脾痛。童便下。婦人血海痛。男子疝痛。茴香湯下(乾坤秘製方)

④治小腸疝氣。烏藥一兩。升麻八錢。水二鍾。煎一鍾。露一宿。空心熱服(孫天仁集效方)

⑤治脚氣。擊痛。鄉村無藥。初發時。即取土烏藥。不犯鐵器。布揩去上。發其剝屑。好酒浸一宿。次早空心溫服。清酒即愈。入麝少許尤佳。痛入腹者。以烏藥同雞子。瓦罐中水煮一日。去雞子。切片。蘸食。以湯送下甚效(永類鈴方)

⑥治血痢。瀉血。烏藥燒存性。研。陳米飯。凡。梧子。大。每米飲下三十丸(普濟方)

⑦治小兒慢驚。昏沈。或搐。烏藥磨水灌之(濟急方)

⑧治氣厥頭痛。不拘多少。及產

【烏骸骨】即虎骨之古籍別名。典見肘後方。詳「虎骨」條。

【烏賴樹皮】即合歡皮之古籍別名。典見綱目。詳「合歡皮」條。

【烏頭】①即川烏之原名。詳「川烏」條。②即附子正根也。詳「附子根」條。

【烏頭尖】即川烏尖之處方用名。詳「川烏」條。

【烏頭附子尖】性質 辛。溫。有毒。

主治 爲末茶服半錢。吐風痰癰痢。

歷代記述攷證 【清】黃宮繡本草求真論烏附尖曰烏附尖能吐風痰。以治癰痢取其直達病所也。

配合應用 ①治風厥癰痢。凡

中風、痰厥、癰痢、驚風、痰涎上壅、牙關緊急、上視、搐搦、並宜碧霞丹主之。烏頭尖、附子尖、蠟梢各七十個、石綠研九度、飛過十兩爲末、麵糊丸、芥子大、每用一丸、薄荷汁半盞化下。更服溫酒半合。須更吐出痰涎爲妙。小兒驚癰、加白礬等分。（和劑局方）

②治脾風撮口。生川烏尖三個、全足蜈蚣半條、酒浸炙、麝香少許爲末。以少許吹鼻得嚏。乃以薄荷湯灌一字。（永類鈴方）

③治木舌腫脹。川烏尖、巴豆研細、醋調塗刷。（集簡方）

④治牙痛難忍。附子尖、天雄尖、全蠍各七個。生研爲末。點之。（永類鈴方）

⑤治奔豚疝氣作痛。或陰囊腫痛。去鈴丸。用生川烏尖七個、巴豆七枚、去皮油。爲末。糕糊丸。梧子大。朱砂磨香爲衣。每服二丸。空心冷酒或冷鹽湯下。三兩日一服。不可多。（濟衆方）

⑥治割甲成瘡。連年不愈。川烏頭尖、黃蘗等分爲末。洗淨貼之以愈爲度。（古今錄驗方）

⑦治老幼口瘡。烏頭尖一個。天南星一個。研末。薑汁和塗足心。男左女右。不過二三次。即愈。

參攷資料 ①烏附用尖。亦取其銳氣直達病所。爾無他義也。保幼大全云。小兒慢脾驚風。四肢厥逆。用附子尖一個。硫黃棗大一個。蠟梢七個爲末。薑汁麵糊丸。黃米

大。每服十九丸。米飲下。亦治久瀉。冠

羸。凡用烏附。不可執爲性熱。審其手足冷者。輕則用湯。甚則用丸。重用者。候手足暖。陽氣回。卽爲佳也。按此方乃和劑局方碧霞丹變法也。非眞慢脾風。不可輒用。是故

初虞世有金虎碧霞之戒。（李時珍）①常山吐瘧疾。積飲在於心下。瓜蒂吐熱痰。在膈。木鑿子引吐

熱毒。從痰外出。萊菔子吐氣痰。在膈。參蘆吐虛痰。烏附尖、藜蘆吐風痰。（黃宮繡）②朱丹溪治許白雲

屢用瓜蒂。梔子、苦參、藜蘆等劑。吐之不透。後用附子尖和漿水與之。始得大吐。膠痰數碗。（汪昂）

【烏龍】即狗之俗名。詳「狗」條。

【烏龍草】即七葉黃荊之別名。詳「七葉黃荊」條。

【烏龍鬚】形態 烏龍鬚爲雜

草類之一種。掛生於烏柏樹上。細長如燈芯草狀。而下垂。採得曬乾。可供藥用。

主治 一切血症。癰腫。勞瘵。瘡疾。

【烏擇】即虎骨之古籍別名。典見漢書。詳「虎骨」條。

【烏氈】命名 本品皆以畜毛織成。其黑乃本色。故名。

主治 火燒生瘡。令不着水風。止血。除賊風。燒灰酒服。治產後血下不止。久臥吸人脂血。損顏色上

氣。

參攷資料 氈屬甚多。出西北方。皆畜毛所作。其白或黑者。本色也。其青、烏、黃、赤者。染色也。其氈、毯、褐、氈、氈氈等稱者。以物命名也。大抵入藥。不甚相遠。（李時珍）

【烏墨泥】即孩兒茶之古籍別名。典見綱目。詳「孩兒茶」條。

【烏蟒】即蟒蛇之黑色者。典見綱目拾遺。詳「蟒蛇」條。

【烏雞】即烏骨雞之簡稱。詳「烏骨雞」條。

【烏雞肉】即烏骨雞之處方用名。

【烏鯉魚】即鯉魚之別名。詳「鯉魚」條。

【烏藤菜】即劉寄奴草之古籍別名。典見綱目。詳「劉寄奴草」條。

【烏藥】處方用名 台烏藥。天台藥。古籍別名 旁其（綱目拾遺）

○

卵。

產地 登萊。

性質 鹹。平。無毒。

主治 開胃利水。

【烏麥】即蕎麥之古籍別名。典見日用本草。詳「蕎麥」條。

【烏麻】即菟絲子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「菟絲子」條。

【烏喙】原名 草烏喙。古籍別名 兩頭尖。(綱目)

性質 辛。微溫。有大毒。

主治 風溼。丈夫腎溼。陰寒。瘁寒熱。歷節。掣引。腰痛。不能行步。癰腫。膿結。又墮胎。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論草烏喙曰。男子腎氣衰。弱陰汗。癰癰。歲月不消。【明】李時珍本草綱目論草烏喙曰。主大風頑痺。

【烏棗】即大棗黑者之處方用名。詳「大棗」條。

【烏梔】即梔梔之古籍別名。典見開寶本草。詳「梔梔」條。

【烏殼便蟲】即蟋蟀之別名。詳「蟋蟀」條。

【烏絨樹皮】即合歡皮之別名。詳「合歡皮」條。

【烏絨子】即鼠李子之別名。詳「鼠李子」條。

【烏菱】即玉竹之古籍別名。典見吳普本草。詳「玉竹」條。

【烏雄雞肉】基本 保存椎類。動物鳥類。雞類。雄雞。

性質 甘。微溫。無毒。

主治 補中止痛。

歷代記述攷證 【宋】日華諸家本草論烏雄雞曰。止肚痛。心腹惡氣。除風溼。麻痺。諸虛羸。安胎。治折傷。并癰疽。生搗塗。竹木刺入肉。參攷資料 按李廷飛云。黃雞宜老人。烏雞宜產婦。暖血。馬益卿云。妊婦宜食牡雞肉。取陽精之全於天產者。此亦胎教宜見虎豹之意耳。又唐崔行功纂要云。婦人產死。多是富貴家擾攘。致婦驚悸。氣亂。故耳。惟宜屏除一切人。令其獨產。更爛煮牡雞。取汁作粳米粥。與食。自然無恙。乃和氣之效也。蓋牡雞。汁性滑而濡。不食其肉。恐難消也。今俗產家。每產後即食雞。啖卵。

氣壯者。幸而無恙。氣弱者。因而成疾。皆由不解此意也。(李時珍)

【烏圓】即鳶尾之古籍別名。典見本經。詳「鳶尾」條。

【烏滑石】即滑石色烏似墨。上有青白膩文者之古籍別名。典見雷公炮炙論。詳「滑石」條。

【烏葉】即雨天燭之別名。詳「雨天燭」條。

【烏賊甲】即烏鰂骨之古籍別名。典見和漢藥考。詳「烏鰂骨」條。

【烏賊骨】即烏鰂魚骨之簡稱。詳「烏鰂骨」條。

【烏飯】即青精乾石饅飯之古籍別名。典見綱目。詳「青精乾石饅飯」條。

【烏飯草】即雨天燭之古籍別名。典見日華諸家本草。詳「雨天燭」條。

【烏槎子】即鼠李子之古籍別名。典見綱目。詳「鼠李子」條。

【烏爾格納】即山穀之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「山穀」條。

【烏嬰】即射干之古籍別名。典見別錄。詳「射干」條。

【烏蒜】即石蒜之古籍別名。典見

救荒本草。詳「石蒜」條。

【烏蒲】即射干之古籍別名。典見本經。詳「射干」條。

【烏銀】製法 烏銀。用硫黃。藥銀。則色黑。成烏銀。養生家製爲器。盛露飲之。

主治 長年辟惡。

配合應用 治翻胃如神。用紋銀錢二分。硫黃一觔。將硫黃分作一百二十包。取大傾銀罐一個。將銀錢放入罐內。炭火上煨。將硫黃逐包投入罐內。黃盡爲度。取銀爲末。初次服三分。二次服二分。三次服一分。再加丁香。茴香。麝香。沉香。各三分。麝香一分。分爲三服。每服用銀粉二分。水一鍾。煎藥至半鍾。將銀粉空心送下。作三日服完。即愈。

【烏鷄】即鳶尾之古籍別名。典見別錄。詳「鳶尾」條。

【烏樟】原名 釣樟。命名 本品根似烏藥。氣香。故名。

古稱別名 樟。樟(本草集註)枕。樟(綱目)

基本 屬樟科爲烏樟之根皮。

產地 凡山谷間恒多產。爲和

也。

種類 有劍脊而細尾者為烏梢蛇。無劍脊而粗尾者為鳳梢蛇。採取 夏秋間恒於蘆葦上捕得之。

製法 雷斅曰：凡使去頭及皮鱗，剉斷，苦酒浸一宿，漉出，柳木炭火炙乾，或以酥炙於屋下已地上，掘坑埋一夜，再炙乾，或以酒浸煮乾用。

用法 水煎服，或酒浸飲，或焙對為末，和作丸散。

性質 甘平，無毒。

主治 祛風燥濕，治癩瘡瘡，諸風頑痺，皮膚不仁，風癢癢，癰疥癬。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥

性本草論烏梢蛇曰：熱毒風，皮肌生癩，眉鬚脫落，癰疥等瘡。【明】李

時珍本草綱目論烏梢蛇曰：功與

白花蛇同，而性善無毒，色黑如漆

尾細。【清】楊時泰本草述鈞元論

烏梢蛇曰：烏梢蛇與白花蛇，味皆

甘，皆入血，而白花蛇獨兼有鹹，則

入血而祛風者，烏梢似難與白花

同。故本草所列主治有輕重之別

也。

配合應用 ①治例：治大風，用

烏蛇三條，蒸熟取肉，焙研末，蒸餅

丸，米粒大，以喂烏雞，待盡，殺雞烹

熟，取肉焙研末，酒服一錢，或蒸餅

丸服，不過三五雞即愈。又用大烏

蛇一條，打死，盛之，待爛，以水二碗

浸七日，去皮骨，入糯米一升，浸一

日，曬乾，用白雞一隻，饑一日，以米

飼之，待毛羽脫去，殺雞煮食，以

酒下之，吃盡，以熱湯一盆浸洗大

半日，其病自愈。【藏方】

②治紫白癰風：烏蛇肉酒炙六

兩，枳殼麩炒，牛膝、天麻各二兩，熟

地黃四兩，白茯苓炒，五加皮、防風

桂心各二兩，剉片，以絹袋盛於無

灰酒二斗中，浸之，密封七日，每溫

服一小盞，忌雞鰵魚肉發物。【聖

惠方】

③治面瘡野炮：烏蛇肉二兩，燒

灰，臘猪脂調傳。【聖惠方】

④治嬰兒撮口不能乳者：烏梢

蛇酒浸，去皮骨，炙半兩，麝香一分

為末，每用半分，荊芥煎湯調灌之。

【聖惠方】

⑤治破傷中風：項強身直，定命

散主之，用白花蛇、烏蛇，並取向後

二寸，酒洗，潤取肉，蜈蚣一條，全者

炙，右各為末，每服三錢，溫酒調服。

【普濟方】

用量 錢半至二錢。

施用宜忌 凡非氣壯邪實者

禁用。

參攷資料 ①商州有人患大

風，家人惡之，山中為起茅屋，有烏

蛇墮酒罈中，病人不知，飲酒漸瘳。

罈底見有蛇骨，始知其由。【朝野

僉載】②烏蛇生商洛山，背有三

稜，色黑如漆，性善不噬物。江東有

黑梢蛇，能纏物至死，亦此類也。【

馬志】③蕪州黃州山中有之，乾

寧記云：此蛇不食生命，亦不害人。

亦生蘆葦中，吸南風，及其花氣，最

難採，多於蘆枝上得之，其身烏

而光，頭圓尾尖，眼有赤光，至枯死

眼不陷，如活者，稱之重七錢至一

兩者為上，十兩至一鎰者為中，粗

大者力彌減也。作為者用他蛇熏

黑，亦能亂真，但眼不光耳。【蘇頌】

④烏蛇脊高，世稱劍脊烏梢，尾細

長，能穿小銅錢一百文者佳，有身

長丈餘者，其性畏鼠狼，蛇類中惟

此入藥最多。【寇宗奭】

【烏梢蛇皮】

主治 風毒氣，眼生翳，唇緊唇

瘡，燒灰，酥和傳之。【李時珍】

【烏梢蛇卵】

主治 大風癩

參攷資料 聖濟總錄：治癩風

用烏蛇卵，和諸藥為丸服。云與蛇

肉用功。【李時珍】

【烏梢蛇膏】

主治 耳聾，綿

裹豆許塞之神

效。

【烏梢蛇膽】

主治 大風癩

疾，木舌，脹塞

【烏犀】即皂莢之古籍別名，典見

綱目。詳「皂莢」條。

【烏犀角】即犀角之處方用名。詳

「犀角」條。

【烏蛇草】即七葉黃荊之古籍別

名，典見綱目拾遺。詳「七葉黃荊」

條。

【烏魚】①即鱧魚之別名。詳「鱧

魚」條。②即烏鰂魚之簡稱。詳「

烏鰂骨」條。

【烏魚蛋】

古籍別名 雄白魚。

【藥性考】

基本 本品係烏鰂魚腹中之

方)

①治勞瘵劣弱。烏梅十四枚。豆豉二合。桃柳枝各一虎口。甘草三寸。生薑一塊。以童子小便二升。煎一半。溫服即止。(圖經本草方)

②治久欬不已。烏梅肉微炒。罌粟殼去筋膜蜜炒。等分爲末。每服二錢。睡時蜜湯調下。

③治痰厥頭痛如破者。烏梅肉三十個。鹽三撮。酒三升。煮一升。頓服。取吐即愈。(肘後方)

④治傷寒頭痛肚熱。胸中煩痛。四五日不解。烏梅十四枚。鹽五合。水一升。煎半升。溫服。取吐。吐後避風良。(梅師方)

⑤治折傷金瘡。乾梅燒存性。傳之一宿。瘥。(千金方)

⑥治馬汗入瘡作痛。用烏梅連核搗爛。以頭醋和敷。仍先刺瘡。出去紫血。乃傳之。繫定。(經驗方)

⑦治獺犬傷毒。烏梅末酒服二錢。千金方)

⑧治指頭腫毒。痛甚者。烏梅肉和魚鮮搗封之妙。(李樓奇方)

⑨治傷寒臘瘡生下部者。烏梅肉三兩。炒爲末。煉蜜丸。梧子大。以

石榴根皮煎湯。食前下二三十丸。(聖惠方)

⑩治小兒頭瘡。烏梅燒末生油調塗。(聖濟總錄方)

⑪治硫黃毒發。令人背膊疼痛。目暗漠漠。烏梅肉焙一兩。沙糖半兩。漿水一大盞。煎七分。呷之。(聖濟總錄方)

用量 八分至錢半。
施用宜忌 凡病當發散者。禁用。又忌豬肉。

著名方劑 烏梅丸。治病者靜而時煩。因臟寒。虵上入其脇。爲虵厥。當吐虵。並治久痢。(仲景方) 烏梅三百個。黃連一斤。黃柏六兩。乾薑十兩。附子六枚。(泡) 蜀椒四兩。(熬去汁) 桂枝六兩。細辛六兩。人參六兩。當歸四兩。有十味。異搗篩。合治之。以苦酒漬烏梅一宿。蒸之。五升米下。飯熟。搗成泥。和藥令相得。納臼中。與蜜二千下。如梧子大。先食飲服十九日。三服。稍加至二十丸。禁生冷滑物臭食。

參攷資料 ①烏梅。白梅所主諸病。皆取其酸收之義。惟張仲景治虵厥。烏梅丸。及蟲蠱方中用者。

取蟲得酸。即止之義。稍有不同耳。

醫說載。曾魯公痢血。百餘日。國醫不能療。陳應之用鹽水。梅肉一枚。研爛。合臘茶。入醋服之。一啜而安。大丞梁莊肅公亦痢。血應之用烏梅。胡黃連。蜜下土等分。爲末。茶調服。亦效。蓋血得酸。即斂。得寒。則止。得苦。則澹。故也。其蝕惡瘡。贅肉。雖是酸收。却有物理之妙。說出本經。其法載於劉涓子鬼遺方。用烏梅肉燒存性。研傳惡肉上。一夜立盡。

聖惠用烏梅和蜜作餅貼者。其力緩。按楊起簡便方云。起臂生一疽。膿潰百日。方愈。中有惡肉。突起如蠶豆大。月餘不消。醫治不效。因閱本草。得此方。試之一日夜。去其大半。再上一日而平。(李時珍) ②烏梅收斂。益津開胃。治休息痢。能斂肺瀉腸。血痢不止。以烏梅燒灰存性。米湯服之。漸止。中風僵仆。牙關緊閉者。取烏梅擦牙。齦即開。按烏梅之酸。固有酸收酸軟之兩義也。(張石頑) ③梅古文作臬。象子在水上之形。梅乃杏類。故反杏爲臬。書家訛爲甘木。後作梅。從每。諧聲也。或云梅者媒也。媒合衆味。故書

云。若作和羹。爾惟鹽梅。而梅字亦從某也。陸佃埤雅言。梅入北方。變爲杏。郭璞註。爾雅以梅爲梅。皆誤矣。枹即枹木。荊人呼爲梅。見陸幾

草木疏。(李時珍) ④多食損齒。傷筋。蝕脾胃。令人發脇上痰。煎服黃精。人忌食之。食梅齒齲者。嚼胡桃肉解之。物類相感志云。梅子同部粉食。則不酸。不軟牙。(大明)

【烏梅肉】即烏梅之處方用名。詳【烏梅】條。

【烏梅乾】即烏梅之處方用名。詳【烏梅】條。
【烏梢蛇】原名 烏蛇。古籍別名 劍脊烏梢蛇。黑花蛇。(綱目) 黑風蛇。烏花蛇。和漢藥考) 基本 屬爬蟲類蛇類。爲烏蛇之肉。
產地 陳仁山藥物生產辨云。烏蛇產江蘇鎮江府十月新。形體 烏蛇棲息各地山野間。全體漆黑色。腹部灰黑色。頭圓尾尖。背有三稜。眼有赤光。雖枯死。眼不陷。如活者。其重一兩以下者。爲上。粗大而重者。爲下。以其藥力減

烏梅曰：梅實。即今之烏梅也。其味最酸。經曰：熱傷氣。邪客於胸中。則氣上逆而煩滿。心爲之不安。烏梅味酸。能斂浮熱。能吸氣歸元。故主下氣。除熱煩滿及安心也。下痢者。大腸虛脫也。好唾口乾者。虛火上炎。津液不足也。酸能斂虛火。化津液。固腸脫。所以主之也。其主肢體痛。偏枯不仁者。蓋因溼氣浸於經絡。則筋脈弛緩。或疼痛不仁。肝主筋。酸入肝而養筋。肝得所養。則骨正筋柔。機關通利。而前證除矣。其主去死肌。青黑痣惡肉者。白梅之功也。白梅味酸。能軟堅故也。又能消痰醒睡。止霍亂解酒毒。弘景云。生梅烏梅。白梅功用大約相似。第烏梅較良。實用更多。【清】黃宮繡本草求真論烏梅曰：烏梅醃漬而溫。似有類於木瓜。但此入肺則收入腸則瀉。入筋與骨則軟。入蟲則伏。入於死肌惡肉惡痣。則除刺。入肉中則拔。故於久瀉久痢氣逆煩滿。反胃骨蒸。無不因其收瀉之性。而使下脫上逆皆治。且於癰毒可敷。中風牙關緊閉可開。虻蟲上攻眩仆可治。口渴可止。寧不爲酸

瀉收斂之一驗乎。不似木瓜功專疏泄脾胃。筋骨溼熱收斂脾肺耗散之元。而於他症則不及也。但肝喜酸。瀉收久服酸味。亦伐生氣。且於諸症初起切忌。【清】王士雄隨息居飲食譜論烏梅曰：梅性酸溫。生時宜鹽鹽食。溫膽生津。孕婦多嗜之。以小滿前肥肥而不帶苦者。佳。食梅齒齲。嚼胡桃仁解之。多食損齒。生痰助熱。凡痰嗽疳積。痞積脹滿。外感未清。女子天癸未行。及婦女汛期前後。產後痧痘後並忌之。青者鹽醃。曝乾爲白梅。亦可蜜漬。糖收法製以充食物。半黃者烟熏爲烏梅。入藥及染色用之。極熟者榨汁曬收爲梅醬。古人用以調饌。故書曰：若作和羹。爾醢鹽梅也。辨僞：鄭肖巖曰：造烏梅法。係取青梅籃盛於竈突上。熏黑。若以稻灰淋汁潤溼。蒸過。則肥澤不盡。近有以小李僞造充售。則無益而有害矣。曹炳章曰：按烏梅杭州出者。肉厚核小。色黑。性潮潤者。佳。紹興楓橋出者。性燥核大。肉薄。色黑微黃者。略次。別處亦出。總要肉厚色黑。性糯爲佳。

配合應用 ①治渴消煩。烏梅肉二兩。微炒爲末。每服二錢。水二盞。煎一盞。去滓。入破二百粒。煎至半盞。溫服。【簡要濟衆方】 ②治泄痢口渴。烏梅煎湯。日飲代茶。【扶壽精方】 ③治產後痢渴。烏梅肉二十箇。麥門冬十二分。每以一升。煮七合。細呷之。【必效方】 ④治赤痢腹痛。烏梅肉炒。黃連各四兩。爲末。煉蜜丸。梧子大。每米飲服二十丸。日三服。【聖惠方】 ⑤治便秘腹脹。烏梅一兩。去核。燒過爲末。每服二錢。米飲下立止。【聖濟總錄方】 ⑥治久痢不止。腸垢已出。用烏梅肉二十箇。水一盞。煎六分。食前分二服。【肘後方】 又用烏梅肉。白梅肉。各七箇。搗爛。入乳香末少許。杵丸。梧子大。每服二三十丸。茶湯下。日三。【袖珍方】 ⑦治大便秘下血及酒痢久痢不止。用烏梅三兩。燒存性爲末。醋煮米糊和丸。梧子大。每空心米飲服二十九丸。日三。【濟生方】 ⑧治小便尿血。烏梅燒存性。研

末。醋糊丸。梧子大。每服四十九。酒下。 ⑨治血崩不止。烏梅肉七枚。燒存性。研末。米飲服之。日三。 ⑩治大便不通。氣奔欲死者。烏梅十顆。湯浸。去核。入棗大。納入下部。少時即通。【食療本草方】 ⑪治霍亂吐利。鹽梅煎湯細細飲之。【如宜方】 ⑫治蛇蟲上行。出於口鼻。烏梅煎湯頻飲。并含之。即安。【食鑑本草方】 ⑬治水氣滿急。烏梅、大棗各三枚。水四升。煮二升。納蜜和勻。含嚥之。【聖濟總錄方】 ⑭治梅核膈氣。取半青半黃梅子。每個用鹽一兩。淹一日。夜曬乾。又浸又曬。至水盡乃止。用青錢三個。夾二梅。麻線縛定。通裝磁罐內。封埋地下。百日取出。每用一枚。含之。嚥汁。入喉。即消。收一年者。治一人。二年者。治二人。其妙絕倫。【饕氏經驗方】 ⑮治心腹脹痛。短氣欲絕者。烏梅二十七枚。水五升。煮一沸。納大錢二十七枚。煮二升。半。頓服之。【肘後

十畫 烏

法當補脾實土爲急。此藥必不可輕用。如果元氣壯實者亦須暫施一二劑病已即去之。(繆希雍)

【烏柏根皮】即烏柏木之處方用名。詳「烏柏木」條。

【烏柏葉】性實 苦微溫有毒。主治 食牛馬六畜肉。生疔腫欲死者。搗汁頓服。得大利去毒即愈。未利再服。冬用根。

【烏參泥】即孩兒茶之原名。詳「孩兒茶」條。

【烏草】即鼠尾草之古籍別名。典見本草拾遺。詳「鼠尾草」條。

【烏骨雞】命名 本品乃雞類之骨色烏者。故名。

處方用名 烏雞肉

基本 屬鸚鵡類。爲舌黑或骨烏之雞。

形態 與鸚鵡同。惟其骨或羽毛之色爲烏黑耳。

製法 孟詵曰。凡使烏雞。治新產婦。須用烏雞一隻。治淨和五味末炒香。投二升酒中。封一宿。取飲。令人肥白。又和烏油麻二升熬香入酒中極效。

性質 甘平無毒。

效能 補虛羸。治勞損。用作滋養強壯藥。

主治 補虛勞羸弱。治消渴中惡。鬼擊。心腹痛。益產婦。治女人崩中帶下。一切虛損諸病。大人小兒下痢禁口。並煮食飲汁亦可。搗和丸藥。

歷代記述攷證 【明】繆希雍本草經疏論烏骨雞曰。烏骨雞性屬陰。能走肝腎血分。補血益陰。則虛勞羸弱可除。陰回熱去。則津液自生。渴自止矣。陰平陽秘。表裏固密。邪惡之氣不得入。心腹和而痛自止。鬼亦不能犯矣。益陰則衝任帶三脈俱旺。故能除崩中帶下一切虛損諸疾也。古方烏骨雞丸。治婦人百病者。以其有補虛益陰入血分之功。

配合應用 治赤白帶下。白果。蓮肉。江米。各五錢。胡椒一錢。爲末。烏骨雞一隻。如常治淨。裝末入腹。煮熱。空心食之。

治遺精白濁。下元虛憊者。用前方食之良。

治脾虛滑泄。烏骨母雞一隻。治淨。用豆豉一兩。草果二枚。燒存

性。摻入雞腹內。紮定煮熟。空心食之。

施用宜忌 凡非虛羸而有實邪者禁用。

參攷資料 雞屬木。而骨反烏者。巽變坎也。受水木之精氣。故肝腎血分之病宜用之。男用雌。女用雄。婦人方科有烏雞丸。治婦人百病。煮雞至爛。和藥。或并骨兼用之。鬼擊卒死。用其血塗心下亦效。(李時珍)

【烏鬼】即鸛鷀之古籍別名。典見杜甫詩。詳「鸛鷀」條。

【烏巢子】即鼠李子之古籍別名。典見圖經本草。詳「鼠李子」條。

【烏梅】命名 本品係以未熟之梅實。剝去核。入饴於火中。燻乾者。色變烏黑。故名。

處方用名 烏梅乾。烏梅肉。

古籍別名 梅實(本經) 薰梅(綱目) 菓煙九助(和漢藥考)

基本 屬薔薇科梅樹未熟之實。

產地 陳仁山藥物生產辨云。烏梅各省均有出。

採取 三四月間採其半黃者。以煙燻乾。

製法 陶弘景曰。凡使烏梅。須去核微炒之。李時珍曰。造法取青梅。盛於突上。燻黑。若以稻灰淋汁潤溼。蒸過。則肥澤不盡。

性質 酸溫平。濡無毒。

效能 斂肺。瀉腸。殺蟲。柔肝。有健胃固腸之效。用於下痢。又有發汗解熱之效。用於感冒。

主治 下氣除熱。煩滿。安心。止肢體痛。偏枯不仁。死肌。去青黑痣。蝕惡肉(本經) 去痺利筋脈。止下痢。好睡口乾(別錄)

歷代記述攷證 【南北朝】陶弘景本草集註論烏梅曰。水漬汁飲。治傷寒熱。唐陳藏器本草拾遺論烏梅曰。止渴調中去痰。治瘧瘧。止吐逆。霍亂除冷熱痢(宋)

大明諸家本草論烏梅曰。治虛勞骨蒸。消酒毒。令人得睡。和建茶乾。煮爲丸服。止休息痢。大驗(明)李時珍本草綱目論烏梅曰。斂肺。瀉腸。止久嗽。瀉痢。反胃。噎膈。吐利。消腫。消痰。殺蟲。解魚毒。烏汗毒。硫黃毒(明)繆希雍本草經疏論

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論柏油曰。塗一切腫毒瘡疥。

【烏柏木】 命名 本品子實。烏喜食之。又木老則根下黑爛成白。故名。

處方用名 烏柏根皮。

古籍別名 鷄白。綱目。鷄舅。

(和漢藥考)

外國名詞 Sapinum Sebiferum Roxb. (拉一)

基本 屬大戟科。藥用烏白之根皮。

產地 凡南方平澤間恒多生焉。



烏白木

形態 烏白爲暖地所產之落葉喬木。高一丈至三丈餘。葉互生。作廣卵圓形。前端尖。夏月於梢上生花穗。綴黃色單性小花。秋末結長三四寸黑褐色扁圓形之實。表面被有白粉。中藏三子。如豆大。皮

部含有多量脂肪。採其根皮供藥用。

製法 大明曰。慢火炙乾黃乃用。

性質 苦。微溫。有毒。

效能 瀉熱毒。消水腫。用作利水藥。

主治 暴水凝結積聚。

歷代記述攷證 【宋】大明曰。華諸家本草論烏柏根白皮曰。療

頭風。通大小便。【元】朱丹溪本草衍義補遺論烏柏根白皮曰。解蛇

毒。【明】繆希雍本草經疏論烏柏根白皮曰。烏柏木根皮味苦氣微

溫。日華子言涼。然詳其用。應是辛苦溫之藥。而其性則有毒也。與巴

豆牽牛大略相似。入手足陽明經。其主暴水凝結積聚者。皆二經爲

病。苦能泄。辛能散。溫能通行腸胃。則諸證無不除矣。

配合應用 治小便不通。烏柏根皮煎湯飲之。(肘後方)

治大便不通。烏柏木根方長一寸。劈碎。水煎半盞服之。立通。不

用多喫其功神聖。兼能取水。(斗門方)

治二便關格。二三日則殺人。

烏柏東南根白皮。乾爲末。熱水服

二錢。先以芒硝二兩煎湯服吐甚效。(肘後方)

治水氣虛腫。小便澀。烏柏皮

檳榔。木通一兩爲末。每服二錢。米飲下。(聖惠方)

治腳氣濕瘡。極痒有蟲。烏柏

根爲末。傅之。少時有涎出良。(摘玄方)

治尸注中惡。心腹刺痛。沈默

錯亂。用烏柏根皮煎濃汁一合。調殊砂末一錢服之。肘後方無殊砂

(永類鈴方)

治暗疔昏狂。瘡頭凸。紅柏樹

根經行路者。取二尺許。去皮搗爛。并華水調一盞服。待瀉過以三角

銀杏仁浸油搗齏患處。(聖濟總錄方)

治嬰兒胎毒滿頭。用水邊烏

柏樹根。晒研入雄黃末少許。生油調搽。(經驗良方)

治風非砒毒。烏柏根半兩。搗

三四箇。待吐下鹽澀乃佳。如不行。熱茶催之。(摘玄方)

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡非氣壯邪實者禁用。

參攷資料 烏柏根性沉而降。利水通腸。功勝大戟。一野人病腫滿氣壯。令掘此根。搗爛。水煎服一盞。連行數行而病平。氣虛人不可用之。此方出太平聖惠方。言其功神聖。但不可多服爾。誠然。(李時珍)

烏柏葉。如小香葉。但微薄而綠色差淡。子八九月熟。初青後黑。分爲三瓣。取子出油。然燈及染髮。(寇宗奭)

烏白。烏喜食其子。因以名之。陸龜蒙詩云。行歌每依鴉舅影。挑頻時見鼠姑心。是矣。鼠姑。牡丹也。或云其木老則根下黑爛成白。故得此名。鄭樵通志言烏白。卽拒柳者非也。(李時珍)

生山南平澤。樹高數仞。葉似梨杏。五月開細花。黃白色。子黑。(蘇頌)

南方平澤甚多。今江西人種植。採子蒸煮。取脂澆燭。質之。上皮膚勝於仁也。(李時珍)

水腫多。屬脾虛。不能制水。以致水氣泛濫。

形態 烏木爲喬木類之常綠木本高二丈餘葉長橢圓形平滑互生花單性合瓣花冠淡黃色雌雄同株果實毬形赤黃色其木材黑色體重堅實入水則沉老者色純黑可製器具與供藥用



烏木

性質 甘。鹹。平。無毒。
主治 解毒。又主霍亂吐利。取屑研末溫酒服。

【烏牛子】即經霜絲瓜子之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「絲瓜」條。
【烏古瓦】即古瓦之原名。詳「古瓦」條。

【烏玉玦】即墨之古籍別名。典見綱目。詳「墨」條。

【烏尖】即鹽筍乾之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「鹽筍乾」條。

【烏羊婆廬】即沙參之古籍別名。典見和漢藥考。詳「沙參」條。

【烏白木】即烏柏木。詳「烏柏木」條。

【烏吹】即射干之古籍別名。典見別錄。詳「射干」條。
【烏芋】即芋薺之原名。詳「芋薺」條。

【烏豆】即黑大豆之處方用名。詳「黑大豆」條。

【烏貝】即蚌之別名。詳「蚌」條。

【烏足】即車前草之古籍別名。典見和漢藥考。詳「車前草」條。

烏柿 命名 本品即柿用火薰乾而色黑者故名。
性質 甘溫無毒。
主治 殺蟲。金瘡。火瘡。生肉止痛。

歷代記述攷證 【南北朝】陶弘景本草集註論烏柿曰。治狗齧瘡。斷下痢。【唐】陳藏器本草拾遺論烏柿曰。服藥口苦及嘔逆者。食少許即止。

【烏花蛇】即烏梢蛇之別名。詳「烏梢蛇」條。

【烏金】即墨之古籍別名。典見綱目。詳「墨」條。即鐵之古籍別名。典見綱目。詳「鐵」條。

【烏金石】即石炭之古籍別名。典見綱目。詳「石炭」條。

烏金紙 產地 出浙江杭縣。
主治 療下疳。

參攷資料 烏金紙之製法。先造烏金水刷紙。候黑如漆。再熏過以槌石研光。性最堅韌。不中書畫。用以包裹珍寶及藥物。作觀紙。則溼氣不入。凡打金箔。則以此紙包金片。揮巨斧。捶之。金成箔。而紙不損。其紙價頗昂。蓋惟浙人善造也。【醫學大辭典】

烏金磚 基本 本品爲年久薰窖中之瓦磚也。
主治 小兒痘不貫漿。虛弱無力者。大效。

【烏柿】即柿之古籍別名。典見綱目。詳「柿」條。

烏韭 古籍別名 石髮。石苔。【唐本草】石衣。【日華】石花。石馬鬣。鬼麗。【綱目】基本 係羊齒門羊齒類水龍骨科骨碎補屬。爲烏韭之莖根。

產地 生山陰石間。

形態 烏韭爲苔類。瓦松屬之一種。常綠草本。根莖堅硬。橫臥地下。自此生葉。葉柄堅硬而滑澤。呈圓柱形。葉身稍帶革質。長於葉柄。

全體爲橢圓形披針形。裂片細。略呈四回羽狀。莖長四五寸。茸茸青翠。可供藥用。

性質 甘寒。無毒。
主治 皮膚往來寒熱。利小腸。勝膀胱。【本經】療黃疸。金瘡內塞。補中益氣。【別錄】

歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草論烏韭曰。燒灰沐頭。長髮令黑。

配合宜忌 垣衣爲之使。

【烏韭】即麥門冬之藥名。典見綱目。詳「麥門冬」條。即陸釐之古籍別名。典見綱目。詳「陸釐」條。

【烏食草】即七葉黃荊之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「七葉黃荊」條。

【烏扇】即射干之古籍別名。典見本經。詳「射干」條。

烏柏子油 原名 柏油。基本 本品乃榨烏柏子實所得之脂肪油。

性質 甘涼無毒。
主治 塗頭變白。爲黑。服一合。令人下利。去陰下水氣。炒子作湯亦可。

芒者爲芒消。亦謂之益消。芒消之底澄凝者爲消石。朴消力緊。芒消次之。消石更緩。未知孰是。蘇恭言晉宋古方多用消石。少用芒消。接張仲景傷寒論。冰氣陷胸。皆用芒消。葛洪肘後方。傷寒時氣亦多用芒消。惟治食蝕不化云。無朴消用芒消代之。是晉宋以前通用朴消。芒消矣。胡洽方十棗湯用芒消。大五飲丸用消石。並云無消石用芒消。是梁隋間通用芒消消石矣。以此言之。朴消消石爲精。芒消爲粗。故陶氏引皇甫士安之言爲證。是消石當時已難得其真。故方書通以相代矣。又古方金石凌法。用朴消。消石。芒消。馬牙消。四種相參。次第下之。方出唐世。不知當時如何分別也。又南方醫人著消說云。本草有朴消。消石。芒消。而無馬牙消。諸家所注三種。竟無斷決。或言芒消。消石是一物。不合重出。或言煎鍊朴消。經宿。盆中有細芒爲芒消。或言馬牙消自是一物。今諸消之體各異。理亦易明。而惑乃如此。朴消味苦而微鹹。出蜀郡者瑩白如冰。雪內地者小黑。皆蘇脆易碎。風

吹之則結霜。混混如粉。熬之炸沸。亦可鑄鑄以水。合甘草猪膽。至減半。投大盆中。又下凝水石屑同漬一宿。則凝結如白石。英者芒消也。掃地霜煎鍊而成。試竹上如解壘。而味辛苦。燒之成屑。都盡者消石也。能消金石。又性畏火。而能制諸石使拒火。亦天地之神物也。牙消即是芒消也。又有生消。不因煮鍊而成。亦出蜀道。類朴消而小。堅也。其論雖辨。然與古人所說殊別。亦未可全信也。蘇頌云。諸消自晉唐以來。諸家皆執名而猜。都無定見。惟馬志開寶本草。以消石爲地霜鍊成。而芒消。馬牙消。是朴消煉出者。一言足破諸家之惑矣。諸家蓋因消石一名芒消。朴消一名消石。朴之名相混。遂致費辨不決。而不知消有水火二種。形質雖同。性氣迥別也。惟神農本草經。朴消。消石二條爲正。其別錄芒消。嘉祐馬牙消。開寶生消。俱係多出。今並歸併之神農所列朴消。即水消也。有二種。煎鍊結出細芒者爲芒消。結出馬牙者爲牙消。其凝底成塊者通爲朴消。其氣味皆鹹而寒。神農

所列消石。即火消也。亦有二種。煎鍊結出細芒者。亦名芒消。結出馬牙者。亦名牙消。又名生消。其凝底成塊者通爲消石。其氣味皆辛苦。而大溫二消皆有芒消牙消之稱。故古方有相代之說。自唐宋以下所用芒消牙消。皆是水消也。南醫所辨雖明。而以凝水石猪膽煎成者爲芒消。則誤矣。今通正其誤。其石脾一名消石者。乃造成假消也。李時珍云。【消石朴】即朴消之古籍別名。典見別錄。詳「朴消」條。【涎衣草】即地膚子之古籍別名。典見唐本草。詳「地膚子」條。【烈節】形體。烈節爲蔓草類之一種。春生苗莖。葉似丁公藤而纖微。無花實。其莖可供藥用。採取。九月採之。曝乾用。性質。辛溫無毒。主治。肢節風冷。筋脈急痛。作湯浴之。參攷資料。楊倓家藏經驗方。有烈節酒。治歷節風痛。用烈節。松節。牛膝。熟地。黃當歸。各一兩。爲粗

末。絲袋盛之。以無灰酒二百盞。浸三日。每服一盞。入生酒一盞。溫服。李時珍云。【烈樸】即厚樸之古籍別名。典見日華諸家本草。詳「厚樸」條。【烏丁】即孩兒茶之古籍別名。典見綱目。詳「孩兒茶」條。【烏丁泥】即烏參泥之別名。詳「孩兒茶」條。【烏女】即玉竹之古籍別名。典見吳普本草。詳「玉竹」條。○即萎蕤之別名。詳「玉竹」條。【烏山椒】即食茱萸之原名。詳「食茱萸」條。【烏元參】即玄參之處方用名。詳「玄參」條。【烏文木】即烏木之古籍別名。典見綱目。詳「烏木」條。【烏木】古籍別名。烏楠木。烏文木。綱目。外國名詞。Diospyros Pergrina, Gurke. (拉丁)基本。係柿樹科柿樹屬。爲烏木之木材。產地。出東印度及馬來半島。與熱帶諸地。

集方

●治發背初起。惡寒。膏膏。或已生瘡。腫脹。疹。消石三兩。暖水一升。泡化。青布摺三重。溫湯赤處。熱即換。頻易取瘥。外臺祕要方

●治女勞黑疸。仲景曰。黃家日哺發熱及惡寒。此為女勞得之。膀胱急。少腹滿。身盡黃。額上黑。尺下熱。因作黑疸。腹脹如水。大便黑時。滯非水也。腹滿者難治。消石。礬石。燒等分。為末。以大麥粥汁和服。方寸匕。日三。病隨大小便去。小便黃。大便黑。是其候也。金匱方

●治手足不遂。大風及丹石熱風。不遂。用消石一兩。生烏麻油二斤。置鑊中。以土壅蓋口。紙泥固濟。火煎。初時氣腥。熱則氣香。更以生麻油二升。合煎得所。收不津器中。服時坐室中。重作小紙屋。然火於內。服一大合。發汗。力壯者日二服。三七日。頭面庖瘡皆滅也。然必以火為使。波羅門僧方

用量 五分至三錢

施用宜忌 凡無實邪者禁用。惡苦參。苦菜。畏女菀。杏仁。竹葉。火為之使。

參攷資料

●朴消屬水。味鹹而氣寒。其性下走。不能上升。故惟蕩滌腸胃積滯。折治三焦邪火。消石屬火。味辛帶苦微鹹。而氣大溫。其性上升。故能破積散堅。治諸熱病。升散三焦火鬱。調和臟腑虛寒。與硫黃同用。則配劑二氣均調。陰陽有升降水火之功。治冷熱緩急之病。厥制礬石。則除積滯痰飲。蓋硫黃之性燄而利。其性下行。消石之性燄而散。其性上行。礬石之性寒而下。消石之性暖而上。一升一降。一陰一陽。此制方之妙也。今兵家造烽火銃機等物。用消石者直入雲漢。其性升可知矣。雷公炮炙論序云。腦痛欲死。鼻投消末。是亦取其上升辛散。乃從治之義。本經言其寒。別錄言其大寒。正與龍腦性寒之誤相似。凡辛苦物未有大寒者。況此物得火則焰生。與樟腦火酒之性同。安有性寒大寒之理哉。史記倉公傳云。甯川王美人懷子不乳。來召淳于意。意往飲以黃宕藥一撮。以酒飲之。旋乳。意復診其脈。躁者有餘病。即飲以消石一劑。出血豆比五六枚而安。此去

血結之驗也。李時珍●消石療病與朴消相似。仙經用此消化諸石。今無真識此者。或云與朴消同。所以朴消一名消石。朴也。又云一名芒消。今芒消乃是煉朴消作之。並未毀研其驗。有人得一種物。色與朴消大同小異。腦腸如握鹽雪。以火燒之。紫青烟起。云是真消石也。今石昌以北諸山有鹹土處皆有之。陶弘景神農本草無芒消。只有消石一名芒消。名醫別錄乃出芒消。療與消石同。疑即消石也。舊出寧州。黃白粒大。味極辛。苦。今醫家多用煑煉作色者。全白粒細而味不甚烈。皇甫士安言。無朴消。可用消石。消石生山之陰。鹽之膽也。取石脾與消石以水煮之一斛得三斗。正白如雪。以水投中。即消。故名消石。其味苦。無毒。主消渴熱。中止煩滿。三月采於赤山。朴消者亦生山之陰。有鹽鹹苦之水。則朴消生於其陽。其味苦無毒。其色黃白。主療熱腹中飽脹。養胃消穀。去邪氣。亦得水而消。其療與消石小異。按如此說。是取芒消合煑。更成為真消石。以朴消作芒消者。

用燈湯淋汁煑之。着木盆中。經宿即成矣。今益州人復鍊礬石作消石。絕柔白而味猶是礬。又曰。朴消今出益州北部汶山郡。四川鹽陵二縣界。生山崖上。色多青白。亦雜黑斑。土人擇取白軟者。以當消石用之。當燒令汁沸。出狀如礬石也。陶弘景●朴消有縱理棧理二種。用之無別。其白軟者。朴消苗也。虛軟少力。鍊為消石。所得不多。以當消石。功力大劣也。又曰。消石即是芒消。朴消一名消石。朴。今煉粗惡朴消。取汁煎作芒消。即是消石。別錄復出芒消。誤矣。晉宋占方多用消石。少用芒消。近代諸醫。但用芒消。渺言消石。理既明白。不合重出。蘇頌●舊說朴消。芒消。消石。三物同種。初采得苗。以水淋汁。煎成者為朴消。一名消石。朴。又煉朴消。或地霜而成。堅白如石者為消石。一名芒消。又取朴消淋汁。煉煎結成。有細芒者為芒消。雖一體異名。而修煉之法既殊。則主治之功亦別。然本經所載。疑是二種。今醫方所用。亦不能究。但以未煉成塊。微青色者為朴消。煉成盆中有

溶解。投入火中。則爆鳴。立即燃燒而發鮮明之焰。

製法 大明曰。真消石。柳枝湯煎三周時。如湯少。即加熱者。伏火即止。膏數日。凡治消石。先研如粉。用雞腸菜。柏子仁。共二十五箇。和作一處丸。如小帝珠子。以瓷瓶子於五斤火中煨赤。投消石四兩於瓶內。連投藥丸入瓶。自然伏火也。抱樣子曰。能消柔五金。化七十二石。為水制之。須用地蓮子。猪牙皂。角。苦參。南星。巴豆。漢防己。晚蠶砂。李時珍曰。溶化。投甘草入內。即伏火。

性質 苦。寒。無毒。

成分 化學上謂之硝酸加溶護。KNO₃。

效能 破堅積。消瘰癧。療霍亂。通五淋。用作清涼利尿藥。又治水腫石淋。

作用 在胃中能激動胃腺。使分泌增加。入至腸。又能刺激腸黏膜。使腸之分泌亦增多。催促大糞之排出。由腸壁而吸入血中。能增血液中之鹼性。遲緩悸進之心臟。以減退原有之體溫。由血中游離

而至腎臟。能將腎臟充血。使全身之過量水分。迅速迫向腎臟排出。若服量過多。則易釀成腸胃炎。

主治 五臟積熱。胃脹便閉。滌去蓄結飲食。推陳致新。除邪氣。煉之如膏。久服輕身。本經。療五臟十二經脈中百二十疾。暴傷寒。腹中大熱。止煩滿消渴。利小便及瘰癧瘡。天地至神之物。能化七十二種石。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論消石曰。破積散堅。治腹脹。破血下瘰癧。瀉得根出。【宋】大明諸家本草論消石曰。含嗽。治喉閉。【明】李時珍本草綱目論消石曰。治伏暑傷冷。霍亂吐利。五腫淋疾。女勞黑疸。心腸疔痛。赤眼。頭痛。牙痛。

國外學說 日本學說謂依日本藥局方云。為消炎藥。於肺炎。肋膜炎。炎。心內外膜炎。急性關節炎。用之。為利尿藥。於諸般之水腫。與實芫荈利斯配用。一日三回。自〇、三至一、五。為水散服之。腸胃炎及衰弱者。宜禁忌。又和漢藥考曰。消石熱帶地方。因含窒素有機物

之腐敗。窒素為空氣中之酸素所酸化。變為硝酸。更與地中之亞克加里化。合而生鹽。取而精製之。遂成消石。日本舊法。採取地板下。經過數年之土類。以水溶化。俟土質類沈降器底。汲取其上面澄清者。蒸發而使結晶。又從而精製之。

配合應用 ①頭痛欲死。消石末吹鼻內即愈。(炮炙論)

②治諸心腹痛。消石。雄黃各一錢。研細末。每點少許。入背內。名火龍丹。亦治腰腹諸痛。(集玄方)

③治赤眼腫痛。消石末。臥時以鋼筋點黍米大入目。皆至。且以鹽水洗去之。(聖惠方)

④治眼目障翳。男女內外障翳。或三五箇月不見效者。一點復明。好紹消一兩。銅器鎔化。入飛過黃丹二分。片腦二分。銅匙急炒。入罐內收之。每點少許。其效如神。(張三伴仙方)

⑤治風熱喉痺。及經喉風病。玉鑰匙。用紹消一兩半。白礬一錢。硃砂半兩。腦子一。研細末。吹之。(三因方)

⑥治重舌。鴨口。竹瀝同紹消點

之。(普濟方)

①治伏暑瀉痢。及腸風下血。或酒毒下血。一服見效。遠年者不過三服。消石。舶上硫黃各一兩。白礬。滑石。牛兩。飛麝四兩。為末。滴水丸。梧子大。每新汲水下。三五十丸。名甘露丸。(普濟方)

②治五種淋疾。勞淋。血淋。熱淋。氣淋。石淋。及小便不通。至甚者。透格散。用消石一兩。不夾泥土。雪白者。生研為末。每服二錢。各依湯使。勞淋。勞倦虛損。小便不出。小腹急痛。瘳子未煎湯下。通後便須服補虛丸散。小便不出。時下血。疼痛滿急。熱淋。小便熱。赤色。臍下急痛。並用冷水調下。氣淋。小腹急滿。尿後常有餘瀝。木通煎湯下。石淋。莖肉痛。尿不能出。內引小腹膨脹急痛。尿下。砂石。令人悶絕。將藥末先入銚內。隔紙炒至紙焦為度。再研。用溫水調下。小便不通。小麥湯下。卒患諸淋。只以冷水下。並空心調藥。使消如水服之。沈存中靈苑方)

③治服石發瘡。疼不可忍。用紙團圍之。中心填消石。令滿。以匙抄水淋之。覺不熱痛即止。(兵部手

基本 係脊椎動物魚類板鰓類橫口類紅類之海鰻魚。

產地 常匍匐於海底沙土中。

形態 海鰻魚為無鱗類魚族之一種。體形扁平。大者圍七八尺。狀如盤及荷葉。頭部之下面有口鼻及五對之鰓孔。頭部之上面有兩眼及噴水孔。此孔可認為鰓孔所變化者。口有小齒。胸鰭甚擴張。故外貌似胸部。甚覺扁大。多呈斜方形。或團扇形。尾部狹小。背面具銳棘。腹鰭小。無臀鰭。尾鰭亦小。僅有上葉。無下葉。全體無鱗而骨軟。游泳甚拙。整人甚毒。其肉可供藥用。

性質 甘。鹹。平。無毒。

主治 男子白濁青淋。玉莖澀痛。

參攷資料 ①海鰻魚肉。氣味有小毒(李時珍) ②海鰻魚肉。不益人(陶弘景)

【海鰻魚尾】 **性質** 有毒。 **主治** 齒痛。

【海鰻魚齒】 **性質** 無毒。 **主治** 瘡癰燒。

【海鰻魚齒】 **主治** 瘡癰燒。

【海鰻鰻】 **命名** 本品出海中。形類鰻鰻而大。故名。

古籍別名 慈鰻鰻。狗魚。(日華)

外國名詞 Murenosox cinereus. (拉丁) Fork (英) 八七(日本)

基本 係脊椎動物魚類喉鰓類海鰻鰻科。

產地 生海中岩礁裂隙間。



鰻 鰻 海

形態 海鰻鰻為無鱗魚類之一種。體圓長。至尾端漸側扁。形似鰻鰻。皮面無鱗。口大具銳齒。上顎微為鈎狀。下顎不突出。脊鰭始於鰓孔之上。臀鰭始於體之中段。連續於尾。背色淡灰黑。稍帶紫。腹面暗白。微帶青。脊鰭鰭色黑。有闊綠邊。本體長三尺餘。大者六尺許。棲於海潮流緩慢處。晝伏。夜出覓食。

其肉可供藥用。

性質 甘。平。有毒。

主治 療皮膚惡瘡。疥癬。疔瘻。

參攷資料 海鰻鰻功似鰻鰻。緩而不補(李時珍)

【海蘆】 即海藻之古籍別名。典見爾雅。詳「海藻」條。

【海蠶】 **產地** 生南海山石間。

形態 海蠶為蠶之一種。其狀似蠶。大如拇指。其沙甚白。如玉粉狀。可供藥用。

性質 鹹。大溫。無毒。

主治 虛勞。冷氣。諸風不遂。久服補虛羸。令人光澤。輕身。延年不老。

參攷資料 海蠶沙難得真者。彼人以水搗葛粉石灰。以梳齒印成。偽充之。縱服無益。反能損人。宜慎之(李時珍)

【海鹽】 即鹽之以海水製成者。詳「食鹽」條。

【浸藍水】 **基本** 係取藍草浸漬之水。

製法 取藍草厚鋪木板上。漬之以水。使起酵發熱。待至乾燥。上

下攪和。再漬水發酵。如是多次。至醇全。息則成暗青黑色。

性質 辛。苦。寒。無毒。

效能 除熱。解毒。殺蟲。消積。

主治 治誤吞水蛭成積。腹痛黃瘦。

參攷資料 昔有人因醉飲田中水。誤吞水蛭。胸腹脹痛。面黃。以此水飲之。大渴數行。頓愈。

【涅石】 即礬石之古籍別名。典見綱目。詳「明礬」條。

【消石】 **命名** 本品力能消化諸石。故名。

古籍別名 芒消(別錄) 苦消(甄權) 焰硝(土宿) 火消(綱目)

地霜(劉本) 生消(唐本) 硝石鹽石化金石。河東野。北帝玄珠(和漢藥考)

外國名詞 Salpêtre. Salnitri. (拉丁) Niter. (英) Salpoeer. (德)

基本 為硝礦之一種。

產地 在山谷川澤及諸岡地。

形態 消石為六稜之冰柱狀。結晶無色。或白色。味微辛。苦。冷而有刺戟性。置空氣中。不變化。水養

凝聚之結核。非其治矣。癰腫癰癰。多由血熱於滯而生。腹鳴水腫。更多滯滯停頓之候。凡此諸症之屬於陽實有餘者。固可治之。而正氣不及。清陽不運諸症。不可概施別錄。特提結熱二字。最當注意。非謂陽虛血熱之癰癰癰。及寒水泛溢等病。皆可以此統同論治也。十二水腫。蓋以十二經而言。諸經積水。固皆有滯熱不利之一候。此類寒滑泄水之藥。固可用之。又曰。甄權謂治心下滿。疝氣下墜疼痛。卵腫。李珣海藥本草。以治奔豚氣。臍氣。水氣浮腫。皆當以熱藥有餘一而而言。正與腎水泛溢之奔豚。及寒水凌心。寒疝結痛諸症。兩得其反。此皆證古人書者。不可不辨之。門徑。非謂凡此諸病。不問虛實寒熱。皆以此物一例通用也。

配合應用 ①海藻酒 治癰氣 用海藻一斤。絹袋盛之。以清酒二升。浸之。春夏二日。秋冬三日。每服兩合。日三。酒盡再作。其滓曝乾。爲末。每服方寸匕。日三服。不過兩劑。即瘥。〔范汪方〕

②治癰氣初起。海藻一兩。黃連

二兩。爲末。時時噉。先斷一切厚味。〔丹溪方〕

③治項下癰癰如梅李狀。宜連服前方海藻酒消之。〔肘後方〕

④蛇盤癰癰。頭項交接者。海藻菜以善炒炒過。白礬雪炒等分。爲末。以白梅泡湯和丸。梧子大。每服六十丸。米飲下。必泄出毒氣。〔危氏得效方〕

用鹽 錢半至三錢。

施用宜忌 凡脾胃虛寒。而有滯滯者。禁用。反甘草。

參攷資料 ①海藻起男子陰消。男子瘡疾。宜常食之。南方人多食。北方人效之。倍生諸疾。更不宜矣。〔孟詵〕

②東垣李氏治癰癰馬刀散。腫潰堅。海藻、甘草兩用之。蓋以堅積之病。非平和之藥所能取捷。必令反奪以成其功也。〔李時珍〕

③此有二種。馬尾藻生淺水中。如短馬尾。細黑色。用之當浸去鹹味。大葉藻生深海中。新羅國葉如水藻。而大海人以繩繫腰。沒水取之。五月以後。有大魚傷人。不可取也。爾雅云。綸似綸。組似組。東海有之。正爲二藻也。〔陳藏器〕

此卽水藻生於海中者。今登萊諸州有之。陶隱居引爾雅綸組註。昆布。謂昆布似組。青苔。葉似綸。而陳藏器以綸組爲二藻。陶說似近之。〔蘇頌〕

【海藻酒】 製法 用海藻一斤。洗淨。浸酒飲。

主治 癰癰結氣。

【海蘇】 卽連錢草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『連錢草』條。

【海蘊】 命名 纏亂絲也。本品葉似之。故名。

古籍別名 海雲。〔日本〕

外國名詞 Masogioia decipiens, Sur. (拉丁) ヲシク (日本)

基本 係海藻科。爲海藻類之海蘊。

產地 出淺水岩石上。寄生於馬尾藻類之藻。

形態 海蘊爲水草類之隱花植物。枝多細長而柔滑。葉細如絲。色蒼黏滑。浮於水面。長數尺。可生食與藥用。

性質 鹹寒。無毒。

主治 癰癰結氣在喉間。下水。

歷代記述攷證 【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論海蘊曰。主水腫。【海鮓】 卽鮓魚。產於海中者之別名。詳『泥鰌』條。

【海鰕】 命名 本品爲鰕之產於海中者。故名。

古籍別名 紅鰕。〔綱目拾遺〕

形態 海鰕爲魚類。鰕屬之一種。長可二尺餘。皮殼嫩紅。磷鱗銀。鼻背有斷節。尾有硬鱗。前足有鉗。多足善躍。其肉作鮮。可供食與藥用。

性質 甘。平。有小毒。

主治 飛尸。蛇蟲。口中甘。鰕齒。頭瘡。去疥癬。風瘙。身痒。治山蚊。子入人肉。初食。瘡發則愈。

參攷資料 海鰕同猪肉食。令人多睡。〔李時珍〕

【海蠶】 卽海螺之原名。詳『海螺』條。

【海鵲魚】 命名 本品形象海鵲。故名。

古籍別名 邵陽魚。少陽魚。荷魚。魴魚。鱖魚。鮪魚。番陽魚。石鰻。

（綱目）

蠱注。解蛇毒。(別錄)

【海鏡】

古籍別名 鏡魚。環蛤。
(郭璞賦)膏藥盤。蟻鏡。

(綱目)

外國名

Amnium japonicus Gmel (拉一) シキヒガヒ

(日本)

基本

屬軟體動物瓣腳類無管類單柱類海扇科海鏡之肉

產地

福建、港、粵諸海濱均有產之

形態

海鏡形似海月。而殼形略圓。右殼平。左殼稍膨凸起。近殼頂之耳狀突起小而前後同形。殼外面無隆線。但有細微之放射線。左殼面色褐或淡紅有多數之細紫輪紋。右殼色白或青白。殼長約四寸。土人多磨礪其右殼。使之透明。嵌之於天窗或窗櫺亦可作明瓦。取其肉可供食與藥用。

性質

鹹寒。無毒。

效能

利尿祛滯。消積。療風。下氣。和中。

主治

消渴。祛腹中宿積。令人易饑。

參攷資料

產於南海。兩片相

合成形。殼圓如鏡。光瑩放射如雲母。內有肉形如蚌。胎腹有寄生蟲。大如豆。狀如蟹。饑則出食。入則飽矣。(李時珍)

【海藻】

命名

藻乃水草之有文者。潔淨如浴藻故謂之曰藻。本品係生海中者。名之曰海藻。海藻者海中所產藻類之總稱也。但藥則用馬尾藻。

處方用名

淡海藻。馬尾藻。

古籍別名

薺海藻。爾雅薺藻。

(別錄)落首。(本經)神馬草。海湯草。(和漢藥考)海菜。(綱目)海髮。(本草集註)

基本

屬褐色海藻門之馬尾藻 *Gelidium Enevey, C. Ag.*

產地

陳仁山藥物生產辨云。海藻產廣東新安、平海、汕尾等鹹水海處。十二月出新。至五月止。

形態

海藻類中之馬尾藻。係生於各地沿海暗礁之藻類。長自三四尺至五六尺。莖細而分歧。互生狹長葉。葉腋有大一分餘之黑色球圓形氣胞。壓之則破裂有聲。日本之筑前地方呼此為捉虱子。其葉莖生鮮時呈黑色。入溫湯則變綠。

變綠。

採取 十二月至來年五月止。為採取時期。

製法

雷獸曰。凡使須用生烏豆。并紫背天葵三件。同蒸伏時。日乾。用李時珍曰。近人但洗淨鹹味。焙乾用。

性質

鹹寒。無毒。

效能

瀉熱。散結。化痰涎。消癰。用作軟堅藥。又為利尿藥。

主治

癰瘡結氣。散頸下硬核。癰腫。癥瘕。堅氣。腹中上下雷鳴。下十二水腫。瘰癧。皮間積聚。暴癰。

氣。結熱。利小便。潔古專治癰瘡。馬刀瘰癧。諸瘡。堅而不潰者。經云。鹹能軟堅。營氣不從。外為浮腫。隨各引經治之。腫無不消。反甘草。一云有小毒。(清)黃宮繡本草求真論海藻曰。海藻書載性反甘草。能治項頭一切癰癧。癥瘕。癰瘕。及痰飲。腳氣。水腫等症。其故奚似。蓋緣苦能洩結。寒能除熱。鹹能軟堅。海藻氣味俱備。與甘草本屬不合。凡其水因熱成。而致隧道閉塞。小便不通。便結不解者。用此堅軟結滯。邪退熱解。使熱盡從小便而出。而病自無不愈也。至有病非實結。最不宜用。非獨海藻為然。即凡海中諸藥。無不如是。海帶。有似海藻而粗柔。翻而長。主治無異。昆布亦同。海藻。海帶。俱性帶滑。且雄。凡癰堅如石者。非此不除。且其下氣最速。久服多令人瘦。至云海島人常食。以其水士不同故耳。皆反甘草。略洗去鹽水用。

近代學說

張山雷曰。海藻生長海中。鹹苦而寒。故能軟堅散結。癰瘡結核。皆肝膽火炎。灼痰凝絡所致。寒能清熱。固其專長。而陰寒

氣。結熱。利小便。潔古專治癰瘡。馬刀瘰癧。諸瘡。堅而不潰者。經云。鹹能軟堅。營氣不從。外為浮腫。隨各引經治之。腫無不消。反甘草。一云有小毒。(清)黃宮繡本草求真論海藻曰。海藻書載性反甘草。能治項頭一切癰癧。癥瘕。癰瘕。及痰飲。腳氣。水腫等症。其故奚似。蓋緣苦能洩結。寒能除熱。鹹能軟堅。海藻氣味俱備。與甘草本屬不合。凡其水因熱成。而致隧道閉塞。小便不通。便結不解者。用此堅軟結滯。邪退熱解。使熱盡從小便而出。而病自無不愈也。至有病非實結。最不宜用。非獨海藻為然。即凡海中諸藥。無不如是。海帶。有似海藻而粗柔。翻而長。主治無異。昆布亦同。海藻。海帶。俱性帶滑。且雄。凡癰堅如石者。非此不除。且其下氣最速。久服多令人瘦。至云海島人常食。以其水士不同故耳。皆反甘草。略洗去鹽水用。

近代學說

張山雷曰。海藻生長海中。鹹苦而寒。故能軟堅散結。癰瘡結核。皆肝膽火炎。灼痰凝絡所致。寒能清熱。固其專長。而陰寒

氣。結熱。利小便。潔古專治癰瘡。馬刀瘰癧。諸瘡。堅而不潰者。經云。鹹能軟堅。營氣不從。外為浮腫。隨各引經治之。腫無不消。反甘草。一云有小毒。(清)黃宮繡本草求真論海藻曰。海藻書載性反甘草。能治項頭一切癰癧。癥瘕。癰瘕。及痰飲。腳氣。水腫等症。其故奚似。蓋緣苦能洩結。寒能除熱。鹹能軟堅。海藻氣味俱備。與甘草本屬不合。凡其水因熱成。而致隧道閉塞。小便不通。便結不解者。用此堅軟結滯。邪退熱解。使熱盡從小便而出。而病自無不愈也。至有病非實結。最不宜用。非獨海藻為然。即凡海中諸藥。無不如是。海帶。有似海藻而粗柔。翻而長。主治無異。昆布亦同。海藻。海帶。俱性帶滑。且雄。凡癰堅如石者。非此不除。且其下氣最速。久服多令人瘦。至云海島人常食。以其水士不同故耳。皆反甘草。略洗去鹽水用。

近代學說

張山雷曰。海藻生長海中。鹹苦而寒。故能軟堅散結。癰瘡結核。皆肝膽火炎。灼痰凝絡所致。寒能清熱。固其專長。而陰寒

氣。結熱。利小便。潔古專治癰瘡。馬刀瘰癧。諸瘡。堅而不潰者。經云。鹹能軟堅。營氣不從。外為浮腫。隨各引經治之。腫無不消。反甘草。一云有小毒。(清)黃宮繡本草求真論海藻曰。海藻書載性反甘草。能治項頭一切癰癧。癥瘕。癰瘕。及痰飲。腳氣。水腫等症。其故奚似。蓋緣苦能洩結。寒能除熱。鹹能軟堅。海藻氣味俱備。與甘草本屬不合。凡其水因熱成。而致隧道閉塞。小便不通。便結不解者。用此堅軟結滯。邪退熱解。使熱盡從小便而出。而病自無不愈也。至有病非實結。最不宜用。非獨海藻為然。即凡海中諸藥。無不如是。海帶。有似海藻而粗柔。翻而長。主治無異。昆布亦同。海藻。海帶。俱性帶滑。且雄。凡癰堅如石者。非此不除。且其下氣最速。久服多令人瘦。至云海島人常食。以其水士不同故耳。皆反甘草。略洗去鹽水用。

近代學說

張山雷曰。海藻生長海中。鹹苦而寒。故能軟堅散結。癰瘡結核。皆肝膽火炎。灼痰凝絡所致。寒能清熱。固其專長。而陰寒

氣。結熱。利小便。潔古專治癰瘡。馬刀瘰癧。諸瘡。堅而不潰者。經云。鹹能軟堅。營氣不從。外為浮腫。隨各引經治之。腫無不消。反甘草。一云有小毒。(清)黃宮繡本草求真論海藻曰。海藻書載性反甘草。能治項頭一切癰癧。癥瘕。癰瘕。及痰飲。腳氣。水腫等症。其故奚似。蓋緣苦能洩結。寒能除熱。鹹能軟堅。海藻氣味俱備。與甘草本屬不合。凡其水因熱成。而致隧道閉塞。小便不通。便結不解者。用此堅軟結滯。邪退熱解。使熱盡從小便而出。而病自無不愈也。至有病非實結。最不宜用。非獨海藻為然。即凡海中諸藥。無不如是。海帶。有似海藻而粗柔。翻而長。主治無異。昆布亦同。海藻。海帶。俱性帶滑。且雄。凡癰堅如石者。非此不除。且其下氣最速。久服多令人瘦。至云海島人常食。以其水士不同故耳。皆反甘草。略洗去鹽水用。

近代學說

張山雷曰。海藻生長海中。鹹苦而寒。故能軟堅散結。癰瘡結核。皆肝膽火炎。灼痰凝絡所致。寒能清熱。固其專長。而陰寒

氣。結熱。利小便。潔古專治癰瘡。馬刀瘰癧。諸瘡。堅而不潰者。經云。鹹能軟堅。營氣不從。外為浮腫。隨各引經治之。腫無不消。反甘草。一云有小毒。(清)黃宮繡本草求真論海藻曰。海藻書載性反甘草。能治項頭一切癰癧。癥瘕。癰瘕。及痰飲。腳氣。水腫等症。其故奚似。蓋緣苦能洩結。寒能除熱。鹹能軟堅。海藻氣味俱備。與甘草本屬不合。凡其水因熱成。而致隧道閉塞。小便不通。便結不解者。用此堅軟結滯。邪退熱解。使熱盡從小便而出。而病自無不愈也。至有病非實結。最不宜用。非獨海藻為然。即凡海中諸藥。無不如是。海帶。有似海藻而粗柔。翻而長。主治無異。昆布亦同。海藻。海帶。俱性帶滑。且雄。凡癰堅如石者。非此不除。且其下氣最速。久服多令人瘦。至云海島人常食。以其水士不同故耳。皆反甘草。略洗去鹽水用。

近代學說

張山雷曰。海藻生長海中。鹹苦而寒。故能軟堅散結。癰瘡結核。皆肝膽火炎。灼痰凝絡所致。寒能清熱。固其專長。而陰寒

氣。結熱。利小便。潔古專治癰瘡。馬刀瘰癧。諸瘡。堅而不潰者。經云。鹹能軟堅。營氣不從。外為浮腫。隨各引經治之。腫無不消。反甘草。一云有小毒。(清)黃宮繡本草求真論海藻曰。海藻書載性反甘草。能治項頭一切癰癧。癥瘕。癰瘕。及痰飲。腳氣。水腫等症。其故奚似。蓋緣苦能洩結。寒能除熱。鹹能軟堅。海藻氣味俱備。與甘草本屬不合。凡其水因熱成。而致隧道閉塞。小便不通。便結不解者。用此堅軟結滯。邪退熱解。使熱盡從小便而出。而病自無不愈也。至有病非實結。最不宜用。非獨海藻為然。即凡海中諸藥。無不如是。海帶。有似海藻而粗柔。翻而長。主治無異。昆布亦同。海藻。海帶。俱性帶滑。且雄。凡癰堅如石者。非此不除。且其下氣最速。久服多令人瘦。至云海島人常食。以其水士不同故耳。皆反甘草。略洗去鹽水用。

近代學說

張山雷曰。海藻生長海中。鹹苦而寒。故能軟堅散結。癰瘡結核。皆肝膽火炎。灼痰凝絡所致。寒能清熱。固其專長。而陰寒

氣。結熱。利小便。潔古專治癰瘡。馬刀瘰癧。諸瘡。堅而不潰者。經云。鹹能軟堅。營氣不從。外為浮腫。隨各引經治之。腫無不消。反甘草。一云有小毒。(清)黃宮繡本草求真論海藻曰。海藻書載性反甘草。能治項頭一切癰癧。癥瘕。癰瘕。及痰飲。腳氣。水腫等症。其故奚似。蓋緣苦能洩結。寒能除熱。鹹能軟堅。海藻氣味俱備。與甘草本屬不合。凡其水因熱成。而致隧道閉塞。小便不通。便結不解者。用此堅軟結滯。邪退熱解。使熱盡從小便而出。而病自無不愈也。至有病非實結。最不宜用。非獨海藻為然。即凡海中諸藥。無不如是。海帶。有似海藻而粗柔。翻而長。主治無異。昆布亦同。海藻。海帶。俱性帶滑。且雄。凡癰堅如石者。非此不除。且其下氣最速。久服多令人瘦。至云海島人常食。以其水士不同故耳。皆反甘草。略洗去鹽水用。

近代學說

張山雷曰。海藻生長海中。鹹苦而寒。故能軟堅散結。癰瘡結核。皆肝膽火炎。灼痰凝絡所致。寒能清熱。固其專長。而陰寒

大如指。長一、二寸許者。名釘頭螺。

溫台沿海諸郡多有之。海螵蛸生

海塗中。立夏後。有人見其羣變爲

虹。今人所稱豆娘是也。或云此螺

能跳丈許。蓋遷其處。此物又能食

蚶。明州奉化多蚶田。皆取苗於海

塗。種之久。則自大。時田者不時得

視。恐有海螵蛸。蓋蚶不畏他物。惟

畏海螵蛸。蚶田中一有此物。蚶無遺

種。皆被其吮食盡。玉環出者。大如

指。名釘頭螺。《杭州府志》。辟蛆

雲客傳方。立夏日食海螵蛸。以殼

七枚。勿令人見。撒廁中。或馬桶內

暑日不生蛆蟲。顏靈驗。《趙恕軒》

命名。本品乃海馬之

大者。其形似龍。故名。

產地 出閩粵南海中。

形態 海龍爲魚類。海馬屬之

一種。首尾如龍。而無牙爪。長四五

寸至尺餘。身長而尾直不捲。體如

玉色。雌者黃。雄者青。可供藥用。

主治 益房術。催生尤有捷效。

握之卽產。功倍海馬。

參攷資料 海馬之屬有三。

小者長不及寸。名海蛆。不入藥中

等者長一二寸。名海馬。尾盤旋作

圈。形扁如馬。其性溫。味甘。煖水臟

壯陽道。消痰塊。治疔腫。產難。血氣

痛。海龍乃海馬中絕大者。長四五

寸至尺許不等。皆長身而尾直不

作圈。入藥功力尤倍。雖同一類形

狀。微有不同。此物廣州南海亦有

之。體方。周身如玉色。起竹節紋。密

密相比。光瑩耀目。誠佳品也。《百

草箋》。介語蝦姑。一名海馬。其

扁如蜈蚣者。燒服。主夜遺。《綱目

拾遺》。

【海龜】卽蠘龜之別名。詳「蠘龜」

條。

【海螵蛸】卽烏鰂骨之原名。詳「

烏鰂骨」條。

【海螺】原名 海蠃。

古籍別名 流螺。《圖

經》。假豬螺。小者名釘頭螺。《綱

目》。

產地 生海濱間。

形態 海螺爲介類。螺蚌屬之

一種。種類甚多。硬殼有旋線。身可

宛轉伏藏。其大者。殼可爲酒厄及

吹器。內面光潔美麗。亦可以鑲嵌

漆器。肉可供食。與藥用。

性質 甘。冷。無毒。

主治 目痛累年。或三、四十年。

生。翳取汁洗之。或入黃連末。在內

取汁點之。

歷代記述攷證 【唐】孫思邈

千金翼論。海螵蛸肉。曰。合菜羹。食治

心痛。

【海螺】 古籍別名 甲香。《

交州記》。

製法 雷斅曰。凡使用生茅香。

皂魚。同煮半日。石臼搗篩。用之。經

驗方曰。凡使用黃泥。同水煮一日。

溫水浴過。再以米泔或灰汁煮一

日。再浴過。以蜜酒煮一日。浴過。燂

乾。用蘇頌曰。傳信方載其法云。每

甲香一斤。以泔斗半。微火煮一伏

時。換泔再煮。凡二換。漉出。衆手刮

去香上涎物。以白米三合。水一斗。

微火煮乾。又以蜜三合。水一斗。煮

三伏時。乃以炭火燒地。令熱。洒酒

令潤。鋪香於上。以新瓦蓋上一伏

時。待冷。硬石臼木杵搗爛。入沉香

末三兩。磨一分。和搗卽成。以瓶貯

之。埋過經久。方燒。凡燒此香。須用

大火爐。多着熱灰。剛炭猛燒。令盡

去之。爐旁着火。煖水。卽香不散。此

法出於劉寔奉禮也。宗奭曰。甲香

善能管香烟。與沉、檀、龍、麝香用之

尤佳。

性質 鹹。平。無毒。

主治 心腹滿痛。氣急。止痢。下

淋。

歷代記述攷證 【唐】李珣海

藥本草論海螵蛸。曰。和氣清神。主

腸風痔瘻。《唐》陳藏器本草拾遺

論海螵蛸。曰。瘰癧。疥癬。頑瘡。癢瘡

甲疽。蛇蝎。蜂蟻。

【海螵蛸】卽白皮子之俗名。詳

「白皮子」條。

【海臘石】卽血竭之古籍別名。典

見和漢藥考。詳「血竭」條。

【海藤】卽藤黃樹之古籍別名。典

見郭義恭廣志。詳「藤黃」條。

【海藥子】 古籍別名 連木。《

本經》。

產地 生山谷間。

形態 海藥爲蔓草類之一種。

其子實似黃藥子。苦藥子可供藥

用。

製法 凡使去皮。取仁。研細用。

性質 辛。溫。無毒。

主治 邪氣諸瘧。瘕。續絕傷。

補骨髓。《本經》。破血。止痢。消腫。除

十 壹 海

形體 海蛇爲無鱗魚類之一

種。種類甚多。大者徑尺餘。普通者上面高凸。狀如張繖。平滑而軟。色淡藍。皮薄。下面有八腕。延長如柄。色淡紅。腕上觸手叢生。觸手之間有無數細口。內通胃腔。繖之邊緣有耳目。常浮水面。羣蝦附之。其肉可供藥用。

製法 採得浸以石灰。礬水。去其血汗。其色遂白。其最厚者。謂之蛇頭。其味更勝。生熟皆可食。茄柴灰和鹽水醃之。尤良。

性質 鹹溫無毒。

主治 婦人勞損。積血帶下。小兒風疾。丹毒。湯火傷。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論海蛇曰。療河魚之疾。

【海蛇皮】 命名 本品即海蛇之外白皮。故名。

性質 鹹溫無毒。

主治 祛風消痰行積。治頭風痞塊。療無名腫毒。

【海雲】 即海蘊之日本名。詳『海蘊』條。

【海棧】 即無漏子之木名。典見綱目。詳『無漏子』條。

【海棧子】 古醫別名 千年棗。 (綱目) 鳳尾蕉子。無漏子。無漏果。棗實。 (綱目拾遺)。

形體 海棧爲喬木類之一種。高三四丈。圍五六尺。春月開花。狀如蕉花。有兩瓣。漸漸開。中有十餘房子。長二寸。黃白色。形類棧子。有核。新秋實熟。色黑。味甘如飴。可供食與藥用。

製法 用刀剝去青皮。石灰湯淪之。入冷熱蜜浸換四次。則澀味去。瓶封。久藏不壞。

性質 甘溫無毒。

主治 消食寬中。除痰止咳。益氣潤顏。久食令人肥美。

【海眼】 即人參之古籍別名。典見廣雅。詳『人參』條。

【海蜃】 即海蛇之訛名。詳『海蛇』條。

【海蜃】 即淡菜之古籍別名。典見綱目。詳『淡菜』條。

【海風】 即海參之別名。詳『海參』條。

【海風藤】 即蕃椒之古籍別名。典見和漢藥考。詳『蕃椒』條。

【海漆】 即倒捻子之古籍別名。詳『倒捻子』條。

『倒捻子』條。

【海風藤】 即蕃椒之古籍別名。典見花鏡。詳『蕃椒』條。

【海精木】 即水英之古籍別名。典見綱目。詳『水英』條。

【海苔】 即山道年可之別名。詳『山道年可』條。

【海蔕子】 即鳳仙子之古籍別名。典見救荒本草。詳『鳳仙子』條。

【海綿】 即海豚魚之古籍別名。典見本草拾遺。詳『海豚魚』條。

【海狸】 即狸之古籍別名。典見廣雅。詳『貓狸』條。

【海風絲】 古醫別名 草蓮。產地 生廣信。

形體 叢生橫根。綠莖細如小竹。初生葉如青蒿。漸長細如茴香。葉可供藥用。



絲 風 海

主治 頭風。利大小便。

【海髮】 即海藻之古籍別名。典見本草集註。詳『海藻』條。

九 九 六

【海欄茶】 即山茶花之古籍別名。典見綱目。詳『山茶花』條。

【海燕】 Asenna (拉丁) イトマキヒトア (日本)

基本 係棘皮動物海盤車類之海燕。產地 出海中磯岩間。

形體 海燕爲介類之一種。五腕甚短。體爲五角形。略似燕。色藍有赭色斑點。口在體之下面。口緣分裂作深溝。直沿各腕之中央。達於其端。溝中有管足二列。以司運動。可供藥用。

性質 鹹溫無毒。

主治 陰雨發損痛。煮汁服。取汗即解。亦入滋陰藥。

【海螵】 性質 鹹寒。主治 瘰癧結核。能降鬱氣。

參攷資料 ●海螵。枕俗立夏以爲應時之味。以花椒酒之。麻油拌食。從新云。比螺螵身細而長。殼有旋紋六七風。頭上有唇。春初螵起。行海崖石壁。海人設網於下一掠而取。治以鹽酒椒桂。按海螵有

【海犀皮】功用 活血治風。

【海犀膏】即黃明膠之古籍別名。典見綱目。詳「黃明膠」條。

【海豚魚】命名 本品因其形似豚故名。

外國名詞

Delphinus longi-

rostris Gray 或 *Prodelphinus*

longirostris (拉卜) (Dolphin)

(英)

古籍別名 海狶生江中者名

江豚(拾遺)江豚水獭(異物志)


鯨魚鰐魚鯨(綱目)

基本 係脊椎動物哺乳類有

胎盤類游水類齒鯨類海豚科

產地 生江海中

形態 海豚魚爲無鱗魚類鯨屬之一種。體長八九尺如紡錘狀口吻尖爲嘴狀上下顎皆有錐形之齒各五十六枚齒頭尖銳耳小善聽鼻孔有鱗狀膜背面及體旁皆黑藍色腹白有兩乳背有高約七八寸之脊。鰭向後屈前肢變爲狹尖之鰭無後肢尾平擴亦呈鰭狀半月形其膏脂最多可燃燈骨硬肉肥可供藥用



魚 豚 海

性質 鹹。腥。無毒。
主治 飛尸蟲毒瘡癰。作脯食之。

【海豚魚肋】

主治 摩濕瘡疥癬痔瘻大馬

瘡疥殺蟲。

【海蛇】即蛇婆之別名。詳「蛇婆」條。

【海肥】即貝子之古籍別名。典見綱目。詳「貝子」條。

【海鹿】即鸛鵒菜之古籍別名。典見和漢藥考。詳「鸛鵒菜」條。

【海湯草】即海藻之古籍別名。典見和漢藥考。詳「海藻」條。

【海菜】即無漏子之古籍別名。典見草木狀。詳「無漏子」條。

【海棠梨】即海紅之古籍別名。典見綱目。詳「海紅」條。

【海椒】即蕃椒之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蕃椒」條。

【海菜】即海藻之古籍別名。典見綱目。詳「海藻」條。

【海蛤】

基本 本品乃海中諸蛤爛殼之總稱也。

形態 海蛤爲介類之一種。種類甚多。大者如椀子。小者如油麻粒。其殼經海水礪礪或漂至海邊多集於沙土中。其色不一。或黃或白。或赤。採得研末可供藥用。

採取 四五月間淘沙取之。

製法 雷斅曰。凡使海蛤。勿用游波蟲骨真相似。只是面上無光。誤餌之。令人狂走欲投水。如鬼祟。惟醋解之立愈。其海蛤用漿水煮一伏時。每一兩入地骨皮栢葉各二兩。同煮一伏時。東流水淘三次。搗粉用。韓保昇曰。取得以半天河麥五十刻。以枸杞汁拌勻。入鹽竹筒內。蒸一伏時。搗用。

性質 苦。鹹。平。無毒。

主治 欬逆上氣。喘息煩滿。胸痛寒熱。本經。療陰痿(別錄)。

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新修本草論海蛤曰。主治十二水滿

急痛。利膀胱大小腸。【唐】甄權藥性本草論海蛤曰。治水氣浮腫。下小便。治嗽逆上氣。項下瘤癭。【唐】蕭炳四聲本草論海蛤曰。止消渴。潤五臟。治服丹石人有瘡。【宋】日華諸家本草論海蛤曰。療嘔逆。胸脇脹急。腰痛。五痔。婦人崩中。帶下。

【明】李時珍本草綱目論海蛤曰。清熱利溼。化痰飲。消積聚。除血痢。婦人血結胸。傷寒反汗。搖擲中風癱瘓。

施用宜忌 凡脾胃虛寒者。禁用。畏狗膽。甘遂。芫花。蜀漆爲之使。

參攷資料 海蛤是諸蛤爛殼。文蛤別是一種。但海中蛤蚌名色雖殊。性味相類。功用亦同。無甚分別也。李時珍。

【海蛤粉】即蛤粉之處方用名。詳「蛤粉」條。

【海蛇】古籍別名 水母。樽蒲魚(拾遺)石鏡(綱目)

海蜇(俗名) *Phylemaesauti-*

外國名詞 *entel* (拉卜) *センクラゲ* (日本)

基本 係腔腸動物。海蛇科魚類。爲海蛇之肉。其皮詳見該條。

【海參】 命名 本品滋補之力不弱人參故名。

古籍別名 海鼠。沙暖。(動物學大辭典) 有刺者名刺參。無刺者名光參。大而有刺者名海男子。(綱目拾遺)

外國名詞 Stichopus japonicus Selenka (拉一) (Sea slug) (英) ナマコ 或イリコ (日本)

基本 係棘皮動物海參類有足類海參科之海參。

產地 生海灣中及外海礁岩間。

形態 海參爲魚屬之一種。形圓長體柔軟。呈蠕蟲狀。皮層黏滑。內有小骨片。一端有口。一端有肛門。口緣列有觸角二十個。背面具大圓錐狀之突起。腹面有管狀之水管。足三列。水管足有吸盤。能伸縮自如。爲運動器。口內有石灰管。下接於腸。腸迂曲初向後。又折於前。復向於後。終達肛門。當腸將達肛門處之稍偏前面。旁有一種分歧。如樹枝之管。乃是水肺。爲呼吸器。體色青黃褐或赤。背腹異形。腹面有三條縱帶紋。背面有二條。長

約一尺。日則潛伏。夜則以水管足及體內之筋肉扭動而匍行。觸手表面分泌一種黏液。時時卷曲。可以鉤取食物。產海灣泥底者。色多青黑而質軟。產外海岩礁者。色多黃褐而質硬。捕得晒乾。可供食品與藥用。

性質 甘。鹹。溫。無毒。

主治 補腎經。益精髓。消痰涎。攝小便。壯陽道。殺瘡蟲。降火滋腎。通腸潤燥。除勞怯諸症。

配合應用 ①治虛火燥結。同木耳切爛入豬大腸煮食之。

②治休息痢。每日煮湯服之。參攷資料 臨安儒醫盛天然云。曾往青山里視一婦人病。眼鼻口耳髮根出血。下部亦然。其人已昏。不知人。詢其夫得症之由。數日前受驚而起。時天酷暑大旱。又中燥烈之氣。致血溢奔騰。上下散出。即不救矣。諸醫皆斂手無策。盛有叔曾於都中得一方。專治此症。幸尙記憶。遂急喚人取山泉一桶。燒酒一觔。挾婦起坐。裸其小腹。先以燒酒淋之。俾酒從踝下。即滴入水

桶內淋訖。然後將腿置水中。一飯頃。其上下血即止。婦亦甦。面色如粉。急叫人覓壯年乳婦。以乳哺之。再用海參半觔。切片。焙爲末。每次調服三錢。日三服。蓋海參能生百脈之血。若失血過多。必須以此補之。其生血之功。捷於歸芍也。(趙學敏)

【海帶】 命名 本品產海石間。柔韌而長如帶。故名。

古籍別名 網昆布。盆布。(日本)

外國名詞 Laminae (拉丁) ホフメボンメ (日本)

基本 係褐色藻類昆布屬之海帶。產地 生海水中土間。形態 海帶爲水草類之一種。如海藻而粗。其葉體短小而扁平。厥形如帶。長自一尺至三尺。幅廣近尺。可供藥用。性質 鹹寒。無毒。主治 催生治婦人病。及療風下水。歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論海帶曰。治水病。癰瘤

功用海藻。

參攷資料 海帶可以束物。醫家用以下水。勝於海藻。昆布。(掌禹錫)

【海梧】 命名 本品形似梧桐。故名。

產地 出安南及熱帶諸地。

形態 海梧爲喬木類之一種。樹如桐而色白。結實肥大。如小栗。而有三角。甘肥。同松子。可供食與藥用。

性質 甘。平。無毒。

主治 利大小腸。益智慧。開心胸。明耳目。療怔忡健忘。夜多惡夢。空心。日食十數枚。月餘。白愈。疝氣。囊大如斗。燒灰服之。產地 生安南及熱帶諸地。【海梧子】 帶諸地。形態 海梧爲喬木類之一種。樹似梧桐。色白。葉似青桐。結實肥大。如小栗。而有三角。味甘可食。同於松子。其子可供藥用。性質 甘。平。無毒。主治 明耳目。益智慧。開心胸。利大小腸。治怔忡。健忘。疝氣。囊大如斗。

之（聖惠方）

①治中惡霍亂。海桐皮煮汁服之。（聖濟總錄方）

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡無風寒溼邪者禁用。

著名方劑

●海桐皮散。治手足拘攣。證治準繩方。海桐皮、當歸、湯洗焙乾。牡丹皮、熟地、牛膝（酒浸焙）各一兩。山茱萸、補骨脂各五錢。上藥研爲細末。每服一錢。清水八分。加葱白二寸。煎至五分。去滓。食前溫服。○海桐皮湯。治跌打損傷。金鑑方。海桐皮、鐵線透骨草、乳香、沒藥各二錢。當歸錢半。（酒洗）川椒三錢。川芎、紅花各一錢。威靈仙、白芷、甘草、防風各八分。右爲細末。裝白布袋內。紫口煎湯。薰洗患處。

參攷資料

●古方多用浸酒。

治風濕。南唐錫州刺史王紹顏撰續傳信方云。頃年予在姑孰。得腰膝痛不可忍。醫以腎臟風毒攻刺諸藥莫療。因覽劉禹錫傳信方。備有此驗。修服一劑。便減五分。其方用海桐皮二兩。牛膝、芎藭、羌活、地

骨皮、五加皮各一兩。甘草半錢。薤苡仁二兩。生地黃十兩。並淨洗焙乾。剉以綿包裹。入無灰酒二斗。浸之。冬二七。夏一七。空心飲一盞。每日早午晚各三次。長令醺醺。此方不得減減。禁毒食。（蘇頌）○海桐皮能行筋絡。達病所。又入血分。及去風殺蟲。李時珍。○海桐生南海及雷州。近海州郡亦有之。葉大如手作三花尖。皮若梓白皮而堅。朝可作繩。入水不爛。不拘時月採之。又云。嶺南有刺桐。葉如梧桐。其花附幹而生。側數如掌形。若金鳳。枝幹有刺。花色深紅。江南有類桐。紅花無實。（蘇頌）○海桐皮有巨刺。如鼈甲之刺。或云。即刺桐皮也。按替含南方草木狀云。九真有刺桐。布葉繁密。三月開花。赤色。照映三五方凋。則三五復發。陳翥桐譜云。刺桐生山谷中。文理細緊。而性喜折裂。體有巨刺。如繡樹。其實如楓。類桐。身青。葉圓大而長。高三四尺。便有花。成朵而繁。紅色如火。爲夏秋榮觀。李時珍。

【海桐花】

主治 止金瘡血。殊效。



海桐花

【海珠】即紅海粉之別名。詳「紅海粉」條。

【海珠藥】即龍眼之古籍別名。典見和漢藥考。詳「龍眼」條。

【海珠蠶】即龍眼之古籍別名。典見和漢藥考。詳「龍眼」條。

【海粉】即紅海粉之別名。詳「紅海粉」條。

【海粉半夏麴】

原名 海粉麴

命名 本品爲半夏麴之一種。

係和海粉製成者。故名。

製法 用半夏爲末。入海粉。雄黃二分之一。和熟蜜。草蜜七日。待生黃衣。懸掛風乾。入藥用。

採取 以陳久者良。

主治 療積痰沉疴。

【海粉麴】即海粉半夏麴之原名。詳「海粉半夏麴」條。

【海桂】即水英之古籍別名。典見唐天寶單方圖詳「水英」條。

【海蚌殼】即石決明之古籍別名。典見和漢藥考。詳「石決明」條。

命名 本品乃魚鱗類也。狀如馬形。故名。

古籍別名 水馬（綱目）

產地 生南海中。

形態 海馬爲介類硬骨魚之一種。雌者色黃。雄者色青。長一二寸至三四寸。側面視之。頭略似馬體。或褐色。或作銀白色。有喙下垂。全體有硬皮。成環節狀。腹部稍粗。尾細長。可供藥用。

性質 甘溫。無毒。

主治 婦人難產。帶之於身。甚驗。臨時燒末飲服。并手握之。即易產。

歷代記述攷證 【宋】蘇頌圖經本草論海馬曰。主產難及血氣痛。【明】李時珍本草綱目論海馬曰。暖水臟。壯陽道。消癥塊。治疔瘡腫毒。

參攷資料 海馬雌雄成對。其性溫暖。頗有交感之義。故難產及陽虛。房中術多用之。如蛤蚧。即君子之功也。蝦亦壯陽。性應同之。（李時珍）

十 薑 海

血分。故主治五淋荳痛溼腫。下熱除則上熱亦息。(汪雙池)

【海南石】即浮海石之古籍別名。

典見和漢藥考。詳『浮海石』條。

【海南檳】即檳榔之處方用名。詳『檳榔』條。

【海砂】即食鹽之古籍別名。典見綱目。詳『食鹽』條。

【海紅】古籍別名 海棠梨。(綱目)

產地 出海外。

形態 海紅爲山果類之一種。

即海棠梨之果實。如木瓜而小。二月開紅花。八月實熟。採得可供藥用。

性質 酸。甘。平。無毒。

主治 止洩痢。

命名 本品大如紅豆。故名。

產地 生南海諸地。

形態 海紅豆爲喬木類之一種。樹高三二丈。葉似梨葉而圓。春開白花。花後枝間結莢。其子略扁。累累如綴珠。皮紅肉白。可供藥用。

性質 微寒。有小毒。

主治 人黑皮。黥鬬花。癰頭面。

遊風。宜入面藥及溼頭。

【海紅柑】即柑之樹小實大。皮厚色紅者。典見綱目。詳『柑』條。

【海胡桃】即甘劍子之古籍別名。典見綱目。詳『甘劍子』條。

【海苔】即乾苔之古籍別名。典見綱目。詳『乾苔』條。

【海若】即鳥細骨之古籍別名。典見圖經本草。詳『鳥細骨』條。

【海孫】即王孫之齊地別名。詳『王孫』條。

【海屬】即車渠之古籍別名。典見綱目。詳『車渠』條。

形態 海根爲溼草類之一種。多生山谷中。莖色赤。葉似馬蔘。其根形似菰。可供藥用。

性質 苦。小溫。無毒。

主治 霍亂中惡。心腹痛。鬼氣。疰忤。飛尸。喉痺。蠱毒。癰疽。腫赤。白遊。瘰癧。咬大毒酒及水磨服并傳之。

命名 本品樹似桐。而皮黃白有刺。故名。

古籍別名 刺桐皮。(綱目)木

棉樹皮。藥物生產辨。

基本 屬海桐花科。爲海桐之木皮。海桐爲落葉喬木。高數尺。木幹皆有刺。葉圓大。稍似梧桐。甚繁密。春暮色深紅。花附幹生。側敷如掌形。若金鳳。其子實似楓。

產地 陳仁山藥物生產辨云。海桐皮產廣東博羅。各省亦有出。

形態 似梓白皮而堅韌。

製法 與他藥水煎。或酒浸服。

或到末和作丸散。

性質 苦。平。無毒。

功效 祛風溼。利經絡。治頑痺。療脚氣。用治風溼痺痛藥。

主治 霍亂中惡。赤白久痢。除疳。蠱毒。牙齦蟲痛。並煮服及含之水。浸洗目。除膚赤。

歷代記述攷證 【唐】李珣海藥本草論海桐皮曰。主治腰脚不遂。血脈頑痺。腿膝疼痛。赤白瀉痢。

【明】李時珍本草綱目論海桐皮曰。去風殺蟲。煎湯洗赤目。【清】黃宮繡本草求真論海桐皮曰。海桐皮辛苦而溫。能入肝經。血分。祛風除溼。及行經絡。以達病所。是以腰膝脚痛能療。赤白瀉痢能止。蟲牙

風痛。煎湯漱之。能愈。疳蝕疳疳。膿汁塗之。能消。目赤膚癢。浸水洗之。能退。皆風祛溼散之力。用者須審病自外至則可。若風自內成。未可妄用。須隨症酌治可耳。

近人學說 張山雷曰。海桐皮唐人李珣海藥本草。謂此木生南海山谷中。似桐而皮黃白。色有刺。故名海桐。亦名刺桐。蘇頌謂生南海及雷州近海諸郡。皮堅韌。可作繩索。入水不爛。壽頤按物實如此。其力在皮。故入藥能外治皮膚之病。祛風逐溼。而亦宜通絡脈。可療頑痺腿膝疼痛。蘇頌引劉禹錫傳信方。以此藥合牛膝。芎藭。羌活。地骨皮。五茄皮。甘草。蔥。生。地。浸酒服。治腰膝痛。不可忍。有驗。洵又謂治赤白痢。蓋味苦氣涼。能導溫熱積滯以下行也。大明以爲性溫者非是。

配合應用 ①同真川槿皮。輕粉。蛇牀子。山大黃爲末。傳癰疽。

②治風濕有蟲。海桐皮。蛇牀子。等分爲末。以臘脂調搽之。(艾元英如宜方)

③治風蟲牙痛。海桐皮煎水漱。

九九二

詳「臘脂」條

【海金沙】

命名。本品質細色黃故名。謂之海者。神異之也。俗名竹園萎者。象葉形也。

古籍別名 竹園萎（俗名）

外國名詞 *Iygodium japonicum, Sw. (拉丁)*

基本 屬海金沙科。為其葉背之胞子。

產地 陳仁山藥物生產辨云。

海金沙以湖南、四川等所產為上。乃升金砂所結之粉。體輕。色紅棕者為佳。廣東、英德、清遠亦有之。又有名土金砂。乃燈心花仁出產。番禺大石。



砂 金 海

形態 海金沙為多年生半匍類。春日從宿根生苗。及長則成莖。莖質硬而有光澤。纏繞他物。長達數尺。葉為分裂之複葉。梢頭小葉類繖葉。背之邊緣。皆皺作卷狀。中

並列子囊。一端稍作帽狀。胞子為可動性。輕粉末。呈黃褐色。逢火則燃燒。如石松子。秋季取梢葉於紙上曬乾。則子囊落集其上。謂之海金沙。供藥用。

採取 秋七月間採葉收之。

性質 甘寒。無毒。

效能 滲溼熱。通五淋。用作鎮靜及利水藥。

主治 通利小腸。得梔子、馬牙消、蓬沙、療傷寒熱狂。或丸或散。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論海金沙曰。治溼熱腫滿。小便熱淋。膏淋。血淋。石淋。莖痛。

解熱毒 【明】繆希雍本草經疏論海金沙曰。海金沙味甘淡。氣寒。性無毒。甘寒淡滲之藥。故主通利小腸。得牙硝、梔子。皆鹹寒苦寒之極。又得蓬沙之辛。所以能治傷寒熱狂。大熱當利小便。此釜底抽薪之義也。淡能利竅。故治熱淋。血淋。膏淋等病。乃手太陽小腸經之藥也。

【清】黃宮繡本草求真論海金沙曰。海金沙味甘而淡。氣寒無毒。為主通利小腸。血分要藥。凡小腸熱閉。而見五淋疼痛不止者。服之使

熱盡從小便而出。且於傷寒熱閉。而見腹滿狂燥。則當於此加梔子、朴硝、蓬沙投治。俾熱亦從小便而出。此釜底抽薪之一義也。但腎臟真陽不足。切忌。洵淨取浮者曬乾。擦之不沾指者。為忌火。

配合應用 ①治熱淋急痛。海金沙、草蔴乾為末。煎生甘草湯。調服二錢。此陳總領方也。一加滑石（夷堅志方）

②治小便不通。臍下滿悶。海金沙一兩。臘南茶半兩。搗碎。每服三錢。生薑甘草煎湯下。日二服。亦可末服（綱經本草方）

③治膏淋如油。海金沙、滑石各一兩。甘草梢二錢半為末。每服二錢。麥冬煎湯服。日二次。（仁存方）

④治血淋淋瀝。但利水道。則清濁自分。海金沙末。新汲水。或沙糖水服一錢（普濟方）

⑤治脾溼腫滿。腹脹如鼓。喘不得臥。海金沙散用海金沙三錢。白朮四兩。甘草半兩。黑牽牛頭末一兩半為末。每服一錢。煎倒流水調下。得利為妙。（東垣關室秘藏方）

⑥治痘瘡變黑。歸腎。用竹園萎草煎酒傳其身。即發起（直指方）

用量 錢半至三錢

施用宜忌 凡虛而無溼熱者禁用。忌火。

參攷資料 ①出黔中郡。湖南亦有生。作小株。高一二尺。七月收其全科。於日中曝之。小乾。以紙襯承。以杖擊之。有細砂落紙上。且曝且擊。以盡為度（劉禹錫）

②江浙、湖、湘、川、陝皆有之。生山林下。莖細如線。引於竹木上。高尺許。其葉細如圓莖。葉而甚薄。背面皆青。上多皺文。皺處有砂子。狀如蒲黃粉。黃赤色。不開花。細根堅強。其砂及草皆可入藥。方士採其草。取汁煮砂。縮汞。李時珍

③海金沙砂生於葉上。小腸膀胱血分藥也。熱伏二經。血分者宜之。故小便熱淋。莖痛為要藥。張石頑

④海金沙子結葉間。如膽附肝之象。三焦與膽通。惟膽中相火結。三焦之水乃結。此藥以結解結。唐容川

⑤海金沙草上結砂。亦所含之精英也。氣輕上浮。宜入心肺。砂體下墜。則入二腸。甘淡則能滲溼去熱。色黃赤則入

(西陽雜俎)松實。俗名)

外國名詞 Pinus Koreien-

sis, S. et Z. (拉丁) テウセン

ハツ テウセンゴエウ(日本)

基本 係松杉科松屬。爲海松

之子仁

產地 寒地恒有出。醫學大辭

典曰。產關東及直隸等處。

形態 海松子爲莢果類之常

綠喬木。高至數丈。有三樹脂道。葉

作長針形。往往五葉相叢。生花單

性。雌花與雄花同株。果實甚大。爲

毬果。呈長卵形。長約六七寸。各鱗

片間有二子。長五分許。有脂氣。甚

香美。大如巴豆。上有三稜。一端略

尖。



子 松 海

採取 七八月間採之。過時即

散落難收也。

製法 採得剥去殼。取仁用水

煎。或搗研和藥。

性質 甘。小溫。無毒。

效能 通虛。治風痺。用作潤

燥鎮咳藥。又爲祛風頑痺藥。

主治 逐風痺寒氣。虛羸少氣。

補不足。潤皮膚。肥五臟。

歷代記述攷證 【唐】李珣海

藥本草論海松子曰。主諸風。溫腸

胃。久服輕身延年不老。【宋】開寶

重定新本草論海松子曰。骨節風

頭眩。去死肌。變白。散水氣。潤五臟

不饑。【宋】寇宗奭本草衍義論海

松子曰。同柏子仁治虛。【明】李

時珍本草綱目論海松子曰。潤肺

治燥結咳嗽。【明】繆希雍本草經

疏論海松子曰。海松子氣味香美

甘溫。甘溫助陽氣而通經。則骨節

中風水氣。及因風頭眩死肌自除

矣。氣溫屬陽。味甘補血。血氣充足

則五臟自潤。髮白不飢。所由來矣

仙方服食。多餌此物。故能延年輕

身不老也。【清】王士雄隨息居飲

食譜論海松子曰。海松子甘平潤

燥。補氣充飢。養液息風。耐飢溫胃

通腸。辟濁下氣。香身最益老人。果

中仙品。宜有宜館。服食所珍。

配合應用 服松子法。七月

取松實。去木皮。搗如膏。收之。每服

雞子大。酒調下。日三服。百日身輕。

三百日行五百里。絕穀。久服神仙

渴。即飲水亦可。以鍊過松脂同服

之。【聖惠方】

治肺燥咳嗽。蘇遊鳳體湯。用

松子仁一兩。胡桃仁二兩。研膏和

熟蜜半兩。收之。每服二錢。食後沸

湯點服。【外臺祕要方】

治小兒寒咳。或作鹽。用松

子仁五個。百部炒。麻黃各三分。杏

仁四十個。去皮尖。以少水略煮三

五沸。化白砂糖丸。茨子大。每食後

含化十九大妙。【錢乙小兒方】

治大便虛秘。松子仁。柏子仁。

麻子仁等分。研泥。溶白蠟和丸。梧

子大。每服五十九丸。黃芪湯下。【寇

氏方】

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡胃薄便瀉及有

溼滯痰飲者禁用。

參攷資料 服食家用松子。

皆海松子。曰中國松子。肌細力薄。

只可入藥耳。按列僊傳云。僊姪好

食松實。體毛數寸。走及奔馬。又僊

子少在黑山。食松子茯苓。壽數百

歲。又亦松子好食松實。天門冬。石

脂。齒落更生。髮落更出。莫知所終。

皆指此松子也。【李時珍】新羅

松子甘美大溫。去皮食之。甚香。與

雲南松子不同。雲南松子似巴豆。

其味不及。與卑古國偏桃仁相似。

多食發熱毒。李珣。按醫說云。

食胡羊肉。不可食松子。而物類相

感。志云。凡雜色羊肉。入松子則無

毒。其說不同何哉。【李時珍】海

松子出遼東及雲南。其樹與中國

松樹同。惟五葉一叢者。毬內結子

大如巴豆。而有三稜一頭尖。爾久

收亦油。中國松子。大如柏子。亦可

入藥。不堪果食。按段成式酉陽雜

俎云。予種五鬣松二株。根大如碗

結實與新羅南詔者無別。其三鬣

者。俗呼孔雀松。亦有七鬣者。或云

三鍼者爲栝子松。五鍼者爲松子

松。【李時珍】

海松根。卽長松根之古籍別名。

典見植物名彙。詳長松根條。

海松實。卽海松子之處方用名。

詳海松子條。

海狗油。卽臘狗油之原名。詳

臘狗油條。

海狗腎。卽臘狗腎之處方用名。

及脚氣。并打撲傷折。及胎孕有傷。服過百粒。即爲全人。此方後人易名紫萍。一粒丹。(李時珍) ①本草所用水萍。乃小浮萍。非大蘋也。陶蘇俱以大蘋註之誤矣。萍之與蘋。音雖相近。字却不同。形亦迥別。浮萍處處池澤。止水中甚多。季春始生。或云楊花所化。一葉經宿。即生數葉。葉下有微鬚。即其根也。一種背面皆綠者。一種面青背紫。赤若血者。謂之紫萍。入藥爲良。七月採之。淮南萬畢術云。老血化爲紫萍。恐自有此種。不盡然也。小雅呦呦鹿鳴。食野之華者。乃蒿屬。陸佃指爲萍誤矣。(李時珍)

【浮萍草】即浮萍之處方用名。詳「浮萍」條。

【浮萍】即浮萍之古籍別名。典見和漢藥考。詳「浮萍」條。

【浮爛羅勒】 產地 生康國。形態 浮爛羅勒爲喬木類之一種。其皮似厚朴。可供藥用。

性質 酸。平。無毒。

主治 一切風氣。開胃。補心。除冷痺。調臟腑。

十畫 浮 浴 海

【浴香】①即檀香之古籍別名。典見綱目。詳「檀香」條。②即乳香之古籍別名。典見綱目。詳「乳香」條。

【海人草】即鸕鶿菜之古籍別名。典見和漢藥考。詳「鸕鶿菜」條。

【海山仙人】即荔枝之古籍別名。典見和漢藥考。詳「荔枝」條。

【海仁草】即鸕鶿菜之古籍別名。典見和漢藥考。詳「鸕鶿菜」條。

【海巴子】即貝子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「貝子」條。

【海月】 命名 本品蛤類也。形似半月。故名。

古籍別名 玉瑤。明瓦。江瑤。馬頰。馬甲。(綱目)

外國名詞 Placenta place- nta Linn. Window Shell (拉丁) ヲドガヒ (日本)

基本 係軟體動物瓣鰓類無管類單柱類海月科爲海月之殼。其肉詳見該條。

產地 生閩粵海濱間。

形態 海月爲介類之一種。其殼圓形而扁。色澤似雲母。而質透明。較合部在右殼。有二齒與左殼之二溝相對。脚無足絲。棲於海濱

砂土。腹中有小蟹。飢則蟹出覓食。飽則海月亦飽。以火近之。蟹出而海月斃。其殼透明。可供遮窗與藥用。

性質 甘。辛。平。無毒。

主治 消渴下氣。調中利五臟。止小便。消腹中宿物。令人易飢。能食。生薑醬同食之。

【海月肉】 性質 甘。辛。平。無毒。

主治 瀉溼熱。療鰓膝風。煎湯洗之。

【海牛】 命名 本品有角如牛。故名。

產地 出東海中。

形態 海牛爲介類海螺之一種。頭有硬角。尖銳有紋。身蒼色。有龜背紋。腹部黃白色。有筋頂花點。魚尾可供藥用。

性質 鹹。溫。無毒。

主治 益腎固精。興陽。

【海石榴】即石榴高一二尺。即結實者之別名。詳「石榴」條。

【海米】即蘼草之古籍別名。典見方孝孺集。詳「蘼草」條。

【海羊】即蝸牛之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蝸牛」條。

【海男子】即海參之大而有刺者。詳「海參」條。

【海芋】 命名 本品根形似芋。故名。

古籍別名 羞天草。玉冊。觀音蓮。天荷。隔河仙。(綱目)

外國名詞 Alocasia Macro- rhiza, Schott. (拉丁) ヤムイモ (日本)

基本 係天南星科海芋屬。爲海芋之根。

產地 生山野間。

形態 海芋爲毒草類之野生草本。春月生苗。高四五尺。葉似芋葉。而有幹。夏秋間抽莖。開花如一瓣蓮。花碧色。花中有蕊。長作穗狀。其根可供藥用。

性質 辛。有大毒。

主治 瘡癰。毒腫。風癩。伏礪砂。

【海松子】 命名 本品乃海松樹之子實。故名。

處方用名 松子仁。海松實。

古籍別名 孔雀松。(綱目)

一叢五葉者名五鬣松。新羅松子。(綱目) 朝鮮松。(日本) 括子松。

十畫 浮

薑蜜水調下。(聖濟總錄方)

①治鼻衄不止。用浮萍末吹之。

(聖惠方)

①治中水毒病。手足指冷至膝肘。即以浮萍日乾爲末。飲服方寸匕良。姚僧坦集驗方。

①治大腸脫肛。水聖散用紫浮萍爲末。乾點之。(危氏得效方)

①治身上虛癢。用浮萍末一錢。以黃芩一錢。同四物湯煎湯調下。(丹溪纂要方)

①治風熱癰癤。浮萍熬過。焙乾。牛蒡子酒煮。曬乾。炒各一兩爲末。每薄荷湯服一二錢。日二次。(古今錄驗方)

①治風熱丹毒。浮萍搗汁遍塗之。(子母祕錄方)

①治汗斑癰癤。端午日收紫背浮萍。曬乾。以四兩煎水浴。并以萍擦之。或入漢防己二錢亦可。(袖珍方)

①治少年面皰。浮萍日採會之。并飲汁少許。(外臺祕要方)又用紫背浮萍四兩。防己一兩。煎濃汁洗之。仍以萍於斑點上熱擦。日三五次。物雖微末。其功甚大。不可小看。

(普濟方)

①治粉滓面點。溝渠小萍爲末。日傅之。(聖惠方)

①治大風癰疾。浮萍草。三月採。淘三五次。蜜三五日。焙爲末。不得見日。每服三錢。食前溫酒下。又方。

七月七日。取紫背浮萍。日乾爲末。半升入好酒風散五兩。每服五錢。水煎。飲仍以煎湯洗浴之。(十便良方)

①治癰瘡入目。浮萍陰乾爲末。以生羊子肝半個。同水半盞。煮熟。搗爛絞汁。調末服。甚者不過一服。已傷者十服見效。(危氏得效方)

①治弩肉攀睛。青萍少許。研爛。入片腦少許。貼眼上效。(危氏得效方)

①治毒腫初起。水中萍子草。搗傅之。肘後方)

①治發背初起。腫嫩赤熱。浮萍搗和雞子清貼之。(聖惠方)

①治楊梅瘡癰。水萍煎汁。浸洗。半日數日一作。(集簡方)

①治燒煙去蚊。五月取浮萍陰乾用之。(孫真人方)

用蠶 八分至錢半。

九八八

施用宜忌 凡非實熱實邪者。禁用。

參攷資料 ①浮萍發汗。勝於麻黃。(朱實亭) ②俗醫用治時行熱病。亦堪發汗。其有功力。用浮萍一兩。四月十五日採之。麻黃去根節。桂心附子炮裂去脾皮各半兩。四物搗細。每服一錢。以水一中盞。生薑半份。煎至六分。和浮萍。汗出乃瘥。又治惡疾癰瘡遍身者。濃煮沐浴。日多效。此方甚奇。古也。(蘇頌) ③浮萍其性輕浮。入肺經。達皮膚。所以能發揚邪汗也。世傳宋時東京開河。掘得石碑。梵書大篆一詩。無能曉者。真人林靈素逐字辨譯。乃是治中風方。名去風丹也。詩云。天生靈草無根幹。不在山間不在岸。始知飛絮逐東風。汎梗背青飄水面。神仙一味去洗疴。採時須在七月半。選其癰風與大風。些小微風都不算。豆淋酒化服三九。鐵鑊頭上也出汗。其法以紫色浮萍。曬乾爲細末。煉蜜和丸。彈子大。每服一粒。以豆淋酒化下。治左癱右瘓。三十六種風。偏正頭風。口眼喎斜。大風癰風。一切無名風。

小於蓮子。五六月間開花者。在莖之一寸四五分處。三瓣白色。能結實。其開花遲者。則開於莖下之一寸許。色綠。不結實。入藥用此種。水萍有青萍。品字藻。槐葉藻。滿江紅。種。青萍及品字藻。俱屬浮萍科植物。槐葉藻及滿江紅。俱屬槐葉藻科植物。凡止水中處。皆有之。

青萍葉長。兩面皆綠。品字藻三葉相附。色較淡。槐葉藻肥如山椒。生四五葉。色深綠。根細長一二寸。色黃。楊性柔。賴以其葉形如槐葉。故名。滿江紅葉簇生。色紅紫。經冬不凋。別有一種紫背浮萍。俗呼爲家鴨之餌。生於三月。故禮月令云。春季萍始生。此草入冬。經霜即枯。沈於水底。明年三月又復上浮。生葉繁茂。葉面色綠。葉背色紫。有細根入藥用。

採取 六七月間。採之曝乾。

製法 李時珍曰。紫背浮萍。七月採之。揀淨。以竹篩攤曬。下置水

一盆。映之。即易乾也。

性質 辛寒。無毒。

效能 發汗。利溼。用作解熱及利尿藥。

主治 暴熱身癢。下水氣。勝酒。長鬚髮。止消渴。久服輕身。(本經)下氣。以沐浴生毛髮。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】陳藏器

本草拾遺論浮萍曰。搗汁服。主水腫。利小便。爲末。酒服。方寸匕。治人中毒。爲膏。傅面。黤。【宋】大明諸家本草論浮萍曰。治熱毒風熱。熱狂。瘡腫。毒湯火傷。風癰。【明】李時珍本草綱目論浮萍曰。主風溼麻痺。脚氣。打撲傷損。目赤。醫。口舌生瘡。吐血。衄血。癰。丹毒。【明】繆希雍本草經疏論浮萍曰。水萍。專得水氣之清陰。故味辛氣寒。別錄兼酸無毒。蓋其體輕浮。其性清燥。能祛溼熱之藥也。熱氣鬱於皮膚。則作癢。味辛而氣清寒。故能散皮膚之溼熱也。寒能除熱。燥能除溼。故下水氣。酒性溼熱。而萍之質不沈於水。其氣味辛寒。輕清而散。故能勝酒。血熱則鬚髮焦枯。而易墮。涼血則營氣清。而鬚髮自長矣。別錄主消渴者。以溼熱之邪去。則津液自生。而渴自止也。其曰下氣。以沐浴生毛髮者。亦以寒能除熱。涼血之驗也。熱邪不干。營氣清旺。則能

復輕身矣。【清】黃宮繡本草求真論浮萍曰。浮萍浮於水上。體輕氣浮。辛寒。古人謂其發汗勝於麻黃。下水。熱於通草。一語括盡浮萍治功。故凡風溼內淫。癰。不舉。在外而見肌膚癢。一身暴熱。在內而見水腫不消。小便不利。用此疎肌通氣。俾風從外散。溼從下出。而癰與癢。其悉除矣。至本經載長鬚髮者。以毛竅利而血脈榮也。止消渴者。以經氣和而津液復也。勝酒者。以陽明通達而能去酒毒也。總皆因其體浮。故能散風。因其氣寒。故能勝熱。因其產於水上。故能以水利小耳。用浮萍。其背紫色。爲末。蜜丸。彈子大。空心酒服。然必大實大熱。方可用此。若表虛自汗者。其切

禁焉。燒酒辟蚊。亦佳。但氣虛切勿近此。【清】黃元御玉楸藥解論浮萍曰。浮萍辛涼發表。治痘。疫。斑。疹。療肌肉麻痺。中風。喘。斜。癱。瘓。醫。癰。疽。熱。腫。隱。疹。癢。楊。梅。粉。刺。汗。斑。皆。驅。利。小。便。閉。癰。消。肌。膚。腫。脹。止。吐。衄。長。鬚。髮。

近人學說 張山雷曰。浮萍味辛氣寒。而輕浮最甚。故上宣肺氣。

外達皮毛。發汗泄熱。下通水道。皆其天然之性。作用本經別錄大明諸家主治。無不在此範圍之內。然而色綠而背色紅紫。則又不僅專入氣分。而亦必兼清血熱。故聖濟以治吐血不止。聖惠方又治鼻衄。瀕湖以治目赤口瘡。既善清火。而又導熱下行。其效良捷。近人止

以爲發汗之藥。而不知清熱正其專長。殊覺未盡其用。且其質最輕。氣味皆薄。雖曰發汗。性非溫熱。必無過汗之慮。而俗子畏之多不敢用。則綱目所引去風丹一方。有鐵鑊頭上也出汗一句之故。張石頑因之。亦謂去風丹治大風。癩風等皆驗。且有發汗勝於麻黃之句。蓋皆未嘗於物理上體驗之耳。壽頤按。瀕湖所引去風丹一詩。不知何本。據其所稱。東京石碑。梵書大篆。人不能曉。真人林某逐字辨譯云。云。頤謂既梵字。斷無逐字譯之。卽成七言詩句之理。且大篆之與梵字。馬牛不相及。何以梵字而有大篆之名。其爲妄人僞造。不攻自破。據其所治有左癱右瘓。三十六種風等說。淺俗已極。明是無知方

十畫 浮

石曰。海石即書所云浮石者是也。其石係水沫結成。浮於水上。故以浮名。色白體輕。味鹹氣寒。蓋既有升上之能。復有達下之力。其曰能治上焦痰熱。目翳痘癰者。以其氣浮上達之謂也。能治諸淋積塊癭瘤者。以其鹹潤癭堅之意也。至於實則宜投。虛則忌服者。以其忌有剋削之氣也。味鹹者良。慢過水飛用。

配合應用 ①治咳嗽不止。浮石末湯服。或蜜丸服。〔肘後方〕

②治消渴引飲。浮石舶上青黛等分。麝香少許爲末。溫湯服一錢。又方用白浮石。蛤粉煆殼等分爲末。鯽魚膽汁七個調服。三錢神效。〔本事方〕

③治血淋砂淋。小便澀痛。用黃爛浮石爲末。每服二錢。生甘草煎湯調服。〔直指方〕

④治石淋破血。浮石滿一手爲末。以水三升。酢一升和煮二升。澄清。每服一升。〔傳信適用方〕

⑤治小腸疝氣。莖縮囊腫者。直指方用浮石爲末。每服二錢。木通赤茯苓。麥門冬煎湯調下。又用海

石。香附等分爲末。每服二錢。薑汁調下。〔丹溪方〕

⑥治頭核腦瘰。頭枕後生痰核。正者爲腦。側者爲痺。用輕虛白浮石燒存性爲末。入輕粉少許。麻油調掃塗。勿用手按。即腫。或加焙乾黃牛糞尤好。亦治頭瘕。〔直指方〕

⑦治底耳有膿。海浮石一兩。沒藥一錢。麝香一字爲末。微淨吹之。〔華濟方〕

⑧治疳瘡不愈。海浮石燒紅。醋淬數次。二兩。金銀花一兩爲末。每服二錢。牛水煎服。病在上食後。在下食前。一年者半年愈。〔儒門事親方〕

⑨治疔瘡發背。白浮石半兩。沒藥二錢。牛爲末。醋糊。丸梧子大。每服六七丸。臨臥冷酒下。亦治諸般惡瘡。〔普濟方〕

用量 三錢至四錢。
施用宜忌 凡氣血兩虛。及痰飲寒嗽者禁用。

參攷資料 ①遠行無水。止渴和苦栝樓爲丸。每旦服三十丸。永無渴也。〔陳藏器〕 ②浮石乃江海間細沙水沫凝聚日久而結成者。

狀如水沫及鑽乳石。有細孔如蛀窠。白色體虛而輕。今皮作家。用磨皮垢甚妙。海中者味鹹。入藥更良。〔李時珍〕 ③燒泥爲瓦。燔木爲炭。水沫爲浮石。此皆去其柔脆。變爲堅剛也。交州記云。海中有浮石。轉虛如以磨。磨養水飲之。止渴。即此也。〔抱朴子〕

〔浮蛆〕即酒釀之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『酒釀』條。

〔浮麥〕即浮小麥之處方用名。詳『浮小麥』條。

〔浮留〕即菟醬之古籍別名。典見食療本草。詳『菟醬』條。

〔浮留藤〕即菟醬之古籍別名。詳『菟醬』條。

原名 水萍。

〔浮萍〕 命名 本品與蘋藻之類不同。蓋無根以入水底土中。而輕浮水面。隨風蕩漾故名。

處方用名 浮萍草。紫背浮萍。古鑑別名 荇。水花。水衣。水蘚。

水白蛙魚食。池星鴨得。浮萍。水蘚。九子萍。水中萍子草。〔和漢藥考〕
基本 屬浮萍科植物。爲水中

九八六

之浮萍。

產地 多在池澤溝渠深淺間。

形態 浮萍爲一年生草。葉相集浮於水面。葉爲扁平之倒卵圓形。大二三分。有光澤。而綠色。背紫紅色。葉下多鬚根。夏開淡綠色小花。此草浮遊不定。隨風所至。吸收溶解水中之養分。故生長旺盛。



浮萍

種類 ①大者曰蘋。中者曰荇。小者曰萍。②蘋荇葉大。雖生水而有根。直入水底土中。與小者浮萍迥然不同。③浮萍有背面皆綠色。有面背皆紫者。若血者。入藥以紫背爲良。古今要覽稱第四百六十五卷浮萍條云。本草綱目荇菜集解。庚辛玉冊云。鳧葵花爲荇菜。白

花爲白蘋。即水鏡草之一。水鏡草荇之別名也。詩召南。于以采蘋。古之所謂蘋。今之大萍也。俗呼水龍。泡子。亦曰蘭山。此萍八月抽莖開花。早者五月即開。七月結實。色綠。

產地 出於浙江錢塘寬橋。

主治 取根浸酒服。追風活血。爲風痺要藥。

【浙茯苓】即茯苓之處方用名。詳「茯苓」條。

【浙驢皮膠】**命名** 本品係浙人所造之黑驢皮膠。故名。

製法 其造法一如造阿膠式。但用杭屬臨平鎮寶莊渡地方之泉水煎熬而成。赤黑色帶絲。頂有豬鬃紋。與東阿所造無二。入藥亦頗有效。

主治 內傷腰痛。強力伸筋。添精固腎。並補血潤燥。功同阿膠。

參攷資料 阿膠貴者難得有。浙膠則較勝於用雜膠也。寶莊在臨平湖西岸。有寶莊泉。土人名爲大力水。云食之多力。向聞虎跑泉水。注大缶中。平口授錢於中。能吞一百六十青錢。而水不溢。他水至八十已浸漫於外矣。而寶莊水能吞二百青錢。不溢其力更勝。可知以此水作膠。自可敵伏流之濟水。蓋其含有特殊之礦質。故功亞阿膠。（綱目拾遺）

【菴草】即天門冬之古籍別名。典見綱目。詳「天門冬」條。

【浮小麥】**處方用名** 浮麥。**古籍別名** 鼓麥。（和漢藥考）

基本 係小麥水淘淨起者。產地 凡產麥區域恒有之。

形態 浮麥之形色與小麥同。惟浮麥中虛體輕。故能浮水也。

採取 夏四五月間。採收曬乾。

製法 淘淨焙用。**性質** 甘。鹹寒。無毒。

效能 瀉斂止汗。用作解除虛熱藥。

主治 益氣除熱。止自汗盜汗。骨蒸虛熱。婦人勞熱。

配合應用 治虛汗盜汗。用浮小麥文武火炒爲末。每服二錢。牛

麥熟切片。米飲下。日三服。或煎湯代茶飲。一方以猪鬃唇蘸食亦良。

（衛生寶鑑方）**參攷資料** 蓋浮麥無肉也。凡人身體疼痛及瘡瘍腫爛沾漬。或小兒暑月出痘瘡潰爛。不能著席。睡臥者。並用夾禪盛鉄縫合。藉臥性涼而輒。誠妙法也。

【浮石】即浮海石之原名。詳「浮海石」條。

【浮貝】即貝子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「貝子」條。

【浮根淺】即菱之古籍別名。典見綱目。詳「菱」條。

【浮海石】**原名** 浮石。**命名** 本品體輕而多氣孔。入水則浮海中。故名。

古籍別名 水花（拾遺）羊肚石。海南石。玉脂芝（和漢藥考）。

外國名 錫（Bimstein）（拉丁）**基本** 火山噴出之花崗岩。消

失中存之珪酸鐵等可溶性物質。而但遺石灰質及雲母質之物。其

在海濱者。更爲海水溶解。失其成分而似海綿。且被波浪磨擦。微呈

圓形。入藥以得海濱者爲良。

產地 陳仁山藥物生產辨云。海石產廣東新安。平海。水東等處。

形態 浮海石爲疎鬆極輕之塊。色有多種。或白或灰白或帶黃。

或青黑。有類似玻璃或絹絲之光澤。質雖堅而甚脆。有無數大小之

氣孔。破碎面作貝殼狀。硬度概爲四・五。比重二・一至二・五。投

水中。則上浮而不沈。以其多氣孔故也。因是又有輕石之名。

製法 洗淨根過水飛用。**性質** 鹹平。無毒。

成分 出於火山者。與海岸所產者。成分雖略有不同。大都含有

珪酸。礬土。石灰。苦土。養化鐵。養化鋁。鈉等。

效能 消老痰結核。清肺金降火。用治諸淋及咳嗽痰藥。

主治 養汁飲。止渴治淋。殺野獸毒。

歷代記述攷證 【南北朝】陶弘景本草集註論浮海石曰。止咳。

【宋】寇宗奭本草衍義論海石曰。去目翳。【元】朱丹溪本草衍義補

遺論海石曰。清金降火。消積塊。化老痰。【明】李時珍本草綱目論海

石曰。消癰癭。結核。疝氣。下氣。消痞。腫。【明】李士材本草圖解論海石

曰。海浮石乃水沫結成。色白體輕。肺之象也。氣味鹹寒。潤下之用也。

故入肺除痰嗽。而順堅上源既清。故又治諸淋。咳逆由於虛氣上沖

者。勿用。痰飲由於脾腎元虛者忌之。【清】黃宮繡本草求真論浮海

用木梗。真似桔梗。只是咬之腥澀不堪。凡用桔梗。須去頭上尖硬二

三分已來。并兩畔附枝子。槐。砧上

細剉。用生百合搗膏。緩火熬令乾

用。每桔梗四兩。用百合二兩五錢

(雷斅)

【桔梗蘆頭】 主治 吐上膈 風熱痰實。生研

末。白湯調服一錢。探吐。

【柏油】 即烏柏子油之原名。詳『

烏柏子油』條。

【殷孽】 命名 本品生於石上。 隱然如木之孽也。故名

古籍別名 蠹石(綱目)

基本 殷孽爲石類之一種。乃

鐘乳之根。附石而生。可供藥用。

產地 出山谷中。

性質 辛溫無毒。

主治 爛傷瘀血。洩痢。寒熱。鼠

瘰。癰疽。結氣。脚冷疼弱。(本經) 熏

筋骨弱并痔瘻及下乳汁(別錄)

施用宜忌 惡防已畏朮。

【氣包魚】 即河豚之古籍別名。典

見綱目詳『河豚』條。

【氣砂】 即礪砂之古籍別名。典

見圖經本草詳『礪砂』條。即礪

砂之古籍別名。典見和漢藥考。詳

【靈砂】條。

【氣酒】 即燒酒之古籍別名。典見

綱目詳『燒酒』條。

【氣殺郎草】 即玉淨瓶之古籍別

名。典見綱目拾遺。詳『玉淨瓶』條。

【氣結】 產地 出交趾。真臘。占

城。瓊海等處。

主治 噎膈。

參攷資料 此乃伽楠香樹中

空腹內所結。藉伽楠芬烈之氣。得

日月雨露之精華。凝結而成。故名

氣結。形亦同香塊。而酥潤。鬱膩不

甚。堅大約伽楠得其質。此得其魂。

亦如天生黃出湯泉。爲硫氣熏結

而成者。然頗難得。世不見多者也

(單斗南)

【氣盤蟲】 即行夜之古籍別名。典

見本草集註詳『行夜』條。

【氣攀】 即行夜之古籍別名。典見

綱目詳『行夜』條。

【泰和老雞肉】 命名 本品

爲雞之出於

江西泰和。吉水諸縣。家家畜之。近

則五六年。遠則一二十年者。故名

性質 甘辛熱無毒。

參攷資料 泰和老雞。俗傳能

發痘瘡。待痘瘡發時。以五味煮爛

與兒食。甚則加胡椒及桂附之屬

此亦陳文中治痘用木香異攻散

之意。取其能助溼熱發膿也。風土

有宜不宜。不可以爲法。(李時珍)

【浙北】 即白朮之古籍別名。典見

嘉祐圖經本草。詳『白朮』條。

【浙貝母】 命名 本品爲產於

浙江者。功用別於川

貝。故名。

處方用名 象貝母。

產地 浙江省皆有出。其中尤

以寧波象山出者爲最佳。

形態 皮糙。獨顆無瓣。頂圓心

斜。

性質 苦寒。無毒。

主治 化痰止咳。開宣肺氣。

配合應用 本經逢原云。貝母

浙產者。治疝瘕。喉痺。乳癰。金瘡。風

溼。一切癰瘍。同苦參。當歸。治妊娠

小便難。同青黛。治人面惡瘡。同連

翹。治項上結核。皆取其開鬱散結。

化痰解毒之功也。

參攷資料 寧波象山所出

貝母。亦分兩種。味苦而不甜。其頂

平而不尖。不能如川貝之象。荷花

蕊也。土人於象貝中揀出一。與

川貝形似者。以水浸去苦味。曬乾

充川貝賣。但川貝與象貝。性各不

同。象貝苦寒。解毒利痰。開宣肺氣。

凡肺家挾風火有痰者。宜此。川貝

味甘而補肺。不若用象貝。治風

火痰嗽。爲佳。若虛寒咳嗽。以川貝

爲宜。(葉開齊) 象貝味大苦。性

寒。陰也。降也。乃手太陰少陽足陽

明厥陰之藥。大治肺癰。肺痿。咳喘

吐血。衄血。最降痰氣。善調鬱結。止

疼痛。消脹滿。清肝火。明耳目。除時

氣煩熱。黃疸。淋閉。使血。瀉火。解熱

毒。殺諸蟲。及療喉痺。癰癤。乳癰。發

背一切癰瘍。肺毒。溼熱。惡瘡。痔漏

金瘡。出血。火瘡。疼痛。爲末。可敷。煎

湯可服。性味俱厚。較之川貝。清

降之功。不啻數倍。反烏頭。又解上

焦肺胃之火。

【浙耆】 即茯苓之處方用名。詳『

茯苓』條。

【浙烏頭】 古籍別名 骨鞋菊。

(綱目拾遺) 鸚哥菊。

(俗名)

專藥。就使桔梗果屬升提。則凡風熱實火諸喉咽病。正是火勢壅上之候。更與辛升。寧不抱薪救火。而益張其蹙。奈何庸俗之流。猶昧然盲從。而執定甘桔爲咽痛之普通藥劑耶。

配合應用 ①治胸滿不痛。桔梗枳殼等分。水二鍾。煎至一鍾溫服。(南陽活人書方)

②治傷寒腹脹。陰陽不和也。桔梗半夏湯主之。桔梗半夏陳皮各三錢。薑五片。水二鍾。煎一鍾溫服。(南陽活人書方)

③治痰嗽喘急。桔梗一兩半。爲末。用童子小便半升。煎四合。去滓溫服。(簡要濟衆方)

④治肺癰咳嗽。胸滿振寒。脈數咽乾不渴。時出濁唾腥臭。久久吐膿如粳米粥者。桔梗湯主之。桔梗一兩甘草二兩。水三升。煮一升。分溫再服。及朝暮吐膿血則瘥。(金匱方)

⑤治喉痺毒氣。桔梗二兩。水三升。煎一升頓服。(千金方)

⑥治齒齲腫痛。桔梗薤白仁等分爲末服。(永類鈴方)

①治骨槽風痛。牙根腫痛。桔梗爲末。桑白和丸。阜子大。綿裹咬之。仍以荊芥湯漱之。(經驗方)

②治牙疳臭爛。桔梗茴香等分。燒研傳之。(衛生易簡方)

③治肝風眼黑。目睛痛。肝風盛也。桔梗丸主之。桔梗一升。黑牽牛頭末三兩。爲末蜜丸。梧子大。每服四十九。溫水下。日二服。(保命集方)

④治鼻出衄血。桔梗爲末。水服方寸匕。日四服。一加生犀角屑。亦治吐血下血。(普濟方)

⑤治打擊瘀血在腸內。久不消。時發動者。桔梗爲末。米飲下一刀圭。(肘後方)

⑥治中蠱下血如雞肝。晝夜出血石餘。四臟皆損。惟心未毀。或鼻破將死者。苦桔梗爲末。以酒服方寸匕。日三服。不能下藥。以物均口。澀之。心中當煩。須臾自定。七日止。當食猪肝肺以補之。神良。一方加犀角等分。(古今錄驗方)

⑦治妊娠中惡。心腹水痛。桔梗一兩。剉水一鍾。生薑三片。煎六分溫服。(聖惠方)

⑧治小兒客忤。死不能言。桔梗燒研三錢。米湯服之。仍吞麝香豆許。(張文仲備急方)

用量 八分至一錢。
施用宜忌 凡陰虛火逆。及無風寒痺肺者。禁用。畏白芨。龍膽草。忌豬肉。節皮爲之使。

著名方劑 ①桔梗白散。治咳而胸滿振寒。脈數咽乾。不渴。時出濁唾腥臭。久久吐膿如米粥者。爲肺癰。(外臺方) 桔梗。貝母各三分。巴豆一分。去皮熬令如脂。上三味爲散。強人飲服半錢。已羸者減之。病在上膈者。吐膿血。膈下者。瀉出。若下多不止。飲冷水一杯。則定。②桔梗湯。治少陰咽痛。先與甘草湯。不遑。與桔梗湯。(傷寒方) 桔梗一兩。甘草二兩。右二味。水二升。煮減半。去滓溫服。日二服。

參攷資料 ①朱肱活人書。治胸中痞滿不痛。用桔梗枳殼。取其通肺利膈下氣也。張仲景傷寒論。治寒實結胸。用桔梗貝母。巴豆取其溫中消穀破積也。又治肺癰腫。用桔梗甘草。取其苦善清肺。甘溫瀉火。又能排膿血補內漏也。其

治少陰證二三日咽痛。亦用桔梗甘草。取其苦辛散寒甘平除熱。合而用之。能調寒熱也。後人易名甘桔湯。通治咽喉口舌諸病。宋仁宗加荊芥。防風。連翹。遂名如聖湯。極言其驗也。(李時珍) ②乾咳嗽乃痰火之邪鬱在肺中。宜苦梗以開之。痢疾腹痛。乃肺金之氣鬱在大腸。亦宜苦梗開之。後用痢藥。此藥能開提氣血。故氣藥中宜用之。(朱震亨) ③此草之根結實而梗直。故名吳普本草一名利如。一名符扈。一名房。圖方書並無是。蓋亦度詞爾。桔梗薺。薺乃一類。有甜苦二種。故本經桔梗一名薺。而今俗呼薺爲甜桔梗也。至別錄始出薺梗條。分爲二物。然其性味功用皆不同。當以別錄爲是。(李時珍) ④今在處有之。根如指大。黃白色。春生苗。莖高尺餘。葉似杏葉而長橢。四葉相對而生。嫩時亦可食。食夏開小花。紫碧色。頗似牽牛。花秋後結子。八月採根。其根有心。若無心者爲薺。關中所出桔梗。根黃皮似蜀葵。根莖細青色。葉小青色。似薺葉也。(蘇頌) ⑤凡使勿

十畫 桔

更有單瓣不作筒狀者。名紋桔梗。此數種皆藝花家所重者。入藥以常品爲良。市中所販。根潔白者是。曬乾也。藥舖稱三原桔梗。其根細長。末尤細。末不細者。稱竹原桔梗。氣味更薄。不堪用。味苦爲桔梗之本性。故有苦梗、苦桔梗之名。又古方藥品考曰。桔梗有數種。形似沙參。屈曲不直。皮褐。肉白。有滋味者爲上品。潔白者與根粗色白者。俱不堪用。採根浸水。候腐爛而後曬乾。則氣味消失。亦不能入藥。別有名花壇者是。花園中老根。尤粗劣。勿用。又大和本草曰。山野多有之。春日宿根出新芽。秋開碧花。或放白花。其花瓣有多至八層者。殊美觀。入藥以碧花之根。冬日及正月採者爲良。小根性薄。大者合用。此草以雞糞壅之。則肥茂。實生長極速。二年即開花。根亦大。花堪賞玩。叢生者花愈多。莖不高。又用藥須知曰。日本產桔梗。可用。其花有單瓣、重瓣。色有紫白之別。其根亦有細大之分。入藥以小者爲貴。藥舖稱楊枝手是也。一種名雞桔梗。日醫當遠志用。非是。又物類品鑑

曰。桔梗。日本所在多有。花作紺碧色。或白花、紫花。或二色相雜。花瓣亦有單瓣、重瓣之異。近世製業者。多於六月土用中。採掘其根。浸河水數日。待外皮爛。然後洗淨。曬乾。色純白。然氣味薄甚。宜八九月掘取。又日用藥品考曰。日本藥舖所售。俱本國產。如三原桔梗、竹原桔梗、白桔梗。皆夏月浸於流水。曬乾收用者也。惟氣味俱薄。其他尚有呼爲生乾及楊枝手者。嫩根亦通用。又手板發蒙曰。日本方書。稱桔梗爲佛吉草。出金剛山者。曰金桔梗。出奧州者。曰相馬桔梗。別一種曰生乾桔梗。桔梗與遠志根有相同之效。中含有沙波露。藥劑師清水如水氏。嘗將其提出之物質。研究之。定名曰普刺企靈。

辨偽 鄭育巖曰。苦桔梗之根。結實而梗直。故有是名。非木上之梗也。近道處處有之。其根外白中黃。有心。味苦而辛。本經主治胸脇痛。如刀刺。腹滿腸鳴。幽幽驚恐。悸氣。其一種無心。味甜者。齊危也。一名杏葉沙參。又名甜桔梗。性味功用。與桔梗大不相同。近今藥肆

因苦桔梗價貴。多以甜梗僞充。又有一種水口梗。性味更劣。服之安能見功耶。曹炳章曰。按桔梗出安慶古城山。色白。有蘆內起菊花心。味甜。帶苦者佳。寧國府涇縣出者。形味略同。亦佳。其他如鎮江、全椒、滁州、白陽山、常州、宜興、天長、定遠、梓潼、各縣皆出。色黃白。味甜。均不道地。此藥乃開提肺氣。爲手太陰要藥。須擇色白。性糯飽綻。味苦而有心者用之。若味甜者。即齊危也。效用不同。不可混用耳。

近人學說 袁淑範曰。桔梗一名苦梗。爲屬桔梗科 (Campanulaceae) 植物 Platycodon grandiflorum 之根。中醫以爲祛痰鎮靜等之要藥。用於呼吸器病及神經系病。或以之代人參。用之以爲能補五勞養氣之強壯藥。故自神農本草經已收之於藥品中矣。張山雷曰。桔梗功用。諸家所述。皆溫通宣泄。無論上焦下焦結滯之病。一例通治。獨潔古謂其爲諸藥之舟楫。載以上行。至胸中最高之分。諸藥中有此一物。則不能下沈云云。總仲醇和之。謂其性陽而

氣加陳皮。哕嗽如知母貝母。咳渴加五味。酒毒加葛根。少氣加人參。嘔加半夏。姜。吐膿血加紫苑。肺癰加阿膠。胸膈不快加枳殼。痞滿加枳實。目赤加梔子大黃。面腫加茯苓。膚痛加黃耆。發斑加荊防。疫癘加牛蒡大黃。不得眠加梔子。總不離乎桔梗。以爲開提。奈世僅知此屬上升。而不知其下行。其失遠矣。但痘疹下部不起。勿用。以其性升之故。久嗽不宜妄用。以其通陽泄氣之故。陰虛不宜妄用。以其拔火上乘之故。其蘆能吐膈上風熱痰實。生研末。水調服。探吐去浮皮。泄瀉。微炒用。清。鄒澍本經疏證論桔梗曰。海藏東垣丹溪皆謂桔梗入腎。豈不以仲景治少陰喉痛耶。殊不知桔梗主喉痛。仍是治肺非治腎也。夫足少陰直者。從腎上貫肝膈入肺中。循喉嚨。挾舌本。支者從肺注心中。腎家邪熱循經而上。肺不任受。遂相爭競。二三日邪熱未盛。故可以甘草瀉火而愈。若不愈。是肺竅不利。氣不宜洩也。以桔梗開之。肺竅既通。氣遂宣洩。熱自透達矣。雖然。此舉其暫者言耳。

曰咳而胸滿振寒。脈數。咽乾不渴。時出濁唾腥臭。久久吐膿如米粥者。非氣停即飲停。飲停即熱生。氣血爲之潰腐耶。亦主以桔梗湯。而注其效曰。再服則吐膿血。豈非火清則熱行。氣宣則腐去也。由此而推。謂腎家之熱爲肺所阻者。其一端也。肺家有熱。氣不宜洩。何獨不能阻腎之氣。使熱復生於下哉。又曰。亦主血痹。血痹之候。寸口關上微。尺中小緊。是病亦關於腎。蓋血痹由於氣痹。氣開則血開。上竅通下竅自通也。通經四逆湯。咽痛者去芍藥。加桔梗。利止。鹹不出者。去桔梗。加人參。芍藥開陰。結止。腹痛下利。桔梗開陽。結亦止。腹痛下利。可知戴陽之候。有結於陽。有結於陰。桔梗芍藥之用。隱然相對待矣。利止必腹痛。先已腹痛已。則結已開。無所事芍藥。并無所事桔梗。况結既開。正嫌其虛。又烏可復用開洩。人參之補肺。桔梗之開肺。又隱然相對待矣。於此知桔梗之苦先於辛。苦歸於辛。苦者以開提腸胃蓄積。辛者使從肺泄爲出路。諸家謂爲升提。謂爲舟楫。似矣。其實又

有故焉。如此者。寒實結胸。無熱證者。治以白散。散中用桔梗爲疏通氣分之主。夫開導胸中之氣。仲景於大承氣湯。小承氣湯。梔子厚朴湯。莫不用枳朴。此偏不用何哉。蓋病有上下。治有操縱。結在上者。宿痰停飲也。故凡結胸。無論熱實寒實。寧用甘遂芫花。巴豆。不用枳朴。如大陷胸湯。丸。白散是也。結在中下。始熱與實。淡氣隨熱化。則於瀉滌。邪穢中。疏利其與邪爲伍之氣。大小承氣等湯是也。况桔梗之用。使氣上越。而不使氣下洩。今病在至高。固宜操上而縱下。不使中下無過之地。橫被侵凌。故曰病在膈上。必吐在膈下。必利也。熱邪與停飲結。治以瓜藶而佐之者。反用半夏。黃連。寒邪與停飲結。治以巴豆而佐之者。反用桔梗。且母於寒因熱用。熱因寒用之中。反佐以取之。可謂精義入神。以致用者矣。排膿散。即枳實芍藥論加桔梗。雞子黃也。排膿湯。即桔梗湯加葷菜也。排膿何必取桔梗。葷菜皮毛者。肺之合。桔梗入肺。暢達皮毛。膿自當以出。皮毛爲順也。散之所至者。深。湯之

所至者。淺。枳實芍藥散。本治產後瘀血腹痛。加桔梗。雞子黃爲排膿。是知所排者。結於陰分。血分之膿。桔梗湯。本治肺癰吐膿喉痛。加葷菜爲排膿。湯是知所排者。陽分氣分之膿矣。二方除桔梗外。無一味同。皆以排膿名。可見排膿者。必以桔梗而隨病之淺深。以定佐使。是桔梗者。排膿之君藥也。

國外學說 日本學說謂桔梗者。可用爲強壯劑。漢醫則配列於祛痰劑。用量二。〇至六。〇。又本草綱目啓蒙曰。桔梗自生於山中。向陽之地。形似沙參。無毛。帶白色。斷之。則有白汁。莖圓。高三五尺。葉橢圓。有細鋸齒。皆互生。或二三葉相對。六月以後。莖端開花。茂盛者。雖葉間亦開。尋常多單瓣。青紫色。亦有作雙層。半瓣。圓扁等形。與深藍。黃白相間。諸色者。雙層者。有紫二重。桔梗。白二重。桔梗。二重。仙臺。桔梗。牡丹。桔梗。等。千瓣者。亦有紫白二種。扁者。名摺扇。桔梗。有深藍淡藍二種。千瓣。扁。莖亦帶扁。黃色。名淺黃。桔梗。間色者。有白。花紫點。桔梗。仙臺。桔梗。南京。桔梗。

十畫 桔

製法 雷敦曰。凡使桔梗。須去頭上尖硬。細剉用。生百合搗背水浸一伏時。火熬令乾。李時珍曰。今但刮去浮皮。米泔水浸一夜。切片微炒用。

性質 辛。微溫。有小毒。

效能 宣肺氣。散風寒。能載藥上行。用爲祛痰鎮咳藥。治於感冒痰咳喘急。肺結核。肋膜炎等症。

主治 胸脇痛。如刀刺。腹滿腸鳴。幽幽驚恐。浮氣。本經。利五臟。腸胃。補血氣。除寒熱。風痺。溫中消穀。療喉咽痛。下蟲毒。別錄。

張仲景之發明 桔梗一味。經張仲景之實驗。認爲主治濁唾腫膿也。旁治咽喉痛。茲考徵如下。●**排膿湯**證。關。桔梗白散證。曰。出濁唾腥臭。久久吐膿。●**桔梗湯**證。曰。出濁唾腥臭。久久吐膿。●**排膿散**證。關。以上四方。其用桔梗者。或三兩。或一兩。或三分。或二分。土四方者。皆仲景之方也。而排膿湯。以桔梗爲君藥也。不載其證。今乃歷觀其用桔梗諸方。或肺癰。或濁唾腥臭。或吐膿也。而以桔梗爲君藥者。名爲排膿。則其排膿也明矣。排

膿湯之證雖闕。而桔梗湯觀之。則其主治明矣。桔梗湯證。曰。出濁唾腥臭。久久吐膿。仲景曰。咽喉痛者。可與甘草湯。不差者。與桔梗湯也。是乃甘草者。緩其毒之意。迫也。而濁唾吐膿。非甘草之所主。故其不差者。乃加桔梗也。由是觀之。腫痛急迫。則桔梗湯。濁唾吐膿多。則排膿湯。

歷代記述攷證

【唐】甄權藥性本草論桔梗曰。主治下痢。破血積氣。消聚痰涎。去肺熱。氣促嗽逆。除腹中冷痛。主中惡。及小兒驚癇。【宋】大明諸家本草論桔梗曰。下一切氣。止霍亂轉筋。心腹脹痛。補五勞養氣。除邪辟溫。破癥瘕。肺癰養血排膿。補內漏。及喉痺。【金】張元素珍珠囊論桔梗曰。利竅。除肺部風熱。清利頭目。咽喉。胸膈滯氣。及痛除鼻塞。【元】李東垣用藥法象論桔梗曰。治寒嘔。【明】李時珍本草綱目論桔梗曰。主口舌生瘡。赤目腫痛。【明】繆希雍本草經疏論桔梗曰。桔梗本經味辛。氣微溫。別錄加苦。云有小毒。神農醫和岐伯雷公咸曰。無毒。而復加甘。觀其

九八〇

所主諸病。應是辛苦甘平。微溫無毒。傷寒邪結胸脇。則痛如刀刺。邪在中焦。則腹滿及腸鳴。幽幽辛散升發。苦洩甘和。則邪解而氣和。諸證自退矣。其主驚恐悸氣者。心脾氣血不足。則現此證。諸補心藥中。藉其升上之力。以爲丹枳勝載之用。此佐使之職也。別錄利五臟腸胃。補血氣者。蓋指邪解則臟腑腸胃自和。和則血氣自生也。除寒熱風痺。溫中療喉咽痛。下蟲毒者。皆散邪解毒通利之功也。消穀者。以其升載陽氣。使居中焦。而不下陷。則脾中陽氣長浮。而穀食自消矣。甄權用以治下痢。及去肺熱氣促者。升散熱邪之故也。日華子用以除邪辟溫。肺癰排膿。潔古用以利竅。除肺部風熱。清利頭目。咽喉。胸膈。滯氣。及痛。除鼻塞者。入肺開發和解之功也。【明】李士材本草圖解論桔梗曰。桔梗苦辛。氣輕味平。入肺經。載引諸藥入至高之分。爲舟楫之劑。肺金稱職。則清肅下行。故能利膈下氣。散痞滿。治胸脇痛。破血結。消痰涎。理喘咳。療肺癰。排膿血。清上焦熱。凡頭目咽喉口鼻諸症。一切主之。按桔梗之用。惟其上入於肺。肺爲主氣之臟。故能使諸氣下降。世俗泥爲上升之劑。不能下行。失其用矣。凡用桔梗。去蘆及浮皮。及尖。以百合搗爛同浸一日。剉碎微焙。【清】黃宮繡本草求真論桔梗曰。桔梗辛苦。而不按書而載。能引諸藥上行。又載能以下氣。其義何居。蓋緣人之臟腑胸膈本貴通利。一有寒邪阻滯。則氣血不通。其在於肺。則或爲不利。而見痰壅氣促鼻塞。其在於陽明。則或風熱相搏。而見齒痛。其在於少陰。則因寒蔽火鬱。而見目赤喉痺咽痛。久而火鬱於肺。則見口瘡肺癰乾咳。火鬱上焦。則見胸膈刺痛。肺火移鬱大腸。則見下痢腹痛。腹滿腹鳴。總皆寒入於肺。閉其竅道。則清不得上行。濁因不得下降耳。桔梗味苦。氣平。質浮色白。係開提肺氣之聖藥。可爲諸藥舟楫。載之上浮。能引苦泄下之劑。至於至高之分。成功。俾清氣既得上升。則濁氣自克下降。降氣之說。理根於是。是以好古加味甘桔。無不因症加藥。如失音。則加訶子聲不出。加半夏上

子大。煎犀角湯。每服三五丸。(總病論方)

④治咽喉骨硬。桑螺蛸醋煎呷之。(經驗良方)

⑤治底耳疼痛。桑螺蛸一箇燒存性。麝香一字研末。每用半字。摻入神效。有膿生微淨。(經驗方)

⑥治小兒軟癰。桑螺蛸燒存性。研末油調傳之。(危氏方)

用量 一錢至三錢

施用宜忌 凡火盛者宜少用。長旋覆花戴樞。

著名方劑 桑螺蛸散。治小便頻數。遺精白濁。心神恍惚健忘等症。寇宗奭方。桑螺蛸(蒸過略炒)遠志石菖蒲人參茯神當歸龍骨(另研)龜甲(炙黃)甘草各一兩。右共研末。臨睡時以人參湯調下二錢。

【桑橘】即桑耳之古籍別名。典見唐本草。詳「桑耳」條。

【桑蟲】即桑蠶蟲之簡稱。

【桑雞】即桑耳之古籍別名。典見綱目。詳「桑耳」條。

【桑繭】即桑花之古籍別名。典見綱目。詳「桑花」條。

十蠶 桑 桓 棠 桔

【桑癭】 命名 本品生於老桑樹上之癭塊。狀如瘤形。故名。

採取 用刀斫下。陰乾用。

主治 療胃痛。去風痺諸淫。浸酒用。

【桑蠶糞】 主治 腸風下血。婦人崩中。產痢。小兒驚風。胎前。咽喉骨硬。

【桑蠶蟲】 命名 本品爲蠶蟲之生於桑樹者。故名。

古籍別名 桑蠶(綱目)

形態 桑蠶蟲爲化生蟲類之一種。乳白色。無脚。有黃褐色短毛。被覆全體。背有顆粒狀突起之物。能支其體。以覆行。蝕桑能入幹中。致桑枯死。其蟲可供藥用。

性質 甘溫。無毒。

主治 心暴痛。金瘡肉生不足。

歷代記述攷證 【唐】韓保昇蜀本草論桑蠶蟲曰。治眼疾。【唐】陳藏器本草拾遺論桑蠶蟲曰。去風補不足。治小兒乳疳。【宋】日華諸家本草論桑蠶蟲曰。胸下堅滿。障翳癢腫。治風癰。【明】李時珍本草綱目論桑蠶蟲曰。小兒驚風。口

瘡。風疳。婦人崩中。漏下赤白。墮胎下血。產後下痢。

【桓】即無患子之古籍別名。典見本草拾遺。詳「無患子」條。

【美】即榛之別名。典見植物學大辭典。詳「榛」條。

【桑栗】即栗之叢生者。實大如杏仁。詳「栗」條。

【桔皮】即橘皮之處方用名。詳「橘皮」條。

【桔櫨子】即枳椇子之古籍別名。典見綱目。詳「枳椇子」條。

【桔梗】 命名 本品根莖結實。而梗直。故名。

處方用名 苦桔梗。白桔梗。蜜炙桔梗。玉桔梗。

古籍別名 薺苳(本經)白藥。梗草(別錄)利如符蘆。盧茹。房圖方圖(吳氏本草)苦梗(綱目)木便苦實。吉祥杵。都乙羅。吡。道乙阿。吡(和漢藥考)

學名 Platycodon grandiflorum A. D. C.

基本 屬桔梗科爲 Campanulaceae 植物 Platycodon grandiflorum 之根。

產地 陳仁山藥物生產辨云。桔梗產安徽滁州府廣西各屬亦有出產。每年春秋兩次收成。

形態 桔梗爲多年生草本。自生於山野向陽之地。春日生苗。莖高二三尺。大者可四五尺。葉爲長卵圓形或披針形。邊緣有細鋸齒。多互生。夏秋之交。莖端開花。色或白或青紫。花冠五裂如鐘。花後結倒卵圓形之蒴果。根類沙參而屈曲。外現黃褐色。直下肥厚。

種類 味苦而根中有心者曰桔梗。即苦桔梗。味甜而根中無心者曰薺苳。即甜桔梗。

採取 春採嫩苗。可以煮食。二月八月間採根曬乾。



(一) 梗 桔



(二) 梗 桔

十靈 桑

喜食果實穀類。為農家之害鳥。其肉可供食與藥用。

性質 甘溫無毒。

主治 肌肉虛羸。益皮膚。

【桑錢】即桑花之古籍別名。典見綱目。詳「桑花」條。

【桑螵蛸】 命名 本品輕飄如絹。而須採桑樹上者故名。

古籍別名 蠟螟窠。刀螟窠。致神。【綱目】拒斧窠。不過（爾雅）蝕。

疥蟬。蟬蟪（別錄）蟬蟪。遺尿窩（本草綱目）野狐鼻溺（和漢藥考）胃夷（揚雄方言）

基本 係屬昆蟲類中為直翅類。蟬蟪之卵。秋日築窠桑樹上。經日堅凝而成蟬蟪。

產地 陳仁山藥物生產辨云。以廣東各屬產者為最。尤以新安東莞為上。廣西八屬等亦有出。次之。又有產江蘇鎮江府者。又次之。均九月新。

形態 桑螵蛸為形如舊紙之塊。性極輕。長寸許。色黑褐或黃褐。破之則類似海螵蛸。各房中俱藏卵。子（本草徵要曰）一生出九十

九。

種類 蟬蟪卵。逢樹便產。惟以桑樹上者。是得桑皮之津氣。良採取。每年於二三月間。連桑枝採收之。

製法 別錄曰。凡使桑螵蛸。即桑枝上蟬蟪子也。採來蒸過火炙。用不爾令人洩。雷斅曰。凡使勿用雜樹上生者。名蠟螟。須覓桑樹東畔枝上。採得去核子。用沸漿水浸淘七次。鍋中熬乾。用別修治。無效也。韓保昇曰。採得以熱漿水浸一伏時焙乾。於柳木灰中炮黃。用。

性質 鹹甘平。無毒。效能 固腎益精氣。補虛治遺溺。用以治陰痿。遺精及夜尿。病。主治 傷中疝瘕。陰痿。益精。生子。女子血閉。腰痛。通五淋。利小便。小道（本經）療男子虛損。五臟氣。微夢寐失精。遺溺。久服益氣養神（別錄）

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論桑螵蛸曰。炮熱空心食之。止小便利。男子身衰。精自出及虛而小便利者。加而用之。【宋】蘇頌嘉祐圖經本草論桑螵蛸曰。古

九七八

方漏精。及風藥中多用之。【宋】寇宗奭本草衍義論桑螵蛸曰。男女虛損。腎衰。陰痿。夢中失精。遺溺。白濁。疝瘕。不可闕也。【明】李時珍本草綱目論桑螵蛸曰。桑螵蛸。肝腎命門藥也。古方盛用之。【明】繆希雍本草經疏論桑螵蛸曰。桑螵蛸。桑樹上蟬螟子也。本經味鹹。氣平。別錄甘。無毒。氣薄味厚。陰也。入足少陰。太陽經。人以腎為根本。男子腎經虛損。則五臟氣微。或陰痿。夢寐失精。遺溺。鹹味屬水。內合於腎。腎得之而陰氣生。故能愈諸疾。及益精生子也。腎與膀胱為表裏。腎得所養。則膀胱自固。氣化則能。出故利水道。通五淋也。女子屬陰。肝腎用事。疝瘕。血閉。腰痛。皆二經為病。鹹能益陰。入血。輕堅。是以主之。甘能補中。故主傷中。益氣。腎足。則水自上升。克與心交。故能養神也。【清】黃宮繡本草求真論桑螵蛸曰。桑螵蛸。即桑枝上蟬螟子也。一生九十九子。用一枚。便傷百命。勿輕用之。味鹹。寒甘。氣平。無滯。入足少陰。腎足。太陽。膀胱。蓋人以腎為根本。男子腎經虛損。則五臟氣微。或陰痿。夢寐失精。遺溺。蟬螟味屬水。內合於腎。腎得之而陰氣生。故能愈諸疾。及益精生子。腎與膀胱為表裏。腎得所養。則膀胱自固。氣化則能。出故利水道。通五淋也。女子疝瘕。血閉。腰痛。皆肝腎二經為病。鹹能入血。輕堅。是以主之。甘能補中。故主傷中。益氣。腎足。則水自上升。克與心交。故能養神也。至書既言功尚收。清。又言利便。義由是矣。產桑樹者佳。

配合應用 治虛勞盜汗。遺精白濁。桑螵蛸炙白龍骨等分。為細末。每服二錢。空心鹽湯下。（外臺祕要方）

治婦人遺尿。桑螵蛸酒炒。為末。白湯服二錢。兼治胎前產後遺尿不禁。千金翼方。

治小便不通。桑螵蛸炙黃。三十枚。黃芽二兩。水煎分二服。（聖惠方）

治婦人胞轉。小便不通。用桑螵蛸炙。為末。飲服方寸匕。日用二（產書方）

治咽喉腫塞。桑上蟬螟窠一兩。燒灰。馬尾勃牛兩。研勻。蜜丸。梧

配合應用

●治青盲洗法。昔武勝軍宋仲孚。患此已二十年。用此法二年。目明如故。新研青桑葉焙乾。逐月按日就地上燒存性。每以一合於瓷器內煎減二分。傾出澄清。溫熱洗目至百度。常試有驗。(普濟方)

●治風眼。下淚。臘月不落桑葉煎湯。日日溫洗。或入芒硝。(集簡方)

●治赤眼。澀痛。桑葉爲末。紙卷燒煙。熏鼻。取效。海上方也。(普濟方)

●治頭髮不長。桑葉。麻葉。煮泔水沐之。七次。可長數尺。(千金方)

●治吐血不止。晚桑葉焙研。涼茶服三錢。只一服止。後用補肝肺藥。(聖濟總錄方)

●治小兒渴疾。桑葉不拘多少。逐片染生蜜。綿繫帶上。綳陰乾。細切煎汁。日飲代茶。(勝人方)

●治霍亂轉筋。入腹煩悶。桑葉一握。煎飲一二服。立定。(聖惠方)

●治大腸脫肛。黃皮桑樹葉三升。水煎過。用帶溫罨納之。(仁齋直指方)

●治肺毒風瘡。狀如大風。綠雲散。用好桑葉洗淨。蒸熟。一宿日乾。爲末。水調二錢。七服。(經驗方)

●治瘡口不斂。經霜黃桑葉爲末。傳之。(直指方)

●治穿掌腫毒。新桑葉研爛。會之即愈。(通玄方)

●治湯火傷瘡。經霜桑葉燒存性。爲末。油和傳之。三日愈。(醫學正傳方)

●治手足麻木。不知痛痒。霜降後桑葉煎湯頻洗。(急救方)

用量 錢半至三錢

著名方劑 桑菊飲。治太陰風溫。但咳。身不甚熱。微渴者。此方主之。溫病條辨方。桑葉二錢。菊花一錢。杏仁一錢。連翹一錢。薄荷八分。苦梗二錢。甘草八分。荳蔻二錢。右以水二杯。煮取一杯。日二服。

參攷資料

●桑葉搗末丸散。任服。或煎水代茶飲之。又霜後桑葉湯淋。渌手足。去風痺。殊勝。又微炙。和桑衣煎服。治痢及金瘡諸損。傷止血。(陶弘景) ●經霜桑葉研末。米飲服。止盜汗。(朱震亨) ●桑

有數種。有白桑。葉大如掌而厚。雞桑。葉花而薄。子桑。先樁而後葉。山桑。葉尖而長。以子種者。不若壓條而分者。桑生黃衣。謂之金桑。其木必將槁矣。種樹書云。桑以構接。則桑大桑根下埋龜甲。則茂盛不蛀。(李時珍)

【桑葉滋】 原名 桑脂。基本 本品即新鮮桑葉筋中之白汁。

性質 苦。微寒。無毒。
主治 天癸入目。點之。乳癰。癰瘤及蜈蚣咬傷。

配合應用 ●治乳癰。用桑葉不拘頭二葉。摘去半段。取後半段。脂三分。黃柏八錢。水煎乾。止用三分。飯鍋熬一次。夜露一宿。塗患處。雖爛見骨者。亦能收口平復。(集驗方)

●治小石瘡。採二戴桑葉。滴下滋水。點上愈。小石瘡。今人呼爲紫馬疔。(錢駿經驗單方)

●治癰瘤。用蛎蛎一錢。蛇脫泥球。包煨爲末。三分。鬼饅頭滋乾一錢。桑葉乾一錢。乳香。沒藥。各三分。麝香一分。共爲細末。飯酒搗爲錠。

臨時時。再取鬼饅頭。滋化開。以雞翎搽患處。過宿即消。(秋泉祕方)

【桑葉露】 風清熱。主治 目疾。紅筋。去

【桑蛾】 即桑耳之古籍別名。典見宋本草。詳「桑耳」條。

【桑實】 即桑椹之古籍別名。典見和漢藥考。詳「桑椹」條。

【桑楮】 基本 本品即多年老桑數被剪伐嫩枝。其枝頭長成如拳狀者。

主治 臨症燒紅存性。爲末酒服。

【桑屬】 古籍別名 藕脂。(爾雅) 青雀(郭璞) 螭嘴雀。綱目)

外國名詞 Eophona (Coccyzus) personata (拉丁)

基本 係脊椎動物鳥類鳴禽類雀科之桑屬。

產地 山林間。

形態 桑屬爲林禽類之一種。大如鸚鵡。其嘴圓錐形而粗短。色黃。嘴根青黑。頭頂眼尖。眼緣及尾皆黑色。有銅光。腹背皆灰色。略帶褐。翼紫黑。有白條紋。腳淡黃色。性

十畫 桑

移植於歐羅巴之南。今英國則各處種植此樹。桑穗熟時。其汁含水質甚多。

配合應用 ④四月令云。四月宜飲桑椹酒。能理百種風熱。其法用桑椹汁三斗。重湯煮至一斗半。入白蜜二合。酥油一兩。生薑汁一合。煮令得所。瓶收。每服一合。和酒飲之。亦可以汁熬燒酒藏之。經年味愈佳。

⑤治瘰癧結核。文武膏。用文武實卽桑椹子二斗。黑熟者。以布取汁。銀石器熬成膏。每日湯調服一匙。日三服。(保命集方)

⑥治水腫脹滿。水不下。則滿溢。水下。則虛竭。還服十無一活。宜用桑椹酒治之。桑心皮切。以水二斗。煮汁一斗。入桑椹。再煮取五升。以糯飯五升。釀酒飲。(普濟方)

⑦治諸骨酸咽。紅椹子細嚼。先嚥汁。後嚥滓。新水送下。乾者亦可。(聖惠方)

⑧治小兒赤禿。桑椹取汁。頻服。(千金方)

⑨治小兒白禿。黑椹入罍中。曝三七日。化爲水。洗之。三七日。神效。

(聖惠方)

⑩拔白變黑。黑椹一斤。蝦蟆一斤。瓶盛封閉。懸屋東頭一百日。盡化爲黑泥。以染白髮如漆。(本草拾遺方)

⑪髮白不生。黑熟桑椹。水浸日曬。搽塗。令黑而復生也。(千金方)

⑫治陰證腹痛。桑椹絹包。風乾。過伏天爲末。每服三錢。熱酒下。取汗。(集簡方)

用爐 三錢至五錢。
施用宜忌 凡大便溏瀉。腎虛無熱者。禁用。

參攷資料 ①本經言桑甚詳。然獨遺烏椹。桑之精英。盡在於此。採摘微研。以布濾汁。石器熬成稀膏。量多少。入蜜熬稠。貯瓷器中。每抄一二錢。飲後夜臥。以沸湯點服。治服金石發熱。口渴。生精神。及小腸熱。其性微涼。故也。仙方日乾爲末。蜜和爲丸。酒服亦良。(冠名聖)

【桑椹酒】 製法 用桑椹搗汁。煎過。同麴米釀酒飲。

主治 補五臟明目。治水腫。

【桑葉】 處方用名 冬桑葉。霜桑葉。童桑葉。枯桑葉。

基本 屬桑科。爲山桑之葉。

產地 ①陳仁山藥物生產辨云。桑葉產廣東以南海。順德爲最。

②凡江浙養蠶區域。恒多生焉。

形態 桑葉爲廣卵圓形。末端尖銳。底部作心臟形。近緣有鋸齒。有時分三裂五裂。葉面作淺綠色。

種類 葉無歧者。俗稱家桑。爲上品。葉有歧者。俗稱野桑。爲下品。

採取 九十月間採摘。曬乾。其經霜後枝上賸留者尤佳。

製法 蘇頌曰。凡使桑葉。以四月桑茂盛時採葉。又十月霜後三分二分已落時。一分在者。名神仙葉。卽採取與前葉同陰乾用。

性質 苦。甘寒。有小毒。

效能 祛風。清熱。涼血。明目。爲疏表解熱藥。用於傷風感冒。及白喉等症。又能輕微刺激。激肺黏膜。及喉頭黏膜。使分泌增加。爲祛痰鎮咳藥。

主治 除寒熱。出汗。(本經) 汁解蜈蚣毒。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】蘇恭新修本草論桑葉曰。煎濃汁服。能除脚氣水腫。利大小腸。【唐】孟詵食

九七六

療本草論桑葉曰。炙熱煎飲。代茶止渴。【唐】陳藏器本草拾遺論桑葉曰。研汁治金瘡。及小兒吻瘡。煎汁服。止霍亂腹痛。吐下。亦可以乾葉煮之。雞桑葉煮汁。結膏服。去老風及宿血。【宋】大明諸家本草論桑葉曰。煎飲。利五臟。通關節。下氣。

嫩葉煎酒服。治一切風。熱熱。癰毒。風痛。出汗。并撲損瘀血。按爛塗蛇蟲傷。【明】李時珍本草綱目論桑葉曰。治勞熱咳嗽。明目長髮。【清】黃宮繡本草求真論桑葉曰。清肺瀉胃。涼血燥溼。去風明目。

近人學說 張山雷曰。以老而經霜者爲佳。欲其氣之全力之厚也。故入藥用冬桑葉。亦曰霜桑葉。古稱桑爲箕星之精。箕主風。而通於肝。故以桑葉爲平肝之藥。願謂此葉清芳。而經秋入冬。得嚴霜之令。故能泄降肝膽之鬱熱。非但木之折其剛暴之性。蓋桑樹確是肝家要藥。故桑枝宜通肝絡。疏利脇肋。搗碎。桑椹入血補腎。滋養肝腎。陰液。而其葉脈絡最多。清疏明顯。則宜通肺絡。而疏達皮毛。清燥泄熱。皆以性情爲主治也。

外國名詞 Mori Sucus 拉

性質 甘寒無毒。

安而神自清寧。神清則聰明內發。陰復則變白不老。甘寒除熱。故解中酒毒。性寒而下行利水。故利小氣而消腫。此皆自然之道也。【澄】

有生者。他處鮮得。須自采或連桑采者。乃可用。世俗多以雜樹上者充之。氣性不同。恐反有害也。按鄭樵通志云。寄生有兩種。一種大者。葉如石榴葉。一種小者。葉如麻黃。其子皆相似。大者曰蔞。小者曰女蘿。今觀蜀本韓氏所說。亦是兩種。與鄭說同。【李時珍】

基本 屬於桑科。為山桑所結之子實。

成分 桑椹味初酸。繼轉甜。中含機酸。糖分黏液質。鹽類。色素等。效能 補腎。明目。養血。祛風。用作強壯藥。又治習慣性便秘。

作用 在胃中能補胃液之缺乏。以助消化之不足。入腸能激腸之黏膜。使腸之分泌增多。并能稍促腸之蠕動。

產地 陳仁山藥物生產辨云。本品以中國地產者佳。尤以廣東、南海、順德、更好。桑椹原產波斯國。今我國養蠶各地皆有之。

形態 桑椹初結色青黃。成熟色紫黑。形橢圓。表面凸凹不平。內含圓形小仁。種子懸其內。胚曲鉤。汁頗多。

主治 利五臟。關節痛。血氣。久服不飢。安魂鎮神。令人聰明。變白不老。多收暴乾為末。蜜丸。日服。

【清】王士雄隨息居飲食譜論桑椹曰。桑椹甘平。滋肝腎。充血液。止消渴。利關節。解酒毒。祛風。澤。聰耳。明日。安魂鎮魄。可生痰。【宜微鹽拌食】。可飲汁。或熬以成膏。或爆乾為末。設逢歉歲。可充糧食。久久服之。鬚髮不白。以小滿前熟透色黑而味純甘者良。熟桑椹以布濾取汁。設器熬成膏。收之。每日白湯或醇酒調服一匙。老年服之。長精神。健步履。息虛風。靖虛火。兼治水腫。脹滿。癰癤。結核。

【桑寄生實】 性質 甘平。無毒。

主治 明目。輕身。通神。

產地 多生園中。

形態 桑莖實為雜草類之一種。方莖大葉如荏。可供藥用。

【桑莖實】 別錄 草王。產地 多生園中。

採取 每年四月間成熟時。採之。日乾。

製法 寇宗奭曰。凡使桑椹。摘微研。以布濾汁。石器熬成稀膏。量多少入蜜熬稠。貯瓷器中。仙方日乾為末。蜜和為丸。酒服亦良。李時珍曰。桑椹酒能理百種風熱。其法用椹汁三斗。重湯煮至一斗半。入白蜜二合。酥油一兩。生薑一合。煮令得所。瓶收。

用法 與他藥水煎。或剉末糊丸。其鮮者搗汁用。

主治 婦人孕餘病。益氣輕身。

【桑絡】 即桑寄生之古籍別名。典見和漢藥考。詳「桑寄生」條。

【桑黃】 即桑耳之古籍別名。典見藥性詳「桑耳」條。

【桑椹】 處方用名 黑桑椹。古籍別名 莖人精桑仁。桑實。文武實。【和漢藥考】

仁。桑實。文武實。【和漢藥考】

仁。桑實。文武實。【和漢藥考】

仁。桑實。文武實。【和漢藥考】

仁。桑實。文武實。【和漢藥考】

仁。桑實。文武實。【和漢藥考】

仁。桑實。文武實。【和漢藥考】

仁。桑實。文武實。【和漢藥考】

仁。桑實。文武實。【和漢藥考】

仁。桑實。文武實。【和漢藥考】

仁。桑實。文武實。【和漢藥考】

仁。桑實。文武實。【和漢藥考】

十靈 桑

腫之能治之充肌膚精氣外達也。堅髮齒精氣內足也。精氣外達而充肌膚則髮眉亦長。精氣內足而堅髮齒則胎亦安。蓋肌膚者皮肉之餘。齒者骨之餘。髮與鬚眉者血之餘。胎者身之餘。以餘氣寄生之物而治餘氣之病。同類相感如此。【清】徐泗溪本草經百種錄論桑寄生曰：寄生乃桑之精氣所結。後生小樹於枝間。有子之象焉。故能安胎。其性與桑相近。故能驅風養血。其生不著土。資天氣而不資地氣。故能滋養血脈於空虛之地。而取效更神也。

國外學說

和漢藥考曰：屬於槲寄生科之宿木。一曰寄生。故寄生槲樹。或他種樹木之植物。謂之槲寄生。暖地不伺蠶之老桑樹。其枝間寄生一種宿木。自桑樹之皮部抽莖而出。宛似插枝於他木者。然其枯死之枝葉。俱現黃色。因採之以入藥。又大本草曰：嫩桑樹無寄生。而養蠶之地。老桑亦少。故真者難得。惟日本隱岐及肥前五島有之。俗以爲中風要藥。頗貴重。又和漢三才圖會曰：他樹寄桑木

而生。曰桑寄生。又本草序例桑耳名桑寄生。是一名而二物矣。非一物而二名也。又手板發蒙曰：諸木皆有寄生。入藥須用桑上寄生。他木寄生者有毒。桑上寄生作黃色。隱州產爲上。不伺蠶之暖地。桑無採斫之苦。故茂盛而寄生多。其寄生他木者黃色。非天然。乃偽藥也。不可不辨。

配合應用

一治血虛。手臂骨節疼痛。桑寄生、枸杞子、地黃、胡麻、川續斷、何首烏、當歸、牛膝。

一療一切風溼痺。用桑寄生入獨活寄生湯。

一療胎動腹痛。桑寄生一兩五錢。阿膠炒五錢。艾葉五錢。水一盞半。煎一盞。去滓溫服。或去艾葉。以其熱也。〔聖惠方〕

一治腸風。生桑寄生搗汁一盞。服之。〔集簡方〕

一治毒痢膿血。六脈微小。並無寒熱。宜以桑寄生二兩。防風、大芎二錢半。炙甘草三錢。爲末。每服二錢。水一盞。煎八分。和滓服。〔楊子建護命方〕

一治下血後虛。下血止後。但覺

丹田元氣虛乏。腰膝沉重。少力。桑寄生爲末。每服一錢。非時白湯點服。〔楊子建護命方〕

用量 三錢至五錢。

施用宜忌 凡非桑上者禁用。忌火。並忌鐵器。

著名方劑 獨活寄生湯。治風寒溼痺。偏枯脚氣。〔千金方〕。獨活三兩。桑寄生、秦艽、細辛、歸身、生地、白芍、川芎、桂心、茯苓、杜仲、牛膝、人參、甘草各等分。爲粗末。每服四錢。煎服。一方有防風。

參攷資料 一桑寄生新舊書云。今處處有之。從宜南北實。處處難得。豈歲歲歲斫摘踐之苦。而不可能生邪。抑方宜不同也。若以爲鳥食物子落枝節間。感氣而生。則麥當生麥。穀當生穀。不當但生此一物也。又有於柔滑細枝上生者。如何得子落枝節間。由是言之。自是感造化之氣。別是一物。古人當日惟取桑上者。實假其氣耳。又云。今醫家鮮用此。極誤矣。今醫家非不用也。第以難得真桑上者。嘗得真桑寄生。下嚙必驗如神。〔慈宗廣〕

一寄生松上。楊上。楓上。皆有形類

九七四

一般。但根津所因處爲異。則各隨其樹名之。生樹枝間。根在枝節之內。葉圓青赤。厚澤帶折。旁白。生枝節。冬夏生。四月花白。五月實赤。大如小豆。處處皆有。以出彭城者爲勝。俗呼爲續斷用之。而本經續斷別在上品。主療不同。市人混雜無識者。陶弘景曰：此多生楓樹。柳楊等樹上。葉無陰陽。如細柳葉而厚。莖粗短。子黃色。大如小棗。惟魏州有桑上者。子汁黃黏。核大似小豆。九月始熟。黃色。陶言五月實赤。大如小豆。蓋未見也。江南人相承用。其莖爲續斷。殊不相關。〔蘇恭〕。諸樹多有寄生莖葉。並相似云。是鳥鳥食一物子。落樹上。感氣而生。葉如橘而厚軟。莖如槐而肥。胞處雖有須。桑上者佳。然非自採。即難以別。可斷莖視之。色深黃者爲驗。又圖經云。葉似龍膽而厚。闊莖短。似雞脚。作樹形。三月四月。花黃白色。六月七月。結子黃綠色。如小豆。以汁稠黏者良也。〔韓保昇〕。一寄生高者二三尺。其葉圓而微尖。厚而柔。面青而光澤。背淡紫。而有茸。人言川蜀桑多時

眞假混亂。如初一摘去寄生一百斤。初二則採取雜寄生百餘斤。回園安插。回摘去寄生之頭處。用牛屎禾稈。經之。加之。尿水足。淋。不十天。其葉色暢。到十五日後。又從而摘之。有何好處。究不如廣西融縣之大桑樹。數十年生長。滿地皆是寄生之寄於樹者。亦滿目皆是。供多求少。左宜右有。價廉味高。隨即在梧州開略片。一息。其葉仍青。曬乾用之。與花地之寄生。有天淵之別。凡研究藥品者。必須親臨境地。方實而有據也。

形態 桑寄生生於桑樹枝間。根在枝節之內。高二三尺。其葉圓而微尖。質厚而柔。面青而光澤。背淡紫而有茸。自生枝葉。四月開白花。五月結實。實赤。大如小豆。九月熟。汁黏稠者。良。生桑樹者佳。

種類 大者曰爲葉如石榴葉。小者曰女蘿。葉如麻黃葉。

採取 每年三月間。連桑枝採其莖葉陰乾。九月間。採其子實晒乾。

製法 雷斅曰。採得用銅刀和根枝莖葉細剉。陰乾用勿見火。

性質 苦。平。無毒。
效能 驅風溼。健筋骨。益營血。安胎元。專用爲婦人藥。

主治 腰痛。小兒背強。癰腫。充肌膚。堅髮齒。長鬚眉。安胎。去女子崩中。內傷。不足。產後餘疾。下乳汁。主金瘡去瘳。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥

性本草論桑寄生曰。主懷妊漏血不止。令胎牢固。【宋】大明日華諸家本草論桑寄生曰。助筋骨。益血脈。【明】繆希雍本草經疏論桑寄生曰。桑寄生感桑之精氣而生。其味苦甘。其氣平和。不寒不熱。固應無毒。詳其主治。一本於桑。抽其精英。故功用比桑尤勝。腰痛及小兒背強。皆血不足之候。癰腫多由於營氣熱。肌膚不充。由於血虛。齒者骨之餘也。髮者血之餘也。益血則髮華。腎氣足則齒堅。而鬚眉長。血盛則胎自安。女子崩中。及內傷不足。皆血虛內熱之故。產後餘疾。皆由血分。乳汁不下。亦由血虛。金瘡則全傷於血。上來種種疾病。莫不悉由血虛有熱所發。此藥性能益血。故並主之也。兼能祛溼。故亦療

瘳。【清】閻立陸本草選旨論桑寄生曰。桑寄生味苦平。無毒。感桑氣

何其遠哉。【清】黃宮繡本草求真

論桑寄生曰。桑寄生感桑精氣而生。味苦而甘。性平而和。不寒不熱。號爲補腎補血要藥。緣腎主骨。髮主血。苦入腎。腎得補則筋骨有力。不致痿痺。而不酸痛矣。甘補血。血得補則髮受其滋。而枯脫落矣。故凡內而腰痛。筋骨痠疾。胎墮外而金瘡。肌膚腐溼。何不一藉此以爲主治乎。第出桑樹生者。眞和莖葉細剉。陰乾。忌火服。則其效如神。若雜樹所出。性氣不同。恐反有害。【清】黃元御玉楸葉解論桑寄生曰。桑寄生通達經絡。驅逐溼痺。治腰痛。背強。筋痿。骨弱。血崩。乳閉。胎動。腹痛。痢疾。金瘡。癰疽。髮齒。長眉鬚。【清】張隱庵本草崇原論桑寄生曰。寄生感桑氣而寄生枝節間。生長無時。不假土力。奪天地造化之神功。故能資養血脈。於空虛之地。而取效倍於他藥也。主治腰痛者。腰乃腎之外候。男子以藏精。女子以繫胞。寄生得桑精之氣。虛繫而生。故治腰痛。小兒腎形未足。似無腰痛之證。應有背強癰腫之疾。寄生治腰痛。則小兒背強癰

服五合。則吐蟲毒出也。(肘後方)

①治刺傷手足犯露水腫痛多殺人以桑枝三條。燂火炮熱斷之以頭熨瘡上令熱冷即易之盡二條則瘡自爛。仍取韭白或薤白傳上急以帛裹之有腫更作。(千金方)

②治紫白癰風。桑枝十斤。益母草三斤。水五斗。浸煮至五斤去滓。再煎成膏。每臥時溫酒調服半合。以愈爲度。(聖惠方)

用量 錢半至三錢。

參攷資料 煎藥用桑者。取其能利關節除風寒溼痺諸痛也。觀蠶樞經治寒痺內熱用桂酒法。以桑炭炙布巾熨痺處。治口僻用馬膏法。以桑鈎鈎其口。及坐桑灰上。皆取此意也。又癰疽發背不起。發或瘰癧不腐潰。及陰瘡癰癰。流注膿瘡頑瘡惡瘡久不愈者。用桑木炙法。未潰則拔毒止痛。已潰則補接陽氣。亦取桑通關節去風寒火性。暢達出鬱毒之意。其法以乾桑木劈成細片。繫作小把。然火吹息。炙患處。每吹炙片時。以瘰癧腐動爲度。內服補托藥。誠良方也。又按

趙晉養疴漫筆云。越州一學錄。少年苦嗽百藥不效。或令用南向桑

桑條一束。每條寸折。納鍋中。以水五盞煎至一盞。盛瓦器中。渴即飲之。服一月而愈。此亦桑枝燻煎法耳。(李時珍)

【桑油】

基本 本品即桑木之油。

採取 取鮮桑木粗碎。裝入瓶內。用一瓶蓋口。倒埋土中。燻火煨之。油自滴下。貯罐聽用。

主治 小兒身面爛瘡。輕粉。雄黃各五錢。豬膽一個。滑石一兩。硫黃五錢。穿山甲十五片。炙。鳳凰退燒存性。五錢爲末。用桑油。豬膽汁調。絹包擦之。

【桑花】

命名 本品乃桑樹上之苔蘚。狀如桑椹之花。故名。

古籍別名 桑蘚。桑錢。綱目。

性質 苦溫。無毒。

主治 健脾瀉腸。止鼻洪。吐血。腸風。崩中。帶下。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論桑花曰。治熱欬。【桑柔枝】即桑枝之處方用名。詳

【桑枝】條。

【桑柴火】

命名 本品係用桑木所燃之火。故名。

主治 癰疽發背不起。瘰癧肉不腐。及陰瘡癰癰。流注。膿瘡頑瘡。燃火吹滅。日灸二次。未潰拔毒止痛。已潰補接陽氣。去腐生肌。凡一切補藥諸膏。宜此火煎之。但不可點艾傷肌。

參攷資料 ①火以暢達。拔引鬱毒。此從治之法也。(朱丹溪) ②桑木能利關節。養津液。得火則拔引毒氣。而祛逐風寒。所以能去腐生新。抱朴子云。一切仙藥。不得桑煎不服。桑乃箕星之精。能助藥力。除風寒痺諸痛。久服終身不患風疾。故也。藏器曰。桑柴火炙蛇。則足見。李時珍。

【桑柴灰】

性質 辛寒。有小毒。

主治 蒸淋取汁爲煎。與冬灰等分。同滅。慈航黑子。蝕惡肉。煮小豆食。大下水脹。傳金瘡。止血生肌。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論桑柴灰曰。桑霜治噎食積塊。

【桑根白皮】即桑白皮之原名。詳『桑白皮』條。

【桑根蛇】即黃領蛇之古籍別名。典見綱目。詳『黃領蛇』條。

【桑脂】即桑葉滋之原名。詳『桑葉滋』條。

【桑寄生】

命名 本品寓他木而生。如鳥立於上。稱曰寄生。以寓生桑上者入藥。故名。舊本俗呼爲寄生草。東方朔傳云。在樹爲寄生。在地爲之憂。藏。

古籍別名

桑上寄生。寄附。寓木。宛童。(本經) 爲寄童。窠屑。窠童。桑生。桑格。混沌。螟蛉。桑上羊兒。藤。(和漢藥考)

基本 屬寄生科。爲桑上寄生木之枝葉。

產地 陳仁山藥物生產辨云。桑寄生國內無論何省。有桑樹者。則有出。俗人多以廣東花地爲正。實不盡然。凡往花地摘寄生。一到該園。必多方逢迎。又每元必有若干回頭俚。臨時必着人往採。雜寄生。回園預備插雜。採得數十斤。即出頭門之廳。開茶烟點心。休息談話。此時園內之伴。即做插雜工夫。

一兩。甘草五錢。上爲末。每服一二錢。入粳米百粒水煎。

參攷資料 ①桑白皮長於利

小水。乃實則瀉其子也。故肺中有水氣及肺火有餘者宜之。十劑云。燥可去溼。桑白皮赤小豆之屬是矣。宋醫錢乙治肺氣熱甚。欬嗽而後喘。面腫身熱。瀉白散用桑白皮炒一兩。地骨皮焙一兩。甘草炒半兩。每服一二錢。入粳米百粒。水煎。食後溫服。桑白皮地骨皮皆能瀉火。從小便而去。甘草瀉火而緩中。粳米清肺而養血。此乃瀉肺諸方之準繩也。元醫羅天益言其瀉肺中伏火而補正氣。瀉邪所以補正也。若肺虛而小便利者。不宜用之。

(李時珍) ②桑根白皮作線縫金瘡。腸出。更以熱雞血塗之。唐安金藏剖腹用此法而愈。(蘇頌) ③古本草言桑根見地上者名馬額。有毒殺人。旁行出土者名伏蛇。亦有毒而治心痛。故吳淑事類賦云。伏蛇痛馬額殺人。(李時珍)

【桑皮】即桑根白皮之簡稱。

【桑皮中白汁】 主治 小兒口瘡白漫拭

淨。塗之便愈。又塗金刃所傷。燥痛須與血止。仍以白皮裹之甚良。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論桑皮中白汁曰。塗蛇蜈蚣蜘蛛傷有效。取枝燒瀝。治大風瘡疥。生眉髮。

【桑耳】 命名 本品係生於桑上之菌耳。故名。

古籍別名 桑樅(唐本草)桑蛾。(宋本草)桑黃。桑臣(藥性)桑雞。桑上寄生(綱目)

外國名詞 Hirnecola polytricha, Fr. Schroet (拉丁) キクラゲ(日本)

基本 係真正擔子菌類。爲桑樹上寄生之菌耳。

產地 多生在栽桑區域。

形態 詳見木耳條。

性質 甘平有毒。

主治 黑者主女人漏下。赤白

汁。血病。癥瘕積聚。陰痛。陰陽寒熱

無子。(本經)療月水不調。其黃熱

陳白者。止久洩。益氣不飢。其金色

者。治癖飲積聚。腹痛金瘡。(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥

性本草論桑耳曰。治女子崩中帶

下。月閉血凝。產後血凝。男子疥癬。

【唐】孟詵食療本草論桑耳曰。利

五臟。宣腸胃氣。排毒氣。壓丹石人發熱。和葱豉作羹食。【宋】大明諸家本草論桑耳曰。止血。飢。腸風瀉血。婦人心腹痛。

【桑臣】即桑耳之古籍別名。典見藥性。詳「桑耳」條。

【桑枝】 處方用名 嫩桑枝。桑枝。

外國名詞 Morus alba, L. (拉丁) クハ(日本)

基本 係桑科桑屬之嫩枝。

形態 桑枝長者七八尺。短者三四尺。有粗有細。枝莖色青褐。略有彎形。梢端細。下端粗。皮內有白色黏汁。葉柄生於枝之左右側面。差錯而生。冬月葉落之後。其枝間有葉柄蒂痕。蒂痕之下有新葉苗芽。

採取 春夏採之。

製法 蘇頌曰。凡使桑枝。近效

方。一法用花葉枝。寸剉炒香。瓦器

煮減一半。再入銀器重湯熱減一

半。或入少蜜亦可。

性質 苦平無毒。

效能 祛風溼。利關節。專作風痺藥。

主治 偏體風痺。乾燥。水氣脚

氣風氣。四肢拘攣。上氣眼運。肺氣欬嗽。消食。利小便。久服輕身。聰明耳目。令人光澤。療口乾及癰疽後。湯用嫩條細切一升。熬香煎飲。亦無禁忌。久服終身不患偏風。

配合應用 ①治服食變白。久服通血氣。利五臟。雞桑嫩枝。陰乾。爲末。蜜和作丸。每日酒服六十丸(聖惠方)

②治水氣脚氣。桑條二兩。炒香。以水一升。煎二合。每日空心服之。無忌。(聖濟總錄方)

③治風熱骨痛。桑枝一小升。切炒。水三升。煎二升。一日服盡。許叔微云。常病骨痛。諸藥不效。服此數劑。自愈。觀本草切用。及圖經言其不冷不熱。可以常服。抱朴子言一切仙藥。不得桑枝煎不服。(本事方)

④解中蠱毒。令人腹內堅痛。面黃青色。淋瀝骨立。病變不常。桑木心剉一斛。着釜中。以水淹三斗。煮取二斗。澄清。微火煎得五升。空心

調中下氣。消痰止渴。開胃下食。殺腹臟蟲。止霍亂吐瀉。研汁。治小兒天弔驚癇客忤及傳鷄口瘡大驗。【明】李時珍本草綱目論桑白皮曰。瀉肺利大小腸。降氣散血。【明】繆希雍本草經疏論桑白皮曰。桑根白皮味甘氣寒而無毒。東垣海藏俱云兼辛。甘以固元氣而補不足。辛以瀉肺邪之有餘。故能止嗽也。凡肺中有水氣及肺火有餘者宜之。傷中者中氣傷也。五勞者五臟勞傷也。六極者六腑之中氣極也。羸瘦者肌肉脫也。崩中者血脫也。脈絕者氣血兩虛之至。故脈不來也。之數者皆由陰不足則陽有餘。陽有餘則火盛而內熱。火與元氣不兩立。火能消物。造化自然也。惟甘也可以補元氣。惟寒也可以除內熱。熱除矣。元氣生矣。則上來諸證自瘳。故本經終之以補虛益氣焉。別錄去肺中水氣者。即十劑中云燥可去溼。桑白皮之屬是已。吐血熱渴者。熱傷肺。火炎迫血妄行。溢出上竅而兼發熱作渴也。其主水腫腹滿臃脹者。即利水道除溼補虛之功也。溼熱盛則寸白生。

消除溼熱。則蟲自不能留也。縫金瘡者。甘寒補益。宜於傷損也。【明】李士材本草圖解論桑白皮曰。桑根白皮甘辛。瀉肺氣而痰水喘嗽皆除。古稱補氣者。非若參耆之正補。乃瀉邪所以補正也。愚者信爲補劑。而肺虛者亦用之。大失桑皮之面目矣。刮去皮。蜜水炒。【清】黃宮繡本草求真論桑白皮曰。桑白皮辛甘性寒。善入肺中。氣分瀉火利水。除痰泄氣。綠氣與水與痰止。屬病標。其氣逆不利。與水飲膠結。未有不因火結而成。久而不治。則痰結便祕。喘嗽胸滿。唾血口渴。水腫臃脹。靡不色色而見。桑白皮辛甘而寒。能於肺中治火利水。俾火去而水自消。水去而火即滅。而氣因爾而治。至書有云。能補元氣之不足。不過云其氣得自安。若以甘寒之味。可以補氣。則當置甘溫於何地乎。况本草十劑篇云。燥可去溼。桑白皮赤小豆之屬是也。故溼則爲重。宜燥劑以除之。但此性寒而製雖有甘味。不能以制。故古人有戒勿多用之條。及肺虛火衰水涸風寒作嗽者。爲切忌。爲線可。

縫金瘡。刮去皮取白。或恐瀉氣。蜜灰用。

配合應用 ①治嗽之要藥。桑白皮天麥二冬。款冬花。百部。薄荷。甘草。沙參。貝母。枇杷。葉。五味子。

②治水腫之神劑。桑白皮。芍藥。薏苡仁。木瓜。茯苓。橘皮。赤小豆。

③治嗽嗽吐血甚者。股鮮。桑根白皮。一斤。米泔浸三宿。刮去黃皮。剉細入糯米四兩。焙乾爲末。每服一錢。米飲下。【經驗方】

④治消渴尿多用入地三尺桑根。剉取白皮。炙黃黑。剉以水煮濃汁。隨意飲之。亦可入少米。勿用鹽。【肘後方】

⑤治產後下血。炙桑白皮。煮水飲之。【肘後方】

⑥治血露不絕。鋸截桑根。取屑五指撮。以淳酒服之。日三服。【肘後方】

⑦治墜馬拘損。桑根白皮五斤。爲末一升。煎膏。傅之。便止。已後亦無宿血。終不發動。【經驗方】

⑧治金刃瘡傷。新桑白皮燒灰。和馬糞塗瘡上。數易之。亦可煮汁服之。【廣利方】

①治雞物味眼。新桑根皮洗淨。槌爛入眼。撥之自出。【聖惠方】

②治髮墮。鹽落桑白皮剉三升。以水淹浸。煮五六沸。去滓。頻洗。沐。自不落也。【聖惠方】

③治髮槁不澤。桑根白皮。柏葉各一斤。煎汁。沐之。潤。【聖惠方】

④治小兒重舌。桑根白皮。煮汁塗乳上。飲之。【子母祕錄方】

⑤治小兒流涎。脾熱也。胸膈有痰。新桑根白皮。搗自然汁。塗之。甚效。乾者煎水。【聖惠方】

⑥治小兒天弔。驚癇客忤。家桑東行根。取研汁服。【聖惠方】

⑦治小兒火丹。桑根白皮。煮汁浴之。或爲末。羊膏和塗之。【千金方】

⑧治石癰。堅硬。不作膿者。蜀桑白皮。陰乾。爲末。拌膠和酒調。傅以軟爲度。【千金方】

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡肺虛無火及寒嗽者。禁用。忌鐵。鉛。鐵。斷。桂。心。麻子爲之使。

著名方劑 瀉白散。治肺熱咳。

嗽。【錢氏方】桑皮。炒。地骨皮。各。

饑。補益虛羸損乏。腰脚無力。久服輕身辟穀。

【桐】 古籍別名 白桐。椿桐。岡桐。桐。弘景。黃桐。〔圖經〕泡桐。榮桐。紫花桐。〔綱目〕

外國名詞 Paulownia tom. entosa H. Bn. (拉丁) キ(日本)

基本 保玄參科桐屬。爲桐之木材。其木皮葉花詳見各該條。

產地 山谷原野均有。

形態 桐爲喬木類之落葉木本。高三丈。葉大對生。春夏間開花於枝梢。排列爲圓錐花序。花冠呈紫色或白色。作唇形。萼五裂。實爲兩房之蒴果。長寸餘。熟則兩裂散出無數小扁種子。隨風飄揚。其木可供藥用。



主治 腫從脚起。削片煮汁漬之。并飲小許。

【桐木皮】 主治 五痔。殺三蟲。〔本經〕療奔豚氣病。

(別錄)

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論桐木皮曰。五淋沐髮去頭風。生髮滋潤。〔明〕李時珍本草綱目論桐木皮曰。治惡瘡。小兒丹毒。煎汁塗之。

【桐油傘紙】 基本 本品即雨傘上之桐油紙。

主治 蛙幹陰瘡。燒灰出火毒一夜。傳之便結痂。

【桐花】 主治 傳諸瘡。飼豬肥大三倍。

【桐蛙】 基本 桐油樹中之蟲也。

主治 惡腫毒。〔取七根焙末。沖酒服〕

【桐麻】 卽苘麻之日本名。詳『苘麻』條。

【桐葉】 性質 苦。寒。無毒。主治 惡蝕瘡陰瘡。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論桐葉曰。消腫毒生髮。〔桑上羊兒藤〕卽桑寄生之古籍別名。典見和漢藥考。詳『桑寄生』條。

【桑上寄生】 卽桑寄生之古籍別名。典見本經。詳『桑寄生』條。

卽桑耳之古籍別名。典見綱目。詳『桑耳』條。

【桑仁】 卽桑椹之古籍別名。典見和漢藥考。詳『桑椹』條。

【桑牛】 卽綠桑蠶之古籍別名。典見綱目。詳『綠桑蠶』條。

【桑生】 卽桑寄生之古籍別名。典見和漢藥考。詳『桑寄生』條。

【桑白皮】 原名 桑根白皮。桑嫩根之白色內皮。故名。

處方用名 生桑皮。炙桑皮。古籍別名 伏蛇皮。馬額皮。〔吳淑事類賦〕要食蠶延年卷雪。〔和漢藥考〕

基本 屬桑科。爲鷄桑之嫩根白皮。

產地 凡養蠶區域恒有生焉。陳仁山藥物生產辨云。桑白皮以產廣東南海西樵三水橫江爲好。味以東沙島爲好肉。粉口清遠次之。其餘東莞等處亦有。形態 桑之嫩根。外色青黃。內色白皮內又有黏汁。色亦潔白。



採取 桑根採無時。但須採十年以上者之嫩根。剝取其內之白皮。焙乾。

製法 雷斅曰。凡使桑白皮。採十年以上向東畔嫩根。銅刀刮去青黃薄皮一重。取裏白皮。切焙乾。用其皮中涎去之。藥力俱在上也。忌鐵及鉛。有同糯炒者。

性質 甘寒。無毒。效能 瀉肺行水。用爲水腫之利尿藥。又爲喘咳之祛痰藥。

主治 傷中。五勞六極。羸瘦。崩中。絕脈。補虛益氣。〔本經〕去肺中水氣。唾血。熱渴。水腫。腹滿。臃脹。利水道。去寸白。可以縫金瘡。〔別錄〕

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論桑白皮曰。治肺氣喘滿。虛勞客熱頭痛。內補不足。〔唐〕孟詵食療本草論桑白皮曰。煮汁飲利五臟。入散用下一切風氣水氣。〔宋〕大明諸家本草論桑白皮曰。

十靈 桃 桃

九六八

桃葉湯藥法。用水二石煮桃葉。取

七斗。安牀簀下。厚被蓋臥牀上。乘

熱薰之。少時當雨汗。汗過去湯速

粉之。并灸大椎穴。則愈。又陳廩且

小品方有阮河南桃葉蒸法云。連

發汗。汗不出者死。可煮之。如中風

法。燒地令熱。去火。以少水洒之。布

乾。桃葉於上。厚二三寸。安席葉上

臥之。溫覆得大汗。被中傳粉極燥

便瘥也。凡栢葉。麥藁。蠶沙。皆可如

此法用。張苗言。曾有人疲極汗出

臥簾受冷。但苦寒倦。四日。凡人發

汗。汗不出用此法而瘥也。(蘇頌)

參攷資料 一 本草言桃膠錄

服。保中不飢。按仙方服膠法。取膠

二十斤。絹袋盛於櫟木灰汁一石

中。煮三五沸。取掛高處。候乾再煮

如此三度。曝乾研篩。蜜和丸。梧子

大。每空腹酒服二十丸。久服身輕

不老。(蘇頌) 二 按抱朴子云。桃膠

以桑灰汁漬過。服之除百病。數月

斷穀。久則時有夜光。如月。又列仙

傳云。高丘公服桃膠得仙。古方以

桃膠為仙藥。而後人不復用之。豈

其功亦未必如是之殊耶。(李時

珍)

糖椰子(日本)

主治 作餅炙食。腴美令人不

不慎歟。(李時珍)

主治 殺鬼邪惡不祥。

歷代記述攷證 【宋】日華諸

家本草論桃蠹蟲曰。食之肥人。悅

顏色。

主治 辟瘟疫。

【桃蠹蟲糞】 為末水飲。

主治 辟瘟疫。

【桃榔子】 命名 本品木似板

榔而光利。故名。

古籍別名 姑榔木子。(臨海

異物志) 麪木子。(伽藍記) 董機

子。(楊慎厄言) 鐵木子。(綱目) 砂

糖椰子(日本)

主治 作餅炙食。腴美令人不

主治 作餅炙食。腴美令人不

主治 殺鬼邪惡不祥。

歷代記述攷證 【宋】日華諸

家本草論桃蠹蟲曰。食之肥人。悅

顏色。

主治 辟瘟疫。

【桃蠹蟲糞】 為末水飲。

主治 辟瘟疫。

主治 辟瘟疫。

【桃榔子】 命名 本品木似板

榔而光利。故名。

古籍別名 姑榔木子。(臨海

異物志) 麪木子。(伽藍記) 董機

子。(楊慎厄言) 鐵木子。(綱目) 砂

糖椰子(日本)

主治 作餅炙食。腴美令人不

主治 作餅炙食。腴美令人不

主治 殺鬼邪惡不祥。

歷代記述攷證 【宋】日華諸

家本草論桃蠹蟲曰。食之肥人。悅

顏色。

主治 辟瘟疫。

【桃蠹蟲糞】 為末水飲。

主治 辟瘟疫。

主治 辟瘟疫。

【桃榔子】 命名 本品木似板

榔而光利。故名。

古籍別名 姑榔木子。(臨海

異物志) 麪木子。(伽藍記) 董機

子。(楊慎厄言) 鐵木子。(綱目) 砂

糖椰子(日本)

主治 作餅炙食。腴美令人不

主治 作餅炙食。腴美令人不

主治 殺鬼邪惡不祥。

歷代記述攷證 【宋】日華諸

家本草論桃蠹蟲曰。食之肥人。悅

顏色。

主治 辟瘟疫。

【桃蠹蟲糞】 為末水飲。

主治 辟瘟疫。

主治 辟瘟疫。

【桃榔子】 命名 本品木似板

榔而光利。故名。

古籍別名 姑榔木子。(臨海

異物志) 麪木子。(伽藍記) 董機

子。(楊慎厄言) 鐵木子。(綱目) 砂

糖椰子(日本)

主治 作餅炙食。腴美令人不

主治 作餅炙食。腴美令人不

主治 殺鬼邪惡不祥。

歷代記述攷證 【宋】日華諸

家本草論桃蠹蟲曰。食之肥人。悅

顏色。

主治 辟瘟疫。

【桃蠹蟲糞】 為末水飲。

主治 辟瘟疫。

主治 辟瘟疫。

中熱。

歷代記述攷證

【明】李時珍

本草綱目論桃枝及樹根皮曰治
疰忤心腹痛解蟲毒辟疫癘療黃
疸身目如金殺諸瘡蟲

【桃花】

主治 詳見白桃花條

【桃花石】

命名 本品即赤石
脂之不黏舌堅如石
而有花點者故名

性質 甘溫無毒

主治 大腸中冷膿血痢久服
令人肥悅能食

參攷資料 桃花石即赤石脂

非別一物故其氣味功用皆同昔
張仲景治痢用赤石脂名桃花湯
和濟局方治冷痢有桃花丸皆即
此物耳(李時珍)

【桃花吐鐵】即吐鐵之古籍別名
典見會稽志詳「吐鐵」條

【桃花鹽】

命名 桃花鹽產澤
旺每春深紅如桃花
至夏色漸淡秋冬白入春仍紅故
名

性質 味鹹

主治 胃痛人以鹽熨之立止

【桃金娘】

古籍別名 金絲桃
(花鏡)

產地 出粵省叢生野間

形態 桃金娘為常綠灌木之
一種葉橢圓質厚對生夏月葉腋
抽細梗開花色淡紅似梅而未微
尖似桃而色倍中莖純紫中綴黃
鬚露出花外狀似金絲八九月實
熟青紺若牛乳狀其實可供藥用
其花詳見該條

性質 甘寒無毒

主治 養血明目

【桃金娘花】

主治 行血

【桃柳藤】即何首烏之古籍別名
典見諸家本草詳「何首烏」條

【桃核仁】即桃仁之處方用名詳
「桃仁」條

【桃寄生】

命名 本品為桃樹
上之寄生故名

性質 苦辛無毒

主治 小兒中蟲毒腹內堅痛
面目青黃淋露骨立取二兩為末
如茶點服日四五服

【桃梟】

命名 本品係經冬不
落之桃實懸乾如梟首

藥木之狀故名

古籍別名 桃奴桃景梟景
(別錄)神桃鬼髓(綱目)

採取 正月採之以中實者良
製法 雷斅曰鬼髓十一月
採得以酒拌蒸之從已至未焙乾
以銅刀切焙取肉用

性質 苦微溫有小毒

主治 殺百鬼精物(本經)殺
精魅五毒不祥療中惡腹痛(別
錄)

歷代記述攷證 【宋】大明諸

家本草論桃梟曰治肺氣脹痛破
血療心痛酒磨煖服之【明】汪穎
食物本草論桃梟曰主吐血諸藥
不效燒存性研末米湯調服有驗
【明】李時珍本草綱目論桃梟曰
治小兒虛汗婦人妊娠下血破伏
梁結氣止邪癰燒烟熏痔瘡黑油
調傅小兒頭上肥瘡軟癬

【桃景】即桃梟之古籍別名典見
別錄詳「桃梟」條

【桃絲竹】

產地 出兩廣交趾
等處

形態 桃絲竹為苞木類竹屬
之一種本大如斗而色黑葉色亦

黑形類棕竹有大小之別可為筆
筒酒注茶甌及刀劍握等用其茹
可供藥用筍筒殼詳見各該條

採取 於竹莖上刮取之先刮
去其外之青皮再刮取其內層之
二黃用

主治 降痰火煎服功勝淡竹
解蛇咬及天蛇毒諸癰瘡發背痘
疔為末傳之或作餅貼之血崩炒
末水服

【桃絲竹蝨】

基本 本品為
桃絲竹上所生

之竹蟲也

主治 瘡疥瘡有效

【桃葉】

古籍別名 嫩葉名桃
心(綱目)

採取 以嫩者入藥尤勝

性質 苦平無毒

主治 除尸蟲出瘡中小蟲

歷代記述攷證 【宋】大明諸

家本草論桃葉曰治惡氣小兒寒
熱客忤【明】李時珍本草綱目論
桃葉曰療傷寒時氣風痺無汗治
頭風通大小便止霍亂腹痛

參攷資料 桃葉薰汗法張

文仲備急方治天行病有支太醫

十畫 桃

同煮乾。於木臼內搗爛。入蒸餅和丸。梧子大。每溫水下三十丸。(聖惠方)

⑤ 治冷勞減食。漸至黑瘦。用桃仁五百顆。吳茱萸三兩。同入鐵鑊中。微火炒一炊久。將桃仁去皮。微黃色。即漸加火。待微烟出。即乘熱。收入新瓶內。厚紙封住。勿令洩氣。每日空心取桃仁二十粒。去皮嚼。之以溫酒下。至重者服五百粒愈。(聖惠方)

⑥ 預辟瘡瘍。用桃仁一斤。吳茱萸黃青鹽各四兩。同炒熟。以新瓶密封。一七取出。揀去茱萸。將桃仁去皮尖。每嚼一二十枚。山居尤宜之。(全居士選奇方)

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡無瘀滯者禁用。香附爲之使。

著名方劑 桃核承氣湯。治傷寒太陽病不解。熱結膀胱。其人如狂。血自下。下者愈。其外不解者。尚未可攻。宜先與桂枝湯解外。外解已。但小腹急結。此主之。(傷寒方)

桃仁五十枚。去皮尖。桂枝二兩。(去皮)大黃四兩。芒硝甘草(炙)

各二兩。上五味。以水七升。煮取二升半。去滓。納芒硝。更上火微沸。下火。先令溫服五合。日三服。當微利。

參攷資料 ① 桃仁苦重於甘。

氣薄味厚。手足厥陰經血分藥也。苦以泄滯。血甘以生新。血故破凝。血者用之。其功有四。治熱入血室。一也。泄腹中滯血。二也。除皮膚血熱燥痒。三也。行皮膚凝滯之血。四也。(李杲) ② 肝者血之源。血聚則肝氣燥。肝苦急。急食甘以緩之。桃仁之甘。以緩肝散血。故張仲景抵當湯用之。以治傷寒八九日內有蓄血發熱如狂。小腹滿痛。小便不利者。又有當汗失汗。熱毒深入。吐血及血結。胸煩躁亂。語者。亦以此湯主之。與蜜蠶水蛭大黃同用。(成無己) ③ 血滯所宜者。桃仁紅花丹皮蘇木。血竭之屬是也。第紅花蘇木。血竭色紅。丹皮色紫。唯桃仁屬血而色乃白。固的知其爲肺果之頭目。桃爲肺果。精專在仁。故司肺氣。爲營血之師帥。凡血之不行不濡。即氣之不決不運。氣如藥。篤血如波瀾。故也。所說可謂中肯。所以紅花丹皮蘇木。血竭。本赤紫

色而入血分。各有所入。唯桃仁本白色。而能和血。故上中下無不行也。又曰。桃爲肺果。而能奏功於血。猶杏爲心果。而能奏功於氣者。也。其物理之妙。有如此。(劉潛江)

④ 桃仁性善破血。凡血結血瘀。血燥。瘀血。閉血。蓄血。血痛。血癥等證。用之立通。第散而不收。瀉而無補。過用之。及用之不得其當。能使血下不止。損傷真陰。爲害非細。故凡經閉不通。由於血枯。而不由於瘀滯。產後腹痛。由於血虛。而不由於瘀血。結塊。大便不通。由於津液不足。而不由於血燥。門結。法宜忌之。(繆希雍)

【桃仁泥】即桃仁之處方用名。詳『桃仁條』。

【桃心】即桃之嫩葉之別名。典見綱目。詳『桃葉條』。

【桃毛】基本 本品即刮取桃實上之細毛也。

性質 辛平無毒。

主治 破血閉。下血癥。寒熱積聚。無子。帶下諸疾。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論桃毛曰。能治惡鬼邪氣。

九六六

【宋】大明諸家本草論桃毛曰。療崩中。破癰氣。

【桃奴】即桃鼻之古籍別名。典見別錄。詳『桃鼻條』。

【桃皮酒】製法 用桃皮煎汁。同秫米和麴釀酒飲。

主治 水腫。利小便。

【桃竹筍】古籍別名 黃筍。

性質 苦平無毒。

主治 六畜瘡中生蛆。搗碎納之。蛆盡出。

參攷資料 ① 南人謂之黃筍。灰汁煮之可食。不爾。載人喉。其竹叢生。醜類非一。(陳藏器) ② 桃枝。竹出川廣中。皮滑而黃。厚紋。瘦骨。四寸有節。可以爲席。李時珍。

【桃竹筍殼】主治 楊梅瘡。

【桃枝】即桃枝之古籍別名。典見綱目。詳『桃枝條』。

【桃枝及樹根皮】製法 李時珍曰。樹皮。根皮皆可用。根皮尤良。並取東行者。刮去粗皮。取白皮入藥。

性質 苦平無毒。

主治 除邪鬼中惡。腹痛。去胃

有去瘀生新之功。若去皮搗爛少用。取其純白。以入大腸。治血枯便閉。血燥便難。以其濡潤涼血和血。有開結通滯之力。

配合應用 ①治產後瘀血結塊作痛。并治壯盛婦人。經閉不通。

用桃仁當歸芍藥澤蘭延胡索蘇木五靈脂紅花牛膝生地黃益母草。

②治大腸血燥。便結不通。用桃仁當歸麻仁地黃麥門冬芍藥黃芩肉蓯蓉甘草。

③治上部內傷。瘀血作痛。用桃仁。番降香。川通草。山查。穿山甲。乳香。沒藥。紅花。續斷。當歸。

④延年去風。令人光潤。用桃仁五合。去皮。用粳米飯漿同研。絞汁。令盡。溫溫洗面極妙。(千金方)

⑤治偏風不遂及癱疾。用桃仁二千七百枚。去皮尖雙仁。以好酒一斗三升。浸二十一日。取出。曬乾。杵細作丸。如梧子大。每服二十丸。以原酒吞之。(外臺祕要方)

⑥治風勞毒腫。癰痛。或牽引小腹及腰痛。桃仁一升。去皮尖。熬令黑。烟出。熱研如脂膏。以酒三升。攪

和服。煖臥取汗。不過三度瘥。(食醫心鏡方)

⑦治癰疾寒熱。桃仁一百枚。去皮尖。乳林內研成膏。不得犯生水。

入黃丹三錢。丸梧子大。每服三丸。當發日。面北溫酒吞下。(唐慎微本草方)

⑧治骨蒸作熱。桃仁一百二十枚。留尖。去皮及雙仁。杵爲丸。平旦并花水類服之。令盡。量飲酒至醉。仍須任意喫水。隔日一劑。百日不得食肉。(外臺祕要方)

⑨治上氣欬嗽。胸滿氣喘。桃仁三兩。去皮尖。以水一大升。研汁。和粳米二合。煮粥食。(食醫心鏡方)

⑩治卒得欬嗽。桃仁三升。去皮。杵着器中密封。蒸熟。日乾。絹袋盛。浸二斗酒中。七日可飲。日飲四五合。

⑪治尸疰鬼疰。乃五尸之一。又挾鬼邪爲祟。其病變動有三十六種。至九十九種。大略使人寒熱淋瀝。沉沉默默。不知所苦。而無處不惡。累年積月。以至於死。死後復傳旁人。急以桃仁五十枚。研泥水煮。取四升服之。取吐。吐不盡。三四日

再吐。(肘後方)

⑫治傳尸鬼氣。咳嗽癰注。氣血氣不通。日漸消瘦。桃仁一兩。去皮尖。杵碎。水一升半。煮汁入米作粥。空心食之。

⑬治鬼疰心痛。桃仁一合。爛研。煎湯服之。(急救方)

⑭治卒然心痛。桃仁七枚。去皮尖。研爛。水一合服之。(肘後方)

⑮治人好覺。桃仁熬去皮尖。三七枚。以小便服之。(千金方)

⑯治下部蟲匿。病人齒無色。舌上白。喜睡。憤憤不知痛痒處。或下痢。乃下部生蟲食肛也。桃仁十五枚。苦酒二升。鹽一合。煮六合服之。(肘後方)

⑰治崩中漏下不止者。桃核燒存性。研細。酒服方寸匕。日三。(千金方)

⑱治產後百病。千金桃仁煎。治婦人產後百病諸氣。取桃仁一千二百枚。去皮尖雙仁。熬搗極細。以清酒一斗半。研如麥粥。納小瓶中。封入楊中。煮一伏時。每服一匙。溫酒和服。日再。(圖經方)

⑲治產後身熱如火。皮如粟粒者。桃仁研泥。同臘豬脂傳之。日日易之。(千金方)

⑳治產後血閉。桃仁二十枚。去皮尖。藕一塊。水煎服之。良。(唐瑤經驗方)

㉑治產後陰腫。桃仁燒研傳之。

㉒治婦人陰癢。桃仁杵爛。綿裹塞之。(肘後方)

㉓治男子陰腫作痒。用桃仁炒香。爲末。酒服方寸匕。日二。仍搗傳之。亦治小兒卵腫。(外臺祕要方)

㉔治小兒爛瘡初起。腫漿似火瘡。桃仁研爛傳之。(子母祕錄方)

㉕治小兒聾耳。桃仁炒研綿裹。日日塞之。(千金方)

㉖治風蟲牙痛。鍼刺桃仁。燈上燒烟出。吹滅。安痛齒上咬之。不過五六次愈。(衛生家寶方)

㉗治唇乾裂痛。桃仁搗和豬脂傳。(海上方)

㉘治大便不快。裏急後重。用桃仁三兩。去皮。吳茱萸二兩。食鹽一兩。同炒熟。去鹽。菜。每嚼桃仁五七粒。(聖濟總錄方)

㉙治急勞咳。煩熱。桃仁三兩。去皮尖。豬肝一枚。童子小便五升。

十畫 桃

冬不落者名桃杪。桃奴。(綱目)汁液流出名桃膠。(綱目)

外國名詞 Prunus Persica.

Set Z. var. vulgaris Maxim.

(拉丁)モモ(日本)

基本 係薔薇科櫻桃屬。爲桃之果實。其仁、毛、果花、葉、膠枝、及樹根皮詳見各條。

產地 山野平原。處處有出。

形態 桃爲果類之落葉喬木。高丈餘。葉披針形。長橢圓。有鋸齒。互生。春月與李同時開花。花有紅、紫、白等色。在單瓣者花冠自五瓣合成。重瓣者種亦多。實爲核果。外面生毛。夏月成熟。亦有熟於秋冬者。熟則蒂帶紅色。結實五年後。宜以刀劃其樹皮。出其脂液。則可垂久。其實俗謂桃子。可供食與藥用。



桃

性質 辛。酸。甘。熱。微毒。

主治 作脯食。益顏色。

歷代記述攷證 【唐】孫思邈

千金翼論桃實曰。肺之果。肺病宜食之。

參攷資料 ①桃子多食。令人有熱。(綱目)②黃帝書云。食桃飽入水浴。令人成淋及寒熱病。(孫思邈)③生桃多食。令人膨脹。及生癰癤。有損無益。五果列桃爲下。以此(李時珍)④桃與鵝同食。患心痛。服朮人忌食之。(吳瑞)

處方用名 桃仁泥。桃核仁。單桃仁。

杏籍別名 脫核仁。脫核嬰兒。(和漢藥考)

外國名詞 Fructus Persicae

(拉丁) 基本 屬薔薇科。爲桃之核仁。

產地 陳仁山藥物生產辨云。桃仁各省均有出產。以湖南常德府。湖北襄樊。老河。山東河南產者爲良。六七月出新。

形態 桃爲各地所栽植之落葉樹。高達丈餘。葉互生。作披針形。邊緣有細鋸齒。花先葉而開。普通爲淡紅色。五瓣花時。或開白。緋。紫等色。有單瓣重瓣之別。果實爲肉果。作彈丸形。肉多汁柔軟。呈赤色。

或橙。色。核殼有許多短線溝。中有仁。仁爲白色。扁平。尖。卵圓形。被有褐衣。且有縱皺。

採取 七月採實。取仁。陰乾。

製法 雷斅曰。凡使桃仁。須去皮。用白朮。烏豆二味。同於坩鍋中。煮二伏時。漉出。劈開。心黃如金色。乃用。李時珍曰。桃仁行血。宜連皮。尖生。用潤燥。活血。宜湯浸。去皮。尖炒黃。用。麥麩同炒。或燒存性。各隨本方。雙仁者有毒。不可食。

性質 苦。甘。平。無毒。

效能 破血。行瘀。潤燥。通便。用治咳嗽。血病。風痛。

主治 瘀血。血閉。癥瘕。邪氣。殺小蟲。(本經)止欬。逆上氣。消心下堅硬。除卒暴擊血。通月水。止心腹

痛。(別錄)

張仲景之發明 桃仁一味。經張仲景之實驗。認爲主治瘀血。少腹滿痛。故兼治腸癰。及婦人經水不利。茲考徵如下。①桃仁承氣湯證曰。少腹急結。②大黃牡丹皮湯證曰。少腹腫痛。③葶藶湯證不具。上三方。(桃仁各五十枚)④下瘀血湯證曰。產婦腹痛。又曰。經水不

九六四

利。(上一方。桃仁三十枚)⑤大蠲蟲丸證曰。腹滿。(上一方。桃仁一升)⑥抵當丸證曰。少腹滿。(上一方。桃仁二十五枚)⑦抵當湯證曰。少腹當鞭滿。又曰。婦人經水不利。(上一方。桃仁二十枚)⑧桂枝茯苓丸證不具。(上一方。桃仁諸藥等方)據此諸方。則桃仁主治瘀血。急結。少腹滿痛。明矣。凡毒結於少腹。則小便不利。或如淋。其如此者。後必有膿自下。或瀉血者。或婦人經水不利者。是又臍下久瘀血之所致也。

歷代記述攷證 【唐】孟詵食療本草論桃仁曰。殺三蟲。又每夜

嚼一枚。和蜜塗手。面。良(金)張元表珍珠囊論桃仁曰。治血結血祕。血塊。通潤大便。破蓄血(明)李時珍本草綱目論桃仁曰。主血滯風痺。骨蒸。肝癰。寒熱。鬼疰。疼痛。產後血痢。①買九如辨藥指南論桃仁曰。桃仁味苦。能瀉血熱。體潤。能滋腸燥。若連皮研碎。多用。藉其赤色。以走肝經。主破蓄血。逐月水。及遍身疼痛。四肢木痺。左半身不遂。左足痛甚者。以其舒經活血。行血

左足痛甚者。以其舒經活血。行血

與本草之義相通否乎。曰。本草言桂辛甘大熱。能宣導百藥。通血脈。止煩出汗。是調其血而汗自出也。仲景云。太陽中風陰弱者。汗自出。衛實營虛。故發熱汗出。又云。太陽病發熱汗出者。此爲營弱衛強。陰虛陽必濇。之故。皆用桂枝發其汗。此乃調其營氣。則衛氣自和。風邪無所容。遂自汗而解。非桂枝能開腠理。發出其汗也。汗多用桂枝者。以之調和營衛。則邪從汗出。而汗自止。非桂枝能閉汗孔也。昧者不知出汗閉汗之意。遇傷寒無汗者。亦用桂枝。誤之甚矣。桂枝湯下發汗字。當認作出字。汗自然發出。非著麻黃能開腠理。發出其汗也。其治虛汗。亦當逆察其意可也。(王好古) ①桂枝本爲解肌。若太陽中風。腠理緻密。營衛邪實。津液凝固。其脈浮緊。發熱汗不出者。不可與此。必也皮膚疎泄。自汗脈浮緩。風邪干於衛氣者。乃可投之。發散以辛甘爲主。桂枝辛熱。故以爲君。而以芍藥爲臣。甘草爲佐者。風淫所勝。平以辛苦。以甘緩之。以酸收之也。以薑棗爲使者。辛甘能發散。

而又用其行脾胃之津液。而和營衛。不專於發散也。故麻黃湯不用薑棗。專於發汗。不待行其津液也。(成無己) ②麻黃通徹皮毛。故專於發汗。而寒邪散。肺主皮毛。辛走肺也。桂枝透達營衛。故能解肌。而風邪去。脾主營。肺主衛。甘走脾。辛走肺也。肉桂下行導火之原。此東垣所謂苦辛燥。急食辛以潤之。開腠理。致津液。通其氣者也。(李時珍) ③有人患赤眼腫痛。脾虛不能飲食。肝脈盛。脾脈弱。用涼藥治肝。則脾愈虛。用暖藥治脾。則肝愈盛。但於溫平藥中。倍加肉桂。殺肝而益脾。故一治兩得之。傳云。木得桂而枯是也。此皆與別錄桂利肝肺氣。杜桂治脇痛。脇風之義相符。人所不知者。今爲拈出。又桂性辛散。能通子宮而破血。故別錄言其墮胎。龐安時乃云。炒過則不損胎也。(醫餘錄) ④桂枝亦惟有汗者宜之。若傷寒無汗。則當以發汗爲主。而不獨調其營衛矣。故曰。無汗不得服桂枝。有汗不得服麻黃也。傷寒例云。桂枝下咽。陽盛則斃。承氣入胃。陰盛則亡。(汪詡菴) ⑤桂

枝辛甘而溫。氣薄升浮。入太陰肺。太陽膀胱經。溫經通脈。發汗解肌。治傷風頭痛。傷寒自汗。調和營衛。使邪從汗出。亦治手足痛。風脇風。桂枝偏陽。陰虛之人。一切血證。不可誤投。(吳儀洛)

【桂芝】即荔枝之古籍別名。典見和漢藥考。詳『荔枝』條。

【桂花】即木犀花。詳『木犀花』條。

【桂花露】即木犀花露。詳『木犀花露』條。

【桂根皮】基本 本品即桂樹採取 取陳年之入土最深者爲用。

主治 貼牙痛。能斷根。

【桂桂】即紫蘇之古籍別名。典見爾雅。詳『紫蘇』條。

【桂棗】即大棗之古籍別名。典見和漢藥考。詳『大棗』條。

【桂圓】即龍眼之古籍別名。典見和漢藥考。詳『龍眼』條。

【桂圓肉】即龍眼之處方用名。詳『龍眼』條。

【桂蠹糞】主治 獸骨哽。煎醋漱。

【桂蠹蟲】形態 桂蠹蟲爲化生蟲類之一種。即蠹蟲之生於桂樹者。人如指。色紫而香。蜜漬之。可爲珍味。可供藥用。性質 辛溫。無毒。

主治 去冷氣。

歷代記述攷證 【明】李時珍本草綱目論桂蠹蟲曰。除寒痰。辟飲。冷痛。

【桃】命名 本品早花。易植而子繁。故字從木。桃十億爲兆。言其數多也。故名。又木此諧聲曰桃。

種類 以其種類而名者。有絳桃。緋桃。蘇州桃。千葉桃。西王母桃。碧桃。美人桃。人面桃。二色桃。日月桃。鸞鳥桃。瑞仙桃。壽星桃。巨核桃。十月桃。油桃。李桃。(綱目) 以其實之色而名者。有紅桃。細桃。白桃。烏桃。金桃。銀桃。胭脂桃。(綱目) 以其實之形而名者。有綿桃。御桃。方桃。圓桃。偏核桃。(綱目) 以其時而名者。有五月早桃。十月冬桃。秋桃。霜桃。(綱目) 小而多毛者。名毛桃。橘桃。冬桃。一名薄桃。又名仙人桃。亦名崑崙桃。番名波淡樹。(綱目) 經

血家不宜桂枝之說。內傷病乃視桂枝如蛇蠍。其實桂枝辛溫能使血液流行亢進。不宜於血症之屬實熱者同也。至若虛勞羸弱。法當宗之。而蘇派醫生之較高明者。知桂枝治寒飲。然量僅二三分。寧不可笑。張山雷曰。桂枝輕用三五分至七八分。重用一錢至錢半。若營血素虛而衛陽亦微。外有凍寒。則用一二分與白芍合炒。其舌滑無苔者。且必桂芍同炒。而揀去桂枝弗用。僅取其氣。不食其味。此雖吳下近時新法。而不可謂其無深意者也。桂枝卽肉桂之枝。柔嫩細條。芬芳濃郁。輕揚升散。味辛氣溫。祛營衛之風寒。主太陽中風而頭痛。此中風爲風寒新感之病。實卽今之所謂傷風。凡漢唐以上。通稱中風。內經以及千金。外臺皆然。與金元以後之所謂中風大異。立中州之陽氣。療脾胃虛緩而腹疼。枝幹橫行。故宜通經絡。上達肩臂。溫辛勝水。則抑降腎氣。下定奔豚。開腎家之痺者。若是陽微洩短。斯爲通潮良材。維在燥咳氣升。妄用卽致血溢。抑或陰虧液耗。誤投

必致病加。其效在皮。而仲景書反去其皮。可悟傳抄之謬。無皮爲木。而晚近來或用其木。毋乃嗜好之偏。

配合應用 ①治風寒束表。用麻黃柴胡荊芥防風生薑葱白。

②治骨節疼痛。用桑枝附子牛膝。威靈仙茯苓。防己。

③治上氣咳逆。用芥子厚朴杏仁半夏。

用量 幾分至二三錢。

施用宜忌 性能動血。陰虛火盛者忌之。忌生葱與火。

著名方劑 ①桂枝湯。治上衝頭痛發熱。汗出惡風者。桂枝芍藥大棗生薑各七分半。甘草五分以上五味。以水一盞四分。煎取六分。古

方藥品考桂枝湯條云。風邪受於表。必以先發表爲順。故用桂枝以發散表邪。芍藥以順血固肌。生薑以開痰達藥力。大棗以溫保胃氣。

甘草以調和諸藥。②桂枝加桂湯。治本方證而上衝劇者。本方加桂五分。煎法同前。

③桂枝加芍藥湯。治本方證而心下痞硬或拘攣及嘔者。桂枝大棗人參各六分。生薑芍藥各八分。甘草四分。上六味以水二

盞四分煎取六分。④桂枝二麻一湯。治桂枝湯證多麻黃湯少者。桂枝八分芍藥大棗生薑各六分。牛

甘草五分。杏仁三分。上七味以水一盞半煎取六分。⑤桂枝二越婢湯。治桂枝湯證多越婢湯證少者。桂枝芍藥甘草麻黃各四分。牛

大棗石燕各六分。生薑七分。煎法同前。

⑥桂枝麻黃各半湯。治桂枝湯麻黃湯二方證相半者。桂枝五分芍藥生薑甘草麻黃大棗各三分。杏仁三分。上七味以水一盞六分煎取六分。

參攷資料 ①桂、甘草大熱。素問云。辛甘發散爲陽。故漢張仲景桂枝湯。治傷寒表虛。皆須此藥。正合辛甘發散之意。本草三種之桂。不用牡桂。茵桂者。此二種性止於溫。不可以治風寒之病也。然本經止言桂。仲景又言桂枝者。取枝上

皮也。《寇宗奭》云。桂能止煩出汗。而張仲景治傷寒有當發汗。凡數處皆用桂枝湯。又云。無汗不得服桂枝。汗家不得重發汗者。用桂枝湯。是重發其汗。汗多者用桂枝甘草湯。此又用桂枝閉汗也。一藥二用。

各八分。甘草四分。上六味以水二盞四分煎取六分。⑦桂枝二麻一湯。治桂枝湯證多麻黃湯少者。桂枝八分芍藥大棗生薑各六分。牛

甘草五分。杏仁三分。上七味以水一盞半煎取六分。⑧桂枝二越婢湯。治桂枝湯證多越婢湯證少者。桂枝芍藥甘草麻黃各四分。牛

大棗石燕各六分。生薑七分。煎法同前。

⑨桂枝麻黃各半湯。治桂枝湯麻黃湯二方證相半者。桂枝五分芍藥生薑甘草麻黃大棗各三分。杏仁三分。上七味以水一盞六分煎取六分。

參攷資料 ①桂、甘草大熱。素問云。辛甘發散爲陽。故漢張仲景桂枝湯。治傷寒表虛。皆須此藥。正合辛甘發散之意。本草三種之桂。不用牡桂。茵桂者。此二種性止於溫。不可以治風寒之病也。然本經止言桂。仲景又言桂枝者。取枝上

節利矣。中者。脾也。辛溫則暢達肝氣。而脾經受益。所以補中益氣者。肺主氣。肺溫則真氣流通而受益也。久服通神。輕身不老者。久服則辛溫助陽。陽氣常伸而靈明陽盛。而身輕不老也。【清】張隱菴本草

崇原論桂枝曰。桂木凌冬不凋。氣味辛溫。其色紫赤。水中所生之木火也。肺腎不交。則爲上氣欬逆之證。桂枝水之生陽上交於肺。則上氣平而欬逆除矣。結氣喉痺者。三焦之氣不行於肌腠。則結氣而爲喉痺。桂枝少陽之木氣。通利三焦。則結氣通而喉痺可治矣。吐吸者。吸不歸根。即吐出也。桂能引下氣。與上氣相接。則吸入之氣。直至丹田而後出。故治吐吸也。關節者。兩肘兩腋兩髀兩脇皆機關之室。周身三百六十五節。皆神氣之周行。桂助君火之氣。使心主之神。而出入於機關。游行於骨節。故利關節也。補中益氣者。補中焦而益上下之氣也。久服則陽氣盛而光明。故通神明。三焦通會元真於肌腠。故輕身不老。【清】陳修園本草經讀論桂枝曰。桂。牡桂也。牡陽也。卽今

之桂枝。桂皮也。薔根也。薔桂。卽今之內桂。厚桂也。然生發之機在枝幹。故仲景方中所用俱是桂枝。卽牡桂也。時醫以桂枝發表。禁不敢用。而所用肉桂。又必刻意求備。皆是爲施治不愈。卸罪巧法。

國外學說 依日本藥局方。爲芳香性健胃藥。又爲調味調香料。於慢性下痢。急性腸炎。答兒之末期。子宮弛緩。輕度之出血。作用於子宮筋之力。比麥角遠弱。可爲散劑。一日數回用。○。三至一。五。或以五。○至一五。○爲浸劑。一日中分服之。又集成藥物學曰。桂枝爲產於中國南部及安南樟科之樹皮。其主要成分爲桂皮油。含鞣酸。樹脂。橡膠等。桂枝之作用。在其揮發油與鞣酸。能亢進胃液及唾液之分泌。而奮起消化器。桂枝用於健胃驅風。及子宮出血間。用爲催產藥。桂枝屬於芳香性神經藥。芳香性神經藥之通性。屬於本類者。爲因含有揮發油。而有效之植物及動物之一部分。與含有揮發油及其他香氣性不明物質。一二之動物性產物。本類

之藥物。隨藥效的分類法。多屬於亢奮藥。及回蘇性腦藥。往往亦依其用量之差異。而有鎮痙之效。

近人學說 ●曹炳章曰。傷寒金匱用桂枝。考其用意。皆屬發散。肝脾而行營血。通達經絡而開皮毛。至於調經開閉。疏木止痛。通關逐痺。活絡舒筋。尤有專功。長沙藥解云。大抵雜症百出。非緣脾胃之逆。則因肝脾之陷。桂枝既宜於逆。又宜於陷。左之右之。無不宜之。凡潤肝養血之藥。一得桂枝。化陰滯而爲陽利。非羣藥所能及。惟淫熱宜辛涼。則此物應忌耳。曹拙巢曰。寒溼凝滯於肌肉。陽氣不達於外。仲師因立桂枝湯方。以扶脾陽而達營分之鬱。蓋孫絡滿佈。腠理寒鬱於肌。孫絡爲之不通。非得陽氣以通之。營分中餘液。必不能蒸化而成汗。桂枝之開發脾陽。其本能也。但失此不治。溼邪內竅。關節則病。歷節或竄入孫絡而爲痛。按之不知其處。俗名寒溼流筋。其鬱塞牽涉肝臟。二證皆宜桂枝。然猶爲間接之治。若夫寒溼太甚。肝臟疎達之氣爲滯邪所鬱。則爲腹中急

痛。黃坤載以爲溼盛肝鬱。太陽篇云。陽脉濡。陰脉弦。【右爲陽。左爲陰】。法當腹中急痛。先予小建中湯。不差。予小柴胡湯。金匱婦人雜病。婦人腹中痛。小建中湯主之。蓋婦人無外事。深閨伏處。動多肝鬱之證。仲師以小建中湯爲主方。卽可證桂枝之能達肝鬱也。章次公曰。自有清中藥。蘇派學說盛行以後。桂枝之價值。遂無人能解。病屬外感。既不敢用之解肌。病屬內傷。更不敢用之以補中。不免有藥材之嘆。予遇有麻黃湯證。懼病者疑麻黃之猛悍。輒以荊防代麻黃。而以桂枝佐之。亦效。蓋桂枝本質。原無汗之能力。以其辛香寬散。故可助發汗藥之作。汗蘇派醫生。所以不敢用桂枝。其理由之可得而言者。不外【南方無真傷寒】。仲景之麻桂。僅可施於北方人。非江南體質柔弱者所能勝。故若輩一遇熱病。無論傷寒溫病。一例以大豆卷。遠翹。桑菊。應付之。於此而欲中醫之不式微。難言之矣。近世藥工。剖切桂枝。必先以水浸三五日。是桂枝芳香之性。已受損失。自後世有

鎮痙攣痛作用。元奮強心強壯作用。祛痰作用。健胃驅風作用。疏通瘀血通經催產。及下胎盤死胎之作用。利尿作用。矯味矯臭作用。則桂枝之主要成分。因含有桂枝油及揮發油。故藥物學所載揮發油之醫治作用。可謂卽桂枝之醫治作用也。

主治 上氣欬逆。結氣喉痺。吐吸。利關節。補中益氣。久服通神。輕身不老。(本經)心痛。脇痛。脇風。溫筋通脈。止煩出汗。(別錄)

張仲景之發明 桂枝一味。經張仲景之實驗。認爲主治衝逆。旁治奔豚頭痛。發熱惡風。汗出身痛等症。茲考徵如下。①桂枝加桂湯證曰。氣自少腹上衝心。(以上一方桂枝五兩) ②桂枝甘草湯證曰。其人又手自冒心。心下悸。欲得按。③桂枝甘草附子湯證。(此方於桂枝甘草湯而加附子。桂枝甘草湯條有上衝證。然此湯亦當有上衝證) ④苓桂甘棗湯證曰。欲奔豚。⑤苓桂五味甘草湯證曰。氣從少腹下衝胸咽。桂枝附子湯證。桂枝附子湯用桂枝多於桂枝。

加附子湯。而無上衝證。蓋關文也。桂枝加附子湯條。猶有桂枝之證。況於此湯。而可無桂枝之證乎。(以上五方。桂枝皆四兩) ⑥桂枝湯證曰。上衝又曰。頭痛發熱。汗出惡風。⑦苓桂朮甘湯證曰。氣上衝胸。(以上二方。桂枝皆三兩) 歷觀此諸方。桂枝主治衝逆也明矣。頭痛發熱之證。其所旁治也。仲景之治疾。用桂枝者。居十之七八。今不枚舉焉。

歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論桂枝曰。去冷風疼痛。【金】張元素珍珠囊論桂枝曰。去傷風頭痛。開腠理。解表發汗。去皮膚風溼。【元】李東垣用藥法象論桂枝曰。橫行手臂。以其爲枝也。氣薄則發洩。故桂枝上行而解表。氣厚則發熱。故肉桂下行而補腎也。【清】楊時泰本草述鈞元論桂枝曰。桂枝性輕揚。能行上焦。頭目通手。臂肢節調營血和肌表。除傷風頭痛。肢節痛風。去皮膚風溼。散下焦蓄血。直行爲奔豚之先導。(奔豚爲腎氣腎氣出膀胱) 橫行爲手臂之引經。世醫不悟桂枝實表

之義。幾以此味爲能補衛而密腠理。若然何以不用參芪耶。夫四時之風。因於四時之氣。冬月寒風。衛爲所併。不能爲營氣之固。而與之。和故汗出。惟桂枝辛甘能散肌表寒風。又通血脈。故合於白芍。由衛之固以達營。使其相和而肌解汗止。又能去下焦蓄血。上焦蓄血多。因熱氣上逆。血不循經所致。非若下焦蓄血。則是寒氣冰凝。血不流行而蓄也。故散以桂枝辛熱之氣。仲景桃仁承氣湯中用之。【清】鄒澐本經疏證論桂枝曰。(上略) 蓋其用之道。有六曰和營。曰通陽。曰利水。曰下氣。曰行瘀。曰補中。其功之最大。施之最廣。無如桂枝湯。則和營其首功也。夫風傷於外。壅遏衛氣。衛中之陽。與奔逆相逐。不得不就近。凡營氣爲助。是以營氣弱。衛氣強。當此之時。又安能不調和營氣。使散陽氣之鬱。遏通邪氣之相併耶。【清】黃宮繡本草求真論桂枝曰。桂枝係肉桂枝梢。其體輕。其味辛。其色赤。有升無降。故能入肺而利氣。入膀胱化氣而利水。且能橫行於臂。調和營衛。治痛風

脇風。止煩出汗。驅風散邪。爲解肌第一要藥。故書皆言無汗能發。有汗能收。然其汗之能發。止是因其衛實營虛。陰被陽濫。故用桂枝以調其營。營調則衛氣自和。而風邪莫容。遂自汗而解。非若麻黃能開腠理。以發其汗也。其汗之能收。止因衛受風傷。不能內護於營。營氣虛弱。津液不固。故有汗發熱而惡風。其用桂枝湯爲治。取其內有芍藥入營。以收陰。外有桂枝入衛。以除邪。則汗自克見止。非云桂枝能閉其汗孔。味者不察。謂桂枝發汗止汗。是何意哉。徒以順口虛喝。其失遠矣。【清】葉天士本草經解論桂枝曰。桂氣溫。稟天春和之木氣。入足厥陰肝經。味辛無毒。得地西方潤澤之金味。入手太陰肺經。氣味俱升。陽也。肺爲金臟。形寒飲冷。則傷肺。肺傷則氣不下。降而病上氣欬逆。桂枝性溫。溫肺肺濕。則氣下降。而欬逆止矣。結氣喉痺。吐吸者。痺者。閉也。氣結於喉。閉而不通。但吐而不能吸也。桂辛溫。散結行氣。則結者散。而閉者通。不吐而能吸也。辛則能潤。溫則筋脈和而關

藥用。

主治 辟寒邪。止心痛。胃痛。研細酒下。

【桂心】即肉桂之處方用名。詳『肉桂』條。

【桂耳】 命名 本品係多年老桂樹上蒸出之蠟色紅狀如木耳。故名。

主治 一切血症。

【桂府滑石】即滑石產於山東蓬萊縣境之桂府村者。典見綱目。詳『滑石』條。

【桂林滑石】即滑石產於廣西蒼梧府境者。典見綱目。詳『滑石』條。

【桂枝】 處方用名 川桂枝。臨桂枝。蜜炙桂枝。

古籍別名 杜桂枝。(本經)

外國名詞 Cortex Cinnamomi (拉丁)

基本 桂枝屬於樟科之桂。其新幹及枝之外皮剝下陰乾。即桂枝也。

產地 陳仁山藥物生產辨云。桂枝產廣東肇慶。六屬羅定等處。酒輪出者為最幼。世界產額。以我

國之廣西四川及東印度安南諸地為最夥。

形態 桂為常綠喬木。自生於中國之南部及交趾。其他熱帶地方。則栽植之。樹幹高大。作灰色。外皮多而易剝。所謂桂皮是也。其皮香味甚烈。嫩枝作受壓狀。具有四稜。其莖柄與花穗之分枝。色均灰白。或帶黃。覆以軟毛。葉如皮革。作長卵圓形。有尖端。多係互生。至枝端則對生。長八仙米至十至八仙米。廣二仙米至六仙米。葉皆有柄。長八密米。生有脈紋三條。面色綠。有光澤。其網絡俱凹陷。背帶褐綠色。有極短之軟毛。香氣亦甚。花穗直立如軸。其末端之華穗。約有三朵。花苞頗小。僅四密米。色帶黃白。覆以絹毛。其底部形如圓板。為卵圓形之片。雄蕊附著於花苞之喉口。其數不定。多作三四螺旋線。在內者為有生殖性之粉囊。粉囊分四房。疊積為兩層。其生殖性雄蕊具有柄梗。或坐立。雌蕊較細。柱頭亦如圓板。果瓣在截片底部之邊緣。有雙裂六條。實為漿果。被以薄皮。照最近考驗所得。謂桂枝外

面現紅褐色之薄皮。闊五分許。質堅。作螺旋形。或兩邊向內卷縮。甚至卷轉如管。表面稍粗。有白色縱紋。皆隱隱隆起。裏面現褐色。亦不平滑。破折之處。幾盡平坦。不作纖維狀。味芳香異常。辛味峻烈。桂皮乃剝取桂樹莖幹之皮。曬乾而成。厚自一密米至三密米。外面灰褐色。或褐色。以顯微鏡檢視。其橫斷面則見其柔軟組織多含澱粉粒。其內面之石核細胞環層。在在中斷。外伴纖維束。而石核細胞之膜壁。其厚薄又每個不同。大都在內者厚。在外者薄。再觀皮部。則處處有厚膜纖維。此纖維長皆〇・七密米。粗〇・〇一五・至〇・〇三密米。並見有油細胞及黏液細胞。體線極為二細胞列。含有澱粉粒及細微之葑酸鹽結晶。皆為細長菱形。

種植 此樹不種苗。乃植其小樹。移種山腹。先灌糞水。後再堆肥。約經五六年。發育最為旺盛。十年後始可採取其皮。

採取 每年於二月八月時間。掘取其根。浸於水中。蕞束洗淨其泥。儲木作槌。擊樹幹。令可剝取外皮。以鑊刀切尺許長。凡剝取桂皮一片。即以竹片張於內面。攤蘆蓆上。置日中晒二三日。俟乾。則成暗褐單卷之根皮。長廣不等。梢枝則先去葉。亦斷為尺許。剝取外皮。即桂枝也。

製法 或以蜜炙。或以清炙。及白芍并煎。

性質 甘。微溫。無毒。

成分 中含揮發桂油(桂皮油)一・〇至一・五%。餘則為樹脂。護黏液質。糖質。單寧酸等。

桂皮油 (Oleum Cinnamomi) 有桂皮固有之芳香。質澄明而稍濃稠。色帶黃。或黃褐。性善揮發。起酸性之反應。比重一・〇四至一・〇七。味如燒灼酒精。伊打哥囉仿姆。冰醋酸等能溶解之。其中含有桂亞爾台希度 $(C_6H_5=CH=CH=COH)$ 亞爾台 (C_6H_5) 及桂皮酸等。

效能 發汗解肌。溫經通絡。用為治衝逆之要藥。

作用 桂枝之醫治作用。以桂枝有發汗解熱及止汗作用。鎮靜

養劑。

主治 益氣。厚腸胃。補胃氣。令人耐飢。

歷代記述攷證 【唐】孫思邈

千金翼論栗子曰。生食治腰腳不遂。【唐】蘇恭新修本草論栗子曰。療筋骨斷碎。腫痛瘀血。生嚼塗之有效。【清】黃宮繡本草求真論栗子曰。栗腎之藥也。味鹹性溫。體重而實。故能入腎補氣。凡人胃氣虧損。而見腰脚軟弱。並胃氣不充。而見腸鳴泄瀉。服此治無不效。然須風乾。連液吞咽爲佳。作粉爲食。勝於羹炙。若使栗不風乾。或生水氣未除。食則助溼發氣。生蟲。煮炒熱食。則壅氣滯腸。而於風水之人尤忌。小兒多食。令齒不生。【清】王士雄隨息居飲食譜論栗子曰。栗甘平補腎。益氣厚腸。止瀉耐飢。最利腰脚。解羊肉毒。辟穀濟荒。生熟皆佳。點有竝嬾。未時嚼之作桂花香。老者風乾則甜而嬾。同橄欖食風味尤美。以錢塘產者良。凡食均須細嚼。連液吞嚥則有益。若頓食至飽。反壅氣傷脾。其外感未去。痞滿疳積。癰疽癰癰。產後小兒病人。

十畫 栗

不飢便秘者竝忌之。以生極難化。熱最滯氣也。【清】黃元御玉楸葉解論栗子曰。栗子鹹甘入脾。補中助氣。充虛益饒。培土實脾。諸物莫達。但多食則氣滯難消。少嗽則氣達。易起耳。生食治腰腿不遂。生嚼塗筋骨斷碎。又消腫痛。行瘀血。破痼癖。去惡刺。出箭頭。止鼻淵。斂泄利。風乾者佳。

配合應用 ●治小兒疳瘡。用生嚼栗子傳之。亦治葦刺入肉。（外臺祕要方）

●治馬汗入肉成瘡者。方同上。（勝金方）

●治馬咬成瘡。獨顆栗子燒研傳之。亦治熊虎爪傷。（醫說方）

●治小兒口瘡。大栗煮熟。日日與食之。甚效。（普濟方）

●治衄血不止。宜州大栗七枚刺破。連皮燒存性。用火毒入麝香少許。研勻。每服二錢。溫水下。（聖濟總錄方）

●治金刃斧傷。用獨殼大栗研傳。或倉卒嚼傳亦可。（集簡方）

●施用宜忌 凡脾虛消化不足。及溼熱困中者禁用。

參攷資料 ●相傳有人患腰脚弱。往栗樹下食數升。便能起行。此是補腎之義。然應生嗽。若服餌則宜蒸爛之。陶弘景。●栗於五果屬水。水澤之年。則栗不熟。類相應也。有人內寒。暴洩如注。令食煨栗二三十枚。頓愈。腎主大便。栗能通腎。於此可驗。經驗方治腎虛腰脚無力。以袋盛生栗。懸乾。每旦喫十餘顆。次喫猪腎粥。助之。久必強健。蓋風乾之栗。勝於日曝。而火煨油炒。勝於煮蒸。仍須細嚼。連液吞嚥。則有益。若頓食。至飽。反致傷脾矣。按蘇子由詩云。老去自添腰脚病。山翁服栗舊傳方。客來爲說晨興晚。三咽徐收白玉漿。此得食栗之訣也。王禎農書云。史記載秦飢。應侯請發五苑粟。則本草栗厚腸胃。補腎氣。令人耐飢之說。殆非虛語矣。（李時珍）●吳栗雖大。味短。不如北栗。凡栗日中曬乾。食即下氣。補益。不爾。猶有木氣。不補益也。火煨去汗。亦殺水氣。生食則發氣。煮蒸炒熟。食則壅氣。凡患風水人。不宜食。味鹹。生水也。（孟詵）●小兒不可多食。生則難化。熟則滯。

氣。膈食生蟲。往往致病。（寇宗奭）●今會稽諸暨栗。形大皮厚。不美。刻及始豐。栗皮薄而甜。乃佳。（陶弘景）●栗處處有之。而兗州。宜州者最勝。木高二三丈。葉極類櫟。四月開花。青黃色。長條似胡桃。花實有房。葉大者若拳。中子三四小者若桃李。中子惟一。將熟則罅拆子出。栗類亦多。按陸機詩。疏云。栗五方皆有之。周秦吳揚特饒。惟潁陽及范陽栗。甜美味長。他方者不及也。倭韓國諸島上。栗大如雞子。味短不美。桂陽有莘栗。叢生。實大如杏仁。皮子形色與栗無異。但較小耳。又有與栗皆與栗同。子圓而細。惟江湖有之。或云即莘也。莘音榛。詩云。樹之榛栗是矣。（蘇頌）●板栗雖栗。二樹皆大。茅栗似板栗。而細如榛子。其樹雖小。葉亦不殊。但春生夏花。秋實。冬枯。爲異耳。（蘇恭）●湖北一種旋栗。頂圓末尖。即樣栗。象榛子形也。栗欲乾收。莫如曝之。欲生收。莫如潤沙藏之。至夏初。尙如新也。（寇宗奭）●栗但可種成。不可移栽。按事類彙編云。栗木高二三丈。苞生多刺。如蝟。

內服不可不注意。又爲含漱藥。能固齒。於矢荷見陪苦。口中諸病。用之有驗。於慢性痔疾。黏液漏洩。及其他慢性咽喉炎及帶下等之局所用之。然現今能用者甚稀。又荷蘭藥鏡曰。拳參多採於山野間。藥肆呼爲金線重纜。但陳久者不堪入藥。根之性質功效。與黨爾縣室拉同。爲最有效之收瀉藥。凡諸管纖維因虛弱而弛緩之病。如久瀉。失血。稀液脫泄。各症俱治之。尿道滑液膜剝脫而小便淋痛及經久無毒之淋病。白帶下。亦治之。患間歇熱。腐敗熱。以此藥加對症之劑。夙稱奇效。散劑用一錢至三錢。或加煎劑。或加苦味之越幾斯劑。製爲丸藥。或徑用越幾斯劑。均各從其便。煎劑。取根一兩。水煎。取用以此根外敷。善治咽喉潰瘍。作含漱藥。功效卓著。

用量 七分至二錢。

參攷資料 生淄州田野。葉如羊蹄。根似海蝦。黑色。土人五月採之。(蘇頌)

【拳參】即紫參之古籍別名。典見和漢藥考。詳「紫參」條。

【拳黃雞子】 古籍別名 水蘿葡。(綱目拾遺)

基本 拳黃雞子爲雜草類之一種。可供藥用。

主治 霍亂吐瀉並瘧疾。嚼碎水飲下。

【振靈香】即返魂香之古籍別名。典見海藥本草。詳「返魂香」條。

【挾火】即螢火之古籍別名。典見吳普本草。詳「螢火」條。

【挾劍豆】即刀豆之古籍別名。典見綱目。詳「刀豆」條。

【致神】即桑螵蛸之古籍別名。典見別錄。詳「桑螵蛸」條。

【勞巨芋】即芋子之古籍別名。典見綱目。詳「芋子」條。

【勞其】即烏藥之古籍別名。典見本草拾遺。詳「烏藥」條。

【旁通】即刺蒺藜之古籍別名。典見本經。詳「刺蒺藜」條。

【旂那】即番鴻葉之原名。詳「番鴻葉」條。

【旂檀】即檀香之古籍別名。典見綱目。詳「檀香」條。

【旂檀娜】即檀香之古籍別名。典見和漢藥考。詳「檀香」條。

見和漢藥考。詳「檀香」條。

【晉攀】即明礬之別名。詳「明礬」條。

【晏青】即斑蝥之古籍別名。典見和漢藥考。詳「斑蝥」條。

【書梁】即蝸牛之古籍別名。典見和漢藥考。詳「蝸牛」條。

【枸核】 基本 枸爲雜木類之一種。其核可供藥用。

採取 五月採之。

性質 苦。

主治 療水。身面癰腫。

【栗】 命名 栗字說文作𣎵。從肉音條。象其花實下垂之狀。故名。

處方用名 栗實。栗子。

古籍別名 篤迦。(梵書)板栗。錐栗。茅栗。山栗。辛栗。桐栗。石栗。(綱目)芋栗(莊子)

外國名詞 Castanea vul. Gaeta. I am var. japonica, DC. (拉丁)

基本 係殼斗科栗屬。爲栗之果實。

產地 各省之山野間咸有出。形體 栗爲落葉喬木。高四五丈。大者七八丈。葉作披針形。有鋸齒。互生。與櫟之葉相酷似。夏日開花。花小。單性。雌花與雄花同株。雄花作長穗狀。花序。雌花常三花集生。包以總苞。果實爲堅果。有二三枚在囊之殼斗內。其殼斗全面帶刺。成熟後則殼裂散出果實。其狀大小因種類而不一。



栗

種類 栗之最大者爲板栗。栗之中心扁子者爲櫟栗。栗之稍大者爲山栗。山栗之圓而未尖者爲錐栗。栗之圓小如橡子者爲華栗。栗之小如指頂者爲茅栗。即桐栗。栗之出於嶺南山中者。一年方熟。圓如彈而皮厚。味如胡桃爲石栗。

採取 八九月採之。風乾用。

用法 風乾者味甘。可生啖。或煮熟供食。或生杵燉研和藥。

性質 鹹溫。無毒。

效能 補腎氣。厚腸胃。用作滋。

樹如李而小。其實青色。無核。乃無核李也。其實可供藥用。

採取 實熟時採之。

主治 益氣。輕身延年。

〔徐長卿〕 命名 徐長卿者。人名也。彼常以此藥治邪病。遂以名之。

古籍別名 鬼督郵。(本經)石下徐長卿。別錄)別仙蹤。(圖經)鈴柴胡。(日本)

外國名詞 Pyenostelma chinensis, Bge (拉丁) クズサ

イユ(日本) 基本 係羅藤科徐長卿屬之根。

產地 在山谷川澤溼地。

形態 徐長卿爲山草類之自生林野草。本莖高二三尺。細而剛。葉對生。作線狀披針形。無鋸齒。夏

月自梢端及葉腋抽枝開花。花形甚小。淡黃綠色。副冠爲五鱗片所成。著於雄蕊之上。藥之各室有一花粉塊。下垂。花後結子。其根橫生如細辛。微粗。長。色黃而有腥氣。可供藥用。

採取 三四月間採之。

製法 雷斂曰。凡採得粗杵。并少蜜令遍。以磁器盛。蒸三伏時。日乾用。

性質 辛。溫。無毒。

主治 鬼物百精。蠱毒。疫疾。邪惡氣。溫瘧。久服。強悍。輕身。(本經)

益氣延年。又曰。石下長卿。主鬼注精物。邪惡氣。殺百精。蠱毒。老魅。注易亡。走啼哭。悲傷恍惚。(別錄)

參攷資料 ①抱朴子言。上古辟瘟疫。有徐長卿散。良效。今人不知用此。(李時珍) ②鬼督郵之名甚多。今俗用徐長卿者。其根正如細辛。小短扁扁。爾氣亦相似。今狗脊散用鬼督郵者。取其強悍。宜腰腳。故知是徐長卿。而非鬼箭赤箭也。(陶弘景) ③徐長卿生泰山山谷及隴西。三月採。又曰。石下長卿生隴西山谷池澤。亦三月採。(別錄) ④所在川澤。多有之。葉似柳。兩葉相當。有光澤。根如細辛。微粗。長。黃色。而有腥氣。今俗以代鬼督郵。非也。(蘇恭) ⑤生下澤川澤之間。苗似小桑。兩葉相對。三月苗青。七八月着子。似羅藤子而小。九月苗黃。十月凋。八月採根。日乾。(韓

保昇) ⑥鬼督郵及己之亂。杜衡其功不同。苗亦不同也。徐長卿之亂。鬼督郵。其苗不同。其功同也。杜衡之亂。細辛。則根苗功用皆彷彿。乃彌近而大亂也。不可不審。(李時珍)

【徐黃】

產地 生水澤中。形態 徐黃爲芳草類之一種。莖大葉細。香如薔本。其莖可供藥用。

性質 辛。平。無毒。

主治 心腹積癥。治惡瘡。

【徑松】 即羅漢松之古籍別名。典見綱目拾遺。詳「羅漢松」條。

【息王藤】

產地 生山谷間。形態 息王藤爲蔓草類之一種。四時常青。凌冬不凋。可供藥用。

性質 苦。溫。無毒。

主治 產後腹痛。惡露不盡。濃煮汁服。

【拳參】

基本 屬參科。爲金線重纒之地下莖。產地 凡山野陰溼之地恒多。

生焉。

形態 拳參爲多年生草本。莖高二尺。葉作廣披針形。下部之葉。概有長柄。夏月梢上開小花。六瓣。色淡紅或白。簇生爲穗狀花序。葉與莖之嫩者。堪作食品。其地下莖。即謂之拳參。色黑褐。長七分至二寸。肥大而扁平。粗如小指。下面梢稍凸隆。副根如鬚。或留癥痕。上面凹陷。有溝一條。隨葉痕而生橫溝。一端彎曲狀如海蝦。味有收斂性。



採取 五月採之。

成分 含有一種鞣酸。餘則澱粉等質也。

效能 專作收斂藥。

主治 爲末。淋瀝腫氣。

國外學說 日本學說謂拳參者。生於中國。日本之高山。爲肥大之地下莖也。其形狀如海蝦。成分爲單寧酸。澱粉等。有收斂之效。但

生紅花亦點蕊尾亦人間所種苗低下於射干狀如蕊尾夏生紫碧花者是也（陳藏器）射干根潤形似高良薑大小赤黃色淡硬五六七八月採（大明）今在處有之人家種之春生苗高一二尺葉大類蠶疊而狹長橫疎棘如翅羽狀故名烏翬葉中抽莖似萱草莖而強硬六月開花黃紅色瓣上有細文秋結實作房中子黑色一說射干多生山崖之間其莖雖細小亦類木故荀子云西方有木名曰射干莖長四寸生於高山之上是也（蘇頌）射干即今扁竹也今人所種多是紫花者呼爲紫蝴蝶其花三四月開六出大如萱花結房大如拇指頗似泡桐子一房四隔一隔十餘子子大如胡椒而色紫極硬咬之不破七月始枯陶弘景謂射干蕊尾是一種蘇恭陳藏器謂紫碧花者是蕊尾紅花者是射干韓保昇謂黃花者是射干蘇頌謂花紅黃者是射干白花者亦其類朱巖亭謂紫花者是射干紅花者非各執一說何以憑依謹按張揖廣雅云蕊尾射干也易通卦

驗云冬至射干生土窟眞君本草云射干卽扁竹葉扁生如側手掌形莖亦如之青綠色一種紫花一種黃花一種碧花多生江南湖廣川浙平陸間八月取汁煮雄黃伏雌黃制丹砂能拒火據此則鸛尾射干本是一類但花色不同正如牡丹芍藥與菊花之類其色各異皆是同屬也大抵入藥功不相遠(李時珍)④射干之名有三佛經射干貂獫此是惡獸似青黃狗人能緣木阮公云射干臨層城者是樹殊有高大者本草射干是草卽今人所種者也(陳藏器)

【射父香】卽麝香之古籍別名典見爾雅詳「麝香」條

【射父香】卽麝香之古籍別名典見爾雅詳『麝香』條。

【射罔】 性質 苦。有大毒。
主治 尸注癥堅及頭

本草拾遺論射罔曰：瘰癧瘡根結
核，癰癰毒腫，及蛇咬，先取塗肉四
畔，漸漸近瘡，習習逐病，至骨瘡有
熱膿及黃水塗之，若無膿水有生
血及新傷破，即不可塗，立殺人。

歷代記述攷證

〔唐〕陳藏器

參攷資料

①人中射罔毒以

甘草、藍汁、小豆、葉浮萍、冷水、薺、烏頭、附子、射罔、乃至毒之藥。非若川烏、頭、附子、人所栽種，加以釀制，殺其毒性之比。自非風、頑、急、疾，不可輕投。甄權藥性論言其益陽事。治男子腎氣衰弱者，未可遽然也。此類止能搜風、勝濕、開頑痰、治頑瘡，以毒攻毒而已。豈有川烏、頭、附子、補右腎、命門之功哉？吾蘇郡知府，自負知醫，因病、癰、服草烏、頭、木鱉子、藥過多，甫入腹而麻痺，遂至不救。可不慎乎？權曰：烏喙形如鳥嘴，其氣鋒銳，宜其通經絡、利關節、尋蹊達徑，而直抵病所，煎為射罔，能殺禽獸，非氣之鋒銳捷利，能如是乎？楊清叟曰：凡風寒溼痺、骨內冷痛、及損傷入骨、年久發痛，或一切陰疽、腫毒，並宜草烏、頭、兩星等分，少加肉桂為末，薑汁、熱酒調塗，未破者能內消，久潰者能去黑爛。二藥性味辛烈，能破惡塊，逐寒熱，遇冷即消，遇熱即潰。李時珍。

【射罔】即草烏頭煎汁之別名。典見本草拾遺。詳「草烏頭」條。

【射香】即麝香。詳「麝香」條。

【射罔】卽草烏頭煎汁之別名典見本草拾遺。詳『草烏頭』條。

【射香】卽麝香。詳『麝香』條。

【射香】卽麝香詳「麝香」條

【射香菜】卽前胡之古籍別名。典見和漢藥考。詳『前胡』條。

【射影】卽溪鬼蟲之古籍別名。典見陸璣詩疏。詳『溪鬼蟲』條。

【峭粉】卽輕粉之古籍別名。典見日華諸家本草。詳「輕粉」條。

【峯子油】卽駱駝脂之古籍別名。典見綱目。詳『駱駝脂』條。

【峯真王】卽白朮之處方用名詳『白朮』條。

【師系】 古籍別名 臣堯巨骨
鬼芭（別錄）

基本 師系爲雜草類之一種。可供藥用。

探取 生。平澤中。
八月採。

性質 甘。無毒。

主治 癰腫惡瘡。煮洗之。

【師姑草】卽王瓜之古籍別名。典見土宿本草。詳『王瓜』條。

【席草】卽燈心草之古籍別名。典見和漢藥考。詳『燈心草』條。

【徐李】 古籍別名 無核李。
本草綱目

產地 生山之陰。
形態 徐李爲雜木類之一種。

之所胎血之所聚。痰之所積。又皆因火結聚而成。射干苦能降火。寒能勝熱。兼因味辛上散。俾火降熱除。而血與痰與毒無不困之而平矣。是以喉痺咽痛結核疳瘻便癰癰母等症。因於老血結於心脾。痰涎積於大陰厥陰者。無不可以調治。如金匱之治欬氣之用射干。麻黃治瘧母。紫甲煎丸用烏扇燒過千金之治喉痺用烏骨膏。治便毒之用射干。同生薑煎服。皆取性善主降。功多於上服則必瀉之意。若脾胃虛寒切忌。泔浸煮熟炒用。

近人學說 張山雷曰。本經謂不得消息。當作不得息。言其喘逆氣急。不得呼吸之常度也。古醫書言喘逆不得息甚多。本草經此條。作不得消息。義不可解。恐係衍文。雖舊本皆有消字。甚覺無謂。又曰射干苦降。而能開泄頑痰瘀血。散結定逆。其功頗多。故別錄謂為微溫。石頑加以辛字。然熱痰寒飲喘逆上氣。皆能治之。則皆以苦降為主。固不必待其為溫。且射干之主治。雖似不一。實則降逆開痰。破結泄熱二語。足以概之。所以韓保昇

十畫 射

謂之微寒。而潮湖景岳又徑以為寒。究之下氣通滯。亦不係乎寒涼。本經苦平。最足至當不易。其所列之主治。則開泄定逆而已。至名醫別錄。則增益破瘀一層。其主咳唾言語氣臭。亦肺胃蘊熱之病也。甄權稱其消痰血。通婦女月閉。日華謂其消痰破瘀結疔癰。胸膈滿腹脹。張潔古謂其去胃中癰瘡。丹溪謂其利積痰疔毒。消結核。潮湖稱其降實火。利大腸。治瘧母。陶弘景謂苦酒磨塗。可消腫毒。石頑謂散結降氣。為咽喉腫痛要藥。能降相火。火息則血散腫消。而痰結自解。實而言之。開通泄降四字盡之矣。

配合應用 ①入鼈甲煎丸。治瘧母。

②治咽喉腫痛。用生射干、豬脂各四兩。合煎令焦。去滓。每嚥藥許即瘳。(袖珍方)

③治喉痺不通。用扁竹新根。搗汁。嚥之大腸動即解。或醋研汁。嚥引涎出亦妙。(醫方大成方)

④治喉痺不通。用紫蝴蝶根一錢。黃半生甘草。桔梗各五分。為末。水調頓服。立愈。名奪命散。(便民

方)

⑤治乳癰初腫。用扁竹根如僵蠶者。同壹草根為末。蜜調敷之神效。(永類鈴方)

⑥治喉痺有烏鬚膏。(孫真人千金方)

⑦治咽喉腫痛。射干花根、山豆根陰乾為末。吹之如神。(袖珍方)

⑧治傷寒咽閉腫痛。用生射干、豬脂各四兩。合煎令膏。去滓。每嚥藥許。即瘳。(扁鵲常傷寒論方)

⑨治二便不通。諸藥不效。紫花扁竹根生水邊者。佳。研汁一盞。服即通。(普濟方)

⑩治水蠱腹大。動搖水聲。皮膚黑。用鬼扇根搗汁。服一盃水即下。(肘後方)

⑪治陰疳腫刺。發時腫痛如刺。用生射干搗汁。與服。取利亦可丸服。(肘後方)

⑫治中射工毒生瘡者。烏鬚、升麻各二兩。水三升。煎二升。溫服。以滓傳瘡上。(姚僧坦集驗方)

用量 八分至錢半。

施用宜忌 凡虛而無實火者。禁用。

著名方劑 射干麻黃湯。治欬而上氣。喉中作水鷄聲。此湯主之。(金匱方) 射干十三枚。一法三兩。麻黃、生薑各四兩。紫苑、款冬花各三兩。五味子半升。細辛三兩。半夏八枚。一法半升。大棗七枚。上九味以水一斗二升。先煮麻黃。黃沸。去上沫。納諸藥。煮取三升。分溫三服。

參攷資料 ①治便毒。此足厥陰濕氣。因疲勞而發。取射干三寸。與生薑同煎。食前服。利三兩行。甚效。朱震亨云。射干能降火。故古方治喉痺咽痛為要藥。孫真人千金方治喉痺有烏鬚膏。張仲景金匱玉函方治欬而上氣。喉中作水鷄聲。有射干麻黃湯。又治瘧母。鼈甲煎丸亦用烏扇燒過。皆取其降厥陰相火也。火降則血散腫消。而痰結自解。癰瘡自除矣。(李時珍)

②其葉叢生。橫鋪一面。如鳥翅及扇之狀。故有烏扇、烏鬚、鳳翼、鬼扇、仙人掌諸名。俗呼扁竹。謂其葉扁生而根如竹也。根葉又如蠶蠶。故曰草蠶。(李時珍) ③射干、露尾二物相似。人多不分。射干即人間所稱為花草名鳳翼者。葉如鳥翅。秋

【家商陳】卽茵陳蒿之古籍別名。典見和漢藥考。詳「茵陳蒿」條。

【家菊】卽茶菊之古籍別名。典見羣芳譜。詳「茶菊」條。

【家雁】卽鵝之古籍別名。典見綱目。詳「鵝」條。

【家鄉肉】卽嘉香肉之別名。典見綱目拾遺。詳「嘉香肉」條。

【家兔】卽鴨之古籍別名。典見綱目。詳「鴨」條。

【家菱】卽菱之古籍別名。典見綱目。詳「菱」條。

【家豬脂】卽豬脂之古籍別名。典見和漢藥考。詳「豬脂」條。

【家貓】卽貓之古籍別名。典見綱目。詳「貓」條。

【家孽】卽草豆蔻之古籍別名。典見和漢藥考。詳「草豆蔻」條。

【家蘇子】卽紫蘇子之處方用名。詳「紫蘇子」條。

【射工】卽溪鬼蟲之古籍別名。典見本草拾遺。詳「溪鬼蟲」條。

【射干】 命名 本品莖梗疎長。正如射之長竿之形狀。

故名。

古醫別名 烏扇。烏蒲。本經。

烏鬚。烏吹。紫蝴蝶。俗名。草薺。

（別錄）鳳翼。拾遺。鬼扇。仙人掌。

紫金牛。土宿。野萱花。扁竹。網目。黃遠。吳普。玉燕。夜干。蔚。

千。蔚乾。地扁竹。秋蝴蝶。扁筑。鬼前。

（和漢藥考）白花射干。本本草集註。

外國名詞 Pardonius sin.

（拉丁）

基本 屬鳶尾科。爲射干之根。

產地 陳仁山藥物生產辨云。

射干原產浙江。



射干

形態 射干爲多年自生之草。

本其花堪供賞玩。然實係毒草。莖

高約二三尺。葉似菖蒲。宛如廣闊

之劍。而葉端極尖銳。葉脈平行。各

葉兩行密排。狀若展大之葵扇。夏

月葉間忽抽一莖。更分數枝。頂端

開六瓣大片之花。色帶黃紅。被有

深紫色之斑點。實爲橢圓形之蒴果。後乃脹裂而散出黑色之種子。

根似良薑而瘠。其內色白。外則黃

白。叢生鬚根。味辛。

種類 莖梗疎長。狀如射之長

者。射干也。莖短葉側相比而如扇

者。烏扇也。

採取 二三月或八九月間採

根。去皮。日乾。

製法 雷斅曰。凡使射干。採根。

先以米泔水浸一宿。漉出。然後以

蜜竹葉煮之。從午至亥。日乾。用。

性質 苦。平。有毒。

效能 瀉火。解毒。散血。消痰。用

治咽喉腫痛及水腫吐酸藥。

主治 欬逆上氣。喉痺咽痛。不

得消息。散結氣。腹中邪逆。食飲大

熱。本經。療老血在心脾間。欬唾

言語氣臭。散胸中熱氣。別錄。

歷代記述攷證 【南北朝】陶

弘景本草集註論射干曰。苦酒摩

塗毒腫。唐甄權藥性本草論射

干曰。治疰氣。消瘀血。通女人月閉。

【宋】大明日華諸家本草論射干

曰。消痰破癥結。胸膈滿腹脹。氣喘

痰癖。開胃下食。鎮肝明目。【宋】寇

射干曰。去胃中癰瘡。【元】朱震亨

本草衍義補遺論射干曰。利積痰

癰毒。消結核。【明】李時珍本草綱

目論射干曰。降實火。利大腸。治癰

母。【明】櫻希雅本草經疏論射干

曰。射干辛而有毒。故本經謂其味

苦。平。有毒。平。亦辛也。別錄微溫。保

昇微寒。二說一義。並無異云。潔古

云。味苦。入手少陽少陰厥陰經。若

能下洩。故善降。兼辛。故善散。故主

欬逆。上氣。喉痺。咽痛。不得消息。散

結氣。胸中邪逆。既降且散。益以微

寒。故主食飲大熱。別錄又主老血

在心脾間。欬唾。言語氣臭。散胸中

熱氣。甄權主注氣。消瘀血。上。女人

月閉。日華子主消痰。破癥結。胸膈

滿。腹脹氣喘。痰癖。寇宗奭主肺氣

喉痺。爲佳。潔古主胃中癰瘡。皆此

意也。丹溪主行太陰厥陰之積痰。

使結核自消。甚捷。又治足厥陰溼

氣下流。因疲勞而發。爲便毒。悉取

其洩熱散結之力耳。故古方治喉

痺咽痛爲要藥。【清】黃宮繡本草

求真論射干曰。射干形如烏羽扇。又以烏羽扇爲名。辛苦微寒。書載瀉火解毒。散血消痰。然究毒

藥方

●治赤白帶下。夏枯草花開時採。陰乾爲末。每服二錢。米飲下。食前服。(徐氏家傳方)

●治血崩不止。夏枯草爲末。每服方寸匕。米飲調下。(聖惠方)

●治產後血暈。心氣欲絕者。夏枯草搗絞汁服一盞大妙。(徐氏家傳方)

●治撲傷金瘡。夏枯草口嚼爛。罨上即愈。(衛生易簡方)

●治汗斑白點。夏枯草煎濃汁。日日洗之。(乾坤生意方)

●治癰癰馬刀。不問已潰未潰。或日久成漏。用夏枯草六兩。水二鍾。煎七分。食遠溫服。虛甚者則煎汁熬膏服。并塗患處。兼以十全大補湯加香附貝母。遠志尤善。此物生血乃治癰癰之聖藥也。其草易得其功甚多。(薛己外科經驗方)

用錢 錢半至三錢

施用宜忌 凡陰虛胃弱而無鬱結者。禁用土瓜爲之使。

參攷資料 ●本草言夏枯草

大治癰癰。散結氣。有補養厥陰血脉之功。而不言及觀其退寒熱虛

者可使。若實者以行散之。藥佐之外以艾葉灸。亦漸取效。(朱震亨)

●黎居士易簡方。夏枯草治目疾。用沙糖水浸一夜。取其能解內熱。緩肝火。樓全善云。夏枯草治目珠疼。至夜甚者神效。或用苦寒藥點之。反甚者。亦神效。蓋目珠連目本屬厥陰之經。夜甚及點苦寒藥反甚者。夜與寒亦陰故也。夏枯草純陽之氣。補厥陰血脈。故治此如神。以陽治陰也。(李珍時)

十畫 夏 奚 娑 宮 害 宵 家

者。夜與寒皆陰也。此物冬至生。夏至枯。氣裏純陽。補肝血。故治此如神。以陽治陰也。豈非以此物爲溫熱乎。不知其方乃以香附甘草爲佐。夏枯草雖微寒。而有香附之辛溫佐之。亦不同沈寒之品矣。又何疑夏枯草之微寒耶。按此草不獨能治目痛。更能消乳癰。蓋凡熱鬱肝經等症。治無不效。要藉其解散之力耳。又丹溪曰。此草大有補養厥陰血脈之功。殆能散而又能補者歟。(虞鵬飛)

●生平澤。冬至後生葉。似旋覆。三月四月開花。作穗紫白色。似丹參花。結子亦作穗。五月便枯。四月採之。(蘇恭)

●原野間甚多。苗高一二尺許。其莖微方。葉對節生。似旋覆葉而長。大有細齒。背白多。故莖端作穗。長一二寸。穗中開淡紫小花一穗。有細子四粒。丹溪云。無子。亦失察矣。嫩苗淪過。浸去苦味。油鹽拌之可食。(李時珍)

●本經專治寒熱癰癰。以辛能散結。苦能除熱。而癰結癰氣散矣。言輕身者。脚腫溼痺。愈而無重著之患也。(張石頑)

●夏枯草本經以爲苦寒。而樓全善謂目珠夜痛。及點苦寒藥更甚

者。夜與寒皆陰也。此物冬至生。夏至枯。氣裏純陽。補肝血。故治此如神。以陽治陰也。豈非以此物爲溫熱乎。不知其方乃以香附甘草爲佐。夏枯草雖微寒。而有香附之辛溫佐之。亦不同沈寒之品矣。又何疑夏枯草之微寒耶。按此草不獨能治目痛。更能消乳癰。蓋凡熱鬱肝經等症。治無不效。要藉其解散之力耳。又丹溪曰。此草大有補養厥陰血脈之功。殆能散而又能補者歟。(虞鵬飛)

●本品係夏枯草蒸取之

●本經專治寒熱癰癰。以辛能散結。苦能除熱。而癰結癰氣散矣。言輕身者。脚腫溼痺。愈而無重著之患也。(張石頑)

●夏枯草本經以爲苦寒。而樓全善謂目珠夜痛。及點苦寒藥更甚

者。夜與寒皆陰也。此物冬至生。夏至枯。氣裏純陽。補肝血。故治此如神。以陽治陰也。豈非以此物爲溫熱乎。不知其方乃以香附甘草爲佐。夏枯草雖微寒。而有香附之辛溫佐之。亦不同沈寒之品矣。又何疑夏枯草之微寒耶。按此草不獨能治目痛。更能消乳癰。蓋凡熱鬱肝經等症。治無不效。要藉其解散之力耳。又丹溪曰。此草大有補養厥陰血脈之功。殆能散而又能補者歟。(虞鵬飛)

●本品係夏枯草蒸取之

●本經專治寒熱癰癰。以辛能散結。苦能除熱。而癰結癰氣散矣。言輕身者。脚腫溼痺。愈而無重著之患也。(張石頑)

●夏枯草本經以爲苦寒。而樓全善謂目珠夜痛。及點苦寒藥更甚

者。夜與寒皆陰也。此物冬至生。夏至枯。氣裏純陽。補肝血。故治此如神。以陽治陰也。豈非以此物爲溫熱乎。不知其方乃以香附甘草爲佐。夏枯草雖微寒。而有香附之辛溫佐之。亦不同沈寒之品矣。又何疑夏枯草之微寒耶。按此草不獨能治目痛。更能消乳癰。蓋凡熱鬱肝經等症。治無不效。要藉其解散之力耳。又丹溪曰。此草大有補養厥陰血脈之功。殆能散而又能補者歟。(虞鵬飛)

●本經專治寒熱癰癰。以辛能散結。苦能除熱。而癰結癰氣散矣。言輕身者。脚腫溼痺。愈而無重著之患也。(張石頑)

●夏枯草本經以爲苦寒。而樓全善謂目珠夜痛。及點苦寒藥更甚

者。夜與寒皆陰也。此物冬至生。夏至枯。氣裏純陽。補肝血。故治此如神。以陽治陰也。豈非以此物爲溫熱乎。不知其方乃以香附甘草爲佐。夏枯草雖微寒。而有香附之辛溫佐之。亦不同沈寒之品矣。又何疑夏枯草之微寒耶。按此草不獨能治目痛。更能消乳癰。蓋凡熱鬱肝經等症。治無不效。要藉其解散之力耳。又丹溪曰。此草大有補養厥陰血脈之功。殆能散而又能補者歟。(虞鵬飛)

●本品係夏枯草蒸取之

●本經專治寒熱癰癰。以辛能散結。苦能除熱。而癰結癰氣散矣。言輕身者。脚腫溼痺。愈而無重著之患也。(張石頑)

●夏枯草本經以爲苦寒。而樓全善謂目珠夜痛。及點苦寒藥更甚

者。夜與寒皆陰也。此物冬至生。夏至枯。氣裏純陽。補肝血。故治此如神。以陽治陰也。豈非以此物爲溫熱乎。不知其方乃以香附甘草爲佐。夏枯草雖微寒。而有香附之辛溫佐之。亦不同沈寒之品矣。又何疑夏枯草之微寒耶。按此草不獨能治目痛。更能消乳癰。蓋凡熱鬱肝經等症。治無不效。要藉其解散之力耳。又丹溪曰。此草大有補養厥陰血脈之功。殆能散而又能補者歟。(虞鵬飛)

●本品係夏枯草蒸取之

●本經專治寒熱癰癰。以辛能散結。苦能除熱。而癰結癰氣散矣。言輕身者。脚腫溼痺。愈而無重著之患也。(張石頑)

●夏枯草本經以爲苦寒。而樓全善謂目珠夜痛。及點苦寒藥更甚

者。夜與寒皆陰也。此物冬至生。夏至枯。氣裏純陽。補肝血。故治此如神。以陽治陰也。豈非以此物爲溫熱乎。不知其方乃以香附甘草爲佐。夏枯草雖微寒。而有香附之辛溫佐之。亦不同沈寒之品矣。又何疑夏枯草之微寒耶。按此草不獨能治目痛。更能消乳癰。蓋凡熱鬱肝經等症。治無不效。要藉其解散之力耳。又丹溪曰。此草大有補養厥陰血脈之功。殆能散而又能補者歟。(虞鵬飛)

●本品係夏枯草蒸取之

●本經專治寒熱癰癰。以辛能散結。苦能除熱。而癰結癰氣散矣。言輕身者。脚腫溼痺。愈而無重著之患也。(張石頑)

●夏枯草本經以爲苦寒。而樓全善謂目珠夜痛。及點苦寒藥更甚

●艾名冰臺。此名夏臺。灸治百病。能回絕氣。治百病。濟絕氣。恐是一物重出也。(李時珍)

●夏橘。即金橘之古籍別名。典見廣州志。詳「金橘」條。

●夏薑。即芥子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「芥子」條。

●奚毒。即草烏頭之古籍別名。典見本經。詳「草烏頭」條。

●梁羅子。即天師粟之古籍別名。典見綱目。詳「天師粟」條。

●宮粉。即白粉之古籍別名。典見綱目。詳「白粉」條。

●白粉。即白粉之處方用名。詳「白粉」條。

●宮粉茶。即山茶花之古籍別名。典見綱目。詳「山茶花」條。

●書母草。即鬼臼之古籍別名。典見圖經本草。詳「鬼臼」條。

●宵燭。即螢火之古籍別名。典見古今注。詳「螢火」條。

●家母藤。即葛公藤之古籍別名。典見葛祖方。詳「葛公藤」條。

●家芥子。即芥子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「芥子」條。

●家苦。即苧麻之古籍別名。典見綱目。詳「苧麻」條。

過。病脾疾。國醫不效。召楊介診之。介用大理中丸。上曰。服之屢矣。介曰。疾因食冰。臣因以冰煎此藥。是治受病之原也。服之果愈。若此。可謂活機之士矣。(李時珍)

【夏芥】即芥子之古籍別名。典見和漢藥考。詳「芥子」條。

【夏枯花】即夏枯草之處方用名。詳「夏枯草」條。

【夏枯草】 命名 本品夏至後即枯。故名。

處方用名 夏枯花。

古醫別名 夕句乃東(本經)

燕面(別錄)鐵色草(綱目)血見愁猪屎草。云蜜。驚。驚。驚。筋骨草。

四牛鬬草(和漢藥考)

外國名詞 Herba Brunellae

lae Herb. Brunell. (拉一)

基本 屬唇形科夏枯草之葉。

產地 凡山野原澤間。多有生焉。陳仁山藥物生。產辨云。夏枯草產廣東北江。星子。樂昌。連州等江。浙各省均有出產。

形態 夏枯草為山野自生之宿根草。莖作方形。高五六寸。葉對

生。作長橢圓形。前端尖。邊緣有細鋸齒。葉脈多毛茸。於莖頂葉腋。叢生淡紫色或白色唇形花。後結實。此草至夏枯死。故有夏枯草之名。尚有滁州夏枯草。為山野自生之唇形科植物。箭韋草 Brunellae Vulgaris, L. 莖方形。高一尺許。葉對生。類薄荷葉而稍尖。葉莖俱生毛茸。莖頂列生淡紫色或白色唇形花。作穗狀。如矢。故名。藥用混充夏枯草。



夏 枯 草

採取 四月間採之。

製法 採得陰乾。取葉莖用。亦有用其花者。

性質 苦。辛。寒。無毒。

效能 清肝火。散鬱結。消癰。明目。自治瘰癧。解凝藥。又為解除子宮及陰戶黏膜炎及眼病藥。

主治 寒熱瘰癧。鼠瘻。頭瘡。破癰。散癰。結氣。腳腫。癰痺。輕身。歷代記述攷證 【明】繆希雍

本草經疏論夏枯草曰。夏枯草味苦辛。而性寒無毒。為治瘰癧鼠瘻之要藥。入足厥陰少陽經。丹溪謂其補厥陰肝家之血。又辛能散結。苦寒能下泄除熱。故治一切寒熱及消瘰癧鼠瘻。破癰。散癰。結氣。頭瘻。皆由於熱。腳腫。癰痺。無非滯熱所成。熱消結散。滯去。則三證自除。而身亦輕矣。【明】李士材本草圖解論夏枯草曰。夏枯草苦辛微寒。獨入厥陰。消瘰癧。散結氣。止目珠痛。此草補養厥陰血脈。又能疎通結氣。目痛瘰癧。皆係肝症。故建神功。然久用亦防傷胃。與參朮同用。方可久服無弊。【清】黃宮繡本草求真論夏枯草曰。夏枯草辛苦微寒。按書所論治功。多言散結解熱。能治一切癰癧。瘰癧。目珠夜痛等症。似得以寒清熱之義矣。若屬內火。治不宜用。又藥何以枯名。以其冬生而夏枯也。莖葉同用。

近人學說 張山雷曰。夏枯草之性。本經言苦辛。並無寒字。孫氏問經堂本可證。而自千金以後。皆加一寒字。於辛字之下。然此草特夏至自枯。故得此名。丹溪謂其稟

純陽之氣。得陰氣而即死。觀其主瘰癧。破癰。散結。腳腫。癰痺。皆以宣通消化見長。必具有溫和之氣。方能消釋。堅凝。疏通。空滯。不當有寒涼之作用。石頑逢原。改為苦辛溫。自有至理。苦能泄降。辛能疏化。溫能流通。善於宣泄。肝胆木火之鬱。窒而順利。氣之血運行。凡凝痰結氣。風寒瘰癧。皆其專職。丹溪謂治瘰癧。散結氣。大有補養厥陰血脈之功。樓全善謂治目珠痛。夜甚。點以苦寒藥。尤甚。者神效。蓋目珠係於厥陰。夜甚而遇寒藥。反甚。是厥陰陰火。鬱塞不疏。自不宜直折。以寒涼反致遏抑。愈劇。夏枯草能疏通肝胆之氣。水鬱達之。亦以稟純陽之氣。而散陰中結滯之熱耳。石頑謂本經言輕身者。能除腳腫。癰痺。而無重者之患也。又能解內熱。緩肝火。治肝熱目赤。皆疏通厥陰氣滯之功。用久服亦傷胃。以善於宣泄。反助厥陰肝木之氣也。

配合應用 明目補肝肝虛目暗痛。冷淚不止。血脈痛。羞明怕日。夏枯草半兩。香附子一兩。為末。每服一錢。臘茶湯調下。(簡要濟

以治風痺。相得益彰矣。(盧飛鵬)

【原蠶沙酒】

製法 用原蠶
糞炒黃。袋盛。浸
酒飲。

主治 風緩頑痺。諸節不遂。腹
內宿痛。

性質 鹹。溫。無毒。

【原蠶蛾】

古鑑別名 晚蠶蛾。
(日華)魏蠶蛾。(廣
志)熱蠶蛾。(綱目)

採取 以雄者入煎。

製法 徐之才曰。凡使炒去翅
足用。

性質 鹹。溫。無毒。

主治 益精氣。強陰道。交接不
倦。亦止精。

歷代記述攷證 【明】李時珍

本草綱目論原蠶雄蛾曰。壯陽事。
止泄精。尿血。暖水臟。治暴風。金瘡。
凍瘡。湯火瘡。滅癰瘰。

參攷資料 ①蠶蛾用第二番
取其敏於生育也。(寇宗奭) ②蠶
蛾性淫。出繭即蟻。至於枯槁乃已。
故強陰益精用之。(李時珍)

【原蠶糞】即原蠶沙之別名。詳『
原蠶沙』條。

【員實】即蠶實之古籍別名。典見

別錄。詳『雲實』條。

【唐小豆】即相思子之古籍別名。
典見和漢藥考。詳『相思子』條。

【唐夷】 基本 唐夷爲雜草類
之一種。可供藥用。

性質 苦。無毒。

主治 療瘰癧。

【唐青子】即萊菔子之古籍別名。
典見和漢藥考。詳『萊菔子』條。

【唐柿】即無花果之古籍別名。典
見和漢藥考。詳『無花果』條。

【唐茶】即畢蘆之日本別名。詳『
畢蘆』條。

【唐婆謁】即鬼臼之古籍別名。典
見綱目。詳『鬼臼』條。

【唐棣】即扶移之古籍別名。典見
爾雅。詳『扶移』條。

【唐梨】即榲桲之日本名。詳『榲
桲』條。

【唐菜】即白菜之日本名。詳『白
菜』條。

【唐楸子】即胡桃之古籍別名。典
見和漢藥考。詳『胡桃』條。

【唐蒙】即菟絲子之古籍別名。典
見爾雅。詳『菟絲子』條。

【唐橘】即枸橘之古籍別名。詳『

枸橘』條。

【唐薔】即番薔之日本名。詳『番
薔』條。

【唐攝】即地膚子之古籍別名。典
見和漢藥考。詳『地膚子』條。

【嘲嘲鳥】即鸚鵡之古籍別名。典
見廣雅。詳『鸚鵡』條。

【望菴】即天名精之古籍別名。典
見別錄。詳『天名精』條。

【埋光烏藥】即高良薑之古籍別
名。典見和漢藥考。詳『高良薑』條。

【埋頭蛇】即蝮蛇之古籍別名。典
見綱目。詳『蝮蛇』條。

【城裏赤柱】即淮木之古籍別名。
典見綱目。詳『淮木』條。

【城頭菊】 產地 生浙江杭城
石礮間。

形態 城頭菊爲菊類之一種。
枝葉極瘦。九月開花如豆。小於菊。
菊氣香而味甘。其花可供藥用。枝
葉詳見該條。

性質 甘寒。無毒。

主治 明目。祛頭風。喉痺。涼血
解毒。

【城頭菊枝葉】

主治 鮮者
生搗。瘡疔瘡。

并服其汁。兼治蛇咬。瘰癧。梅瘡。眼
癢。煎洗。天泡瘡亦效。

【夏瓜】即西瓜之古籍別名。典
見和漢藥考。詳『西瓜』條。

【夏生】即萊菔之古籍別名。典見
王禎農書。詳『萊菔』條。

【夏石】即鐘乳石之古籍別名。典
見別錄。詳『鐘乳石』條。

【夏冰】 命名 本品爲夏季所
製之冰。故名。但天然者
俱在邊荒之區。殊不易得耳。

古鑑別名 凌。(綱目)

性質 甘。冷。無毒。

主治 去煩熱。熨人乳石發熱
腫。

歷代記述攷證 【明】吳瑞日

用本草論夏冰曰。解煩渴。消暑毒。
【明】李時珍本草綱目論夏冰曰。
傷寒陽毒。熱盛昏迷者。以冰一塊
置於腹中。良。亦解燒酒毒。

參攷資料 ①夏暑極熱。食冰
應與氣候相反。便非宜人。誠恐入
腹。冷熱相激。卻致諸疾也。食譜云。
凡夏用冰。止可隱映飲食。令氣涼
爾。不可食之。雖當時暫快。久皆成
疾也。(陳藏器) ②宋徽宗食冰太

【原蠶沙】 命名 本品一名晚蠶沙。蓋原也。晚也。再養之義也。即藥用須以夏蠶之糞沙故名。

處方用名 二蠶沙。
古籍別名 晚蠶沙。晚蠶矢。（方書）蠶屎。俗名原蠶糞。別名基本 屬昆蟲類中鱗翅族。爲夏蠶排泄之糞。

產地 凡養蠶區域多有。
形態 蠶沙爲鐵黑色之橢圓顆粒。入藥須用夏蠶之糞。

製法 蘇頌曰。凡使蠶沙蠶蛾皆用晚出者佳。李時珍曰。蠶沙須晒乾淘淨再晒。可久收不壞。

性質 甘辛。溫無毒。
效能 祛風溼。治目疾。化血瘀。療頑痺。用治眼臉癢爛藥。又或以治淋疾及爲風痺藥。

主治 腸鳴熱中消渴。風痺癱瘓。

歷代記述攷證 【唐】陳藏器本草拾遺論蠶沙曰。炒黃袋盛浸酒去風。緩諸節不遂。皮膚頑痺。腹內宿冷。冷血瘀。腰脚冷疼。炒熱袋盛。熨偏風筋骨癱瘓。手足不遂。

腰腳軟。皮膚頑痺。【明】李時珍本草綱目論蠶沙曰。治消渴癢瘕及婦人血崩頭風。風赤眼去風除溼。

患卽愈。昔史國公用此浸酒。以治風痺。瘰癧多根。此然。惟晚者爲良。早蠶者不堪入藥。以飼火烘。故有毒也。

【明】繆希雍本草經疏論蠶沙曰。原蠶沙卽晚蠶所出屎也。其味辛甘。氣溫無毒。腸鳴者。水火相觸也。辛甘以和之。消渴者。中氣燥熱也。辛以潤之。蠶屬火。其性燥。燥能勝溼。去風。故其沙主療風溼之病。如陳藏器以之炒黃袋盛。浸酒去風。緩諸節不遂。皮膚頑痺。腹內宿冷。瘕血。腰脚冷疼。炒熱熨偏風筋骨癱瘓。手足不遂等證。【清】黃宮繡本草求真論蠶沙曰。蠶沙卽晚蠶所出之屎也。玩書所著治功。多有祛風除溼之能。所述治症。多是肢節不遂。皮膚頑痺。腰膝冷痛。冷血瘀。血。腸鳴消渴。爛弦風眼。絲蠶食而不飲。其食出則氣燥。燥則可以勝溼去風。凡一切皮膚等症。因於風溼而至者。無不得此以爲調治。且味辛而兼甘。故凡水火相激。而見腸鳴得此甘以和之。燥熱而見消渴不止。得此辛以潤之。是以用此炒黃袋盛。浸酒以去風。緩不遂。皮膚頑痺。瘰癧風眼。用此油浸塗。

配合應用 ①治半身不遂。蠶沙二碩。以二袋盛之。蒸熟。更互熨患處。仍以羊肚糲米煮粥。日食一枚。十日卽止。

②治風癢癰癧。作痒成瘡。用蠶沙一升。水五斗。煮取一斗二升。去滓。洗浴避風。【聖惠方】

③治頭風白屑。作癢。蠶沙燒灰。淋汁洗之。【聖惠方】

④治眼目不出。蠶沙揀淨。空心以新汲水吞下十枚。勿嚼破。【聖惠方】

⑤治消渴飲水。用晚蠶沙燒乾。焙爲末。每用冷水下二錢。不過數服。【斗門方】

⑥治婦人血崩。蠶沙爲末。酒服三五錢。【儒門事親方】

⑦治月經久閉。蠶沙四兩。砂礱炒。半黃色。入無灰酒一壺。煮沸。澄去沙。每溫服一盞。卽通。

⑧治轉女爲男。婦人始覺有孕。用原蠶屎一枚。井華水服之。日三。

（千金方）

⑨治跌撲傷損。扭閃出骨。竅等證。蠶沙四兩。炒黃。綠豆粉四兩。炒黃。枯礬二兩。四錢爲末。醋調傳之。絹包縛定。換三四次。卽愈。惡產婦近之。【邵真人經驗方】

⑩治男婦心痛。不可忍。者。晚蠶沙一兩。滾湯泡過。濾淨。取清水服卽止。【瑞竹堂方】

用量 錢半至三錢。

施用宜忌 凡無淫痒而有血燥者。禁用。

參攷資料 ①蠶屎飼牛。可以代穀。用三升醇酒。拌蠶沙五斗。傾蒸於暖室中。鋪油單上。令患風冷氣痺。及近感癰風人。就以患處一邊臥沙上。厚蓋取汗。苦虛人須防大熱昏悶。令露頭面。若未全愈。間日再作。【藏示瘕】

②陳氏經驗方。一抹背。治爛弦風眼。以真麻油浸蠶沙二三宿。研細。以篋子塗患處。不問新舊。隔宿卽愈。同桑葉灰。淋汁。煮蠶肉。作丸。治腹中癥結。李九華云。蠶沙煮酒。色味清美。又能療疾。【李時珍】

③蠶沙置酒罈上。泥好。色清味美。昔史國公用此浸酒。

好。色清味美。昔史國公用此浸酒。

閉用凌雪花、當歸、紅花、川芎、牛膝、地黃、延胡索、桃仁、蘇枋木、五靈脂。

●治婦人血崩凌雪花爲末每酒服二錢後服四物湯（丹溪方）

●治遺後下血凌雪花浸酒類飲之（普濟方）

●治消渴飲水凌雪花一兩搗碎水一盞半煎一盞分二服（聖濟方）

●治嬰兒不乳百日内小兒無故口青不飲乳用凌雪花大藍葉芒硝大黃等分爲末以羊脂和丸梧子大每服一丸以乳送下便可喫乳熱者可服寒者勿服昔有人休官後雲遊湖湘修合此方救危甚多（普濟方）

●治久近風癰凌雪花或根葉爲末每服三錢溫酒下服畢解髮不住手梳口噙冷水溫則吐去再噙再梳至二十口乃止如此四十九日絕根百無所忌（方賢奇效方）

●治通身風痒凌雪花爲末酒服一錢（醫學正傳方）

●治大風癰疾凌雪花五錢地龍焙研蠶炒全蠍炒各七箇爲末

每服二錢溫酒下先以藥湯浴過服此出臭汗爲效儒門事親如輝

蛻五品各九箇作一服（潔古家藏方）

●治鼻上酒瘡用凌雪花山梔子等分爲末每茶服二錢日二服數日除根臨川曾子仁用之有效（百一選方）又用凌雪花牛兩硫黃一兩胡桃四箇膩粉一錢研膏生絹包搗（楊氏家藏方）

●治走皮癩瘡滿頸滿頂浸淫溼爛延及兩耳痒而出水發歇不定用凌雪花并葉煎湯日日洗之（直指方）

●治婦人陰瘡紫歲爲末用鯉魚腦或膽調搽（摘玄方）

●治耳卒聾閉凌雪花杵取自然汁滴之（斗門方）

●治女經不行凌雪花爲末每服二錢食前溫酒下（徐氏胎產方）

用量 錢半至三錢

施用宜忌 凡血虛陰虧又無瘀滯者禁用畏鹵鹹

參攷資料 ●花不可近鼻聞傷腦花上露入目令人昏瞤（李

時珍）●凌雪花連莖葉用詩云

君之華云其黃矣爾雅云陵苣黃華萼白華葢山中亦有白花者（蘇頌）●今處處皆有多生山中人家園圃亦或栽之初作蔓生俟

大木久延至巔其花黃赤夏中乃盛今醫家多採花乾之入女科藥用（蘇頌）●凌雪野生蔓幾數尺得木而上即高數丈年久者藤大如杯春初生枝一枝數葉尖長有齒深青色自夏至秋開花一枝十餘朵大如牽牛花而頭開五瓣緒黃色有細點秋深更赤八月結莢如豆莢長三寸許其子輕薄如榆仁馬兜鈴仁其根長亦如兜鈴根狀秋後採之陰乾（李時珍）

性實 苦平

無毒

【凌雪花莖葉】

主治 癰瘡益氣

歷代記述攷證 【宋】大明諸家本草論凌雪花莖葉曰熱風身痒遊風風癰瘀血帶下花如根功同【明】李時珍本草綱目論凌雪花莖葉曰治喉痺熱痛涼血生肌

【凌雪花】即玄參之古籍別名典見和漢藥考詳【玄參】條

【凍青】即冬青之古籍別名典見綱目詳【冬青】條

【凍瓊脂】即石花菜膠之古籍別名詳【石花菜】條

【剛子】即巴豆之古籍別名典見雷公炮炙論詳【巴豆】條

【剛前】即淫羊藿之古籍別名典見本經詳【淫羊藿】條

【剛鬚肉】即豬肉之古籍別名典見禮記詳【豬肉】條

【原寸香】即麝香之處方用名詳【麝香】條

【原生地】即大生地之處方用名詳【大生地】條

【原油香】即大茴香之處方用名詳【大茴香】條

【原金銀】即石斛之處方用名詳【石斛】條

【原扁斛】即石斛之處方用名詳【石斛】條

【原紅花】即紅花之處方用名詳【紅花】條

【原滑石】即滑石之處方用名詳【滑石】條

【原麝香】即麝香之處方用名詳【麝香】條

【凌泉】卽黃環之古籍別名。典見本經。詳「黃環」條。

【凌霄】卽凌霄花之簡稱。詳「凌霄花」條。

【凌霄花】原名 紫葳花。蔓生延上。高達數丈。故名。其花色赤艷。又有紫葳之稱。

古鑑別名 陵君。裴華。本經。陵時花。郭璞。女葳花。甄權。武威花。羅陵花。鬼目花。吳普。

基本 屬紫葳科紫葳之花。產地 陳仁山藥物生產辨云。凌霄花各省均有產。但以江蘇鎮江爲多出。



凌霄花

形態 凌霄花爲自生山中或栽植庭園之蔓生木本。莖生氣根。植物根由莖之上部發生。不入於地內。而生於空中。取空氣中之水分以爲生活者。曰氣根。攀登他樹。其葉對生。爲羽狀複葉。小葉

作尖卵圓形。邊緣有粗鋸齒。七八月間。開黃赤色不整齊之大花。有五瓣花冠。花後結長三寸許之莢果。

採取 六七月採之。調法 採得陰乾入藥。性質 酸微寒。無毒。效能 瀉血熱。破血瘀。專作通經藥。

主治 婦人產乳餘疾。崩中。瘕瘕。血閉。寒熱。羸瘦。發胎。歷代記述攷證 【唐】甄權藥性本草論凌霄花曰。產後奔血。不定。淋瀝。主熱風。風癩。大小便不利。腸中結實。宋大明諸家本草論凌霄花曰。酒醴熱毒。風刺。婦人血隔。遊風。崩中帶下。明穆希雅本草經疏論凌霄花曰。紫葳。卽凌霄花也。其味酸。氣微寒。無毒。花開於夏。而色赤。味應帶苦。入肝行血之峻藥。故主婦人產乳餘疾。及崩中瘕瘕。血閉。寒熱。羸瘦。諸證。至於養胎。決非其性之所宜。用者。慎之。

【清黃宮繡本草求真論凌霄花曰。肝經血分藥也。味甘。而酸。氣寒。無毒。凡人火伏血中。而見腸結血

閉。風癩。崩帶。瘕瘕。一切由於血瘀。血熱而成者。所常用。此調治。蓋此專主瀉熱。熱去而血自活也。是以肺癰之藥。多有此爲君。妊娠用此。克安者。以其內有瘀積。瘀去而胎卽安之意也。所云孕婦忌服者。恐其瘀血既無。妄用。恐生他故也。此爲女科必用之藥。但當相症施治耳。藤生。花開五瓣。黃赤。亦有點。不可近鼻。聞傷腦。清張隱庵本草崇原論凌霄花曰。紫葳。延引藤蔓。主通經脈。氣味酸微寒。主清血熱。故本經主治如此。近時用此。爲通經下胎之藥。仲景蠶甲煎丸。亦用紫葳。以消瘕瘕。必非安胎之品。明矣。本經養胎二字。當是墮胎之譌耳。清楊時泰本草述鈞元論凌霄花曰。氣寒。其味鹹。先而勝。苦後而殺。知其入血而散熱。結無凝。第丹溪云。補陰甚捷。瀕湖又言。能去血中伏火。似其性不專於通行。且此味畏鹵鹹。以鹹多傷血之理推之。則知畏傷血者。必非峻於行血者也。又卽其治熱毒風言之。夫血中所鬱之熱化。而爲毒風。治非行血而兼補陰。不能取效。用此物治

之。是其卽行爲補可知矣。丹溪言其有守而能獨行。所以爲崩漏要藥歟。

近人學說 張山雷曰。凌霄之花。色黃而赤。正入血分。味微酸。而氣微寒。吳普謂神農書公岐伯皆作辛。扁鵲苦鹹。能消清血分之熱。故可以活血行滯。而亦可治帶下崩中。本經專主婦人產乳餘疾。正以初產乳子之時。陰血已虛。孤陽偏旺。最宜此酸鹹微寒。直入血分。藉以固護。既耗之元陰。而收攝浮游之陽。可見古人之治產後。皆以助陰抑陽爲主。正與晚近庸俗之見。產後妄用溫補。耗燦陰液者。兩得其反。又治崩中。則專以元陽妄行。不能自攝之崩中而言。非謂可以統治血虛不守之崩陷。瘕瘕血閉。蓋亦爲血熱太甚。灼燦成瘕者言之。亦非陰寒凝結之瘕瘕閉塞可知。又曰。寒熱羸瘦。則又血虛內熱。形消體瘠者耳。其又能養胎者。以胎元既結之時。元陰凝聚於下。往往虛陽上浮於上。而此能養之。亦助陰消陽之要旨也。

配合應用 治壯實婦人經

十畫

【修胞】即山藥之古籍別名。典見吳普本草。詳『山藥』條。

【修胞】即薯蕷之古籍別名。典見吳普本草。詳『山藥』條。

【排蒲木】產地 生陵谷間。形態 排蒲木為雜木類之一種。葉如柰。其實赤有三稜可供藥用。

性質 甘平。無毒。

主治 療少氣止煩。

【佷兔骨】即虎骨之古籍別名。典見和漢藥考。詳『虎骨』條。

【倉庚】即鶯之古籍別名。典見月令。詳『鶯』條。

【個人菜】即韭之古籍別名。典見和漢藥考。詳『韭』條。

【倍子】即五倍子之簡稱。詳『五倍子』條。

【倒吊果】即吊搭果之原名。詳『吊搭果』條。

【倒生樹】即榕之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『榕』條。

【倒行狗子】即砂撈子之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『砂撈子』條。

【倒金鈎】即雷公藤之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『雷公藤』條。

【倒流水】即流水之古籍別名。典見本草衍義。詳『流水』條。

【倒捻子】命名 本品食之必倒捻其蒂。故謂之倒捻子。說為都念子也。蘇子瞻名為海漆。非漆而曰漆。以其得一木之液凝而為血。可補人之血與漆同功。功逾膏黏。故名。

古籍別名 都念子。〔綱目〕海漆。〔蘇子瞻文〕黏子。倒黏子。〔綱目拾遺〕

產地 所在多有。產羅浮者高丈許。

形態 檣櫟叢生。開於暮春。似芍藥而小。有紅白二種子如軟柿。外紫內赤。亦小有四葉承之。汁可染若胭脂。

性質 甘美。

主治 痰嗽氣喘。暖腹脹。益肌肉。

參攷資料 東坡雜記。吾謫居南海。以五月出陸至藤州。自藤至儋。野花夾道。如芍藥而小。紅鮮可愛。檣櫟叢生。土人云。倒黏子花也。

至儋則已結子。爛紫可食。殊甘美。中有細核。嚼之瑟瑟有聲。亦頗苦沁。兒童食之。使大便難。野人夏秋下痢。食葉輒已。子活血補血。研濾為膏。偶之又止腸滑。

【倒掛紫金鈎】即雷公藤之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『雷公藤』條。

【倒掛藤】即梁上塵之古籍別名。典見綱目。詳『梁上塵』條。

產地 生深山中。

形態 倒掛藤為蔓草類之一種。莖有逆刺如懸鉤。倒掛於樹間。葉尖而長。可供藥用。

性質 苦無毒。

主治 一切老血及產後諸疾。結痛。血上欲死。煮汁服。

【倒摘刺】即黃寮郎之古籍別名。典見綱目。詳『黃寮郎』條。

【倒黏子】即倒捻子之古籍別名。典見綱目拾遺。詳『倒捻子』條。

命名 本品逐病極速。故名。

產地 生山谷中。

形態 倚待草為雜草類之一種。高二三尺。葉圓形。可供藥用。

採取 八月採之。

性質 甘溫。無毒。

主治 血氣虛勞。腰膝疼痛。風緩羸瘦。顏色枯槁。絕陽無子。婦人老血浸酒服。

【倚商】即通草之古籍別名。典見山海經。詳『通草』條。即木通之古籍別名。典見和漢藥考。詳『木通』條。

【倭木】即杉材之古籍別名。典見植物學大辭典。詳『杉材』條。

【倭硫】即石硫黃之產於日本琉球。呂宋等處者。典見和漢藥考。詳『石硫黃』條。

【倭藥】即蝸牛之別名。詳『蝸牛』條。

【兼句】即枳椇子之古籍別名。典見和漢藥考。詳『枳椇子』條。

【凌】即夏冰水之古籍別名。典見綱目。詳『夏冰水』條。

【凌水石】即寒水石之古籍別名。典見別錄。詳『寒水石』條。

【凌波仙子】即水仙之古籍別名。典見和漢藥考。詳『水仙』條。

【凌波客】即水仙之古籍別名。典見和漢藥考。詳『水仙』條。

見和漢藥考。詳『水仙』條。

Chung-kuo yao hsüeh ta ts'u tien.

R127.1

AB


C5599

V.2

1935

O.C.

UNIVERSITY OF CALIFORNIA
MEDICAL CENTER LIBRARY
SAN FRANCISCO



ORIENTAL
COLLECTION

